Nomenclator botanicus.

Nominum ad finem anni 1858 publici juris factorum, classes, ordines, tribus, familias, divisiones, genera, subgenera vel sectiones designantium enumeratio alphabetica.

Adjectis

Auctoribus, Temporibus, Locis systematicis apud Varios, Notis literariis atque etymologicis et Synonymis.

Conscripsit

Ludovicus Pfeiffer,

M. D. Cassellanus, Academiae Leop. Carol. Naturae Curiosorum etc. socius.

Vol. II. Pars altera.

CASSELLIS,

Sumptibus Theodori Fischeri.

1874.

Plinia Plumier cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Cerasear.
= Eugenia Mich.
Plinia Burger . . . : g. Vitium, teste Bronner.
Plinthanthesis Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 14: nov. g. Phalaridear.
Plinthine Rchb. 1832. Fl. exc. p. 792: sect. Arenariae. (Gypsophila aggregata L.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Rchb. 1841. Ic. fl. germ. V; 1841. Nom. p. 205. n. 7807: g. Drypear.
= Euthalia Fenzl ex parte.
Plinthus*) Fenzl 1839. Nov. stirp. decad. VI. n. 60: nov. g. Portulacear.
Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 288: g. Aizoidear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5167. p. 948; 1841. Ench. p. 500. — Walp. 1846. Rep. V. p. 783.
Meisn. 1843. Comm. p. 357: g. Ficoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Tetragonear.
Synon. Ruprechtia Rchb.
Plocaglottis Steud. vid. *Plocoglottis Blume.*
Plocama Aiton 1789. Hort. kew. p. 292: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par Schreb. 1791. Gen. II. p. 797. n. 1738. — Gmel. 1791. Syst. p. 390 (*Placoma*). 428. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1210. n. 467. — Hedw. 1806. Gen. p. 148. n. 636 (*Placoma*).
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 96. t. 196.
Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 471 (*Placoma*): g. Rubiacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XIV. 222. n. 905. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 371. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 760. n. 815; 1830. Gen. I. p. 172. n. 867. — Poir. 1826. Dict. v. 41. p. 407. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 196. (sect. incertae.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 780.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 604: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1994.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84 (*Placoma*): g. Lygistidiae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI: g. Spermacocear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 161: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 577. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 634. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 74. n. 2759. — Endl. 1838. Gen. n. 3111. p. 525; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (119). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48. — Webb . . . . Canar. II. p. 191.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Synon. Bartlingia Rchb.
Plocamieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 21: div. Sphaerococcear. (*Synon. Florideae Agdh.*) Gen.: Liagora, Ptilota, Hypnea, Grateloupia, Gigartina, Gelidium, Bowiesia, Sphaerococcus, Phyllophora, Chondrus, Gracilaria, Acanthophora, Corallopsis, Chondria, Chylocladia, Laurencia, Bonnemaisonia, Alisidium, Rhodomela, Dictyomenia, Odonthalia, Microcladia, Plocamium, Thamnophora, Botryocarpa, Rhodomenia, Hymenema, Nitophyllum, Delesseria, Aglaophyllum, Amanoia, Claudea.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 107; 1843. Phyc. gener. p. 449; 1845. Phyc. germ. p. 335; 1849. Sp. Alg. p. 883: fam. Platynoblastear. Gen.: Plocamium, Thamnocarpus, Thamnophora.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : trib. Rhodomeniacear. Gen.: Plocamium, Thamnophora.
Plocamium*) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 137: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 41. p. 407. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 367. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 329. — Menegh. 1838. Cenni p. 38. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 400; 1841. Brit. Alg. p. 64. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 151. — Math. 1853. Belg. II. p. 478. — Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 353.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 39: g. Phycoidator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 381: sect. Gastridii.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 163: g. Halymeniar.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 497 *d:* sect. Sphaerococci.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 97.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 741: g. Plocamiear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 107; 1843. Phyc. gener. p. 449; 1845. Phyc. germ. p. 335; 1849. Sp. Alg. p. 883. n. 592. — Nägeli 1847. Alg. Syst.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 155: g. Delesseriear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 52. n. $122/_{83}$. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 192. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 172. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55. 276.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Thamnophorear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126: g. Sphaerococcear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 295.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Delesseriar.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 682: g. Rhodymeniear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 152: g. Rhodymeniacear. Char. reform.
Synon. Nereidea Stackh.; Plocas Targ.
Plocamium Harv. & Hook. 1845. Fl. antarct. p. 168; 1847. Ner. austr. p. 121; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 245: g. Rhodymeniacear. ampliat.
= Thamnocarpus, Thamnophora et Plocamium Kütz.
Plocamophyllum Lessing 1831. Linnaea VI. p. 224: subg. Helichrysi. (Gnaphalium circinatum Hils. & Boj. mss.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 192: sect. Chrysolepideae.

*) πλίνθος, later, imbrex.

*) πλόκαμιον, opus textum.

Plocandra*) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 181: nov. g. Gentianear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Endl. 1838. Gen. n. 3537. p. 601; 1841. Ench. p. 302: g. Chironicar. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (168). — Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 43.
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5117: g. Erythraeariar.
Synon. Pseudosabbatia Griseb.

Plocaria Nees 1820. Hor. phys. Berol. p. 42: nov. g. Lichenum idiothalamor. phymatoideor. (Sphaerococcus lichenoides Ag.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 514 et Leman 1826. Dict. v. 41. p. 409.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 78: g. Globigerear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 23: g. Plocariar. (Meyer 1825. Flecht. p. 336 neque lichenibus nec fungis algisve adnumerandam censet. „An radix aërea plantae parasiticae phanerogamae?")
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 496: g. Sphaerococcear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25.
Endl. 1843. Spl. III. p. 50. n. $122/_{80}$: g. Sphaerococcoidear. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 190.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 307; 1849. Sp. Alg. p. 772: sect. Sphaerococci.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55. 277: g. Plocariear.
Synon. Gracilaria Grev.

Plocariae Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 22: cohors 6 Lichenum. Gen.: Isidium, Plocaria, Sphaerophoron, Roccella, Stereocaulon, Dufourea.

Plocarieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear. (*Sphaerococceae Kütz.* 1843.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: trib. Floridear. Gen.: Hypnea, Plocaria, Rhodymenia, Dicranema, Stenogramma? Heringia, Sarcomenia.

Plocarites Massalongo 1851. Piante foss. Vicent. (Flora 1852. p. 732): nov. g. Algar. foss.?

Plocas Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. it. p. 305: nov. g. Algar. (Fucus coccineus Huds.)
= Plocamium Lamx.

Plocoglottis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 380: nov. g. Orchidear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 356 (*Plocaglottis*).
Lindl. 1831. Orchid. p. 132: g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1396. p. 195; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 1995. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 540. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 676.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.?
Blnme 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 46: g. Phajusear.

Plocostemma Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 14. p. 59: nov. g. Hoyear., Hoyae aff. (P. lasianthum et pallidum.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 67: g. Ceropegiar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 526: sect. Hoyae.

Plösslea*) Endl. 1839. Nov. stirp. decad. I. n. 47; 1840. Gen. n. 5628. p. 1027; 1841. Ench. p. 561: g. anomalum Dodonaeacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 346.
Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7600: g. Cupaniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Sapindacear. anomalum.

Ploiarium Endl., Lindl. vid. *seq.*

Ploiarum**) Korthals .... Verhand. nat. Gesch. ned. Bes. p. 135. t. 25.
Walp. 1842. Rep. I. p. 378; 1846. V. p. 132: g. Laplacear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 94. n. $5416/_1$ (*Ploiarium*).
Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Ternströmiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397 (*Ploiarium*).

Ploinixia „Korthals Loranth. jav." Endl. 1841. Ench. p. 399. n. 4584 *b*: sect. Visci.
Conf. seq.

Ploionuxia Korthals .... Verh. Bat. Genootsch. XVII. p. 254: sect. Visci. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 804.
Conf. praeced.

Plokiostigma Schuchardt 1853. Linnaea XXVI. p. 39: nov. g. Stackhousiacear. (P. Lehmanni.)

Plotea Gmel. vid. *seq.*

Plotia Adans. 1763. Fam. II. p. 226: g. Jasminor. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 41. p. 556.
Scop. 1777. Intr. p. 198: g. Speciosar. (*Rapanea Aubl.*)
Gmel. 1791. Syst. p. 404 (*Plotea*): g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 41. p. 556. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIX. 522. n. 803.
= Myrsine Linn.

Plotia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 55. n. 697: g. Arcythophytor.
= Ropourea Aubl.

Plotia Schreb. mss. ex Trin. in Steud. Nomencl. II. p. 356. 361 (brizoides).
= Poa obtusa Nutt.

Plottzia Arnott 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 441.
Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96): g. Illecebrear.
= Chaetonychia DC.

Pluchea***) Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 31; 1826. Dict. v. 42. p. 1: nov. g. Verноniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 339; 1830. v. 60. p. 586: g. Plucheinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 449. Sect.: Stylimnus, Hebephora. — Endl. 1838. Gen. n. 2414. p. 391; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

---

*) πλέκω, torqueo; ἀνήρ, vir.

*) Dicat. Plössl, optico Vindobonensi cel.
**) πλοιάριον, navicula.
***) Dicat. abbati Nat. Ant. Pluche, gallo.

Pluchea Cass. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2211: g. Eupatorinar.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 149: g. Tarchonanthear. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 260. — Brongn. 1843. En. genr. p. 43.
Less. 1832. Syn. p. 207: g. Epaltidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3567: g. Plucheinar. Sect.: Pluchea, Hebephora.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 58: subg. Conyzae.

Plucheinae Rchb. 1841. Nomencl. p. 91: subdiv. Conyzear. Gen. Plucheinear. Endl. et Placus?, Laggera.

Plucheineae Cassini 1828. Dict. v. 57. p. 338; 1830. v. 60. p. 586: div. Vernoniear. Gen.: Epaltes, Pluchea, Chlaenobolus, Monenteles, Phalacromesus, Monarrhenus, Tessaria. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. Gen. ead. et Blumea.
DC. 1836. Pr. V. p. 432: div. Tarchonanthear. Gen.: Blumea, Pluchea, Pterocaulon, Monenteles, Tessaria, Monarrhenus, Cylindrocline, Evax, Micropsis, Micropus, Epaltes, Denekia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 391; 1841. Ench. p. 236. Gen. ead. et Dipterocome. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 41) Diaperia, Stylocline et 1843 (Spl. III. p. 68) Filaginopsis, Calymmandra. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). Gen. ead. et Gnaphalopsis?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ut Endl. 1842.

Pluchia Arrab. 1835. Fl. Flum. IV. t. 20.
= Diclidanthera Mart.

Pluckenetia Steud. vid. *seq.*

Plucknetia Gmel. vid. *seq.*

Plukenetia*) Plumier 1703. Gen. in Ind. (antea *Pluknetia*).
Linn. 1753. Sp. II. p. 1192: g. pl. incertae sedis.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1277. n. 964; 1763. Sp. ed. II. p. 1423; 1764. Gen. ed. VI. p. 501. n. 1080; 1767. Syst. ed. XII. p. 633: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 720; 1784. Syst. p. 862. — Reich. 1778. Gen. p. 497. n. 1178. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 652. n. 1459. — Pers. 1797. Syst. p. 906. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 514. n. 1715.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 392. — J. E. Smith 1799. Nov. Act. Ups. VI. p. 1. (Monogr.) — Steud. 1841. Nom. II. p. 356 (*Pluckenetia*).
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474.
Gled. 1764. Syst. p. 140. n. 592: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 242: g. Tricoccar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 169.
Neck. 1790. El. II. p. 339. n. 1130: g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1013 (*Plucknetia*): g. Monadelph. Octandr.

*) Dicat. Leonardo Plukenett, Anglo.

Plukenetia Plum. cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 505: g. Tithymaloidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 289: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 580. n. 2135. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 8.
Meisn. 1841. Gen. p. 338 (251): g. Acalyphear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Synon. Pluknetia Plum.

Pluknetia Plum. 1703. Nov. gen. p. 47. t. 13.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 517. n. 996: g. incertae sedis.
Adans. 1763. Fam. II. p. 357: g. Tithymalor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 374: g. Linozostear.
A. Juss. 1824. Euphorb. p. . . .: g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 161.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 86. n. 2430; 1831. Gen. II. p. 553. n. 2708: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5031; 1841. Nom. p. 194. n. 7349: g. Acalyphear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. — Endl. 1840. Gen. n. 5784. p. 1111; 1841. Ench. p. 587. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 288.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Ricinear. genuinar.
Baill. 1858. Euphorb. p. 483: sect. Sajorii.
= Plukenetia Plum.

Plumaria Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 58. 86: nov. g. Fucor. (Pl. pectinata.)
= Ptilota Agdh.

Plumaria Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 4: subg. Hydranthematis. (Conferva verticillata, Myriophyllum, equisetifolia.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 10.
= Griffitsia Agdh.

Plumbageae Rchb. 1837. Handb. p. 202: div. Plumbaginear. Subdivis.: Armerieae, Staticeae, Dentellarinae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 122. Subdivis.: Staticeae, Dentellarieae, Salvadoreae.

Plumbageae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 315 (226): trib. Plumbaginear. Gen.: Plumbago, Ceratostigma, Vogelia.
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 690: trib. Plumbaginacear. Gen.: Plumbagella, Plumbago; Valoradia, Vogelia; Bubania.

Plumbagella Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 333 not.: nov. g. Plumbaginear. verar. (P. micrantha Led.)
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 690: g. Plumbagear.

Plumbagidium Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 338: nov. g. Plumbaginear. verar. (P. auriculata, scandens, rosea.)
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 691: sect. Plumbaginis.

Plumbaginaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 269; 1847. Veg. kingd. p. 639: ordo Cortusalium. Trib.: Staticeae, Plumbagineae.
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 617: ordo (154) Corolliflorar. Trib.: Staticeae, Plumbageae.

Plumbagineae Vent. 1799. Tabl. II. p. 276: ordo 4 class. VII. Gen.: Plumbago, Statice. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 228.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 216. t. 38. Gen. ead.
DC. 1805. Franç. III. p. 418: fam. (36) Dicotyledonum. Gen. ead.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 425. Ed. Nees p. 281: ordo Dicotyledonum monopetalar. Nov. gen.: Aegialitis.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 381: fam. Nyctagineis et Primuleis aff. Gen.: Plumbago, Vogelia, Statice, Armeria, Aegialitis.
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Monochlamydear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: fam. Thalamitubiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1826. Isis p. 586: ordo Tubiflorar.
Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 13. Gen.: Plumbago, Vogelia, Thela, Aegialitis, Statice.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXX; 1828. Consp. p. 91; 1831. Fl. exc. p. 189: fam. Aggregatar. Divis.: Stylidieae, Staticeae, Dentellarieae et 1828 Brunoniaceae.
Link 1829. Hdb. I. p. 401: ordo (18) Hypanthar. Gen.: Plumbago.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (183) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 126: ordo (84) Aggregatar. Divis.: *genuinae* (gen.: Plumbago, Vogelia), Staticeae.
Lindl. 1833. Nix. p. 31: ordo unicus Plumbalium.
Mart. 1835. Consp. p. 25: ordo 140.
Koch 1837. Syn. p. 594. Ed. II. p. 682: ordo Corolliflorar. Gen. ut Vent.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201; 1841. Nom. p. 122: fam. Crateriflorar. Divis.: Plantagineae, Plumbageae, Epacrideae.
Endl. 1838. Gen. p. 348; 1841. Ench. p. 223: ordo Plumbaginum. Trib.: Staticeae, *verae* (gen.: Plumbago, Ceratostigma, Vogelia et 1843 [Spl. III. p. 65] Valoradia).
Ebel 1840. Prodr. Plumbag. fam. (Regiomont.)
Meisn. 1840. Gen. p. 315 (226): ordo Plantagoidear. Trib.: Staticeae, Plumbageae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 331: fam. (66) Aggregatar. Trib.: *verae* (gen.: Plumbagella, Plumbago, Plumbagidium, Ceratostigma, Vogelia), Staticeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 70: fam. Primulinear. Gen.: Armeria, Statice, Plumbago.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 641: trib. Plumbaginacear. Gen. Plumbaginear. verar. Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 289. Trib. ut Endl.

Plumbagines Juss. 1789. Gen. p. 92: ordo 4 class. VII. Gen.: Plumbago, Statice.
= Plumbagineae Vent.

Plumbagines Endl. 1838. Gen. p. 346; 1841. Ench. p. 221: class. Acramphibryor. Gamopetalor. Ordines: Plantagineae, Plumbagineae, (Salvadoraceae).

Plumbaginoides Boerh. 1720. Lugd. Bat. II. p. 264.
= Boerhaavia Vaill.

Plumbago*) Tourn. 1700. Inst. p. 140. t. 58: g. pl. class. II.
Linn. 1737. Gen. p. 44. n. 123; 1737. Cliff. p. 53; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 43; 1753. Sp. I. p. 151; 1759. Syst. ed. X. p. 921. n. 196; 1762. Sp. ed. II. p. 215; 1764. Gen. ed. VI. p. 86. n. 213; 1767. Syst. ed. XII. p. 154. n. 212: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 167; 1784. Syst. p. 199. — Reich. 1778. Gen. p. 88. n. 227. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 114. n. 281. — Gmel. 1791. Syst. p. 337. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 33; 1818. Fl. cap. II. p. 13. — Pers. 1797. Syst. p. 205; 1805. Ench. I. p. 175. n. 406. — Willd. 1797. Sp. I. p. 837. n. 318; 1809. En. p. 198. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 37; ed. 1832. I. p. 462.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 195.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 217. n. 906: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 428.
Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jalapar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 265.
Hill 1769. Ht. kew. p. 127: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 278: g. Icosandrar.
Medic. 1787. Malv. p. 86: g. Monadelph. Pentandr. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 211; 1789. Phil. Bot. I. p. 60.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 234. t. 50. f. 11 (rosea).
Juss. 1789. Gen. p. 92: g. Plumbaginum.
Neck. 1790. El. III. p. 355. n. 1783: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 277: g. Plumbaginear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 216. — DC. 1805. Franç. III. p. 424. — Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 482. — Hedw. 1806. Gen. p. 87. 377. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 381; 1825. Syst. I. p. 537. n. 573; 1830. Gen. I. p. 121. n. 602. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 220. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 77 (*Dentelaire*). — Kunth 1823. Syn. II. p. 21. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 735. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 171. — Link 1829. Hdb. I. p. 401. — Bartl. 1830. Ord. p. 127. — Endl. 1833. Norf. p. 43; 1838. Gen. n. 2174. p. 349; 1841. Ench. p. 224. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 590. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 70. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 301. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 641. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 289. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 753.
Batsch 1802. Tab. p. 224: g. Jalapinar.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 3. n. 616: g. Globulariar.
Link 1821. En. I. p. 156: g. Globularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1926; 1841. Nom. p. 123. n. 4785: g. Dentellariear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 191; 1837. Hdb. p. 203: g. Dentellarinar.
Meisn. 1840. Gen. p. 315 (226): g. Plumbagear. — Par. Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 60. Sect.: Plumbago, Plumbagidium. —

*) Nomen ex Plinio.

Plumbago Tourn. cont.
Ledeb. 1849. Ross. III. p. 470. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 993.
Synon. Dentillaria J. Bauh.; Dentellaria Hall.; Thela Lour.

Plumbago Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 334: g. Plumbaginear. verar. restrict. (P. europaea L.)
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 691: sect. Plumbaginis.

Plumbales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 31: nixus Aggregatar. Ordo: Plumbagineae.

Plumea Lunan. 1814. Hort. jam. II. p. 77.
= Guarea Linn. spec. (DC. Pr. I. p. 624.)

Plumeria*) Tourn. 1700. Inst. p. 659. t. 439. Append.
Linn. 1737. Gen. p. 66. n. 188: g. Pentandr. Digyn.
Linn. 1737. Cliff. p. 76; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 94. n. 219; 1753. Sp. I. p. 209; 1759. Syst. ed. X. p. 944. n. 263; 1762. Sp. ed. II. p. 306; 1764. Gen. ed. VI. p. 117. n. 298; 1767. Syst. ed. XII. p. 190. n. 296: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 210; 1784. Syst. p. 254. — Reich. 1778. Gen. p. 121. n. 325. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 164. n. 422. — Lour. 1790. Coch. I. p. 117. — Gmel. 1791. Syst. p. 437. — Pers. 1797. Syst. p. 267. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1242. n. 483; 1809. En. p. 275. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 20. t. 137—142 (*Plumieria*. — Char. reform.) — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 26. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 20.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 197. n. 816: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31 (*Plumiera*): g. Contortor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Apocinor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 172 (*Plumiera*): g. Apocynor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 201. — Haw. 1819. Succ. suppl. p. 6.
Scop. 1777. Intr. p. 155 (*Plumieria*): g. Dicarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 145: g. Apocinear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 424. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 329. — Hedw. 1806. Gen. p. 110. n. 492 (*Plumieria*).
Neck. 1790. El. I. p. 261. n. 415: g. Campylophytor.
Pers. 1805. Ench. I. p. 267. n. 614: g. Apocynear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 493; 1825. Syst. I. p. 835. n. 961; 1830. Gen. I. p. 207. n. 1056. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 229. (verar.) — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXVI. 416. n. 751 (*Plumieria*). — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 355 (*Franchipanier*). — Link 1821. En. I. p. 205; 1829. Hdb. I. p. 430. — Kunth 1823. Syn. II. p. 296. (verar.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1036. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 882.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3538: g. Vincear.
Bartl. 1830. Ord. p. 204: g. Echitear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 93 (*Plumiera*): g. Tabernaemontanear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 389. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 425.
Endl. 1838. Gen. n. 3400. p. 582; 1841. Ench. p. 294: g. Plumeriear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 519. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 717 (*Franchipanier*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601 (*Plumieria*): g. Plumierear.

Plumerieae Endl. 1838. Gen. p. 581: trib. Euapocynear. Gen.: Hunteria, Urceola, Tabernaemontana, Voacanga, Orchipeda, Aspidosperma, Plumeria, Cameraria, Gonyoma, Rhazya, Amsonia, Vinca, Lochnera; Plectaneia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1396 et Ench. p. 294) Conopharyngia, 1842 (Spl. II. p. 56) Odontadenia, Cyclostigma, Thyrsanthus et 1843 (Spl. III. p. 75) Piptolaena.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. 518: trib. Apocynear. Gen. ut Endl. 1838. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172). Gen. ead. exclusis Orchipeda et Plectaneia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52. Gen. ex Endl.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 345: trib. Apocynacear. Subtrib.: Alyxieae, Tabernaemontaneae.

Plumiera Linn., Adans., G. Don vid. *Plumeria Tourn.*

Plumiereae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 601: trib. Apocynacear. Gen. Alyxiear. et Tabernaemontanear. A. DC. et Stemmadenia.

Plumieria Scop., Ruiz & Pav., Hedw., Röm. & Schult. vid. *Plumeria Tourn.*

Plumularia C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 393: subsect. Mallacodii. (Hypnum velutinum L.)

Pluridens Necker 1790. Elem. bot. I. p. 86. n. 156: nov. g. Siphoniphytor.
= Bidentis Linn. pars.

Plusiocoma*) Schrenk 1841. Enum. pl. nov. I. p. 50: sect. Inulae. (I. grandis Schrenk.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 600. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 508.

Pluteus Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 198 (Plutei): subtrib. Clitopili.
Fries 1836. Epicr. p. 140; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 286: subg. Hyporhodii. — Simil. Bail 1858. Syst. p. 38. t. 37.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 5: sect. Agarici. Subsect.: Volvaria, Psalliota, Psilopus. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 510: subsect. Hyporhodii. Divis.: Psilopus, Volvaria.
Bonord. 1851. Hdb. p. 192: g. Agaricinor.

*Plyrontophytum**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 104: gen. XIX. plant. Spec. natur.: Peplis, Lythrum, Bergenia, Pemphis, Ammania, Villarsia, Celastrus, Evonymus, Itea, Turnera, Cassine, Sibbaldia, Leonicenia, Tiarella, Blondia, Mitella, Osbeckia, Grislea, Mela-

*) Dicat Carolo Plumiero „Tournefortio americano“: Linn. Hort. Cliff. p. 76.

*) πλούσιος, dives, abundans.
**) πλευρόν, latus; φυτόν, planta.

Plyrontophytum Necker cont.
stoma, Zulatia, Jaravaea, Drepanandrum, Ginora, Savastania, Senneberia, Dugortia, Girtanneria, Marcorella, Berchemia, Rhamnus, Aspidocarpus, Hettlingeria, Forgerouxa, Verlangia, Ceanothus, Happia, Salmonia, Rumphia.

Pneophilum Montagne vid. *seq.*

Pneophyllum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 385; 1845. Phycol. germ. p. 295; 1849. Sp. Alg. p. 695. n. 465: nov. g. Spongitear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55 (*Pneophilum*): g. Floridear. minus cognitum.

Pneumaria Hill 1769. Hort. kew. p. 123: nov. g. Monopetalar., a Pulmonaria L. disjunctum.
Synon. Cerinthoides Boerh.?; Mertensia Roth; Hippoglossum Hartm.; Casselia Dumort.; Steenhammera Rchb.; Stenhammaria Lilja; Steenhammaria Lindl.

Pneumonanthe*) Gleditsch 1749. Mém. Ac. Berl. V. (1751) p. 130; 1764. Syst. p. 238. n. 979: g. Petalostemonum.
Neck. 1790. El. II. p. 11. n. 621: g. Darinyphytor.
Schmidt 1796 in Römer Arch. I. 1. p. 8. (Gentiana Pneumonanthe, purpurea, etc.)
Link 1821. En. I. p. 258; 1829. Hdb. I. p. 422: sect. Gentianae. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 269. (restrict.) — Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3499 *b*; 1841. Nom. p. 133. n. 5130. 2 *b*. — Bunge 1829. Mém. soc. Mosc. VII. (1824.) p. 206. 220. — Endl. 1838. Gen. n. 3528 *c*. p. 600; 1841. Ench. p. 302. — Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 109. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 64.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 334: g. Gentianar. verar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 426: subsect. Cyanaeae.
D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 509: g. Gentianear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 193. (verar.)
Synon. Cyane Ren.; Ciminalis Adans. pt.

Pneumonantheae Rchb. 1841. Nomencl. p. 133: subsect. Swertiear. Gen.: Pleurogyne, Gentiana.

Pneumonanthopsis Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 85: sect. Voyriae.
Miq. 1850. Stirp. sel. Surin. p. 146: g. Gentianear.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 83: g. Lisianthear.

Poa**) Linn. 1737. Gen. p. 20. n. 55; 1737. Cliff. p. 27; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 67; 1759. Syst. ed. X. p. 874. n. 77; 1762. Sp. ed. II. p. 98; 1764. Gen. ed. VI. p. 34. n. 83; 1767. Syst. ed. XII. p. 92: g. Triandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 68. — Murr. 1774. Syst. p. 97; 1784. Syst. p. 113. — Reich. 1778. Gen. p. 36. n. 89. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 49. n. 114. — Lour. 1790. Coch. I. p. 44.

*) πνεύμων, pulmo.
**) πόα, gramen, pabulum.

Poa Linn. cont.
— Gmel. 1791. Syst. p. 179. — Pers. 1797. Syst. p. 116; 1805. Ench. I. p. 88. n. 168. — Willd. 1797. Sp. I. p. 385. n. 134; 1809. En. p. 103. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 41. t. 10. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 278. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 420. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 65. — Trin. 1820. Fund. p. 138. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 590. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 333; ed. 1832. I. p. 331.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 211: g. Graminum. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 102. — Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 74. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1802. Gram. Austr. II. p. 44. t. 60—76; 1805. ibid. III. p. 9. t. 13—17. — Link 1821. En. I. p. 85. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 54. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 68. 226. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 95. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 75. n. 368. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 371. Sect.: Poa, Sclerochloa.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 19. n. 75: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 185.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 402. — Juss. 1789. Gen. p. 32. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 108. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 85. — DC. 1805. Franç. III. p. 56; 1815. V. p. 272. — Hedw. 1806. Gen. p. 45. n. 211. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 32. 532. n. 294. — Lois. 1825. Dict. v. 38. p. 142 (*Paturin*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 337. n. 341. — Link 1829. Hdb. I. p. 70. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 305.
Adans. 1763. Fam. II. p. 34: g. Poarum.
Neck. 1790. El. III. p. 220. n. 1597: g. Achyrophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 16 in Diandr. Digyn. (Poa prolifera.)
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 102. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Endl. 1837. Gen. n. 876. p. 98; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Aeluropus, Eragrostis, Poa. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 205.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 56: g. Festucacear. (verar.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 165. — Kunth 1822. Syn. I. p. 219; 1830. Gram. p. 110; 1833. Agrost. p. 324; 1838. Berol. II. p. 385. — Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Koch 1837. Syn. p. 800. Ed. II. p. 925. Sect.: Catapodium, Poa. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 446. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 41. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 349. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 145; 1850 in Webb Canar. III. p. 407. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 511 (*Paturin*). — Steud. 1854. Glum. I. p. 249. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 539.

Poa Linn. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXI. 53. 131: g. Brizoidear. Sect.: Glyceria, Sclerochloa, Eragrostis, Poa.
Link 1827. Hort. I. p. 173: g. Glycerinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1030; 1830. Fl. exc. p. 45: g. Poacear. — Par. Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 235.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 489: g. Festucear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 437. — Math. 1853. Belg. I. p. 611.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 60. Sect.: Poa, Atropis.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1383: g. Poariar. Sect. ut Endl.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 76: g. Poëar. — Par. Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 104. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 370. Sect.: Eupoa, Psilantha.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 395: g. Festucinear.
Synon. Demazeria Dum.?; Allagostachyum Nees?; Plotia Schreb. (Steud.)

Poa Palis. 1812. Agrost. p. 70: g. restrictum Graminear.
Endl. 1837. Gen. n. 876 c. p. 98; 1841. Ench. p. 59: sect. Poae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1383. 2.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 402: g. Poacear. Sect.: Micranthela, Macranthela, Neuranthe, Psilantha, Catabrosodes.

Poaceae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 583 (Verm. bot. Schr. I. p. 115): altera Graminear. tribus.
Rchb. 1828. Consp. p. 54; 1830. Fl. exc. p. 42: div. Graminear. Gen.: Airochloa, Köleria, Falimiria, Bromus, Tripogon, Schenodorus, Tricuspis, Ichnanthus, Glyceria, Pleuropogon, Molinia, Poa, Eragrostis, Briza.
Rchb. 1841. Nom. p. 39; 1844. Fl. sax. p. 29: subdiv. Festucacear. Sect.: Poariae, Brizeae.
Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 234. Gen.: Uniola, Eragrostis, Poa, Festuca, Bromus.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 422: trib. 1 Graminear. Subtrib.: Triticeae, Festuceae, Aveneae, Agrostideae, Chlorideae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 356. Subtrib.: Oryzeae, Agrostideae, Chlorideae, Festucineae, Hordeineae, Rottbölliaceae, Arundinaceae, Bambusaceae, Avenaceae.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 401: div. Loxanthar. Gen.: Dactylis, Poa, Catabrosa, Eragrostis, Aeluropus.

Poacites „Schloth." Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 210. 238. 309: g. Vegetabilium foss. class. III.
Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 137; 1828. Prodr. p. 128: g. Monocotyledonear. foss.
Endl. 1837. Gen. n. 1788. p. 257; 1841. Ench. p. 137: g. Acrobryar. foss. dubii ordinis.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 167; 1846. Chlor. prot. p. LXVI: g. Graminear. dubium.

Poae Adans. 1763. Fam. II. p. 33: sect. 3 Graminum. Gen.: Milium, Tema, Phragmites, Arundo, Dalucum, Amaxitis, Poa, Festuca, Linosparton, Cynosurus, Falonia, Sesleria.

Poariae Rchb. 1841. Nomencl. p. 39: sect. Poacear. Gen.: Poa, Sclerochloa, Glyceria, Pleuropogon, Eatonia, Catabrosa, Coelachne.

Poarion Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 950: g. Phalaridear. (*Aegialitis Trin.*, non *R. Br.*) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31.
= Köleria Link.

Poarium*) Desvaux 1825 in Hamilt. Pr. fl. Ind. occ. p. 46: nov. g. Didynam. Angiosperm. (P. veronicoides.)
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3074: g. Melampyrear.?
Meisn. 1840. Comm. p. 214: g. Scrophularinar.?
Endl. 1842. Spl. II. p. 62: g. Scrophularinear. minus notum. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 437. 973.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 585; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Scrophulariacear. minus notum.

Pocillaria P. Browne 1756. Jamaic. t. 15. f. 1.
= Cantharellus Fries.

Pocillum Tulasne 1844. Arch. Mus. IV. p. 186: sect. Dimorphandrae. (D. pennigera.) An genus proprium? — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 575.

*Pocilmophytum***) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 297: gen. LI. plant. Spec. nat.: Calamus, Elate, Caryota, Phoniphora, Bactris, Elaeis, Areca, Cocos, Corypha, Chamaerops, Borassus, Zamia, Cycas.

Pocockia***) Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 185: nov. g. Trifoliear. (Trif. Melilotus cretica L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3871. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 176. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61). — Endl. 1840. Gen. n. 6509. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. — Trautv. 1842. Flora II. Beibl. p. 122. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Boiss. 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 9. p. 11. Char. dilat.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 576. n. 2817: g. Leguminosar.
Link 1831. Hdb. II. p. 167: g. Lotoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5697: g. Trigonellear.
Synon. Melissitus Medic.

Pocophorum†) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 226. n. 964: nov. g. Eredophytor., a Rhoë L. sejunctum.
= Toxicodendron Tourn.

Podachaenium††) Benth. 1855 in Örst. Centralam. Comp. (Vidensk. Meddel.) p. 98: nov. g. Verbesineis et Galinsogeis aff. (P. alatum.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 230.
= Ferdinanda Lag.

---

*) *ποάριον*, parva planta.
**) „*ποικίλματα*, varietates facio."
***) Dicat. Rob. Pocock.
†) *πόκος*, lana.
††) *πούς, ποδός*, pes.

Podagraria Rivin. 1699. Pentap. p. 47.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 267. Ed. Hall. 1745. p. 279: g. pl. class. XII.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 99. t. 3.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 427: g. Umbelliferar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 95: g. Careor.
Mönch 1794. Meth. p. 89: g. Thalamostemonis.
= Aegopodium Linn.

Podagrostis Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 436: sect. Agrostidis. (A. aequivalvis Trin.)

Podalepis Fenzl vid. *Podolepis Labill.*

Podaliria*) Lamarck 1792. Illustr. t. 327.
Willd. 1809. En. p. 437: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 743: g. Sophorear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 144.
Link 1821. En. I. p. 401: g. Leguminosar. Sect.: Baptisia, Podaliria. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 347. n. 1640; 1830. Gen. I. p. 363. n. 1831.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5916: g. Podalirìear.
Conf. Podalyria Willd.

Podalirieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 151: subdiv. Genistear. Sect.: *genuinae* (gen. Eupodalyriear. Endl.), Pultenaeeae, Mirbelieae.

Podalyria Willd. 1799. Sp. II. p. 501. n. 806: g. Decandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1819. Corom. III. p. 55. t. 259; 1832. Ind. II. p. 317.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 211: g. Leguminosar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 293. n. 1168. — R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 6. (Verm. bot. Schr. II. p. 456.) — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 49. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1498.
Bronn 1822. Diss. p. 131: g. Sophorear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 101. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4079. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 114. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 167. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 4. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (57).
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 67; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 434: g. Eupodalyriear. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 454; 1842. Rep. I. p. 565. — Endl. 1840. Gen. n. 6423. p. 1255; 1841. Ench. p. 667. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 296.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 126: g. Podalyriear.
Conf. Podaliria Lam.

Podalyria Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 263: g. Decandr. Monogyn. (ex DC. a praecedente diversum.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 453. n. 1005.

Podalyrieae Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 27; 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 65: trib. Leguminosar. Subtrib.: Eupodalyrieae, Pultenaeae, Mirbelieae.
Endl. 1840. Gen. p. 1254; 1841. Ench. p. 666: trib. Papilionacear. Subtrib. eaed. — Par. Benth. 1841. Hook. journ. bot. III. p. 133; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 429. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 126. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. Subtrib. eaed. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 268. Subtrib. eaed.

*) Dicat. Podalirio, medico graeco antiquo.

Podanthe Rchb. vid. *Podanthes Haw.*

Podanthe Griseb. vid. *Podanthum Don.*

Podanthe Taylor 1846. Lond. journ. bot. V. p. 413: nov. g. Hepaticar. (P. squamata.)
Nees 1847. Syn. Hepat. p. 789: g. Metzgeriear.

Podanthera Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 22. t. 1759: nov. g. Arethusear. (P. pallida.)

Podanthes Haworth 1812. Syn. succ. p. 32. Ed. Schrank 1819. p. 34: g. Pentandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 55: sect. Stapeliae. — Par. Schult. 1822. Syst. VI. p. 28. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 840; 1830. Gen. I. p. 208. — Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *h* (*Podanthe*); 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 7. — Endl. 1838. Gen. n. 3524 c. p. 598; 1841. Ench. p. 300. — Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 655.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 117: g. Stapeliear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 561: subg. Stapeliae.

Podanthum*) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 748: sect. Phyteumatis. — Par. A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 454. — Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4019. 3. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 290 (*Podanthe*). — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 873.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3082 *b β*. p. 1392; 1841. Ench. p. 266: subsect. Rapunculi.
Boiss. 1849. Diagn. pl. or. II. Nr. 11. p. 76: subsect. Eucodontis.
= Asyneuma Griseb. & Schenk.

Podanthus Lagasca 1816. Nov. gen. et spec. p. 24: nov. g. Corymbiferar. (P. ovatifolius.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 899; 1826. Syst. III. p. 456. n. 2712; 1831. Gen. II. p. 617. n. 3057: g. Eupatorinar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 398; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2662.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
= Euxenia Cham.

Podasaemum Rchb. vid. *Podosaemum Kunth.*

Podaxideae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 24; 1842. Anl. Mycol. p. LXXVIII. 98: fam. Dermatogasterum. Gen.: Cycloderma, Podaxon, Cauloglossum.

Podaxidei Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 5: div. Trichogastrum. Gen.: Cauloglossum, Podaxon.
Endl. 1836. Gen. p. 28; 1841. Ench. p. 17: trib. Trichogasterum. Gen. ead. et Cycloderma. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 9. Gen. ead.

*) πούς, ποδός: a floribus pedicellatis.

Podaxidei Fries cont.
Bonord. 1851. Hdb. p. 254: fam. Trichogastrum. Gen. ut Endl.

Podaxineae Montagne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 69: div. Trichogastrum. Gen.: Cycloderma, Cauloglossum, Podaxon, Secotium, Polyplocium, Gyrophragmium. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 621. — Par. L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 175. Subdivis.: Podaxoneae, Secotieae.

Podaxinei Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 42: subordo Gasteromycetum. Gen.: Montagnea, Gyrophragmium, Polyplocium, Secotium, Podaxon, Cauloglossum, Cycloderma.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 439: div. Lycoperdaceor. Gen. ead. excepta Montagnea.
Lév. 1849 in Orb. Dict. (VII. p. 505: trib. Lycoperdacear.) VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen.: Podaxon, Cauloglossum, Hyperrhiza, Cycloderma, Stemonitis, Diachea.

Podaxis*) Desvaux 1809. Journ. bot. II. p. 97: nov. g. Fungor.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 557: g. Lycoperdinear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 139: g. Lycoperdineor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 199.
Leman 1826. Dict. v. 42. p. 54: g. Lycoperdacear.
Endl. 1836. Gen. n. 325 *a*. p. 28; 1841. Ench. p. 17: sect. Podaxonis.
= Podaxonis Fries pt.

Podaxon Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 62: g. Podaxideor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 325. p. 28; 1841. Ench. p. 17. Sect.: Podaxis, Catachyon. — Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 383. Sect.: Podaxon, Catachyon. — Bonord. 1851. Hdb. p. 254.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 99: g. Podaxidear.
Mont. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 80: g. Podaxinear.
L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 175: g. Podaxonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Podaxineor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 440. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505. VIII. p. 488.
Synon. Schweinitzia Grev.

Podaxoneae L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 175: subdiv. Podaxinear. Gen.: Podaxon, Cauloglossum, Cycloderma.

Podeilema R. Brown mss.
= Sphaeropteris R. Brown.

Poderemia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 699: sect. Eremiae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4306 *b*. p. 1411; 1841. Ench. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4892. 2.

Podetiopsorae Rchb. 1841. Nomencl. p. 14: ordo Lichenum. Subordines: Crateropsorae, Cephalopsorae. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 68. Subord. iid. et Peltopsorae.

Podia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 72. n. 127: nov. g. Siphoniphytor., a Centaurea L. disjunctum.
= Seridia Juss.

Podianthus Schnizlein 1843. Bot. Zeit. p. 739: nov. g. Dioscoridear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 214: g. Dioscoreacear.

Podiopetalum Hochstett. 1841. Flora II. p. 657: nov. g. Leguminosar. (Dalbergiear.?)
Endl. 1842. Spl. II. p. 97. n. 6730/$_1$: g. Dalbergiear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Walp. 1846. Rep. V. p. 547.

Podiscus Bailey . . .
= Eupodisci sp. (Kütz. Sp. Alg. p. 135.)

Podisoma Link 1809. Berl. Mag. III. p. 9: nov. g. Epiphytar. (Gymnosporangium fuscum DC.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 57.
Nees 1816. Syst. p. 18; 1817. Überbl. p. 4: g. Coniomycor. entophytor.
Mart. 1817. Erlang. p. 322: g. Coniomycetum (elementarium). — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 78.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Exosporior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 544: g. Coeomidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Intestinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 522: g. Uredinear. verar.
Link 1825. Spec. II. p. 127: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 190: g. Sporodesmior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 32.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Pucciniastror.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 507: g. Hypodermior.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 230: g. Sporomycetum hyposporor.
Endl. 1836. Gen. n. 187 *a*. p. 17; 1841. Ench. p. 13: sect. Gymnosporangii.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 8: g. Caeomacear.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 36; 1842. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 165: g. Coryneacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 22: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 29.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Pucciniaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 474: g. Coryneaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 148: g. Myxonemeor.
Math. 1853. Belg. II. p. 420: g. Sporidesmiear.
Tul. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 186: g. Puccinieor. *Cf.* Flora 1855. p. 747.

Podocalyx Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 202; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 52:

*) Vox hybrida: ποῦς, axis (ἄξων).

Podocalyx Klotzsch cont.
nov. g. Buxear.? — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 370.
Endl. 1842. Spl. II. p. 91. n. 5878/$_1$: g. Euphorbiacear. dubium.
= Richeria Vahl? (Baill.)

Podocarpaceae Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 448: ordo Monochlamydear. Gen.: Podocarpus, Dacrydium, Microcachrys, Pherosphaera.

Podocarpeae Rchb. 1837. Handb. p. 166: div. Taxinear. Gen.: Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus, Salisburia.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 437: sect. Abietinear. Gen.: Podocarpus, Dacrydium.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 203; 1847. Gen. Spl. IV. p. 8: ordo Coniferar. Gen. ut Spach et Microcachrys?
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1070: ordo Gymnospermar. Gen. ut Spach.

Podocarpium Benth. 1852. Pl. Jungh. fasc. II. p. 226: sect. Desmodii. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 254. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 538.

Podocarpus „L'Herit. 1788 mss." nov. g. ex typo Taxi elongatae Ait. (A. Rich.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 580. n. 2134: g. Coniferar. — Par. Link 1822. En. II. p. 411. — D. Don 1825. Nepal. p. 55. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 58. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 889. n. 3150; 1831. Gen. II. p. 703. n. 3541. (Dioec. Monandr.) — Blume 1830. En. pl. jav. I. p. 88. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 297. — Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 1. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 232.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 121: g. Monocarpar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 350.
Willd. 1809. En. p. 991: g. Monoec. Monadelph.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 297: g. Taxinar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 2. t. 97. — Agdh. 1825. Aphor. p. 212. — Bartl. 1830. Ord. p. 96.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 217: g. Taxear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 61. n. 2337.
A. Rich. 1826. Conif. p. 124; 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 358: g. Taxinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1694. — Endl. 1837. Gen. n. 1800. p. 262; 1841. Ench. p. 144; 1842. Spl. II. p. 28. n. 1810. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Brongn. 1843. En. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 181.
Rchb. 1837. Hdb. p. 166: g. Podocarpear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 437. — Endl. 1847. Conif. p. 206; 1847. Spl. IV. p. 8. n. 1810. Sect.: Nageia, Eupodocarpus, Stachycarpus, Dacrycarpus. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1071. Sect. ex Endl.
Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. p. 35. t. 10. (P. cupressina R. Br.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 231: g. Taxacear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 448: g. Podocarpacear.

Podocarpus Labill. 1806. Spec. fl. Nov. Holl. II. p. 71: g. Coniferar.
= Phyllocladus Rich.

Podocarya „Buckl." Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 136: nov. g. Pandanear. foss.

Podocentrum Burchell mss.
= Emex Neck.

Podochileae Blume 1848. Rumphia IV. p. 43: trib. Epidendrear. Gen.: Podochilus.

Podochilus Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 295: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 234: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1490. p. 206; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2095. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 300 (*Podochylus*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 568. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 686.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Blume 1848. Rumphia IV. p. 43: g. Podochilear. Sect.: Selenostylis, Scalpellorchis.
Synon. Platysma Blume; Placostigma Blume; Apista Blume.

Podochylus Hasskarl vid. *praeced.*

Podocoelia Benth. 1849. Niger Fl. p. 345: sect. Osbeckiae. (Spec. african.)

Podocoma Cassini 1817. Bull. soc. philom. Sept. p. 137: nov. g. Asterear. (Erigeron hieracifolium Poir.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 187. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3294. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 462; 1826. v. 42. p. 60; 1830. v. 60. p. 582: g. Erigerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2548.
DC. 1836. Pr. V. p. 260: g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2307. p. 374; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952.
Synon. Podopappus Hook.?

Podocoma R. Brown 1849 in Sturt's exp. App. p. 80 (Ann. and Mag. 1849. III. p. 58): nov. g. Erigeronti aff. (P. cuneifolia.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 825: g. Erigerear.?
= Ixiochlamys F. Müll. & Sond.

Podocystis Kütz. 1844. Bacill. p. 62.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 39: sect. Surirellae.

Podocystis Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 512: g. Epiteor. (*Podosporium Lév.*, nec *Schwein.*)
= Melampsora Cast.

Podocytisus Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 9. p. 7: nov. g. Genistear. (P. caramanicus.) *Cf.* Flora 1850. p. 43. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 343.

Pododiscus Kütz. 1844. Bacill. p. 51; 1849. Sp. Alg. p. 26. n. 21: nov. g. Melosirear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eulysigoniear.

Podogyne Hoffmsg. .... Verzeichn. p. 186.
= Gymnogonia R. Brown.

Podolepis Labill. 1806. Nov. Holland. II. p. 57. t. 28.
Pers. 1807. Ench. II. p. 457. n. 1865: g. Syngenes. Superfl.
R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V.

Podolepis Labill. cont.
p. 82 (Verm. bot. Schr. II. p. 442): g. Syntherear.
Cass. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 65: g. Asterear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 561; 1826. Syst. III. p. 545. n. 2766; 1831. Gen. II. p. 629. n. 3128: g. Radiatar.
Link 1822. En. II. p. 336: g. Corymbiferar.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 562; 1826. v. 42. p. 62: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2430. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26. — Brongn. 1843. Ėn. genr. p. 39.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Helichrysear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 162. Sect.: Scalia, Stylolepis, Doratolepis. — Endl. 1838. Gen. n. 2736. p. 445; 1841. Ench. p. 242. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3495. Sect.: Podolepis, Stylolepis, Doratolepis. — Walp. 1843. Rep. II. p. 645. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 462. Sect. ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 299. Sect. eaed.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 367: g. Leysserear. — Par. Fenzl 1839. Flora II. p. 730 (*Podalepis*).
Synon. Scaliopsis Walp.

Podolobium R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 9 (Verm. bot. Schr. II. p. 459): nov. g. Leguminosar. (Chorizema trilobatum Sm.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 65. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 349. n. 1647; 1830. Gen. I. p. 365. n. 1841. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1503.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 743: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 132. — DC. 1825. Pr. II. p. 103. Sect.: Pseudochorizemae, Pseudodaviesiae, Pseudo-Oxylobia. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4077. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 116. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 170. — Meisn. 1837. Gen. p. 80. (57).
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 70: g. Eupodalyriear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6428. p. 1256; 1841. Ench. p. 667. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 453.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5921: g. Podaliriear.
Brongn. 1843. Ėn. genr. p. 126: g. Podalyriear.

Podolobus Rafin. . . . . Amer. monthl. mag. IV. p. 194.
= Stanleya Nutt.

Podolotus Benth. 1835 in Royle Himal. Legum. p. 198: nov. g. Hosackiae et Loto aff. *Cf.* Vogel 1838. Linnaea Litt. p. 5.
Meisn. 1837. Gen. p. 85 (60): g. Trifoliear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6520. p. 1270; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 651. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5708: g. Trigonellear.

Podomitrium Mitten 1855 in Hook. f. Fl. N. Zeal. II. p. 164: nov. g. Hepaticar. frondosar. (Steetzia Phyllanthus Nees). *Cf.* Gottsche 1858. Bot. Zeit. Übers. Hepat. p. 22.
Synon. Hypoblyttia Gottsche.

Podoneja DC. 1836. Prodr. V. p. 325: sect. Nejae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2372 *a*. p. 384; 1841. Ench. p. 235.

Podonosma Boissier 1829. Diagn. pl. or. II. Nr. 11. p. 113: nov. g. Borraginear. (Onosma syriaca Labill.) *Cf.* Flora 1850. p. 56.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 134: g. Lithospermear.

Podopappus Hook. & Arnott 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 50: nov. g. Vernoniear. (P. hirsutus.)
= Podocoma Cass.? (ex ipsis Auctoribus.)

Podopeltis Fée 1852. Gen. Filic. p. 286: nov. g. Cyclodiear. (Aspidium singaporianum Hook.)

Podopetalum Gaudin mss.
= Trochiscanthes Koch. (DC.)

Podophorus Philippi 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 109: nov. g. Graminum. (P. bromoides.)

Podophyllaceae DC. 1824. Prodr. I. p. 111: ordo Thalamiflorar. Trib.: Podophylleae, Hydropeltideae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 120. Gen. Podophyllear. DC. 1824.

Podophylleae DC. 1819. Théor. élém. p. 243; 1821. Syst. II. p. 30: ordo 7 Thalamiflorar. Trib.: Podophylleae, Hydropeltideae. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 67.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
= Podophyllaceae DC.

Podophylleae DC. 1821. Syst. II. p. 33; 1824. Prodr. I. p. 111: trib. Podophyllacear. (1821 Podophyllear.) Gen.: Podophyllum, Jeffersonia, Achlys?
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: div. Papaveracear. Gen.: Jeffersonia, Podophyllum.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (8) Thalamiflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo ad Nymphaeaceas accedens.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452: sect. Berberidear. Gen.: Diphylleia, Hydrastis?, Podophyllum, Jeffersonia. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 185. Gen. ut DC.
Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8): ordo 7 plant. (p. 437 trib. Berberidacear.) Gen. ut Bernh.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 34. 70: trib. Berberidear. Gen. ut Rchb. 1827 et Diphylleia.

Podophyllum*) Linn. 1737. Gen. p. 151. n. 426; 1737. Cliff. p. 202; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 137; 1753. Sp. I. p. 505; 1759. Syst. ed. X. p. 1072. n. 571; 1762. Sp. ed. II. p. 723; 1764. Gen. ed. VI. p. 262. n. 646; 1767. Syst. ed. XII. p. 359: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 406; 1784. Syst. p. 489. — Reich. 1778. Gen. p. 266. n. 702. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 349. n. 879. — Gmel. 1791. Syst. p. 808. — Pers. 1797. Syst. p. 523. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1141. n. 1013; 1809. En. p. 561. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 10.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 117. n. 484: g. Thalamostemonum.

*) Detruncatio nominis sesquipedalis Tournefortiani.

Podophyllum Linn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Rhaeadum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Papaveracear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 61. n. 1251. — Link 1822. En. II. p. 68.
Adans. 1763. Fam. II. p. 432: g. Papaverum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Rhoeadear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 383.
Hill 1769. Ht. kew. p. 227: g. Polypetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 271: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 235: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 66. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 66.
Neck. 1790. El. II. p. 265. n. 1016: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 47: g. Multisiliquosar.
Cram. 1803. Disp. p. 118: in Dodecandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 493: g. Ranunculear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 729: g. Papaverear.
DC. 1821. Syst. II. p. 33; 1824. Pr. I. p. 111: g. Podophyllear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 604. n. 1946; 1830. Gen. I. p. 435. n. 2155. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII; 1841. Nom. p. 185. n. 7086. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 70. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 261.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: g. Paeonidiar.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4844; 1837. Hdb. p. 265: g. Bocconiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 252: g. Paeoniacear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 120: g. Podophyllacear.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 54: g. Nandinear.
Endl. 1839. Gen. n. 4806. p. 852; 1841. Ench. p. 440: g. Berberidear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 100. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 95. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 231.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428: g. Actaeear.
Synon. Anapodophyllon Tourn.; Anapodophyllum Mönch.

Podopogon Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 221: nov. g. Graminear. (Stipa avenacea L.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 85 et Steud. Glum. I. p. 129.
= Eustipa Trin.

Podopogon „Ehrenb." Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear. (Nomen.)

Podopteris Rchb. vid. *Podopterus Humb. & Bonpl.*

Podopterotheceae Schultz Bip. 1842. Flora II. p. 434: div. Helianthear. Gen.: Dipterotheca, Wirtgenia.

Podopterus Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 89. t. 107: nov. g. Polygonear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 181. — Campd. 1819. Mon. Rum. p. 18. — Kunth 1822. Syn. I. p. 469. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 162. n. 1387; 1830. Gen. I. p. 293. n. 1516. (Hexandr. Trigyn.) — Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 346. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XCI. 1478. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Endl. 1837. Gen. n. 1996. p. 309; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 55. (verar.) — Meisn. 1840. Gen. p. 317 (228). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1222. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 522.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4294; 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 163. n. 6329 (ubique *Podopteris*): g. Coccolobear.
C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 147: g. Triplaridear. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 171.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504: g. Triplarear.

Podoria Pers. 1807. Ench. II. p. 5. n. 1170: g. Dodecandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 73.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 475: g. Capparidear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 460. n. 1779. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 232.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 775: g. Capparidum.
= Boscia Lam.

Podoriocarpos Lam. ex Steud. Nomencl. II. p. 365. (*Podoriocarpus* ex Wittst. Etym. Handw. p. 710.)
= Boscia Lam.

Podosaemon Spreng. vid. *seq.*

Podosaemum Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 127; 1822. Syn. I. p. 197: g. Agrostidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 148.
Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 73: g. Graminear.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 906 (*Podasaemum*): g. Cinnear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 58. n. 285 (*Podosaemon*): g. Graminum.
= Podosemum Desv.

Podosemum*) „Desv." Palis. 1812. Agrost. p. 29: nov. g. Graminear. (Stipa capillaris.) *Cf.* Isis 1823. p. 699 (*Podosaemum*). — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 67.
Link 1827. Hort. I. p. 82: g. Agrostidear.
= Mühlenbergia Schreb.

Podosira Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 161: nov. g. Bacillarior., Gallionellae simile.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eulysigoniear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 26. n. 22: g. Melosirear.

Podosperma Labill. 1806. Nov. Holland. II. p. 35. t. 177.
Pers. 1807. Ench. II. p. 391. n. 1805: g. Syngenes. Aequal.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 544; 1826. Syst. III. p. 441. n. 2684; 1831. Gen. II. p. 612. n. 3024: g. Eupatorinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2414: g. Gnaphaliear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
= Podotheca Cass.

*) „ποδον, pes; ασωμος, sine corpore." (Desv.)

Podosperma Lessing 1832. Syn. Compos. p. 133: g. Scorzonerear. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 379.
Schultz Bip. 1844. Flora II. p. 476: g. Tragopogonear.
= Podospermum DC.

Podospermum DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 61; 1815. V. p. 455: nov. g. Cichoracear. (Scorzonera resedifolia L.) — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 782. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 3. 23. — Math. 1853. Belg. I. p. 321.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 582: g. Cichorear.
Link 1822. En. II. p. 279: g. Syngenes. Aequal.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 65; 1826. v. 42. p. 77; 1827. v. 48. p. 422: g. Scorzonerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2174; 1841. Nom. p. 94. n. 3690. — Koch 1837. Syn. p. 425. Ed. II. p. 489. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 110. — Endl. 1838. Gen. n. 2993. p. 497; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 781. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 470. (Sect.: Eupodospermum.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 345. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 309.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 444.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1358; 1831. Fl. exc. p. 276: sect. Scorzonerae.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.
Synon. Podosperma Less.; Richardia Roth?

Podosphaera Kunze 1823. Mykol. Heft. II. p. 109: nov. g. Fungor. (P. myrtillina.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 82.
Lév. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 135: g. Erysiphear.
Synon. Podosphaeria Fries.

Podosphaeria Fries 1825. Pl. homon. p. 161: g. Perisporior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 148.
Endl. 1836. Gen. n. 277 *b.* p. 23; 1841. Ench. p. 16: sect. Erysibes. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 310. 2.
= Podosphaera Kunze.

Podosphenia Ehrenb. 1838. Infus. p. 214.
Kütz. 1844. Bacill. p. 120; 1845. Phyc. germ. p. 106; 1849. Sp. Alg. p. 110. n. 60: g. Licmophorear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 13.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Eustylariear.

Podosporei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: div. Isariaceor.? Gen.: Podosporium, Trichostroma.

Podosporiacei Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 227: fam. Sphaeronemeor. Gen.: Dilophosphora, Podosporium, Acrospermum, Schizothecium.

Podosporium Schweinitz 1832. Trans. Amer. phil. soc. IV. t. 19. f. 1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Isariaceor.

Podosporium Schweinitz cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: g. Podosporeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Helminthosporeor.
= Helminthosporium Link?

Podosporium Léveillé 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 374 (Flora 1849. p. 278); 1849 in Orb. Dict. XII. p. 786: nov. g. Uredinear. (Uredo Capraearum.)
= Podocystis Fries.

Podosporium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 227: nov. g. Podosporiacear. (P. atrum et demersum.)

Podostachys Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 193: nov. g. Crotonear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 90. n. 5828/$_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 365: sect. Crotonis.

Podostaurus Junghuhn . . . . Nat. en Geneesk. Arch. II. p. 45.
„Jungh. Reisen durch Java 301" Walp. 1846. Rep. V. p. 7: g. Ranunculacear. indescriptum.
Endl. 1850. Spl. V. p. 101. n. 5972/$_1$: g. Zanthoxylear.

Podostemaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 482: ordo Rutalium. Gen. Podostemmear. Endl.
Tul. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 87; 1852. Arch. Mus. VI. p. 1. (Monogr.) Trib.: Hydrostachyeae, Eupodostemeae. *Cf.* Bot. Zeit. 1850. p. 502, Griseb. in Arch. f. Nat. 1850. II. p. 336, Walp. Ann. bot. III. p. 430 et Müll. Ann. bot. V. p. 772.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 301: fam. Dicotyledonear. Trib.: Podostemeae, Hydrostachydeae.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 31.
Tul. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 229. Trib.: Lacideae, Tristicheae.

Podostemales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 26: nixus Achlamydear. Ordo: Podostemoneae.

Podostemeae Rich. 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 246: ordo plant. Gen.: Podostemum, Marathrum.
Agdh. 1822. Aphor. p. 125; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: ordo Macropodar. Gen. ead. et Tristicha? — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 111. Gen. ead.
Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 6. Gen.: Mniopsis, Lacis, Podostemum, Dicraeia.
Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 83: ordo pl. Gen.: Podostemum, Halophila, Diplanthera, Hydrostachys, Marathrum.
Bartl. 1830. Ord. p. 72: ordo (49) Helobiar. Gen.: Lacis, Podostemon, Marathrum, Mniopsis.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Corda 1835 in Sturm Jungerm. p. 114. Subtrib.: Lacideae, Marathreae.
Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88): ordo 80 plant. (p. 438 Parietalium.) Gen.: Hydrostachys, Halophila, Tristicha, Philocrena, Diplanthera?, Dicraeia, Podostemum, Mniopsis, Lacis, Marathrum, Mourera.

Podostemeae Rich. cont.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 11: fam. (97) Helobiear. Gen. Podostemmear. Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 302: trib. Podostemacear. Gen.: Mniopsis, Hydrobryum, Podostemon, Mourera, Lacis, Tristicha.
Conf. Podostemoneae Rchb.; Podostemmaceae et Podostemaceae Lindl.; Podostemmeae Endl.; Philocrenaceae Bong.

Podostemmaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 190: vid. *Podostemaceae Lindl.*

Podostemmeae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (163) Achlamydear.
Endl. 1837. Gen. p. 268: ordo Aquaticar. Gen.: Mniopsis, Podostemon, Mourera, Lacis, Tristicha; Hydrostachys?, Halophila?, Lemnopsis? Accedit 1841 (Spl. I. p. 1375 et Ench. p. 154) Hydrobryum.

Podostemon Michx. 1803. Fl. bor. am. II. t. 44 (in textu *Podostemum*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 120: g. Najadum.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 95. n. 126: g. Naïadum.
Rchb. 1828. Consp. p. 77. n. 1673; 1841. Nom. p. 59. n. 2310: g. Podostemonear. — Par. Tul. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 102; 1852. Arch. Mus. VI. p. 128; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 254. (restrict.) — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 438. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 784.
Bartl. 1830. Ord. p. 72: g. Podostemear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 32. n. 44. — Griff. 1836. Asiat. soc. XIX. 1. (*Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 182.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 124. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 12. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 302 (sph. *Podostempon*).
Corda 1835 in Sturm Jungerm. p. 114: g. Marathrear.
Endl. 1837. Gen. n. 1832. p. 269; 1841. Ench. p. 155: g. Podostemmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 483: g. Podostemacear. *Cf.* Flora 1850. p. 39. — Par. Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 33. t. 1918.
Synon. Podostemum Michx.; Dicraeia Pet.-Th.?

Podostemoneae Rchb. 1828. Consp. p. 97: fam. Najadear. Gen.: Mniopsis, Lacis, Marathrum, Podostemon; Tristicha; Hydrostachys. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 162. Divis.: Blandovieae, Marathreae, Lacideae. — Rchb. 1841. Nom. p. 59. Gen.: Lemnopsis?, Mniopsis, Hydrobryum, Podostemon, Mourera, Lacis, Tristicha, Hydrostachys.
Lindl. 1833. Nix. p. 26: ordo Podostemalium.

Podostemoneae Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 102; 1852. Arch. Mus. VI. p. 128; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 254: sect. Lacidear. Gen.: Podostemon, Hydrobryum, Mniopsis, Oserya, Devillea, Sphaerothylax, Castelnavia. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 437. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 773.

Podostempon A. Juss. vid. *Podostemon Michx.*

Podostemum*) Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 164: nov. g. Monoec. Diandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 196. n. 1633. — Pers. 1807. Ench. II. p. 532. n. 2026. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 202.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 246: g. Podostemear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 259. — Agdh. 1822. Aphor. p. 125. — Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 6. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 82. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 111. — Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88).
= Podostemon Michx.

Podostigma Elliott 1817. Sketch Bot. South-Carol. I. p. 326: nov. g. Pentandr. Digyn. (Asclepias pedicellata et viridis Walt.)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 850. n. 985; 1830. Gen. I. p. 211. n. 1081: g. Asclepiadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 903. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3431: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
Endl. 1838. Gen. n. 3489. p. 594; 1841. Ench. p. 299: g. Euasclepiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176).
Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4976: g. Asclepiear. genuinar.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 521: g. Haplostemmar.
Synon. Stylandra Nutt.

Podostrombium**) „Kunze" Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 158: g. Apiosporior. *Cf.* Endl. Gen. p. 23.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 308: g. Apiosporeor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44 (*Podostromium*): g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Sphaeriaceor. (= Hypolyssus Montagnei Berk.)

Podostromium Lindl. vid. *praeced.*

Podosycea Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 442: sect. Ficus. (F. macropoda et pedunculosa.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 722.

Podotheca Cassini 1822. Dict. v. 23. p. 561: g. Gnaphaliear. (serius *Phaenopoda* dictum.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Less. 1832. Syn. p. 272: g. Helichrysear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 159. — Endl. 1838. Gen. n. 2731. p. 444; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3500. — Walp. 1843. Rep. II. p. 645. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 448. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Synon. Podosperma Labill.; Phaenopoda Cass.

---

*) στήμων, stamen.
**) στρόμβιον, helix, turbo.

Podozamites Münst., Braun, Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 111: sect. Zamitis.
= Palaeozamia Endl.

Poëae Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 161. 171. 203; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 104: subtrib. Festucear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 76: subdiv. Festucacear. Gen.: Poa, Briza, Glyceria, Enodium, Catabrosa. — Simil. Steud. 1854. Glum. I. p. 249.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 367: subdiv. Bromear. Gen.: Sclerochloa, Dactylis, Aeluropus, etc.

Poecadenia Wittst. vid. *Poikadenia Ell.*

Poechia*) Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 43. n. 1961/₁: g. Aërvear. (*Psilostachys Hochst.*, non *Turcz.*)
= Psilotrichum Blume.

Poecilandra Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 342: nov. g. Ternströmiacear. (P. retusa.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 123: g. Ternströmiaceis aff.
Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5959/₁: g. Luxemburgiear. minus notum.

Poecilochroma**) Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 353; 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 178 (*Paecilochroma*): nov. g. Jochromear. (Saracha punctata Rz. & Pav.)
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 494: g. Lycinear.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 158: g. Solanear.

Poecilocnemis Martius mss.
= Geissomeria Lindl.

Poecilodermis Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 33: nov. g. Sterculiear. (P. populnea.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 30 (25).
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 511: g. Sterculiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Brachychitonear.
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *c*. p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiac. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 3.
Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. 5320 *b β*: subsect. Gymnochitonis.

Poecilopteris Presl 1836. Pterid. p. 241: g. Acrostichacear. *Cf.* Presl 1850. Epimel. bot. p. 531, ubi sect.: Poecilopteris, Cyrtogonium.
Endl. 1841. Spl. I. n. 603 *b ζ*. p. 1345; 1841. Ench. p. 35: subsect. Acrostichi.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 987. 6: sect. Acrostichi.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 59: subg. Heteronevri.
Synon. Poikilopteris Eschw.; Bolbitis Schott.

Poecilothamnion Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ...: nov. g. Ceramiacear. *Cf.* Flora 1848. II. p. 620.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 657: sect. Phlebothamnii.

Poederia Reuss 1802. Rep. comm. II. p. 55. 176: vid. *Paederia Linn.*

Poeonia Caesalp. 1583. De plant. lib. 15. (Linn. 1747. Cl. plant. p. 30.)
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 148: g. pl. class. VII.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 67. 136: g. Multisiliquar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 378: g. Polyandr. Digyn.
Scop. 1777. Intr. p. 259: g. Polycarpiar.
Neck. 1790. El. II. p. 293. n. 1061: g. Synathrophytor.
Presl 1826. Sicul. I. p. 26: g. Poeoniacear.
= Paeonia Tourn.

Poeoniaceae Presl 1826. Fl. sicul. I. p. 26: trib. 6 Ranunculacear. Gen.: Poeonia.

Pöppigia*) „Kunze" Rchb. 1828. Consp. p. 212 ª. n. 1227 ᵇ: g. Haemodorear. (Nomen.)
= Tecophilaea Bert.

Pöppigia Presl 1830. Symb. I. p. 15. t. 8: nov. g. Cassiear. (Caesalpinia procera Pöpp.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 7 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 359. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 483.
Benth. 1840. Hook. journ. bot. II. p. 72: g. Leptolobiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Endl. 1841. Gen. n. 6762. p. 1312; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6064. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 120.
Synon. Ramirezia A. Rich.

Pöppigia Bertero 1830. Bull. sc. nat. p. 109.
Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 448: g. Durantear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227: g. Verbenear.
= Citharexylon Linn.?

Poevrea Tulasne vid. *Poivrea Comm.*

Poggendorffia**) Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 438; 1858. Fl. Columb. I. p. 29. t. 15: nov. g. Passiflorear. (P. rosea.)

Pogiris Tausch . . .
= Pogonirion Rchb.

Pogochilus***) Falconer 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 73: nov. g. Orchidear., Cyrtosiae Bl. aff.
Endl. 1843. Spl. III. p. 62. n. 1612/₂: g. Arethusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.

Pogogyne Benth. 1834. Labiat. p. 414: nov. g. Melissinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 789. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 421. — Walp. 1845. Rep. III. p. 745. 984.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4117: g. Melissear. — Par. Meisn.

---

*) Dicat. Jos. Poech, botanico Vindobon.
**) ποικίλος, variegatus; χρῶμα, color.

*) Dicat. Ed. Frid. Pöppig, peregrinatori botanico.
**) Dicat. Cl. Poggendorff, physico.
***) πώγων, barba.

Pogogyne Benth. cont.
1840. Gen. p. 285 (194). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 243.
Endl. 1838. Gen. n. 3623. p. 620; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar.

Pogonandra A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 511: sect. Scaevolae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3038 *c*. p. 1391; 1841. Ench. p. 261. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4008. 4. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 393.
Synon. Pogonanthera Don; Baudinia Lesch.; Molkenboeria Vriese.

Pogonanthera Blume 1831. Flora II. p. 520: nov. g. Miconiear. (Melastoma pulverulenta Jack.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 778. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (81). — Endl. 1840. Gen. n. 6239. p. 1217; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6747. — Walp. 1846. Rep. V. p. 712. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 24: g. Medinillear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 302: g. Dissochaetear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 552.

Pogonanthera G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 729: sect. Scaevolae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 583: g. Scaevolear.
= Pogonandra DC.

Pogonantherae Klotzsch 1839 in Otto & Dietr. Gartenz. VII. p. 307: nova subtrib. Acanthacear. Gen.: Strobilorhachis.

Pogonantherum Decne vid. *Pogonatherum Palis.*

Pogonanthum G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 845: sect. Rhododendri. (R. anthopogon D. Don.) — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 725. — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4948. 2.
= Eurhododendron Endl.

Pogonatherum Palis. 1812. Agrost. p. 56. t. 11. f. 7: nov. g. Graminear. (Saccharum paniceum Lam.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 28. 497. n. 276. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 88. Sect.: Pogonatherum, Diplatherum. — Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 356 (*Pogonantherum*).
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 177. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 968. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 182.
Kunth 1830. Gram. p. 159: g. Andropoginear.
Kunth 1833. Agrost. p. 477: g. Andropogonear. — Par. Nees 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 238. — Endl. 1837. Gen. n. 941. p. 107; 1841. Ench. p. 60. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1343. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Steud. 1854. Glum. I. p. 412.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 515: g. Eusaccharear.
Synon. Homoplitis Trin.

Pogonatum Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 39; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 460: nov. g. Hymenodum. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 228 et Leman 1826. Dict. v. 42. p. 92.
Röhl. 1814. Ann. Wett. Ges. III. 2. p. 226: g. Aploperistomator.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 107: g. Acrocarpor. peristomor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Polytrichoideor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 670.
Endl. 1836. Gen. n. 560 *b*. p. 54; 1841. Ench. p. 32: sect. Polytrichi. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 25. — Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 938. 2. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 235. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 208.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1844. Bryol. eur. Fasc. 21. 22: g. Polytrichacear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 24: g. Polytrichear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: subg. Polytrichi. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 96.
Synon. Dorcadion Wallr. (Docradia Hüb.)

Pogonetes Lindl. 1836. Introd. ed. II. p. 242; 1847. Veg. kingd. p. 695: g. Scaevolear.
= Crossotoma Don.

Pogonia Juss. 1789. Gen. p. 65: nov. g. Orchidear. — Par. R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 203. (Verm. bot. Schr. II. p. 25.) — Spreng. 1826. Syst. III. p. 706. n. 2954; 1831. Gen. II. p. 658. n. 3317.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 292: g. Coniopagar.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 192: g. Gynandr. Monandr.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528): g. Arethusear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1441; 1841. Nom. p. 56. n. 2171. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1601. p. 218; 1841. Ench. p. 114. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 31. Sect.. Eupogonia, Nervilia. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 599. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 715.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 16. t. 122.
Lindl. 1840. Orchid. p. 413: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Pogonidar.
Synon. Nervilia Comm.; Triphora Nutt.; Odonectis Raf.; Isotria Raf.

Pogonia Andrews 1801. Bot. Repos. III. n. 212.
Labill. 1804. Nov. Holl. t. 83: g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 1. p. 120 (*Pegonia*). — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 232. n. 511.
Hedw. 1806. Gen. p. 126. n. 554: g. Campanulatar.
= Myoporum Banks & Sol.

Pogonidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Arethusear. Gen.: Pogonia, Didymoplexis, Codonorchis, Arethusa, Haplostellis,

Pogonidae Lindl. cont.
Cleistes, Calopogon, Crybe. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Pogonirion Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1187 *a;* 1830. Fl. exc. p. 80: sect. Iridis. (I. pumila, arenaria, variegata, sambucina, etc.) — Simil. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 637.
Synon. Pogiris Tausch; Pogoniris Spach.

Pogoniris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 48; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 103: subg. Iridis. (I. pumila, germanica.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 824.
= Pogonirion Rchb.

Pogonitis Rchb. 1832. Fl. exc. p. 516: sect. Anthyllidis. (A. montana, polycephala, Barba-Jovis.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 151. n. 5910: g. Anthyllidear.
= Barba Jovis Mönch.

Pogonolepis Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 440: nov. g. Angianthear., Skirrhophoro aff. (P. stricta.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 230.
A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 149: sect. Skirrophori. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 264.

Pogonophora „Miers" Benth. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 372: nov. g. Crotonear. (P. Schomburgkiana.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 332: g. Jatrophidear.

Pogonophyllum Didrichsen 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . . : nov. g. Crotonear. (P. elatum.)

Pogonopsis Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. 333: nov. g. Andropogonear. *Cf.* Flora 1830. II. Erg. Bl. p. 106. — Par. Kunth 1833. Agrost. p. 518. — Endl. 1837. Gen. n. 952. p. 108; 1841. Ench. p. 60. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 414. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1333. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Steud. 1854. Glum. I. p. 404.

Pogonopus Klotzsch 1853. Ber. Berl. Ak. p. 500 (Flora 1853. p. 718): nov. g. Gardeniear. (P. Ottonis.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 124.

Pogonorhynchus Crüger 1847. Linnaea XX. p. 107: nov. g. Melastomacear., Diplochitae proximum. (P. amplexans.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 300: g. Miconiear.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 305: g. Clidemiear., an Miconiae coadunandum?

Pogonospermum Hochstett. 1844. Flora I. Beil. p. 5: nov. g. Acanthacear. (Justicia ciliaris Vahl.)
= Schwabea Endl.

Pogonostema Hassk. vid. *seq.*

Pogonostemon Hassk. vid. *Pogostemon Desf.*

Pogonostigma Boissier 1843. Diagn. pl. nov. or. I. Nr. 2. p. 39: nov. g. Galegear., Tephrosiae proximum. (Psoralea arabica Hochst. et Onobrychis arabica Hochst.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 858; 1846. V. p. 515. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Pogonostylis Bertol. 1833. Fl. ital. I. p. 312; 1842. Stirp. Ital. rar. fasc. II: nov. g. Cyperacear. (*Scirpo - Cyperus Mich.* Gen. p. 49.)
Steud. 1855. Glum. II. p. 121: g. Scirpear.

Pogonotrophe Miquel 1847. Lond. bot. journ. VI. p. 525; 1848. ibid. VII. p. 72: nov. g. Ficuum. (Ficus vagans Roxb.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 700: g. Morear.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 51: g. Ficear.

Pogonura „DC." Lindl. 1836. Introd. ed. II. p. 263; 1847. Veg. kingd. p. 715: g. Trixidear. (*Cf.* Endl. Gen. p. 493.)

Pogopetalum Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 680. 684. t. 42; 1841. Ann. and Mag. VII. p. 216: nov. g. Icacinear. (P. orbiculatum et acuminatum.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 82. n. 5488/$_4$. — Walp. 1843. Rep. II. p. 803. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 9. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444.
Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Olacinear.
= Emmotum Desv.

Pogostemeae Endl. 1838. Gen. p. 212; 1841. Ench. p. 306: subtrib. Menthoidear. Gen.: Pogostemon, Dysophylla. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). Gen. ead. — Walp. 1845. Rep. III. p. 576. Gen. ead.

Pogostemidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Menthear. Gen. Pogostemear. Endl.

Pogostemon*) Desfont. 1815. Mém. Mus. II. p. 154: nov. g. Labiatar. (P. plectranthoides.) — Par. Link 1822. En. II. p. 120. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 721. n. 2087; 1831. Gen. II. p. 472. n. 2330. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 93 (*Pogostemum*). — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 825. — Hassk. 1842. Flora II. Beibl. p. 25 (*Pogonostema);* 1844. Cat. Bogor. alt. p. 130 (*Pogonostemon*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 433: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2865. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Benth. 1833. Labiat. p. 152: g. Menthoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 711. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 401. — Brongn. 1843. En. genr. p. 68.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Menthear.
Endl. 1838. Gen. n. 3586. p. 612; 1841. Ench. p. 306: g. Pogostemear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). — Walp. 1845. Rep. III. p. 576. 979.
Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4052: g. Pogostemonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Pogostemidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 151: g. Elsholtziear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 961: g. Satureiear. Sect.: Dysophylla.
Synon. Wensea Wendl.

*) πώγων, barba; στήμων, stamen.

Pŏgostemoneae Rchb. 1841. Nomencl. p. 104: subdiv. Menthear. Gen.: Pogostemon, Dysophylla.

Pogostemum Poir. vid. *Pogostemon Desf.*

Pogostoma Schrad. 1831. Ind. sem. h. Götting.: nov. g. Caprariae aff. (P. saxifragaefolia.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 24.

Endl. 1839. Gen. n. 3923. p. 679; 1841. Ench. p. 339: g. Gratiolear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4625. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 510. — Walp. 1845. Rep. III. p. 264. 962.

Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 430: g. Sibthorpiear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459 (*Pegostoma*).

Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.

Pohlana*) Leand. de Sacram. 1819. Denkschr. Ak. Münch. p. 229: nov. g. Zanthoxylear. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 94.

Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 185: g. Xanthoxylear.

Endl. 1840. Gen. n. 5972 *e.* p. 1146; 1841. Ench. p. 609: sect. Zanthoxyli.

Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7476. 5: sect. Xanthoxyli.

Synon. Langsdorfia Leand.; Maqueria Comm.

Pohlia Hedwig 1787. Descr. Musc. frond. I. p. 96. t. 36; 1801. Spec. Musc. p. 171: nov. g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Röm. & Ust. Mag. Bot. IV. p. 163 et Leman 1826. Dict. v. 42. p. 94. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 760. n. 1649. — Willd. 1799 in Schrad. Journ. II. p. 13. (Neckera undulata, etc.) — Roth 1800. Germ. III. p. 224. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 35. — DC. 1805. Franç. II. p. 498. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 74. — Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 70. — Mart. 1817. Erlang. p. 72. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 188. n. 3322; 1831. Gen. II. p. 734. n. 3725. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 218. (odontostomor.)

Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 174; II. 3. p. 142; 1817. Spl. III. p. 74: g. Diploperistomator.

Brid. 1822. Meth. musc. p. 115: g. Peristomor. acrocarpor.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 727: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 245.

Brid. 1826. Bryol. I. p. 607: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLII g. Comantium.)

Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 649: g. Bryaceor.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Bryoidear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.

Hüb. 1833. Musc. germ. p. 464: g. Acrocarpor. Diploperistomor.

Endl. 1836. Gen. n. 547. p. 53; 1841. Ench.

*) Dicat. Joh. Eman. Pohl, prof. Vindobon.

Pohlia Hedw. cont.

p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 38.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 925: g. Calyptrobryor.

Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 88: sect. Bryi. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 202. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 242. — Bruch, Schimp. & Gümp. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Bryear.

Synon. Amphirhinum Green; Amphirrhinum Wittst.

Pohlia Knaf 1844 . . . .

= Tripleurospermum Schultz Bip.

Poidium Nees 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 450.

Steud. 1854. Glum. I. p. 288: g. Festucacear.

= Aira Linn.?

Poikadenia Elliott 1822. Sketch Bot. South-Carol. II. 2. p. 197: sect. Psoraleae. (Ps. virgata Nutt. et Melilotus psoraloides Nutt.) An genus proprium? (*Cf.* Wittst. Et. Handw. p. 711, corr. *Poecadenia.*)

= Psoralea Linn.

Poikilopteris Eschw. 1827. Linnaea II. p. 117.

= Poecilopteris Presl.

Poincia Necker vid. *Poinciana Tourn.*

Poinciana*) Tourn. 1700. Inst. p. 619. t. 391: g. pl. class. XXI.

Linn. 1737. Coroll. p. 7. n. 954; 1737. Clift. p. 158; 1740. Syst. p. 43; 1742. Gen. ed. II. p. 180. n. 409; 1748. Ups. p. 101; 1753. Sp. I. p. 380; 1759. Syst. ed. X. p. 1018. n. 462; 1762. Sp. ed. II. p. 544; 1764. Gen. ed. VI. p. 207. n. 515; 1767. Syst. ed. XII. p. 290. n. 510: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 328; 1784. Syst. p. 395. — Reich. 1778. Gen. p. 211. n. 558. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 278. n. 701. — Lour. 1790. Coch. I. p. 260. — Gmel. 1791. Syst. p. 671. — Pers. 1797. Syst. p. 422. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 355.

Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 92. n. 377: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Lomentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 429. — Batsch 1802. Tab. p. 98.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 300. — Juss. 1789. Gen. p. 349. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 376. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 207. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 767. (anomal.) — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 98.

Berg. 1774. Vet. Ac. Handl. p. 57.

Neck. 1790. El. II. p. 449. n. 1282 (*Poincia*): g. Chorisophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 150. t. 150.

(Swartz 1791. Obs. bot. p. 165: g. Caesalpiniae injungit.)

HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 333: g. Caesalpiniear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV.

*) Dicat. de Poinci, Antillarum quondam gubernatori.

Poinciana Tourn. cont.
p. 48. — Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4148; 1841. Nom. p. 155. n. 6068. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 104. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6766. p. 1313; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132.
DC. 1825. Pr. II. p. 483: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 432. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 282. — Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 485.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 397: sect. Caesalpiniae. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 101.
Benth. 1840. Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 311 (*Poinciniana*): g. Papilionacear.
Synon. Crista pavonis Breyn., Burm.?; Erythrostemon Klotzsch.

Poinciniana Duchart. vid. *praeced.*

Poinsettia*) Graham 1836. Edinb. n. phil. journ. Mart.; 1836. Bot. Mag. t. 3493: nov. g. Euphorbiacear. (Euphorbia pulcherrima W.) — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 312.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281: g. Euphorbiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 284: sect. Euphorbiae.

Poiretia „Walt." Gmel. 1791. Syst. p. 263: g. Tetrandr. Monogyn.
= Houstonia Linn.

Poiretia**) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 24. t. 343: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. cucullata.) — *Cf.* Poir. 1804. Dict. V. p. 449. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 173. n. 396. (Ericoidear). — Hedw. 1806. Gen. p. 163. n. 689.
= Sprengelia Smith.

Poiretia Vent. 1807. Mém. Inst. I. p. 4: nov. g. Leguminosar. (P. scandens.) — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 122. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 103. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 593. n. 2930.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 509: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 130.
DC. 1825. Pr. II. p. 315: g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 279. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (64). — Endl. 1841. Gen. n. 6595. p. 1281; 1841. Ench. p. 670. — Walp. 1846. Rep. V. p. 520. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3987; 1841. Nom. p. 153. n. 5981: g. Onobrychear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.
Vogel 1838. Linnaea XII. p. 51: g. Hedysarear.
Synon. Turpinia Pers.

*) Dicat. Inventori Poinsette.
**) Dicat. J. L. M. Poiret.

Poiretia Smith 1808. Linn. Trans. IX. p. 304.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 748: g. Spartiear.
= Hovea R. Brown.

Poitaea DC. 1825. Prodr. II. p. 263: g. Galegear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 239. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 89 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6547. p. 1274; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5736. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 589. n. 2903: g. Leguminosar.
= Poitea Vent.

Poitea*) Vent. 1800. Choix p. 36. t. 36; 1807. Mém. Inst. I. p. 16: nov. g. Leguminosar. (P. galegoides.) — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 755; 1826. Syst. III. p. 272. n. 2576. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 288.
Bronn 1822. Dict. p. 134: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3899.
Synon. Poitaea DC.

Poivraea A. Rich. vid. *Poivrea Comm.*

Poivrea**) Comm. 1806 in Pet.-Thouars Obs. pl. Afr.. austr. p. 28. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 39. p. 362 (*Pevraea*).
DC. 1828. Pr. III. p. 17: g. Terminaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4535; 1841. Nom. p. 171. n. 6607. — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 317. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 306. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6086. p. 1182; 1841. Ench. p. 632. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. cub. p. 528 (*Poivraea*). — Walp. 1846. Rep. V. p. 662.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 357. n. 1803: g. Decandr. Monogyn.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 662: sect. Combreti.
Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 282.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 119: g. Combretear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718: g. Terminalear.
Tulasne 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 76 (*Poevrea*): g. Combretacear.
Synon. Cristaria Sonn.; Gonocarpus Hamilt.

Polameia Rchb. vid. *Potameia Pet.-Th.*

Polamisia Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 305: vid. *Polanisia Rafin.*

Polanisia***) Rafin. 1819. (Sillim. journ. I.) Journ. Phys. LXXXIX. p. 98: nov. g. Capparidear. (Cleome dodecandra Michx.) *Cf.* Flora 1824. I. p. 132. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 321.
DC. 1824. Pr. I. p. 242: g. Cleomear. Sect.: Brachystyla, Stylaria. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4862 (sect.: Brachystylium, Macrostylium); 1837. Hdb. p. 267 (genuinar.); 1841. Nom. p. 185. n. 7105

*) Dicat. A. Poiteau.
**) Dicat. Pierre Poivre in ins. Bourbon.
***) *πολύς*, multus; *ἄνισος*, inaequalis (a staminibus).

Polanisia Rafin. cont.
(sect.: Polanisia, Ranmanissa). — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 275. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 22. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 304. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 122. — Endl. 1839. Gen. n. 4988. p. 891; 1841. Ench. p. 456. Sect.: Corynandra, Ranmanissa, Eupolanisia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89. — Walp. 1846. Rep. V. p. 52. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 364. Sect. ut DC.
Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. 45: sect. Cleomes. Subsect. ut DC. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1068.
Synon. Jacksonia Rafin.

Polanisia R. Brown in Denh. Narr. p. 221. = Eupolanisia Endl.

Polarnia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: fam. Isomisiae. Subfam.: Hamellidia, Diervillaria.

Polemannia Berg 1826. Linnaea I. p. 250 (hyacinthoides).
= Uropetalum Ker.

Polemannia*) Ecklon & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 347: nov. g. Roselinear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4431. p. 775; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 957. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5423.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Polembryum**) A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 519. t. 28. f. 49: nov. g. Rutacear. (? e fructu solo propositum. — P. castanocarpum.) — Par. Schott 1834. Rutac. p. 11. t. 6. (Esenbeckiae aff.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 232.
Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5156; 1837. Hdb. p. 282: g. Diosmear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 388. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 322.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 807: g. Rutaceis aff.
Meisn. 1837. Gen. p. 63 (45): sect. Esenbeckiae.
= Esenbeckia Kunth?

Polemonaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 398: ordo 14 class. VIII. Gen. §. 1: Löselia, Diapensia. §. 2: Phlox, Polemonium, Cantua, Cobaea.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 312. t. 49. Gen.: Phlox, Polemonium, Cantua, Hoitzia, Cobaea.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae.

Polemonia Juss. 1789. Gen. p. 136: ordo 11 class. VIII. Gen.: Phlox, Polemonium, Cantua, Hoitzia.
Batsch 1802. Tab. p. 211: fam. Patular. Gen. ead. et Löselia.

Polemoniaceae Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 259: ordo plant. Gen.: Phlox, Polemonium, Löselia, Hoitzia. — Par. Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 306. Gen. ead. et Bonplandia, Cullomia, Cantua, Vestia.
DC. 1805. Franç. III. p. 645: fam. (49) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Polemonium. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 367. (hypogynar.) Gen. ut Endl.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 341: fam. Corolliflorar. Gen.: Polemonium.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1826. Isis p. 586: ordo Tubiflorar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 188. Gen. ut Rchb. et *affinia*: Caldasia, Campylanthus. — Endl. 1839. Gen. p. 656; 1841. Ench. p. 326. Gen.: Caldasia, Phlox, Collomia, Gilia, Polemonium, Hoitzia, Cantua; Cobaea; Cyananthus. Accedit 1843 (Spl. III. p. 78) Schizocodon. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179). Trib.: Polemonieae, Cyanantheae, Cobaeaceae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX: div. Solanacear. Gen.: Phlox, Polemonium, Cantua, Gilia, Hoitzia.
Rchb. 1828. Consp. p. 119: div. Convolvulacear. Gen. ut 1827 et Collomia, Heteryta, Löselia?
Link 1829. Hdb. I. p. 595: ordo (34) Hypanthar. Gen.: Polemonium, Phlox.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (200) Monopetalar.
D. Don . . . . Edinb. n. phil. journ. Nr. 7. p. 286.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Volvalium.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 232) 1847. Veg. kd. p. 653: ordo Solanalium. Gen. ut Endl. et Linanthus, Leptosiphon, Dianthoides, Dactylophyllum, Ipomopsis, Navarretia, Schizocodon, Bronnia?
Koch 1837. Syn. p. 493. Ed. II. p. 567: ordo Corolliflorar. Gen.: Polemonium. — Par. Benth. 1845 in DC. Pr. IX. p. 302. Gen.: Phlox, Collomia, Navarretia, Gilia, Polemonium, Löselia, Caldasia, Cantua, Cobaea.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 237: ordo Corollaeflorar. Gen.: Polemonium, Diapensia, Phlox, Hugelia, Linanthus, Leptosiphon, Fenzlia, Gilia, Aegochloa, Collomia, Caldasia, Löselia, Cantua.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 106: fam. (136) Tubiflorar. Sect.: Phlogineae, Gilieae, Polemonieae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 54: fam. Convolvulinear. Gen.: Cobaea, Cantua, Bonplandia, Hoitzia, Polemonium, Phlox, Leptosiphon, Gilia, Navarettia, Collomia.
Conf. Polemonia Juss.; Polemonaceae Vent.; Polemonideae Pers.; Polemonieae Spreng.; Polemoniariae Rchb.; Cobaeaceae Don.

Polemoniariae Rchb. 1837. Handb. p. 194: div. Convolvulacear. Subdivis.: Phloginae, Gilieae, Polemonieae.

Polemonideae Pers. 1805. Ench. I. p. 185. Gen.: Polemonium, Phlox, Cantua, Hoitzia, Gilia, Bonplandia, Navarretia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar.

Polemonieae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 467: div. Convolvulear. Gen.: Polemonium, Phlox, Cantua, Caldasia, Hoitzia.

*) Dicat. P. H. Polemann, pharmacopolae capensi.
**) πόλος, axis.

Polemonieae Spreng. cont.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 349; 1841. Nom. p. 113: div. Convolvulacear. Subdivis.: Phloginae, Gilieae, *genuinae* (gen.: Polemonium, Cyananthus, Cobaea).
Rchb. 1837. Hdb. p. 194: subdiv. Polemoniariar. Gen.: Polemonium, Cobaea.
Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179): trib. Polemoniacear. Gen.: Bonplandia, Phlox, Collomia, Gilia, Polemonium, Hoitzia, Cantua.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108: sect. Polemoniacear. Gen.: Polemonium; anomalum: Cobaea; Cyananthus?

Polemonium*) Tourn. 1700. Inst. p. 146. t. 61: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 31. Ed. Hall. 1745. p. 31: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 46. n. 131; 1737. Cliff. p. 63; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 40; 1753. Sp. I. p. 162; 1759. ed. X. p. 925. n. 200; 1762. Sp. ed. II. p. 230; 1764. Gen. ed. VI. p. 87. n. 217; 1767. Syst. ed. XII. p. 159. n. 216: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 172; 1784. Syst. p. 205. — Reich. 1778. Gen. p. 90. n. 233. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 117. n. 289. — Gmel. 1791. Syst. p. 347. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 35; 1818. Fl. cap. II. p. 33. — Pers. 1797. Syst. p. 213. — Willd. 1797. Sp. I. p. 886. n. 326; 1809. En. p. 209. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 127. — Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 24. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 8. 140.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 490: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 210. n. 875: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 455.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian: g. Convolvulor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 214: g. Personatar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 393.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 103: g. Oliganthorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 139: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 278: g. Icosandrar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 299. t. 62. f. 10 (caeruleum).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 204; 1789. Phil. Bot. I. p. 56.
Juss. 1789. Gen. p. 136: g. Polemonior. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 211. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXVI. 364. n. 717.
Neck. 1790. El. II. p. 33. n. 662: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 401: g. Polemonacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 313. — Hedw. 1806. Gen. p. 107. n. 477.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 259; 1826. Dict. v. 42. p. 307: g. Polemoniacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 645. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 160. — Link 1821. En. I. p. 196; 1829. Hdb. I. p. 596. —

*) Nomen ex Plinio. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 176.

Polemonium Tourn. cont.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 341. — Kunth 1823. Syn. II. p. 256. — Lois. 1826. Dict. v. 42. p. 305. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3025. — Bartl. 1830. Ord. p. 189. — Koch 1837. Syn. p. 493. Ed. II. p. 568. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 238. — Endl. 1839. Gen. n. 3822. p. 657; 1841. Ench. p. 327. — Brongn. 1843. En. genr. p. 54. — Benth. 1845 in DC. Pr. IX. p. 316. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 367. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 83. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 498.
Pers. 1805. Ench. I. p. 185. n. 421: g. Polemonidear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 467; 1825. Syst. I. p. 623. n. 663; 1830. Gen. I. p. 153. n. 764: g. Polemoniear. — Par. Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 232. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 349; 1837. Hdb. p. 194; 1841. Nom. p. 113. n. 4396. (genuinar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 684. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 120.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 131: g. Campanaceis aff.
Eschsch. 1826. Mém. Ac. Pet. X. p. 281.

Polhymnia Walpers 1843. Repert. II. p. 605: emendatio proposita nominis *Polymnia L.*

Polia*) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. I. p. 164. Ed. Willd. p. 204: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. arenaria.)
Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 135: g. Caryophyllear.
= Polycarpaea Lam.?

Polia „Tenore in Duchartre Rev. bot. II. p. 126" Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 830: g. Iridear. (Tigridia Herbertiana.)

Polianthеae Rchb. 1837. Handb. p. 154: subdiv. Hemerocallidear.

Polianthes**) Linn. 1737. Gen. p. 97. n. 274; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 76; 1753. Sp. I. p. 316; 1759. Syst. ed. X. p. 984. n. 384; 1762. Sp. ed. II. p. 453; 1764. Gen. ed. VI. p. 169. n. 426; 1767. Syst. ed. XII. p. 247. n. 422: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 276; 1784. Syst. p. 335. — Reich. 1778. Gen. p. 172. n. 460. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 225. n. 576. — Pers. 1797. Syst. p. 356. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 63.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283.
Gled. 1764. Syst. p. 223. n. 926: g. Petalostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 56: g. Narcissor.
Batsch 1802. Tab. p. 146: g. Lirior.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. (1815.) p. 42: g. Agavear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 236; 1825. Syst. II. p. 75. n. 1225; 1830. Gen. I. p. 259. n. 1348: g. Liliacear. — Par. Schult. 1829.

*) πολιά, canities: ab aspectu plantae incano.
**) πόλις, urbs. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 177.

Polianthes Linn. cont.
Syst. VII. p. XXXIX. 625. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1111.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1399: g. Aletrinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Hemerocallidear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 116. — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302).
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Endl. 1837. Gen. n. 1103. p. 142; 1841. Ench. p. 83: g. Agapanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1830. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 724 (*Tubéreuse*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 154: g. Polianthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Hemerocallear.
Synon. Amica nocturna Rumph.; Polyanthes Linn., Gled. et Auct.; Tuberosa Medic.; Pothos Adans. (Steud.)

Polifolia „Buxb. Cent. V. 28. t. 49“ Endl. vid. *seq.*

Poliifolia Buxbaum 1727. Comm. Ac. Pet. II. p. 345. t. 21: nov. g. plant.
Endl. 1839. Gen. n. 4318 *b.* p. 755 (*Polifolia*); 1841. Ench. p. 370: sect. Andromedae.
= Andromeda Linn. (restrict.)

Poliodendron Webb. . . . . Phytogr. Canar. III. p. 106: nov. g. Ajugoidear. (Teucrii sect. Leucosceptrum et Teucropsis pro parte Benth.)
Conf. Teucropsis Ging.

Polistroma „Clemente“ Achar. 1814. Syn. Lich. p. 136: nov. g. Phymatoideor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 442.
= Urceolaria Achar.?

Polium*) Tourn. 1700. Inst. p. 206. t. 97: g. pl. class. IV.
Schreb. 1774. Verticill. gen. p. 20: sect. Teucrii. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 520. — Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2851 *b;* 1831. Fl. exc. p. 315; 1841. Nom. p. 107. n. 4160. 3. — Link 1829. Hdb. I. p. 455. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 20. — Benth. 1835. Labiat. p. 684; 1848 in DC. Pr. XII. p. 590. — Koch 1837. Syn. p. 577. Ed. II. p. 663. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 868. — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *i.* p. 632; 1841. Ench. p. 309. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 149. — Walp. 1845. Rep. III. p. 918. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 445. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 712.
Mönch 1794. Meth. p. 385: g. Petalostemonis. (Teucrium aureum.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167: g. Ajugoidear.
= Teucrii Linn. pars.

Polla Adans. 1763. Fam. II. p. 493: g. Muscor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 311.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 688: sect. Bryi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 642 *c;* 1841. Nom. p. 26. n. 920. 3. — Endl. 1836. Gen. n. 542 *c.* p. 52; 1841. Ench. p. 31.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: g. Bryoideor.
= Mnium Dill.

*) πολιός, canus.

Pollalesta*) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 36. t. 321: nov. g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 375.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2197: g. Eupatorinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Vernoniear.
= Vernoniae Schreb. pars.

Pollexfenia**) Harvey 1844 in Lond. journ. bot. III. p. 431: nov. g. Rhodomelear., Rytiphloeae aff. (P. pedicellata.) — Par. Lindl. Veg. kd. p. 25 (*Pollexfexia*). — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 373. — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 697.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Claudeinear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 874. n. 577: g. Delesseriear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55.

Pollexfexia Lindl. vid. *praeced.*

Pollia***) Thunb. 1781. Nov. gen. I. p. 11; 1784. Fl. japon. p. 8: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 332. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 223. n. 572. — Gmel. 1791. Syst. p. 556. — Willd. 1799. Sp. II. p. 149. n. 645. — Pers. 1805. Ench. I. p. 347. n. 771.
Juss. 1789. Gen. p. 45: g. Juncor.
Neck. 1790. El. III. p. 198. n. 1567: g. Gonoophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 125: g. Ephemeror.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 111: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 243. n. 988.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 242; 1825. Syst. II. p. 27. n. 1180: g. Spathacear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXII. 1149.
Agdh. 1823. Aphor. p. 168: g. Commelinear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 407 (311). — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 540.
Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 315: g. Asparaginear.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1162: g. Xiphidiear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 255. n. 1326: g. Smilacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1090.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Galanthear.
Endl. 1837. Gen. n. 1029. p. 125; 1841. Ench. p. 70: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188. — Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 148. Char. emend.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1529: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 75.
Synon. Aclisia E. Meyer?; Lamprocarpus Blume?

Pollichia†) Medic. 1783. Beob. p. 247; 1789. Phil. Bot. I. p. 32: nov. g. pro Boragine indica et africana propositum.
= Trichodesma R. Brown.

*) πολλόν, multum; ἀλίστη, palea. (?)
**) Dicat. John Henry Pollexfen.
***) Dicat. J. van der Poll, consuli Amstelod.
†) Dicat. Joh. Andr. Pollich, medico et botanico.

Pollichia Roth 1788. Tent. fl. germ. I. p. 254: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (Galeopsis Galeobdolon et Lamium amplexicaule L.) *Cf.* Pers. in Usteri n. Ann. XIV. p. 39 et Willd. Fl. Berol. p. 198.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2874 *a:* sect. Lamii.
= Lamiopsis Dumort. et Galeobdolon Huds.

Pollichia Soland. 1789 in Ait. hort. kew. I. p. 5; III. p. 505: nov. g. Monandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 782. n. 1705. — Willd. 1797. Sp. I. p. 23. n. 21; 1809. En. p. 7. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 21. — Vahl 1805. Enum. I. p. 8. n. 8. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 337. — Hedw. 1806. Gen. p. 5. 344. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 5. 38. n. 29. (Char. emend. ibid. n. 556.) — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 316.
Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 388; 1825. Dict. v. 38. p. 9: g. Paronychiear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 10. n. 28. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 25.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 311; 1825. Syst. I. p. 17. n. 27: g. Chenopodear.
Link 1821. En. I. p. 6: g. Atriplicinar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 161. n. 6277: g. Scleranthear.
DC. 1828. Pr. III. p. 377: g. Pollichiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 94. — Endl. 1839. Gen. n. 5208. p. 959; 1841. Ench. p. 504.
Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4258: g. Polycarpear.
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Illecebrear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (97). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Synon. Neckeria Gmel.; Meerburgia Mönch.

Pollichieae DC. 1828. Prodr. III. p. 377: trib. Paronychiear. Gen.: Pollichia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 94. Gen. id. — Endl. 1839. Gen. p. 959; 1841. Ench. p. 504. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 492. Gen. id.

Pollicipora Ehrh. Beitr. p. 129.
= Spongites Kütz.

Pollinacia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67. 73: class. II. Vegetabilium. Stirpes: Virescinia, Putrescinia.

Pollinia*) Spreng. 1815. Pugill. II. p. 10; 1817. Anleit. II. 1. p. 178: nov. g. Saccharinar. (Andropogon distachyos.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 974; 1830. Fl. exc. p. 34. Sect. (1830): Schizopogon, Chrysopogon. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 185.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 53. 828. n. 380: g. Triandr. Digyn.
Link 1821. En. I. p. 106: g. Graminum. —

Pollinia Spreng. cont.
Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 62. n. 302. (*Synon. Andropogon Schk., Pogonatherum Palis., Diectomis Kunth.*)
Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 134. 288. n. 298: g. Graminear. (Andropogon striatus W.) — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 93.
Link 1827. Hort. I. p. 243: g. Villiflorar.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 304: g. emendat. Andropogineor.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1330. 3: sect. Andropogonis.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 473; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 476: g. Saccharear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 409: g. Andropogonear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 520: g. Eusaccharear.
= Andropogon Nees?

Poloa*) DC. 1833 in Guillem. Ann. II. p. 514; 1834 in Wight Contrib. p. 10.
= Callistephus Cass.

Polpoda*) Presl 1830. Flora II. p. 630; 1830. Symb. I. p. 1. t. 1: nov. g. Telephiear. (P. capensis.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 51 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 357. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96).
Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 300: g. Polpodear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5194. p. 954; 1841. Ench. p. 502. — Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6304. — Walp. 1846. Rep. V. p. 789.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498: g. Molluginear.
Synon. Blepharolepis Nees.

Polpodeae Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 300: trib. Portulacear. Gen.: Polpoda. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 954; 1841. Ench. p. 502. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 441. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 162: subsect. Molluginear. genuinar. Gen. id.

Poltolobium***) Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 493: nov. g. Dalbergiear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 253.

Polyacantha Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 156: nov. g. Cynarocephalar.
= Notobasis et Lamyra Cass. pt. (Rchb.)

Polyacantha Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 443: nov. g. Cynarocephalear. (Centaurea Isnardi L.)
= Centaureae Linn. pars.

Polyacanthus J. Bauh. III. p. 92. f. 2. (DC. Prodr. VI. p. 658.)
= Lamyrae Cass. spec.

Polyacanthus Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 463: nov. g. pro Celastro stenophyllo Eckl. & Z. propositum.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 189: g. Celastrinear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 82. n. 5679/$_2$: g. Evonymear.

*) Dicat. Ciro Pollini, prof. Veron.

*) Dicat. Marco Polo, peregrinatori veneto.
**) „πολπώδης, lacinia, fimbria". (Vox ignota.)
***) πόλτος, palpa; λόβιον, legumen.

Polyachyreae D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 229: trib. Labiatiflorar. Gen.: Polyachyrus, Gastrocarpha.

Polyachyrideae Endl. 1838. Gen. p. 489; 1841. Ench. p. 248: subtrib. Nassauviaccar. Gen. unicum: Polyachyrus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: subtrib. Nassaviacear. Gen. id.

Polyachyris Walp. vid. *seq.*

Polyachyrus Lagasca 1811. Amen. nat. I. p. 37: nov. g. Chaenanthophorar. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 319.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 68: g. Labiatiflorar.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 207; 1830. v. 60. p. 584: g. Nassauviear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2293; 1841. Nom. p. 97. n. 3779. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1830. Linnaea V. p. 5; 1832. Syn. p. 400. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 53. — Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. (verar.)
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 229: g. Polyachyrear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 173. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 631 (*Polyachyris*).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 625. n. 3102: g. Perdiciear.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 14. t. 23.
Endl. 1838. Gen. n. 2943. p. 489; 1841. Ench. p. 248: g. Polyachyridear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 321.
Synon. Bridgesia Hook.; Diaphoranthus Meyen?; Cephaloseris Pöpp.

Polyactideae Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 14; 1839. III. p. 11; 1842. V. p. 13; 1842. Anl. Mycol. p. LXIII. 51: fam. Hyphomycetum. Gen.: Polyactis, Cladobotryum, Stachylidium, Gonatobotrys, Botryosporium, Clonostachys, Sceptromyces, Verticillium, Peronospora, Actinocladium, Acrostalagmus, Gliocladium, Acmosporium, Corethropsis. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 123. Gen.: Polyactis, Cladobotryum, Calcarisporium, Verticillium, Prismaria, Acrostalagmus, Tilachlidium, Verticicladium.

Polyactidei Rchb. 1841. Nomencl. p. 4: subsect. Mucedineor. genuinor. Gen.: Botrytis, Polyactis, Acrostalagmus, Verticillium, Sceptromyces, Haplotrichum, Acladium, Rhopalomyces, Cephalosporium, Acmosporium, Clonostachys. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 96. Gen. fere ead.
Bonord. 1851. Hdb. p. 103: fam. Hyphomycetum. Gen.: Cylindrocephalum, Camptoum, Haplotrichum, Doratomyces, Gonatobotrys, Arthrosporium, Cacumisporium; Spicularia, Cephalosporium, Myxotrichum, Colletosporium, Stachylidium, Botryosporium, Gonytrichum, Mucrosporium.

Polyactidium DC. 1836. Prodr. V. p. 281: g. Erigerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2329. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Polyactidium DC. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. (verar.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 45.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3268: g. Erigeronear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.
Synon. Polyactis Less.; Stenactis Cass. pt.

Polyactis Link 1809. Berl. Mag. III. p. 16. f. 22: nov. g. Mucedinum (serius [1816. ibid. VII. p. 36] Aspergillo injunctum). *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 319. — Par. Nees 1816. Syst. p. 57; 1817. Überbl. p. 15. (capitatar.) — Mart. 1817. Erlang. p. 344. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Ascophorar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 554: g. Aspergillidear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 31: subg. Moniliae.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 115 *f:* sect. Botrytidis. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 227 c. p. 19; 1841. Ench. p. 14.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 89: g. Spondylomycetum.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 18: g. Aspergillinor.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 14; 1842. V. p. 13; 1842. Mycol. p. 51: g. Polyactidear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 47. t. 24; 1851. Linnaea XXIV. p. 123.
Corda 1839. Prachtfl. p. 33. t. 16 (fascicularis).
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 163: g. Polyactideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cladobotryeor.

Polyactis Link 1824. Spec. I. p. 62: g. Hyphomycetum. (Botrytis ramosa Pers.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 115: g. Basidiophoror.
= Spicularia Pers.

Polyactis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 188: nov. g. Asterear. (Erigeron delphinifolius W.)
= Polyactidium DC.

Polyactium DC. 1824. Prodr. I. p. 655: sect. Pelargonii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5278 *l.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 733. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 317. — Endl. 1840. Gen. n. 6048 *f.* p. 1168; 1841. Ench. p. 620. — Walp. 1842. Rep. I. p. 453.
Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. I. p. 65: g. Pelargoniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7660.

Polyadelphia Linn. Gen., Syst., Spec. etc., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XVIII. plant. Ordines: Pentandria, Icosandria, Polyandria.

Polyadenia Ehrenb. 1827. Linnaea II. p. 253: subg. Tamaricis.
Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4413 *c;* 1841. Nom. p. 167. n. 6470. 3: sect. Tamaricis.

Polyadenia Ehrenb. cont.
— Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 727. — Endl. 1840. Gen. p. 1039. n. 5484 c. — Walp. 1843. Rep. II. p. 116.
Synon. Pleiadenia Rchb.

Polyadenia*) Nees 1833. Progr. p. 18; 1836. Syst. Laurin. p. 571: nov. g. Tetrantherear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2060. p. 322; 1841. Ench. p. 198. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1362. — Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473. — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2649. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 960. Sect.: genuinae, Aperula, Iteadaphne, Cephalodaphne.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

Polyaetnium Desv. vid. *Polytaenium Desv.*

Polyalthia**) Blume 1829. Fl. Jav. Anon. p. 68: nov. g. Anonacear. Sect.: Eupolyalthia, Oxymitra, Kentia, Goniothalamus. — Par. A. DC. 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 215. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 510.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7308: g. Guatteriear. Sect. fere ut Blume.
Endl. 1839. Gen. n. 4713. p. 831; 1841. Ench. p. 422: g. Xylopiear. Sect. ut Blume. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 74. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 375. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422: g. Xylopear.

Polyalthia Rchb. 1841. Nomencl. p. 192. n. 7308. 1: sect. Polyalthiae.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 137: g. Guatteriear. (restrict.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 68. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 321.
= Eupolyalthia Blume.

Polyandrae Scopoli 1777. Introd. p. 262: trib. XXIII. plant. Gentes: 1. *Germine nullo disco insidente.* Gen. §. 1: Vateria, Rhynea, Norantea, Reaumuria, Homalium, Orygia, Seguieria, Cistus, Dicera, Calinea, Trewia, Thea, Corbichonia, Sarracena, Apeiba. §. 2: Thoa, Laetia, Ablania, Singana, Breynia, Mahurea. §. 3: Mammea. §. 4: Soramia, Plinia, Miroxylon, Delima, Rheedia, Actaea, Teichmeyeria, Oncoba, Crataeva, Garcinia, Grewia, Muntingia, Trilix, Prockia, Cambogia. §. 5: Calophyllum, Elaeocarpus, Grias, Nitraria, Barringtonia, Mallococca. 2. *Germine disco elevato.* Gen. §. 1: Morisonia, Capparis, Maerua, Clusia, Charadra. §. 2: Lochneria, Banara, Podophyllum, Bocconia, Chelidonium, Glaucium, Papaver, Argemone, Sanguinaria, Mourera, Bixa, Peganum, Sloanea, Triumfetta, Werniskia, Tilia, Heliocarpus, Symplocos.

Polyandria Linn. Gen., Syst., Spec. etc., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XIII. plantar. Ordines: Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa-, Polygynia.

Polyandria Gmel. 1791. Syst. p. 770: class. XII. plant., complectens Icosandriam et Polyandriam Linn.

Polyandria Liljeblad 1796. Rat. pl. disp. p. . . . : class. IX. plant., classes 11—13 Linnaei amplectens.

Polyangideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 566. 586: div. Gasteromycear. Gen.: Polyangium.

Polyangium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 42: nov. g. Gastromycor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 320.
Nees 1816. Syst. p. 137 adnot.; 1817. Überbl. p. 36: g. Angiogasterum. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 414. n. 3461; 1831. Gen. II. p. 761. n. 3884.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 586: g. Polyangidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 81: g. Nidulariar.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 304; 1828. Elench. II. p. 49: g. Nidulariacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 562: g. Nidulariear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 131: g. Nidulariaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 216; 1841. Nom. p. 10. n. 405. — Endl. 1836. Gen. n. 340. p. 29; 1841. Ench. p. 17. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 304.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sporigastreor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 869: g. Pyrenomycetum asporor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 100: g. Pisocarpiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 439: g. Nidularieis aff.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Polygastreor.

Polyantha A. Rich. vid. *seq.*

Polyanthea DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 435; 1824. Prodr. I. p. 322: sect. Passiflorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3472 *a.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 47 (*Polyanthema*). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 261. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 596 (*Polyantha*).
Endl. 1839. Gen. n. 5098 c 4. p. 926; 1841. Ench. p. 483: subsect. Decalobae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 221.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5078. 3 *d:* subsect. Passiflorae.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 164: sect. Decalobae.

Polyanthema G. Don vid. *praeced.*

Polyanthemum Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 68: nov. g. ex typo Statices Armeriae L.
= Armeria Willd.

Polyantherae Gmel. 1769. Fl. Sibir. IV. p. 178: class. XVIII. plant. Gen.: Hypericum, Capparis, Tilia, Chelidonium, Papaver, Actaea, Cimicifuga, Nymphaea, Paeonia, Aquilegia, Delphinium, Aconitum, Trollius, Isopyrum, Caltha, Thalictrum, Clematis,

*) πολύς, multus; ἀδήν, glandula: propter glandularum numerum in flore auctum.
**) ἀλθήεις, salubris.

Polyantherae Gmel. cont.
Atragene, Anemone, Adonis, Ranunculus, Sagittaria.

Polyantherix Nees 1838 in Jard. Ann. nat. hist. I. p. 284: nov. g. Triticear. (Aegilops Hystrix Nutt.)
Hook. 1841 in Beech. voy. Bot. p. 404.
Endl. 1841. Spl. I. n. 918/₁. p. 1354; 1841. Ench. p. 60: g. Hordeacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1381. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165. — Steud. 1854. Glum. I. p. 356.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Hordear.

Polyanthes Linn. 1737. Hort. Cliffort. p. 126: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Lour. 1790. Coch. I. p. 204. — Gmel. 1791. Syst. p. 559. — Willd. 1799. Sp. II. p. 164. n. 650; 1809. En. p. 377. — Pers. 1805. Ench. I. p. 374. n. 826. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 166.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Hill 1769. Ht. kew. p. 331: g. Monopetalar., incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 86: g. Liliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 330. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 6 (*Tubéreuse*).
Neck. 1790. El. III. p. 186. n. 1446: g. Goonophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 186: g. Narcissoideis aff.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 141: g. Amaryllideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 236. n. 956.
DC. 1805. Franç. III. p. 234: g. Asphodelor.
Agdh. 1823. Aphor. p. 163: g. Asphodelear.
Link 1829. Hdb. I. p. 170: g. Hyacinthinar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 20: g. Hemerocallidear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 377: g. Anthericear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 845: g. Agavear. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 584.
= Polianthes Linn.

Polyarrhena Cassini 1826. Dict. v. 56. p. 172; 1830. v. 60. p. 582: nov. g. Bellidear. (1830 spuriar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30.
Less. 1832. Syn. p. 184: subg. Elphegeae.
Nees 1833. Aster. p. 205: g. Asterum tenellor.
= Anhebecarpaea DC.

Polyarthrion Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 667: sect. Statices.

Polyblastia Massalongo 1853. Mem. Lich. p. 147: nov. g. Lichenum. (Endocarpon Garovaglii Schär.)
Massal. 1857 in Rabenh. Lich. eur. exs. Fasc. VIII.
Arnold 1858. Flora II. p. 550: g. Verrucariear.
Lönnr. 1858. Flora II. p. 630: g. restrictum.

Polyboea Klotzsch 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 88. n. 5787/₅: nov. g. Acalyphear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 504: g. Dysopsidear.

Polyboea*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 30: nov. g. Vacciniear. (Thibaudia Kereme Kunth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1086.

Polybotrya „Humb.“ Willd. 1810. Spec. V. p. 99. n. 1953: nov. g. Filicum. — Par. Leman 1826. Dict. v. 42. p. 321. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 33. n. 3233; 1831. Gen. II. p. 720. n. 3625. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 213 (sph. *Polybtrya*).
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 28: g. Polypodiacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 91. — Agdh. 1822. Aphor. p. 116. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 55. — Blume 1829. Fl. jav. Fil. p. 13; 1830. En. pl. Jav. II. p. 99. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (nudar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 22. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 4.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 261: g. Acrostichear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330). — Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 429. Sect.: Eupolybotrya, Soromanes. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 281.
Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 734: g. Gymnopteridum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Endl. 1836. Gen. n. 603 *a*. p. 59; 1841. Spl. I. p. 1345; 1841. Ench. p. 35: sect. Acrostichi. Subsect. (1841): Polybotrya, Olfersia.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 986: g. Polypodiear. Sect. ut Endl.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 23: g. Acrostichacear.

Polybotrya Presl 1836. Pterid. p. 230: g. restrict. Acrostichacear. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 148.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 401; 1842. ibid. IV. p. 150: g. Acrostichiear. Sect. (1842): Rhipidopteris, Polybotrya.
Endl. 1841. Spl. I. n. 603 *a α*. p. 1345; 1841. Ench. p. 35: subsect. Polybotryae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
= Egenolphia Schott.

Polybotrya Fée 1852. Gen. Fil. p. 46: g. Acrostichear. emend. Sect.: Psomiocarpa, Eupolybotrya.

Polybotryon Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 66: subsect. Dulcamarae.

Polybtrya Desv. vid. *Polybotrya Humb.*

Polycalymma Sond. & F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 494: nov. g. Angianthear. (P. Stuartii.)

Polycampium**) Presl 1850. Epimel. bot. p. 495 (135): nov. g. Polypodiear. (Acrostichum Lingua Thunb.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 262: sect. Niphoboli?

Polycandia Steud. vid. *Polycardia Juss.*

Polycantha Hill 1769. Hort. kew. p. 59: nov. g. Associatar., a Carduo L. separatum.
= Cirsii et Cardui sp.

---

*) Polyboea soror Hyacinthi.
**) χαμπή, arcus.

Polycardia*) Juss. 1789. Gen. p. 377: nov. g. Rhamnor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 70.
Gmel. 1791. Syst. p. 407: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1121. n. 420. — Pers. 1805. Ench. I. p. 243. n. 541.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 464: g. Rhamnoidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 265: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 160. n. 682. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 664; 1825. Syst. I. p. 788. n. 866; 1830. Gen. I. p. 183. n. 924. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXIV. 432. n. 990. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 322. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 819. — Steud. 1841. Nom. II. p. 369 (*Polycandia*).
DC. 1825. Pr. II. p. 10: g. Evonymear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 68 (48). — Rchb. 1837. Hdb. p. 301; 1841. Nom. p. 207. n. 7882. (genuinar.) — Endl. 1840. Gen. n. 5677. p. 1086; 1841. Ench. p. 574. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 101.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5393: g. Celastrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 379: g. Celastrinear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 403.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 11: g. Euonymear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588.
Synon. Commersonia Comm.; Florinda Nor.

Polycarena Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 371: nov. g. Buchnerear. (Buchnera capensis L.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 588. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 527.
Endl. 1839. Gen. n. 3965. p. 686; 1841. Ench. p. 339: g. Manulear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4639. — Walp. 1845. Rep. III. p. 309. 967. — Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 350: g. Manuleiear.

Polycarpae Batsch 1802. Tab. affin. p. 115: ordo Liliacear. Fam.: Magnoliae, Anonae, Menisperma.

Polycarpae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 27: cohors Monopetalar. Nixus: Brexiales, Ericales, Primulales, Nolanales, Volvales.

Polycarpaea Lamarck 1792. Journ. hist. nat. II. p. 8. t. 25. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 323.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 12. Ed. Schrank 1819. p. 13 (*Polycarpea*): g. Pentandr. Monogyn. — Par. Delile 1824. Descr. de l'Egypte XIX. p. 241. t. 24. f. 1 (*Polycarpea*).
DC. 1828. Pr. III. p. 373: g. Polycarpaear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 90.
Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4263; 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 162. n. 6291: g. Polycarpear. Sect. (1841): Polycarpaea, Anapera, Kataxera. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 104.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 182: g. Paronychiear. — Par. Bartl. 1830. Reliq. Hänk. II. 1. p. 6. — Webb 1836. Canar. I. p. 156 (em. *Polycarpia*).
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Spergulear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 133. — Endl. 1840. Gen. n. 5216. p. 961; 1841. Ench. p. 504. Sect.: Hemixera, Anapera, Kataxera. — Walp. 1846. Rep. V. p. 76. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 377.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 357: g. Illecebrear. (Bot. Mag. Comp. I. p. 117. t. 6.)
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205: g. Alsinear.
Meisn. 1838. Comm. p. 97: g. Spergulariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Synon. Hagaea Vent.; Hagea Pers.; Mollia Willd.; Lahaya Röm. & Schult.; Hyala L'Herit.; Anthyllis Adans. pt.; Polia Lour.?

Polycarpaeae DC. 1828. Prodr. III. p. 373: trib. Paronychiear. Gen.: Polycarpaea, Stipulicida, Ortegia, Polycarpon, Cerdia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 90. Gen. ead. et Balardia, Aversia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 493. Gen. ead. et Aylmeria, Spergularia, Spergula, Drymaria.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 565: vid. *Polycarpeae Rchb.*

Polycarpea Haw., Delile vid. *Polycarpaea Lam.*

Polycarpeae Rchb. 1828. Consp. p. 161: subdiv. Paronychiear. Gen.: Pollichia; Ortegia, Polycarpon, Cardia, Stipulicida, Polycarpaea; Cardionema, Paronychia, Illecebrum, Anychia, Gymnocarpum, Herniaria, Sellowia?, Polychroa?
Rchb. 1837. Hdb. p. 235: sect. Illecebrear. Gen.: Polycarpaea, Stipulicida, Ortegia, Polycarpon, Cordia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 162. Gen. ead. et Arversia, Aylmeria.
Endl. 1839. Gen. p. 960; 1841. Ench. p. 504: trib. Paronychiear. Subtrib.: Löflingieae, Sperguleae. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 104. Gen.: Drymaria, Polycarpaea, Ortegia, Polycarpon, Löfflingia, Queria, Minuartia, Buffonia.

Polycarpellae Agardh 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 588: class. Phanerocotyledonear. completar. hypogynar. polypetalar. Ord.: Menispermeae, Anonaceae, Magnoliaceae, Dilleniaceae, Ranunculaceae.

Polycarpia Webb vid. *Polycarpaea Lam.*

Polycarpiae Scopoli 1777. Introd. p. 247: trib. XXII. plant. Gentes: 1. *Involucro subregulari.* Gen. §. 1: Nephelium, Zantoxyllon, Cimicifuga, Menispermum, Acer, Triopteris, Culhamia, Saururus, Gisekia, Ivira; Helicteres, Usubis, Aporetica, Evodia, Diosma, Byttneria, Quassia, Simaba, Forskaelea, Ochna, Aruba, Pekea, Drimys, Euriandra, Illicium, Dictamnus, Epibiastrum, Staphyllaea, Cardiospermum, Sapindus, Tribulus,

*) πολυκαρδία, pluries cordata.

Polycarpiae Scop. cont.
Suriana, Hiraea, Bannisteria, Fagonia, Grielum, Tetracera, Tillaea, Hippocratea, Sedum. §. 2: Xylopia, Annona, Hedycarya, Cananga, Waria, Uvaria, Michelia, Magnolia, Hydrastis, Liriodendron, Dillenia, Anemone, Pulsatilla, Clematis, Atragene, Thalictrum, Adonis, Ranunculus, Alisma, Sagittaria, Septas, Butomus, Caltha. 2. *Corolla aut calyce irregulari.* Gen.: Trollius, Helleborus, Curatella, Poeonia, Myosurus, Isopyrum, Aquilegia, Aconitum, Delphinium, Garidella, Nigella.

Polycarpicae Bartl. 1830. Ord. natur. p. 247: class. (43) Gymnoblastor. Ordines: Magnoliaceae, Dilleniaceae, Paeoniaceae, Ranunculaceae.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 183: class. (19) Dicotyledoneor. Fam.: Ranunculaceae, Helleboraceae, Dilleniaceae, Magnoliaceae.
Endl. 1839. Gen. p. 824; 1841. Ench. p. 414: class. Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Menispermaceae, (Phytocreneae,) Myristiceae, Anonaceae, (Eupomatieae,) Schizandraceae, Magnoliaceae, Dilleniaceae, Ranunculaceae, Berberideae.
Meisn. 1843. Gen. p. 437: class. I. Diplochlamydear. Ord.: Ranunculaceae, Dilleniaceae, Magnoliaceae, Anonaceae, Menispermaceae, Berberidaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 124: ordo Choristopetalar.

Polycarpon*) „Löfl." Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 881. 1360. n. 1110; 1762. Sp. ed. II. p. 131; 1764. Gen. ed. VI. p. 42. n. 105; 1767. Syst. ed. XII. p. 304: g. Triandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 91. — Murr. 1774. Syst. p. 111; 1784. Syst. p. 129. — Reich. 1778. Gen. p. 44. n. 112. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 58. n. 138. — Gmel. 1791. Syst. p. 207. — Pers. 1797. Syst. p. 134; 1805. Ench. I. p. 111. n. 207. — Willd. 1797. Sp. I. p. 490. n. 159. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 416. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 89. — Gmel. 1826. Fl. Bad. IV. p. 107. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 72. 372.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 299. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 237. — Batsch 1802. Tab. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 110. — Hedw. 1806. Gen. p. 50. n. 236. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 838 (anomal.); 1825. Syst. I. p. 363. n. 363. — Link 1821. En. I. p. 107. — Lois. 1826. Dict. v. 42. p. 323.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
Gled. 1764. Syst. p. 11. n. 39: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 228.
Neck. 1790. El. II. p. 152. n. 842: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 224. t. 129.
DC. 1805. Franç. IV. p. 767: g. Alsinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 38: g. Paronychiear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 390; 1825. Dict. v. 38. p. 9. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 40. — Kunth 1824. Syn. III. p. 353. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 181. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 77. n. 381. — Webb 1836. Canar. I. p. 154. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 416. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 214.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 56. 858. n. 392: g. Paronychicar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 547: g. Paronychidear. verar.
DC. 1828. Pr. III. p. 376: g. Polycarpaear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 566. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 93.
Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4260; 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 162. n. 6286: g. Polycarpear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 255. Ed. II. p. 281. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 607.
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Spergulear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 133. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 173. — Endl. 1839. Gen. n. 5212. p. 960; 1841. Ench. p. 504. — Walp. 1842. Rep. I. p. 263. — Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 165.
Link 1831. Hdb. II. p. 423: g. Paronychiacear.
Meisn. 1838. Comm. p. 97: g. Spergulariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Synon. Trichlis Hall.; Anthyllis Adans. pt.; Hagea Biv.; Polycarpum Scop.

Polycarpum Scopoli 1777. Introd. p. 330: g. Caryophyllear.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 726: g. Triandr. Trigyn.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Paronychiear.
= Polycarpon Löfl.

Polycenia Choisy 1823. Mém. soc. Genèv. II. 2. p. 91: nov. g. Selaginear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3096. — Bartl. 1830. Ord. p. 178. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 245. — Endl. 1839. Gen. n. 3726. p. 641; 1841. Ench. p. 317. — Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 245. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 473. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 142.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII: g. Buchnerear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 196: g. Globulariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4439: g. Hebenstreitiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 667: g. Selaginacear. — Par. Choisy 1848 in DC. Pr. XII. p. 2.

Polycephalos Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 154: nov. g. Syngenes. Polygam. Capitat.
Scop. 1777. Intr. p. 124: g. Flosculosar.
DC. 1836. Pr. V. p. 370: sect. Sphaeranthi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2395 c. p. 388; 1841. Ench. p. 235. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3572. 3 (*Polycephalus*).
Synon. Oligolepis Cass.

*) Apulejo πολυκαρπος.

Polycephalus Rchb. vid. *praeced.*
Polychaeta Rchb. vid. *Polychaete Endl.*
Polychaeta Jaub. & Spach 1852. Ill. pl. Or. IV. p. 65: subg. Pulicariae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 203.
= Pulicariae (sect.) DC. pars et Strabonia DC.
Polychaete Endl. 1838. Gen. n. 2264 *c.* p. 367; 1841. Ench. p. 233: sect. Steviae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3820. 3 (*Polychaeta*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 548.
Polychaetia Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 81: sect. Tolpidis.
= Schmidtia Mönch.
Polychaetia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 371: nov. g. Carpesiear. (Relhania linifolia W.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 284: g. Relhaniear. Sect.: Stictophylla, Eupolychaetia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2780. p. 453; 1841. Ench. p. 244. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3539. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 731: g. Osmitear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.
Polychaeton Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 9: sect. Fumaginis. — Par. Leman 1826. Dict. v. 42. p. 325.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeronemeor.
Polychidium Achar. 1810. Lich. univ. p. 658; 1814. Syn. Lich. p. 328: sect. Collematis. — Par. Leman 1818. Dict. v. 10. p. 71. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 378.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 401: g. Collematidear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 421: g. Collemear.
Synon. Garovaglia Trev.
Polychilos Kuhl & Hass. 1827. Orchid. ed. Breda t. 1.
Lindl. 1853. Fol. Orchid. Fasc. V. 1 Dec.: g. Orchidear. (P. cornu cervi.)
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 681: g. Vandear.
Polychlaena G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 488: nov. g. Malvacear. (P. ramosa et simplex.)
Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23): g. Hibiscear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370.
Rchb. 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. n. 7647: g. Ketmiear. genuinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5277 *b δ.* p. 982; 1841. Ench. p. 512: subsect. Ketmiae.
Synon. Pentaspermum DC.?; Pentaspermus Don?
Polychlaena Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 833: sect. Hibisci. (*Synon. Kosteletzkya Presl; Pentaspermum DC.; Hibiscus Med.*)
Polychroa*) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. II. p. 559. Ed. Willd. p. 684: nov. g. Monoec. Pentandr. (P. repens.) — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 393. n. 1674. — Pers. 1807. Ench. II. p. 561. n. 2027.
Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 134: g. Amarantacear. sect. 2.

*) χρόα, color; ex multiplici foliorum colore.

Polychroa Loureiro cont.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 205: g. Amaranthacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 481. — Agdh. 1825. Aphor. p. 219. (verar.) — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 326.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 816. n. 922: g. Amarantear.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4271: g. Polycarpear.?
Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96): g. Telephiear.?
= Amarantus Linn.
Polychroma Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 191: nov. g. Ceramiear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 327.
= Griffitsia Agdh.
Polychysmium Lév. vid. *Polyschismium Corda.*
Polyclada DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 125: sect. Scorzonerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3695. 5 (*Polyclade*). — Walp. 1847. Rep. VI. p. 351.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8: g. Scorzonerear.
Polyclade Rchb. vid. *praeced.*
Polycladia Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 378: nov. g. Floridear.? (Fucus Commersoni Lamx.)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 769. n. 512: g. Gelidiear.
Polyclados Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Synantherear. Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 34. t. 4. f. B: P. cupressinus, inter Synanthereas dubiae sedis.)
Polyclathra „Bertol." Linnaea XVI. Litt. p. 253: vid. *Pentaclathra Bertol.*
Polyclidia Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 164: nov. g. Nicotianear. Vid. *Polydiclis Miers.*
= Polydiclia G. Don.
Polycnemeae Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 22.
Moq.-Tand. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 41: trib. Paronychiear. Gen.: Polycnemum, Hemichroa.
Endl. 1837. Gen. p. 302; 1841. Ench. p. 185: subtrib. Achyranthear. Gen. ead. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). Gen. ead. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 334. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 165: subsect. Achyranthear. Gen. ead.
Polycnemum*) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 21. n. 44; 1753. Sp. I. p. 35; 1759. Syst. ed. X. p. 862. n. 51; 1762. Sp. ed. II. p. 50; 1764. Gen. ed. VI. p. 25. n. 53; 1767. Syst. ed. XII. p. 74: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 75; 1784. Syst. p. 83. — Reich. 1778. Gen. p. 26. n. 59. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 33. n. 72. — Gmel. 1791. Syst. p. 106. — Pers. 1797. Syst. p. 84; 1805. Ench. I. p. 40. n. 91. — Willd. 1797. Sp. I. p. 192. n. 88. — Vahl 1806. Enum. II. p. 23. n. 76. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 97. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 29. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 403. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 64. 98.

*) Nomen ex Dioscoride. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 177.

Polycnemum Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 11. n. 34: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Scop. 1777. Intr. p. 346: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 84: g. Atriplicum. — Par. Schrad. 1809. N. Journ. III. p. 89. Char. reform. *Cf.* Schrad. 1811. Comm. Gotting. I. p. 14.
Neck. 1790. El. II. p. 201. n. 922: g. Sysellophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 211. t. 128.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 256: g. Chenopodear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 398. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 310; 1825. Syst. I. p. 180. n. 202; 1830. Gen. I. p. 46. n. 212. — Agdh. 1825. Aphor. I. p. 215. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4325. — Link 1831. Hdb. II. p. 415. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. — Kunth 1838. Berol. II. p. 155. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 180.
Cram. 1803. Disp. p. 5 in Monandr. Digyn., p. 15 in Diandr. Digyn. et 56 in Pentandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 198: g. Attriplicear.
Hedw. 1806. Gen. p. 32. 360: g. Atriplicear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 346. 523. n. 152. — Lois. 1826. Dict. v. 42. p. 328. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI.
Link 1821. En. I. p. 62: g. Atriplicinar.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 61. 371: g. Chenopodiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 297. — Koch 1837. Syn. p. 604. Ed. II. p. 694.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 583; 1837. Hdb. p. 239: g. Amaranthear.
Moq.-Tand. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 41; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 334: g. Polycnemear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1960. p. 302; 1841. Ench. p. 185. — Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6411. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 860.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 103: g. Achyranthear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 615: g. Scleranthear., 1855. ibid. III. p. 6 ad Amarantaceas reductum.
Synon. Selago Adans. pt.

Polycocceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 16. 41. 99: trib. Coccothallar. Gen.: Calialoa, Polycoccus, Pleococcus. *Cf.* Flora 1849. p. 612.

Polycoccum Flotow . . .
= Verrucaria Pers.

Polycoccus Kütz. 1841. Haarl. natuurk. Verh.; 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phycol. gener. p. 171; 1845. Phycol. germ. p. 148; 1846. Tab. phyc. t. 8. f. 10; 1849. Sp. Alg. p. 211. n. 165: g. Palmellear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 65.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 15: g. Protococcoidear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 41: g. Polycoccear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Polycodon Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 687: subsect. Eucricae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 46. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *u*.

Polycoelia J. Agardh 1850. Öfvers.; 1850. Flora II. p. 742: nov. g. Cryptonemear.

Polycoelium A. DC. 1847. Prodr. XI. p. 705: g. Myoporacear. (Nomen mutatum ob species 6- et 8-loculares.)
Synon. Pentacoelium Sieb. & Zucc.

Polycoma „Palis. ined." Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: nov. g. Iliodear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Polycomear.
= Thorea Agdh.

Polycomeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: subtrib. Chaetophorear. Gen.: Myriodactylon, Polycoma.

Polycomptos Endl. 1847. Syn. Conif. p. 260; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 11. n. 1816/3 2 *β*: subsect. Plagiopyles.

Polycycnis Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 110: g. Catasetear. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 618.

Polycyrtas Wittst. Etym. Handw. p. 715: vid. *seq.*

Polycyrtus Schlechtend. 1843. Linnaea XVII. p. 126: nov. g. Umbelliferar. (P. cachroides.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
= Eupeucedanum DC.

Polycystis Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 269; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 787: nov. g. Uredineor. (Uredo pompholygodes Wallr.) *Cf.* Flora 1849. p. 277.
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 372: g. Uredinear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 515: g. Ustilagineor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.

Polycystis Kütz. 1846. Tab. phyc. p. 7; 1849. Sp. Alg. p. 210. n. 162: nov. g. Palmellear.
= Diplocystis Trevis.

Polydactylon Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: g. pl. class. XIV *a*. (Nomen.)

Polydesmaea Rchb. 1841. Nomencl. Ind. p. 207: nomen pro *Polydesmia Benth.* 1839 (nec 1833) propositum.

Polydesmia Benth. 1833. Labiat. p. 114; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 115: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 699. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *m*. p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 12. — Walp. 1845. Rep. III. p. 549.

Polydesmia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 615: subsect. Ectasis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a* 3. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 1 *c*. (in Ind. p. 207 emend. *Polydesmaea*.)

Polydesmus Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 365: nov. g. Fungor., Septosporio et Alternariae proximum. (P. elegans.)

Polydiclia*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 466: sect. Nicotianae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 12. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 571.

Synon. Polyclidia Miers.

Polydiclis „Miers in Jard. & Selby Ann. n. h. 2d. ser. IV. p. 361" Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 151: g. Nicotianear. (Dictyocalyx quadrivalvis et multivalvis Hook.)

Polydictyum Presl 1850. Epimel. bot. p. 412 (52): nov. g. Nephrodiariar. (Aspidium Menyanthidis Bl.)

Polydistachyophorum (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 469: sect. Andropogonis. (A. hirtum et pubescens.)

Polydontia Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1104: nov. g. Rosacear. *Cf. Polystorthia Blume.*

G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 516: g. Amygdalacear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. III. p. 3. 6 (*Polyodontia*).

Meisn. 1837. Gen. p. 102 (72): g. Amygdalear. (*Polyodontia*). — Par. Wight 1840. Ic. pl. Ind. I. 13. t. 256 (*Polyodontia*).

= Pygeum Gärtn.

Polydora Fenzl .... in Kotschy Pl. Aethiop. n. 578: subg. Vernoniae? (Walp. Rep. VI. p. 98.)

= Lepidaploae Cass. sp.

Polyechma**) Hochstett. 1841. Flora p. 376: nov. g. Acanthacear.

Endl. 1842. Spl. II. p. 62. n. 4040/1: g. Hygrophilear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 367. — Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 82.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Hygrophilidar.

Polyedrium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 83: nov. g. Tetrasporear.

Kütz. („ex Näg. mss.") 1849. Sp. Alg. p. 169. n. 125 (*Polyedrum*): g. Desmidiear.

A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. genuinar. eremobiar.

Polyedrum Kütz. vid. *praeced.*

Polygala***) Tourn. 1700. Inst. p. 174. t. 79: g. pl. class. III.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 245. Ed. Hall. 1745. p. 252: g. pl. class. X.

Linn. 1737. Gen. p. 214. n. 567: g. Diadelph. Decandr.

Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 195. t. 85.

Linn. 1737. Cliff. p. 352; 1740. Syst. p. 27; 1742. Gen. ed. II. p. 340. n. 686; 1753. Sp. II. p. 701; 1759. Syst. ed. X. p. 1153. n. 761; 1763. Sp. ed. II. p. 986; 1764. Gen. ed. VI. p. 364. n. 851; 1767. Syst. ed. XII. p. 470: g. Diadelph. Octandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 48. — Murr. 1774. Syst. p. 530; 1784. Syst. p. 637. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 734. t. 294. 295. — Reich. 1778. Gen. p. 364. n. 921. —

*) *δικλίς*, valva.
**) *ἔχμα*, retinaculum.)
***) *γάλα*, lac: herba quae potata lactis ubertatem inducit.

Polygala Tourn. cont.

Lour. 1790. Coch. II. p. 426. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 482. n. 1155. — Gmel. 1791. Syst. p. 1081. — Pers. 1797. Syst. p. 675; 1807. Ench. II. p. 271. n. 1661. — Willd. 1800. Sp. III. p. 871. n. 1303; 1809. En. p. 741. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 87. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 179. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 427. 443. Sect.: Polygala, Chamaebuxus. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 218.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 606: g. inter Papilionaceas et Didynamias medium.

Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 129. n. 531: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 626.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Lomentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 429.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 63: g. Leguminosar.

Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 437: g. Papilionacear. deliquesc.

Hill 1769. Ht. kew. p. 309: g. Tetrapetalar. irregular.

Scop. 1777. Intr. p. 313: g. Anomalar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 294. t. 62. f. 1 (vulgaris).

Juss. 1789. Gen. p. 99: g. Pedicularium.

Neck. 1790. El. III. p. 61. n. 1381: g. Amorphophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 296: g. Rhinanthoidear.

Batsch 1802. Tab. p. 87: g. Rhoeadear.

Rebent. 1804. Neom. p. 172: g. Octandr. Monogyn.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 228: g. Rhinanthacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 455. (*Cf.* ibid. V. p. 386.)

Juss. 1809. Ann. Mus. XIV. p. 386; 1815. Mém. Mus. I. p. 388: g. Polygalear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 737; 1826. Syst. III. p. 163. n. 2487; 1831. Gen. II. p. 569. n. 2771. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 667. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 392. — Kunth 1824. Syn. III. p. 310; 1838. Berol. I. p. 102. — DC. 1824. Pr. I. p. 321. Sect.: Psychanthus, Polygalon, Blepharidium, Clinclinia, Timutua, Senega, Chamaebuxus, Brachytropis. — Mart. 1825. Mat. med. bras. in Denkschr. Münchn. Ak. IX. p. 88. — D. Don 1825. Nepal. p. 199. — Presl 1826. Sicul. I. p. 136. — Lois. 1826. Dict. v. 42. p. 333. — A. St. Hil. & Moq.-Tand. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 350; 1829. Fl. Bras. II. p. 5; 1830. Mém. Mus. XIX. p. 326. — Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3029; 1841. Nom. p. 175. n. 6779. Sect. ut DC. exclusa Brachytropide. — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 247; 1842. Ross. I. p. 269. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 349. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 36. — Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 18. — Koch 1836. Syn. p. 90. Ed. II. p. 98. Sect.: Polygalon, Chamaebuxus. — Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). — Endl. 1840. Gen. n. 5647. p. 1078; 1841. Ench. p. 568. Sect. ut DC. — A.

Polygala Tourn. cont.
Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 104. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 81. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 239. — Walp. 1846. Rep. V. p. 63. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 194. Sect. ut Koch. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 381. Subgen.: Isolophus, Tricholophus, Polygala, Chamaebuxus, Senega, Psychanthus. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 237.
Link 1822. En. II. p. 219; 1829. Hdb. I. p. 618: g. Polygalinar.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 443: g. Personatis aff.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 350: g. Polygalacear. Sect.: Polygala, Chamaebuxus. — Par. Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 84; 1847. Veg. kd. p. 378. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 126. — Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 124. Distinguitur Chamaebuxus.
Synon. Polygaloides Tourn.; Clinclin Feuill.; Chamaebuxus Dill., etc.

Polygala Adans. 1763. Fam. II. p. 358: g. Tithymalor.
= Penaea Plum.

Polygala Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 117: g. Polygalear. valde restrict. Sect.: Polygalium, Andrachnoides, Macrolophium, Microlophium.
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 382: subg. Polygalae.
= Polygalon DC. pt.

Polygalaceae Rchb. 1828. Consp. p. 120: fam. Limbatar. Divis.: Polygaleae, Myoporinae, Pittosporeae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 349. (Gen. Polygala.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 249: fam. Myrtiflorar. Divis.: Polygaleae, Lecythideae, Barringtonieae.

Polygalaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 84) 1847. Veg. kingd. p. 375: ordo Sapindalium. Gen.: Polygalear. Endl. et Brachytropis, Trigonia, Moutabea, Hymenanthera?
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 125: ordo Dicotyledonum.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 294.
= Polygalear. Juss. pars.

Polygaleae Juss. 1809. Ann. Mus. XIV. p. 386; 1815. Mém. Mus. I. p. 385; 1826. Dict. v. 42. p. 399: nova fam. Polypetalar. Gen. (1815): Tetratheca, Muralta, Polygala, Comesperma, Bredemeyera, Monnina, Hebeandra. *Affin.:* Salomonia, Krameria.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 342. (Verm. bot. Schr. I. p. 26.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 736: fam. 79 plant. Gen.: Polygala, Securidaca, Muralta, Bredemeyera, Hebeandra, Comasperma, Salomonia; Krameria, Tetratheca, Brownea.
DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Pr. I. p. 321: ordo 18 Thalamiflorar. Gen. (1824): Polygala, Salomonia, Comesperma, Badiera, Soulamea, Muraltia, Mundia, Monnina, Bredemeyera, Securidaca, Krameria? — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 348. Gen. ut DC. et Carpolobia.

Polygaleae Juss. cont.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 667: fam. Thalamiflorar. Gen.: Polygala.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
A. St. Hil. & Moq.-Tand. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 313; 1830. XIX. p. 305. 325: ordo inter Sapindaceas et Fumarieas collocandus. Gen.: Polygala, Badiera, Comesperma, Salomonia, Muraltia, Mundia, Monnina, Soulamea, Securidaca, Krameria; Bredemeyera?
Rchb. 1828. Consp. p. 120: div. Polygalacear. Gen. ut DC. (exclusa Krameria) et Brachytropis, Jackia, Penaea?
Bartl. 1830. Ord. p. 256: ordo (144) Rhoeadear. Gen. ut Rchb. exclusa Penaea.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Aceralium.
Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20): ordo 22 plant. (p. 438 Polygalinar.) Gen. ut DC. et Xanthophyllum, Carpolobia, Trigonia?
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 107: fam. (103) Rhoeadear. Trib.: *verae* (gen.: Isolophus, Tricholophus, Polygala, Chaemaebuxus, Senega, Brachytropis, Psychanthus, Salomonia, Comesperma, Badiera, Xanthophyllum, Muraltia, Mundia, Monnina, Bredemeyera, Securidaca), Kramerieae.
Endl. 1840. Gen. p. 1077; 1841. Ench. p. 567: ordo Polygalinar. Gen.: Salomonia, Polygala, Badiera, Comesperma, Muraltia, Mundia, Monnina, Securidaca, Bredemeyera?, Carpolobia? *Anomala:* Krameria, Xanthophyllum, Soulamea. Emittitur 1841 Soulamea et accedunt 1843 (Spl. III. p. 96) Catocoma, Lophostylis.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 81: fam. Polygalinear. Gen.: Polygala, Muraltia, Securidaca.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 383: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.
Conf. Polygalinae Link; Polygalaceae Lindl.; Krameriaceae Lindl.; Polygalineae Rabenh.

Polygaleae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXXVII: fam. Limbatar. Gen.: Securidaca; Polygala, Comesperma, Muralta, Mundia; Krameria; Penaea; Stenochilus, Bontia, Pholidia, Myoporum.
= Polygalaceae Rchb.

Polygaleae Rchb. 1837. Handb. p. 250; 1841. Nomencl. p. 175: div. Polygalacear. Subdivis.: *genuinae* (gen. Polygalear. Rchb. 1828), Kramerieae, Tremandreae.
= Polygalinae Endl.

Polygalinae Link (1822. Enum. II. p. 219) 1829. Handb. I. p. 617: ordo (39) Hypanthar. Gen.: Polygala, Muraltia et (1831. II. p. 274) Krameria.

Polygalinae Endl. 1840. Gen. p. 1076; 1841. Ench. p. 566: class. Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Tremandreae, Polygaleae, (Soulameae, Trigoniaceae).
Meisn. 1843. Gen. p. 438: class. IV. Diplochlamydear. Ord. ut Endl.

Polygalineae Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 223.
= Polygaleae Juss.

Polygalineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXIII. 81: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Tremandreae?, Polygaleae.

Polygalium Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 120: sect. Polygalae. (P. vulgaris, amara, major, flavescens.)

Polygaloides Tourn. ined. Nomen antea pro *Chamaebuxo* propositum. *Cf.* Dill. Nov. gen. p. 153.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 607: g. inter Papilionaceas et Didynamias medium.
= Chamaebuxus Tourn.

Polygalon DC. 1824. Prodr. I. p. 324: sect. Polygalae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3029 *e*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 351. — Koch 1836. Syn. p. 90. Ed. II. p. 98. — Endl. 1840. Gen. n. 5647 *b*. p. 1078; 1841. Ench. p. 568. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 269. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 194.
Synon. Isolophus, Tricholophus et Polygala Spach.

Polygamia Linn. Gen., Syst., Spec. etc., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XXIII. plant. Ordines: Monoecia, Dioecia, Trioecia.

Polygaster Fries 1823. Syst. myc. II. p. 295: nov. g. Tuberacear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 343.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 564: g. Tuberear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 130: g. Tuberaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 221.
Endl. 1836. Gen. n. 346. p. 30; 1841. Ench. p. 17: g. Tubereor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 328.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 25; 1842. Mycol. p. 102: g. Pisocarpiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 443: g. Sclerodermeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Polygastreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 237: g. Nidulariaceor.

Polygastrei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: sect. Cyophoreor. Gen.: Polygaster, Endogone, Gemmularia?, Arachnion, Myriococcum, Polyangium, Ciliciocarpus.

Polyglochin Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 6; 1789. Beitr. IV. p. 146. (Carex dioica.)

Polygonaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 211; 1847. Veg. kingd. p. 502: ordo Silenalium. Trib.: Eriogoneae, Polygoneae, Triplareae, Brunnicheae.
Meisn. 1840. Gen. p. 316 (227): ordo Oleracear. Trib.: Brunnichieae, Coccolobeae, Polygoneae.
C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 135. Subordines: *verae* (trib.: Eriogoneae, Calligoneae, Rumiceae, Eupolygoneae, Coccolobeae, Triplarideae), *spuriae* (trib. unica: Brunnichieae).
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 385: fam.

Polygonaceae Lindl. cont.
Dicotyledonear. apetalar. perigynar. Trib.: Eriogoneae, Polygoneae.
Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 1: ordo Monochlamydear. Subord.: Eriogoneae, Polygoneae, Brunnichieae, Symmerieae.

Polygonales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 24: nixus Curvembryar. Ordo: Polygoneae.

Polygonastrum Mönch 1794. Meth. p. 637: nov. g. Petalostemonis. (Convallaria racemosa L.)
= Smilacina Desf. (et Flüggea Rich.)

Polygonatae Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 486: ordo plant. Gen.: Rumex, Scleranthus, Herniaria, Polygonum.

Polygonatum*) Tourn. 1700. Inst. p. 78. t. 14: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 45. Ed. Hall. 1745. p. 51.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 286: g. Liliacear.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 636.
Adans. 1763. Fam. II. p. 54: g. Hyacinthor.
DC. 1805. Franç. III. p. 175: sect. Convallariae. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 373. — Gmel. 1806. Fl. Bad. II. p. 51. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 205. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 448. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 567; 1830. Fl. exc. p. 100. — Schult. 1829. Syst. VII. p. 296. — Koch 1837. Syn. p. 705. Ed. II. p. 814. — Kunth 1838. Berol. II. p. 268. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1119. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 401.
Desfont. 1807. Ann. Mus. IX. p. 48: g. a Convallaria distinctum.
Elliott 1817. Sketch I. p. 393: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 225.
Link 1821. En. I. p. 342: g. Asparaginar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 187: g. Smilacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1322.
Link 1829. Hdb. I. p. 184: g. Convallariacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 53: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Math. 1853. Belg. I. p. 533.
Endl. 1837. Gen. n. 1181. p. 154; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1730. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 41; 1850. Enum. V. p. 131. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 386. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 122. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 228.
Synon. Vagnera Adans.?; Axillaria Rafin.

Polygoneae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 48 plant. Gen.: Polycnemum, Camphorosma, Basella, Polygonum, Atraphaxis, Coccoloba, Rumex, Rheum, Triplaris, Corrigiola, Telephium, Tamarix, Herniaria, Illecebrum, Scleranthus, Trianthema.

*) πολυγόνατον Dioscoridis.

Polygoneae Juss. 1789. Gen. p. 82: ordo 5 class. VI. Gen.: Coccoloba, Atraphaxis, Polygonum, Rumex, Rheum, Triplaris, Calligonum, Pallasia, Königia. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 225. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 249. Gen. ead. omissis Triplaride et Pallasia. — Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 345. Gen. ut antea et Brunnichia, Polygonella, Eriogonum, Espinosa, Podopterus.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 192. t. 33. Gen. ut Juss. 1789 et Brunnichia.
DC. 1805. Franç. III. p. 363: ordo (32) Dicotyledonum. Gen.: Polygonum, Rumex, Rheum. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 418. Ed. Nees p. 274. (apetalar.) Gen.: Polygonum, Rumex.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 873: fam. Dicotyledonum apetalar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 303: fam. 27 plant. Gen.: Polygonum, Atraphaxis, Eriogonum, Coccoloba, Rumex, Rheum, Triplaris, Calligonum, Brünnichia, Königia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Monochlamydear. — Par. Koch 1837. Gen. p. 612. Ed. II. p. 703. Gen.: Rumex, Oxyria, Polygonum.
Campd. 1819. Mon. Rum. p. 18. Gen.: Oxyris, Atraphaxis, Persicaria, Polygonum, Fagopyrum, Emex, Rumex, Podopterus, Triplaris, Rheum; Eriogonum, Oxygonum, Coccoloba, Brunnichia, Königia, Calligonum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 266: fam. Monochlamydear. Gen.: Bistorta, Persicaria, Polygonum, Fagopyrum; Lapathum, Acetosa, Oxyria.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 22: fam. Thalamitegmiae.
Agdh. 1825. Aphor. p. 222; 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 585: ordo Oleracear. Gen.: Königia, Polygonum, Fagopyrum, Oxyria, Atraphaxis, Eriogonum, Brunnichia, Calligonum, Rumex, Rheum, Podopterus, Triplaris, Coccoloba. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 304; 1841. Ench. p. 187. Trib.: Eriogoneae, *verae* (gen.: Oxyria, Rheum, Königia, Polygonum, Fagopyrum, Oxygonum, Calligonum, Coccoloba, Ceratogonon, Emex, Rumex, Tragopyrum, Atraphaxis, Podopterus, Triplaris, 1842 [Spl. II. p. 34] Polygonella, Gonopyrum et 1847 [Spl. IV. p. 51] Campderia, Mühlenbeckia, Thysanella, Pteropyrum, Symmeria), *spuriae* (gen.: Brunnichia, Antigonon). *Cf.* Endl. 1847. Spl. IV. p. 44.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: div. Portulacear. Gen.: Königia, Rumex, Emex, Oxyria, Rheum, Tragopyrum, Atraphaxis, Polygonum, Coccoloba; Begonia.
Rchb. 1828. Consp. p. 162 (1832. Fl. exc. p. 568): div. Portulacacear. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Königia; Oxygonum, Calligonum; Oxyria, Emex, Rumex, Rheum, Polygonella, Atraphaxis, Tragopyrum, Polygonum; Eriogonum), Begoniaceae, Coccolobeae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. Subdivis.: Rumiceae, Begonieae, *genuinae* (sect.: Persicarieae, Amblygoneae, Coccolobeae).

Polygoneae Juss. cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 295: ordo 3 Vaginalium. Gen.: Coccoloba, Atraphaxis, Polygonum, Calligonum, Rumex, Emex, Oxyria, Rheum, Königia.
Bartl. 1830. Ord. p. 107: ordo (75) Fagopyrinar. Gen.: Königia, Rumex, Emex, Oxyria, Rheum, Podopterus, Triplaris, Coccoloba, Brünnichia, Blochmannia, Atraphaxis, Polygonella, Tragopyrum, Polygonum, Fagopyrum, Calligonum, Oxygonum, Eriogonum.
Meisn. 1832. Syn. Polyg. Ind. or. in Wall. Pl. As. rar. III. p. 53.
Lindl. 1833. Nix. p. 24: ordo unicus Polygonalium.
Mart. 1835. Consp. p. 16: ordo 96.
Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 482. Gen. Afr. austr.
Meisn. 1840. Gen. p. 316 (228): trib. Polygonacear. Gen.: Rheum, Oxyria, Pterococcus, Calliphysa, Calligonum, Königia, Podopterus, Rumex, Emex, Atraphaxis, Polygonella, Polygonum, Fagopyrum, Ceratogonon, Oxygonum, Triplaris. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. Gen.: Oxyria, Rheum, Königia, Polygonum, Fagopyrum, Ampelygonum, Oxygonum, Calligonum, Calliphysa, Pterococcus, Coccoloba, Mühlenbeckia, Ceratogonum, Emex, Rumex, Tragopyrum, Gonopyrum, Polygonella, Atraphaxis. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 386. Gen. ut Endl. 1841.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 518: fam. (175) Fagopyrinar. Trib.: Eriogoneae, *verae* (gen. ut Endl., sed restrictiora).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 100: fam. Polygonoidear. Gen. ex Endl.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 3. 28: subordo Polygonacear. Trib.: Pterygocarpae, Apterocarpae.

Polygonella Michx. 1803. Fl. bor. Am. II. p. 240: nov. g. Dioec. Octandr., Atraphaxidi aff.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 255: sect. Polygoni. — Par. Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 133.
Juss. & Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 346: g. Polygonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4288. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. — Meisn. 1841. Gen. p. 317 (228). — Endl. 1842. Spl. II. p. 34. n. 1994/1; 1847. Spl. IV. p. 53. (verar.) Sect. (1847): Eupolygonella, Gonopyrum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 292. Sect. ut Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236: g. Rumicear. — Par. (emend.) Engelm. & Gray 1847. Bost. Journ. V. p. 231. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 79. Sect. ut Endl.
Synon. Lyonia, Lyonella et Stopinaca Rafin.

Polygonella C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 145: g. restrict. Rumicear.
= Eupolygonella Endl.

Polygonifolia Vaillant . . . . Paris. 162.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 95. t. 3: g. Gymnomonospermar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 272: g. Spergular.
= Corrigiola Linn.

Polygonoideae Brongn. 1843. Enum. genr. p. XXVII. 100: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Polygoneae.

Polygonoides Tourn. 1700. Coroll. p. 47. t. 478: g. pl. class. II.
= Calligonum Linn.

Polygonum*) Tourn. 1700. Inst. p. 510. t. 290: g. pl. class. XV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 86. Ed. Hall. 1745. p. 96: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 116. n. 329; 1737. Cliff. p. 150; 1742. Gen. ed. II. p. 169. n. 391; 1745. Fl. suec. p. 117; 1748. Ups. p. 95: g. Octandr. Trigyn.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 182: g. ord. 3 class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123: g. Thalamostenis.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Vaginalium.
Adans. 1763. Fam. II. p. 276: g. Persicariar.
DC. 1805. Franç. III. p. 368: sect. Polygoni. Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 43.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 271: g. Polygonear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 534. (verar.)
= Polygoni sect. Avicularia Meisn.

Polygonum Linn. 1753. Sp. I. p. 359: g. injunctis Bistorta et Persicaria ampliat. Octandr. Trigyn. Sect.: Atraphaxoides, Bistorta, Persicaria, Helxine. — Par. Linn. 1759. Sp. ed. X. p. 1005. n. 445; 1762. Sp. ed. II. p. 516; 1764. Gen. ed. VI. p. 195. n. 495; 1767. Syst. ed. XII. p. 275. n. 490. — Scop. 1772. Carn. I. p. 278. — Murr. 1774. Syst. p. 311; 1784. Syst. p. 376. — Reich. 1778. Gen. p. 199. n. 537. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 264. n. 677. — Lour. 1790. Coch. I. p. 240. — Gmel. 1791. Syst. p. 637. — Pers. 1797. Syst. p. 402. — Willd. 1799. Sp. II. p. 440. n. 785; 1809. En. p. 427. — MBieb. 1808. Taur. cauc. I. p. 300. Sect. ut Linn. 1753. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 254. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 34. Sect.: Bistorta, Persicaria, Polygonum, Fagopyrum. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 285.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 82; 1826. Dict. v. 42. p. 346. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 250. — Pers. 1805. Ench. I. p. 439. n. 977. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 193. — DC. 1805. Franç. III. p. 363. Sect.: Bistorta, Persicaria, Polygonum, Fagopyrum. — Hedw. 1806. Gen. p. 285. n. 1145. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 419. Ed. Nees p. 275. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 304; 1825. Syst. II. p. 253. n. 1510; 1830. Gen. I. p. 323. n. 1647. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 177. — Campd. 1819. Mon. Rumic. p. 18. (restrict.) — Link 1821. En. I. p. 384; 1829. Hdb. I. p. 296. — Kunth 1822. Syn. I. p. 466; 1838. Berol. II. p. 158. Sect. (1838): Bistorta, Persicaria, Avicularia, Tiniaria. — D. Don 1825. Nepal. p. 69. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. (Sejungitur Fagopyrum.) — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 505. Sect. ut DC. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 529. — Meisn. 1826. Mon. Polyg. p. . . .; 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 53. Sect.: Bistorta, Aconogonum, Amblygonum, Fagopyrum, Tiniaria, Persicaria, Avicularia. *Cf.* Linnaea II. p. 453. — Lois. 1827. Dict. v. 45. p. 70 (*Renouée*). — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI. 614. 648 (sect.: Centinodium, Persicaria, Helxine, Bistorta); 1828. Consp. p. 162. n. 4291. Sect. ut Meisn. (Centinodia loco Aviculariae.) — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 77. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. (restrict.) — Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 5. 48. Sect.: Bistorta, Persicaria, Avicularia, Helxine, Fagopyrum. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 571. Sect.: Polygonum (subsect.: Persicaria, Bistorta, Centinodium, Aconogonum, Tiniaria), Fagopyrum. — Endl. 1833. Norf. p. 42; 1837. Gen. n. 1986. p. 306; 1841. Spl. I. p. 1377; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 45. (verar.) Sect. (1837): Bistorta, Amblygonon, Persicaria, Echinocaulon, Cephalophilon, Aconogonon, Avicularia, Tiniaria. — Koch 1837. Syn. p. 616. Ed. II. p. 710. Sect. ut Mert. & Koch et Aconogonum. — A. Cunn. 1838. Ann. nat. hist. I. p. 455. — Babingt. 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 93. — Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 483; 1841. Gen. p. 317 (228); 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 623. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1319. — Brongn. 1843. En. genr. p. 100. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 313. Sect.: Bistorta, Aconogonon, Persicaria, Avicularia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 757 (*Renouée*). — Webb . . . . Canar. III. p. 220. (Emittuntur Persicaria et Tiniaria.) — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 209. Sect.: Persicaria, Aviculare, Muhlenbeckia. — De Bruyn 1854. Pl. Jungh. III. p. 302. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 45. Sect. ut Griseb. et Helxine, Fagopyrum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Gled. 1764. Syst. p. 85. n. 355: g. Thalamostemonum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 40: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 329: g. Monopetalar. incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 487: g. Polygonatar.
Scop. 1777. Intr. p. 344: g. Seminudar.
Neck. 1790. El. II. p. 211. n. 943: g. Sysellophytor. Disjunguntur Persicaria et Asicaria.
Mönch 1794. Meth. p. 628: g. Petalostemonis.
Batsch 1802. Tab. p. 176: g. Vaginalium. — Par. Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 239.
Cram. 1803. Disp. p. 58 in Pentandr. Monogyn. (P. amphibium), p. 63 in Pentandr.

*) πολύγονον Dioscoridis.

Polygonum Linn. cont.
Digyn. (filiforme) et in Pentandr. Trigyn. (ocreatum), p. 77 in Hexandr. Monogyn. (Persicaria etc.), p. 80 in Hexandr. Trigyn. (barbatum etc.), p. 83 in Heptandr. Monogyn. (orientale) et p. 88 in Octandr. Monogyn. (Fagopyrum, etc.).
C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 146: g. Eupolygonear. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 518. Sect. ex Meisn. — Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 11; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 83. Sect.: Tephis, Avicularia, Persicaria, Amblygonon, Bistorta, Cephalophilon, Echinocaulon, Tiniaria, Aconogonon.
Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6317: g. Persicariear. Sect. fere ut Endl.
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 997: g. Apterocarpar. Sect. ex Meisn.
Synon. Polygonum, Persicaria, Bistorta Tourn.; Helxine Linn.; Atraphaxoides Linn.; Tephis et Tovara Adans.; Asicaria Neck.; Lagunea Lour.; Antenoron Rafin.; Pleuropterus Turcz.

Polyideae Rchb. 1837. Handb. p. 136: div. Floridear.
Rchb. 1841. Nom. p. 21: div. Sphaerococcear. Gen.: Polyides, Thaumasia.

Polyides*) Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 390 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. p. XXXIII. 194: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 349. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 365.
Fries 1825. Pl. homon. p. 342: g. Batrachospermear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193: g. Fucoidear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 344. n. 3410; 1831. Gen. II. p. 751. n. 3807: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 87. p. 8; 1841. Ench. p. 6.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 137: g. Cylindracear.
Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 433: g. Mesogloiariar.
Grev. 1830. Alg. Brit. p. 69: g. Spongiocarpear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 53; 1853. Ner. bor. am. II. p. 28. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 92. — Endl. 1843. Spl. III. p. 38. n. $122/_{35}$. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 89: g. Chondrothamnior.
Rchb. 1837. Hdb. p. 136; 1841. Nom. p. 21. n. 750: g. Polyidear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 453: g. Mesogloiear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Furcellariear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: g. Cryptocarpear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 308.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Spongiocarpidar.

*) „Nomen a similitudine cum tot aliis generibus plantarum inditum."

Polyides Agardh cont.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Gracilariear.
= Furcellaria Lamx.? (teste Kütz. Spec.)

Polylepis Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 80. t. 15: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 72. n. 1300.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 861: g. Sanguisorbear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 226. — Kunth 1824. Syn. III. p. 471. — DC. 1825. Pr. II. p. 591. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 592. — Endl. 1840. Gen. n. 6377. p. 1244; 1841. Ench. p. 659.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 499. n. 1843; 1830. Gen. I. p. 411. n. 2050: g. Rosacear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 350. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 38. 119.
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4425: g. Rosear.
Bartl. 1830. Ord. p. 403: g. Dryadear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453.
Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74): g. Alchemillear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 242; 1841. Nom. p. 167. n. 6479: g. Poteriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 562: g. Sanguisorbacear.

Polylepis Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 212: sect. Sphaeranthi. (Sph. africanus.)
= Dichrocephala DC.

Polylepis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 173: subg. Asteris.
= Hebecarpaea DC.

Polylobium*) Ecklon & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 180: nov. g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 84 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6488. p. 1264; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5869. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 620.
Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 601: sect. Lotonidis.
Synon. Lipozygis Meyer sp.

Polylophium Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 47: nov. g. Thapsiear. (P. orientale.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 897. — Endl. 1850. Spl. V. p. 12. n. $4493/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Thapsidar.

Polymeres Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 316: sect. Diphyis. (D. violacea, tenuifolia, mucronata.)

Polymeria Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIV: sect. Parmeliae.
Pers. 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 18: sect. Physciae.

Polymeria R. Brown 1810. Prodr. I. p. 488. Ed. Nees p. 344: nov. g. Convolvulacear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 352. — Bartl. 1830. Ord. p. 192. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 622.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 463; 1825. Syst. I. p. 568. n. 604; 1830. Gen. I. p. 130. n. 647: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2994; 1841. Nom. p. 114. n. 4436. (genuinar.) — Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 484; 1845 in DC. Pr.

*) πολύ, λόβιον: propter leguminum abundantiam.

Polymeria R. Brown cont.
IX. p. 432. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 295. — Endl. 1839. Gen. n. 3800. p. 653; 1841. Ench. p. 324. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVII. 185. n. 669: g. Convolvulor.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 625: g. Convolvulinar.

Polymeris Dunal 1816. Syn. Solan. p. 23: sect. Solani. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 420. — Walp. 1845. Rep. III. p. 62.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 163: sect. Lycianthis. Subsect.: Gonianthes, Lobanthes.

Polymnactis Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 273: sect. Polymniae. (P. Uvedalia.)
= Uvedalia DC.

Polymnia*) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 15; 1753. Sp. II. p. 926; 1759. Syst. ed. X. p. 1235. n. 889; 1763. Sp. ed. II. p. 1303; 1764. Gen. ed. VI. p. 444. n. 987; 1767. Syst. ed. XII. p. 576: g. Syngenes. Polygam. Necess. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 658; 1784. Syst. p. 790. — Reich. 1778. Gen. p. 441. n. 1070. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 581. n. 1335. — Gmel. 1791. Syst. p. 1270. — Pers. 1797. Syst. p. 831; 1807. Ench. II. p. 491. n. 1939. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2335. n. 1554; 1809. En. p. 934. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 183.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 187. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 524. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 412. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 354.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540. — Link 1822. En. II. p. 362.
Gled. 1764. Syst. p. 251. n. 1037: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 242.
Hill 1769. Ht. kew. p. 24: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 429. t. 174. f. 2. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 575; 1826. Syst. III. p. 622. n. 2865; 1831. Gen. II. p. 642. n. 3223.
Scop. 1777. Intr. p. 134: g. Flosculosar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 282: g. Heliantheur. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 505.
Less. 1832. Syn. p. 213: g. Silphicar. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 514. Sect.: Uvedalia, Alymnia. — Endl. 1838. Gen. n. 2475. p. 402; 1841. Ench. p. 237. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3023. Sect.: Polymnia, Alymnia. — Walp. 1843. Rep. II. p. 605 (an rectius *Polhymnia?*); 1847. VI. p. 149. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

*) *Πολύμνια*, una ex Musis.

Polymnia Linn. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21: g. Milleriear. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 273. Sect.: Eupolymnia, Polymnactis.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 47. t. 254.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 43: g. Melampodiear.
Synon. Polymnia et Alymnia Neck.; Polymnia et Polymniastrum Lam., Cass. etc.

Polymnia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 31. n. 58: g. Actinophytor., sejuncta Alymnia restrictum.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18; 1829. v. 59. p. 235. 247; 1830. v. 60. p. 577: g. Milleriear. (1829 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2719.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.
Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3023. 1: sect. Polymniae.
= Uvedalia DC.

Polymniastrum Lamarck Illustr. t. 712.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18; 1829. v. 59. p. 235. 246; 1830. v. 60. p. 577: g. Milleriear. (1829 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2720.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.
= Alymnia Neck.

Polymorpha Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 55. 71; 1816. Nereis brit. ed. alt. p. 94: nov. g. Fucor. (P. crispa, patens, etc.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 356.
= Chondrus Lamx.

Polymorphae Scopoli 1777. Introd. p. 57: trib. XVI. plantar.
= Tubulatae Scop.

Polymorphae Batsch 1802. Tab. affin. p. 237: ordo Monopetalar. Fam.: Sambucinae, Caprifolia, Viscinae, Chordariae, Asarinae.

Polymorphum Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 32: nov. g. Hypoxylor. lichenoideor. (Opegrapha faginea Pers.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 357.
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 543. 13: sect. Opegraphae.
= Dichaena Fries.

Polymorphus Naumb. 1782. Diss. p. 28. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 358.
= Bulgaria Fries.

Polymyces Batt. 1759. Fung. Tab. 30.
= Armillaria Fries.

Polynema Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 274: nov. g. Sphaeriaceor. (Excipula ornata Not.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491; 1849. ibid. X. p. 388: g. Excipuleor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 367: g. Patellariaceor.

Polyneuron Decaisne 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 694: sect. Plantaginis.

Polyodon HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 174: nov. g. Chloridear. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 362. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 232; 1830. Gram. p. 170; 1833. Agrost. p. 282. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 875. — Endl. 1837. Gen. n. 850. p. 95; 1841.

Polyodon HBK. cont.
Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 336. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 217.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 42. 713. n. 343: g. Graminear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.
Synon. Pleiodon Rchb.

Polyodontia Meisn., Wight, Römer vid. *Polydontia Blume.*

Polyodus Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 301: nov. g. Algar. (Fucus gelatinosus Desf.)
= Laurencia Lamx.

Polyopes J. Agardh 1850. Öfvers.; 1850. Flora II. p. 742: nov. g. Floridear. (Fucus constrictus Turn.)

Polyosma Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 658: nov. g. Caprifoliear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 275: g. Cornear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 401. — Rchb. 1837. Hdb. p. 211. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (110). — Endl. 1839. Gen. p. 799. n. 4579 (dubium).
Benn. 1838 in Horsf. Pl. Jav. rar. p. 193. t. 40: g. Escalloniear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4678/$_1$. p. 1417; 1841. Ench. p. 410. — Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6255. (genuinar.) — Walp. 1843. Rep. II. p. 379. 937. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 723.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 88 (*Polyosmia*): g. Cornacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 751: g. Grossulariacear.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 17. p. 258: g. Polyosmacear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 613.

Polyosmaceae Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 17. p. 258: novus ordo plant., Alangiaceis aff. Gen.: Polyosma. *Cf.* Griseb. 1851. Arch. f. Nat. II. p. 366 et Walp. Ann. bot. II. p. 613.

Polyosmia Spach vid. *Polyosma Blume.*

Polyosus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 75: g. Tetrandr. Monogyn. (P. bipinnata et lanceolata.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 342. — Hedw. 1806. Gen. p. 371.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 374: g. Rubiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2007: g. Coffeacear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 185.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
= Polyozus Willd.

Polyothus „Nuttall" ex Decaisne in DC. Prodr. VIII. p. 521: vid. *seq.*

Polyotus Nuttall . . . . Amer. phil. trans. n. ser. V. p. 199.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 143: g. Asclepiear.
= Acerates Ell.

Polyotus**) Gottsche 1845 in Nees Syn. Hepat. p. 244: nov. g. Ptilidiear. (Jungermannia magellanica Lam.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 389.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 152: g. Hepaticar. foliosar.

*) „πολύ, multum; ὄζος, ramus."
**) πολύωτος, nomen generis ex auricularum numerositate depromtum.

Polyoxus A. Juss. vid. *Polyozus Willd.*

Polyozosia Massalongo 1855. Framm. lich. p. . . .: nov. g. Lichenum.

Polyozus Willd. 1793 in Lour. Fl. Cochinch. I. p. 94: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 9. 176. n. 452. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 421. n. 432. — Schult. 1827. Mant. III. p. 7.
Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 364: g. Rubiacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 947.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 a. n. 2120 b: g. Cephaëlidear.?
Spreng. 1830. Gen. I. p. 81. n. 396: g. Verbenear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 494: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 577. — Endl. 1838. Gen. n. 3157. p. 534; 1841. Ench. p. 272.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 430: g. Verbenacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2807: g. Psychotriear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 253 (*Polyoxus*).
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 299: g. Chasaliear.
Synon. Polyosus Lour.

Polypangium Walp. vid. *Tolypangium Endl.*

Polypappus Lessing 1829. Linnaea IV. p. 314; 1831. ibid. VI. p. 149; 1832. Syn. Compos. p. 204: nov. g. Baccharidear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 398. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3593. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Endl. 1838. Gen. n. 2409. p. 390; 1841. Ench. p. 236: g. Eubaccharidear.
Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128): g. Baccharear.

Polypara*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 61. Ed. Willd. p. 77: nov. g. Triandr. Trigyn. (P. cochinchinensis.)
= Houttuynia Thunb.

Polypera Ficin. 1808. Fl. Dresd. p. 306. t. 1. f. 51.
= Polysaccum DC.

Polypetalae Hill 1769. Hort. kew. p. 224: class. XIII. herbar. Typus: Sempervivum.

Polypetalae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I: div. Angiospermar. Subdivis.: Thalamiflorae, Calyciflorae.
Lindl. 1833. Nix. p. 13: subclass. Exogenar. Cohortes: Albuminosae, Gynobasicae, Epigynae, Parietales, Calycosae, Syncarpae, Apocarpae.

Polypetalae incompletae Hill 1769. Hort. kew. p. 360: class. XXVII. herbar. Typus: Trollius.

Polypetalae irregulares Hill 1769. Hort. kew. p. 318: class. XX. herbar. Typus: Monotropa.

*) Nomen a corolla multos flosculos producente.

Polypetaleae (*Les Polypétalées*) De la Marck 1785. Act. Ac. Paris. p. 443: prima classis plantar. Familiae: *les anones*, etc.

Polyphaceae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Polyphacum, Scaberia.
Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 54: fam. Algar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: trib. Floridear. Gen.: Polyphacum.

Polyphacum*) Agardh 1821. Spec. Alg. I. 1. p. 106 (Aphor. p. 101): g. Fucoidear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 44. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 781.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXVII. 274: g. Fucacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 327. — Endl. 1836. Gen. n. 117. p. 10; 1841. Ench. p. 8.
Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 511: g. Laminariacear.
Grev. 1830. Syn. p. 106.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Polyphacear. — Par. Sond. 1845. Bot. Zeit. p. 54; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 184. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55. 409.
Endl. 1843. Spl. III. p. 33. n. $122/_{15}$: g. Cystoseirear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Castraltiear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 879. n. 582: g. Delesseriear.
Synon. Osmundaria Lamx.

Polyphema**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 546. Ed. Willd. p. 666: nov. g. Monoec. Monandr. (P. Jaca et Champeden.)
= Artocarpus sect. Jaca Endl.

Polyphisa Lindl. vid. *Polyphysa Lamx.*

Polyphragmeae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 234: subtrib. Gardeniear. Gen.: Polyphragmon.

Polyphragmon Desfont. 1820. Mém. Mus. VI. p. 5. t. 2: nov. g. Rubiacear. (alt. seriei. — P. sericeum.) — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 399. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 295. n. 1555; 1830. Gen. I. p. 336. n. 1698. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 369. — Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 417. (Injungitur Axanthes timoriensis DC.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1407.
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2113: g. Hameliacear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 231.
Bartl. 1830. Ord. p. 211: g. Hedyotidear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 445: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 543. — Endl. 1838. Gen. n. 3233. p. 547; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2930.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.

*) *φακός*, lens.
**) „Nomen a gigantea bacca, cujus stamen unicum in mare et pistillum in foemina quasi monoculam faciunt."

Polyphragmon Desfont. cont.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 234: g. Polyphragmear.

Polyphyllon Lessing 1832. Syn. Compos. p. 143: subg. Trixidis. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 717 (*Polyphyllum*).
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 70: subsect. Eutrixidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2960 *b β*. p. 492; 1841. Ench. p. 249.

Polyphyllum Wittst. vid. *praeced.*

Polyphysa Lamx. 1816. Polyp. flex. p. 252.
Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 473; 1824. Syst. p. XXXII. 192: g. Ulvacear.? *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 370.
Menegh. 1838. Cenni p. 35: g. Siphonear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 678: g. Corallinear.?
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328 (Flora 1843. p. 93): g. Acetabulariear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 17. n. 44. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): g. Codiear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phyc. gener. p. 311: g. Polyphysear.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 29: g. Oliviear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19 (*Polyphisa*): g. Acetabularidar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 510. n. 328: g. Valoniear.

Polyphyseae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phycol. gener. p. 311; 1845. Phycol. germ. p. 254: fam. Coeloblastear. Gen.: Polyphysa, Acetabularia.
= Valoniear. Kütz. pars.

Polypilus Pers. 1822. Mycol. I. p. 110: sect. Thelephorae. (Helvella pannosa Sw. etc.) — Par. Leman 1828. Dict. v. 53. p. 444. — Bonord. 1851. Hdb. p. 162. (*Auricularia Grev.*)

Polyplacum „Berk." Bot. Zeit. 1843. p. 621: vid. *Polyplocium Berk.*

Polypleurum Tulasne 1852. Arch. Mus. VI. p. 114: sect. Dicraeae. (antea *Blandowia*, non Willd.)

Polyplocium*) Berkeley 1843. Lond. journ. bot. II. p. 202: nov. g. Lycoperdaceor. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 881.
Mont. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 80: g. Podaxinear.
L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 176: g. Secotiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Podaxineor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 439.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Polyporeor.

Polypodeae Link 1822. Enum. II. p. 456: ordo Filicum.
= Polypodiaceae R. Brown.

Polypodeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 79: subordo Polypodiacear. Gen. 148.

Polypodiaceae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 145. Ed. Nees p. 1: trib. Filicum. Gen.: Acrostichum, Notholaena, Grammitis, Polypodium, Aspidium, Nephrodium, Allantodia,

*) *πολύπλοκος*, multis cirris instructus.

Polypodiaceae R. Brown cont.
Asplenium, Doodia, Blechnum, Stegania, Vittaria, Pteris, Adiantum, Cheilanthes, Lindsaea, Davallia, Dicksonia, Alsophila, Trichomanes, Hymenophyllum. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 4. Gen. ex Polypodieis Endl. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 973. Gen. §. 1: Grammitis, Polypodium, Woodsia. §. 2: Aspidium, Polystichum, Cystopteris, Asplenium, Scolopendrium, Blechnum, Pteris, Adianthum. §. 3: Notholaena, Allosorus, Struthiopteris. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 278. Subtrib.: Cyatheaceae, Dicksonieae, Lindsaeeae, Pteroideae, Blechnoideae, Acrosticheae, Asplenieae, Polypodieae.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 4: div. Filicum (restricta). Gen.: Ceterach, Polypodium. — Par. J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 394; 1842. ibid. IV. p. 44. Trib.: Polypodieae, Acrostichieae, Pteridieae, Asplenieae, Aspidieae, Dicksonieae, Cyatheae.

Agdh. 1822. Aphor. p. 116; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: ordo Filicum. Gen. §. 1: Todea, Gleichenia, Platyzoma. §. 2: Polybotrya, Acrostichum, Hemionitis, Meniscium, Taenitis, Grammitis, Polypodium. §. 3: Pleopeltis, Aspidium, Onoclea, Struthiopteris, Lomaria, Asplenium, Darea, Scolopendrium, Diplazium, Pteris, Vittaria, Blechnum, Woodwardia, Lindsaea, Adiantum, Cheilanthes, Lonchitis, Davallia, Dicksonia, Cyathea, Trichomanes, Hymenophyllum. — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 55. Gen.: Polybotrya, Acrostichum, Hemionitis, Gymnogramma, Meniscium, Grammitis, Xiphopteris, Ceterach, Cochlidium, Polypodium, Niphobolus, Taenitis, Nothochlaena, Onoclea, Struthiopteris, Allosorus, Onychium, Hymenolepis, Leptochilus, Ellobocarpus, Lomaria, Blechnum, Sadleria, Woodwardia, Doodia, Asplenium, Allantodia, Darea, Scolopendrium, Diplazium, Didymochlaena, Pteris, Vittaria, Lonchitis, Monogramma, Antrophyum, Adiantum, Cheilanthes, Cassebeera, Lindsaya, Davallia, Saccoloma, Dicksonia, Balantium, Cibotium, Aspidium, Pleopeltis, Alsophila, Chnoophora, Woodsia, Hemitelia, Cyathea, Trichomanes, Hymenophyllum. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. Divis.: *indusiatae* (gen.: Hymenophyllum, Trichomanes, Alsophila, Chnoophora, Hemitelia, Cyathea, Davallia, Peranema, Saccoloma, Dicksonia, Balantium, Cibotium, Lecanopteris, Pleopeltis, Woodsia, Niphobolus; Adiantum, Cheilanthes, Cassebeera, Lindsaya, Pteris, Vittaria, Leptostegia, Lonchitis, Monogramma, Antrophyum, Darea, Asplenium, Scolopendrium, Didymochlaena, Diplazium, Allantodia, Aspidium, Allosorus, Onychium, Hymenolepis, Leptochilus, Ellebocarpus, Blechnum, Sadleria, Woodwardia, Doodia, Lomaria, Onoclea, Struthiopteris), *nudae* (gen.: Polobotrya, Acrostichum, Hemionitis, Gymnogramma, Meniscium, Grammitis, Taenitis, Notholaena, Xiphopteris, Ceterach, Cochlidium, Polypodium). — Endl. 1836. Gen. p. 59; 1841. Ench. p. 35. Subordines: Po-

Polypodiaceae R. Brown cont.
lypodieae, Cyatheaceae, Parkerieae. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 17. Trib.: Acrostichaceae, Polypodieae, Aspleniaceae, Aspidiaceae, Davalliaceae.

Presl 1825 in Reliq. Hänk. I. p. 14.

Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 261: trib. Gyratear. Subtrib.: Acrosticheae, Hemionitideae, Asplenieae, Aspidieae, Polypodieae, Cyatheae.

Rchb. 1828. Consp. p. 37; 1832. Fl. exc. p. L: fam. Thryptopteridum. Divis.: *indusiatae* (subdivis.: Hymenophylleae, Cyatheaceae, Aspidiaceae, Davalliaceae, Adiantheae, Pteroideae, Asplenioideae, Blechnoideae, Onocleaceae, Woodsieae), *nudae* (s. *Gymnopterides*. Gen.: Taenitis, Marginaria, Polypodium, Cochlidium, Ceterach, Xiphopteris, Selliguea, Grammitis, Meniscium, Gymnogramma, Hemionitis, Adenophorus?, Acrostichum, Polybotrya). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 27. Divis.: Hymenophylleae, Polypodieae, Amphibolocarpae.

Blume 1829. Fl. jav. fasc. III. IV. p. 11. *A. genuinae*. Gen.: Polybotrya, Acrostichum, Platycerium, Niphobolus, Nothochlaena, Taenitis, Antrophyum, Gymnogramme, Meniscium, Grammitis, Selliguea, Polypodium, etc.

Lindl. 1833. Nix. p. 36; 1847. Veg. kd. p. 78: ordo Filicalium. Subord.: Polypodeae, Cyatheae, Parkereae, Hymenophylleae, Gleicheneae, Schizaeeae, Osmundeae.

Meyer 1836. Chlor. hann. p. 673: fam. Epiphyllosporar. Divis.: *indusiatae* (gen.: Pteris, Asplenium, Scolopendrium, Aspidium, Blechnum, Struthiopteris), *nudae* (gen.: Polypodium, Ceterach).

Presl 1836. Pterid. p. 167: trib. Gymnosorear. Sect.: Struthiopterideae, Polypodieae, Lecanopterideae.

Genth 1836. Nass. I. p. 2. 18: ordo Filicoidear. Gen. ut Meyer et Cystopteris, Acropteris.

Link 1841. Fil. h. Berol. p. 33: ordo Epiphyllospermar. Subord.: Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Struthiopterideae, Dicksoniaceae, Davalliaceae, Pterideae, Aspleniaceae, Aspidiaceae, Vittariaceae, Dryopterideae, Grammariae, Taenitideae, Antrophyaceae, Notochlaenideae, Acrostichaceae.

Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330): subordo Filicum. Fam.: Acrosticheae, Grammitideae, Polypodieae, Taenitideae, Pterideae, Asplenieae, Aspidieae, Dicksonieae, Cyatheaceae, Hymenophylleae, Gleicheniaceae, Schizaeaceae. — Par. Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 14. Trib.: Cyatheae, Dicksonieae, Davallieae, Lindsaeeae, Pterideae, etc.

Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 372. Trib.: Stigmatosori, Mecosori, Neurosori, Nothochlaeneae, Acrosticheae, Taenitideae, Vittariaceae, Xiphopterideae.

Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 309: fam. Filicum. Gen.: Adiantum, Polypodium, Gymnogramma, Notochlaena, Ceterach, Cryptogramma, Pteris, Blechnum, Asplenium, Scolopendrium, Cystopteris, Woodsia, Cheilanthes, Aspidium, Struthiopteris.

Polypodiaceae R. Brown cont.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: trib. Filicum. Divis.: Acrosticheae, Taenitideae, Grammitideae, Polypodiaceae, Aspidieae, Asplenieae, Adianteae, Dicksonieae, Woodsieae.
Fée 1852. Gen. Filic. p. 35. Divis.: Cathetogyratae, Helicogyratae.
Conf. Gyratae Swartz, Filices verae Willd.

Polypodiacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 120: trib. Filicaceitum. Gen.: Strephopteris, Göppertia, Cyphopteris, Steffensia.

Polypodieae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 261: subtrib. Polypodiacear. Gen.: Pleopeltis, Adenophorus, Cyclophorus, Polypodium, Marginaria, Selliguea, Lastrea, Meniscium, Taenitis.
Presl 1836. Pterid. p. 176: sect. Polypodiacear. Gen.: Polypodium, Goniopteris, Pleocnemia, Amblia, Goniophlebium, Marginaria, Campyloneurum, Pleopeltis, Dictyopteris, Phymatodes, Psygmium, Niphobolus. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 28. Gen.: Polypodium, Polybotrya, Acrostichum, Hemionitis, Antrophyum, Gymnogramme, Grammitis, Synammia, Selliguea, Stegnogramme, Meniscium, Pleurogramme, Taenitis, Monogramme, Adenophorus, Ceratodactylis?, Notochlaena, Pleopeltis, Niphobolus, Lecanopteris, Calymmodon, Cheilanthes, Lonchitis, Adianthum, Cassebeera, Allosorus, Pteris, Jamesonia, Blechnum, Vittaria, Asplenium, Struthiopteris, Onoclea, Allantodia, Doodia, Woodwardia, Scolopendrium, Onychium, Diplazium, Didymochlaena, Sphaerostephanos, Nephrolepis, Nephrodium, Aspidium, Cystopteris, Acrophorus, Lindsaea, Davallia, Dicksonia, Paesia, Cibotium, Woodsia, Hymenocystis, Hypoderris, Diacalpe, Sphaeropteris. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693. Gen.: Struthiopteris, Polypodium, Goniopteris, Goniophlebium, Cyrtophlebium, Marginaria, Phlebodium, Dictyopteris, Niphobolus, Phymatodes, Dryostachyum, Lecanopteris.
Endl. 1836. Gen. p. 59: subordo Polypodiacear. Gen.: Acrostichum, Hemionitis, Antrophyum, Gymnogramme, Grammitis, Allosurus, Selliguea, Meniscium, Taenitis, Monogramme, Adenophorus, Notochlaena, Polypodium, Pleopeltis, Niphobolus, Cheilanthes, Lonchitis, Adiantum, Cassebeera, Pteris, Jamesonia, Blechnum, Leptochilus, Vittaria, Hymenolepis, Struthiopteris, Onoclea, Asplenium, Allantodia, Doodia, Woodwardia, Scolopendrium, Onychium, Diplazium, Didymochlaena, Nephrolepis, Nephrodium, Aspidium, Cystopteris, Lindsaea, Davallia, Dicksonia, Cibotium, Woodsia, Saccoloma, Diacalpe, Sphaeropteris. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1345; 1841. Ench. p. 35. Emittuntur Allosurus, Leptochilus, Hymenolepis, Saccoloma. Accedunt Cryptogramma, Stegnogramma, Sphaerostephanus, Ceratodactylis?, Lecanopteris, Calymmodon, Acrophorus, Hymenocystis, Hypoderris.

Polypodieae R. Brown cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 139: div. Pteroidear. Subdivis.: Gymnogrammeae, Adiantheae, Peranemaceae.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 394; 1842. ibid. IV. p. 44: trib. Polypodiacear. Sect.: *Orthophlebieae* (gen.: Monogramma, Pleurogramma, Grammitis, Polypodium, Struthiopteris, Ceratodactylis, Allosorus, Jamesonia, Notholaena, Gymnogramma, Leptogramma), *Symplophlebieae* (gen.: Stenosemia, Stegnogramma, Meniscium, Goniopteris, Synammia, Goniophlebium, Niphobolus, Cyrtophlebium, Phlebodium, Drynaria, Dryostachium, Aglaomorpha, Lecanopteris, Dictyopteris, Loxogramma, Selliguea, Diblemma, Drymoglossum, Taenitis, Pteropsis, Taeniopsis, Vittaria, Polytaenium, Antrophyum, Hemionitis, Ceratopteris). — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331). Gen.: Niphobolus, Pleopeltis, Polypodium, Lecanopteris, Calymmodon, Jamesonia. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 13. 25. Gen.: Monogramme, Vaginularia, Vittaria, Antrophyum, Platycerium, Taenitis, Polypodium, Aglaomorpha, Lecanopteris, Ceratopteris, Gymnogramme, Ceratodactylis, Cryptogramma, Allosorus, Notholaena, Adiantum, Cheilanthes, Pteris. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 282.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 37. 229: trib. Cathetogyratar. Gen.: Plectopteris, Cryptosorus, Grammitis, Polypodium, Phegopteris, Goniopteris, Goniophlebium, Campylonevron, Lecanopteris, Niphobolus, Craspedaria, Chrysopteris, Aglaomorpha, Dictyopteris, Microsorium, Drynaria, Pleuridium, Dipteris, Dryostachyon.
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 18: trib. Filicum. Gen.: Davallia, Lindsaea, Adiantum, Hypolepis, Cheilanthes, Pteris, Lomaria, Asplenium, Doodia, Polystichum, Nephrodium, Goniopteris, Polypodium, Phymatodes, Dictymia, Arthropteris, Niphobolus, Grammitis, Gymnogramma, Notholaena, Stenochlaena.

Polypodioides „Stackh." Endl. Gen. Suppl. III. p. 24 in synon. Halyseridis: vid. *Polypodoidea Stackh.*

Polypodiolithes Sternb. Fl. protog. p. 44. t. 33. f. 1. (ex Endl.)
= Palaeozamia Endl.

Polypodites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 338: g. Pecopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 92; 1846. Chlor. prot. p. XLVII. 121. t. 136.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 79: g. Filicum foss.
Synon. Lonchopteris Brongn.; Steffensia Sternb.; Phlebopteris Brongn. sp.; Dictyophyllum Lindl.

Polypodium*) Tourn. 1700. Inst. p. 540. t. 316: g. pl. class. XVI, ab Auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 325. Ed. Hall. 1745. p. 346: g. Epiphyllospermar. — Par. Hall.

*) πολυπόδιον Graecorum = Filix.

Polypodium Tourn. cont.
1742. En. stirp. Helv. I. p. 137. — Wigg. 1780. Holsat. p. 74. — Mart. 1817. Erlang. p. 3.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 195. t. 86. 87.
Linn. 1737. Gen. p. 322. n. 784; 1737. Cliff. p. 474; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1082; 1759. Syst. ed. X. p. 1324. n. 1043; 1763. Sp. ed. II. p. 1542; 1764. Gen. ed. VI. p. 560. n. 1179; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 691: g. Filicum. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Adans. 1763. Fam. II. p. 20. — Hill 1769. Ht. kew. p. 427. — Scop. 1772. Carn. II. p. 293. — Murr. 1774. Syst. p. 785; 1784. Syst. p. 934. — Reich. 1778. Gen. p. 556. n. 1296. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 335. — Juss. 1789. Gen. p. 15. — Lour. 1790. Coch. II. p. 673. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 757. n. 1632. — Gmel. 1791. Syst. p. 1304. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Mönch 1794. Meth. p. 725. — Pers. 1797. Syst. p. 975. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 63. — Smith 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 97. (dorsiferar.) — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 4. 18 (annulatar.); 1806. Syn. p. 25. (gyratar.) — Roth 1800. Germ. III. p. 40. (annulatar.) — Rich. 1803 in Michx. Fl. am. II. p. 271. Sejunguntur Nephrodium, Cyathea, Hypopeltis. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 44. — DC. 1805. Franç. II. p. 564; 1815. V. p. 242. — Willd. 1809. En. p. 1068; 1810. Sp. V. p. 144. n. 1960. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 249. — Leman 1826. Dict. v. 42. p. 399. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 668. (dorsiferar.) — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 45. n. 3243; 1831. Gen. II. p. 721. n. 3635. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 225. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 324. (verar.)
Gled. 1764. Syst. p. 288. n. 1172: g. Filicinar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 454: g. Filicear.
Scop. 1777. Intr. p. 63: g. Dorsiferar.
Neck. 1790. El. III. p. 314. n. 1717: g. Sphaeroophytor. Segregantur Gleichenia et Psidopodium.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 4: g. Annulator.
Batsch 1802. Tab. p. 262: g. Filicinor.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 23: g. Cathetogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 146. Ed. Nees p. 2: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 6. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 4. — Kunth 1822. Syn. I. p. 70; 1838. Berol. II. p. 414. — Agdh. 1822. Aphor. p. 116. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 87. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 20. — D. Don 1825. Nepal. p. 1. — Blume 1829. Fl. jav. fasc. III. IV. p. 128; 1830. En. pl. Jav. II. p. 120. Sect.: Polypodium, Atactosia. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (nudar.) — Endl. 1833. Norf. p. 7. — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 36. — Meyer 1836. Chlor. hann. p. 680. (nudar.) — Genth 1836.

Polypodium Tourn. cont.
Nass. I. p. 20. — Brongn. 1843. En. genr. p. 4. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 974. (nudar.) — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 310. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 508. (indusiatar.) — Math. 1853. Belg. II. p. 11.
Link 1822. En. II. p. 457: g. Polypodear.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 345: g. Polypodiear. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 60. n. 615. Sect.: Lastraea, Dicranopteris, Ctenopteris, Aglaomorpha, Goniophlebium, Drynaria. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1346; 1841. Ench. p. 36. Sect.: Eupolypodium, Goniopteris, Pleocnemia, Amblia, Gonophlebium, Marginaria, Cyrtophlebium, Phlebodium, Dictyopteris, Phymatodes, Aglaomorpha. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. Sect. ut Endl. 1841. — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331). Sect. similes. — Webb 1850. Canar. III. p. 453. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 40. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 30. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 627. (nudar.) — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 283.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 723: g. Gymnopteridum. Sect.: Dipteris, Drymaria, Lastrea.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Wallr. 1831. Krypt. I. p. 12: g. Phyllopteridum.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 126: g. Dryopteridear.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 373: g. Stigmatosoror. Sect.: Eupolypodium, Goniopteris, Goniophlebium, Anaxetum, Campyloneurum, Euphlebodium, Pleopeltis.

Polypodium Presl 1836. Pterid. p. 176: g. restrict. Polypodiear. Sect.: Ctenopteris, Phegopteris. — Par. J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 46. Sect. eaed. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear. = Eupolypodium Endl.

Polypodium Fée 1852. Gen. Fil. p. 234: g. Polypodiear., ulterius restrict. (Polypodii Presl sect. 1.)
Synon. Glaphyropteris Presl.

Polypodoidea Stackh. 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 96. 97: nov. g. Fucor. (P. membranacea.)
= Haliseris Targ.

Polypogon Desfont. 1800. Fl. Alt. I. p. 66: nov. g. Triandr. Digyn. — Par. Willd. 1801. Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 441; 1809. En. p. 87. — Pers. 1805. Ench. I. p. 50. n. 155. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 192. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 50. — Trin. 1820. Agrost. p. 101. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 497. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 67. 193.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 72: g. Graminear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 5. — Hedw. 1806. Gen. p. 38. n. 177. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 173. Ed. Nees p. 29. — Palis. 1812. Agrost. p. 17. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 15. 325. n. 223. — Link 1821. En. I. p. 29; 1829.

Polypogon Desfont. cont.
Hdb. I. p. 29. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 242. n. 251. — Lois. 1826. Dict. v. 42. p. 408.
Panzer 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 278. (Revis. crit.)
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 134; 1822. Syn. I. p. 202; 1830. Gram. p. 72; 1833. Agrost. p. 232: g. Agrostidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 147. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 152. — Agdh. 1823. Aphor. p. 147. — Link 1827. Hort. I. p. 75. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 24. — Endl. 1837. Gen. n. 813. p. 90; 1841. Ench. p. 58. — Koch 1837. Syn. p. 780. Ed. II. p. 901. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 436. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 29. — Meisn. 1843. Gen. p. 420 (321). — Brongn. 1843. En. genr. p. 8. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 139. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 460; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 443. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 489. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 378.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 674): g. Agrostideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 900: g. Cinnear.
Ledeb. 1829. Alt. I. p. 84: g. Graminum. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 57. n. 282.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 405: g. Agrostear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1180. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 380. — Steud. 1854. Glum. I. p. 183 (injuncta Nowodworskya).
Dietr. 1839. Syn. I. p. 325. 320: g. Agrostoidear.
Trin. 1841. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 253: g. Agrosteor.
Synon. Santia Savi.

Polypompholyx*) Lehm. 1844. Bot. Zeit. p. 109; 1845. Pl. Preiss. I. p. 340: nov. g. Utriculariear. *Cf.* Flora 1844. p. 82. — Par. Benj. 1847. Linnaea XX. p. 316. 496; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. IX. p. 251.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 686: g. Lentibulariacear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 439: g. Lentibulariear.
Synon. Tetralobus A. DC.

Polyporeae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 327: sect. Agaricear. Gen.: Boletus, Polyporus, Dedalea.

Polyporei Fries 1825. Pl. homon. p. 79: subordo Pileator. Gen.: Boletus, Polyporus, Daedalea, Merulius, Porotheleum.
Rchb. 1828. Consp. p. 14: div. Hymeninor. Gen. ead.
Endl. 1836. Gen. p. 39; 1841. Ench. p. 21: trib. Pileator. Gen. ut Fries. Accedit 1842 (Spl. II. p. 103) Aschersonia.
Fries 1838. Epicr. p. 408. 603: ordo Hymenomycetum. Gen.: Boletus, Polyporus, Trametes, Daedalea, Cyclomyces, Hexagona, Favolus, Laschia, Merulius, Porothelium. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 315. Gen. ead. et Gloeoporus, Theleporus.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 49: fam. Hymenomycetum. Gen.: Boletus, Polyporus. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 169. Gen.: Porothelium, Merulius, Hexagona, Fistulina, Cyclomyces, Favolus, Daedalea, Trametes, Polyporus, Boletus. — Bail 1858. Syst. p. 24. Gen. ead. excepto primo.
Rchb. 1841. Nom. p. 12: subdiv. Agaricinor. Gen. ut Fries 1838 (emissa Laschia).
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. CVI. 178: fam. Basidiophoror. Gen.: Fistulina; Boletus, Polyporus, Porothelium, Ceriomyces, Favolus, Hexagona, Trametes, Dedalea, Cyclomyces, Epichysium, Laschia, Merulius.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 234: fam. Tetrasporideor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 412: subsect. Pileator. Gen. ut Endl. et Fistulina, Trametes.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: subordo Hymenomycetum. Gen. ut Fries 1838 et Glaeoporus, Epichysium.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: sect. Idiomycetum. Gen.: Boletus, Fistulina; Secotium, Polyplocium; Hymenogramme, Daedalea; Polyporus, Trametes, Gloeoporus; Junguhnia, Favolus, Hexagona.

Polyporites Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. I. n. 65.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 18; 1846. Chlor. prot. p. XXIX: g. Fungor. foss.

Polyporus Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 129. t. 70. 71: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 25: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 10: g. Fungor.
Scop. 1777. Intr. p. 361: g. Fungoidear.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 549: sect. Boleti.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 645: g. Boletidear. = Polypori Fries pars.

Polyporus Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 121; 1818. II. p. 253: g. Fungor. emend. Sect.: Peltea (1818 Mesopus), Labeum, Acopus, Poria. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 411.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 341; 1828. Elench. I. p. 72: g. Pileator. Subgen.: Favolus, Microporus, Polysticta. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 763. n. 3898.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 578: g. Agaricear.
Pers. 1825. Myc. eur. II. p. 35: g. Porodermeor. Sect.: Platyporus, Microporus, Poria, Cladoporus.
Fries 1825. Pl. homon. p. 79; 1838. Epicr. p. 427; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 135; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 318: g. Polyporeor. Sect. (1838): Mesopus, Pleuropus, Merisma, Apus. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 338. Sect.: Resupinatus, Apus, Merisma, Pleuropus, Mesopus, Polysticta. — Endl. 1836. Gen. n. 447. p. 39; 1841. Ench. p. 21. Sect.: Polysticta (1836 sphalm. *Polystica*), Poria, Agaricon,

*) πόμφολυξ, vesica.

Polyporus Fries cont.
Cladoporus, Microporus, Platyporus, Scenidion. — Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 50; 1842. V. p. 42. 83; 1842. Mycol. p. 180. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 75; 1842. Pl. cell. Cub. p. 387. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 482. Sect. ut Endl. — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 235. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 416. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 487. — Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 46. Series vel subgenera: Eupolyporus, Fomes, Poria. *Cf.* Linnaea 1852. p. 682. — Bonord. 1851. Hdb. p. 172. — Bail 1858. Syst. p. 27.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 580: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Math. 1853. Belg. II. p. 333: g. Polyporear. Sect.: Milleporus, Pleuropus, Merisma, Retiporus, Poria, Favolus.

Polyprema Scopoli 1777. Introd. p. 137: gens Epicarpiar. Gen.: Morina, Fedia, Valeriana, Boerhavia.

Polypremnus Beckm. vid. *seq.*

Polypremum*) Linn. 1741. Act. soc. Ups. p. 78; 1753. Sp. I. p. 111; 1759. Syst. ed. X. p. 894. n. 128; 1762. Sp. ed. II. p. 161; 1764. Gen. ed. VI. p. 56. n. 137; 1767. Syst. ed. XII. p. 121: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 130; 1784. Syst. p. 153. — Reich. 1778. Gen. p. 57. n. 143. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 74. n. 178. — Gmel. 1797. Syst. p. 248. — Pers. 1797. Syst. p. 159; 1805. Ench. I. p. 134. n. 272. — Willd. 1797. Sp. I. p. 623. n. 213. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 95.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
Gled. 1764. Syst. p. 169. n. 690: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 294. t. 62. f. 2 (procumbens).
Juss. 1789. Gen. p. 122: g. Scrophulariis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 9. n. 617: g. Darinyphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 282. — Hedw. 1806. Gen. p. 58. 369. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 430.
Juss. 1806. Ann. Mus. V. p. 255.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 838; 1825. Syst. I. p. 428. n. 447: g. Caryophyllear. anomalar.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 6. 150. n. 435: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 382.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2045: g. Cinchonear.

*) πρέμνος, stipes, caudex, quare Beckmann 1801. Lex. bot. p. 178 scribendum asserit: *Polypremnus.*

Polypremum Linn. cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 85. n. 418: g. Gentianear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 443.
DC. 1830. Pr. IV. p. 434: g. Hedyotear.? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 536. — Endl. 1838. Gen. n. 3241. p. 550; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 160 (115). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2876. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 56.
Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 105: g. Scrophularinar., Scopariae proximum.
Hook. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 174: g. Veronicear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374: g. Hedyotidear.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 45: g. Loganiear.? *Cf.* Endl. Spl. II. p. 53 et A. DC. Pr. IX. p. 12.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 434: g. Buddleiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Buddleear.
Synon. Symphoranthos Mitch.; Cleyera Adans.

Polypremum Adans. 1763. Fam. II. p. 152: g. Scabiosar.
= Valerianella Mönch.

Polypteris Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 139: nov. g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 17: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2595; 1841. Nom. p. 83. n. 3187. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 265; 1830. v. 60. p. 575: g. Hymenopappear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
DC. 1836. Pr. V. p. 659: g. Euheleniear. (antea [V. p. 124] suadente Less. ad Palafoxiam Lag. relatum.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2594. p. 422; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133).
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 369: sect. Palafoxiae. (Paleolaria fastigiata DC.)

Polypteris Lessing 1831. Linnaea VI. p. 518: g. Galardiear.
= Cercostylos Less.

Polyraphis Trinius vid. *seq.*

Polyrhaphis Trinius 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 91 (*Polyraphis*): sect. Pappophori. — Par. Kunth 1833. Agrost. p. 255. — Endl. 1837. Gen. n. 830 *b.* p. 92; 1841. Ench. p. 58. — Steud. 1854. Glum. I. p. 200.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Pappophorear.

Polyrrhaphis Wittst. Etym. Handw. p. 718: vid. *praeced.*

Polysaccei Léveillé 1849 in Orb. Dict. (VII. p. 505: trib. Lycoperdacear.) VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen.: Polysaccum, Scoleiocarpus.

Polysaccum (Desp. & DC. Rapp. voy. bot. I. p. 8) DC. 1815. Fl. franç. V. p. 103: nov. g. Angiocarpor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 432.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar.

Polysaccum DC. cont.
IV. p. 86. — Fries 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 139.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Geoperdinear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 135; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 51; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 444: g. Sclerodermeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 330. p. 28; 1841. Ench. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 391. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 293.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 872: g. Pyrenomycetum astomor.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 24; 1842. V. p. 25. 63; 1842. Mycol. p. 102: g. Pisocarpiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.
Lév. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 131. Char. emend.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; VIII. p. 488: g. Polysacceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 238: g. Pisocarpiaceor.
Synon. Pisolithus Alb. & Schw.; Pisocarpium Link; Pisomyces Fries; Eudacinus (Endacinus?) Raf.; Polypera Ficin.; Ciliciocarpus Corda.

Polyscalis*) Wallich 1832. Catal. n. 6939. 6940: nov. g. Desmochaetear.? non descriptum. *Cf.* Endl. Gen. p. 303 et Meisn. Comm. p. 231. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6415.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 329: sect. Cyathulae.

Polyschidea**) Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 53. 65: nov. g. Fucor.
= Laminariae Lamx. pars.

Polyschismium Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 20; 1842. Anl. Mycol. p. 81: nov. g. Physareor. (Leangium Trevelyani.) — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489 (*Polychysmium*). — Bonord. 1851. Hdb. p. 214.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.

Polyschistis***) Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. 294. t. 41: nov. g. Eragrostidear. *Cf.* Flora 1830. II. Erg. Bl. p. 101.
Kunth 1833. Agrost. p. 283: g. Chloridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 852. p. 95; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 336. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1326. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 217.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 384: g. Gymnopogonear.

Polycias†) Forst. 1776. Char. gen. p. 63. t. 32: nov. g. Octandr. Pentagyn.
Scop. 1777. Intr. p. 108: g. Umbelliferis aff.
Juss. 1789. Gen. p. 218: g. Araliar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 43.

Polyscias Forst. cont.
Lam. 1804. Dict. V. p. 559. (Ill. t. 320.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 463: g. Araliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 288. n. 1155. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 433. — Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3785. — Bartl. 1830. Ord. p. 238. — DC. 1830. Pr. IV. p. 257. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 388. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 213. — Endl. 1839. Gen. n. 4556. p. 794; 1841. Ench. p. 393. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 325. n. 1657: g. Araliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1329. — Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5546.

Polyscutalum Riess 1853. Bot. Zeit. p. 138: nov. g. Dematiaceor.

Polysiphonia Greville 1824. Fl. Edinens. p. 308.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 348. n. 3416; 1831. Gen. II. p. 752. n. 3814: g. Confervinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 485: g. Ceramiacear.
Duby 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 334; 1833. ibid. VI. p. 9: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 69. p. 6; 1841. Ench. p. 4. — Menegh. 1838. Cenni p. 32. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 402; 1841. Brit. Alg. p. 84. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 169; 1842. Pl. cell. Cub. p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 706. — Math. 1853. Belg. II. p. 486.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 81: g. Myclothamnior.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 29; 1842. Alg. medit. p. 119: g. Rhodomelear. Series: Oligosiphonia, Polysiphonia. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 44. n. $122/_{57}$. Sect. caed. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 125. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 180 (sect. ut J. Agdh.); 1852. Linnaea XXV. p. 701. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 157. Sect. caed. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 265. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54. 411.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): g. Rytiphlear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phyc. gener. p. 416: g. Polysiphoniear. Sect.: Calliptera, Herposiphonia, Stenosiphonia, Platysiphonia, Coelosiphonia. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 312; 1849. Sp. Alg. p. 802. n. 545. Sect. caed. et Botryoclonia, Heterosiphonia, Dasyclonia.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 30; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 227: g. Rhodomelacear. Subgen. ut Agdh.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 345: g. Floridear.
Synon. Hutchinsia Agdh.; Grammita Bonnem.; Lamourouxia Bonnem.; Corradoria Mart.; Broussonetia Grat.; Vertebrata

*) *σκαλίς*, ligo, pala.
**) *σχίδη* s. *σχίδος*, assula, scindula.
***) *σχιστός*, fissus.
†) *σκία*, umbella.

Polysiphonia Grev. cont. Gray; Dicarpella, Brongniartella et Grateloupella Bory; Lophyros Targ. pt.

Polysiphonia J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 141: series Polysiphoniae. — Simil. Endl. 1843. Spl. III. p. 46. n. $122/_{57}$ *B*. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 180. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 166.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 45; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 230: subg. Polysiphoniae.

Polysiphonieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phycol. gener. p. 416; 1845. Phycol. germ. p. 312: fam. Axonoblastear. Gen.: Polysiphonia, Helicothamnion, Halopitys, Digenea, Bryothamnion, Physcophora, Alsidium. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 802. Gen. ead. (Bostrychia loco Helicothamnii) et Trigenea, Bonnemaisonia.

Polysolenia Ehrenb. 1839. Ges. nat. Fr.; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 216: g. Bacillarior.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 169. n. 124: g. Desmidiear.

Polyspatha Benth. 1849. Niger Fl. p. 543: nov. g. Commelynear. (P. paniculata.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 660: g. Commelynacear.

Polysperma Vauch. 1803. Conferv. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 42. p. 434.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 104: g. Polyspermear.
= Confervae Fries et Lemaneae Bory sp.

Polyspermae Batsch 1802. Tab. affin. p. 192: ordo Monopetalar. Fam.: Personatae, Luridae.

Polyspermeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 104: trib. unica Angiothalamar. Gen.: Polysperma.

Polyspia Rafin. 1830. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: ordo 2 Corisantheriae. Subord.: Philisodia, Isomisia.

Polyspora Sweet . . . . Hort. brit. p. 61.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 574: g. Gordoniear. (Camellia axillaris Roxb.)
Meisn. 1837. Gen. p. 41 (30): g. Ternströmiacear.
= Closaschima Korth.?

Polystachia Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 70: sect. Ischaemi.

Polystachya Hook. . . . . Exot. Fl. t. 103. *Cf.* Flora 1825. Erg. Bl. p. 31.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 742. n. 3034: g. Orchidear.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530): g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1491.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 72: g. Dendrobiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1366. p. 192; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1956. — Meisn. 1842. Gen. p. 370 (278). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176 (*Polystachyia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Polystachyia Spach vid. *praeced.*

Polystegia Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1248 *a;* 1841. Nom. p. 44. n. 1607. 1: sect. Haemanthi. — Par. Römer 1847. Fam. nat. III. p. 8. 38.

Polystema Rafin. . . . .: g. Fungor., teste Leman 1826. Dict. v. 42. p. 435.

Polystemma Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 602: nov. g. Gonolobar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Gonolobear.

Polystemon Don . . . . Edinb. n. phil. journ. IX. p. 95.
= Belangera Camb.

Polystemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 57: vid. *Plantae All.*

Polystica Endl. vid. *Polysticta Fries.*

Polystichites „Presl“ Sternb. 1838. Vers. II. p. 117: nov. g. Aspidiacitum.
= Pecopteris Brongn.

Polystichum*) Roth 1797. Tent. fl. germ. III. p. 69: nov. g. Filicum. (annulatar. — Polypodium Filix mas, Lonchitis L., etc.) — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 298. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 8. 57. — DC. 1805. Franç. II. p. 559; 1815. V. p. 241. — Leman 1826. Dict. v. 42. p. 435.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 324: g. Aspidiear. — Par. J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 412; 1842. ibid. IV. p. 195. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Presl 1836. Pterid. p. 82: g. Aspidiariar.
Endl. 1836. Gen. p. 62. n. 640 *b;* 1841. Spl. I. p. 1349. n. 640 *a;* 1841. Ench. p. 37: sect. Aspidii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1028. 1. — Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334). — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 323. — Webb 1850. Canar. III. p. 436.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 110: g. Aspidiacear.
Koch 1845. Syn. ed. II. p. 977: g. Polypodiacear. (indusiatar.) — Par. Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 513. — Math. 1853. Belg. II. p. 12.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 277: g. Cyclodiear.
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 630. (indusiatar.)
Synon. Tectaria Cav.; Rumohra Raddi; Hypopeltis Rich.

Polysticta**) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 384; 1828. Elench. I. p. 123: subg. Polypori.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 338 *f;* 1841. Nom. p. 12. n. 482. 1: sect. Polypori. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 447 *a.* p. 39 (*Polystica*); 1841. Ench. p. 21.
Synon. Mison Adans.

Polystictus Fries 1851. Nov. Act. Upsal. ser. tert. I. 1. p. 70: nov. g. Polyporeor., a Polyporo disjunctum. Stirpes: perennis, sacri, discipedis, prolificantis, funalis, stuposi, coriacea, membranacea, resupinata. *Cf.* Flora 1852. p. 682.

---

*) στίχος, ordo.
**) στικτός, punctatus.

Polystigma DC. 1815. Fl. franç. V. p. 164: nov. g. Hypoxylor. (Xyloma rubrum Pers.)
DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 316. 330: g. Xylomor. *Cf.* Dict. sc. n. v. 59. p. 163.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: g. Xylomear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Sphaeriacear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 553: sect. Xylomatis.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 176. 181: g. Sphaeriaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Leman 1826. Dict. v. 42. p. 441: g. Hypoxylear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 773. n. 3973: g. Atrichor.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 29: g. Pyrenomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 288: g. Dothideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 31; 1842. Mycol. p. 128: g. Sphaeronemear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 164: g. Dothidinar.
Bonord. 1851. Hdb. p. 55: g. Aecidiaceor.
= Dothidea Fries?

Polystigma Meisn. 1839. Gen. pl. vasc. p. 252 (161): nov. g. Aquifoliacear. (Ilex? anomala Hook. & Arn.)
= Byronia Endl.

Polystoma Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 566. 586: nov. g. Lycoperdonidear. (Geastrum coliforme Pers.)
= Myriostoma Desv.

Polystorthia*) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VIII: g. Rosacear., antea *Polydontia Blume.*
= Pygeum Gärtn.

Polystroma Leman vid. *Polistroma.*

Polytaenia DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 53. t. 13; 1830. Prodr. IV. p. 196: nov. g. Peucedanear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 345. — Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5479. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4479. p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Walp. 1843. Rep. II. p. 416. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 633.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 791. n. 4103: g. Smyrniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Polytaenium Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 174. 218 (sph. *Polyaetnium*): nov. g. Filicum. (Vittaria lanceolata Sw.)
Endl. 1836. Gen. n. 605 c. p. 59; 1841. Ench. p. 36: sect. Antrophyi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 989. 3.
J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 68: g. Polypodiear.
Meisn. 1843. Gen. p. 431 (332): g. Taenitidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: g. Grammitidear.

*) στόρθη, cuspis, dens.

Polytaxis Bunge 1843. Del. sem. h. Dorp. p. VIII; 1844. Linnaea XVIII. p. 156; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 370: nov. g. Carlinear. (P. Lehmanni.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 290.

Polythrincium*) Kunze 1817. Mykol. Heft. I. p. 13. t. 1. f. 8: nov. g. Fungor. (P. Trifolii.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Parasporior.
Link 1824. Spec. I. p. 43: g. Hyphomycetum. — Par. Leman 1826. Dict. v. 42. p. 445. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 88.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 536: g. Botrytidear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 188: g. Sporomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 101.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 367: g. Dematieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 234. p. 20; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 204. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 161: g. Asporomycetum rhizomorphor.
Corda 1837 in Sturm Flor. Fung. III. p. 17. t. 9.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 15; 1839. III. p. 10; 1842. V. p. 10; 1842. Mycol. p. 37: g. Helminthosporiacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 115: g. Rhacodieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 504 (*Polytrinchium*): g. Toruleor.
Math. 1853. Belg. II. p. 466: g. Botrydear.

Polythrix „Duby" Mont. 1840 in Webb Phyt. Canar. IV. p. 24: sect. Polytrichi.

Polythrix Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 285: nov. g. Aphelandrear. (Barleriae sp. Boj.)

Polythysania**) Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 209: nov. g. Hypocyrtear. (P. parviflora.)

Polytoca R. Brown 1838 in Horsf. Pl. Jav. rar. p. 20. t. 5: nov. g. Paniceár., Tripsaco et Chionachni aff.
Endl. 1841. Spl. I. n. 743/3. p. 1353; 1841. Ench. p. 56: g. Phalaridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1242. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 10.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 475: g. Maydear.

Polytomium Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 108: grex Philodendri. (Ph. lacerum Sch.)

Polytrichaceae Bruch, Schimp. & Gümp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 21. 22: fam. Muscor. Gen.: Atrichum, Oligotrichum, Psilo-

**) θριγκός, cymatium.
***) θύσανος, fimbria.

Polytrichaceae Bruch cont.
pilum, Pogonatum, Polytrichum, Cephalotrichum.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 191: subtrib. Mnioidear. Gen.: Catharinea, Polytrichum, Dawsonia, Lyellia.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 233: sect. Stegocarpor. Gen.: Catharinea, Polytrichum.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 367: trib. Acrocarpor. Gen.: Polytrichum.

Polytrichadelphus C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 201: sect. Catharineae.
Synon. Cyphoma Hook. & Wils.

Polytricheae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: sect. Muscear. Gen.: Polytrichum, etc.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 44: fam. Muscor. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 23. (frondosor.) Gen.: Atrichum, Pogonatum, Polytrichum.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90: div. Bryacear. Gen.: Polytrichum, Oligotrichum, Atrichum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: trib. Acrocarpor. Gen.: Lyellia, Dawsonia, Polytrichum.

Polytrichoidea Rchb. 1828. Consp. p. 36: subdiv. Acrocarpior. Gen.: Diphyscium, Dawsonia, Lyellia, Psilopilum, Catharinea, Pogonatum, Polytrichum.

Polytrichoideae R. Brown 1819. Linn. Trans. XII. 2. p. 565 (Verm. bot. Schr. II. p. 712): fam. Muscor. Gen.: Lyellia, Polytrichum, Dawsonia.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 320: trib. 12 Muscor. Gen. ead.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 11 Muscor. Gen.: Lyellia, Polytrichum.

Polytrichoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Polytrichum, Pogonatum, Catharinea, Psilopilum, Lyellia. *Affinia:* Buxbaumia, Diphyscium, Dawsonia.

Polytrichon Dillen. 1719. Nov. gen. t. 2.
Adans. 1763. Fam. II. p. 492: g. Muscor. = Polytrichum Dill.

Polytrichum*) Dillen. 1719. Nov. pl. gen. p. 85; 1741. Hist. musc. p. 419. t. 54. 55: nov. g. Muscor. — Par. Linn. 1737. Gen. p. 323. n. 786; 1737. Cliff. p. 476; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1109; 1759. Syst. ed. X. p. 1332. n. 1055; 1763. Sp. ed. II. p. 1573; 1764. Gen. ed. VI. p. 563. n. 1192; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 700. — Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 106. — Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Neck. 1771. Meth. musc. p. 119. 258 (plumulascentium). — Scop. 1772. Carn. II. p. 308. (calyptrator.) — Murr. 1774. Syst. p. 795; 1784. Syst. p. 946. — Reich. 1778. Gen. p. 559. n. 1309. — Hedw. 1782. Fund. p. 90; 1801. Spec. p. 88. (frondosor.) — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 342. — Juss. 1789. Gen. p. 11. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 762. n. 1660. — Gmel. 1791. Syst. p. 1326. — Mönch 1794. Meth. p. 735. — Pers. 1797. Syst. p. 986. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 52. — Roth 1800. Germ. III. p. 346. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 14. 133. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 293. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 32. — DC. 1805. Franç. II. p. 435; 1815. V. p. 224. (Sejungitur Oligotrichum.) — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 71. — Mart. 1817. Erlang. p. 78. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 719. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Leman 1826. Dict. v. 42. p. 445. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 174. n. 3319; 1831. Gen. II. p. 732. n. 2713. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 194. (odontostomor.) Sect.: Oligotrichum, Dorcadia, Adianta. — Math. 1853. Belg. II. p. 21. Sect.: Polytrichum DC., Oligotrichum.
Gled. 1764. Syst. p. 294. n. 1193: g. Muscosar. (calyptratar.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 450.
Scop. 1777. Intr. p. 358: g. Muscoidear.
Neck. 1790. El. III. p. 330. n. 1742: g. Phryganophytor. Disjungitur Ymnitrichum.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 23: g. Calyptrator.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 158; II. 1. p. 80; 1806. Spl. I. p. 47: g. Aploperistomator.
Menz. 1798. Linn. Trans. IV. p. 63. 303. *Cf.* Schrad. Journ. 1799. II. p. 388.
Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 37: g. Mitrocarpor.
R. Brown 1819. Linn. Trans. XII. 2. p. 566 (Verm. bot. Schr. II. p. 712): g. Polytrichoidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 320. Sect.: Polytrichum, Oligotrichum. — Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 84.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 194: g. Epistomor. Peristomor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: g. Polytrichear. — Par. Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 44. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 23 (sect.: Polythrix, Pogonatum); 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400; X. p. 413. Subgen.: Lipotrichum, Catharinea, Oligotrichum, Pogonatum, Psilopilum. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 94. Subgen.: Atrichum, Oligotrichum, Psilopilum, Cyphoma, Phalacroma, Pogonatum, Polytrichum.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 736: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 212.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 520: g. Acrocarpor. Diploperistomor. Sect.: Adianta, Docradia.
Endl. 1836. Gen. n. 560. p. 54; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear. Sect.: Polytrichum, Pogonatum, Catharinea. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 47.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 938: g. Calyptrobryor. Sect. ut Endl.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 235: g. Polytrichacear. Sect.: Pogonatum, Polytrichum. — Par. C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 202.

*) Nomen ex Plinio.

Polytrichum Dillen. cont.
(emend.) Sect.: Aloidella, Cephalotrichum, Pogonatum, Catharinella, Eupolytrichum. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 367. Sect. ut Endl. et Oligotrichum.
Synon. Polytrichon Dill., Adans.; Ymnitrichum Neck.?

Polytrichum Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 40; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 461: g. Hymenodum, sejunctis Atricho et Pogonato restrict. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 228.
Röhl. 1814. Ann. Wett. Ges. III. 2. p. 212: g. Aploperistomator.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 134: g. Acrocarpor. peristomor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Polytrichoideor. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 671.
Endl. 1836. Gen. n. 560 *a*. p. 54; 1841. Ench. p. 32: sect. Polytrichi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 938. 3. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 236.
Bruch, Schimp. & Gümp. 1844. Bryol. eur. IV: g. Polytrichacear.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90: g. Polytrichear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 24.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 96: subg. Polytrichi.
= Eupolytrichum C. Müll.

Polytrinchium Fries vid. *Polythrincium Kunze.*

Polytropia*) Presl 1830. Symb. I. p. 21. t. 12: nov. g. Galegear. (P. ferulaefolia. — An Psoralea prostrata Linn.?) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 6 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 360. — Par. Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 245. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (62). — Endl. 1840. Gen. n. 6536. p. 1272; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5725. — Walp. 1842. Rep. I. p. 672.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Psoraliear.?

Polyxena**) Kunth 1843. Enum. pl. IV. p. 294: nov. g. Hyacinthear. (Polyanthes pygmaea Jacq.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 298.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.

Polyzone Endl. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 191; 1840. Gen. n. 6283. p. 1226; 1841. Ench. p. 650: nov. g. Chamaelaucicar. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 354.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 76: g. Myrtacear.

Polyzonia Suhr 1834. Flora II. p. 739: nov. g. Algar.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 401: g. Floridear.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 162; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): g. Rytiphlear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 24; 1842. Alg. medit. p. 67: g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 48. n. 122/67. —

*) „πολύτροπος, in multis modis divisus vel multiplex."
**) Polyxena, filia Hecubae.

Polyzonia Suhr cont.
Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 183. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55. 414.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phyc. gener. p. 447; 1849. Sp. Alg. p. 881. n. 589: g. Amansiear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 226: g. Rhodomelacear.

Polyzygus*) Dalzell 1850 in Hook. Kew gard. misc. II. p. 160: nov. g. Silerinear.? — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 714. (P. tuberosus.)

Pomaceae Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 37 plant. Gen.: Punica, Pyrus, Crataegus, Mespilus, Sorbus, Ribes.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 36 plant. Gen. §. 1: Spiraea, Ribes, Sorbus, Crataegus, Mespilus, Pyrus. §. 2: Punica. §. 3: Chrysobalanus, Prunus, Amygdalus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. Gen. ead.

Pomaceae Juss. 1789. Gen. p. 334: sect. Rosacear. Gen.: Malus, Pyrus, Cydonia, Mespilus, Crataegus, Sorbus. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 458. — Par.. Vent. 1799. Tabl. III. p. 335. Gen. ead. — Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. 1. p. 93. Gen.: Chaenomeles, Cydonia, Pyrus, Osteomeles, Mespilus, Amelanchier, Cotoneaster, Eriobotrya, Photinia, Chamaemeles, Raphiolepis, Crataegus. *Cf.* Flora 1823. I. p. 145 et Isis 1825. p. 972. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 210. Gen.: Osteomeles, Mespilus, Cotoneaster. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. Gen. ut Lindl. excepto Chaenomele.
DC. 1805. Franç. IV. p. 428: ordo Rosacear. Gen.: Malus, Pyrus, Crataegus, Mespilus, Sorbus.
Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 33. Ed. Voigt p. 28.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 866: div. Rosacear. Gen.: Pyrus, Mespilus.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 562: fam. Calyciflorar. Gen.: Pyrus, Crataegus, Mespilus.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae.
Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 225: trib. Rosacear. Gen.: Purshia, Photinia, Mespilus, Pyrus, Cydonia, Osteomeles, Amelanchier, Chamaemeles. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 626. Gen. ut Lindl. (omisso Chaenomele.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 106 (74). Gen. ead. et Dicalyx?
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Icosandrar.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (74) Calyciflorar. (apocarpar.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 597. Gen. ut DC. et Dicalyx?, Pyrenaria? — Koch 1836. Syn. p. 233. Ed. II. p. 258. Gen. ut Link et Sorbus.
Bartl. 1830. Ord. p. 399: ordo (237) Calophytor. Gen. ut Lindl.
Link 1831. Hdb. II. p. 77: ordo 29 Perigy-

*) ζυγόν, Jugum.

Pomaceae Juss. cont.
nar. Gen.: Crataegus, Cotoneaster, Aronia, Mespilus, Pyrus, Cydonia.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 627; 1837. Hdb. p. 243: subdiv. Rosear. Gen. ut DC. 1825 et Glaphyria? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 168. Gen. ut Endl.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo ad Rosaceas accedens.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 49: fam. 10 Calophytar. Gen. fere ut Lindl. et Malus, Cormus.
Endl. 1840. Gen. p. 1236; 1841. Ench. p. 655: ordo (270) Rosiflorar. Gen.: Cydonia, Pyrus, Osteomeles, Mespilus, Amelanchier, Peraphyllum, Cotoneaster, Hesperomeles, Eriobotrya, Photinia, Chamaemeles, Rhaphiolepis, Crataegus, Stranvaesia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 124: fam. Rosinear. Gen. ex Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 559: ordo Rosalium. Gen. ut Endl. et Nägelia, Myriomeles.
Römer 1847. Fam. nat. III. p. 97: fam. Rosiflorar. Gen. ut Endl. et Heteromeles, Oxyacantha, Aria, Torminaria, Chamaemespilus, Azarolus, Halmia, Sorbus, Anthomeles, Phaenopyrum, Aronia, Cormus, Malus, Eriolobus, Chaenomeles, Pyracantha.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 207: fam. Rosacear. Gen. ut Endl.
Conf. Pomiferae Hall.; Pomeae Lindl.

Pomaceae Rchb. 1828. Consp. p. 167: div. Rosacear. Subdivis.: Potentilleae, Spiraeeae, *genuinae* (gen.: Crataegus, Raphiolepis, Chamaemeles, Photinia, Eriobotrya, Cotoneaster, Glaphyria?, Amelanchier, Mespilus, Osteomeles, Pyrus, Cydonia).

Pomaderreae Reissek 1840 in Endl. Gen. p. 1101; 1841. Ench. p. 581: trib. Rhamnear. Gen.: Pomaderris, Trymalium. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 87. Gen. ead.

Pomaderris*) Labill. 1804. Nov. Holl. I. p. 61. t. 86. 87: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. elliptica et apetala.) *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 1. p. 121.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 661; 1825. Syst. I. p. 766. n. 844; 1830. Gen. I. p. 182. n. 921: g. Rhamnear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXII. 414. n. 985 (*Pomatoderris*). — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 60 (*Pomatiderris*). — DC. 1825. Pr. II. p. 33. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 459. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 371. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 38. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 462. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 818. — Steud. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 182. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 45.
Link 1821. En. I. p. 232: g. Rhamnoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3801: g. Ceanothear.
Endl. 1840. Gen. n. 5743. p. 1102; 1841. Ench. p. 581: g. Pomaderrear.

*) πῶμα, operculum; δερρίς, membrana.

Pomaderris Labill. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5584 (*Pomatoderris*): g. Pomatoderrear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: g. Phylicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Pomaderroides DC. 1825. Prodr. II. p. 32: sect. Ceanothi.
= Trymalium Fenzl.

Pomangium Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 10: nov. g. Rubiacear.
= Argostemma Wall.

Pomaria Cavan. 1799. Icon. V. p. 1. t. 402: nov. g. Decandr. Monogyn. (P. glandulosa.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 460. n. 1020: g. Leguminosar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 298. n. 1183. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 461.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 485. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 434. — Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70).
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4143; 1841. Nom. p. 155. n. 6073: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6771. p. 1314; 1841. Ench. p. 674.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 393: sect. Hoffmannseggiae.
Benth. 1840. Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 811; 1846. V. p. 559. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Pomatia Nees 1833. Linnaea VIII. p. 46; 1836. Laurin. p. 277: subg. Nectandrae.
Endl. 1838. Gen. n. 2044 *a*. p. 320; 1841. Ench. p. 197: sect. Nectandrae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2666. 1.

Pomatia Vellozo . . .
= Chrysophyllum Linn.

Pomatiderris HBK. vid. *Pomaderris Labill.*

Pomatium Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 252. t. 225.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 390: g. Rubiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2077: g. Cinchonear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 391: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 504. — Meisn. 1838. Gen. p. 162 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2953. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. p. 560. n. 3296 (in Ench. casu omissum): g. Eugardeniear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 517.

Pomatoderreae Rchb. 1841. Nomencl. p. 144: sect. Phylicear. Gen.: Pomatoderris, Trymalium.

Pomatoderris Röm. & Schult., Rchb. vid. *Pomaderris Labill.*

Pomatoxyris Endl. 1837. Gen. n. 1025 *b*. p. 124; 1841. Ench. p. 69; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 55: sect. Xyridis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1519. 2. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 22.

Pomax*) Soland. mss. ex Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 112 (Pomax umbellata Sol.): gen. a Gärtnero ad Operculariam relatum.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1930; 1837. Hdb. p. 180: g. Opercularinar.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 145: g. Opculariar. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 521. n. 3096. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2751.
DC. 1830. Pr. IV. p. 615: g. Operculariear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 213. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 662. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 378. — Endl. 1841. Ench. p. 270. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 97.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Operculari-dar.

Pombalia**) Vandelli 1771. Fasc. pl.; 1796 in Röm. Script. p. 51. t. 3: nov. g. Pentandr. Monogyn.
R. Brown 1818. Tuck. Cong. p. 440 (Verm. bot. Schr. I. p. 220): g. Violear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 306. — Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4887. — Bartl. 1830. Ord. p. 284. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 335. — Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Ionidiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7146: g. Pombaliear.
= Jonidium Vent.?

Pombalieae Rchb. 1837. Handb. p. 269; 1841. Nomencl. p. 187: sect. Jonidiear. Gen.: Solea, Pigea, Jonidium, Pombalia, Anchietea, Noisettia.

Pombea Caldas 1810. Sem. Nov. Gran.: g. indescriptum. (Endl. Gen. p. 1334. n. 44.) *Cf. Pombea Mutis* ex Spreng. N. Entd. II. p. 303. (Steud. Nom. II. p. 379.)

Pomeae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 145; 1837. Bot. Regist. XXIII. n. 1956: subordo Rosacear. Gen. 1837: Stranvaesia, Photinia, Hesperomeles, Raphiolepis, Eriobotrya. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 462. Gen.: Crataegus, Pyrus, Photinia, Amelanchier, Peraphyllum.
= Pomaceae Juss.

Pomereula Domb. herb. ex DC. Prodr. III. p. 190.
= Miconiae Ruiz & Pav. spec.

Pomereulla Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 252. n. 200: g. Graminear.
Agardh 1823. Aphor. p. 150: g. Avenacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 874. p. 98; 1841. Ench. p. 59. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1225. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.
= Pommereulla Linn. f.

Pometia***) Forst. 1776. Char. gen. p. 109. t. 55: nov. g. Monoec. Hexandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 640. n. 1436.
Scop. 1777. Intr. p. 325: g. Disciferar.
Gmel. 1791. Syst. p. 595: g. Heptandr. Monogyn.

Pometia Forst. cont.
Pers. 1807. Ench. II. p. 561. n. 2076: g. Hexandr. Monogyn.
Poir. 1823. Dict. v. 27. p. 59: sect. Euphoriae.
= Nephelium Linn. (Camb., Endl.)

Pometia Willd. 1805. Spec. IV. p. 398. n. 1678: g. Monoec. Hexandr.
= Schmidelia Linn. (Meisn.)

Pometia Flor. Flum. III. t. 87: g. Pentandr. Monogyn. (lutescens) ex Steud. Nom. II. p. 379.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 45 inter genera nondum descripta.

Pomiferae Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 345: div. Dicotyledonum petalodear. Polystemonum. Gen.: Ribes, Rosa, Sorbus, Pirus, Mespilus, Crataegus; Prunus, Cerasus, Padus.
Batsch 1802. Tab. p. 7: fam. Frugariar. Gen.: Pyrus, Mespilus, Sorbus, Crataegus; Ribes.
= Pomaceae Juss. etc.

Pommerella*) Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790. (Amoen. ac. X.) p. 33: nov. g. Graminum spicator.
= Pommereulla Linn. f.

Pommereuila Kunth vid. *praeced.*

Pommereuilia Palis. vid. *praeced.*

Pommereula Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 89: g. Graminear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 328. n. 332.
Trin. 1820. Agrost. p. 153: g. Triandr. Digyn.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 71. n. 343: g. Graminum.
= Pommereulla Linn. f.

Pommereulla Linn. f. 1781. Suppl. p. 12. n. 1358: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 102. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 42. n. 96. — Gmel. 1791. Syst. p. 123. — Willd. 1797. Sp. I. p. 314. n. 116 (*Pommereullia*). — Pers. 1797. Syst. p. 104. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 17. t. 131; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 332; ed. 1832. I. p. 331. — Vahl 1806. Enum. II. p. 393. n. 130. — Roth 1821. Nov. spec. p. 33 (*Pommereullia*).
Juss. 1789. Gen. p. 34: g. Graminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 156. — Hedw. 1806. Gen. p. 35. 361. — Palis. 1812. Agrost. p. 91 (*Pommereuilia*). — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 9. n. 200 (p. 252 *Pomereulla*). — Poir. 1826. Dict. v. 42. 464.
Neck. 1790. El. III. p. 237. n. 1627: g. Achyrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 136: g. Graminum. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 230 (*Pommereullia*).
Pers. 1805. Ench. I. p. 106. n. 191: g. Triandr. Digyn.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72 (*Pommereuila*): g. Avenacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 162. — Kunth 1830. Gram. p. 109; 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 223. t. 7; 1833. Agrost. p. 320. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 428.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 942: g. Phalaridear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31.

*) *πωμάζω*, operculum impono.
**) Dicat. marchioni de Pombal, Lusitano.
***) Dicat. Gallo Pomet.

*) Dicat. domino Du Gage de Pommereull.

Pommereulla Linn. f. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 248: g. inter Avenaceas et Festucaceas intermedium.
Synon. Pommerella Linn. f.; Pommereula St. Hil. etc.; Pomereulla Röm. & Sch. etc.; Roylea Nees.

Pommereullia Willd., Roth, Dietr. vid. *praeced.*

Pompadoura Buchoz . . . . Monogr.
= Calycanthus Lindl.

Pompholyx*) Endl. 1836. Gen. n. 281 *a.* p. 24; 1841. Ench. p. 16: sect. Sclerotii. (Sclerotium Xyloma Fries.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 317. 1.
Synon. Xyloma Link.

Pompholyx Corda 1841 in Sturm Fl. III. H. 19. 20. p. 47. t. 15: nov. g. Tuberum. (P. sapidum.)
Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 393: g. Sclerodermeor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 96: g. Sclerodermacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 296: g. Sclerodermear.

Ponaea**) Schreb. 1789. Gen. I. p. 266. n. 682: g. Octandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 640. — Willd. 1799. Sp. II. p. 470. n. 791. — Pers. 1805. Ench. I. p. 445. n. 984.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 251. n. 1505; 1830. Gen. I. p. 322. n. 1642: g. Sapindear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1318: g. Sapindacear.
= Toulicia Aubl.

Ponceletia***) Petit-Thouars .... Fl. aguan. p. 36.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 858 *b:* sect. Spartinae.
= Spartinae Schreb. pars.

Ponceletia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 554. Ed. Nees p. 410: nov. g. Epacridear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIII. 488. n. 783. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 631. n. 676; 1830. Gen. I. p. 155. n. 777. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 506. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 689.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3348: g. Sprengeliacear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 784: g. Epacriear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 767: g. Epacrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4287. p. 749; 1841. Ench. p. 368. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4816: g. Sprengeliear.

Ponera†) Lindl. 1831. Orchid. gen. p. 113: nov. g. Epidendrear. (Epidendrum graminifolium Pav. mss.) *Cf.* Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. Misc. p. 17; 1842. ibid. XV. Misc. p. 18. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1377. p. 194; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1972. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.
Synon. Nemaconia Knowl. & Westc.

Ponerorchis Rchb. f. 1852. Linnaea XXV. p. 227; 1854. Xen. Orchid. p. 20: nov. g. Orchidear., Herminio aff. (P. graminifolia.)

Pongam Adans. 1763. Fam. II. p. 322: g. Genistar.
= Pongamia Lam.

Pongamia Lamarck Illustr. t. 603.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 341: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 574. n. 2802.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Syst. II. p. 416. — Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4013; 1841. Nom. p. 153. n. 6005. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 374. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 262. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 361. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68). — Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 101. — Endl. 1841. Gen. n. 6713. p. 1304; 1841. Ench. p. 673. — Walp. 1842. Rep. I. p. 798; 1846. V. p. 543. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 571.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 248. 250: g. inter Galegeas et Dalbergieas medium.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 146: g. Millettiear. Char. emend.
Synon. Pongam Adans.; Galedupa Lam.

Pongati Rheede 1679. Malab. II. t. 24.
= Pongatium Juss.

Pongatieae Rchb. 1837. Handb. p. 186; 1841. Nomencl. p. 103: subdiv. Campanulear. Gen.: Sphenoclea.
Endl. 1838. Gen. p. 519; 1841. Ench. p. 267: fam. Campanulinar. Gen.: Pongatium.
Meisn. 1839. Gen. p. 242 (151): ordo 119 plant. Gen.: Pongatium (antea Sphenoclea inter Ficoideas).

Pongatium Juss. 1789. Gen. p. 423: g. Portulaceis aff.? An Samolo?
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 353: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 100. n. 449. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 508.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4399: g. Phytolaccear.?
Lindl. 1836. Introd. ed. II. p. 239.
Endl. 1838. Gen. n. 3092. p. 519; 1841. Ench. p. 268: g. Pongatiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 242 (151).
= Sphenoclea Gärtn.

Pongelion Adans. 1763. Fam. II. p. 319: g. Cassiar.
Scop. 1777. Intr. p. 299 (*Pongelium*): g. Leguminosar.
= Adenanthera Roy.

Pongelium Scop. vid. *praeced.*

Pongolam Rheede 1688. Malab. VII. t. 59.
= Putranjiva Wall.

---

*) πόμφολυξ, vesica.
**) Dicat. Giov. Pona, botanico italo.
***) Dicat. Poncelet, de Tritico scriptore.
†) πονηρός, vilis: ob aspectum plantae.

Ponlana DC. Prodr. I. p. 725 in synon. Zanthoxyli: vid. *Pohlana.*
Ponpartia A. Juss. vid. *Poupartia Comm.*
Pontaletsje Adans. 1763. Fam. II. p. 159: g. Caprifolior.
= Lawsonia Linn.
Pontania Lem. mss.
= Brachysema R. Brown. (Walp. Rep. V. p. 423.)
Pontederaceae Rich. 1828. Nouv. élém. ed. IV. p. 427.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 347) 1847. Veg. kingd. p. 206: ordo Lilialium. Gen.: Heteranthera, Leptanthus, Eichhornia, Pontederia, Unisema, Monochoria.
Endl. 1837. Gen. p. 137; 1841. Ench. p. 81: ordo Coronariar. Gen.: Heteranthera, Pontederia, Reussia. Accedit 1843 (Spl. III. p. 58) Eichhornia.
= Pontederiaceae Meisn.
Pontederas Hoffmsg. ex Steud. Nom. II. p. 380.
= Pontederia Linn.
Pontedereae Salisb. 1812 in Hortic. Trans. I. (1815) p. 270: ordo Monocotyledonum. Gen.: Philydrum.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 265: ordo plant. Gen.: Heteranthera, Pontederia. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 273. Gen. ead.
Agdh. 1823. Aphor. p. 169; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar. Gen. ead.
Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 7. Gen. ut Kunth.
Rasp. 1827. Mém. Mus. XIV. p. 169. Gen. ead.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (246) Hexapetaloidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 34: ordo Lilialium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 154: subdiv. Hemerocallidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 42: subdiv. Commelynear. Gen.: Leptanthus, Heteranthera, Pontederia, Reussia.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 265: fam. Asphodeleis aff. Gen. ut Kunth et Eichhornia, Monochoria, Reussia.
= Pontederiaceae Meisn.
Pontederia*) Linn. 1737. Gen. p. 102. n. 291; 1737. Cliff. p. 133; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 288; 1759. Syst. ed. X. p. 975. n. 361; 1762. Sp. ed. II. p. 412; 1764. Gen. ed. VI. p. 159. n. 399; 1767. Syst. ed. XII. p. 233. n. 395: g. Hexandr. Monogyn. *Cf.* Swartz 1791. Obs. bot. p. 123. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 195. — Murr. 1774. Syst. p. 261; 1784. Syst. p. 315. — Reich. 1778. Gen. p. 162. n. 431. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 214. n. 545. — Lour. 1790. Coch. I. p. 198. — Gmel. 1791. Syst. p. 533. — Pers. 1797. Syst. p. 334; 1805. Ench. I. p. 347. n. 773. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 6. t. 110. 111; 1832. Ind. II. p. 121. — Willd. 1799. Sp. II. p. 22. n. 609. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 215.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 221. n. 918: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Narcissor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 55.

*) Dicat. Julio Pontedera, prof. Patavino.

Pontederia Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170.
Scop. 1777. Intr. p. 85: g. Liliacear.
Neck. 1790. El. III. p. 163. n. 1511: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 185: g. Narcissoideis aff.
Cram. 1803. Disp. p. 20: in Triandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 140: g. Amaryllideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 230. n. 937.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 266: g. Pontederear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 273. — Agdh. 1823. Aphor. p. 169. — Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 8. t. 4. — Rasp. 1827. Mém. Mus. XIV. p. 169. (Char. reform.) — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXI. 1137. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 256. n. 1331. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1091. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1525. Sect.: Unisema, Pontederia, Monochoria. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 392.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 246; 1825. Syst. II. p. 42. n. 1192: g. Spathacear.
Link 1821. En. I. p. 309: g. Narcissinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1166: g. Ephemerear. Sect.: Pontederia, Umsema.
Link 1829. Hdb. II. p. 176: g. Hyacinthinar.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 32: g. Hemerocallidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Asphodelear. descisc., Commelinaceis aff.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Ornithogalear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 347; 1847. Veg. kd. p. 206: g. Pontederacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1088. p. 138; 1841. Ench. p. 81. Sect.: Unisema, Pontederia.
Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301): g. Pontederiacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 424.
= Pontederia et Eichhornia Kunth.
Pontederia Presl 1827. Reliq. Hänk. I. p. 116: g. Asphodelear., sejuncta Monochoria restrict.
Endl. 1837. Gen. n. 1088 *b a.* p. 139; 1841. Ench. p. 81: subsect. Pontederiae.
= Eichhorniae Kunth pars.
Pontederia Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1166 *a*: sect. Pontederiae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1088 *b.* p. 139; 1841. Ench. p. 81. Subsect.: Pontederia (Presl), Monochoria.
Brongn. 1843. En. genr. p. 24: g. Pontederiacear.
= Eichhornia Kunth.
Pontederia Kunth 1843. Enum. IV. p. 123: g. Pontederiacear., sejuncta Eichhornia restrict. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 93.
Synon. Unisema Rafin.; Reussia Endl.?, Pontederas Hoffmsg. (Steud.)
Pontederiaceae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 398 (300): ordo Coronariar. Gen.: Heteranthera, Pontederia, Reussia.
Brongn. 1843. En. genr. p. 24: fam. Bromelioidear. Gen.: Pontederia, Unisema.

Pontederiaceae Meisn. cont.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 118: ordo Monocotyledonum. Gen.: Heteranthera, Pontederia, Eichhornia, Monochoria. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 423. Gen. ead. et Reussia.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 85. Gen.: Heteranthera, Eichhornia, Pontederia, Reussia.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 106.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.
Synon. Pontedereae Kunth; Pontederaceae Rich.

Pontesia Arrab. ex Steud. Nomencl. II. p. 380: g. Vernoniacear.? (P. errata.)

Ponthiera Ritgen vid. *seq.*

Ponthieua Lindl. vid. *seq.*

Ponthieva*) R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 197 (Verm. bot. Schr. II. p. 20): nov. g. Orchidear. (P. glandulosa.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 709. n. 2960; 1831. Gen. II. p. 660. n. 3325.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1426; 1841. Nom. p. 55. n. 2140. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 215. n. 1573. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125 (sph. *Ponthiera*): g. Coniopagar.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 16. t. 123.
Lindl. 1840. Orchid. p. 444; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1547. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18.
Meisn. 1842. Gen. p. 384 (288): g. Cranichidear.
Lindl. 1846 in Benth. Pl. Hartweg. II. p. 258 (*Ponthieua*): g. Orchidacear.
Synon. Schönleinia Klotzsch.

Ponthieveae Klotzsch .... in Hayne Arzneig. XXIV: div. Neottiear. Gen.: Neottia, Spiranthes, Listera, Epipactis.

Ponticum G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 843: sect. Rhododendri. (Rh. ponticum, etc.)
= Eurhododendron Endl.

Pontinia Fries 1843 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 9: nov. g. pro Agrostemmate Coeli rosa propositum, antea *Coronaria Fries. Cf.* Flora 1844. II. p. 664.
= Eudianthe Rchb.

Pontopidana Scopoli 1777. Introd. p. 195. n. 849: g. Speciosar.
= Couroupita Aubl.

Pootia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 37: nov. g. plant. (*Cansjan-Cora Rheede* X. t. 52.)
= Canscora Lam.

Pootia Miquel .... Verl. en Meded. k. Ac. Wet. VII. p. 193; 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 417: nov. g. Tabernaemontanear. *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 496.

Podothion Rchb. vid. *Porodothion Fries.*

Popowia Endl. 1839. Gen. n. 4710. p. 831; 1841. Ench. p. 422 (*Poppowia*): nov. g. Bocagear. pisocarpa Bl.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 212 (*Bopowia*). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7310. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422 (*Poppowia*).
Meisn. 1843. Comm. p. 339: g. Anonacear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 104: g. Mitrephorear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 51. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 313.

*) Dicat. De Ponthieu, collectori plantarum americanarum.

Poppowia Endl., Lindl. vid. *praeced.*

Poppya Neck. 1790. Elem. bot. I. p. 241. n. 391: g. Sygolliphytor., a Momordica L. disjunctum.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 13. 59: g. Momordicear.
= Momordicae Linn. pars.?

Populago Tourn. 1700. Inst. p. 273. t. 145: g. pl. class. VI.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 319: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 458: g. Ranunculor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 404: g. Polyandr. Polygyn.
Mönch 1794. Meth. p. 300: g. Thalamostemonis.
= Caltha Linn.

Populago DC. 1818. Syst. I. p. 308; 1824. Prodr. I. p. 44: sect. Calthae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4961 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 43. — Endl. 1839. Gen. n. 4786 *c.* p. 847; 1841. Ench. p. 434.
Synon. Caltha Spach.

Populus Tourn. 1700. Inst. p. 592. t. 365: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 314: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 333 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 307. n. 755; 1737. Cliff. p. 460; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 298; 1753. Sp. II. p. 1034; 1759. Syst. ed. X. p. 1294. n. 996; 1763. Sp. ed. II. p. 1463; 1764. Gen. ed. VI. p. 526. n. 1123; 1767. Syst. ed. XII. p. 656: g. Dioec. Octandr. — Par. Scop. 1772 Carn. II. p. 265. — Murr. 1774. Syst. p. 745; 1784. Syst. p. 889. — Reich. 1778. Gen. p. 521. n. 1228. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 693. n. 1531. — Pers. 1797. Syst. p. 931; 1807. Ench. II. p. 623. n. 2249. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 802. n. 1809; 1809. En. p. 1016. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 639. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 199. 286.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 156: g. Juliferar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 455. — Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 241.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 151: g. Amentacear. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 350. — Juss. 1789. Gen. p. 409. — Gis. 1792. Prael. p. 578. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 555. — Batsch 1802. Tab. p. 163. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 317. — DC. 1805. Franç. III. p. 298. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 346; 1825. Syst. II. p. 244. n. 1490; 1830. Gen. I. p. 319. n. 1631. — Link 1822. En. II. p. 421. — Lois. 1826. Dict. v. 39. p. 340

Populus Tourn. cont.
(*Peuplier*). — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 652. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 295.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 126. n. 522: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 337.
Adans. 1763. Fam. II. p. 376: g. Castanear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 492.
Neck. 1790. El. III. p. 261. n. 1656: g. Axonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 630: g. Octandr. Monogyn.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 56. t. 90.
Cram. 1803. Disp. p. 201: g. Dioec. Dodecandr.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 243: g. Dioec. Polyandr.
Rebent. 1804. Neom. p. 211: g. Polyandr. Monogyn.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 906: g. Salicinear. — Par. Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. I. p. . . . (Disjungitur Tremula.) — Koch 1837. Syn. p. 660. Ed. II. p. 750. Sect. ut Rchb. 1831. — Endl. 1837. Gen. n. 1904. p. 290; 1841. Ench. p. 177. — Kunth 1838. Berol. II. p. 217. Sect. ut Koch. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 153. — Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 28; 1841. Vég. phan. X. p. 378. Sect.: Leuce, Leucoides, Aigeiros, Tacamahaca. — Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). — Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2464. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 134. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 345. — Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 681 (*Peuplier*). — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 625. Sect. ex Spach. — Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 322; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 498. Sect. ut Rchb. et Turanga. — Math. 1853. Belg. I. p. 489. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 143. Sect.: Leuce, Aigeiros.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 242: g. Salicinar. Sect.: Populus, Aegirus. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 208. — Bartl. 1830. Ord. p. 119. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 223; 1846. Chlor. prot. p. LXXX.
Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1789; 1831. Fl. exc. p. 173: g. Saliccar. Sect. (1831): Leuce, Aigeiros.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 255: g. Salicacear.
Synon. Tremula Dumort.

Populus Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 242: sect. Populi.
= Leuce Duby.

Porana Burm. 1768. Fl. ind. p. 51. t. 21.
Linn. 1771. Mant. II. p. 554. n. 1339: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 168; 1784. Syst. p. 200. — Reich. 1778. Gen. p. 89. n. 230. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 116. n. 286. — Gmel. 1791. Syst. p. 339. — Pers. 1797. Syst. p. 206; 1805. Ench. I. p. 176. n. 413. — Willd. 1797. Sp. I. p. 843. n. 322. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 350. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 31. t. 235 (char. emend.); 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 39; ed. 1832. I. p. 464. *Cf.* Flora 1823. II. p. 471.

Porana Burm. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 420: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 105. n. 470.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 463; 1825. Syst. I. p. 614. n. 646; 1830. Gen. I. p. 134. n. 665: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3010; 1841. Nom. p. 114. n. 4432. (genuinar.) — Choisy 1833. Mém. soc. Genève VI. p. 487 (*cf.* Flora. Lit. V. p. 135); 1845 in DC. Pr. IX. p. 436. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 298. — Endl. 1839. Gen. n. 3797. p. 653; 1841. Ench. p. 324. Sect.: Dinetus, Euporana. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 95. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXII. 304. n. 692: g. Convolvulor.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 723: g. Convolvulacear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 98. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 523. — Bartl. 1830. Ord. p. 191. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 626.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 625: g. Convolvulinar.
Synon. Dinetus Sweet.

Poranthera*) Rudge 1811. Linn. X. p. 302. t. 22. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 524.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 668; 1825. Syst. I. p. 948. n. 1133: g. Diosmear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 181.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXV. 684: g. Ranunculacear.?
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Phytolaccear.
Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4230: g. Bruniacear.
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 217. t. 50 A. B; 1833. Ann. sc. nat. XXIX. p. 384: g. Euphorbiacear. *Cf.* Isis 1836. p. 459.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 235. n. 1237: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1016.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Gisekiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5859. p. 1121; 1841. Ench. p. 589: g. Phyllanthear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — Klotzsch 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 230.
Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7423: g. Poranthercar.
Baill. 1858. Euphorb. p. 573: g. Wielandiidear.

Poranthera Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 221: nov. g. Graminear. (Andropogon nutans et ciliatus.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 85 et Steud. Glum. I. p. 392.

Porantthereae Rchb. 1841. Nomencl. p. 195: subsect. Cluytiear. Gen.: Poranthera.

Poraqueiba**) Aublet 1775. Guian. I. p. 123. t. 47: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 331. — Poir. 1826. Dict. v. 42. p. 525.
Juss. 1789. Gen. p. 288: g. Berberidibus aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 87: g. Berberideis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 95. n. 427: g. Berberidear.

*) πόρος, foramen, pora.
**) *Poraqueiba* nomen Galibiense.

Poraqueiba Aublet cont.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVI. 182. n. 667: g. Berberidum.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 a. n. 1899 a: g. Hamamelidear.?
Meisn. 1841. Comm. p. 237: g. Laurinear.?
Endl. 1841. Gen. n. 6872. p. 1331; 1841. Ench. p. 685: inter genera gamopetala incerta.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. monopetalum, incertae sedis.
Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 169: g. Icacinear. — Par. Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 481.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 179: g. Olacinear.
Synon. Barreria Scop.; Bareria Juss.; Meisteria Gmel.

Porcelia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 84; 1798. Syst. p. 144: nov. g. Polyandr. Polygyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 19.
Pers. 1807. Ench. II. p. 95. n. 1352: g. Anonar.
Dunal 1817. Mon. Anon. p. 38. 85: g. Anonacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 480; 1824. Pr. I. p. 88. — Bartl. 1830. Ord. p. 247. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 497. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 293 (*Porcella*).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 632. n. 2011; 1830. Gen. I. p. 454. n. 2239: g. Anonear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI; 1828. Consp. p. 194. n. 5008: g. Unonear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 92.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7319: g. Uvariear.
= Uvaria Linn.?

Porcella Dietr. vid. *praeced.*

Porcellites Cassini 1822. Dict. v. 25. p. 64; 1826. v. 43. p. 42: nov. g. Scorzonerear. (Hypochaeris radicata L.) — Par Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hypochaeridear.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1414; 1841. Nom. p. 96. n. 3746. 3: sect. Hypochaeridis. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 91. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 775.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2154: g. Andryalear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 102: g. Cichoracear.

Pordenium Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXVI: sect. Baeomycetis.

Porella**) Dillen. 1741. Hist. Musc. p. 459. t. 68: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 47. — Par. Linn. 1741. Act. soc. Ups. p. 83. n. 1031; 1753. Sp. II. p. 1106; 1759. Syst. ed. X. p. 1331. n. 1050; 1763. Sp. ed. II. p. 1569; 1764. Gen. ed. VI. p. 561. n. 1186; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 698. — Adans. 1763. Fam. II. p. 491. — Murr. 1774. Syst. p. 794; 1784. Syst. p. 944. — Reich. 1778. Gen. p. 558. n. 1303. — Juss. 1789. Gen. p. 12. (spurior.) — Gmel. 1791. Syst. p. 1322. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 984.
Gled. 1764. Syst. p. 293. n. 1189: g. Muscosar. nudar.
Scop. 1777. Intr. p. 357: g. Muscoidear.
Neck. 1790. El. III. p. 333. n. 1746: g. Phryganophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 753. n. 1616: g. Miscellanear.
Dicks. .... Linn. Trans. III. p. 238.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 39: g. Licopodacear.
Schwägr. 1814. Musc. hep. prodr. p. 32: g. Muscor. hepaticor.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 532 *h*: sect. Jungermanniae?
Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 823: g. Jubulear.
Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 233: g. Porellear.
Synon. Bellincinia, Antoiria et Schulthesia Raddi; Cavendishia Gray; Madotheca Dumort.; Suaresia Leman; Bellinginia Rchb.

Porelleae Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 232: div. Jungermanniacear. Gen.: Radula, Porella.
Conf. Platyphyllae Nees.

Poria Hill 1762. Syst. II. p. 40.
Adans. 1763. Fam. II. p. 10: g. Fungor.
Pers. 1797. Tent. p. 29: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 542: sect. Boleti. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 114.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 128; 1818. ibid. II. p. 260; 1851. Symb. nov. mycol. I. (Flora 1852. p. 682): sect. Polypori. — Par. Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 88. — Leman 1826. Dict. v. 42. p. 426. — Endl. 1836. Gen. n. 447 *b*. p. 39; 1841. Nom. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 482. 2. — Math. 1853. Belg. II. p. 340.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 19: g. Boletor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 639: g. Boletidear.
Synon. Leptopora Rafin.; Physoporus Chev.

Poridae Gray vid. *Porinidae.*

Porina Achar. 1810. Lich. univ. p. 60. 308. t. 7; 1814. Syn. Lich. p. 109: nov. g. Phymatoideor. (Lichen pertusus L.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 49.
Mart. 1817. Erlang. p. 254: g. Lichenum verrucosor.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: g. Hypoxylear. Pseudolichenum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 495: g. Porinidar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Pyrenulatar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 15: g. Verrucariar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 260: g. Endocarpear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350.
Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 363: g. Porinear.

*) Dicat. Antonio Porcel, Hispano.
**) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 178.

Porina Achar. cont.
Arnold 1858. Flora II. p. 556: g. Thelochroëar.
= Pertusaria DC.

Porineae Rchb. 1828. Consp. p. 20 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Gasteropsorar. Gen.: Porina, Chiodecton, Porothelium, Stigmatidium.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14: trib. Nucleiferar. Gen.: Pertusaria. *Cf.* Flora 1854. p. 236.

Porinidae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 486 (p. 493 *Poridae*): div. Idiothalamear. Gen.: Pyrenula, Thelotrema, Porina.

Porliera Pers. 1805. Ench. I. p. 445. n. 986: g. Octandr. Tetragyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 288. n. 1153.
Spreng. 1818. Anl. II. p. 703: g. Onagrar. genuinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 216. n. 1439: g. Zygophyllear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 616. n. 6039. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479.
Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 52: g. Rutacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 304. n. 1553. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1269.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5199; 1841. Nom. p. 198. n. 7556: g. Guaiacear.
= Porlieria Ruiz & Pav.

Porlieria*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 55. t. 9: nov. g. Octandr. Tetragyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 107: g. Zygophyllear. (verar.) — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 457. — Bartl. 1830. Ord. p. 392. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 773. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 308. (genuinar.) — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — Endl. 1840. Gen. p. 1164. n. 6039. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 82.
Synon. Porliera Pers.

Porocarpae Rchb. 1837. Handb. p. 264; 1841. Nomencl. p. 184: sect. Papaverear. genuinar. Gen.: Papaver.

Porocarpus Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 473. t. 178. f. 4: nov. g. praeter fructum incognitum. (P. Helminthotheca.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 53.

Porocillaea Miers 1826. Trav. in Chili II. p. 529.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 46 (*Porocillea* in Ench. p. 686): inter genera nondum descripta.

Porocyclia Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: g. Melosirear.

Porocypheae Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 425: fam. Lichenum Gelatinosor. Gen.: Porocyphus.

Porocyphus**) Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 425: nov. g. Porocyphear. (Collematis sp. Flot.)

Porodermei Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 34: div. Pilomycor. Gen.: Polyporus, Boletus, Hypodrys.

Porodothion Fries 1825. Pl. homon. p. 262: g. Trypetheliacear. (pro *Porothelio Eschw.* propositum.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 721 (*Porodothium*). — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 153.
Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 375 (sph. *Popodothion*): g. Trypethelinor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. X. p. 436: g. Trypetheliear.
= Mycoporum Meyer.

Porodothium Wittst. vid. *praeced.*

Poronia Gleditsch 1764. Syst. p. 303. n. 1217: g. Fungosar occultatar.
Willd. 1787. Fl. Berol. p. 400: g. Fungor. (P. Gleditschii.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 55. — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 542.
Fries 1818. Obs. myc. II. p. 314: g. Sphaerioideor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Sphaeriar. An subg. Sphaeriae?
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 515: g. Spherideear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 329; 1828. Elench. II. p. 60: trib. Sphaeriae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 106: sect. Hypoxyli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 278 *b;* 1841. Nom. p. 7. n. 300. 2.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 135. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 382. — Bonord. 1851. Hdb. p. 273. — Bail 1858. Syst. p. 53. t. 17. (stromaticor.)
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 223: g. Sphaerinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 166: g. Sphaeriacear.
= Hypoxylon Bull.?

Porophora G. F. W. Meyer 1825. Entw. Flecht. p. 326: nov. g. Myelocarpor. (Porina pertusa et granulata Ach.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 55. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 241. n. 3363; 1831. Gen. II. p. 742. n. 3759.
= Pertusaria DC.

Porophylleae DC. 1836. Prodr. V. p. 647: div. Tagetinear. Gen.: Porophyllum. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 420. Gen. id. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1382 et Ench. p. 239) Chaethymenia. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). Gen. id. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. Gen. ut Endl. 1841 et Cadiscus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. 1841.

Porophyllum*) Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 308: nov. g. Corymbiferar.
Linn. 1737. Cliff. p. 494; 1737. Coroll. p. 14. n. 977; 1740. Syst. p. 28: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Adans. 1763. Fam. II. p. 122: g. Conysar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 203; 1826. v. 43. p. 56: g. Tagetinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 84.

---

*) Dicat. Ant. Porlier, botanophilo.
**) πῶρος, gelatina; κυφός, gibber.

*) Folia vesiculis lunulatis adspersa sunt et ad crenas marginis notata. (Ht. Cliff.)

Porophyllum Vaillant cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2057: g. Tagetear.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: g. Pectidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16.
DC. 1836. Pr. V. p. 647: g. Porophyllear. Sect.: Euporophyllum, Cusimbua, Kugaia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2582. p. 420; 1841. Ench. p. 239. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3217. Sect.: Porophyllum (subsect.: Tsinoma, Hunteria), Cusimbua, Kugaia. — Walp. 1843. Rep. II. p. 624; 1847. VI. p. 174. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Kleinia Jacq.; Cacaliae sp. Linn.
Porophyllum Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 91: sect. Saxifragae. (S. caesia, patens et diapensoides.)
= Aizoniae Tausch pars.
Poropsis Kütz. 1856. Tab. phycol. VI. *Cf.* Bot. Zeit. 1858. Beil. p. 76.
Poropterides Willd. 1810. Spec. V. p. 66: ordo 3 Cryptogamiae. Gen.: Marattia, Danaea. — Par. Willd. Grundr. ed. Link (1831.) p. 135.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 106: div. Pteroidum. Gen. ead.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 23; 1831. Gen. II. p. 718: sect. familiae primae Cryptogamiae. Gen. ead. et Angiopteris.
Porosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 91: g. Sphaeriear. (Sphaeria stipitata, sessilis.)
Porostema Schreb. 1791. Gen. II. p. 517. n. 1226: g. Polyadelph. Polyandr. *Cf. Perostema Räusch., Steud.*
Nees 1836. Laurin. p. 298: subg. Nectandrae. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 498 (err. *Prostenia*).
Endl. 1837. Gen. n. 2044 *b*. p. 320; 1841. Ench. p. 197: sect. Nectandrae.
Porosthele Achar. mss. ex Wallr.
= Porosthelium Wallr.
Porosthelium Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 311: sect. Endocarpi.
= Pertusaria DC.
Porosus Cotta 1832. Dendrol. p. 40: nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora Lit. II. p. 137.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 458: g. Filicum foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 111; 1846. Chlor. prot. p. LII: caudex Filicis foss.
Porotheleum Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 272: nov. g. Fungor. (Boletus fimbriatus Pers.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 63.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 506; 1828. Elench. I. p. 125: g. Pileator.
Fries 1825. Pl. homon. p. 80: g. Polyporeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 444. p. 39; 1841. Ench. p. 21.
Synon. Porothelium Rchb. etc., non Eschw.
Porothelium Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 18. f. 21: nov. g. Trypetheliacear. (Trypethelium conglobatum Ach., etc.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 63.
Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 365: g. Porinear.

Porothelium Eschweiler cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 743. n. 3763: g. Myelocarpor.
= Mycoporum Meyer.
Porothelium Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 335; 1841. Nom. p. 12. n. 475: g. Polyporeor. — Par. Fries 1838. Epicr. p. 503; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 325. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 180. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 412. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 170.
= Porotheleum Fries.
Porotiddia G. Don mss.: nov. g. pro Baea triandra Pers. propositum. (Walp. Repert. III. p. 152.)
= Jovellana Ruiz & Pav.
Porotrichum Brid. 1827. Bryol. II. p. 275: sect. Climacii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 557 *b*; 1841. Nom. p. 26. n. 963. 1. — Endl. 1836. Gen. n. 585 *a*. p. 56; 1841. Ench. p. 32.
Porpa*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 117: nov. g. Tiliacear. *Cf.* Linnaea I. p. 658. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 427. n. 2118. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 547. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 3. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 238.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 201: g. Polyandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5434: g. Tiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 37 (28).
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Tiliariar. genuinar.
= Bartramea DC.?
Porpax Lindl. 1845. Bot. Regist. Misc. p. 63: nov. g. Orchidear., Eriae proximum. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 266.
Porphyra**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 69. Ed. Willd. p. 87: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (P. dichotoma.)
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2921: g. Verbenear.
= Callicarpa Linn.
Porphyra Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 404: sect. Ulvae. — Par. Leman 1828. Dict. v. 56. p. 243. — Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 479 *a*.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXII. 190: g. Ulvacear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 755. n. 3842. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 405; 1841. Brit. Alg. p. 169; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 264. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 17. — Endl. 1843. Spl. III. p. 19. n. 59. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. 437.
Menegh. 1838. Cenni p. 36: g. Ulvear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 693. (genuinar.) — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465.) — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 135. (genuinar.) — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ... — Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 404.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 20: g. Ulvoidear.

*) πόρπη, fibula.
**) πορφύρα, purpura: a colore floris.

Porphyra Agardh cont.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 382; 1845. Phyc. germ. p. 293; 1849. Sp. Alg. p. 691. n. 461: g. Porphyrear. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 53.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.

Porphyranta Gren. vid. *seq.*

Porphyrantha „Fenzl" Endl. 1840. Gen. n. 5234 *c.* p. 967; 1841. Ench. p. 505: sect. Arenariae. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 262 (*Porphyranta*).
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7791: g. Arenariear.
Synon. Dufourea Gren. pt.

Porphyranthus G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 725: sect. Goodeniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3043 *c.* p. 507; 1841. Ench. p. 261. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 515. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4009. 3.

Porphyreae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 382; 1845. Phycol. germ. p. 293; 1849. Sp. Alg. p. 691: fam. Epiblastear. Gen.: Porphyra, Peyssonelia, Hildenbrandtia.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 52: trib. Ulvacear. Gen.: Porphyra, Bangia.

Porphyreon G. Don vid. *Porphyrion Tausch.*

Porphyridium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 71: nov. g. Tetrasporear.

Porphyrion Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Saxifragae. (P. oppositifolia.) — Par. Seringe 1830 in DC. Pr. IV. p. 17. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 213 (*Porphyreon*). — Koch 1836. Syn. p. 269. Ed. II. p. 296. — Endl. 1839. Gen. n. 4634 *a.* p. 814; 1841. Ench. p. 408. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 563. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6155. 3. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 204. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 658.
Synon. Antiphylla Haw.; Calliphyllum Gaud.

Porphyrispora Massalongo 1853. Mem. lichen. p. 154: nov. g. Lichenum. (Verrucariae forma Schär.)

Porphyrocoma „Hook." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 679: g. Justiciadar., inter Strobilorachidem et Endopogonem collocatum.

Porphyroglossum Kütz. 1847. Flora II. p. 775: nov. g. Algar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 794. n. 536: g. Chaetangiear.

Porphyrosa Walp. vid. *seq.*

Porphyrosia Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 105: sect. Jambosae. (Eugenia rubens Roxb.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 636 (*Porphyrosa*).

Porphyrostachys Rchb. f. 1854. Xen. Orchid. p. 18: nov. g. Orchidear. (Altensteinia pilifera HBK.)

Porphyrostromium Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 100: nov. g. Bangiear. (Bangia repens Zan.)

Porpidia*) Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 221: nov. g. Lecidinar. (Diplotommatis sp. Krp.)

*) *πόρπη*, annulus.

Porroteranthe Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 287: nov. g. Festucacear.

Porrum*) Tourn. 1700. Inst. p. 382. t. 204: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 140. Ed. Hall. 1745. p. 154: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 103. n. 292; 1737. Cliff. p. 136; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 141. n. 328; 1745. Fl. succ. p. 94: g. Hexandr. Monogyn., serius Allio injunctum.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 294: g. Liliacear.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 55: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 50: g. Cepar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 539: sect. Allii. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. 1000. — Koch 1837. Syn. p. 718. Ed. II. p. 830. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1129. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 380. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 394. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 239. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 162. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 196.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1378; 1830. Fl. exc. p. 110; 1841. Nom. p. 48. n. 1769: g. Alliacear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 328: subg. Allii.
Webb 1850. Canar. III. p. 342: subsect. Crommyi.
= Schoenoprasi Kunth pars.

Portalesia**) Meyen 1834. Reise I. p. 316: nov. g. Nassauviacear.
Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142): g. Nassauviear.
= Caloptilium Lag.?

Portea***) Tenore 1845. Diar. congr. Neap. ex Flora 1846. II. p. 565: nov. g. ex typo Juanulloae floribundae?

Portea „Hort. Paris." C. Koch 1856. Pl. nov. h. Berol.; 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 368: g. Bromeliaceear. (P. kermesina.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 67.

Portenschlagia†) Tratt. 1812. Archiv p. 250.
Link 1821. En. I. p. 149: g. Rhamnoidear.
= Elaeodendron Jacq.

Portenschlagia Visiani 1849. Fl. dalm. III. p. 45: nov. g. ex typo Athamantae ramosissimae Port. *Cf.* Flora 1850. p. 570.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 898: g. Seselinear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 70.

Porteria Hook. 1852. Ic. pl. t. 864: nov. g. Valerianear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 137.
Synon. Amblyorhinum Turcz.

Portesia††) Cavan. 1789. Diss. VII. p. 369. t. 215: nov. g. Monadelph.
Juss. 1789. Gen. p. 265: g. Meliar.
Gmel. 1791. Syst. p. 609: g. Octandr. Monogyn.
Gis. 1792. Prael. p. 363: g. Tribilatar.

*) *Porrum* et *porrus* Veterum.
**) Dicat. Don Diego Portales.
***) Dicat. Della Porta.
†) Dicat. F. de Portenschlag-Ledermeyer, botanico austriaco.
††) Dicat. D. Poupé-Desportes.

Portesia Cav. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 43: g. Meliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 275. n. 1107. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 83.
A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 237: sect. Trichiliae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5541 *b*. p. 1051; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8077. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 433.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 86. 115: g. Trichiliear.

Portiera „Rz. & Pav.“ Wittst. Etym. Handw. p. 722 (Onagreae): an err. pro *Porlieria Ruiz & Pav.?*

Portieria Zanardini 1851. Flora I. p. 33: nov. g. Floridear., Plocamio aff.

Portlandia P. Browne 1756. Jamaic. p. 164: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 928. 1364. n. 1121; 1762. Sp. ed. II. p. 244; 1764. Gen. ed. VI. p. 91. n. 227; 1767. Syst. ed. XII. p. 164. n. 226. — Murr. 1774. Syst. p. 178; 1784. Syst. p. 213. — Reich. 1778. Gen. p. 93. n. 243. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 121. n. 299. — Gmel. 1791. Syst. p. 360. — Pers. 1797. Syst. p. 221; 1805. Ench. I. p. 197. n. 439. — Willd. 1797. Sp. I. p. 935. n. 340. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 49. (reform.) — Cram. 1803. Disp. p. 53.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 202; 1820. Mém. Mus. VI. p. 387. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 577. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 440. — Hedw. 1806. Gen. p. 138. n. 597. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. III. 21. n. 863. — Link 1821. En. I. p. 223. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 708. n. 776; 1830. Gen. I. p. 166. n. 835. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 84. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 725.
Adans. 1763. Fam. II. p. 147: g. Aparinium.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402.
Gled. 1764. Syst. p. 200. n. 829: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 140: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 153. t. 31. f. 1 (grandiflora).
Neck. 1790. El. I. p. 148. n. 257: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 610. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2068. — Bartl. 1830. Ord. p. 211. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 286.
Cram. 1803. Disp. p. 36 in Tetrandr. Monogyn. et p. 74 in Hexandr. Monogyn.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1017: g. inter Rubiaceas et Strychnaceas medium.
DC. 1830. Pr. IV. p. 404: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 513. — Endl. 1838. Gen. n. 3258. p. 553; 1841. Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2894.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 419: g.

Portlandia P. Browne cont.
Hedyotidear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.

Portula Dillen. 1719. Nov. pl. gen. p. 133. t. 7: nov. g. herbae Enangiospermae Hexapetalae.
Mönch 1794. Meth. p. 661: g. Calycostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 553: g. Salicariar. = Peplis Linn.

Portulaca*) Tourn. 1700. Inst. p. 236. t. 118: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 107. Ed. Hall. 1745. p. 120: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 122. n. 343: g. Decandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 104. (P. oleracea.)
Linn. 1737. Cliff. p. 207; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 240. n. 523; 1748. Ups. p. 246: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 216. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 6.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 392: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 106. n. 434: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 280.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Linn. 1753. Sp. I. p. 445; 1759. Syst. ed. X. p. 1045. n. 531; 1762. Sp. ed. II. p. 638; 1764. Gen. ed. VI. p. 240. n. 603; 1767. Syst. ed. XII. p. 328: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 329. — Murr. 1774. Syst. p. 370; 1784. Syst. p. 445. — Reich. 1778. Gen. p. 246. n. 659. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 323. n. 824. — Lour. 1790. Coch. I. p. 293. — Gmel. 1791. Syst. p. 751. — Pers. 1797. Syst. p. 477; 1807. Ench. II. p. 6. n. 1177. — Willd. 1799. Sp. II. p. 859. n. 949; 1809. En. p. 497. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 121 (*Portulacca*); ed. Schrank 1819. p. 132. — Elliott 1821. Sketch I. p. 534 (*Portulacca*). — Gaud. 1828. Helv. III. p. 261. 263. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 463.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.; g. Sempervivar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 242: g. Portulacar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 197: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 224: g. Nomadear.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 245. 256; 1789. Phil. Bot. I. p. 92. *Cf. Telephiastrum.*
Juss. 1789. Gen. p. 312: g. Portulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 259. — Batsch 1802. Tab. p. 36. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 137. — DC. 1805. Franç. IV. p. 401. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 898. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 839; 1825. Syst. II. p. 459. n. 1772; 1830. Gen. I. p. 394. n. 1977. — Link 1822. En. II. p. 2; 1831. Hdb. II. p. 42. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 71. — Kunth 1824. Syn. III. p. 373; 1838. Berol. I. p. 147. —

*) Nomen vetustum, quia foliis portulas imitatur et portulas habere videtur. (Gesn.)

Portulaca Tourn. cont.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1136. — Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 217 (*Pourpier*). — DC. 1828. Pr. III. p. 353. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 190. — Bartl. 1830. Ord. p. 303. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 575. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 355. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 73. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 224. — Koch 1836. Syn. p. 252. Ed. II. p. 278. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 218. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 619. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 605. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 455 (*Pourpier*).

Neck. 1790. El. II. p. 381. n. 1194: g. Ypsoophytor. Sejungitur Merida.

Cram. 1803. Disp. p. 92: in Octandr. Monogyn.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1828. Consp. p. 163. n. 4312: g. Talinear.

Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: g. Portulacellar. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 273; 1841. Nom. p. 163. n. 6350. — Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94).

Lindl. 1836. Nat. syst. p. 123; 1847. Veg. kd. p. 501: g. Portulacacear. — Par. Webb . . . . Canar. I. p. 169. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 196. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 23.

Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 294: g. Sesuviear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5174. p. 949; 1841. Ench. p. 501. — Walp. 1843. Rep. II. p. 233; 1846. V. p. 785. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 145. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1060. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 6.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 105: g. Calandriniear.

Synon. Meridiana Linn.; Merida Neck.; Lemia Vand.

Portulacaceae Rchb. 1828. Consp. p. 161; 1832. Fl. exc. p. 563; 1837. Hdb. p. 234; 1841. Nom. p. 161: fam. Rosiflorar. Divis.: Paronychieae, Polygoneae, Portulaceae.

Portulacaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 123; 1847. Veg. kingd. p. 500: ordo Silenalium. Gen. Portulacariear. et Calandriniear. Endl. et Portulaca.

Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 195: ordo Dicotyledonum. Gen. novum: Calyptridium.

= Portulaceae Juss.

Portulacae Adans. 1763. Fam. II. p. 235: fam. 32 plant. Gen. §. 1: Samolus, Claytonia, Portulaca, Manettia, Mesembryum, Gasoul, Vossia, Hariota, Opuntia, Cereus, Moscatella, Sciodaphyllum, Grossularia, Saxifraga, Mitella, Heuchera, Turnera, Reaumuria, Begonia, Hydrangea, Syringa, Datisca, Suzygium, Ludolfia, Dantia, Chrysosplenium. §. 2: Remé, Veslingia, Penthorum, Talinum, Rossolis, Cressa, Vistnu, Nama, Cuscuta.

Portulacaria Jacq. 1786. Coll. I. p. 160: nov. g. Pentandr. Trigyn. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 85. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 203. n. 522. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1515. n. 584; 1809. En. p. 332. — Cram. 1803. Disp. p. 64. — Pers. 1805. Ench. I. p. 331. n. 744. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 49 (*Portulaccaria*); ed. Schrank 1819. p. 52.

Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 69: g. Thalamostemonis. (Claytonia Portulacaria L.)

Hedw. 1806. Gen. p. 210. n. 863: g. Portulacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 840; 1825. Syst. I. p. 947. n. 1129; 1830. Gen. I. p. 232. n. 1222. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXV. 684. — Link 1821. En. I. p. 292; 1831. Hdb. II. p. 44. — DC. 1828. Pr. III. p. 360. — Bartl. 1830. Ord. p. 304. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 80. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 232. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1009.

Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4316; 1837. Hdb. p. 237: g. Talinear.

Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: g. Steudeliear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95).

Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 294: g. Portulacariear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5175. p. 950; 1841. Ench. p. 501. — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6355.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 105: g. Calandriniear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 501: g. Portulacacear.

Synon. Hänkea Salisb.

Portulacarieae Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 294: trib. Portulacear. Gen.: Portulacaria. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 949; 1841. Ench. p. 501. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 441. Gen. id.

Rchb. 1841. Nom. p. 164: subsect. Talinear. Gen. id.

Portulacastrum „Juss.“ Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 99. (Trianthema monogyna L., Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 255.)

= Trianthemae sect. Rocama.

Portulacca Haworth, Schrank, Elliott vid. *Portulaca Tourn.*

Portulaccaria Haworth, Schrank vid. *Portulacaria Jacq.*

Portulaccellae Meisn. vid. *Portulacellae Fenzl.*

Portulaceae Juss. 1789. Gen. p. 312: ordo 4 class. XIV. Gen. §. 1: Portulaca, Talinum, Turnera, Bacopa, Montia, Rokejeka, Tamarix, Telephium, Corrigiola, Scleranthus, Gymnocarpus. §. 2: Trianthema, Limeum, Claytonia, Gisekia. *Cf.* Cassel 1810. Nat. Fam. p. 137 et Juss. 1826. Dict. v. 43. p. 86.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 258: ordo 1 class. XIV. Gen. §. 1: Portulaca, Talinum, Claytonia, Montia, Telephium, Corrigiola, Scleranthus. §. 2: Trianthema, Limeum, Gisekia.

Batsch 1802. Tab. p. 36: fam. Difformariar. Gen.: Claytonia, Portulaca, Talinum, Bacopa, Montia, Telephium, Corrigiola, Drypis, Trianthema, Limeum, Sesuvium.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 137. t. 96. Gen. ut Juss. Accedit Miltus.

Portulaceae Juss. cont.
DC. 1805. Franç. IV. p. 398: fam. (65) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Tamarix, Telephium, Corrigiola, Portulaca, Montia, Scleranthus. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 897. Typi sectionum: Portulaca, Thelephium, Corrigiola.
St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 195. (Placenta centralis.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 839: fam. 93 plant. Gen. §. 1: Portulaca, Talinum, Portulacaria, Montia, Claytonia, Cypselea, Telephium, Corrigiola. §. 2: Trianthema, Limeum, Nevrada, Gisekia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246; 1828. Mém. soc. h. n. Par. IV. p. 174; 1828. Pr. III. p. 351: ordo (85) Calyciflorar. Gen. (1828): Trianthema, Cypselea, Portulaca, Anacampseros, Talinum, Calandrinia, Portulacaria, Ullucus, Claytonia, Montia, Leptrina, Gingirsia, Aylmeria; Hydropyxis? — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 71. Gen. ut DC. et Grahamia, Lewisia, Colobanthus.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 543: fam. Calyciflorar. Gen.: Montia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: ordo Succulentar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: fam. Rosiflorar. Divis.: Sclerantheae, Paronychieae, Polygoneae, Samoleae, Corrigiolaceae, Talineae, Trianthemeae.
Rchb. 1828. Consp. p. 163: div. Portulacacear. Subdivis.: Telephieae, Montinieae, Talineae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 574. Subdivis.: Telephieae, *genuinae* (gen.: Montia, Portulaca). — Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 163. Subdivis.: Telephieae, Sesuvieae, *genuinae* (sect.: Montieae, Portulacellae, Talineae).
Bartl. 1830. Ord. p. 303: ordo (174) Caryophyllinar. Gen. ut DC. (exceptis 3 ultimis) et Crypta? — Par. Endl. 1839. Gen. p. 946; 1841. Ench. p. 499. Trib. ut Fenzl 1839.
Link 1831. Hdb. II. p. 42: ordo 11 Perigynar. Gen.: Portulaca, Anacampseros, Talinum, Portulacaria, Claytonia, Montia.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo Silenalium.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 221: fam. (73) Caryophyllinear. Gen.: Basella, Portulaca, Anacampseros, Talinum, Cistanthe, Calandrinia, Grahamia, Portulacaria, Ullucus, Claytonia, Montia, Leptrina, Crypta? — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 105. Trib.: Mollugineae, Calandrinieae.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351. Trib.: Steudelieae, Portulacellae, Talineae.
Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94): ordo 92 plant. (p. 438 Caryophyllinar.) Trib. ut Fenzl 1836.
Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 285. Trib.: Tetragonieae, Aizoideae, Sesuvieae, Portulacarieae, Calandrinieae, Mollugineae, Polpodeae, Adenogrammeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 440. Trib. ut Fenzl 1839.
Synon. Portulacaceae Lindl.

Portulacellae Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: trib. Portulacear. Gen.: Cypselea, Portulaca, Sesuvium, Trianthema. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94). Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 237; 1841. Nom. p. 163: sect. Portulacear. genuinar. Gen.: Portulaca.

Portuna*) Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 268: nov. g. Andromedear. (Andromeda floribunda Pursh.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1115.

Posanthus „Rafin." Endl. Ench. p. 273 in synon. Isertiae: vid. *Phosanthus Rafin.*

Posidonia**) Konig 1806. Ann. of bot. II. p. 95. t. 6: g. pro *Zostera Caul.* substitutum et exacte definitum.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 116; 1825. Syst. I. p. 181. n. 205; 1830. Gen. I. p. 46. n. 214: g. Najadum. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 111.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XX: g. Typhear.
Rchb. 1828. Consp. p. 43. n. 757: g. Zosterear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 477.
Bartl. 1830. Ord. p. 72: g. Najadear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1660. p. 231; 1841. Ench. p. 125. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 65. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 227.
Rchb. 1832. Fl. exc. Add. p. 137: g. Potamogetonear.
Kunth 1841. Enum. III. p. 121: g. Posidoniear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 14.
Rchb. 1841. Nom. p. 31. n. 1071: g. Zosteracear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 145. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 323.
Synon. Zostera Caulin.; Caulinia DC.; Kernera Willd.

Posidonieae Kunth 1841. Enum. pl. III. p. 120: trib. Fluvialium. Gen.: Thalassia, Posidonia.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 14: trib. Najadear. Gen. ead. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 565. Gen. ead.

Posoqueria***) Aublet 1775. Guian. I. p. 133. t. 51: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. longiflora.) — Par. Roxb. 1824. Ed. Wall. II. p. 562; ed. 1832. I. p. 712.
Juss. 1789. Gen. p. 201; 1820. Mém. Mus. VI. p. 389: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 439. — Hedw. 1806. Gen. p. 144. n. 622. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVI. 227. n. 915. — Link 1821. En. I. p. 225. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 89. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 979. Injungitur Oxyanthus DC. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 197. (sect. incert.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 609: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2074.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80 (*Posoria*): g. Allodiniae.

---

*) „Nomen indicat affinitatem cum Leucothoë."
**) *Ποσειδῶν*, deus oceani.
***) Nomen caribaeum: *Aymara-posoqueri.*

Posoqueria Aublet cont.
DC. 1830. Pr. IV. p. 375: g. Gardeniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 493. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 407. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2965. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3308. p. 562; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 520; 1847. VI. p. 86.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Synon. Ramspekia Scop.; Cyrtanthus Schreb.; Kyrtanthus Gmel.; Solena Willd.

Posoria Rafin. vid. *praeced.*

Possira Aublet 1775. Guian. II. p. 934. t. 355: nov. g. Polygam. Monoec. (P. arborescens.)
Scop. 1777. Introd. p. 314: g. Anomalar.
Swartz 1788. Prodr. p. 5. 81: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 797.
Juss. 1789. Gen. p. 351: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 211. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 90.
Gis. 1792. Prael. p. 376: g. Putaminear.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear. (pars Swartziae.)
DC. 1825. Pr. II. p. 422: sect. Swartziae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 379. — Vogel 1837. Linnaea XI. p. 168. — Endl. 1841. Gen. n. 6814 *b*. p. 1322; 1841. Ench. p. 681. — Walp. 1842. Rep. I. p. 842.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4160: g. Swarziear.
Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6111: g. Swartziear.
Synon. Rittera Schreb.; Hölzelia Neck.

Possura „Aubl." Steud. 1841. Nomencl. II. p. 383: g. Berberidear.? (P. guianensis.) Quid?

Postanthereae Benth. in DC. Prodr. XII. p. 30: sphalm. pro *Prostanthereae*.

Postelsia Ruprecht 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. Bot. p. 75. t. 6: nov. g. Algar., Nereocystidi proximum. (P. palmaeformis.)
Synon. Virginia Aresch.

Potalia Aublet 1775. Guian. II. p. 394. t. 151: nov. g. Decandr. Monogyn. (P. amara.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 466. n. 1049. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 286. n. 1540.
Scop. 1777. Intr. p. 192: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 143: g. Gentianis aff.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 325: g. Gentianeis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 318. n. 1255.
Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 92: g. Gentianear.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 89. t. 170: g. Potaliear. *Cf.* Flora 1827. I. p. 371. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 335. n. 1693. — Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 133. n. 5141. — Endl. 1838. Gen. n. 3369. p. 577; 1841. Ench. p. 289. — Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168). — DC. 1845. Pr. IX. p. 36.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3507: g. Loganiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 206. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 484.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 67: g. Potaliacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 51: g. Strychnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Loganear.
Synon. Nicandra Schreb.

Potaliaceae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (193) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 29: ordo Loganialium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 306.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 67: ordo Corollaeflorar. Gen.: Potalia, Anthocleista, Fagraea.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425: fam. a Loganiaceis disjuncta. Gen.: Potalia, Anthocleista.

Potalieae Martius 1827. Nov. gen. II. 2. p. 91. 133: nov. ordo plant. Gen.: Fagraea, Potalia, Anthocleista.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211: subdiv. Carissear. Gen. ead.
Endl. 1838. Gen. p. 576; 1841. Ench. p. 289: trib. Loganiear. Gen. ead. et Picrophloeus.
Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168): subordo Loganiacear. Gen.: Potalia, Anthocleista. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 36. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 133: sect. Loganiear. Gen.: Fagraea, Picrophloeus, Potalia.

Potamea Batsch 1802. Tab. affin. p. 122: fam. Dialium. Gen.: Butomus, Damasonium, Alisma, Sagittaria.

Potameae Link 1821. En. I. p. 147; 1822. II. p. 18. 395: fam. plant.
Juss. 1826. Dict. v. 43. p. 93. (= *Fluviales Vent.*)
Koch 1837. Syn. p. 671. Ed. II. p. 774: ordo Endogenear. Gen.: Potamogeton, Ruppia, Zanichellia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 144; 1841. Nom. p. 33: div. Potamogetonear. Gen. ut Koch et Halodule, Cycnogeton, Althenia.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 476: trib. Najadear. Gen.: Potamogeton, Zannichellia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: fam. Aperispermear.
Math. 1853. Belg. I. p. 506: fam. Monocotyledonear. Gen.: Potamogeton, Ruppia, Zanichellia, Zostera, Caulinia, Nayas.
Gay 1854. Compt. rend. Ac. Par. XXXVIII. p. 702. Gen. §. 1: Potamogeton, Spirillus, Grönlandia. §. 2: Zannichellia, Althenia.

Potameia*) Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 16 in Römer Collect. bot. p. 199: nov. g. Lauror. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 94 (*Potamica*). — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 31. 476. n. 579. (?)
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1915 (sph. *Potameia*): g. Laurear.
Bartl. 1830. Ord. p. 112: g. Laurinear.
Endl. 1838. Gen. p. 340; 1847. Spl. IV. p. 81. n. 2137/$_1$: g. Persooniear.? — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401. — Rchb.

*) ποταμός, fluvius.

Potameia Petit-Thouars cont. 1841. Nom. p. 64. n. 2414. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 328.

Meisn. 1841. Gen. p. 332 (244): g. Proteinear.

Potamica „Pet.-Th.“ Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 94: vid. *Potameia Pet.-Thouars.*

Potamobryon Liebm. 1849. Forh. skand. Naturf. V. p. 512: nov. g. Podostemear.

Potamochloa Griffith 1836. Journ. soc. Beng. V. p. 571: nov. g. Graminear., Zizaniae aff. (Pharus aristatus Retz.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 371.

Endl. 1841. Spl. I. n. $728/_2$. p. 1352; 1841. Ench. p. 56: g. Oryzear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1249. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 4.

Potamogeae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XX: fam. Limnobiar. Gen.: Zostera, Zannichellia, Ruppia, Potamogeton.

Rchb. 1828. Consp. p. 43. div. Potamogetonear. Gen.: Zannichellia, Ruppia, Graumüllera, Potamogeton.

Potamogeteae Salisb. 1812. Hortic. trans. I. (1815.) p. 267: ordo Monocotyledonum. Gen.: Triglochin.

Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272): trib. Najadear. Gen.: Ouvirandra, Cycnogeton, Potamogeton.

Potamogeton*) Tourn. 1700. Inst. p. 232. t. 103: g. pl. class. V.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 59. Ed. Hall. 1745. p. 64: g. pl. class. IV.

Linn. 1737. Gen. p. 33. n. 92; 1737. Cliff. p. 40; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 126; 1759. Syst. ed. X. p. 901. n. 160; 1762. Sp. ed. II. p. 182; 1764. Gen. ed. VI. p. 67. n. 174; 1767. Syst. ed. XII. p. 130: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 117. — Murr. 1774. Syst. p. 141; 1784. Syst. p. 168. — Reich. 1778. Gen. p. 70. n. 186. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 92. n. 234. — Gmel. 1791. Syst. p. 288. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 32; 1818. Fl. cap. I. p. 578. — Pers. 1797. Syst. p. 174; 1805. Ench. I. p. 152. n. 341. — Willd. 1797. Sp. I. p. 712. n. 269; 1809. En. p. 173. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 111. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 834. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 471; ed. 1832. I. p. 451. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 377. 463.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. p. 199: g. ordinis 8 Apetalar. staminiferar.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 27. n. 107: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 306.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Inundatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 66. — Gis. 1792. Prael. p. 326. — Batsch 1802. Tab. p. 161.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Aroidear.

Adans. 1763. Fam. II. p. 468: g. Aror.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 33: g. Incompletar.

*) ποταμός, fluvius; γείτων, vicinus.

Potamogeton Tourn. cont.

Hill 1769. Ht. kew. p. 339: g. Tetrapetalar. incompletar.

Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462: g. Aracear.

Juss. 1789. Gen. p. 19: g. Naiadum. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 37. 503. n. 609.

Neck. 1790. El. III. p. 277. n. 1668: g. Catabophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 81: g. Fluvialium. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 52. — Hedw. 1806. Gen. p. 85. n. 392. — Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 370. — Kunth 1822. Syn. I. p. 134; 1838. Berol. II. p. 309.

DC. 1805. Franç. III. p. 183; 1815. V. p. 310: g. Alismacear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 343. Ed. Nees p. 199. — D. Don 1825. Nepal. p. 21. — Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 98 (*Potemot*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 556.

Rich. 1808. Anal. fr. Ed. Voigt p. 46: g. Potamophilar. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 103. — Cham. & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 157. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 156.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 121; 1825. Syst. I. p. 498. n. 566: g. Najadum. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 111.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 33 (*Potamogiton*): g. Fluviatilium.

Link 1821. En. I. p. 147: g. Potamear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 671. Ed. II. p. 774. — Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1137. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 476. — Math. 1853. Belg. I. p. 506. — Gay 1854. Compt. rend. Ac. Par. XXXVIII. p. 702. (sect. 1.) — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 311.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 63.

Agdh. 1822. Aphor. p. 124: g. Najadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 72. — Endl. 1837. Gen. n. 1664. p. 231; 1841. Ench. p. 152. — Brongn. 1843. En. genr. p. 29. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 59. 67 (1846. p. LXIX); 1845. Syn. p. 177. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 444. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 22. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 228.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: g. Naiadear. — Par. Webb . . . . Canar. III. p. 299.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XX; 1828. Consp. p. 43. n. 763: g. Potamogear. Sect.: Peltopsis, Potamogeton.

Link 1829. Hdb. I. p. 283: g. Hydrogetonum.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 117. n. 596: g. Alismear.

Rchb. 1830. Fl. exc. p. 7: g. Potamogetonear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 127. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 15.

Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272): g. Potamogetear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 210: g. Juncaginacear.

Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 236: g. Naiadacear.

Synon. Fontilapathum Lobel.; Hydrogeton Lour.; Peltopsis Rafin.

Potamogeton Walt. Fl. car. p. 90.
= Myriophyllum Linn. (DC. Pr. III. p. 69.)

Potamogetoneae Rchb. 1828. Consp. p. 43: fam. Limnobiar. Divis.: Zostereae, Potamogeae. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 6. Gen.: Zostera, Ruppia, Zannichellia, Potamogeton.
Rchb. 1837. Hdb. p. 144: div. Alismacear. Subdivis.: Lemneae, Zannichelleae, Potameae.
Kunth 1841. Enum. III. p. 126: trib. Fluvialium. Gen. unicum: Potamogeton.
Rchb. 1841. Nom. p. 33: fam. Helobiar. Divis.: Lemneae, Potameae, Ouvirandreae.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 15: trib. Najadear. Gen.: Potamogeton. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 566. Gen. id.

Potamogiton „Diosc." Gray vid. *Potamogeton Tourn.*

Potamophila R. Brown 1810. Prodr. I. p. 211. Ed. Nees p. 67: nov. g. Graminear. (P. parviflora.) — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 127. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 136. n. 1331; 1830. Gen. I. p. 282. n. 1460. (in Hexandr. Digyn.) — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 97 (*Potamophylla*).
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1830. Gram. p. 6; 1833. Agrost. p. 8: g. Oryzear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 152. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 957; 1841. Nom. p. 36. n. 1251. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXXVII. 1366. — Endl. 1836. Gen. n. 730. p. 78; 1841. Ench. p. 56. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 231. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 4.
Trin. 1820. Fund. p. 206: g. Monoec. Hexandr.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 672): g. Vilfaceor.
Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 181: g. Oryzeor.

Potamophila Schrank 1819. Hort. Monac. II. t. 63; 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II (Isis 1823. p. 852): nov. g. Pentandr. Pentagyn.
= Microtea Swartz.

Potamophilae Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. 46: nov. ordo plant. Gen.: Ruppia, Potamogeton, Zannichellia, Najas, Zostera.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXX: div. Tripetaloidear. Gen.: Alisma, Sagittaria, Ruppia, Potamogeton, Zannichellia.

Potamophylla Poir. vid. *Potamophila R. Brown.*

Potamophyllites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 117; 1828. Prodr. p. 114: g. foss. Nayadum.
Endl. 1837. Gen. n. 1667. p. 232; 1841. Ench. p. 125: g. Najadear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. p. 178; 1846. Chlor. prot. p. (69) LXIX.
Synon. Phyllites Brongn.; Bibliolithes Schloth.

Potamophyllites Nilsson 1831. Act-Holm. t. 3; .... Lethaea suec. p. 110. t. 34. f. 4.
= Zosterites Brongn.

Potamopiatus Walp. vid. *seq.*

Potamopithys Seub., Walp. vid. *seq.*

Potamopitys Adans. 1763. Fam. II. p. 256: g. Alsinium. *Cf. seq.*
Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6631. 2: sect. Elatines. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 284 (*Potamopiatus*); 1846. Rep. V. p. 86 (*Potamopithys*). — Seub. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 56 (*Potamopithys.*) — Endl. 1850. Spl. V. p. 71. n. 5475 *c.*
= Alsinastrum Tourn.

Potamopytis Buxbaum 1726. Comm. Ac. Petrop. I. p. 243: nov. g. plantar.
= Alsinastrum Tourn.

Potamoxyris Seubert 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 212: sect. Xyridis.

Potarcus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 107: nov. g. Algar., Rivulariae aff. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 101.

Potatoe Dunal 1816. Solan. syn. p. ... : sect. Solani. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 400. — Walp. 1845. Rep. III. p. 38.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 31: subsect. Tuberarii.
= Battata Hill.

Potemogeton „Rafin." Rchb. Consp. n. 763 *b:* sphalm. pro *Potamogeton.*

Potentilla Linn. 1737. Gen. p. 147. n. 415; 1737. Cliff. p. 193; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 495; 1759. Syst. ed. X. p. 1063. n. 559; 1762. Sp. ed. II. p. 709; 1764. Gen. ed. VI. p. 255. n. 634; 1767. Syst. ed. XII. p. 350: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 357. — Murr. 1774. Syst. p. 396; 1784. Syst. p. 477. — Reich. 1778. Gen. p. 260. n. 690. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 342. n. 866. — Lour. 1790. Coch. I. p. 326. — Pers. 1797. Syst. p. 512; 1805. Ench. I. p. 53. n. 1241. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1094. n. 1000; 1809. En. p. 552. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 310. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 295. 369. Sect.: Fragariastrum, Triphyllon, Pentaphyllon, Anserina.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 338: g. Gymnopolyspermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 277. n. 1143: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 656.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 3; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 321.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 187. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 235. Sect.: Pentaphyllum, Thermophyllum. — Link 1822. En. II. p. 63. — D. Don 1825. Nepal. p. 229. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1105. — Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 141. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 416. n. 2077. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 178. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 445. Sect.: Tormentilla, Potentilla. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 53.
Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.

Potentilla Linn. cont.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 180: g. Calicyflorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 185: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 221: g. Calycanthemar.
Juss. 1789. Gen. p. 338: g. Potentillar. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 300.
Neck. 1790. El. II. p. 93. n. 756: g. Sarcodiphytor. Disjungitur Tridophyllum.
Gmel. 1791. Syst. p. 857: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 232.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 346: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 455; 1815. V. p. 450. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 580. — Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 571. Sect.: Potentillastrum, Comarum, Fragariastrum. — Bartl. 1830. Ord. p. 402 (inclusa Tormentilla). — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 233. — Link 1831. Hdb. II. p. 101. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 549. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 185. (ut Nestl.) — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 469. — Koch 1836. Syn. p. 212. Sect.: Potentilla, Fragariastrum. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 235 (inclusa Tormentilla). Sect. ut antea. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 97. Sect. ex Ser. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 522. — Lehm. 1851 in Walp. Ann. bot. II. p. 468. (Monogr.)
Nestl. 1816. Mon. Potent. p. 17. 22: g. Fragariacear. (includens Tormentillam et Comarum.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 863; 1825. Syst. II. p. 533. n. 1864: g. Potentillear. — Par. Tausch 1823. Ht. Canal. I. Divis.: Geoides, Pentaphylloides, Comarum, Quinquefolium, Lupinoides, Tormentilla. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII (injuncto Comaro); 1828. Consp. p. 167. n. 4436 (sect.: Fragariastrum, Potentillastrum, Trichothalamus); 1832. Fl. exc. p. 589; 1841. Nom. p. 168. n. 6498. (genuinar.) — Kunth 1838. Berol. I. p. 184.
Lehm. 1820. Mon. gen. Potent. *Cf.* Spreng. N. Entd. II. p. 296.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 215: g. Potentillacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 464.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 436: g. Fragariear. Sect.: Eupotentilla, Anserina, Comocarpa, Closterostyles. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6363. p. 1242; 1841. Ench. p. 659. Sect.: Tormentilla, Potentilla. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 35. — Walp. 1846. Rep. V. p. 651. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 663.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.
Synon. Quinquefolium et Pentaphylloides Tourn.; Argentina Blackw.; Bootia Big.; Trichothalamus Lehm.; Dactylophylli Spenn. pars; Fraga Lapeyr. (Steud.)

Potentillaceae HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 215: sect. Rosacear. Gen.: Potentilla, Fragaria, Rubus. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 464. Gen. ead.

Potentillae Juss. 1789. Gen. p. 337: sect. Rosacear. Gen.: Tormentilla, Potentilla, Fragaria, Comarum, Geum, Dryas, Rubus.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 298: subordo Rosacear.

Potentillastrum Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 571: sect. Potentillae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4436 *b.* — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 97. — Walp. 1846. Rep. V. p. 651.
= Pentaphyllum Gärtn.

Potentilleae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 863: div. Rosacear. Gen.: Potentilla, Geum, Sieversia, Waldsteinia, Fragaria, Duchesnea; Dryas, Dalibarda, Rubus. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII. Gen.: Agrimonia, Aremonia, Sibbaldia, Tormentilla, Potentilla, Camaropsis, Dalibarda, Waldsteinia, Geum, Dryas; Fragaria, Rubus. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 588. Gen.: Sibbaldia, Tormentilla, Potentilla, Comarum, Fragaria, Waldsteinia, Geum, Sieversia, Dryas, Rubus. — Rchb. 1837. Hdb. p. 243. Subdivis.: *genuinae* (gen. Potentillear. 1828 exclusis 2 ultimis), Rubeae, Spiraeeae. — Kunth 1838. Berol. I. p. 184. Gen.: Potentilla, Tormentilla, Comarum, Fragaria, Geum, Rubus. — Rchb. 1841. Nom. p. 167. Subdivis.: Dryadeae, Rubeae, Spiraeeae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; Isis 1826. p. 592: ordo Icosandrar.
Rchb. 1828. Consp. p. 167: subdiv. Pomacear. Gen.: Sibbaldia, Horkelia; Tormentilla, Potentilla, Comarum, Fragaria, Dalibarda, Cowania, Comaropsis, Waldsteinia, Sieversia, Biebersteinia, Geum, Dryas, Cylactis, Rubus.

Potentilleae genuinae Rchb. 1841. Nomencl. p. 167: sect. Dryadear. Gen.: Fragaria, Duchesnea, Comarum, Potentilla, Tormentilla.

Potentillidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 564: trib. Rosacear. Gen. Dalibardear., Fragariear. et Chamaerhodear. Endl. et Agrimonia, Aremonia, Purshia, Cercocarpus, Waldsteinia, Comaropsis, Sieversia, Fallugia, Geum, Cowania, Coluria, Dryas.

Potentillopsis Opiz 1857. Lotos p. 30: nov. g. pro Potentilla pentandra Engelm. propositum.

Poteranthera*) Bongard 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 137. t. 4: nov. g. Melastomacear. (P. pusilla.)
Endl. 1840. Gen. n. 6194. p. 1210; 1841. Ench. p. 646: g. Rhexiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6702. — Meisn. 1843. Comm. p. 355. — Walp. 1846. Rep. V. p. 689. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 278: g. Lasiandralium.

Poteridium Spach 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 43: nov. g. ex typo Sanguisorbae annuae Torr.

Poterieae Rchb. 1837. Handb. p. 242; 1841. Nomencl. p. 167: sect. Sanguisorbear. ge-

*) ποτήρ, poculum.

Poterieae Rchb. cont.
nuinar. Gen.: Poterium, Sanguisorba, Acaena, Polylepis, Margyricarpus et 1841 Ancistrum, Tetraglochin.

Poterium Linn. 1737. Gen. p. 289. n. 722; 1737. Cliff. p. 445; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 288; 1753. Sp. II. p. 994; 1759. Syst. ed. X. p. 1271. n. 948; 1763. Sp. ed. II. p. 1411; 1764. Gen. ed. VI. p. 495. n. 1069; 1767. Syst. ed. XII. p. 629: g. Monoec. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 716; 1784. Syst. p. 857. — Reich. 1778. Gen. p. 491. n. 1167. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 645. n. 1445. — Pers. 1797. Syst. p. 901; 1807. Ench. II. p. 566. n. 2099. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 421. n. 1691; 1809. En. p. 973. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 6. 157.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 231. n. 953: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 185. — Link 1822. En. II. p. 396. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 611. n. 1976; 1830. Gen. I. p. 445. n. 2202. — Lois. 1826. Dict. v. 40. p. 490 (*Pimprenelle*).
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Miscellanear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594.
Scop. 1777. Intr. p. 222: g. Calycanthemar.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 230: g. Polyandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 832. — Rebent. 1804. Neom. p. 219.
Juss. 1789. Gen. p. 336: g. Sanguisorbar.
Neck. 1790. El. II. p. 101. n. 769: g. Sarcodiphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 696: g. Calycostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 340: g. Agrimoniear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 610.
Batsch 1802. Tab. p. 10: g. Senticosar.
DC. 1805. Franç. IV. p. 448: g. Agrimoniacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 575.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 861: g. Sanguisorbear. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54. — DC. 1825. Pr. II. p. 594. Sect.: Leiopoterium, Rutidopoterium. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII. — Link 1831. Hdb. II. p. 114. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 594. Sect. ut DC. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 248; 1844. Ross. II. p. 26. — Koch 1836. Syn. p. 232. Ed. II. p. 258. — Kunth 1838. Berol. I. p. 181. — Endl. 1840. Gen. n. 6374. p. 1244; 1841. Ench. p. 659. Sect. ut DC. (1840 Rytidopoterium.) — Webb . . . . Canar. II. p. 9. — Walp. 1843. Rep. II. p. 44; 1848. Ann. bot. I. p. 282. Sect. ex Spach. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 562. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 665.
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4422: g. Rosear. Sect. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 403: g. Dryadear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 487. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 125. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 108. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 191 (*Pimprenelle*).

Poterium Linn. cont.
Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74): g. Alchemillear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 242; 1841. Nom. p. 167. n. 6477: g. Poteriear. Sect. (1841): Poterium, Leiopterium.
Spach 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 31. (Monogr.) Sect.: Pimpinelloides, Agrimonioides, Sanguisorboides, Ancistroides. (Excluditur sect. Leiopoterium.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 562: g. Sanguisorbacear.
Synon. Pimpinella Adans.

Potha „Herm. Mus. zeyl. p. 6" Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 197.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 156. n. 329 (Nov. gen. zeyl. p. 13. n. 1067): g. Gynandr. Polyandr. *Cf. Phantis Linn.*

Pothoinae Rchb. 1828. Consp. p. 44: subdiv. Callacear. Gen.: Dracontium, Pothos.
Bartl. 1830. Ord. p. 67: div. Callacear. Gen.: Pothos.
Schott 1832. Melet. p. 21: subtrib. Orontiacear. Gen.: Pothos, Lasia, Anthurium, Spathiphyllum. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 239; 1841. Ench. p. 129. Gen. ead. — Kunth 1841. Enum. III. p. 64. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269). Gen. ead.

Pothomorphe Miquel 1839. Bull. Néerl.; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 170; 1840. Comm. phyt. p. 36; 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 286; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 25: nov. g. Piperear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2569. (genuinar.) — Miq. 1843. Syst. Piperac. p. 202. (spuriar.) — Endl. 1847. Spl. IV. p. 15. n. 1822.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1820 *d.* p. 1374; 1841. Ench. p. 149 (*Potomorphe*): sect. Piperis.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 11: g. Piperacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 360.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar.
Synon. Heckeria Kunth.

Pothopsis Miquel 1855. Fl. Ind. bat. III. p. 187: subg. Scindapsi. (S. sylvestris Kunth.)

Pothos*) Linn. 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 137; 1753. Sp. II. p. 968; 1759. Syst. ed. X. p. 1252. n. 918; 1763. Sp. ed. II. p. 1373; 1764. Gen. ed. VI. p. 472. n. 1031; 1767. Syst. ed. XII. p. 605: g. Gynandr. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 691; 1784. Syst. p. 829. — Reich. 1778. Gen. p. 467. n. 1122. — Lour. 1790. Coch. p. 532. — Pers. 1797. Syst. p. 873.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Piperitar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 123.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor.
Gled. 1764. Syst. p. 127. n. 526: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 68 (*Potos*): g. Spadicear.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 85. n. 210: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 274. — Willd. 1797. Sp. I. p. 684. n. 245; 1809. En. p. 168. — Pers. 1805.

*) πόθος Theophrasti Silenae species.

Pothos Linn. cont.
Ench. I. p. 147. n. 313. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 16. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 451; ed. 1832. I. p. 430.
Juss. 1789. Gen. p. 24: g. Aroidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 159. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 58. — Hedw. 1806. Gen. p. 75. n. 354. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 75. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 126; 1826. Syst. III. p. 766. n. 3058; 1831. Gen. II. p. 681. n. 3433. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 28. 451. n. 563. — Link 1821. En. I. p. 109; 1829. Hdb. I. p. 268. — Kunth 1822. Syn. I. p. 125. — Agdh. 1822. Aphor. p. 132. — D. Don 1825. Nepal. p. 21. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 148. — Schott 1829. Wien. Zeitschr. III. p. 828. (Char. reform.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 53. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 135.
Neck. 1790. El. III. p. 293. n. 1689: g. Emproophytor.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 186: g. Monoec. Polyandr.
Salisb. 1812. Hortic. trans. I. p. 267: g. Dracontear.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 775; 1841. Nom. p. 32. n. 1112: g. Pothoinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 68. — Schott 1832. Melet. p. 21. — Endl. 1837. Gen. n. 1700. p. 239; 1841. Ench. p. 129. — Kunth 1841. Enum. III. p. 65. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269).
Rich. 1833 in Guillem. Arch. bot. I. p. . . .: g. Orontiacear. — Par. De Vriese 1851. Pl. Jungh. I. p. 102.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 33: g. Orontiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 194. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 177. Subgen. ut Schott et Goniurus. *Cf* Müll. Ann. bot. V. p. 909.
Schott 1855. Östr. bot. Woch. p. 18. Sect.: Eupothos, Allopothos.
Synon. Tapanava Adans.; Adpendix Rumph.
Pothos Adans. 1763. Fam. II. p. 57: g. Narcissor. = Polianthes Linn. (Steud.)
Pothosites Peterson 1841. Trans. Edinb. soc. I. p. 45: nov. g. pl. foss.
Pothuava Gaudich. Voy. Atl. t. 116. 117: g. Bromeliacear. indescriptum. = Hoplophytum Beer.
Potima*) Pers. 1805. Enchir. I. p. 209: sect. Coffeae. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 200.
Hedw. 1806. Gen. p. 143. n. 618: g. Pentandr. Monogyn.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Lentaginiae. = Tetramerium Gärtn.
Potomorphe Endl. vid. *Pothomorphe Miq.*
Potos Scopoli vid. *Pothos Linn.*
Pottia**) Ehrhart 1787. Beitr. I. p. 175: nov. g. Muscor.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 584 *a*: sect. Gymnostomi.

*) πότιμος, potabilis.
**) Dicat. J. Fr. Pott, Brunsvicensi.

Pottia Ehrhart cont.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Desmatodontoidear.
Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. 18—20: g. Pottiacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 96. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 373. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402. — Bayrh. 1849. Taun. p. 7. — Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 546. Sect.: Anacalypta, Eupottia, Hyophila, Hymenostylium.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 94: g. Pottiear.
Pottiaceae Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. 18—20 (II. p. III): fam. Muscor. Gen.: Pottia, Anacalypta, Desmatodon.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 95: subsect. Desmatodontear. Gen.: Fiedleria, Pottia, Anacalypta.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen.: Pottia, Anacalypta.
Bayrh. 1849. Taun. p. 7: fam. Muscor. frondosor. Gen. ut Mont.
Pottiaceae C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 546: subtrib. Pottioidear. Gen.: Pottia, Schistidium, Trichostomum, Barbula, Ceratodon, Tridontium, Weisia.
Pottiaceae Spruce 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 373: trib. Acrocarpor. Gen.: Acaulon, Phascum, Pottia, Anacalypta, Desmatodon.
Pottieae Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 94: div. Bryacear. Gen.: Anacalypta, Pottia.
Pottioideae C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 512: trib. Acrocarpor. Subtrib.: Calymperaceae, Pottiaceae, Orthotrichaceae.
Pottsia Hook. & Arn. 1836. Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 198. t. 43: nov. g. Apocynear. (P. Cantonensis.)
Endl. 1838. Gen. n. 3421. p. 585; 1841. Ench. p. 295: g. Echitear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5161. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 441. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 450.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.
Synon. Parsonsia Wall.
Pouchetia*) A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 251: nov. g. Gardeniar. (P. africana.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 393: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 506. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 2951. (genuinar.)
Endl. 1839. Gen. n. 3294. p. 560; 1841. Ench. p. 274: g. Eugardeniear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 721: g. Rubiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Poupartia**) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 372: nov. g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 256. — Hedw. 1806. Gen. p. 338. n. 1330.

*) Dicat. Pouchet, prof. botan. Rouen.
**) Arbor borbonica *„Bois de Poupart"* dicta.

Poupartia Comm. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 728: g. Decandr. Pentagyn.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Pers. 1805. Ench. I. p. 509. n. 1135: g. Terebinthacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1160. — Spreng. 1827. Cur. post. p. 158.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 364 (Gen. Tereb. p. 32): g. Spondiacear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 47 adnot. — DC. 1825. Pr. II. p. 75. — Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3855. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 79. — Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55). — Endl. 1840. Gen. n. 5921. p. 1134; 1841. Ench. p. 599. — Walp. 1846. Rep. V. p. 418. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 469 (sph. *Ponpartia*).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 383. n. 1930: g. Terebinthear.
Bartl. 1830. Ord. p. 394: g. Burserear.
Spach 1834. Gen. syst. II. p. 230: g. Burseracear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 146. n. 5675: g. Spondiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467: g. Anacardiacear.

Pouretia Lindl. vid. *seq.*

Pourettia Endl. vid. *Pourretia Ruiz & Pav.*

Pourouma*) Aublet 1775. Guian. II. p. 891. t. 341: nov. g. Dioec. Monandr. (P. guianensis.)
Juss. 1789. Gen. p. 406: g. Urticis aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 313 (*Puruma*): g. Urticeis aff. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 216.
Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Artocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 105. — Endl. 1837. Gen. p. 282. n. 1872; 1841. Spl. I. n. $1864/_1$. p. 1375; 1841. Ench. p. 168. — Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 29. t. 141. — Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261).
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 511: g. Pouroumear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2540 (*Pouroumea*). — Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 100. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 656. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 121.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear.

Pouroumea Rchb. vid. *praeced.*

Pouroumeae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 511: div. Urticear. Gen.: Pourouma, Bruea.
Rchb. 1841. Nom. p. 67: subdiv. Artocarpear. Gen. ead. et Sorocea.
Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 100: trib. Artocarpear. Gen. unicum: Pourouma. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 797. Gen. id. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 656. Gen. id.
Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 121: subtrib. Artocarpear. propriar. Gen. id.

Pourretia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 46. t. 7; 1802. Fl. peruv. III. p. 33. t. 256. 257: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 218.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 295: g. Bromeliacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 298. — Agdh. 1823. Aphor. p. 175. — Lindl. 1827. Bot. Reg. XIII. n. 1068; 1847. Veg. kd. p. 148 (*Pouretia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 47. — Endl. 1837. Gen. n. 1314. p. 184; 1841. Ench. p. 106 (*Pourettia*).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 23. n. 1169; 1830. Gen. I. p. 249. n. 1298: g. Bromeliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1060.
Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1277; 1841. Nom. p. 45. n. 1629: g. Tillandsiear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 41. t. 156.
= Puya Molina.

Pourretia Willd. 1800. Spec. III. p. 844. n. 1306: g. Monadelph. Polyandr.
Pers. 1807. Ench. II. p. 260. n. 1647: g. Malvacear. — Par. Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 162. t. 133.
Correa 1807. Ann. Mus. IX. p. 293. t. 9 (P. arborea). Fructus.
DC. 1824. Pr. I. p. 477: g. Bombacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 205. n. 5331. — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 509. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 36. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 343. — Meisn. 1837. Gen. p. 28 (25).
Rchb. 1837. Hdb. p. 295: g. Pourretiear.
= Cavanillesia Ruiz & Pav.

Pourretieae Rchb. 1837. Handb. p. 295: sect. Bombacear. genuinar. Gen.: Pourretia.

Pouslowia Wight 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 185. 192: nov. g. ordinis novi? Lecythideis aff.?

Pouteria*) Aublet 1775. Guian. I. p. 85. t. 33: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (P. guianensis.)
Scop. 1777. Intr. p. 193: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 156: g. Guajacanar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 348 (*Puteria*): g. Ebenacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 59. 370. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 250. — Bartl. 1830. Ord. p. 161.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3590: g. Styracear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 82. n. 400. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 431.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 37: g. Sapotacear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 164. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.
Meisn. 1839. Gen. p. 251 (160): g. Sapotear.
Synon. Labatia Swartz; Chaetocarpus Schreb.; Prozetia Neck.

Pouzolzia**) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 503: nov. g. Parietariear. (Parietaria laevigata Poir.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2501. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25.

*) Nomen caribaeum *Pourouma*.
**) Dicat. D. Abbati Pourret.

*) Nomen caribaeum *Pourouma-Pouteri*.
**) Dicat. P. M. C. de Pouzolz, botanico.

Pouzolzia Gaud. cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1885 *e*. p. 285; 1841. Ench. p. 170: sect. Parietariae.
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 64. t. 14. Sect.: Memorialis, Pouzolzia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear. — Par. Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 10. t. 1978—1980. p. 37. (Monogr.) — Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 228.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 23: g. Urticear.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 205 (*cf.* Flora 1855. p. 524); 1857. ibid. VII. p. 374: g. Euböhmeriear.
Synon. Leucococcus Miq.; Margarocarpus Wedd.

Pozoa Lagasca 1816. Nov. gen. et. spec. p. 13; 1821. Amen. nat. II. p. 94: nov. g. Umbelliferar. divis. 1. (P. coriacea, etc.) — Par. Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXII. 344; 1825. Syst. I. p. 874. n. 1033; 1830. Gen. I. p. 220. n. 1133; 1831. Gen. II. p. 790. n. 4095. (descisc.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 84.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3772: g. Hydrocotylear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 82: g. Mulinear. — Par. Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 330. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 262. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5526. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4377. p. 766; 1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934. — Walp. 1846. Rep. V. p. 843. Sect.: Zopoa, Schizeilema. — Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 3. Sect.: Eupozoa, Schizeilema.
Tausch 1834. Flora I. p. 353: g. Azorellear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: g. Tetragonospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.

Pozopsis Hook. . . . . Icon. plant. ser. nov. V. t. 859: nov. g. Mulinear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 62 (*Prozopsis*).

Praeformativi Rchb. 1828 Consp. p. 3: div. Uredineor. Gen.: Mycomater, Nosophloea, Phloeoconis, Strumella, Spermoedia, Naevia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 129: fam. Blastomycetum. Gen. ut antea.
Rchb. 1841. Nom. p. 1: fam. 1 Coniomycetum. Gen.: Mycomater, Spilocoea, Strumella. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 1.

Praesepium „Spreng.“ Rchb. 1828. Consp. p. 212 b. n. 4421 b: g. Cliffortiear. (Nomen.)

Pragmopora*) Massalongo 1855. Framm. lich. p. 13: nov. g. Lichenum. *Cf.* Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 352.
Arnold 1858. Flora II. p. 701: g. Leciographear.

Prangos Lindl. 1825. Quart. journ. XVIII. p. 7: nov. g. Umbelliferar. *Cf.* Linnaea I. p. 162. — Par. Lag. 1826. Oc. Esp. emigr. p. 15. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3691: g. Thapsiear.

*) πρᾶγμα, negotium, ratio. (?)

Prangos Lindl. cont.
DC. 1830. Pr. IV. p. 239: g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 374. — Endl. 1839. Gen. n. 4526. p. 790; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 986. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 114. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 358. — Walp. 1846. Rep. V. p. 915.
Tausch 1834. Flora I. p. 345: g. Angelicear.? — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5344: g. Smyrniear.
Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108): g. Pleurospermear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 14: g. Eusmyrnear. Sect.: Euprangos, Colladonia, Heptaptera.
Synon. Pteromarathrum Koch.

Praravinia*) Korthals . . . . Arch. Neerl. Ind. I. p. 432 (*cf.* Flora 1848. II. p. 580: *Paravinia*); 1842. Verh. nat. Gesch. Bot. p. 190. t. 41: nov. g. Hameliear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 766 (*Paravinia*).
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 225: g. Randiear.

Prasanthea**) DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 532: sect. Gesneriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4675. 2.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1408. n. 4155 *b*; 1841. Ench. p. 349. n. 4165 *b*: sect. Gesnerae.
= Codonophora Lindl.

Prasieae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 334: div. Schizogynar. Gen.: Prasium.
Benth. 1835. Labiat. p. 646; 1848 in DC. Pr. XII. p. 550: trib. (6) Labiatar. Gen.: Gomphostemma, Phyllostegia, Stenogyne, Prasium. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 875. Gen. ead. — Koch 1837. Syn. p. 575. Ed. II. p. 660. Gen.: Prasium. — Endl. 1838. Gen. p. 630; 1841. Ench. p. 308. Gen. ut Benth. — Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). Gen. ead. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66. Gen.: Prasium. — Walp. 1845. Rep. III. p. 896. Gen. ut Benth.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: subordo Lamiacear. Gen. ut Benth.

Prasieae Rchb. 1837. Handb. p. 189; 1841. Nomencl. p. 107: subdiv. Leioschizocarpicar. Sect.: Prunelleae, Melitteae, *genuinae* (gen.: Prasium, Stenogyne, Phyllostegia, Gomphostegia [1841 Gomphostemma]).

Prasiola Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 416: sect. Ulvae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 479 *d*.
Menegh. 1838. Cenni p. 36: g. Ulvear. (ab Endl. [Spl. I. p. 18] ad Bangiam relatum.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 689. (genuinar.) — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465); 1848. Alghe coccot. p. 101. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 134. (genuinar.)
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 295; 1845. Phyc. germ. p. 243;

*) Nomen a monte Pararavin.
**) πράσιος, viridulus.

Prasiola Agardh cont.
1849. Sp. Alg. p. 472. n. 295: g. Ulvacear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 7.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129: subg. Ulvae.
Jessen 1848. Prasiolae Monog.: g. Blastosporear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 866.
Synon. Mastodia Hook. f.

Prasium*) Linn. 1737. Gen. p. 345. n. 867; 1737. Cliff. p. 309; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 173; 1753. Sp. II. p. 601; 1759. Syst. ed. X. p. 1107. n. 655; 1763. Sp. ed. II. p. 838; 1764. Gen. ed. VI. p. 302. n. 737; 1767. Syst. ed. XII. p. 404: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 458; 1784. Syst. p. 548. — Reich. 1778. Gen. p. 305. n. 795. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 398. n. 992. — Gmel. 1791. Syst. p. 921. — Pers. 1797. Syst. p. 584. — Willd. 1800. Sp. III. p. 179. n. 1127; 1809. En. p. 632. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 26.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 188. n. 785: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 468.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 162. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 117. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 349. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 270. — Pers. 1807. Ench. II. p. 137. n. 1421. — DC. 1815. Franç. V. p. 403. — Link 1822. En. II. p. 121; 1829. Hdb. I. p. 490. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 694. n. 2054; 1831. Gen. II. p. 465. n. 2287. — Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 257. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 839.
Hill 1769. Ht. kew. p. 247: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 321. t. 66. f. 12 (majus).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 283; 1789. Phil. Bot. I. p. 132.
Neck. 1790. El. I. p. 303. n. 474: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 443: g. Melissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXV.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2815: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 334; 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4155: g. Prasiear. — Par. Benth. 1835. Labiat. p. 655; 1848 in DC. Pr. XII. p. 556. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 860. — Koch 1837. Syn. p. 575. Ed. II. p. 660. — Endl. 1838. Gen. n. 3676. p. 631; 1841. Ench. p. 308. — Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 465. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66. — Walp. 1845. Rep. III. p. 901. 991. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662. — Webb .... Canar. III. p. 105.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 705: g. Stachydear.
Synon. Levina Adans.

Prasomila Dochnahl 1855. Obstk. I. p. 123: g. Malorum. (*Renette.*)

Prasophyllum R. Brown 1810. Prodr. I. p. 317. Ed. Nees p. 173: nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 259. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 712. n. 2967; 1831. Gen. II. p. 661. n. 3334. — Hook. 1853. N. Zeal. I. p. 247.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 295: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1421; 1841. Nom. p. 55. n. 2148. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1581. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 512; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Diuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1583; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 12.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Diuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.

Prasostemon Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 390: sect. Ornithogali. (O. prasandrum n. sp.)

Prasoxylon Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 83. 101: nov. g. Trichiliear. (Dysoxylon alliaceum Blume. — *Alliaria Rumph.*) = Dysoxyli Blume pars.

Pratella Pers. 1801. Syn. p. XVI. 417: sect. Agarici. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 260. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 153. — Nees 1816. Syst. p. 207; 1817. Überbl. p. 52. Subsect.: Lepiota, Cortinaria, Gymnopus, Mycena. — Mart. 1817. Erlang. p. 434. Subsect. eaed. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 205. — Endl. 1836. Gen. n. 453 *III.* p. 40; 1841. Ench. p. 21. Subsect. ut Fries 1821. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 2. Subsect.: Psathyra, Psilocybe, Hypholoma. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 458. Subsect. ut Endl.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 48; 1818. II. p. 171: fam. Agarici.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 626: g. Pratellidear.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 11: series Agarici. Tribus: Volvaria, Psalliota, Hypholoma, Psilocybe, Psathyra, Coprinarius. — Par. Fries 1838. Epicr. p. 599. *Cf. Pratellus Fries.* — Bail 1858. Syst. p. 36. Subgen. Pratelli Fries 1836.
Synon. Pratellus Fries.

Pratellarius Fries 1825. Pl. homon. p. 74: subsect. Phacoti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *Ca.*

Pratellideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 596. 626: div. Hymenotheceear. Gen.: Pratella, Cortinaria, Prunulus, Coprinus.

*) Nomen ex Dioscoride et Plinio.

*) πράσον, porrum.

Pratellus Fries 1825. Pl. homon. p. 74: subg. Agarici. Sect.: Volvaria, Psalliota, Gomphus, Hypholoma, Psilocybe, Psathyra. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *B*. Subsect. eaed. — Math. 1853. Belg. II. p. 352. Subsect.: Coprinarius, Psathyra, Psilocybe, Hypholoma, Psalliota, Volvaria.

Fries 1836. Epicr. p. 212: series Agarici. Subgen.: Psalliota, Hypholoma, Psilocybe, Psathyra. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 294 (subgen. ead. et Stropharia); 1851. Nov. Act. Upsal. ser. tert. I. 1. p. 25 (accedit Pilosace).

= Pratella Pers.

Pratia*) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 456. t. 79: nov. g. Lobeliaceae. (Lobelia concolor R. Br.?) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 699. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 157.

Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 212: sect. Lobeliae.

Presl 1836. Mon. Lobel. p. 46: g. Delisseacear. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 512. n. 3063. Sect.: Bernonia, Eupratia. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148). — Walp. 1847. Rep. VI. p. 372.

Rchb. 1837. Hdb. p. 186: g. Delisseear.

Pratia A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 340: g. restrict. Delisseacear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 264. n. 3063.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572: g. Delissear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693.

Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3995: g. Delisseear.

Synon. Eupratia Endl.

Praticola Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 15; 1789. Beitr. IV. p. 146. (Thalictrum simplex L.)

Praxelis Cassini 1826. Dict. v. 43. p. 261; 1830. v. 60. p. 585: nov. g. Eupatoriear. Archetypar. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37.

= Ooclinium DC.?

Preauxia Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phytogr. Canar. II. p. 250; 1847 in Walp. Repert. VI. p. 197: nov. g. Euchrysanthemear. (P. jacobaeifolia et canariensis.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Chrysanthemear.

Preciae Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: ordo 51 plant. Gen.: Primula, Androsace, Diapensia, Cortusa, Dodecatheon, Soldanella, Cyclamen.

Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 21 plant. Gen. §. 1: Primula, Androsace, Diapensia, Aretia, Dodecatheon, Cortusa, Soldanella, Cyclamen. §. 2: Limosella. §. 3? Menyanthes, Hottonia, Samolus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347. Gen. ead.

Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXXV: div. Rotacear. Gen.: Primula, Androsace, Hottonia.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20: div. Primulacear. Gen. ut Wahlenb.

Preissia**) Corda 1829 in Opiz Beitr. I. p. 647; 1830 in Sturm Jungerm. p. 5; 1832. ibid. p. 66: g. Marchantiacear. (P. italica.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 75.

= Preissiae Nees pars.

Preissia Nees 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 414; 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXIX. 113; 1846. Syn. Hepat. p. 538: g. Jecorariar. ampliatum.

Endl. 1841. Spl. I. n. 471. p. 1338; 1841. Ench. p. 27: g. Marchantiacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 842: g. Marchantiear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 10. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549; 1849 ibid. X. p. 460.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.

Synon. Preissia et Chomiocarpon Corda; Strozzius Gray pt.; Cyathophora Gray?

Preissleria*) Sternb. 1838. Vers. II. p. 192: nov. g. Asparagaceitum. (P. antiqua.)

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 168; 1846. Chlor. prot. p. LXVI: g. Liliacear. foss.

Premma Brongn. vid. *seq.*

Premna**) Linn. 1771. Mant. II. p. 154. n. 1316: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 473; 1784. Syst. p. 565. — Reich. 1778. Gen. p. 316. n. 823. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 413. n. 1025. — Gmel. 1791. Syst. p. 944. — Pers. 1797. Syst. p. 607; 1807. Ench. II. p. 142. n. 1437. — Willd. 1800. Sp. III. p. 314. n. 1164. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 75.

Scop. 1777. Intr. p. 170: g. Personatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 269. t. 56. f. 6 (serratifolia).

Juss. 1789. Gen. p. 107: g. Viticum.

Neck. 1790. El. I. p. 387. n. 603: g. Plasyrgophytor.

Duchesne 1804. Dict. v. 2. p. 115 (*Andarèse*): g. Verbenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 247. — Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 512. Ed. Nees p. 368. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 815. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 424; 1825. Syst. II. p. 755. n. 2118; 1831. Gen. II. p. 478. n. 2361: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2910.

Bartl. 1830. Ord. p. 180: g. Viticear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4202. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 630. Sect.: Gumira, Premnos.

Endl. 1838. Gen. n. 3701. p. 636; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 613. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65 (*Premma*). — Walp. 1845. Rep. IV. p. 93.

Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 890: g. Euviticear. Sect. ut Schauer.

Synon. Cornutia Burm.; Baldingera Dennst.; Holochiloma Hochst.

---

*) Dicat. Prat-Bernon, itineris socio.
**) Dicat. Dr. med. Preiss.

*) Dicat. Joh. Preissler.
**) πρέμνον, caudex, truncus.

Premnos Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 26 (1844. Cat. Bogor. alt. p. 134 (*Premnus*): g. pro Premna L. restricta propositum.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 633: sect. Premnae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 896.

Premnus Hassk. vid. *praeced.*

Prenantheae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phytogr. Canar. II. p. 418: div. Lactucacear. Gen.: Prenanthes.

Prenanthes*) Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 193: g. Cichoracear., ab auctoribus varia latitudine adoptatum. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 754. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 168. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 483. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 373. — DC. 1805. Franç. IV. p. 5. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 416. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 885. — Link 1829. Hdb. I. p. 787. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 3. 43. — Math. 1853. Belg. I. p. 309.
Linn. 1737. Gen. p. 235. n. 609; 1737. Cliff. p. 383; 1740. Syst. p. 28; 1753. Sp. II. p. 797; 1759. Syst. ed. X. p. 1193. n. 816; 1763. Sp. ed. II. p. 1120; 1764. Gen. ed. VI. p. 401. n. 911; 1767. Syst. ed. XII. p. 521: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 596; 1784. Syst. p. 714. — Reich. 1778. Gen. p. 400. n. 990. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 528. n. 1236. — Gmel. 1791. Syst. p. 1173. — Pers. 1797. Syst. p. 753; 1807. Ench. II. p. 365. n. 1766. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1532. n. 1406; 1809. En. p. 818. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 123. — Link 1822. En. II. p. 282. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 403.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130 (sph. *Phrenanthes*); 1764. Syst. p. 242. n. 996: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 533.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.
Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 47: g. Ligulatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 358.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 463: g. Chicoracear.
Scop. 1772. Carn. II. p. 103; 1777. Intr. p. 121: g. Semiflosculosar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 250. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 485.
Neck. 1790. El. I. p. 59. n. 108: g. Glossariphytor.
Rebent. 1804. Neom. p. 92: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 580; 1826. Syst. III. p. 654. n. 2883; 1831. Gen. II. p. 645. n. 3242: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 143.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 61: g. Lactucear. (Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145. — Less. 1832. Syn. p. 137. — Koch 1837. Syn. p. 430. Ed. II. p. 494. — DC.

*) Num ex πρηνής, pronus?

Prenanthes Vaill. cont.
1838. Pr. VII. 1. p. 194. — Endl. 1838. Gen. n. 3005. p. 498; 1841. Ench. p. 250. Sect.: Euprenanthes, Nabalus, Lygodesmia, Atalanthus et 1842 (Spl. II. p. 50) Erytheremia, Pleiacanthus. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32. — Walp. 1843. Rep. II. p. 691. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 839. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 96; 1826. v. 43. p. 279; 1827. v. 48. p. 422. 432; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear. Sejunguntur 1825 Nabalus et 1826 Phaenixopus, Mycelis, Phaecasium. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1345. 1365: g. Cichoriacear. Sect.: Prenanthes, Phoenixopus, Mycelis.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2169; 1831. Fl. exc. p. 272: g. Scorzonerear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 308: g. Hieracear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 140.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3713: g. Crepidear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 266: g. Liguliflorar.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 420: g. Prenanthear. Subgen.: Euprenanthes, Chrysoprenanthes.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 323: g. Crepoidear.

Prenocephalum*) Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 426: subg. Sonchi. (Microrhynchus nudicaulis Less.)

Prenosonchus Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 425: sect. Dendrosonchi. (Sonchus gummifer Link.)

Preonanthes Rchb. vid. *seq.*

Preonanthus**) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 95; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Anemone alpina.)
DC. 1818. Syst. I. p. 193; 1824. Pr. I. p. 17: sect. Anemones. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 486. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 16. — Koch 1836. Syn. p. 8. Ed. II. p. 9. — Pritz. 1841. Linnaea XV. p. 607. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 19. — Walp. 1842. Rep. I. p. 19.
Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4945 *a* (*Preonanthes*); 1832. Fl. exc. p. 732; 1841. Nom. p. 190. n. 7232. 1: sect. Pulsatillae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4773 *a β.* p. 845; 1841. Ench. p. 434. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 254.

Preptanthe***) Rchb. f. 1853 in Van Houtte Fl. d. serr. VIII. p. 245: nov. g. Orchidear. (Calanthe vestita Wall.)

Prepusa†) Martius 1827. Nov. gen. II. p. 120. t. 190: nov. g. Gentianear. (P. montana.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 376. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 342; 1831. Gen. II. p.

*) πρηνής, cernuus.
**) πρηών, collis.
***) πρεπτός, dignus.
†) πρέπουσα, conspicua.

Prepusa Mart. cont.
802. n. 4152. — Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. XI. 62. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 36. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 197. (verar.) — Steud. 1841. Nom. II. p. 303 (*Perepusa*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3480: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3554. p. 604; 1841. Ench. p. 302.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5105: g. Erythraeariar.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 206: g. Lisyanthear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 80: g. Lisianthear.

Prescotia Lindl. 1825 in Hook. exot. Fl. XIII. n. 115: nov. g. Orchidear. *Cf.* Flora 1825. II. Erg. Bl. p. 37. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 706. n. 2955; 1831. Gen. II. p. 659. n. 3318.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 529): g. Gastrodiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1457.
Bartl. 1830. Ord. p. 56: g. Neottiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2142.
Endl. 1842. Spl. II. p. 19. n. 1553: g. Cranichidar.
= Prescottia Lindl.

Prescottia*) Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1916: g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 215. n. 1575. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 453; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1553.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Cranichidear.
Synon. Prescotia Lindl.; Decaisnea Brongn.

Preslaea**) Martius 1827. Nov. gen. II. p. 75. t. 164: nov. g. Heliotropicear. (P. paradoxa.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 370 (*Praeslea* et *Preslea Spreng.*) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 193.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 365: g. Heliotropear.
= Schleidenia Endl.

Preslea Opiz 1824. Flora I. p. 321: nov. g. ex typo Menthae cervinae L.
Benth. 1836. Labiat. p. LV: g. Menthoidear.
Synon. Preslia Fresen., etc.

Preslea Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 338: g. Pentandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2960: g. Echiear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 135. n. 672: g. Asperifoliar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 629.
Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear.
St. Hil. 1833. Voy. distr. diam. II. p. 434.
= Schleidenia Endl.

Preslia „Opiz" Fresen. 1828. Syll. Ratisb. II. p. 238.

*) Dicat. John Prescott, peregrinatori.
**) Dicat. pari nobili fratrum I. et C. B. Presl.

Preslia Opiz cont.
Benth. 1833. Labiat. p. 167; 1848 in DC. Pr. XII. p. 164: g. Menthoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 715. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 404. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 68. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 654.
Endl. 1838. Gen. n. 3593. p. 613; 1841. Ench. p. 306: g. Menthear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4045. (genuinar.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 585. 980.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Menthidar.
= Preslea Opiz.

Prestinaria*) Schultz Bip. (Herb. un. it. nr. 62. 332) in Steud. 1841. Nomencl. II. p. 393: nov. g. Compositar. (P. abyssinica et bidentoides.)
Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3612: g. Coreopsidear.
Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 162: subg. Coreopsidis. Sect.: Euprestinaria, Steppia.

Prestonia Scopoli 1777. Introd. p. 281. n. 1275: g. Columniferar. (*Lass Adans.*)
= Abutilon Tourn.

Prestonia**) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 69 (Verm. bot. Schr. II. p. 406): nov. g. Apocynear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 490; 1830. Gen. I. p. 146. n. 731. (Pentandr. Monogyn.) — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 221. (verar.) — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIV. 409. n. 744. — Kunth 1823. Syn. II. p. 291. (verar.)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 637. n. 690: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 654.
Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 283: g. Apocinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3527: g. Echitear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3425. p. 585; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 428. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 473.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 83: g. Echitiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5181: g. Neriear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Pretrea Gay 1824. Ann. sc. nat. I. p. 457: nov. g. Sesamear., intermedium inter Sesamum et Josephiniam. (Martynia zanquebarica Lour.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3251. — Bartl. 1830. Ord. p. 176. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 249.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Martyniear.
Meisn. 1840. Gen. p. 298 (206): g. Pedaliear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 255: g. Pedalinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.
Synon. Dicerocaryum Boj., Endl.; Dicerocaryon Dietr.

*) Dicat. de Prestinari.
**) Dicat. Charles Preston, botanico a Rayo et Blairio summopere laudato.

Prevostea*) Choisy 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 496: novum nomen pro *Dufourea Kunth* propositum. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 286 et Isis 1831. p. 762.
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2998: g. Convolvulear. — Par. Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 492; 1845 in DC. Pr. IX. p. 437. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 299. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 542.
Bartl. 1830. Ord. p. 192: g. Convolvulacear. = Dufourea HBK.

Prevotia Adans. 1763. Fam. II. p. 256: g. Alsinium. (Cerastium 4 Linn. sp.)
= Cerastii Linn. pars.

Priapus Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 176: nov. g. Fungor., Phallo et Hydno simile.
= Bidona Adans.

Priestleya**) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 90: nov. g. Leguminosar. Sect.: Eisothea, Aneisothea. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 291. — Spreng. 1827. Cur. post. p. 264; 1831. Gen. II. p. 590. n. 2907.
DC. 1825. Pr. II. p. 121: g. Genistear. Sect. eaed. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4045 (sect. eaed.); 1841. Nom. p. 151. n. 5894. (genuinar.) Sect.: Priestleya, Aneisothea. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 131. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 192. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 17. Sect.: Isothea, Anisothea. — Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60). — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 468. Sect. ut Meyer. — Endl. 1840. Gen. n. 6464. p. 1261 (*Pristleya*); 1841. Ench. p. 667. Sect. eaed. — Walp. 1842. Rep. I. p. 580 (*Pristleya*); 1843. II. p. 834. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 442. 444: g. Lipariear.
Synon. Xiphotheca Eckl. & Zeyh.

Priestleya Ecklon & Zeyh. 1836. Enum. pl. Afr. II. p. 164: g. restrictum Genistear.
Rchb. 1841. Nom. n. 151. n. 5894. 1: sect. Priestleyae.
= Eisothea DC.

Priestleya Fl. mexic. ined.
= Montagnaea DC.

Prieurea***) DC. 1828. Prodr. III. p. 58 (Coll. Mém. III. p. 14. t. 2): nov. g. Jussiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 319. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 696. — Meisn. 1838. Gen. p. 120 (85).
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4492; 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6558: g. Jussieuear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 34. n. 149: g. Onagrar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 170.
Endl. 1840. Gen. n. 6108. p. 118; 1841. Ench. p. 637: g. Jussievear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Jussiaear.

Primula „Dodon." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 17. Ed. Hall. 1745. p. 17: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 40. n. 112; 1737. Cliff. p. 50; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 36; 1753. Sp. I. p. 142; 1759. Syst. ed. X. p. 918. n. 980; 1762. Sp. ed. II. p. 204; 1764. Gen. ed. VI. p. 80. n. 197; 1767. Syst. ed. XII. p. 150: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 131. — Murr. 1774. Syst. p. 162; 1784. Syst. p. 192. — Reich. 1778. Gen. p. 82. n. 210. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 106. n. 258. — Gmel. 1791. Syst. p. 326. — Pers. 1797. Syst. p. 199; 1805. Ench. I. p. 169. n. 380. — Willd. 1797. Sp. I. p. 800. n. 293; 1809. En. p. 190. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 119. — Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 17.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 482: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 206. n. 855: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 426.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 123. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 6. 81. Sect.: Primula, Auricula, Arthritica, Verbasculum. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20. Sect.: Eroprota, Aleuritia.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 96.
Adans. 1763. Fam. II. p. 230: g. Anagallidum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 83: g. Oliganthcrar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 135: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 186: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 233. t. 50. f. 10 (veris).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 201; 1789. Phil. Bot. I. p. 53.
Neck. 1790. El. II. p. 17. n. 632: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 289: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 222. — DC. 1805. Franç. III. p. 444; 1815. V. p. 383. — Hedw. 1806. Gen. p. 97. n. 437. — Mirb. 1815. Elém. II. p. 877. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIV. 133. n. 658. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 301. — Link 1821. En. I. p. 157; 1829. Hdb. I. p. 413. Sejungitur (1829) Auganthus. — D. Don 1825. Nepal. p. 77. — Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 293. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Koch 1837. Syn. p. 586. Ed. II. p. 673. Sect.: Aleuritia, Primulastrum, Auricula, Arthritica. — Kunth 1838. Berol. II. p. 131. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 1. Sect. ut Koch (excepta Auricula). — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 463.
Batsch 1802. Tab. p. 207: g. Primulariar.
Lehm. 1817. Monogr. gen. Primulae.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 383; 1825. Syst. I. p. 573. n. 616; 1830. Gen. I. p. 142. n. 707: g. Primulear. — Par. Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 208. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 643. — Brongn. 1843. Én. genr.

*) Dicat. dom. Prevost, Genevensi.
**) Dicat. Jos. Priestley, physico et chemico.
***) Dicat. detectori Le Prieur.

Primula Dodon. cont. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 34. Sect.: Sphondylia, Primulastrum, Auricula, Arthritica, Aleuritia. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 439. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 8. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1001.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 128. n. 3361: g. Androsacear. Sect.: Aleuritia, Arthritica, Corthusina. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 401; 1841. Nom. p. 124. n. 4827. Sect.: Aleuritia, Primula, Auricula. — Endl. 1838. Gen. n. 4199. p. 731; 1841. Ench. p. 356. Sect.: Auricula, Aleuritia. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 447. Sect. ex Duby.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.

Schott 1851. Östr. Prim. p. 10. Sect.: Primulastrum, Auriculastrum. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 463.

Synon. Primula veris Tourn.

Primula Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 104. Ed. Willd.*) p. 127: g. Pentandr. Monogyn. (P. mutabilis.)
= Hydrangea Linn.

Primula Rchb. 1831. Fl. exc. p. 402; 1841. Nom. p. 124. n. 4827. 2: sect. Primulae.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 350: g. Primulacear. restrict. (P. grandiflora et veris.)
= Primulastrum Duby.

Primula veris Caesalp. 1583. De plant. lib. 12. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 25.)
= Bellis Linn.

Primula veris Tourn. 1700. Inst. p. 124. t. 47: g. pl. class. II.
= Primula Linn.

Primulaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 285: ordo 1 class. VIII. Gen. §. 1: Centunculus, Anagallis, Lysimachia, Hottonia, Coris, Trientalis, Aretia. §. 2: Androsace, Primula, Cortusa, Soldanella, Dodecatheon, Cyclamen. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 246 et 1826. Dict. v. 43. p. 305.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 218. t. 39. Gen. §. 1 ut Vent. et Micrantemum, Lubinia, Sheffieldia, Limosella. §. 2 ut Vent. §. 3. *Affinia:* Phyla, Globularia, Conobea, Mecardonia, Tozzia, Samolus, Utricularia, Pinguicula, Menyanthes, Nymphoides.

DC. 1805. Franç. III. p. 430: fam. (39) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Centunculus, Anagallis, Lysimachia, Hottonia, Coris, Androsace, Primula, Cortusa, Soldanella, Dodecatheon, Cyclamen, Samolus. Accedit 1815 (ibid. V. p. 382) Trientalis. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 427. Ed. Nees p. 283. Gen.: Centunculus, Lysimachia. *Aff.:* Samolus. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 877. Typi sectionum: Anagallis, Primula.

A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 41. (Placenta centralis.)

DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 580. Ed. II. p. 666. Gen.: Trientalis, Lysimachia, Anagallis, Centunculus, Androsace,

*) „Genus distinctissimum Wolfiae Schreb. affine, sed germine stigmateque diversum."

Primulaceae Vent. cont. Aretia, Primula, Hottonia, Cortusa, Soldanella, Cyclamen, Samolus, Glaux. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 33. Trib.: Hottonieae, Primuleae, Anagallideae, Samoleae.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 297: fam. Corolliflorar. Gen.: Centunculus, Anagallis, Irasekia, Lysimachia, Naumburgia, Numularia, Hottonia, Trientalis, Primula, Cyclamen et in Add.: Samolus, Glaux.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: fam. Thalamitubiae.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1826. Isis p. 587: ordo Tubiflorar.

Duby 1828. Bot. gall. I. p. 379.

Link 1829. Hdb. I. p. 402: ordo (19) Hypanthar. Gen.: Centunculus, Anagallis, Lysimachia, Thyrsanthus, Asterolinon, Hottonia, Samolus, Glaux, Coris, Trientalis, Androsace, Aretia, Primula, Auganthus, Cortusa, Soldanella, Dodecatheon, Cyclamen.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (207) Monopetalar.

Bartl. 1830. Ord. p. 165: ordo (101) Myrsinear. Gen.: Cyclamen, Dodecatheon, Soldanella, Cortusa, Androsace, Gregoria, Douglassia, Primula, Trientalis, Hottonia, Lubinia, Asterolinon, Lysimachia, Hemianthus, Euparea, Micranthemum, Anagallis, Centunculus, Bacopa; Coris.

Lindl. 1833. Nix. p. 27: ordo Primulalium.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 223; 1847. Veg. kd. p. 644: ordo Cortusalium. Trib.: Primulidae, Anagallidae, Hottonidae, Samolidae.

Endl. 1839. Gen. p. 729; 1841. Ench. p. 355: ordo (156) Petalanthar. Trib. ut Duby.

St. Hil. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 85.

St. Hil. & Girard 1840. Mon. d. Primulacées.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 341: fam. (149) Myrsinear. Gen. fere ut Bartl. et Aretia, Vitaliana, Primulidium, Auricula, Aleuritia, Coxia, Godinella, Palladia, Naumburgia, Jirasekia, Samolus; Schwenkia?

Brongn. 1843. En. genr. p. 69: fam. Primulinear. Trib.: Primuleae, Samoleae.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20: fam. Tubiflorar. Divis.: Rotaceae, Preciae.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 466: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Trib. ut Endl.

Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 257. Trib.: Primuleae, Anagallideae, Samoleae.

Synon. Preciae Linn. 1751; Lysimachiae Juss.; Primulariae Batsch; Primuleae Spreng.

Primulaceae Rchb. 1828. Consp. p. 128: fam. Crateriflorar. Divis.: Plantagineae, Androsaceae, Samoleae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 203; 1841. Nom. p. 124. Divis.: Primuleae, Lysimachieae, Jacquinieae.

Primulales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 27: nixus Polycarpar. Ordines: Primulaceae, Myrsineae, Sapoteae, Ebenaceae, Ilicinae.

Primulariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 207: fam. Cyathinar. Gen.: Diapensia; Primula, Cortusa, Androsace, Dodecatheon, Cyclamen, Soldanella.

Primulastrum Duby 1828. Bot. gall. I. p. 383; 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 35: sect. Primulae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 586. Ed. II. p. 673. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 1. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 447.
Synon. Eroprota Fries; Euprimula Schott.

Primulastrum Schott 1851. Östr. Prim. p. 10: sect. Primulae ampliata. Subsect.: Euprimula, Aleuritia. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 463.

Primuleae Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 383: fam. 38 plant. Gen.: Primula, Androsace, Cortusa, Soldanella, Dodecatheon, Cyclamen; Lysimachia, Lubinia, Anagallis, Hottonia, Micranthemum, Centunculus, Samolus, Coris, Limosella, Erinus, Wulfenia, Lindernia, Manulea, Nama; Utricularia, Pinguicula; Trientalis, Tovaria.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 398: div. Lysimachiacear. Subdivis.: Hottoniaceae, Androsaceae, Cyclamineae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124: div. Primulacear. Subdivis.: Corideae, Androsaceae, Cortuseae.
= Primulaceae Vent.

Primuleae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXXIX: fam. Crateriflorar. Divis.: Lentibulariae, Lysimachieae, Androsaceae, Epacrideae.

Primuleae Endl. 1839. Gen. p. 730; 1841. Ench. p. 356: trib. Primulacear. Subtrib.: Androsaceae, Lysimachieae. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). Subtrib. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 69. Gen. ex Endl. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 34. Gen.: Primula, Gregoria, Douglasia, Androsace, Cortusa, Dodecatheon, Cyclamen, Soldanella, Coris, Glaux, Trientalis, Lubinia, Naumburgia, Lysimachia, Apochoris, Pelletiera, Asterolinum, Euparea. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 466. Subtrib. ut Endl. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 259. Gen. bras.: Pelletiera.

Primulidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 645: trib. Primulacear. Gen. Primulear. Endl. et Macrosyphonia, Apochoris, Steironema, Anagzanthe.

Primulidium Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 354: nov. g. Primulacear. (Primula sinensis Lindl.)
= Auganthus Link.

Primulineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXI. 69: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Primulaceae, Myrsineae, Theophrasteae, Aegicereae, Plumbagineae.

Primulopsis Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 507: sect. Oenotherae. (Jussiaea acaulis Pursh.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 86.
Synon. Heterostemon Nutt.

Principes Endl. 1837. Gen. p. 244; 1841. Ench. p. 133: class. (21) Amphibryor. Ordo: Palmae.

Pringlea „Anders. mss." Hook. 1845. Antarct. voy. p. 238. t. 90. 91: nov. g. Cruciferar. (P. antiscorbutica.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 43: g. Sisymbriear.

Pringlea Anders. cont.
Endl. 1850. Spl. V. p. 34. n. 4882/2: g. Alyssinear.
Synon. Diaphoranthus Anders.

Prinodia Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 224: nov. g. Ilicinear., pro speciebus Ilicis et Prinois corolla polypetala propositum.

Prinoides DC. 1825. Prodr. II. p. 16: sect. Prinois. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3626 *a*. — Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. 57.

Prinos*) Linn. 1737. Coroll. p. 6. n. 952; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 151. n. 352; 1753. Sp. I. p. 330; 1759. Syst. ed. X. p. 988. n. 398; 1762. Sp. ed. II. p. 471; 1764. Gen. ed. VI. p. 174. n. 441; 1767. Syst. ed. XII. p. 251. n. 436: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 281; 1784. Syst. p. 342. — Reich. 1778. Gen. p. 176. n. 474. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 231. n. 594. — Gmel. 1791. Syst. p. 574. — Pers. 1797. Syst. p. 365; 1805. Ench. I. p. 387. n. 852. — Willd. 1799. Sp. II. p. 225. n. 674; 1809. En. p. 394. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 212.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 219. n. 912: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 481.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rhamnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 379. — Batsch 1802. Tab. p. 70. — Jaum. 1804. Dict. v. 2. p. 267 (*Apalanche* genre *des nerprunés*).
Scop. 1777. Intr. p. 200: g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 62. n. 711: g. Arcythophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 468: g. Rhamnoidear. — Par. Link 1821. En. I. p. 344.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 236: g. Dioec. Hexandr.
Cram. 1803. Disp. p. 54 in Pentandr. Monogyn. et p. 188 in Dioec. Tetrandr.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 269: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 223. n. 909. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 241. n. 1263. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1050.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 502: g. Ophiospermar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 182. n. 1317: g. Sapotear.
DC. 1825. Pr. II. p. 16: g. Aquifoliacear. Sect.: Prinoides, Ageria, Winterlia. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3626 (sect. eaed.); 1841. Nom. p. 135. n. 5250. — Bartl. 1830. Ord. p. 377. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 432. — Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598.
Rchb. 1827 ap Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. XI. 57. Sect. ut DC.
Link 1831. Hdb. II. p. 118: g. Celastrinar.

*) πρῖνος, Ilex.

Prinos Linn. cont.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 20: g. Ilicinear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5706. p. 1092; 1841. Ench. p. 577. — Walp. 1842. Rep. I. p. 541. — Brongn. 1843. En. genr. p. 73.
Synon. Ageria Adans.; Winterlia Mönch.

Prinsepia*) Royle 1834. Himal. p. 206. t. 38. f. 1.
Meisn. 1837. Gen. p. 102 (72): g. Amygdalear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 42.
Endl. 1840. Gen. n. 6414. p. 1252; 1841. Ench. p. 664: g. Chrysobalanear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 178. n. 6881.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 543: g. Chrysobalanacear.
Synon. Cycnia Lindl.

Printzia Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 463. 488; 1826. v. 43. p. 324; 1830. v. 60. p. 582: nov. g. Asterear. (Archetypar. verar. — Inula cernua Berg.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2555: g. Asterinar.
Less. 1830. Linnaea V. p. 274; 1832. Syn. p. 108: g. Mutisiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3435.
Nees 1833. Aster. p. 245: g. Asterum plumigeror.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 13: g. Eumutisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2931. p. 487; 1841. Ench. p. 248. — Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141).
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954: g. Printziear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.
Synon. Lioydia Neck.?

Printzieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954: sect. Pulicariear. Gen.: Printzia, Minurothamnos, Cypselodontia; Carphopappus.

Prionachne**) Nees 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 447.
Endl. 1837. Gen. n. 931. p. 106; 1841. Ench. p. 60: g. Rottbölliacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1369: g. Röttbölliear.
= Chondrolaena Nees.

Prionanthes Schrank 1819. Pl. rar. ht. Monac. II. t. 51; 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II (Isis 1823. p. 852): nov. g. plant. (P. antimenorrhoea.)
Endl. 1838. Gen. n. 2960 *b γ*. p. 492; 1841. Ench. p. 249: subsect. Eutrixidis.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34: g. Trixidear.
Synon. Tenorea Bert.

Prionites Nees vid. *Prionitis Linn.*

Prionitis Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 487: nov. g. indefinitum. (Adhatodae spec. Burm., Pet.)
Nees (1841. Linnaea XV. p. 358: *Prionites*) 1847 in DC. Prodr. XI. p. 237: sect. Barleriae. — Par. Örst. 1855. Centralam. Acanth. p. 23. (An genus Barleriear.?) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 654. (B. Prionitis L.)
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 809: g. Barleriear.
Synon. Crabbea Harv. 1838.

Prionitis Adans. 1763. Fam. II. p. 499: g. Cicutar. (Sium Falcaria L.)
Delarbr. 1795. Fl. Auvergne.
= Falcaria Riv.

Prionitis J. Agardh 1851. Spec. II. p. 189.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 676: g. Cryptonemear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 197: g. Nemastomear. (Gelidium lanceolatum Hook., Kütz.)
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 254: g. Cryptonemiacear.

Prionium E. Meyer 1832. Linnaea VII. p. 130: nov. g. Juncear. (Juncus serratus Thunb.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1673. — Meisn. 1842. Gen. p. 405 (310). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134. — Steud. 1855. Glum. II. p. 309.
Endl. 1837. Gen. n. 1048. p. 130; 1841. Ench. p. 74: g. Juncacear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 314. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192.

Prionodon „C. Müll.“ Hampe 1847. Linnaea XX. p. 90: nov. g. Leucodontear. (Hypnum densum Sw.) — Par. C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 129.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403: g. Muscor. minus cognitum.
= Cyrtopus Brid.

Prionolepis Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 55. t. 261: nov. g. Verbesinear., Perymenio aff. (P. silphioides.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 167.

Prionopsis Nuttall 1841. Amer phil. trans. n. ser. VII. p. 329: nov. g. Chrysocomear. (Aplopappus ciliatus DC.)
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 245: g. Solidaginear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 40. n. 2380/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 592. 967. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Prionopteris Wallich 1831. Catal. n. 184.
Presl 1836. Pterid. p. 246: inter genera Filicum minus cognita.
= Sphaeropteris R. Brown?

Prionoschoenus Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1287 *d*: sect. Junci.

Prionosepalum Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 266: nov. g. Restiacear. anomalum. (P. Gilberti.)

Prionotes*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 552. Ed. Nees p. 408: nov. g. Epacridear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIII. 488. n. 782. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 631. n. 677; 1830. Gen. I. p. 156. n. 781. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 333. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 690.

*) Dicat. Macaire-Prinsep, botanico Genevensi.
**) πρίων, serra.

*) πριονωτός, serratus.

Prionotes R. Brown cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3350: g. Lysinemacear.?
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 783: g. Epacriear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 765: g. Epacrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4284. p. 749; 1841. Ench. p. 368. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4818: g. Lysinemear.

Prionotophyllum Lessing 1832. Syn. Compos. p. 115: subg. Chaetantherae.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 31: sect. Chaetantherae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2921 *d.* p. 485; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3425. 4.

Priotropis Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 180 in adnot.: nov. g. a Crotalaria disjunctum.
Meisn. 1837. Gen. p. 82 (58): sect. Crotalariae? — Par. Endl. 1842. Gen. n. 6472 *f.* p. 1262; 1841. Ench. p. 668.
Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5885: g. Genistear. (genuin.?) — Par. Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 458. 594. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 348. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 461.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Crotalariear.

Prismaria Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 125: nov. g. Polyactidear. (P. alba.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 159.

Prismatanthus Hook. & Arn. mss.
= Siphonostegia Benth. (Hook. & Arn.)

Prismatocarpeae Endl. 1838. Gen. p. 516: subtrib. Wahlenbergiear. Gen.: Prismatocarpus, Roëlla. Accedit 1841 (Ench. p. 266) Edraianthus. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 242 (149). Gen. ut Endl. 1838.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: trib. Campanulacear. Gen. ut Endl. 1841.

Prismatocarpus L'Herit. 1788. Sert. Angl. 2.
Mönch 1794. Meth. p. 496: g. Petalostemonis. (Campanula speculum L.)
DC. 1805. Franç. III. p. 708: g. Campanulacear. — Par. Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 334. — Link 1829. Hdb. I. p. 630. — Bartl. 1830. Ord. p. 152. — Koch 1837. Syn. p. 473.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 523: g. Campanulear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 302. — Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2801; 1831. Fl. exc. p. 305.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 152: sect. Campanulae. — Par. Link 1821. En. I. p. 216. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 737; 1830. Gen. I. p. 169. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 359.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 10. 167: g. Pentandr. Monogyn.
= Specularia Heist. et Prismatocarpus A. DC.

Prismatocarpus A. DC. 1830. Mon. Campan. p. 164. t. 20: g. restrictum Campanulear. Disjungitur Specularia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186.

Prismatocarpus A. DC. cont.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 743: g. Jasionear.
Endl. 1838. Gen. n. 3080. p. 516; 1841. Ench. p. 266: g. Prismatocarpear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 242 (149). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 442: g. Wahlenbergiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 756: subg. Campanulae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 536: g. Campanulacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4040: g. Canarinear. genuinar.
Synon. Roelloides Banks?

Prismatomeris Thwaites 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 268. t. 7 A: nov. g. Coffear., Ixorae aff. (P. albidiflora.)

Pristidium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 407: sect. Gelidii (antea mss. genus pro Fuco pristoide Turn. propositum).
= Gelidium Lamx.

Pristleya Meyen 1827. Linnaea II. p. 401.
= Palmella Lyngb.

Pristleya Endl., Walp. vid. *Priestleya DC.*

Pristocarpha*) E. Meyer in herb. Dreg.
= Holophyllum Less.

Pritchardia Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 102; 1845. Syn. pl. foss. p. 260; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIX: g. lignor. fossil.

Pritzelia**) Walpers 1843. Repert. II. p. 428. 922: nov. g. Hydrocotylear. (*Cf.* Bunge in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 284 not.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 81. n. $4361/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.
= Dimetopia DC.

Pritzelia Schauer 1843. Flora p. 407: g. Bäckear.
= Scholtzia Schauer.

Pritzelia Klotzsch 1855. Begon. p. 227: nov. g. Pritzeliear. (Begonia Fischeri Otto & D.)

Pritzelieae Klotzsch 1855. Abh. Berl. Ak. f. 1854. p. 225: trib. Stephanocarpear. Gen.: Tittelbachia, Pritzelia, Wageneria.

Priva Adans. 1763. Fam. II. p. 505: g. Verbenar. (Verbena lappulacea L.)
Scop. 1777. Intr. p. 169: g. Personatar.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75: g. Verbenacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 139. n. 1426. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 277. — Kunth 1823. Syn. II. p. 61. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 338. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. — Clos 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 380.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 422; 1825. Syst. II. p. 753. n. 2112; 1831. Gen. II. p. 477. n. 2354: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2895; 1841. Nom. p. 108. n. 4190. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227. — Brongn. 1843. Én. genr.

*) πριωτός, serratus.
**) Dicat. Dr. G. Pritzel, Berolin.

Priva Adans. cont.
p. 65. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 532. Sect.: Eupriva, Aparinaria.
Link 1822. En. II. p. 223: sect. Verbenae.
Endl. 1838. Gen. n. 3690. p. 634; 1841. Ench. p. 312: g. Lippiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 290 (198). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 606. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 34; 1847. VI. p. 687. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 473.
Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 177: g. Euverbenear.
Jaub. & Spach . . . . Ill. pl. or. V. p. 57. t. 453—455. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 705.
Synon. Phryma Forsk.; Blairia Gärtn.; Castelia Cavan.; Tortula Willd.; Streptium Roxb.

Problastes*) Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 10: nov. g. Onagrar. (*Rheede* Malab. VI. p. 37.)
= Lumnitzera Willd.

Proboscidea**) Schmidel 1747. Anal. p. 49. t. 12. 13.
Mönch 1794. Meth. p. 466: g. Petalostemonis.
DC. 1845. Pr. IX. p. 253: sect. Martyniae.

Proboscidella DC. 1845. Prodr. IX. p. 253: sect. Martyniae.

Proboscidia Rich. herbar.
= Rhynchanthera DC.

Probosciphora Necker 1790. Elem. bot. I. p. 336. n. 523: nov. g. Chasmatophytor., a Rhinantho L. disjunctum.
= Rhinanthus MBieb.

Prockeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 328: trib. Flacourtiacear. Gen. Prockiear. Endl. 1843 et Ascra, Trilix, Zuelania.

Prockia „P. Browne“ Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1074. 1372. n. 1148; 1762. Sp. ed. II. p. 745; 1764. Gen. ed. VI. p. 271. n. 674; 1767. Syst. ed. XII. p. 368: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 416; 1784. Syst. p. 500. — Reich. 1778. Gen. p. 275. n. 729. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 363. n. 916. — Gmel. 1791. Syst. p. 826. — Pers. 1797. Syst. p. 537; 1807. Ench. II. p. 72. n. 1302. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1213. n. 1051.
Adans. 1763. Fam. II. p. 442: g. Cistor.
Gled. 1764. Syst. p. 122. n. 506: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 268: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 340: g. Prockiar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 6.
Neck. 1790. El. II. p. 274. n. 1034: g. Catizophytor.
Lam. 1804. Dict. V. p. 625. (Illustr. t. 645.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 190: g. Rosacear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 342.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 868: g. Rosaceis aff.
DC. 1824. Pr. I. p. 260: g. Bixinear. Sect.: Prockiaria, Aphloia. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4926. Sect. eaed. — Bartl. 1830. Ord. p. 282. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 296. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 115 (et p. 296 inter Cappareas). — Brongn. 1843. En. genr. p. 75. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 266.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 606. n. 1966; 1830. Gen. I. p. 439. n. 2177: g. Bixear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX.
Rchb. 1837. Hdb. p. 274; 1841. Nom. p. 189. n. 7189: g. Prockiear. Sect.: Prockia, Aphloia. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 919. n. 5072. Sect. ut DC.

Prockia Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 191 in adnot.: g. Flacourtianear., sejunctis Thiodia et Aphloia restrictum. *Cf.* Clos 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 268.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1421; 1841. Ench. p. 479. n. 5072: g. Prockiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 56.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 589: g. Bixacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Prockear.
Synon. Tinea Spreng.; Prockiaria DC.

Prockia A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 214: g. Tiliacear., cum Trilice conjunctum. *Cf. Zuelania et Neumannia A. Rich.*

Prockiae Juss. 1789. Gen. p. 339: sect. Rosacear. Gen.: Tigarea, Delima, Prockia, Hirtella.
Batsch 1802. Tab. p. 6: fam. Frugariar. Gen.: Prockia, Delima, Moquilea, Hirtella.

Prockiaria DC. 1824. Prodr. I. p. 260: sect. Prockiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4926 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 296. — Endl. 1839. Gen. p. 919. n. 5072 *a*.
= Prockia Benn.

Prockieae Rchb. 1837. Handb. p. 274: subdiv. Bixinear. Gen.: Prockia, Laetia, Abatia.
Endl. 1839. Gen. p. 918: trib. Bixacear. Gen.: Carpotroche, Oncoba, Phoberos, Rhinanthera, Ludia, Laetia, Prockia, Banara, Kuhlia, Azara, Pineda, Christannia, Dasyanthera. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1421; 1841. Ench. p. 478. Excluditur Rhinanthera et accedunt Thiodia, Aphloia, 1842 (Spl. II. Add. p. 108) Zuelania et 1843 (Spl. III. p. 90) Xylotheca.
Rchb. 1841. Nom. p. 189: subdiv. Bixear. Gen.: Prockia, Thiodia, Aphloia, Phoberos, Ludia, Kuhlia, Azara, Pineda.

Proclesia*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 32: nov. g. Vacciniear. (Thibaudiae sp.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1086.

Procrassula Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 323: nov. g. Crassulacear. (Crassulae auctorum europaeae.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346: g. Crassulear.
= Aithales Webb.

Procrideae Weddell 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 358: trib. Urticacear. Gen.: Pilea, Achudemia, Lecanthus, Pellionia, Nanocnide, Elatostema, Procris.

*) πρωιβλαστής, mature germinans.
**) προβοσκίς, rostrum, proboscis.

*) Procles rex Epidauri.

Procris „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 403: nov. g. Urticar.
Gmel. 1791. Syst. p. 267: g. Tetrandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 178: g. Scabridar.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 344. n. 1661: g. Monoec. Tetrandr.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 308: g. Urticear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 354; 1826. Syst. III. p. 846. n. 3101; 1831. Gen. II. p. 691. n. 3487. — D. Don 1825. Nepal. p. 60. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 345. — Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1802.
Pers. 1807. Ench. II. p. 556: sect. Böhmeriae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1884 *b.* p. 284; 1841. Ench. p. 170.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 507: g. Coenosanthear.
Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Artocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 105.
Rchb.1837. Hdb. p. 172: g. Cecropiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2495: g. Böhmeriear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 187 ad Elatostema refert.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 369: g. Procridear.

Proferea Presl 1850. Epimel. bot. p. 619 (259): nov. g. Aspidiariar. (Aspidium excellens Bl.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 358: g. Cyclodiear.

Proineia*) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 81; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Aira praecox.)
= Aspris Adans.

Proiphys Herbert 1821. App. p. 42; 1825. Bot. Mag. App. p. II: nov. g. Amaryllidear. (Pancratiformium.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1265: g. Narcissoinar.
= Eurycles Salisb.

Prolifera Vauch. 1803. Conferv. p. 14. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 355.
= Oedogonium Link.

Prolifera Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 56. 77: nov. g. Fucor. (P. rubens, angustifolia.)
= Phyllophorae Grev. pars.

Prolongoa Boissier 1840. Voy. bot. t. 93: nov. g. ex typo Leucanthemi pectinati DC. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 377.
Endl. 1842. Spl. II. p. 46. n. 2667/$_1$: g. Chrysanthemear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 193. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 245: g. Euchrysanthemear.

Promenaea Lindl. 1843. Bot. Regist. XXIX. p. 13: nov. g. Vandear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Pronacron**) Cassini 1826. Dict. v. 43. p. 370; 1829. v. 59. p. 235; 1830. v. 60. p. 577: nov. g. Millerieur. (1829 verar.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 214. — DC. 1836. Pr. V. p. 508. — Endl. 1838. Gen. n. 2465. p. 400; 1841. Ench. p. 237: — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129.) — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3006. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Pronaya*) „Hügel mss." Endl. 1837. En. pl. Hügel. p. 9; 1840. Gen. n. 5667. p. 1083; 1841. Ench. p. 572: nov. g. Pittosporear. (P. elegans.) — Par. Putterl. 1839. Syn. Pittosp. p. 26; 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 203. — Meisn. 1843. Comm. p. 348. — Walp. 1846. Rep. V. p. 73.
Rchb. 1837. Hdb. p. 270; 1841. Nom. p. 187. n. 7165: g. Billardierear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 441: g. Pittosporacear.
Synon. Spiranthera Hook.; Campylanthera Hook.

Pronephrium Presl 1850. Epimel. bot. p. 258: nov. g. ex typo Aspidii lineati Bl.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 358: g. Aspidiear.

Propolis Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 198: subg. Stictidis. — Par. Leman 1827. Dict. v. 51. p. 9.
Endl. 1836. Gen. n. 423 *a.* p. 36; 1841. Ench. p. 20: sect. Stictidis. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 332.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 38; 1842. V. p. 36; 1842. Mycol. p. 152: g. Pezizear.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 438: g. Cupulator.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 372: g. Sticteor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Agyrieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 199: g. Patellariaceor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 61. t. 19.
Synon. Xylogramma Wallr.

Prosaptia**) Presl 1836. Pterid. p. 165: nov. g. Vittariacear. (Davallia contigua Sw.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 643 *e.* p. 1350; 1841. Ench. p. 37: sect. Davalliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1032. 5.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 160: subg. Davalliae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 324: g. Davalliear.

Prosartes***) D. Don 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 341; 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 531: nov. g. Smilacear., ad Melanthaceas accedens. (Streptopus lanuginosus Michx.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 1180/$_1$. p. 1359; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1729.
Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307): g. Asparagear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 202: g. Uvulariear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235: g. Veratrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.

*) πρωΐ, mature; νέος, novus, recens.
**) προνεύω, antrorsum inclino; ἄκρον, summum.

*) Dicat. Ladisl. de Pronay, Hungaro.
**) προσάπτειν, inserere.
***) προσαρτάω, adpendo.

Proscephaleium Walp. vid. *seq.*

Proscephalium Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 248: nov. g. Rubiacear. (Chiococca javanica Bl.) *Cf.* Flora 1851. p. 538.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 755 (*Proscephaleium*): g. Coffeear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 302: g. Chasaliear.

Proselia*) D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 234; 1832. Edinb. n. phil. Mag.: nov. g. Chaetantherear. (Chaetanthera serrata Rz. & Pav.)
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35: g. Mutisiear.
= Euchaetanthera Hook. & Arn.

Proselias Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 106: sect. Astragali. (A. monspessulanus, etc.)

Proserpinaca**) Linn. 1741. Act. soc. Ups. p. 81. n. 1028; 1753. Sp. I. p. 88; 1759. Syst. ed. X. p. 881. n. 97; 1762. Sp. ed. II. p. 129; 1764. Gen. ed. VI. p. 41. n. 102; 1767. Syst. ed. XII. p. 103: g. Triandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 110; 1784. Syst. p. 128. — Reich. 1778. Gen. p. 43. n. 108. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 56. n. 134. — Gmel. 1791. Syst. p. 207. — Pers. 1797. Syst. p. 133; 1805. Ench. I. p. 111. n. 204. — Willd. 1797. Sp. I. p. 488. n. 156. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 76. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 91 (*Proserpinica*).
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Inundatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 326.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Naïadum.
Gled. 1764. Syst. p. 8. n. 27: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 68: g. Hydrocharidum. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 170. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 266.
Neck. 1790. El. III. p. 389. n. 1833: g. Catabophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 176: g. Vaginalium.
Juss. 1804. Ann. Mus. III. p. 320: g. inter Onagrarias et Ficoideas intermedium.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 149: g. Onagrariar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 52. 366.
Rich. 1808. Anal. fr. p. 34. Ed. Voigt p. 29: g. Hygrobiar.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 550 (Verm. bot. Schr. I. p. 44): g. Halorageear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 315. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 78. n. 386. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 528. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 416. — Endl. 1840. Gen. n. 6137. p. 1197; 1841. Ench. p. 640. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 117. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723. — Orb. 1849. Dict. X. p. 562 (*Proserpinaea*).
Juss. 1817. Dict. v. 7. p. 441: g. Cercodianar. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 375. — DC. 1828. Pr. III. p. 67. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 702. — Meisn. 1838. Gen. p. 122 (187).

*) προσήλιος, apricus.
**) Nomen ex Plinio.

Proserpinaca Linn. cont.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 58. 873. n. 401: g. Onagrar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 364. n. 370: g. Hydrocharidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4478: g. Hydrobiar.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 443: g. Hygrobiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. n. 6547: g. Myriophyllear.
Synon. Trixis Mitch.

Proserpinaea Orb. vid. *praeced.*

Proserpinica Nuttall vid. *praeced.*

Prosopia*) Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3091: g. Pedicularinar. (Nomen.)
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1073; 1831. Fl. exc. p. 363; 1841. Nom. p. 115. n. 4461. 2: sect. Pedicularis. (P. sceptrum.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4015 *b*. p. 694; 1841. Ench. p. 340. — Walp. 1845. Rep. III. p. 431. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 581.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272: g. Rhinanthear.
Synon. Sceptrum Carolinum Linn.; Scepanium Ehrh.

Prosopidoclineae Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 176: trib. Euphorbiacear. Gen.: Schismatopera, Spixia, Pera, Peridium. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 86. Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. Gen. ead.

Prosopis**) Linn. 1767. Mant. p. 10. n. 1260; 1767. Syst. ed. XII. p. 293: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 331; 1784. Syst. p. 398. — Reich. 1778. Gen. p. 215. n. 568. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 280. n. 706. — Gmel. 1791. Syst. p. 678. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 45. t. 63. — Pers. 1797. Syst. p. 426. — Willd. 1799. Sp. II. p. 547. n. 831.
Scop. 1777. Intr. p. 299: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 348. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 374. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 205. — Pers. 1805. Ench. I. p. 461. n. 1026. — Hedw. 1806. Gen. p. 304. n. 1206. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 326. n. 1592; 1830. Gen. I. p. 351. n. 1773. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 376. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1424.
Neck. 1790. El. II. p. 453. n. 1289: g. Chorisophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 429: g. Papilionacear.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 305: g. Mimosear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 31. (Mimos. p. 106.) — DC. 1825. Pr. II. p. 446. Sect.: Adenopis, Algarobia. — Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4170. Sect. eaed. — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 399. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 62. Sect. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (69). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 133.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Aca-

*) πρόσωπον, facies, pertona.
**) Nomen ex Dioscoride, ubi Lappam significat.

Prosopis Linn. cont.
ciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 271. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 165. — Endl. 1841. Gen. n. 6821. p. 1324; 1841. Ench. p. 682. Sejungitur Algarobia.
Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6116: g. Lagonychiear.
Benth. 1842 in Hook. Journ. bot. IV. p. 346: g. Adenantherar. Sect.: Adenopis, Anonychium, Algarobia, Strombocarpa.
Walp. 1842. Rep. I. p. 861; 1846. V. p. 581: g. Adenantherear. Sect. ut Benth. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 49.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.

Prosoposperma Rchb. vid. *Prososperma Vogel.*

Prosorus*) Dalzell 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 345: nov. g. Euphorbiacear., Flüggeae aff.
Thwait. 1854 in Hook. Kew gard. VI. p. 298. t. 10 C: g. Phyllanthear. *Cf.* Thwait. ibid. VIII. p. 271.
Baill. 1858. Euphorb. p. 619: sect. Ciccae.

Prososperma**) Vogel 1837. Linnaea XI. p. 667: sect. Cassiae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6781 *c.* p. 1316; 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6083. 5 (*Prosoposperma*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 817. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 496. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 95.

Prostanthera Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 18. t. 157.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 508. Ed. Nees p. 364: g. Labiatar. — Par. Link 1822. En. II. p. 120. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 703. n. 2066; 1831. Gen. II. p. 468. n. 2301. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 379.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 442: g. Melissear.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2832: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Benth. 1834. Labiat. p. 448; 1848 in DC. Pr. XII. p. 559: g. Prostantherear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 798. — Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 107. n. 4172. — Endl. 1838. Gen. n. 3630. p. 621 (sph. *Prostranthera*); 1841. Ench. p. 307. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 426. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. — Walp. 1845. Rep. III. p. 764. 985. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661.

Prostanthereae Benth. 1834. Labiat. p. 447; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 557: trib. Labiatar. Gen.: Chilodia, Cryphia, Prostanthera, Hemiandra, Hemigenia, Westringia, Microcorys. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 798. Gen. ead. — Endl. 1838. Gen. p. 621. Gen. ead. et 1841 (Spl. I. p. 1400 et Ench. p. 307) Atelandra et 1843 (Spl. III. p. 77) Perovskia. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. Gen. ead. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). Gen. ut Benth. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. Gen. ut Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. Gen. ex Benth.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189: div. Trachyschizocarpicar. Gen. ut Benth.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: subordo Lamiacear. Gen. ut Benth. 1834 et Atelandra, Anisandra.

Prostea Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 23: nov. g. Sapindear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 795. n. 4121. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 664. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 40. — Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Endl. 1840. Gen. n. 5608. p. 1069; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1842. Rep. I. p. 416. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285: g. Cupaniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7572: g. Cardiospermear.

Prostemium Brongn. vid. *Prosthemium Kunze.*

Prostenia Spach vid. *Porostema Schreb.*

Prosthecium Fresen. 1852. Beitr. z. Mykol. H. II. p. . . . : nov. g. Pyrenomycetum. (Sphaeriae sp.)

Prosthemium*) Kunze 1817. Mykol. Hefte I. p. 17: nov. g. Fungor. (P. betulinum.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 380.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Exosporior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 79: g. Coniomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 527 (*Prostemium*): g. Stilbosporear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 426.
Fries 1825. Pl. homon. p. 121: g. Xylomaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 239. — Endl. 1836. Gen. n. 363. p. 31; 1841. Ench. p. 19.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Dimidiator.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 176. n. 3994: g. Cytisporear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 229: g. Sporomycetum hyposporor.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 24: g. Pyrenomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 260: g. Leptostromateor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Mycol. p. 141: g. Sporocadear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 142: g. Sphaeronemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 416: g. Sphaeropsideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Pestalozzieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 229: g. Sporocadeor.

Prosthesia**) Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 866: nov. g. Ericear.

*) πρόσορος, affinis.
**) πρόσω, antrorsum, antice.

*) πρόσθημα, appendix.
**) πρόσθεσις, additamentum, appendix.

Prosthesia Blume cont.
Meisn. 1837. Gen. p. 21 (18): g. Alsodinear., Ceranthera peraffine.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7152: g. Ceranthercar.
= Alsodeia Petit-Thouars?
Prostranthera Endl. vid. *Prostanthera Labill.*
Protaxanthes Didrichsen 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . . subg. Excoecariae. (E. accrifolia.)
Protea*) Linn. 1737. Gen. p. 22. n. 59; 1737. Cliff. p. 29; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 94; 1759. Syst. ed. X. p. 887. n. 104; 1762. Sp. ed. II. p. 137; 1764. Gen. ed. VI. p. 46. n. 111; 1767. Syst. ed. XII. p. 110: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 117; 1784. Syst. p. 136. — Reich. 1778. Gen. p. 48. n. 117. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 62. n. 143. — Gmel. 1791. Syst. p. 221. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 25; 1818. Fl. cap. I. p. 445. — Pers. 1797. Syst. p. 140; 1805. Ench. I. p. 113. n. 213. — Willd. 1797. Sp. I. p. 506. n. 165; 1809. En. p. 138.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 162. n. 661: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 204: g. Pseudocompositar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 239. t. 51. f. 7 (argentea).
Juss. 1789. Gen. p. 78: g. Protear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18. — Brongn. 1843. En. genr. p. 120.
Neck. 1790. El. I. p. 105. n. 184: g. Psydomorphytor. Disjunguntur Holderlinia, Leucandrum, Vionaea.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 242: g. Proteoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Proteariar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 185: g. Proteacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 71. n. 340. — R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811.) p. 74. (Verm. bot. Schr. II. p. 138.) — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 21. 342. n. 527. — Link 1821. En. I. p. 112; 1829. Hdb. I. p. 382. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 461. n. 500; 1830. Gen. I. p. 102. n. 510. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 384. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 514. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 566.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 330: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1744; 1841. Nom. p. 63. n. 2380: g. Proteear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 409. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 230.
Endl. 1838. Gen. n. 2123. p. 337; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 76: g. Proteinar.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (244): g. Proteinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Proteidar.
Synon. Leucadendron Linn.; Leucadendros Linn.; Lepidocarpodendron Boerh.; Scolymocephalus Herm.; Lepidocarpus Adans.; Leucandrum et Vionaea Neck.?; Erodendrum et Pleuranthe Salisb.; Gaguedi Bruce; Chrysodendron Vaill.

*) Arbor imo Proteo ipso magis variabilis. (Ht. Cliff.)

Proteaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 185. t. 31: fam. plant. Gen. §. 1: Protea, Banksia, Roupala, Brabeium. §. 2: Embothrium, Linkia.
R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811.) p. 15 (Verm. bot. Schr. II. p. 53); 1810. Prodr. I. p. 363. Ed. Nees p. 219: ordo Dicotyledonum apetalar. Gen.: Aulax, Leucadendron, Petrophila, Isopogon, Protea, Leucospermum, Serruria, Mimetes, Nivenia, Sorocephalus, Spatalla, Adenanthos, Guevina, Brabeium, Persoonia, Cenarrhenes, Agastachys, Symphionema, Bellendena, Franklandia, Simsia, Conospermum, Synaphea, Anadenia, Grevillea, Hakea, Lambertia, Xylomelum, Orites, Rhopala, Knightia, Embothrium, Oreocallis, Telopea, Lomatia, Stenocarpus, Banksia, Dryandra. (*Cf.* R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 567 [Verm. bot. Schr. I. p. 82], Röm. & Schult. Syst. III. p. 447 et Juss. 1826. Dict. v. 43. p. 381.)
Knight & Salisb. 1810. Proteac. (Londin.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 329: fam. 31 plant. Ordines: Ceclismenae, Embothrieae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 211. *A. Nucamentaceae.* Tribus: Proteeae, Conospermeae, Franklandieae, Persoonieae. *B. Folliculares.* Trib.: Grevilleae, Embothrieae, Banksieae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: fam. Thalamitegmiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586; 1826. Aphor. p. 235: ordo Epichlamydear. Trib. ut Spreng. 1817.
Rchb. 1828. Consp. p. 81 (1831. Fl. exc. p. 162): fam. Ambiguar. *A. Nuciferae.* Divis.: Synapheeae, Proteeae, Persoonieae, Bellendeneae. *B. Folliculares.* Divis.: Grevilleeae, Lambertieae, Knightieae, Embothrieae, Banksieae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 169; 1841. Nom. p. 63. Divis.: Proteeae, Persoonieae, Elaeagneae.
Link 1829. Hdb. I. p. 382: ordo (11) Perigoniatar. Gen.: Leucadendron, Protea, Serraria, Persoonia, Grevillea, Hakea, Banksia, Dryandra.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 18: fam. Proteariear. Trib.: Proteae, Banksieae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (60) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 115: ordo (81) Proteinar. Gen. ut R. Brown et Cylindria?
Lindl. 1833. Nix. p. 23: ordo unicus Protealium.
Mart. 1835. Consp. p. 15: ordo 86.
Endl. 1838. Gen. p. 336; 1841. Ench. p. 214: ordo (113) Thymelaear. Subord.: *Nucamentaceae* (trib.: Proteinae, Conospermeae, Franklandieae, Persoonieae), *Folliculares* (trib.: Grevilleae, Banksieae). *Cf.* Endl. 1847. Spl. IV. p. 74. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 229; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII. Gen. foss.: Petrophiloides.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 398: fam. (169) Proteinear. Trib. fere ut Endl. — Par.

Proteaceae Jaume St. Hilaire cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 120. Trib.: Proteae, Grevilleae, Banksieae.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (243): ordo Daphnoidear. Trib. ut Endl. (Persoonieis cum Proteineis junctis; Rhopaleae loco Grevillear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 532. Subord.: *Nucamentaceae* (tribus: Proteidae, Conospermidae, Franklandidae, Persoonidae), *Folliculares* (trib.: Grevillidae, Banksidae).
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 564: fam. Dicotyledonear. apetalar. perigynar. Trib. ut Endl.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 73. Gen. bras.: Andripetalum, Rhopala, Adenostephanus.
Synon. Proteae Juss.; Proteoideae Vent.; Protearíae Batsch.

Proteae Juss. 1789. Gen. p. 78: ordo 3 class. VI. Gen. §. 1: Protea, Banksia, Roupala, Brabeium. §. 2: Embothrium.
= Proteaceae St. Hil.

Proteae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 120: trib. Proteacear. Gen.: Aulax, Leucadendron, Isopogon, Protea, Leucospermum, Mimetes, Spatalla, Persoonia, Guevina.

Proteales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 23: nixus Tubiferar. Ordo: Proteaceae.

Protearíae Batsch 1802. Tab. affin. p. 183: fam. Nuciferar. Gen.: Protea, Banksia, Ropala, Brabejum, Embothrium.
= Proteaceae St. Hil.

Protearieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15: ordo Torosepalar. Fam.: Proteaceae, Eleagnideae, Thymelineae, Aquilariaceae, Penaeaceae.

Proteeae Rchb. 1828. Consp. p. 81: div. Proteacear. (nuciferar.) Gen.: Adenanthos, Spatalla, Sorocephalus, Nivenia, Serruria, Petrophila, Isopogon, Mimetes, Leucospermum, Protea, Leucadendron; Guevina. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 169 (restrict.); 1841. Nom. p. 63. Subdivis.: *genuinae* (gen. Proteinar. Endl.), Banksieae, Grevilleae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 400. 403: trib. Proteacear. Gen. Proteïnar. Endl. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 211. (Nucamentacear.) Gen. ead.

Proteidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 533: trib. Proteacear. Nucamentacear. Gen. Proteinar. Endl.

Proteina Rchb. vid. *Proteinia Seringe.*

Proteinae Bartl. 1830. Ord. p. 110: class. (26) Gymnoblastor. Ordines: Laurineae, Santalaceae (et Antholoboleae), Elaeagneae, Thymelaeae, Proteaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 169: ordo Monochlamydear.

Proteinae Endl. 1838. Gen. p. 336; 1841. Ench. p. 215: trib. Proteacear. Nucamentacear. Gen.: Aulax, Leucadendron, Petrophila, Isopogon, Protea, Leucospermum, Mimetes, Serruria, Nivenia, Sorocephalus, Spatalla, Adenanthos.

Proteineae Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 396: class. (37) Dicotyledonum apetalar. Fam.: Proteaceae, Thymeleae, Elaeagneae, Santalaceae, Laurineae.

Proteineae Spach cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXXI. 120: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Proteaceae, Eleagneae.

Proteineae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 331 (243): trib. Proteacear. Gen. Proteinar. Endl. et Guevina, Brabeium, Potameia, Cenarrhenes, Persoonia, Agastachys, Symphyonema, Bellendena. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 564. Gen. Proteinar. Endl.

Proteinia*) Seringe 1824 in DC. Prodr. I. p. 366: sect. Saponariae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5360 *a* (*Proteina*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 397. — — Endl. 1840. Gen. n. 5246 *a γ*. p. 972; 1841. Ench. p. 506; 1842. Spl. II. p. 77; 1843. Spl. III. p. 93. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 301. — A. Braun 1843. Flora p. 381. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 181.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7816: g. Saponariear.

Proteoideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 241: ordo 3 class. VI. Gen.: Protea, Banksia.
= Proteaceae St. Hil.

Proteoides Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 35: trib. Lycoperdi.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 297: sect. Lycoperdi.
= Langermannia Rostk.

Proteophyllum Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 39; 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 130: sect. Celtidis. (C. crassifolia, occidentalis, etc.)

Proteopsis Martius & Zuccar. mss. (*Protolepis Steud.* Nom. II. p. 401.)
= Hololepis DC.

Protium Burm. 1768. Ind. p. 88.
Scop. 1777. Intr. p. 106: g. Strictar.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 350 (Gen. Tereb. p. 18); 1825 in HBK. Nov. gen. VII. p. 24 adnot.: g. Burseracear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 78. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 230. — Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56). — Endl. 1840. Gen. n. 5929. p. 1136; 1841. Ench. p. 602. — Walp. 1842. Rep. I. p. 557. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 15. p. 229.
Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 409: g. Terebinthacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1271.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3840; 1841. Nom. p. 145. n. 5635: g. Burserear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 394. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 176. Sect.: Protium, Balsamodendron.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 83: g. Burseriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.
Synon. Tingulong Rumph.

*Protobrya***) Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 106: ordo Muscor. Gen.: Lycopodium.
= Lycopodiaceae DC.

Protococcaceae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. 154: ordo 6 Algar. Gen.: Protococcus, Haematococcus, Chlorococcum.

---

*) προτείνω, extendo.
**) πρῶτος, primus.

Protococceae Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. p. 57 (Flora 1843. p. 467): trib. Nostochinoidear.
Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. ... : fam. Algar. globuliferar. Gen.: Botrydina, Haematococcus, Protococcus.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 16. 21. 99: trib. Coccothallar. Subtrib.: Euprotococceae, Haematococceae. *Cf.* Flora 1849. II. p. 609.

Protococcidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 18: trib. Palmellear. Gen. Protococcoidear. Men. 1842 et Hormospora.

Protococcinae Rchb. 1841. Nomencl. p. 17: div. Nostochinar. Gen.: Cryptococcus, Chlorococcus, Protococcus, Micraloa, Palmella, Scythymenia.

Protococcoideae Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 25: fam. Algar. Gen.: Cryptococcus, Protococcus, Chlorococcum, Micraloa.
Menegh. 1842. Nostoch. p. ... : subtrib. Nostochinear. Gen.: Protococcus, Haematococcus, Chlorococcum, Pleurococcus, Stereococcus.
Endl. 1843. Spl. III. p. 10: trib. Palmellear. Gen. ead.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 11: div. Algar. imperfectar. Gen.: Protococcus, Micraloa, Botrydina, Haematococcus, Pleurococcus, Palmella, Polycoccus.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: subtrib. Palmellear. Gen. ut Men. 1842 et Cryptococcus.

Protococcus Agardh 1824. Syst. Alg. p. XVII. 13; 1826. Nov. Act. Leop. XII. 2. p. 749: nov. g. Nostochinar. (Lepraria kermesina Wrang.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 28. p. 3; 1841. Ench. p. 3.
Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 418: g. Chaodinar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 758. n. 3868: inter primordia Algar.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 365: g. Algar. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 362.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406; 1841. Brit. Alg. p. 181: g. Ulvacear. — Simil. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 134 (in appendice).
Menegh. 1838. Cenni p. 25; 1842. Mon. Nostoch. p. 10: g. Protococcoidear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 10. n. 1. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 11. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. 571.
Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 573: g. Protococcinar.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phyc. gener. p. 167; 1845. Phyc. germ. p. 144; 1849. Sp. Alg. p. 196. n. 153: g. Palmellear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 66. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 58 (nivalis). — Math. 1853. Belg. II. p. 524.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. ... : g. Protococcear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Protococcidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. 154: g. Protococcacear.

Protococcus Agardh cont.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 22: g. Euprotococcear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. genuinar. eremobiar.
Synon. Sphaerella Sommerf.; Coccophysium Link; Zoogalactina Sette; Aërophytum Meyen; Chlorococcum Grev.; Protosphaeria Turp.; Pleurococcus Menegh.

Protoderma Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phycol. gener. p. 295; 1845. Phycol. germ. p. 242: nov. g. Ulvacear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 7.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 133: g. Ulvear. (genuinar.) — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 471. n. 292: g. Protodermacear.

Protodermaceae Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 471: fam. Dermatoblastear. Gen.: Protoderma, Inoderma.

Protolepis Steud. vid. *Proteopsis Mart.*

Protolinum Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 597; 1848. ibid. VII. p. 165: series Eulini. (Linum usitatissimum, grandiflorum, nervosum.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 94.

Protomyceae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 532: fam. Fungor. Divis.: Coeomideae, Stilbosporideae, Xylomideae, Gymnosporangideae, Aegeritideae, Tuberculardeae.

Protomyces Unger 1833. Exanth. p. 341. t. 9. f. 15—17: nov. g. inter Exanthemata vegetabilium et Cariem intermedium. (P. endogenus, macrosporus et microsporus.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 215.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 4: g. Uredineor. (genuinor.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 2. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492. (?)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 8: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
L. & Ch. Tul. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 112: g. Ustilaginear.
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 374; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 788: g. Uredinear. dubiar.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 517: g. Hypodermior.?
.= Nosophlaea Fries?

Protomycetes Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 32: fam. Coniomycetum. Gen.: Hormiscium, Cylindrium, Alysidium; Taeniola, Chalara, Helicomyces, Bispora, Septonema, Spilocaea; Ustilago, Uredo.

Protomyci Nees 1817. Überbl. p. 1: regnum I. vegetabilium mycetoideor. Circuli: Coniomyci, Goniomyci, Sphaeromyci.

Protonema Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXII. 43: nov. g. Byssoidear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 416. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 191.
Fries 1825. Pl. homon. p. 313: g. Byssacear. spuriar.
Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 458: g. Oscillatorinar.

Protonema Agardh cont.
Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15: g. Rhizomorpheor.
Menegh. 1838. Cenni p. 30: g. Confervar.
Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 660: g. Confervear.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466): g. Euconfervear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gener. p. 282; 1845. Phyc. germ. p. 227: g. Protonemear. (P. repens, Bryi annotini primordium.) — Par Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 11. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 3. p. 15.
Synon. Herpothricum Fries; Herpetrichum Agdh.; Herpotrichum Brongn.

Protonema Kütz. 1841. Natuurk. Verh. Haarl. II. t. O. fig. g. h. (P. dichotomum.)
= Gongrosira Kütz.

Protonemeae Rchb. 1837. Handb. p. 136: subdiv. Vaucheriear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gener. p. 281: fam. Dermatosiphear. Gen.: Gongrosira, Protonema. — Par Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 11. (ectospermear.) Gen. ead.
Kütz. 1843. Phyc. germ. p. 226: fam. Confervinar. Gen. ead. et Chlorotylium.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 15: div. Algar. imperfectar. Gen.: Protonema, Chlorotylium.

Protonopsis Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 15. p. 230: nov. g. pro Protii speciebus (W. & A.) propositum.

Protophyta Endl. 1836. Gen. p. 1; 1841. Ench. p. 1: sect. Thallophytor. Classes: Algae, Lichenes.
Unger 1838. Aphor. (Linnaea Litt. 1838.)
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 810): class. I. plant. Ord.: Fungi, Lichenes, Algae.

Protophyta Endl. Gen. p. 42: vid. *Acrobrya*.

Protopterideae Corda 1845. Flora d. Vorw. p. 75: fam. Filicum fossilium. Gen.: Zippea, Protopteris, Sphalmopteris, Chelepteris, Stemmatopteris, Ptychopteris, Caulopteris, Cottaea.

Protopteris Sternb. 1838. Vers II. p. 69: g. Filicitum.
Göpp. 1842. Nov. Act. Leop. XIX. 2. p. 118: g. Filicitar.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 77: g. Protopteridear.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 107; 1846. Chlor. prot. p. LI: caudex Filicis foss.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 84: g. Caulopteridear.

Protosphaeria Turp. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 160. t. 11. f. 7: nov. g. Vegetabilium simplicium. (P. simplex.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 27: g. Euprotococcear.
= Protococcus Agardh?

Protostelides*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 289 (Coll. Mém. VI.): subsect. Euloranthi.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 411: sect. Struthanthi.

Proustia Lagasca mss.
= Actinotus Labill.

Proustia*) Lagasca 1811. Amen. nat. I. p. 33: nov. g. Chaenanthophorar.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 67. 70: g. Labiatiflorar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 555; 1826. Syst. III. p. 502. n. 2742; 1831. Gen. II. p. 623. n. 3092: g. Perdiciear.
Cass. 1824. Dict. v. 33. p. 463: g. Mutisiear. (Archetypar.?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2265. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Less. 1830. Linnaea V. p. 280; 1832. Syn. p. 110.
Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 417: g. Corymbiferar.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 395; 1830. v. 60. p. 570: g. Stähelinear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9.
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 198: g. Trixidear. Sect.: propriae, Harmodia. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 171.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 26: g. Eumutisiear. Sect.: Euproustia, Baccharoides, Thelecarpaea, Harmodia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2918. p. 484 (sect.: Euproustia, Leucoryphe, Harmodia); 1841. Spl. I. p. 1385; 1841. Ench. p. 248 (sect. ut DC.). — Meisn. 1839. Gen. p. 230 (142).
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3790: g. Chuquiragear. Sect.: Proustia, Baccharina, Thelecarpaea, Harmodia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.

Provenzalia Adans. 1763. Fam. II. p. 469: g. Aror. (Calla palustris L.)
= Calla Linn.

Provinca Caesalp. 1583. De plant. lib. 8. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 17.)
= Vinca Linn.

Prozetia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 225. n. 372: g. Dicroophytor.
= Pouteria Aubl.

Prozopsis Müll. vid. *Pozopsis Hook.*

Prune Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 85: sect. Pruni. (P. spinosa, insiticia, etc.) — Simil. Römer 1847. Fam. nat. III. p. 5. 36. (restrict.)
= Prunophora Neck.

Prunella**) Moris. 1680. Hist. pl. II. lib. 3. sect. 11.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 224: g. pl. class. IX.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 188. n. 782: g. Petalostemonum.
Linn. 1753. Sp. II. p. 600; 1759. Syst. ed. X. p. 1106. n. 654; 1763. Sp. ed. II. p. 837; 1764. Gen. ed. VI. p. 301. n. 735; 1767. Syst. ed. XII. p. 404: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 458; 1784. Syst. p. 547. — Reich. 1778. Gen. p. 304. n. 793. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 397. n. 990. — Gmel. 1791. Syst.

*) στηλίς, parva columna (?).

*) Dicat. chemico cel. Proust.
**) De nomine conf. *Brunella Tourn.*

Prunella Moris. cont.
p. 920. — Pers. 1797. Syst. p. 584. — Willd. 1800. Sp. III. p. 176. n. 1125; 1809. En. p. 631. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 36.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 137. n. 1419. — Poir. 1817. Dict. v. 5. p. 379 (*Brunelle*). — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 323. — Link 1822. En. II. p. 121; 1829. Hdb. I. p. 489. — Kunth 1823. Syn. II. p. 96. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 691. n. 2051; 1831. Gen. II. p. 464. n. 2283. — D. Don 1825. Nepal. p. 109. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 382.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1772. Intr. p. 162. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 378.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 239: g. Gymnospermar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 279.
Hill 1769. Ht. kew. p. 244: g. Monopetalar.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 382: g. Pericarpiferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 66: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 443: g. Melissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXV.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2813: g. Salviear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 5. 101: g. Bilabiatar.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 330: g. Nepetear.
Benth. 1834. Labiat. p. 416: g. Scutellarinear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 574. Ed. II. p. 659. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 790. — Endl. 1838. Gen. n. 3624. p. 620; 1841. Ench. p. 307. — Kunth 1838. Berol. II. p. 99. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. — Meisn. 1840. Gen. p. 285 (194). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 421. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 128. — Walp. 1845. Rep. III. p. 745. 984. — Webb .... Canar. III. p. 83. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 575.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4147: g. Prunellear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 67: g. Scutellariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Scutellarear.
= Brunella Tourn.

Prunelleae Rchb. 1837. Handb. p. 189; 1841. Nomencl. p. 107: sect. Prasiear. Gen.: Horminum, Lepechinia, Prunella, Cleonia.

Prunilia Dochnahl 1855. Obstk. I. p. 296: g. Malor. (*Kirschapfel.*)

Prunophora Necker 1790. Elem. bot. II. p. 71. n. 719: g. Sarcodiphytor.
Endl. 1841. Ench. p. 663. n. 6406 *b*: sect. Pruni.
Synon. Prunus Tourn.; Prune Griseb.

Prunulus „Caesalpin.“ Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 596. 630: nov. g. Pratellidear. (Agaricus denticulatus Bolt., papyraceus, foenisicii, ericaeus, varius, titubans etc. Pers.) *Cf. Brunulus Caesalp.*
= Coprinarii, Bolbitii etc. Fries spec.

Prunus Tourn. 1700. Inst. p. 622. t. 398: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 119. Ed. Hall. 1745. p. 132: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 141. n. 396; 1737. Cliff. p. 186; 1742. Gen. ed. II. p. 214. n. 474; 1748. Ups. p. 124: g. Icosandr. Monogyn. — Par. GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 151. 170.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 355: g. Pomiferar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 276. n. 1134: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 671.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Drupacear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 483. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 591. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 45. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 558.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 192.
Adans. 1763. Fam. II. p. 305: g. Zizyphor.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 171: g. Calyciflorar.
Juss. 1789. Gen. p. 341: g. Amygdalear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 354. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 241. — Kunth 1824. Syn. III. p. 480. — DC. 1825. Pr. II. p. 532. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 391. — Meisn. 1837. Gen. p. 102 (72). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 406. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 577.
Borckh. 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 39. (Char. emend.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 34: sect. Pruni. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 310. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 827; 1832. Fl. exc. p. 643. — Koch 1836. Syn. p. 205. Ed. II. p. 228. — Endl. 1840. Gen. p. 1251. n. 6406 *b*. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 4. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 363.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV; 1828. Consp. p. 177. n. 4706; 1841. Nom. p. 177. n. 6862: g. Cerasear.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 498: g. Amygdalacear.
= Prunophora Neck.

Prunus Linn. 1753. Sp. I. p. 473; 1759. Syst. ed. X. p. 1056. n. 546; 1762. Sp. ed. II. p. 677; 1764. Gen. ed. VI. p. 249. n. 620; 1767. Syst. ed. XII. p. 341: g. ampliat. Isocandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 342. — Murr. 1774. Syst. p. 385; 1784. Syst. p. 462. — Reich. 1778. Gen. p. 254. n. 675. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 336. n. 849. — Lour. 1790. Coch. I. p. 317. — Pers. 1797. Syst. p. 496. — Willd. 1799. Sp. II. p. 984. n. 982; 1809. En. p. 517. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 284. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 102. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 293. 304. Sect.: Cerasus, Prunus, Armeniaca. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 500.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Spreng. 1825.

Prunus Linn. cont.
Syst. II. p. 476. n. 1816; 1830. Gen. I. p. 403. n. 2016. — Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 405. Sect.: Padi, Cerasi, Armeniacae, Pruni genuinae.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 93: g. Calyciflorar.
Scop. 1777. Intr. p. 217: g. Calycanthemar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 297.
Gmel. 1791. Syst. p. 794: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 214.
Batsch 1802. Tab. p. 4: g. Drupiferar.
Cram. 1803. Disp. p. 118: in Dodecandr. Monogyn. (P. spinosa.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 34. n. 1221: g. Amygdalear. Sect.: Cerasus, Prunus. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 867. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 823. Sect. ut Pers. et Armeniaca. — Bartl. 1830. Ord. p. 405. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 210. — Link 1831. Hdb. II. p. 74. — Koch 1836. Syn. p. 205. Ed. II. p. 228. Sect. ut Rchb. et Padus. — Kunth 1838. Berol. I. p. 210. — Endl. 1840. Gen. n. 6406. p. 1250; 1841. Ench. p. 663. Sect.: Armeniaca, Prunus (1841 Prunophora), Cerasus. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 42. — Brongn. 1843. En. genr. p. 126. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 85. Sect.: Prune, Cerasus, Padus. — Walp. 1843. Rep. II. p. 8 (sect. ut Endl.); 1846. V. p. 648. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 3. Sect. ut Koch. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 513. Sect. ut Endl. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 363. Sect.: Armeniaca, Prunus, Cerasus, Nothocerasus, Laurocerasus. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 651.
Link 1822. En. II. p. 32: g. Myrtacear.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 305: g. Drupacear.
D. Don 1825. Nepal. p. 239: g. Amygdalinar.
Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 419: g. Rosacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1104.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 642: g. Cerasear. Sect.: Padus, Cerasus, Prunus, Armeniaca.
Webb .... Canar. II. p. 18: g. Amygdalinear. Sect.: Padus, Laurocerasus.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 352: g. Drupear.
Synon. Prunus, Armeniaca et Laurocerasus Tourn.; Cerasus Juss.; Prunophora et Cerasophora Neck.

Prunus Römer 1847. Fam. nat. syn. III. p. 5. 34: g. Amygdalacear. rectrictissimum. Sect.: Spinus, Prune, Chikasa.

Pryona Miquel 1857. Fl. Ind. bat. I. p. 1081: nov. g. Amherstiear. (Touchiroa bantamensis Hassk.)

Psacalium*) Cassini 1826. Dict. v. 43. p. 461: nov. g. Adenostylear. (Cacalia peltata Kunth.)
Endl. 1838. Gen. n. 2807 *a*. p. 458; 1841. Ench. p. 244: sect. Psacalii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3361. 1.
= Psacalii DC. pars.

Psacalium DC. 1837. Prodr. VI. p. 334: g. Euseneciear., injuncta Pentacalia ampliat. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2807. p. 458; 1841. Ench. p. 244. Sect.: Psacalium, Pentacalia. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136).
Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3361: g. Senecionear. (genuinar.) Sect. ut Endl. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Psaliota Endl. vid. *seq.*

Psalliota*) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 280; 1828. Elench. I. p. 40: trib. Pratellae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 74: sect. Pratelli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *B e*.
Endl. 1836. Gen. n. 453 *III e*. p. 40; 1841. Ench. p. 22 (*Psaliota*): subsect. Pratellae. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 466. — Bail 1858. Syst. p. 36. t. 35.
Fries 1836. Epicr. p. 212; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 294: subg. Pratelli.
Rchb. 1841. Nom. p. 13. n. 502. 5 *b*: subsect. Plutei.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.
Math. 1853. Belg. II. p. 354: subsect. Pratelli.

Psamma**) Palis. 1812. Agrost. p. 143: nov. g. Graminear. (Arundo littoralis.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 463. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 55. 845. n. 387. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 361. n. 356; 1830. Gen. I. p. 76. n. 372. — Sond. 1851. Fl. Hamb. p. 41.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 143. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 907. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 79. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 433. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 479.
Trin. 1820. Fund. p. 109: sect. Arundinis.
Schult. 1824. Mant. II. p. 464: g. Triandr. Monogyn.
Synon. Ammophila Host; Amagris Rafin.

Psammanthe Rchb. 1841. Icon. fl. germ. V; 1841. Nomencl. p. 205. n. 7777: nov. g. Minuartiear.

Psammanthe „Hance Pl. nov. Austr. Chin. diagn. II. p. 13" Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 659: g. Sesuviear. (P. marina.)

Psammelymus Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 331: sect. Elymi. (E. arenarius, etc.) — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 350.
= Psammochloa Endl.

Psammiris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 69; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 110: subg. Iridis. (I. arenaria Kit.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 828.

Psammisia***) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 42: nov. g. Vacciniear. (Thibaudiae sp.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1091 — Planch. 1853. Fl. d. serr. VIII. p. 205. t. 825.

Psammochamela Fenzl 1842. Pl. syr. pug. p. 14: sect. Hutchinsiae. (H. procumbens.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 88. n. 4931 *c*.
Synon. Pleiospermum Gaud.

*) Contractum ex Pseudo- et Cacalia.

*) ψαλίς, fornix; οὖς, auris. (?)
**) ψάμμος, arena.
***) Psammis, rex Aegypti.

Psammochloa Endl. 1837. Gen. n. 915 *a*. p. 103; 1841. Ench. p. 59: sect. Elymi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1377. 2.
Synon. Psammelymus Griseb.

Psammocorchorus Rchb. 1841. Nomencl. p. 210. n. 7969: g. Tiliear. genuinar. = Guazumoides DC.

Psammogeton Edgeworth 1846. Linn. Trans. XX. 1. p. 57: nov. g. Umbelliferar. (P. biternatum.) *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 713.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 355: g. Caucalinear.

Psammophila Fenzl 1840 in Endl. Gen. p. 965. n. 5227. 13; 1841. Ench. p. 505. n. 5227 *a*: sect. Alsines.

Psammoseris Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 11. p. 52: nov. g. Cichoraceear. (Barkhausia senecionides Spr.) *Cf.* Flora 1850. p. 55.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 971: g. Lactucear.

Psammostachys Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 521 (Bot. Bemerk. p. 91): nov. g. pro Harveya rubra Hook. propositum.

Psammotropha Ecklon & Zeyh. 1836. Enum. pl. Afr. II. p. 286: nov. g. Molluginear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95: *Psammotrophia*). — Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 263. — Endl. 1839. Gen. n. 5189. p. 953; 1841. Ench. p. 501. — Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6299. (genuinar.) — Walp. 1843. Rep. II. p. 247. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Synon. Mallogonum Fenzl.

Psammotrophia Meisn. vid. *praeced.*

Psanacetum*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 89. n. 161: nov. g. Siphoniphytor., a Tanaceto L. disjunctum.
Less. 1832. Syn. p. 265: subg. Tanaceti.
DC. 1837. Pr. VI. p. 130: sect. Tanaceti. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2696 *b*. p. 439; 1841. Ench. p. 242. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3454. 2. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 603. — Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 220.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24: g. Chrysanthemear.

Psanchum**) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 254. n. 405: nov. g. Campylophytor., a Cynancho L. sejunctum.

Psarolithus***) A. Spreng. 1828. Comm. de Psarolithis: nov. g. ligni foss.

Psaronieae Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 4: ordo Filicum (jam 1841 in Endl. Ench. p. 44 indicatus). Gen.: Psaronius.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 144; 1846. Chlor. prot. p. LX: ordo Selaginum. Gen. id.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 93: div. Lycopodiacear. Gen. id. et Heterangium, Diplotegium.

Psaronius Cotta 1832. Dendrolith. p. 26: nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora Lit. II. p. 127.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 456: g. Filicum foss.

*) Contractnm ex Psendotanacetnm.
**) Contractum ex Pseudocynanchum.
***) ψαρός, fuligo, cinis. (?)

Psaronius Cotta cont.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 173: g. Filicitum. (*Synon. Endogenites Spr.*)
Unger 1842 in Endl. Spl. II. p. 4. n. 687/1; 1845. Syn. p. 144; 1846. Chlor. prot. p. LX: g. Psaroniear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 93.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 93: g. Angiopteridear. — Par. Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 288. Sect.: Eupsaronius, Trimatopteris.

Psathura*) „Commers.“ Juss. 1789. Gen. p. 206; 1820. Mém. Mus. VI. p. 396: nov. g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 446. — Pers. 1805. Ench. I. p. 392. n. 865. — Hedw. 1806. Gen. p. 224. n. 910. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 485 (*Psatura*).
Gmel. 1791. Syst. p. 577: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 229. n. 678.
Batsch 1802. Tab. p. 235: g. Guettardear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2101. — Bartl. 1830. Ord. p. 212. — DC. 1830. Pr. IV. p. 462. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 555. — Meisn. 1838. Gen. p. 166 (117).
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 82. t. 194.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84 (sph. *Pstathura*): g. Pyrenidiae.
Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 158; ed. 1832. I. p. 531: g. Pentandr. Monogyn.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Psathurear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 214: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
Walp. 1843. Rep. II. p. 488: g. Euguettardear.
Synon. Chicoinaea Comm.; Psathyra Spreng., Endl.

Psathureae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Rubiacear. Gen.: Psathura, Chomelia, Mathiola, Cuviera, Laugeria.

Psathurochaeta**) DC. 1836. Prodr. V. p. 609: nov. g. Verbesinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2546. p. 414 (*Psaturochaeta*); 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3149 (*Psaturochaeta*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
= Lipotriche R. Brown.

Psathyra***) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 11 (*Psatyra*). 295; 1828. Elench. I. p. 41: trib. Pratellae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 75: subsect. Pratelli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *B a*. — Math. 1853. Belg. II. p. 353.
Endl. 1836. Gen. n. 453 *III b*. p. 40; 1841. Ench. p. 21: subsect. Pratellae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 2 *a*. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 461. — Bail 1858. Syst. p. 36.
Fries 1836. Epicr. p. 231; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 296: subg. Pratelli.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

*) ψαθυρός, fragilis, siccus.
**) ψαθυρός, fragilis; χαίτη, seta.
***) Nomen ob fragilitatem insignem.

Psathyra Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 614: g. Guettardear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2850. (genuinar.)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 127. n. 1313; 1830. Gen. I. p. 244. n. 1274: g. Rubiacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XVI. 92.
Endl. 1838. Gen. n. 3200. p. 542; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
= Psathura Comm.

Psathyrella Fries 1836. Epicr. p. 237; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 297: subg. Coprinarii. — Par. Bail 1858. Syst. p. 36.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 1 *a*: subsect. Coprinarii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Psathyrotes A. Gray 1853. Pl. Wright. II. p. 100. t. 13: g. Senecionear. (*Psathyrotus Nutt.*) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 163.

Psathyrotus Nuttall . . . . Journ. Ac. Philad. n. ser. I. p. 179: sect. Bulbostylis.
= Psathyrotes A. Gray.

Psatura Poir. vid. *Psathura Comm.*

Psaturochaeta Endl., Rchb. vid. *Psathurochaeta DC.*

Psatyra Fries vid. *Psathyra Fries.*

Psecadia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 414: nov. g. Cytisporeor. (Cytisporae sp.)

Psectra*) Endl. 1838. Gen. n. 2847 *c*. p. 467; 1841. Ench. p. 245: sect. Echinopis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3926. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 667; 1847. VI. p. 281.

Psedera**) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 158. n. 267: nov. g. Gitonophytor., ab Hedera L. disjunctum.

Psedomelia***) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 150. n. 1496: nov. g. Cratoophytor., a Bromelia L. segregatum.

Pselium†) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 621. Ed. Willd. p. 762: nov. g. Dioec. Hexandr. (P. heterophyllum.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 390 (*Psellium*).
DC. 1818. Syst. I. p. 531; 1824. Pr. I. p. 100: g. Menispermear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 487. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 904. n. 3185; 1831. Gen. II. p. 708. n. 3573. — Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1882; 1841. Nom. p. 69. n. 2617. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 243. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 109. — Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7). — Endl. 1839. Gen. p. 826. n. 4686. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7.
Endl. 1841. Ench. p. 415. n. 4686: g. Menispermacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 309.
Miers 1851. Ann. and Mag. 2d. ser. VII. p. 36: g. Eleutharrhenear.

Psellium St. Hil. vid. *praeced.*

Psephelloides Jaub. & Spach . . . . Illustr. pl. or. III. p. 16: sect. Phaeopappi. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 446.

*) ψήκτρα, strigilis.
**) Nomen contractum ex Pseudohedera.
***) Nomen contractum ex Pseudobromelia.
†) ψέλιον, armilla: ob nucem armillarem.

Psephellus*) Cassini 1826. Dict. v. 43. p. 488: nov. g. Centauriear. (Centaurea dealbata W.) — Par. C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 437.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Jaceinear. verar.
DC. 1837. Pr. VI. p. 575: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *m*. p. 473; 1841. Ench. p. 246. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 695. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 294.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 2 *g*: subsect. Centaureae.
Synon. Heterolophus Cass. *

Psephellus Fischer & Meyer mss.
= Phaeopappus DC.

Pseudacacia Mönch vid. *Pseudoacacia Tourn.*

Pseudachne Endl. 1837. Gen. n. 801 *b*. p. 88; 1841. Ench. p. 57: sect. Aristidae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1202. 2.
Synon. Streptachne Kunth.

Pseudachomanes Presl 1850. Epimel. bot. p. 376: sect. Trichomanis. (Tr. sinuosum Rich., etc.)

Pseudacynos Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 244: sect. Hedeomae.

Pseudagrostemma A. Braun 1843. Flora p. 368: sect. Coronariae.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 224 (*Pseudoagrostemma*): sect. Lychnidis.
= Lychnidis sect. Agrostemma Fenzl.

Pseudais Decaisne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 40: nov. g. Aquilariear. (Dais coccinea Gaudich.) *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 599.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 289: g. Aquilarinear. — Par Walp. 1846. Rep. V. p. 410.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 579: g. Aquilariacear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 603: g. Drymispermear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 883.

Pseudaleia Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 51 in Römer Collect. bot. p. 207: nov. g. Guttiferar. *Cf.* Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 348 et Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 494.
DC. 1824. Pr. I. p. 533: g. Olacinear. (minus notum). — Par Schult. 1829. Syst. VII. p. XIV. 82. — Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 582. — Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33). — Endl. 1840. Gen. n. 5493. p. 1042; 1841. Ench. p. 546. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5264. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 263 (dubium). — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 13. 24.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3614: g. Olacinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: g. Olacacear. dubium.

Pseudaleioides Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 52 in Römer Collect. bot. p. 207:

*) ψῆφος, globulus: a pappo globulis consperso.

Pseudaleioides Petit-Thouars cont. nov. g. Guttiferar. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 495.
DC. 1824. Pr. I. p. 533: g. Olacinear. (dubium.) — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XIV. 83. — Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 582. — Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33). — Endl. 1840. Gen. n. 5494. p. 1042; 1841. Ench. p. 546. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5265 (*Pseudaleiopsis*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 263 (*Pseudaleoides*). — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 13. 25.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3615: g. Olacinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: g. Olacacear. dubium.

Pseudaleiopsis Rchb. vid. *Pseudaleioides Pet.-Th.*

Pseudaleoides Spach vid. *praeced.*

Pseudanchusa A. DC. 1846. Prodr. X. p. 158: sect. Omphalodis.

Pseudangelica DC. 1830. Prodr. IV. p. 158: sect. Angelicae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 323. — Endl. 1839. Gen. n. 4456 *b.* p. 778; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5485. 2.
Synon. Nomoselinum DC.

Pseudangiopteris Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 283: sect. Angiopteridis.

Pseudanisomeles Benth. 1835. Labiat. p. 700; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 601: sect. Ajugae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 873 (*Pseudoanisomeles*). — Endl. 1838. Gen. n. 3680 *c.* p. 632; 1841. Ench. p. 309. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4159 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 930.

Pseudantheae Endl. 1838. Gen. p. 328: familiola Santalaceis aff., serius ad Phyllantheas relata. Gen. Pseudanthus.

Pseudanthus „Sieber" Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 25: g. Santalear.?
Spreng. 1830. Gen. I. p. 45. n. 207: g. Santaleis aff. (Triandr. Monogyn.
Guillem. . . . . Dict. hist. nat. XIV. p. 318.
Endl. 1832. Flora II. p. 392; 1833. Atakt. bot. p. 11. t. 11: g. fam. novae, Anthobolo et Empetreis aff. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 243.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282: g. Stackhousiear.
Endl. 1838. Gen. p. 328. n. 2089: g. Pseudanthear.
Decne 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 157: g. Euphorbiacear., Micrantheae proximum.
Endl. 1841. Spl. I. n. 5845/1. p. 1424; 1841. Ench. p. 588: g. Phyllanthear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7408. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 556: g. Colmeiroidear.

Pseudanthus Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 3. t. 1776: nov. g. Achyranthear. (Aerva brachiata Mart.)

Pseudarabis Endl. vid. *Pseudo-Arabis Meyer.*

Pseudarctotis DC. 1837. Prodr. VI. p. 489: sect. Arctotidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2830 *b.* p. 464; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3234. 2.

Pseudarthria Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 209: nov. g. Clitoriear. (Hedysarum viscidum L.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62).
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Cajanear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6689. p. 1299; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5834. — Walp. 1842. Rep. I. p. 783. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 171.

Pseudastilbe DC. 1830. Prodr. IV. p. 51: sect. Tiarellae. An genus proprium?
= Hoteia Morr. & Decne.

Pseudathrixia DC. 1837. Prodr. VI. p. 277: sect. Athrixiae. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 730 (*Pseudoathrixia*). — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2770 *b.* p. 452; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3529. 2.
Synon. Asteropsis Less.

Pseudathyrium Newman 1851. Syn. brit. ferns p. 14: nov. g. Filicum. (Polypodium alpestre Koch.)

Pseudelephantopus Rohr 1792 in Danske Nat. Selsk. Skrivt. II. 2. p. 213: nov. g. pl. (Elephantopus spicatus Sw.)
Endl. 1838. Gen. n. 2231 *c.* p. 362; 1841. Ench. p. 232: sect. Elephantopodis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3928. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 543; 1848. Ann. bot. I. p. 391. — Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 519.
Synon. Distreptus Cass.; Matamoria La Llave & Lex.; Pseudoelephantopus Steud.

Pseuderemia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 658: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 30. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *d.*

Pseuderigeron Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 178: sect. Erigerontis. (E. filifolium, etc.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 582.

Pseuderiopsis Rchb. f. 1849. Linnaea XXII. p. 852: nov. g. Orchidear., Eriopsidi aff. (P. Schomburgkii.)
Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 543: g. Vandear.

Pseudevax DC. 1836. Prodr. V. p. 459: sect. Evacis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2420 *b.* p. 392; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3555. 2.

Pseudinga Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 590: sect. Ingae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 628.

Pseudiosma A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 519: g. Rutacear.?
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 807: g. Rutaceis aff.
Endl. 1840. Gen. n. 5981. p. 1149; 1841. Ench. p. 609: g. Zanthoxylear. dubium.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7484: g. Xanthoxylear.?
Meisn. 1843. Comm. p. 347: g. Zanthoxylacear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.?
Synon. Diosma Lour.

Pseuditea Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 30: nov. g. Ericeis aff. (Itea javanica Bl.)

Pseuditea Hasskarl cont.
Cf. Endl. 1843. Spl. III. p. 84. n. 4677.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 160: g. Ericacear.
= Pittosporum Banks.

Pseudixora Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 209: nov. g. Randiear. (Cupia auriculata DC., etc.)

Pseudoacacia Tourn. 1700. Inst. p. 649. t. 417: g. pl. class. XXII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 255. Ed. Hall. 1745. p. 257: g. pl. class. XI.
Medic. (Vorles. II. p. 364) 1789. Phil. Bot. I. p. 204.
Mönch 1794. Meth. p. 145 (*Pseudacacia*): g. Thalamostemonis.
= Robinia Linn.

Pseudoagrostemma Godr. vid. *Pseudagrostemma Braun.*

Pseudo-Androgyni Klotzsch 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 178: nova tribus Euphorbiacear. Gen.: Lopadocalyx.

Pseudoanisomeles G. Don vid. *Pseudanisomeles Benth.*

Pseudo-Arabis C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 18: sect. Arabidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4854 *a*. p. 864; 1841. Ench. p. 448 (*Pseudarabis*). — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 249.

Pseudoathrixia Wittst. vid. *Pseudathrixia DC.*

Pseudo-Barleria Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 23: sect. Barleriae. (An gen. Barleriear.?) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 653. (B. hirsuta, polytricha, Richardiana, polystachya, coerulea.)

Pseudobasilicum Steud. Nom. II. p. 405: vid. *Pseudobrasilium Adans.*

Pseudo-Blitum Gren. (& Godr.) 1855. Fl. France III. p. 22: subg. Chenopodii.
= Agathophyton Moq.

Pseudobrasilium „Plum." Adans. 1763. Fam. II. p. 341: g. Pistaciar. (*Pseudobasilicum Steud.*)
= . . . ?

Pseudobrassica Presl 1826. Fl. sicul. I. p. 92: sect. Brassicae. (B. Tournefortii Gou.)

Pseudocadetia Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 533: sect. Dendrobii. (D. funiforme Bl.)

Pseudocapsicum „Dodon." Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 122: nov. g. pro Solano Pseudo-Capsico et diphyllo L. indicatum.
Mönch 1794. Meth. p. 476: g. Petalostemonis.
Dunal 1816. Solan. syn. p. 11: sect. Solani. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 584. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 410. — Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4761. 2.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 76: g. Solanear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 150: subsect. Anthopleuridis.

Pseudocarpicae Meyer 1836. Chlor. hann. p. 662: cohors Cryptogamar. vascularium. Fam. unica: Characeae.

Pseudocaryophyllus Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 415; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. 429: nov. g. Pimentoidear. (Eugenia Pseudo-Caryophyllus DC.)

Pseudo-Chamomilla DC. 1837. Prodr. VI. p. 51: sect. Matricariae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2669 *d*. p. 434; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3066. 4. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 544.

Pseudochironia Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 107; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 44: sect. Exaci. (E. tetragonum Roxb., etc.)

Pseudochironia Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 125: sect. Sabbatiae. (S. gentianoides Ell.)
= Lapithea Gris.

Pseudochrosia Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 10. p. 158: nov. g. Ophioxylear., Ochrosiae aff. (Cerbera glomerata Herb. Zipp.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 34: g. Tabernaemontanear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 415.

Pseudo-Cicca Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 618: sect. Ciccae. (Margaritaria adelioides Rich.)

Pseudocistus Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 276: sect. Helianthemi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 126. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915 *b*; 1841. Nom. p. 188. n. 7190. 4. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 308. — Koch 1836. Syn. p. 80. Ed. II. p. 85. — Endl. 1840. Gen. n. 5029 *d*. p. 905; 1841. Ench. p. 467. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 240. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 232. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 171.
Synon. Rhodax et Argyrocistus Spach.

Pseudocodon Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 291: sect. Phyteumatis. (Ph. amplexicaule Sm., ellipticum Sm., rumelicum.)

Pseudocollomia Benth. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 311: sect. Giliae.

Pseudocompositae Scopoli 1777. Introd. p. 203: trib. XVII. plant. Gen.: Stilbe, Globularia, Protea, Laxmannia, Leucadendron, Eriocaulon, Centella, Nauclea, Brunia, Statice, Clibadium, Rapatea, Codia.

Pseudocormos Endl. 1836. Gen. n. 317 c. p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Didymii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 364. 3.

Pseudocormus Wittst. Etym. Handw. p. 730: vid. *praeced.*

Pseudo-Cotula C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 39: sect. Cotulae. (C. barbata DC.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 991.

Pseudocotyledoneae Agardh 1822. Aphor. p. 103; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: regio II. plant. Class.: Muscoideae, Tetradidymae, Filices, Equisetaceae.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 99: subdiv. Orthophytor. Class.: Equisetaceae, Filices s. Pterides, Musci s. Brya.

Pseudocremanium Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 233: subsect. Cremanii. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 739.

Pseudo-Crepides Gaudin 1829. Fl. Helv. V. p. 119: sect. Hieracii. (H. aureum, alpestre, praemorsum, hyoseridifolium, prunellaefo-

Pseudo-Crepides Gaudin cont. lium, succisaefolium, blattarioides, grandiflorum.)

Pseudocynometra Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 294: sect. Cynometrae. (C. polyandra Roxb.)

Pseudo-Cyperus Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 54. t. 31: g. pl. class. XV.
= Cyperus Tourn.

Pseudocyperus Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Cyperacear., pro Cypero scirpino Salzm. indicatum.

Pseudodianthus A. Braun 1843. Flora p. 384: sect. Tunicae. (*Synon. Imperatia Mönch.*)
= Tunicae Scop. pars.

Pseudodianthus Willkomm . . . . Ic. pl. nov. Hisp. p. 25: subg. Dianthi. Sect.: Tunica, Kohlrauschia. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 264.

Pseudodictamnus Tourn. 1700. Inst. p. 188. t. 89: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 222. Ed. Hall. 1745. p. 228: g. pl. class. IX.
Adans. 1763. Fam. II. p. 191: g. Labiatar.
Mönch 1794. Meth. p. 399: g. Petalostemonis. (Marrubium hispanicum L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2885 *c:* sect. Marrubii.
= Ballotae sect. Beringeria.

Pseudoelephantopus Steud. Nom. II. p. 405: vid. *Pseudelephantopus Rohr.*

Pseudo-Evax Cosson & Germ. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 287: sect. Filaginis. (F. prostrata DC.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 247.

Pseudofumaria „Rivin." Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 110. Typus: Fumaria lutea L., Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 264.
= Capnoides Gärtn.

Pseudofumaria Borckh. 1797 in Römer Arch. I. 2. p. 44: g. ex typo Fumariae bulbosae L. constitutum.
= Bulbocapnos Bernh.

Pseudofungi Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: div. Hypoxylear. Tribus: Sphaeriae, Xylomeae.

Pseudo-Gelseminum „Riv." Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 243: g. pl. class. IX.
= Bignoniae Tourn. sp.

Pseudogenista Cosson . . . : sect. Ulicis.
= Nepa Webb.

Pseudoglinus Endl. 1839. Gen. n. 5185 *b.* p. 952; 1841. Ench. p. 501: sect. Glini. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6295. 2.

Pseudo-Glycyrrhiza „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 249. Ed. Hall. 1745. p. 257: g. pl. class. XI.
= Glycyrrhiza Linn.

Pseudo-Grimmia Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 240: sect. Grimmiae. (Gr. geniculata Schw.)
= Campylostelium Bruch & Schimp.

Pseudo-Gunnera Örsted 1857. Nat. For. Vid. Medd. p. 192 (7): nov. g. Gunneracear. (Gunnera macrophylla Bl.)

Pseudogypsophila A. Braun 1843. Flora p. 384: sect. Tunicae.
Synon. Dianthi sect. Pseudotunica Fenzl; Tunicae sect. Leptopleura Jaub. & Spach.

Pseudogyratae Bernhardi 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 6: subordo Filicum. Divis.: Pleurogyratae, Acrogyratae.

Pseudoharveya „Presl" Walp. Rep. VI. p. 650: vid. *seq.*

Pseudoharweya Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 521 (Bot. Bemerk. p. 91): sect. Harweyae. (Orobanche pratensis Eckl. & Zeyh.)

Pseudo-Helenium Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 388: sect. Leptopodae. (L. brachypoda.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 988.

Pseudo-Iris „Dodon." Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 417. Typus: Iris Pseudacorus L.

Pseudojaca Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 117: subg. Artocarpi. (A. Lakooka Roxb., etc.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 660.

Pseudolacca Moquin-Tandon 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 30: sect. Pircuniae.

Pseudolavatera Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 29: sect. Malvae. (Lavatera arborea L.)

Pseudoleskea Schimp. 1852. Bryol. eur. V: nov. g. Hypnacear. (Leskea incurvata, etc.)
= Anomodon C. Müll. pt.

Pseudolichenes Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: div. Hypoxylear. Gen.: Opegrapha, Verrucaria, Pertusaria, Porina.
Arnold 1858. Flora p. 701: ser. V. Lichenum. Ordo: Nesolechiaceae.

Pseudolinum DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 239; 1821. Syst. II. p. 517; 1824. Prodr. I. p. 201: sect. Camelinae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 215. — Endl. 1839. Gen. n. 4919 *b.* p. 877; 1841. Ench. p. 450. — Walp. 1842. Rep. I. p. 173.
Synon. Leiolobium Rchb.

Pseudolirion Kunth, Spach vid. *seq.*

Pseudolirium Endl. 1837. Gen. n. 1098 *c.* p. 141; 1841. Ench. p. 83: sect. Lilii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1760. 3. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 263 (*Pseudolirion*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 277 (*Pseudolirion*).

Pseudolmedia Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 129: nov. g. Olmediear. (Olmedia ferruginea Pöpp.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 663. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 116.

Pseudo-lomarieae Fée 1852. Gen. Fil. p. 80: div. Lomariear. Gen.: Dendroglossa, Hymenolepis.

Pseudo-lucilia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 326 in Ind.: novum nomen pro *Lucilioide* (Luciliae sect.) propositum.
Synon. Belloa Rémy; Lucillia Rchb.

Pseudolycianthes Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 156: subsect. Meiomeridis.

Pseudolysimachia Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 464: sect. Veronicae. — Par. Ledeb.

Pseudolysimachia Benth. cont. 1849. Ross. III. p. 230. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 688.
= Pseudo-Lysimachium Koch.

Pseudo-Lysimachium Koch 1837. Syn. p. 527. Ed. II. p. 605: sect. Veronicae. (V. spicata L.) — Par. Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 585.
Synon. Pseudolysimachia Benth.

Pseudo-Malvastrum A. Gray 1849. Mem. Amer. Ac. IV. p. . . . : sect. Sidae. *Cf.* Flora 1850. p. 696.

Pseudomelissa Benth. 1834. Labiat. p. 382; 1848 in DC. Pr. XII. p. 224: sect. Micromeriae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 780. — Endl. 1838. Gen. n. 3616 c. p. 618; 1841. Ench. p. 307. — Walp. 1845. Rep. III. p. 726. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 350.
Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4125. 1: sect. Calaminthae.
Synon. Orthomeria Griseb.

Pseudomimetes Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 78. n. 2125 *b:* sect. Mimetis. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 264.

Pseudo-Monolopia Meyer 1843. Ind. non. sem. h. Petr.; 1844. Linnaea XVIII. p. 189: sect. Monolopiae. (M. minor DC.)

Pseudomyosotis A. DC. 1846. Prodr. X. p. 129: sect. Eritrichii.

Pseudo-Napaea A. Gray 1849. Mem. Amer. Ac. IV. p. . . . : sect. Sidae. *Cf.* Flora 1850. p. 696.

Pseudonomia F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 369: subg. Eunomiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 212.

Pseudo-Orchis Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 30. t. 26: g. pl. class. XI. (Peristylus albidus?)

Pseudopappus A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 149: sect. Skirrophori. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 264.

Pseudopetalon Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 108: g. Rutacear. *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 500.

Pseudopholidia A. DC. 1847. Prodr. XI. p. 704: nov. g. Myoporacear.

Pseudophora Blume 1850. Rumphia III. p. 142: subg. Otophorae.

Pseudopilotrichum C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 123: sect. Neckerae. Subsect.: Orthostichella, Pilotrichella, Papillaria.

Pseudopoa C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 409: sect. Festucae. (Poa persica Trin.)

Pseudoquina Weddell 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 271: sect. Cascarillae. (Cinchona magnifolia R. & P., etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 786.

Pseudorchis Johren. 1710 in Praef. ad Vadem. Bot.
= Goodyera R. Brown.

Pseudorchis Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 199. 213: nov. g. Orchidear. (Ophrys Loeselii L.)
= Sturmia Rchb.

Pseudo-Rottlera Zolling. 1856. Linnaea XXVIII. p. 310: sect. Rottlerae. (An genus proprium? R. subfalcata R. & Z.) — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 427.

Pseudo-ruta Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 21. t. 19: g. pl. class. VI.
= Rutae Linn. spec.?

Pseudosabbatia Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 98: sect. Chironiae.
= Plocandra E. Meyer.

Pseudosaponaria A. Braun 1843. Flora p. 384: sect. Tunicae.
Synon. Dianthi sp. Pseudotunica Fenzl; Tunicae sect. Pachypleura Jaub. & Sp.

Pseudo-Scordium Webb . . . . Phytogr. Canar. III. p. 109: sect. Teucrii. (T. spinosum L.)

Pseudoscordum „Herb." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 205: g. Scillear.
= Nothoscordum Kunth.

Pseudosebaea Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 112; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 46: sect. Exaci. (E. pedunculatum Lehm., etc.)

Pseudo-Secale (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 599: sect. Tritici. (T. villosum Palis.)
Conf. Ctenopyrum Link et Cereale Gris.

Pseudoselinum C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 356: sect. Peucedani. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 315.

Pseudosenna Webb 1846. Phyt. Canar. II. p. 119: sect. Cassiae. (C. occidentalis L.)
= Chamaesenna DC.

Pseudo-Sideritis Koch 1837. Syn. p. 569. Ed. II. p. 653: sect. Stachydis. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 689.

Pseudosophora DC. 1825. Prodr. II. p. 96: sect. Sophorae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 110. — Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 87. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 390. — Endl. 1841. Gen. n. 6738 *d.* p. 1308; 1841. Ench. p. 673.
Synon. Radiusia Rchb.

Pseudospermum „Spreng." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 517: g. Umbelliferar. (Ligusticum aquilegifolium W.)
= Physospermum Cuss.

Pseudostemma DC. 1830. Prodr. IV. p. 360: sect. Exostemmatis. An genus proprium? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 482. — Walp. 1843. Rep. II. p. 508.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 397: subg. Exostemmatis.
= Lasionema Don?

Pseudostoechas Steud. vid. *Pterostoechas Benth.*

Pseudostrobus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 151; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 6. n. 1803 *B* VIII: sect. Pini.

Pseudostylis Endl. 1836. Gen. n. 318 *a.* p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Didermatis.

Pseudothapsus Benth. 1835. Scroph. ind. p. 5: sect. Celsiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 499. — Endl. 1839. Gen. n. 3879 *a.* p. 671; 1841. Ench. p. 338. — Walp. 1845. Rep. III. p. 147.
Synon. Ditaxia Rafin.

Pseudothlaspi Magnol. 1720. Char. pl. nov. p. 245. Lib. 3. pars 3. (Linn. Cl. pl. 1747. p. 398.)
= Iberis Linn.

Pseudothymbra Benth. 1834. Labiat. p. 348; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 205: sect. Thymi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 770. — Endl. 1838. Gen. n. 3610 *c.* p. 617; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4114. 4. — Walp. 1845. Rep. III. p. 704.

Pseudo-Triticum Micheli 1729. Nov. gen. pl. p. 35: g. pl. class. XIV a. (Nomen.) = . . . ?

Pseudotunica Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5244 *d.* p. 971; 1841. Ench. p. 506: sect. Dianthi. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 287.

Synon. Fiedleria Rchb.; Tunicae sect. 2 Fisch. & Mey.; Gypsophilae sp. Desf.

Pseudo-Unona Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 135: sect. Unonae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 67. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 320.

Pseudo-Vanda Lindl. 1833. Gen. Orchid. p. 167: sect. Cymbidii.
= Luisa Gaudich.

Pseudowithania Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 454: sect. Withaniae.

Pseudozinnia Endl. 1838. Gen. n. 2493 *b.* p. 405; 1841. Ench. p. 238: sect. Zinniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3123. 2.

Pseva Rafin. 1809. Obs. ex Journ. Phys. LXXXIX. p. 261.
= Chimophila Pursh.

Psiadia*) Jacq. 1797. Hort. Schönbr. II. p. 13. t. 152.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2384. n. 1565; 1809. En. p. 939: g. Syngenes. Necessar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 429. n. 1848: g. Syngenes. Superfl.
Cass. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 65: g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 190. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 44.
Link 1822. En. II. p. 365: g. Corymbiferar.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1826. v. 43. p. 503; 1830. v. 60. p. 581: g. Psiadiear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 318. Sect.: Glutinaria, Glandularia. — Endl. 1838. Gen. n. 2368. p. 384; 1841. Ench. p. 235. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3323. Sect.: Psiadia, Glandularia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2524: g. Psiadiacear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (*Psiodia*): g. Erigerear.
Synon. Alix et Glutinaria Comm.; Thouarsia Vent.; Elphegea Cass.

Psiadiaceae Rchb. 1828. Consp. p. 107: sect. Solidaginear. Gen.: Elphegea, Sarcanthemum, Psiadia, Nidorella.

Psiadieae Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1830. v. 60. p. 581: subdiv. Solidaginear.

*) ψιάς, gutta, stilla.

Psiadieae Cassini cont.
Gen.: Elphegea, Sarcanthemum, Psiadia, Nidorella.
DC. 1836. Pr. V. p. 317: subdiv. Chrysocomear. Gen.: Erato, Woodvillea, Psiadia, Microglossa, Nidorella, Homochroma, Neja. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 383; 1841. Ench. p. 235. Gen. ead. (Frivaldia loco Microglossae.) — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). Gen. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. Gen. ut Endl. (exclusa Homochroma.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ut Endl.

Psichohormium*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phycol. gener. p. 256; 1845. Phycol. germ. p. 201; 1849. Sp. Alg. p. 374. n. 250: nov. g. Confervear. ? — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 22. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53 (*Psichormium*).
Itzigsohn 1854. Flora p. 16. t. 1.

Psichormium Montagne vid. *praeced.*

Psidieae Rchb. 1837. Handb. p. 253: sect. Myrtear. genuinar. Gen.: Myrtus, Jossinia, Psidium, Campomanesia, Nelitris, Sonneratia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 177. Gen. ead. (exclusa Jossinia) et Rhodomyrtus; Eupomatieae.

Psidiopsis Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 350: nov. g. Pimentoidear. (P. Moritziana.)

Psidium**) Linn. 1737. Gen. p. 140. n. 393; 1737. Cliff. p. 184; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 122; 1753. Sp. I. p. 470; 1759. Syst. ed. X. p. 1055. n. 541; 1762. Sp. ed. II. p. 672; 1764. Gen. ed. VI. p. 247. n. 615; 1767. Syst. ed. XII. p. 339: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 384; 1784. Syst. p. 460. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 482. t. 190. 191. — Reich. 1778. Gen. p. 253. n. 670. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 333. n. 841. — Lour. 1790. Coch. I. p. 309. — Pers. 1797. Syst. p. 493. — Willd. 1799. Sp. II. p. 957. n. 971; 1809. En. p. 514. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 480.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 274. n. 1127: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Arbustivor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 324.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Hesperidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Prunos et Myrtos conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 218: g. Calycanthemar.
Neck. 1790. El. II. p. 76. n. 727: g. Sarcodiphytor. Sejungitur Burchardia.
Gmel. 1791. Syst. p. 786: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 136.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 324: g. Myrtoidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 13.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 162: g. Myrtear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 850; 1825. Syst. II. p. 488. n. 1825; 1830. Gen. I. p. 405. n. 2026. — Poir. 1821. Dict. v.

*) ψίχη, mica, frustulum; ὁρμιά, linea piscatoria.
**) Synonymon Punicae apud Veteres.

Psidium Linn. cont.
19. p. 251 (*Gojavier*). — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV; 1828. Consp. p. 176. n. 4687. — DC. 1828. Pr. III. p. 232. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 277. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 830. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 152. — Meisn. 1837. Gen. p. 108 (77). — Endl. 1840. Gen. n. 6315. p. 1231; 1841. Ench. p. 651. — Walp. 1843. Rep. II. p. 170; 1846. V. p. 750. — Brongn. 1843. En. genr. p. 123. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 579. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 70. — G. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 284 (*Goyavier*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 468. Sect.: Eupsidium, Macropsidium.
Pers. 1807. Ench. II. p. 27. n. 1204: g. Myrtacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 27; 1831. Hdb. II. p. 66. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 151. — Kunth 1824. Syn. III. p. 422. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1092. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 328. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 71.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 177. n. 6856: g. Psidiear.
Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 352; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. p. 381: g. Pimentoidear.
Synon. Pela Rheede; Guajava Tourn.; Cujavus Rumph.; Guajavos Burm.; Burchardia Neck.

Psidopodium*) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 315. n. 1718: nov. g. Sphaeroophytor., a Polypodio L. sejunctum.
= Aspidium Swartz.

Psiguria*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 237. n. 384: nov. g. Sygolliphytor., ab Anguria L. disjunctum.
Arnott 1841. Hook. journ. bot. III. p. 274: g. Cucurbitear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 215.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 8. 26: sect. Anguriae.
= Anguria Linn.?

Psilactis***) A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV. P. 1.) p. 71 adnot. (Flora 1850. II. p. 709): nov. g. Asterear. (Ps. asteroides.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 825: g. Heteropappear.

Psilantha C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 405: sect. Poae. (Eragrostis collina Trin.) — Par. Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 381.

Psilanthemum Lindl. 1853. Fol. Orchid. 10. Jan. p. 28: sect. Epidendri. — Simil. Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 135.

Psilanthus Juss. 1805. Ann. Mus. VI. p. 396: nov. g. Passiflorear. (Tasconia trinervia.) — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 132. 198.

Psilanthus Juss. cont.
DC. 1828. Pr. III. p. 335: sect. Tacsoniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3469 *a*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 58.

Psilathera Link 1827. Hort. Berol. I. p. 121: nov. g. Avenacear. (Sesleria tenella Host.)
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 995; 1830. Fl. exc. p. 35: g. Festucacear.
Link 1829. Hdb. I. p. 81: g. Graminear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Endl. 1837. Gen. n. 875 *c*. p. 98; 1841. Ench. p. 59: sect. Sesleriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1397. 1.

Psilobium „Jack Malay. Misc. II" Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 320: nov. g. Rubiacear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 618 (minus notum). — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 664. — Jack 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 255. — Endl. 1838. Gen. n. 3321. p. 564; 1841. Ench. p. 275. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2980.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 50; 1830. Gen. I. p. 168. n. 844: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 740.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2056: g. Cinchonear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 264: g. Gardeniar.
Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114): g. Rondeletiear.? et p. 163 (116) Gardeniear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 199: g. Randiear.

Psilocarpaea DC. 1836. Prodr. V. p. 596: sect. Bidentis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2541 *b*. p. 413; 1841. Ench. p. 238 (*Psylocarpaea*). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 353. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3597. 2. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 518. — Schultz Bip .... in Webb Canar. II. p. 242 (*Psilocarpia*).

Psilocarpaea DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 766: sect. Stylidii.
= Nitrangium Endl.

Psilocarpha Endl. vid. *seq.*

Psilocarphus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 340: nov. g. Tarchonanthear. (Micropus globiferus DC.?) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 265.
Endl. 1842. Spl. II. p. 41. n. $2421/_{1}$ *c* (*Psilocarpha*): sect. Micropodis.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: g. Evacear.

Psilocarpia Schultz Bip. vid. *Psilocarpaea DC.* 1836.

Psilocarya Torrey .... in Gray Man. p. 531: nov. g. Rhynchosporear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 690. — Steud. 1855. Glum. II. p. 150.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 114: g. Haloschoenor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.

Psilochaena Walp. vid. *Psilochaenia Nutt.*

*) Nomen contractum ex Pseudopolypodium.
**) Nomen contractum ex Pseudoanguria?
***) ψιλός, tenuis, calvus; ἀκτίν s. ἀκτίς, radius.

Psilochaeta Jaub. & Spach 1852. Illustr. pl. Or. IV. p. 81: subg. Pentanematis. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 202.

Psilochenia Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 437: nov. g. Lactucear. (Crepis occidentalis Nutt.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 51. n. 3022 *c:* sect. Crepidis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 697 (*Psilochaena*).

Psiloclada Mitten 1855 in Hook. f. Fl. N.-Zeal. II. p. 143. t. 99. f. 4: nov. g. Hepaticar. foliosar. (P. clandestina.) *Cf.* Gottsche 1858. Bot. Zeit. Übers. Hepat. p. 34.

Psilocoela Rchb. 1841. Nomencl. p. 72. n. 2701. 2: sect. Valerianellae. (*Psilocaelae DC.*) — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 170 (*Psilocoele*).

Psilocoele Griseb. vid. *praeced.*

Psilocybe*) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 289; 1828. Elench. I. p. 41: trib. Pratellae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 75: subsect. Pratelli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *B b.* — Math. 1853. Belg. II. p. 353.
Endl. 1836. Gen. n. 453 *III c.* p. 40; 1841. Ench. p. 21 (*Psylocybe*): subsect. Pratellae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 2 *b.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 462. — Bail 1858. Syst. p. 36. t. 35.
Fries 1836. Epicr. p. 225; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 296: subg. Pratelli.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Psiloderis DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 299: nomen pro *Microderide* (sect. Erechtitis) propositum.

Psilodochea*) Presl 1845 in Corda Fl. Vorw. p. 93 (nomen); 1847. Suppl. Pterid. p. 287: nov. g. Angiopteridear.

Psiloglossa Ørsted 1855. Centralam. Acanth. p. 42: sect. Rhytiglossae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 661.

Psilogyne DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 132 (Revis. Bignon. p. 16); 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 294: nov. g. Bignoniear. (Ps. viticifolia.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4571 (dubium).
Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207): g. Eubignoniear.?
Endl. 1841. Spl. I. p. 1407. n. $4132/_1$; 1841. Ench. p. 347. n. 4126: g. Bignoniacear. dubium.
= Vitex Linn.

Psilolepus**) Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 558: nov. g. ab Aspalatho sejunctum. (A. pedunculata L'Her.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 211: g. Genistear.

Psilonema C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 50; 1845. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. Bot. p. 14: nov. g. Alyssinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Endl. 1839. Gen. n. 4873. p. 868; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 137. — Walp. 1842. Rep. I. p. 142.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p 180. n. 6954: g. Alyssear. genuinar.

*) κυβή, cavitas.
**) ψιλός, nudus; δοχή, vasculum.
***) ψιλός, tenuis; λέπος, legumen.

Psilonema C. A. Meyer cont.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.

Psilonepeta Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 392: sect. Nepetae.

Psilonia Fries 1819. Novit. fl. suec. V. p. 78: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 505.
Fries 1825. Pl. homon. p. 187: g. Sporomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 107.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 450: g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 211. p. 18; 1841. Ench. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 16; 1840. IV. p. 27; 1842. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 41: g. Psiloniacear. — Par Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 73. — Preuss 1848 in Sturm Fl. III. H. 25. 26. p. 37. t. 19; 1851. Linnaea XXIV. p. 118.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 106: g. Psiloniaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 495: g. Sepedoniaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Myrothecieor. (p. 494 Menisporeor.?)
Math. 1853. Belg. II. p. 465: g. Botrydear.
Synon. Menispora Pers.; Camptosporium Linn.; Circinotrichum Nees; Gyrotrichum Spreng.

Psiloniaceae Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 16: fam. Hyphomycetum. Gen.: Menispora, Psilonia, Colletotrichum, Aseimotrichum, Rhinotrichum, Oedemium, Halysium, Chloridium, Tricholeconium, Trichostroma, Medusula, Chaetopsis, Botrytis, Sporodum. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 11; 1842. Mycol. p. LX. 41. Gen.: Psilonia, Colletotrichum, Aseimotrichum, Halysium, Chloridium, Arthrinium, Camptoum, Gonatosporium, Botrytis, Chaetopsis, Streptothrix, Campsotrichum, Menispora, Sporophleum, Coelosporium, Gliotrichum, Balanium, Gongylocladium, Oedemium, Ospriosporium, Rhinotrichum, Trichostroma, Medusula. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 118. Gen.: Psilonia, Botrytis, Menispora, Trichostroma, Nodulisporium, Synsporium, Rhinotrichum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 71: sect. Sepedonieor. Gen.: Menispora, Gyrothrix, Rhinotrichum?, Chaetopsis, Psilonia, Colletotrichum, Campsotrichum, Ceratocladium, Aseimotrichum, Halysium, Chloridium, Cystophora, Tricholeconium, Trichostroma, Sporodum, Streptothrix.

Psiloniacei Rchb. 1841. Nomencl. p. 4: subsect. Sepedonieor. Gen.: Menispora, Chaetopsis, Psilonia, Colletotrichum, Campsotrichum, Ceratocladium, Aseimotrichum, Halysium, Chloridium, Coelosporium, Tricholeconium, Gonatosporum, Trichostroma, Sporodum, Streptothrix.
Bonord. 1851. Hdb. p. 86: fam. Hyphomycetum. Gen.: Acladium, Haplaria, Sporophleum, Cylindrotrichum, Goniosporium, Menispora, Didymotrichum, Helminthosporium, Epochnium, Tuburcina.

Psilopezia Berkeley 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 325: nov. g. Fungor., Pezizae aff. (P. nummularia.)
Conf. Pilopeza Fries.

Psilophyllum Lessing 1832. Syn. Compos. p. 376: subg. Relhaniae.
DC. 1837. Pr. VI. p. 286: sect. Relhaniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2781 *b.* p. 454; 1841. Ench. p. 244 (*Psyllophyllum*). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3540. 2.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.

Psilopilum*) Brid. 1827. Bryol. II. p. 95: nov. g. Acrocarpor. epistomor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Polytrichoideor. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 668.
Endl. 1836. Gen. n. 561. p. 54; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 939: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. . . . Bryol. eur. IV: g. Polytrichacear.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 194: sect. Catharineae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: subg. Polytrichi. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 95.

Psilopogon Hochstett. Sched. itin. Abyss. nr. 96.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1331: g. Andropogonear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 327 (ignotum).
A. Rich. 1850. Fl. Abyss. II. p. 447. *Cf.* Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 793.
= Lucaea Kunth.

Psilopogon Hochstett. 1846. Flora I. p. 117: nov. g. Andropogonear. (P. capensis.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 951.
= Eulalia Kunth.

Psilopsis Necker 1790. Elem. bot. I. p. 319. n. 501: nov. g. Corythophytor., a Galeopside L. sejunctum.

Psilopus „Klotzsch" Rchb. 1841. Nomencl. p. 13. n. 502. 5 *c*: subsect. Plutei. — Simil. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 510.

Psilorhegma **) Vogel 1837. Linnaea XI. p. 689: sect. Cassiae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6781 *f.* p. 1316; 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6083. 2. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 99.

Psilosanthus Necker 1790. Elem. bot. I. p. 69. n. 120: nov. g. Siphoniphytor., a Serratula L. disjunctum.

Psilosolena Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 532: nov. g. Thymelaeacear. (Cestrum umbellatum E. Meyer.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 588: g. Daphnoidear.
= Peddiea Harv.

Psilostachys Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. p. . . .: nov. g. Hippomanear. *Cf.*

*) ψιλός, calvus; πῖλος, pileus.
**) ῥῆγμα, rima, sulcus.

Psilostachys Turczan cont.
Bot. Zeit. 1844. p. 266 et Flora 1844. p. 121. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — Endl. 1850. Spl. V. p. 87. n. 5781/$_1$.
= Redia Casar.? (Baill.)

Psilostachys Hochstett. 1844. Flora I. Beil. p. 6: nov. g. Aërvear.
= Psilotrichum Blume.

Psilostachys Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 413: nov. g. Andropogonear. (Arthraxon Hohenackeri Hochst.)

Psilostachys Örsted 1858. Palm. Centroam. p. 24: subg. Chamaedoreae. (Ch. geonomaeformis Wendl.)

Psilostemon DC. 1846. Prodr. X. p. 35: g. Anchusear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 558. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 113.
= Trachystemon Don.

Psilosteum DC. 1837. Prodr. VI. p. 40: sect. Gamolepidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2656 *b.* p. 432; 1841. Ench. p. 241.

Psilostoma Klotzsch 1837 in Ecklon & Zeyh. En. pl. Afr. III. p. 361: nov. g. Coffeacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.
Endl. 1838. Gen. n. 3174. p. 537; 1841. Ench. p. 272: g. Coffeear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 484.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2824: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Psilostrophe DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 261: g. Compositar. incertae sedis. — Par. Meisn. 1839. Comm. p. 122. — Endl. 1841. Spl. I. n. 3032/$_7$. p. 1390; 1841. Ench. p. 251.
Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3183: g. Heleniear.

Psilostylis „Andrz. mss." Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4795 *a*; 1841. Nom. p. 181. n. 6992. 2: sect. Cheiranthi.
= Cheiroides DC.

Psilostylium Rchb. vid. *seq.*

Psilostylum DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 463; 1824. Prodr. I. p. 191: sect. Sisymbrii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4810 *c* (*Psilostylium*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 205. — Endl. 1839. Gen. n. 4906 *c.* p. 875; 1841. Ench. p. 449.

Psilothamnus DC. 1837. Prodr. VI. p. 41: g. Chrysanthemear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2657. p. 432; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (134). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3080. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 276: g. Pyrethrear.
Synon. Jacquemontia Belang.

Psilotheca C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 513: sect. Encalyptae.

Psilothesium A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 670: sect. Thesii.

Psilothonna „E. Meyer in Coll. Dreg." DC. 1837. Prodr. VI. p. 40: sect. Gamolepidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2656 *a.* p. 432; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3081. 1.

Psilotites Münst. . . . . Beitr. V. p. 188.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 144; 1846. Chl. prot. p. LX: g. Lepidodendrear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 90: g. Lycopodiear.

Psilotrichium Hassk. vid. *seq.*

Psilotrichum Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 544: nov. g. Amaranthacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1962. p. 302; 1841. Ench. p. 185: g. Aërvear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6427. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. p. 279.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 83 (*Psilotrichium*): g. Amarantacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.
Synon. Leiospermum Wall.; Psilostachys Hochst.; Pöchia Endl.

Psilotum*) Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 109: nov. g. Filicibus aff.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 281: g. Lycopodacear.
Palis. 1805. Pr. Aeth. p. 106: g. Lycopodior.
Swartz 1806. Syn. Fil. p. 187: g. Lycopodinear. (Lycop. nudum L.) — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 113. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 272. — Grev. & Hook. 1831. Bot. Misc. II. p. 362. — Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. Pt. III. p. 102. — Spring 1843. Bull. Ac. Brux. X. 1. p. 234.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 44: g. Agyratar.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 164. Ed. Nees p. 20: sect. Psiloti. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 695 *b.* p. 69; 1841. Ench. p. 47. — Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2316. 1.
Wahlenb. 1815. Nov. Act. Ups. VII. p. 178: g. Tetradidymar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 110: subg. Lycopodii.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 248: g. Filicum.
Leman 1826. Dict. v. 43. p. 506: g. Lycopodiacear. — Par. Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 192. — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 12. — Spring 1838. Flora I. p. 148. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 160. — Meisn. 1843. Gen. p. 436 (337). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 6. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 70. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 56. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 122.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 11. n. 3216; 1831. Gen. II. p. 717. n. 3607: g. Lycopodear.
Synon. Bernhardia Willd.; Hoffmannia Willd.; Tristeca Palis.; Ipphia Nor.

Psilotum R. Brown 1810. Prodr. I. p. 164. Ed. Nees p. 20: g. Lycopodinear. ampliat. Sect.: Psilotum, Tmesipteris. — Par. Spring 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 132.

*) ψιλωτής, nuditas.

Psilotum R. Brown cont.
Endl. 1836. Gen. n. 695. p. 69; 1841. Ench. p. 47: g. Lycopodiacear. Sect. eaed. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2316. Sect. eaed.

Psiloxylon Petit-Thouars mss.
= Nuxia Lam.

Psiloxyloon Rchb. vid. *Psyloxylon Ner.*

Psilurus Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 93: nov. g. Monandr. Digyn. — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 283.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 679): g. Chlorideor.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 21. n. 42: g. Graminum.
Link 1827. Hort. I. p. 5: g. Ophiurinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 819: g. Ophiurear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64.
Link 1829. Hdb. I. p. 2: g. Graminear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 13. n. 50. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 26.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 830. Ed. II. p. 959. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 15: g. Rottböllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.
Kunth 1830. Gram. p. 150; 1833. Agrost. p. 461: g. Rottbölliacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 921. p. 104; 1841. Ench. p. 60. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 49. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 395. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (326). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Steud. 1854. Glum. I. p. 356. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 619.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1358: g. Rottbölliear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 422; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 325: g. Triticear.
Synon. Asprella Host; Monerma Palis.

Psiodia Schultz Bip. vid. *Psiadia Jacq.*

Psistus*) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 273. n. 1033: nov. g. Catizophytor., a Cisto L. disjunctum.
= Helianthemum Tourn.

Psittacantheae Rchb. 1841. Nomencl. p. 73: sect. Loranthear. genuinar. Gen. Dendrophthoë, Tapinanthus, Loxanthera, Psittacanthus, Elythranthe, Macrosolen, Tristerix, Lepeostegeres, Tolypanthus.

Psittacanthus**) Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 15: sect. Loranthi. — Par Endl. 1839. Gen. n. 4586 *h.* p. 802; 1841. Ench. p. 399. Subsect.: Eupsittacanthus, Trygonanthus. — Walp. 1843. Rep. II. p. 443.
Martius 1830. Flora I. p. 406: g. Loranthear. *Cf.* DC. Pr. IV. p. 671 et Schult. Syst. VII. p. 1613.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 415: g. Loranthacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791.

*) Nomen contractum ex Pseudocistus?
**) Nomen a florum coloribus pulchris.

Psittacanthus Blume cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2718: g. Psittacanthear. Sect.: Psittacanthus, Trygonanthus.

Psittacoglossum La Llave & Lexarza 1825. Nov. veg. descr. II. Orch. p. 29: nov. g. Rinemospermar. epidendrar. (P. atratum.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 154: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1499; 1841. Nom. p. 53. n. 2022. — Endl. 1837. Gen. n. 1417. p. 198; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.?

Psittacoschoenus Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 87: nov. g. Cladiear., pro *Gahnia Labill.* et *R. Brown* (nec Forst.) propositum.

Psolanum*) Necker 1790. Elèm. bot. II. p. 60. n. 707: nov. g. Arcythophytor., a Solano L. segregatum.
= Lycopersici Tourn. pars.

Psomiocarpa**) Presl 1850. Epimel. bot. p. 521 (161): nov. g. Acrostichacear. (Polybotrya apiifolia Sm.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 47: sect. Polybotryae.

Psophocarpus***) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 45. n. 1362: nov. g. Cyteophytor., a Dolicho L. sejunctum.
DC. 1825. Pr. II. p. 403: g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3946; 1841. Nom. p. 149. n. 5781. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 362. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 335. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 586. n. 2879: g. Leguminosar.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 252: g. Euphaseolear. — Par. Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 113. — Endl. 1841. Gen. n. 6680. p. 1298; 1841. Ench. p. 672. — Walp. 1842. Rep. I. p. 781; 1843. II. p. 902. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 180.
Synon. Botor Adans.

Psora Hill 1769. Hort. kew. p. 65: nov. g. Associatar., a Centaurea disjunctum?

Psora†) Hoffm. 1789. Pl. lichen. t. 22. f. 5. 6. t. 41. f. 1—3. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 510.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 161: g. Scutellator.
GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 17. 212: g. Lichenum. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 367.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Squamariear.
Fries 1831. Lich. eur. p. 3. 122: sect. Parmeliae.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 392: sect. Patellariae.
Endl. 1836. Gen. n. 172 *A. γ.* p. 15; 1841. Ench. p. 11: subsect. Squamariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 570. 1 *d.*

Psora Hoffm. cont.
Genth 1836. Nass. I. p. 357: g. Parmeliacear. (P. lentigera, decipiens, vesicularis.)
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 111: sect. Biatorae. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 331. (ibid. p. 373: g. Lecanorear. Sect.: Rinodina.)
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 95: sect. Lecideae.
Flot. 1850. Bot. Zeit. p. 382: g. Lecanorinar.
Math. 1853. Belg. II. p. 141: g. Lichenear. sect. 5.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 175: g. Psorinar.
Arnold 1858. Flora p. 335: g. Psorear.
Conf. Geissodea Vent.; Patellaria Pers.

Psora Trevisan 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Eulecideinar. (*Buellia Not.*, *Diplotomma Flot.*, *Catillaria*, *Catolechia*, *Diploicia*, *Thalloidima*, *Cormothecium* et *Abrothallus* p. p. *Mass.*)

Psorae Gmel. 1791. Syst. p. 1365: sect. Lichenis.

Psorae Rchb. Consp. p. 7 vid. *Lichenes Rchb.*

Psoralea*) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 358 (*Psoralia*); 1748. Ups. p. 225; 1753. Sp. II. p. 762; 1759. Syst. ed. X. p. 1175. n. 801; 1763. Sp. ed. II. p. 1074; 1764. Gen. ed. VI. p. 386. n. 894 (*Psoralia*); 1767. Syst. ed. XII. p. 500: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 570; 1784. Syst. p. 685. — Reich. 1778. Gen. p. 384. n. 967. — Lour. 1790. Coch. II. p. 443. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 508. n. 1210. — Gmel. 1791. Syst. p. 1138. — Pers. 1797. Syst. p. 723. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1342. n. 1382; 1809. En. p. 787. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 102. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 195. (*Cf. Poikadenia Ell.*) — Roxb. 1832. Ind. III. p. 387.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 135. n. 567: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 487. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 119. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 603.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 303. — Juss. 1789. Gen. p. 355. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 397. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 220. — DC. 1805. Franç. IV. p. 518; 1815. V. p. 554. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 761; 1826. Syst. III. p. 198. n. 2520; 1831. Gen. II. p. 577. n. 2820. — Link 1822. En. II. p. 257 (sphalm. *Psoralla*). — Lois. 1826. Dict. v. 43. p. 512.
Adans. 1763. Fam. II. p. 322: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 296: g. Tetrapetalar. irregular.
Medic. (Vorles. II. p. 381) 1789. Phil. Bot. I. p. 208. Sejungitur Ruteria, etc.
Neck. 1790. El. III. p. 8. n. 1304: g. Cyteophytor.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear.
DC. 1825. Pr. II. p. 216: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 201.

*) Nomen contractum ex Pseudosolanum.
**) ψώμιον, turunda.
***) ψόφος, sonus, strepitus.
†) ψώρα, scabies, impetigo.

*) ψωραλέος, scabiosus.

Psoralea Linn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3976: g. Glycinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: g. Clitoriear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 410. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 197. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 230. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 82. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 224. — Meisn. 1837. Gen. p. 86 (61).
Link 1831. Hdb. II. p. 177: g. Lotoidear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 539: g. Phaseolear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 299: g. Galegear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6526. p. 1271; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5717. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 563. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 47. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — Webb 1846. Canar. II. p. 91. — Walp. 1846. Rep. V. p. 513. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 456. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 317. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 486.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Psoraliear.
Synon. Aspalthium, Cullen, Ruteria Medic.; Dorychnium Mönch; Poikadenia Ell.; Aspalathium Steud.; Meladenia Turcz.?; Poecadenia Wittst.

Psoralia Linn. 1742 et 1764: vid. *praeced.*

Psoralieae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 554: subtrib. Lotear. Gen.: Psoralea, Polytropia?, Requienia, Amorpha, Eysenhardtia, Dalea, Petalostemon, Kuhnistera.

Psoralla Link vid. *Psoralea Linn.*

Psoreae Arnold 1858. Flora I. p. 335: trib. Lecideacear. Gen.: Psora, Thalloidima, Toninia.

Psorinae Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 174: subfam. Lecidear. Gen.: Diploicia, Psora, Thalloidima, Catolechia, Toninia.

Psoroma Achar. 1798. Lich. suec. p. 91: g. Lichenum crustaceor.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 321: g. Lichenacear.
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIII: sect. Parmeliae. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 243; 1831. Lich. eur. p. 3. 89. — Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 402 *b*. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 472. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 214.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 406; 1814. Syn. Lich. p. 188: sect. Lecanorae. — Par. Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 55. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 366.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 444: g. Lecidear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 186: g. Hymenocarpor.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 118: g. Placodinar. (emend.)
Arnold 1858. Flora p. 310: g. Psoromear.
Synon. Fulgensia Massal.

Psoromeae Arnold 1858. Flora I. p. 310: trib. Parmeliacear. Gen.: Psoroma, Acarospora.

Psorophytum Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 413; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 360: nov. g. Androsaeminear. (Hypericum balearicum L.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 210. n. 7997: g. Androsaemear.

Psorophytum Spach cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5464 *Be*. p. 1033; 1841. Ench. p. 539: sect. Hyperici.

Psoropodium Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 84: grex Philodendri. (Zantedeschia exasperata C. Koch.)

Psorospermum Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 351; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 157. 350: nov. g. Visminear. (Haronga lanceolata Ch., Vismia guineensis Guill.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8014: g. Vismiear. genuinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5467. p. 1034; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 391. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.
Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Hypericear.
Hook. f. 1849. Niger Fl. p. 241: g. Hypericinear.
Synon. Harongae, Vismiae et Hyperici sp. Auct.

Psorotichia Massalongo 1855. Framm. lich. p. ...: nov. g. Lichenum, a Körb. (1855. Syst. Lich. Germ. p. 395) Collemaceis (exoticis) adscriptum.

Pstathura Rafin. vid. *Psathura Comm.*

Psychanthus*) Rafin. 1814. Specch. I. p. 116.
DC. 1824. Pr. I. p. 321: sect. Polygalae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3029 *g*; 1841. Nom. p. 175. n. 6779. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 349. — Endl. 1840. Gen. n. 5647 *a*. p. 1078; 1841. Ench. p. 568.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 130: g. Polygalear. verar.
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 383: subg. Polygalae.

Psychechilos Kuhl & Hass. 1827. Orchid. ed. Breda t. 9. (*Psychechilus* ex Wittst.) = Erythrodes Blume.

Psychidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Orthoplocear. Gen.: Schouwia, Psychine.

Psychine Desfont. 1800. Fl. Atl. II. p. 69. t. 148.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 508: g. Cruciferar. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 515.
Pers. 1807. Ench. II. p. 189. n. 1555: g. Siliculosar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 880. n. 2304; 1831. Gen. II. p. 519. n. 2551. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 658.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 645; 1824. Pr. I. p. 224: g. Psychinear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 183. n. 4756; 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6944. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 255. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4963. p. 885; 1841. Ench. p. 451.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Psychidar.

Psychineae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 153. 643; 1824. Prodr. I. p. 224: trib. Orthoplocear. Gen.: Schouwia, Psychine. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 255. Gen. ead. — Meisn. 1837.

*) ψυχή, papilio.

Psychineae DC. cont.
Gen. p. 15 (14). Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 885; 1841. Ench. p. 451. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 183: sect. Siliculosar. Gen. ead. et (1828) Brachycarpaea.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180: subdiv. Amphischistar. Gen. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 93: trib. Cruciferar. Gen.: Schouwia.

Psychophila*) Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 91. 188: sect. Droserae. (D. uniflora W.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 69 (*Psychrophila*).

Psychopsis „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 327: sect. Hosackiae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6517 *d.* p. 1269; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5705. 4. — Walp. 1842. Rep. I. p. 650.

Psychosperma Dumort. vid. *Ptychosperma Labill.*

Psychotria**) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 929. 1364. n. 122; 1762. Sp. ed. II. p. 245; 1764. Gen. ed. VI. p. 92. n. 229; 1767. Syst. ed. XII. p. 164. n. 228: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 179; 1784. Syst. p. 214. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 145. t. 55. — Reich. 1778. Gen. p. 94. n. 246. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 125. n. 313. — Gmel. 1791. Syst. p. 362. — Pers. 1797. Syst. p. 223. — Willd. 1797. Sp. I. p. 961. n. 349; 1809. En. p. 219. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 56. t. 202—213. (reform.) — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 159; ed. 1832. I. p. 533.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 204; 1820. Mém. Mus. VI. p. 378. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 582. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 444. — Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 466. — Hedw. 1806. Gen. p. 142. n. 615. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. X. 171. n. 889. — Link 1821. En. I. p. 223; 1829. Hdb. I. p. 658. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 740. n. 792; 1830. Gen. I. p. 170. n. 858. — Poir. 1826. Dict. v. 43. p. 536. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 958. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 760.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.
Gled. 1764. Syst. p. 201. n. 834: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 144 (*Psycothria*): g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 120. t. 25. f. 6. (asiatica).
Neck. 1790. El. I. p. 144. n. 251: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 233: g. Coffeacear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 354. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 603. — Kunth 1824. Syn. III. p. 22. — Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2031. Sect.: Antherura, Simira, Mapouria, Myrstiphyllum, Viscoides, Hilacium. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 171. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 432. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 456. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85 (sph. *Dychotria*): g. Coffeariae.
D. Don 1825. Nepal. p. 137: g. Stipulariar. Sejungitur Geophila.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 19; 1830. ibid. V. p. 167: g. Psychotriacear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Psychotriear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 212.
DC. 1830. Pr. IV. p. 504: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 584. — Endl. 1838. Gen. n. 3147. p. 532; 1841. Ench. p. 271. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 32. — Walp. 1843. Rep. II. p. 471; 1847. VI. p. 40.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: g. Cephaëlidear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 32. t. 238.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 283: g. Chasaliear. Sect.: Streblosa.
Synon. Psychotrophum P. Browne; Myrstiphyllum P. Browne; Myrstiphyllon Adans.

Psychotria Benth. & Örst. 1852. Centralam. Rubiac. p. 8: g. Coffeear. ampliat. Sect.: Eupsychotria, Strempelia, Mapouria, Notopleura.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 229: g. Psychotriear. Sect.: Eupsychotria, Strempeliastrum, Mapouria. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 108. Sect.: Strempelia, Mapouria, Notopleura.

Psychotriaceae Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 4. 130; 1830. ibid. V. p. 166: sect. Rubiacear. Gen.: Declieuxia, Chiococca, Ixora, Palicurea, Psychotria, Tetramerium, Coffea, Canthium.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): subtrib. Coffeacear. Gen.: Nescidia, Saldinia, Polyozus, Siderodendron, Faramea, Grumilea, Chasalia, Chiococca, Margaris, Damnacanthus, Canthium, Hylacium?, Rutidea, Antherura, Baconia, Pavetta, Diplospora, Declieuxia, Tertrea, Coffea, Amaracarpus, Saprosma, Coussarea, Scolosanthus, Chomelia, Ixora, Eumachia, Rudgea, Strempelia, Psychotria, Ronabea, Psilostoma, Plectronia, Psydrax, Palicourea, Marquisia.

Psychotridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 764: trib. Coffear. Gen. Psychotriear. Endl. et Feretia, Galiniera, Codonocalyx, Macrocalyx, Mitriostigma.

Psychotrieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: trib. Rubiacear. Gen.: Psychotria, Coffea, Serissa, Canthium, Chiococca, Caprosma, Cephaelis, Stipularia, Morinda, Plocama.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: div. Rubiacear. Gen.: Rytidea, Tetramerium, Frölichia, Siderodendron, Coffea, Rudgea, Ixora, Pavetta, Baconia, Declieuxia, Chiococca, Psychotria, Palicourea, Ronabea, Canthium, Vangueria, Geophila, Nonatelia; Cephaëlis, Patabea, Evea, Canophora.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 75: sect. Coffeinar. Gen. Coffeear. Endl. Subsect.: Paedericae.

*) ψύχος, frigor.
**) Nomen e Psychotropho P. Browne factum, q. cf.

Psychotrieae Dumort. cont.
Endl. 1838. Gen. p. 530; 1841. Ench. p. 271: trib. Coffeaccar. Subtrib.: Cephaëlideae, Coffeeae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 279. Subtrib.: Chasalieae, Coffeineae, Cephaëlideae, Pyrostrieae.

Psychotriopis Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 298: sect. Grumileae. (Psychotria viridiflora Reinw., etc.)

Psychotrophum*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 160: nov. g. Pentandr. Monogyn.
= Psychotria Linn.

Psychridium Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 105: sect. Astragali. (A. oroboides et Phacae species.)

Psychrophila**) DC. 1818. Syst. I. p. 307; 1824. Prodr. I. p. 44: sect. Calthae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4961 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 43. — Endl. 1839. Gen. n. 4786 *b*. p. 847; 1841. Ench. p. 434.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277: g. Paeoniear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 290: g. Calthinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 191. n. 7262: g. Calthear.
Gay 1845. Hist. de Chile. Bot. I. p. 47: g. Helleborear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 129. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 11. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 717.

Psychrophila Walp. vid. *Psychophila Planch.*

Psycothria Scopoli vid. *Psychotria Linn.*

Psydaranta***) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 145. n. 1488: nov. g. Cratoophytor., a Maranta L. disjunctum.
= . . . ?

Psydax Steud. vid. *Psydrax Gärtn.*

Psydomorphytum †) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 101: gen. 4 plant. Spec. natur.: Globularia, Abolaria, Protea, Holderlinia, Leucandrum, Vionaea, Scabiosa, Chetastrum, Pteropogon, Succisa, Trichopteris, Knautia, Cephalanthus, Allionia, Astrocoma, Nebelia, Brunia, Dipsacus, Statice, Taxanthema, Nauclea, Eriocaulon, Centella, Stilbe.

Psydrax ††) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 125. t. 26. f. 2: nov. g. plant. (Dicoccos zeylanica altheae flore Herm. mss.)
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 405: g. Rubiacear.? dubium.
Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 190: g. Coffeacear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 411 (*Psydax*).
DC. 1830. Pr. IV. p. 476: g. Coffear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 564.
Endl. 1838. Gen. n. 3175 *c*. p. 537; 1841. Ench. p. 272: sect. Canthii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2825. 3.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (119): g. Psychotriacear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 249: sect. Vangueriae.

Psygmatella „Kütz. mss.“ Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 559: in synon. Exilariae.
= Licmophora Agdh. (Endl.)

Psygmium*) Presl 1836. Pterid. p. 199: nov. g. Polypodiear.
= Aglaomorpha Schott.

Psyllieae Rchb. 1837. Handb. p. 202; 1841. Nomencl. p. 122: subdiv. Plantaginear. Gen.: Psyllium.

Psylliostachys Jaub. & Spach 1843. Illustr. pl. or. I. p. 158.
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 669: sect. Statices.

Psyllium**) Tourn. 1700. Inst. p. 128. t. 49: g. pl. class. II. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 43. p. 544.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 470: sect. Plantaginis. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 409. — Rapin 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 485. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 404. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 397. — Koch 1837. Syn. p. 600. Ed. II. p. 689. — Endl. 1838. Gen. n. 2170 *a*. p. 348; 1841. Ench. p. 223. — Kunth 1838. Berol. II. p. 126. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 305. — Barnéoud 1845. Mon. Plant. p. 47. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 190. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 480 (sph. *Phyllium*). — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 730. — Decne 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 733.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 88: g. pl. class. IV.
Juss. 1789. Gen. p. 90: g. Plantaginum.
Neck. 1790. El. II. p. 6. n. 615: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 270: g. Plantaginear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 209. — Hedw. 1806. Gen. p. 57. n. 271. — Juss. 1826. Dict. v. 41. p. 236. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX; 1828. Consp. p. 128. n. 3355; 1844. Fl. sax. p. 241.
Endl. 1830. Fl. poson. p. 212.
Rchb. 1837. Hdb. p. 202; 1841. Nom. p. 122. n. 4779: g. Psylliear.

Psyllocarpus Pohl mss.
= Declieuxia HBK.

Psyllocarpus ***) Martius & Zuccar. 1824. Flora I. p. 130; 1824. Nov. gen. I. p. 44. t. 28: nov. g. Rubiacear. (P. ericoides, laricoides, etc.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 37; 1831. Gen. II. p. 801. n. 4150.
Schult. 1827. Mant. III. p. 14. 211: g. Tetrandr. Monogyn.
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 357: g. Spermacocear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 210. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 152. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2780. (genuinar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2014: g. Coffeacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 570: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 629. — Endl. 1838. Gen. n. 3131. p. 529;

---

*) ψυχοτρόφος, frigore recreans.
**) ψυχρός, frigidus.
***) Nomen contractum ex Pseudomaranta.
†) ψευδής, falsus; μορφή, forma; φυτόν, planta.
††) ψύδραξ, exanthema vesiculosum.

*) ψῦγμα, flabellum.
**) ψύλλα, pulex: ob seminum similitudinem.
***) ψύλλος: ob semina colore et figura pulicem referentia.

Psyllocarpus Martius & Zuccar. cont. 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Synon. Diodois Pohl.

Psyllophora Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 7; 1789. Beitr. IV. p. 146. (Carex pulicaris L.)
Heuffel 1844. Flora II. p. 528: g. Caricinear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 40: sect. Vigneae.

Psyllophyllum Endl. 1841 vid. *Psilophyllum Less.*

Psylocarpaea Endl. 1841 vid. *Psilocarpaea.*

Psylocybe Endl. 1841 vid. *Psilocybe.*

Psylostylum DC. vid. *Psilostylum.*

Psyloxylon „Neraud" Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 30: g. Lythrariear. dubium. *Cf.* Endl. Gen. p. 1205. n. 6168.
Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6672 (*Psiloxyloon*): g. Lagerströmiear.? dubium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lagerstromear.?

Psythirisma „Herb." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 161: g. Iridacear.

Ptacoseia Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 38; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Carex leporina L.)

Ptaeroxylon *) Ecklon & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. austr. I. p. 54: nov. g. Sapindear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38). — Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7608 (dubium).
Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46): g. Zanthoxylear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5636. p. 1074; 1841. Ench. p. 562: g. Sapindacear. penitus dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.

Ptarmica **) Tourn. 1700. Inst. p. 496. t. 283: g. pl. class. XIV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 162. Ed. Hall. 1745. p. 174: g. pl. class. VIII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 712: sect. Achilleae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 370. Ed. II. p. 407. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 408. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 212. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 165.
Neck. 1790. El. I. p. 15. n. 26: g. Actinophytor.
DC. 1837. Pr. VI. p. 19: g. Euanthemidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2648. p. 431; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 209 (134). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 527. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 190.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 191: g. Anthemidear. (verar.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3046: g. Ptarmicear.
J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 606: g. Senecionidear.

Ptarmiceae Rchb. 1841. Nomencl. p. 80: div. Anthemidear. Gen. Euanthemidear. Endl. et Periderаea.

Ptelaea Mönch vid. *Ptelea Linn.*

*) πταίρω, sternuto.
**) Nomen ex Dioscoride a πταίρω, sternuto.

Ptelea *) Linn. 1737. Gen. p. 29. n. 78; 1737. Cliff. p. 36; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 30; 1753. Sp. I. p. 118; 1759. Syst. ed. X. p. 898. n. 141; 1762. Sp. ed. II. p. 173; 1764. Gen. ed. VI. p. 60. n. 152; 1767. Syst. ed. XII. p. 125: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 135; 1784. Syst. p. 160. — Reich. 1778. Gen. p. 61. n. 159. — Lour. 1790. Coch. I. p. 82. — Gmel. 1791. Syst. p. 260. — Pers. 1797. Syst. p. 166; 1805. Ench. I. p. 145. n. 304. — Willd. 1797. Sp. I. p. 670. n. 235; 1809. En. p. 166. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 104. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. (497 *Ptelia*).
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Gled. 1764. Syst. p. 25. n. 95: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 55 (*Ptelaea*).
Rüling 1774. Ord. pl. p. 34: g. Aceres et Pistacias conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 325: g. Disciferar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 223. t. 49. f. 3 (trifoliata).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 194; 1789. Phil. Bot. I. p. 41.
Juss. 1789. Gen. p. 375: g. Terebintaceis aff. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 454. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 259.
Neck. 1790. El. II. p. 228. n. 968: g. Eredophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 680. n. 1505: g. Dioec. Tetrandr. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 189.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Hedw. 1806. Gen. p. 66. 374: g. Terebintacear.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 15. 291. n. 491: g. Terebinthacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 145. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 1.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 694; 1825. Syst. I. p. 441. n. 459; 1830. Gen. I. p. 97. n. 483: g. Acerum.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 355 (Gen. Tereb. p. 23): g. Pteleacear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 82. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 80. — Link 1831. Hdb. II. p. 220.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 510: g. Zanthoxylear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5125. — Bartl. 1830. Ord. p. 386. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 806. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 369. — Meisn. 1837. Gen. p. 65 (46). — Endl. 1840. Gen. n. 5977. p. 1147; 1841. Ench. p. 609. — Walp. 1842. Rep. I. p. 523. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 84. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 607.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 214: g. Zanthoxylacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7471: g. Xanthoxylear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 249: g. Xanthoxylacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473.
Synon. Belluccia Adans.

*) Secundum lexica eadem arbor, quae ulmus esse putatur.

Pteleaceae Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 354 (Gen. Tereb. p. 22): fam. Terebinthacear. Gen.: Ptelea, Blackbournea, Toddalia, Cneorum. *Affinia:* Spathelia, Ailanthus. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 82. Gen. fere ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 80: fam. Citriear. Gen.: Ptelea.
Link 1831. Hdb. II. p. 219: ordo 1 Anastemonum. Gen. id.

Ptelia Dietr. vid. *Ptelea. Linn.*

Ptelidium*) Petit-Thouars 1805. Vég. il. Afr. I. p. 11. 29: nov. g. Rhamnoidar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 345: g. Tetrandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 66. n. 319: g. Rhamnear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 3.
Pet.-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 83 in Römer Collect. bot. p. 214: g. Rhamnor. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 15. 291. n. 492. (?)
DC. 1825. Pr. II. p. 11: g. Evonymear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 68 (49). — Rchb. 1837. Hdb. p. 301.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5395: g. Celastrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 379: g. Celastrinear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 404.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 12: g. Euonymear.
Endl. 1840. Gen. n. 5683. p. 1087; 1841. Ench. p. 575: g. Elaeodendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7891. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 103.
Synon. Seringia Spreng.

Pteracanthus**) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 84. (Ruellia alata Wall.)
Endl. 1839. Gen. n. 4053 *b*. p. 700; 1841. Ench. p. 343: sect. Strobilanthis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4250. 2.

Pterandra A. Juss. 1833 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 72. t. 179; 1837 in Deless. Ic. sel. III. t. 30: nov. g. Malpighiacear. (P. psidiaefolia et pyroidea.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 157.
Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39): g. Malpighiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 299. (genuinar.) — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 258; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 29. — A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 327; 1843. Arch. Mus. III. p. 316. t. 6. Sect.: Pterandra, Acmanthera. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7870. Sect. eaed. — Endl. 1842. Spl. II. p. 84. Sect.: Eupterandra, Androptera. — Walp. 1846. Rep. V. p. 180. Sect. ut Endl. 1840.
Endl. 1840. Gen. n. 5589. p. 1064; 1841. Ench. p. 557: g. Apterygiar. Sect.: Pterandra (1841 Eupterandra), Androptera.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Malpighear.

Pterandra A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 328; 1843. Arch. Mus. III. p. 317: sect. Pterandrae. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1064. n. 5589 *a*. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 2870. 1. — Walp. 1846. Rep. V. p. 180.
= Eupterandra Endl.

Pterantheae R. Brown 1830 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 17 (Verm. bot. Schr. V. p. 375): nova tribus Illecebreis proxima et ad Amarantaceas veras accedens, indicata, nec nominata. Gen.: Cometes, Pteranthus.
Endl. 1839. Gen. p. 959; 1841. Ench. p. 504: trib. Paronychiear. Gen. ead. Accedit 1850 (Spl. V. p. 54) Dicheranthus. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 492. Gen. ead.

Pteranthus Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 36: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 149. n. 327.
Scop. 1777. Intr. p. 345: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 404: g. Urticar.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 534: g. Urticear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 309. — Hedw. 1806. Gen. p. 77. n. 361. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 30. 464. n. 572. — Agdh. 1825. Aphor. p. 204. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 4. — Bartl. 1830. Ord. p. 106.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 178. t. 213.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 453. n. 487; 1830. Gen. I. p. 109. n. 550: g. Chenopodear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4332. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 541.
R. Brown 1830 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 17: g. Pteranthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5206. p. 959; 1841. Ench. p. 504. — Walp. 1842. Rep. I. p. 262. — Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 163.
Decne 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 244.
Meisn. 1838. Gen. p. 133 (97): g. Cometear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Synon. Louichea L'Herit.; Louichia Steud.

Pterichis Lindl. 1840. Gen. Orchid. p. 444; 1847. Veg. kingd. p. 182: nov. g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1547/1. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18.
Meisn. 1842. Gen. p. 384 (288): g. Cranichidear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181: g. Neottiear.

Pteridaceae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: trib. Gyratear. Subtrib.: Pterideae, Ceratopterideae, Blechneae, Doodieae, Adianteae, Notholaeneae.

Pterideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 3. 16: div. Filicum. Gen.: Pteris, Adiantum.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: subtrib. Pteridacear. Gen.: Pteris, Neuropteris, Onychium, Lonchitis, Monogramma, Allosorus.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 48: subordo Polypodiacear. Gen.: Ceratopteris, Haplopteris, Hymenopteris, Pteris, Campteria, Pellaea, Allosorus, Cassebura, Adiantum, Cheilanthes, Hypolepis, Lonchitis.
Meisn. 1843. Gen. p. 431 (332): trib. Polypodiacear. Gen.: Vittaria, Lindsaya, Hewardia, Pteris, Allosorus, Nothochlaena, Cheilanthes, Cassebeera, Adiantum, Lonchitis, Doodia, Woodwardia, Onychium, Blech-

*) Pteleae simile.
**) πτερόν s. πτέρυξ, ala.

Pterideae Gray cont.
num, Lomaria, Ceratopteris, Struthiopteris, Onoclea. — Par. Hook. 1851. Sp. Fil. II. p. 1. Gen.: Adiantum, Ochropteris, Lonchitis, Hypolepis, Cheilanthes, Cassebeera, Onychium, Llavea, Cryptogramme, Pellaea, Pteris, Ceratopteris.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 36. 103. 124: subtrib. Pteridinear. Gen.: Pteris, Pellaea, Phorolobus, Onychium, Doryopteris, Litobrochia, Heterophlebium, Amphiblestra.

Pterides Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 103: vid. *Filices.*

Pteridieae J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 403; 1842. ibid. IV. p. 156 (*Pterideae*): trib. Polypodiacear. Sect.: *Chilosoreae* (gen.: Hypolepis, Ochropteris, Cheilanthes, Cassebeera, Platyloma, Adiantum, Hewardia, Amphiblestra, Doryopteris, Litobrochia, Lonchitis, Pteris, Onychium), *Metasoreae* (gen.: Lomaria, Blechnum, Salpichlaena, Doodia, Woodwardia).

Pteridineae Fée 1852. Gen. Fil. p. 36. 103: trib. Leptocarpear. Subtrib.: Lindsayeae, Adianteae, Pterideae, Lonchitideae.

Pteridium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 445; 1849. Sp. Alg. p. 877: sect. Hypoglossi.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 94: subg. Delesseriae.

Pteridophyllum Sieb. & Zuccar. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 719: nov. g. Papaveracear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 85. n. $4834/_1$: g. Hypecoëar. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 21. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436.

Pteridophyllum Thwaites 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 65. t. 1 B: nov. g. Anacardiacear. (Rhus decipiens W. & A.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 444.
Thwait. 1855. Kew gard. misc. VII. p. 273: g. Sapindacear.

Pteridopsis Link 1841. Fil. hort. Berol. p. 49: subg. Pteridis. (P. longifolia, grandifolia, falcata.)

Pterigeron DC. 1836. Prodr. V. p. 293: sect. Erigerontis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2332 c. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3263. 3.

Pterigieae Rchb. 1828. Consp. p. 87: div. Laurinear. Gen.: Pterigium.

Pterigium Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 397. t. 6. f. 1: nov. g. Fago aut Castaneae aff.? (Pt. costatum.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 5.
Juss. 1822. Dict. v. 25. p. 349: g. Laurinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1917: g. Pterigiear. Sect.: Dipterocarpus, Shorea, Dryobalanops, Caryolobis.
= Dipterocarpus Gärtn.

Pteriglyphis Fée „1843 mss." 1852. Gen. Fil. p. 219: g. Diplaziear. (Diplazium alismaefolium Presl.)
= Ochlogramma Presl.

Pterigodium Poir., Dumort. vid. *Pterigodium Swartz.*

Pterigonium Gray vid. *Pterogonium Swartz.*

Pterigophyllum Brid. 1822. Meth. musc. p. 149: nov. g. Peristomor. pleurocarpor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 8.
Agdh. 1822. Aphor. p. 109: g. Muscor. — Par. Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 225.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 86: g. Hypnear.
= Pterygophyllum Brid.

Pterigospermeae Spach vid. *Pterygospermeae.*

Pterigospermum Donati 1750. Sagg. stor. nat. mar. Adriat.: nov. g. plantar. marinar. (Fucus maritimus, gallopavonis pennas referens C. B.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 10.
Targ. 1816 in Bertol. Amoen. ital. p. 310: g. Algar. (Fucus Pavonius L.)
= Padina Adans.

Pterigostachyum Nees herb. ex Trin. mss. 1841 in Steud. Nom. II. p. 412: nov. g. Graminear. (Pt. Lehmanni.) *Cf. Pterygostachyum Nees.*

Pterigota A. Juss. vid. *Pterygota Schott & Endl.*

Pterigynandrum Hedwig 1782. Fund.; 1801. Spec. Musc. p. 80: g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 10. — Par. Michx. 1803. Fl. am. II. p. 291. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 31. — DC. 1805. Franç. II. p. 460; 1815. V. p. 214. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Math. 1853. Belg. II. p. 46.
Brid. 1797. Muscol. I. p. 156; II. 1. p. 62; 1806. Spl. I. p. 129: g. Aploperistomator. — Par. Röhl. 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 117.
Palis. 1805. Prodr. Aeth. p. 25; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 452: g. Ectopogonor. Sejungitur Lasia. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 221.
Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72: sect. Grimmiae.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 126: g. Peristomor. pleurocarpor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 173: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV Leskiar.)
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 21; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypnear. — Par. Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47. (serius Pylaisaeacear.)
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 946: g. Calyptrobryor.
Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 91: subsect. Leucodontis.
Conf. Maschalanthus Schulz, Maschalocarpus Spreng., Pterogonium Swartz, Pycnoleucodon C. Müll.

Pterilema*) Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 13: nov. g. Malvacear.
= Engelhardtia Lesch.

Pterinoides Siegesb. 1736. Prim. fl. Petrop. p. 91. (ex Hall.)
= Lomaria Willd.

Pteripteris Leman vid. *Peripteris Rafin.*

Pteris **) Linn. 1737. Gen. p. 322. n. 780; 1737. Cliff. p. 473; 1740. Syst. p. 32; 1753.

*) *εἴλημα*, involucrum.
**) Filulo filicis species.

Pteris Linn. cont.
Sp. II. p. 1073; 1759. Syst. ed. X. p. 1321. n. 1038; 1763. Sp. ed. II. p. 1530; 1764. Gen. ed. VI. p. 559. n. 1174; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 687: g. Filicum. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Hill 1769. Ht. kew. p. 429. — Scop. 1772. Carn. II. p. 290. — Murr. 1774. Syst. p. 782; 1784. Syst. p. 930. — Reich. 1778. Gen. p. 555. n. 1291. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 331. — Juss. 1789. Gen. p. 15. — Lour. 1790. Coch. II. p. 678. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 757. n. 1626. — Gmel. 1791. Syst. p. 1297. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Mönch 1794. Meth. p. 724. — Pers. 1797. Syst. p. 971. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 65. — Smith 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 101. (dorsiferar.) — Roth 1800. Germ. III. p. 42. (annulatar.) — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 5. 63 (annulatar.); 1806. Syn. p. 94. (gyratar.) — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 261. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 46. — DC. 1805. Franç. II. p. 549; 1815. V. p. 237. — Willd. 1809. En. p. 1073; 1810. Sp. V. p. 355. n. 1970. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 251. — Leman 1826. Dict. v. 44. p. 13. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 677. (dorsiferar.) — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 70. n. 3257; 1831. Gen. II. p. 723. n. 3650. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 293. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 326. (verar.)

Gled. 1764. Syst. p. 289. n. 1173: g. Filicinar.

Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 454: g. Filicear.

Wigg. 1780. Holsat. p. 73: g. Epiphyllospermar. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 8.

Neck. 1790. El. III. p. 317. n. 1725: g. Sphaeroophytor.

Hoffm. 1795. Crypt. p. 11: g. Annulator.

Batsch 1802. Tab. p. 262: g. Filicinor.

Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 29: sect. Aspleni.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 30: g. Gyrator.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 153. Ed. Nees p. 9: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 16. — Kunth 1822. Syn. I. p. 81; 1838. Berol. II. p. 415. — Agdh. 1822. Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 185. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 54. — D. Don 1825. Nepal. p. 15. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 207. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Endl. 1833. Norf. p. 12. — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 73; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 111. — Meyer 1836. Chlor. hann. p. 673. (indusiatar.) — Genth 1836. Nass. I. p. 42. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 4. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 984. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 313. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 523. (indusiatar.) — Math. 1853. Belg. II. p. 17.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 16: g. Pteridear. — Par. Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 383. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 49.

Pteris Linn. cont.
Subgen.: Pteridopsis, Pteris. — Meisn. 1843. Gen. p. 432 (332). — Hook. 1851. Sp. Fil. II. p. 154. Sect.: Eupteris, Ornithopteris, Heterophlebium, Campteria, Litobrochia, Amphiblestra. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 124. Sect.: Eupteris, Aquilinae, Lonchitidium.

Link 1822. En. II. p. 461: g. Polypodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: g. Filicear.

Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 693: g. Pteroidear. — Par. Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 280.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Asplenicar.

Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 24: g. Phyllopteridum.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.

Endl. 1836. Gen. n. 622. p. 61; 1841. Spl. I. p. 1347; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. Sect. (1841): Allosorus, Amphiblestria, Litobrochia, Campteria, Monogonia, Eupteris. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1011. Sect. eaed. excepto Allosoro. — Hook. 1855. N. Zeal. II. p. 24. Sect.: Platyloma, Pteris, Litobrochia. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 52. — Gren. (& Godr). 1856. France III. p. 639. (indusiatar.)

Agdh. f. 1839. Rev. spec. gen. Pteridis. Sect.: Eupteris, Ornithopteris, Litobrochia, Histiopteris.

Unger 1845. Syn. p. 106; 1846. Chlor. prot. p. LI. 122. t. 36. 37: g. Pecopteridum.

Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 440. Sect. ut Agdh.

Webb 1850. Canar. III. p. 449: g. Adiantear. Sect.: Nymphopteris, Macropteris.

Synon. Thelypteris Rupp.; Filix Hall., Scop.; Oetosis Neck.?; Peripteris s. Lemapteris Rafin.; Pycnodoria Presl?

Pteris Presl 1836. Pterid. p. 143: g. Adiantariar., valde restrictum.

J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 405; 1842. ibid. IV. p. 164: g. Pteridiear.

Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Adiantear. (*Haplopteris, Campteria* et *Monogonia Presl.*)
= Eupteris Endl.

Pterisanthes Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 192: nov. g. Ampelidear. — Par. Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 397. t. 8. Char. reform.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 694: g. Viniferar. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 51 (36).

Spach 1834. Vég. phan. III. p. 210: g. Sarmentacear. — Par. A. Juss. 1841 in Orb. Dict. I. p. 372.

Endl. 1839. Gen. n. 4568. p. 797; 1841. Ench. p. 395; 1850. Spl. V. p. 17: g. Vitear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5571 (*Pterisanthus*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 444. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 440.

Pterisanthus Rchb. vid. *praeced.*

Pterisma Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 102: sect. Monninae. (M. retusa.)

Pterium Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 75: nov. g. Graminear. (P. elegans.) *Cf.* Endl. Gen. p. 109. — Par. Röm. & Schult. 1817.

Pterium Desvaux cont.
Syst. II. p. 50. 807. n. 373. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 21. — Kunth 1833. Agrost. p. 521 (dubium). — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1431.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 838: g. Cenchrinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Meisn. 1843. Gen. p. 416 (318): g. Panicear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 111.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Graminacear. dubium.
= Lamarkia Mönch? (Endl. Gen. p. 101.)

Pterixia Endl. 1841 vid. *Pteryxia Nutt.*

Pternandra*) Jack „Malay. Misc. II“ 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 157: nov. g. Octandr. Monogyn. (P. coerulescens.)
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 324: g. Melastomacear.
Meisn. 1838. Gen. p. 117 (79): g. Charianthear.
= Ewyckiae Blume et Kibessiae DC. sp.

Pternix Hill 1769. Hort. kew. p. 60: nov. g. Associatar. (Carduus defloratus L.)
Rafin. 1817. Fl. Ludov. (absque descriptione.)
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 314: g. Carduinear. dubium.
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2341: g. Carduinar. genuinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear.?
= Cardui Gärtn. sp.

Pterobryon Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 50: nov. g. Bryacear. (Pterogonium densum Schw.) *Cf.* Schwägr. 1840. Linnaea XIV. p. 522.
Synon. Cryptotheca Hornsch.; Symphysodon Dozy & Molk.; Pterobryum C. Müll.

Pterobryum C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 767: g. Neckeracear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Neckerear.
Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 179: sect. Pilotrichi.
= Pterobryon Hornsch.

Pterocalymma Turczan. 1846. Bull. soc. Mosc. XIX. 2. p. 508: nov. g. Lythrariear., Lagerströmiae proximum. (*Cf.* Flora 1848. I. p. 302 et Bot. Zeit. 1848. p. 357.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 295.

Pterocalyx Schrenk 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 361; 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 62: nov. g. Chenopodiacear. (P. strictissimus.)
= Alexandra Bunge.

Pterocarpus**) Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 196. n. 417: g. Diadelph.? obscurum.
„Löfl. 1756“ Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1662: g. Decandr. Monogyn.
Jacq. 1763. Amer. p. 283. t. 183 in Append. (Pt. officinalis. — *Lingoum Rumph.?*)
Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 366. n. 854; 1767. Syst. ed. XII. p. 473: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 533; 1784. Syst. p. 641. — Reich. 1778. Gen. p. 365. n. 925. — Lour. 1790. Coch. II. p. 431. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 484. n. 1159. — Gmel. 1791. Syst. p. 1086. — Pers. 1797. Syst. p. 679; 1807. Ench. II. p. 277. n. 1669. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 9. t. 116; 1832. Ind. III. p. 234. — Willd. 1800. Sp. III. p. 904. n. 1318.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 608.
Scop. 1777. Intr. p. 299: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 364. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 429. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 243. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 763; 1826. Syst. III. p. 192. n. 2510; 1831. Gen. II. p. 573. n. 2795. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 21. — Endl. 1833. Norf. p. 94.
Neck. 1790. El. III. p. 48. n. 1367: g. Cyteophytor.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 418. Sect.: Moutouchia, Amphymenium, Echinodiscus, Santalaria, Ateleia. — Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4016 (sect. eaed.); 1841. Nom. p. 153. n. 5997. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 376. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 362. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 266. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (67). — Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 94. — Endl. 1841. Gen. n. 6705. p. 1302; 1841. Ench. p. 672. — Walp. 1842. Rep. I. p. 793. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 454. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 134. (p. 1082 sejungitur Malaparius.) — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 570.
Link 1831. Hdb. II. p. 198: g. Galegoidear.
Synon. Lingoum Adans.; Clypeola et Peltaria Burm. (DC.)

Pterocarpus Berg. 1769. Vet. Ac. Handl. p. 116. (P. ecastaphyllum.)
= Ecastaphyllum B. Browne.

Pterocarya*) Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 345 (Gen. Tereb. p. 13): nov. g. Juglandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3833; 1841. Nom. p. 145. n. 5631. — Bartl. 1830. Ord. p. 397. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54). — Endl. 1840. Gen. n. 5891. p. 1127; 1841. Ench. p. 597. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 507. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 134.
„Nutt.“ Lindl. 1847. Veg. kd. p. 293: g. Juglandacear.

Pterocarya DC. 1824. Prodr. I. p. 340: sect. Monninae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3038 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 368.

Pterocarya Nuttall . . .
= Oblone Gärtn.

*) πτέρνα, calx.
**) πτερόν, ala; κάρπος, fructus.

*) πτερόν, ala; καρύα, nux juglans.

Pterocaryon Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 185; 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 230: sect. Betulae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 19. n. 1840 *Δ a*.

Pterocaulon Elliott 1824. Carol. II. p. 323.
DC. 1836. Pr. V. p. 453: g. Plucheinear. Sect.: Chlaenobolus, Pterocaulopsis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2415. p. 391; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 262: g. Tarchonanthear.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3565: g. Plucheinar. Sect.: Pterocaulon, Pterocaulopsis.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953: g. Iphionear.
Synon. Chlaenobolus Cass.

Pterocaulon Gaudin 1829. Fl. Helv. V. p. 177: sect. Cirsii. (C. palustre, lanceolatum, subulatum, hybridum, Chailleti, subalpinum.)
Nägeli 1841. Cirs. Schweiz. (Neue Denkschr. d. schw. Ges. f. Nat. V.)
= Helocirsium Rchb.

Pterocaulon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 360; 1849. Sp. Alg. p. 606. n. 418: g. Sargassear. (Fucus Peronii Turn.)
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 283: tribus unica Pterophyci.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Cystosirear.

Pterocaulopsis DC. 1836. Prodr. V. p. 454: sect. Pterocaulonis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2415 *b*. p. 392; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3565. 2.

Pterocelastrus*) Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 68 (49): g. Evonymear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5682. p. 1087; 1841. Ench. p. 574. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7887. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 535.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588: g. Euonymear.
Synon. Asterocarpus Eckl. & Zeyh.

Pterocephalus Vaillant 1722. Act. Ac. Paris. p. 183: nov. g. Dipsacear. — Par. Lagasc. 1816. Gen. et spec. p. 9. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 47. — Link 1829. Hdb. I. p. 683. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 130. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 192. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 179. — Webb .... Canar. II. p. 200.
Adans. 1763. Fam. II. p. 152: g. Scabiosar.
Scop. 1777. Intr. p. 120: g. Compositar.
Mönch 1794. Meth. p. 491: g. Petalostemonis. (Scabiosa papposa L.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 587; 1825. Syst. I. p. 383. n. 378; 1830. Gen. I. p. 88. n. 435: g. Aggregatar.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 758: sect. Scabiosae. (Sc. diandra.) — Par. Lois.

*) Nomen mutatum ob Astrocarpum Neck.

Pterocephalus Vaillant cont.
1827. Dict. v. 48. p. 8. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 448.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1932; 1841. Nom. p. 72. n. 2690: g. Scabiosear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 652. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 688. — Endl. 1838. Gen. n. 2194. p. 354; 1841. Ench. p. 229. — Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 314. — Walp. 1843. Rep. II. p. 534; 1847. VI. p. 85. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 451.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 700: g. Dipsacacear.

Pteroceras „Van Hasselt mss." Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 6; 1848. Pl. jav. rar. p. 128: nov. g. Orchidear.
Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Vandear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 61. n. $1458/_1$. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Pteroceras Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 690. n. 459: nov. g. Ceramiear. (Ceramium cancellatum Ag.)

Pterochaeta Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 455: nov. g. Helichrysear. (P. paniculata.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 234.

Pterochaete Boissier 1845. Diagn. pl. or. nov. I. Nr. 6. p. 76: nov. g. Corymbiferar., Pulicariae aff. (P. glutinosa, Aucheri, etc.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 142: g. Euinulear.
= Platychaete Boiss.

Pterochilus Hook. & Arn. 1832 in Beech. voy. Bot. Pt. II. p. 71. t. 17: nov. g. Orchidear. (Pt. plantaginea.)
= Microstylis Nutt.

Pterochiton Torrey & Frem. 1845. Rep. expl. exp. App. p. 318: nov. g. Grayiae Hook. & Arn. aff. (P. occidentale.) *Cf.* Duchartre Rev. bot. II. p. 55.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 40. n. $1915/_2$: g. Atriplicear. (a Moquin-Tand. 1849 ad Obionem relatum.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 567.

Pterochlamys Fisch. mss.
= Panderia Fisch. & Mey.

Pterocladia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 328. n. 1738: nov. g. Phryganophytor., ab Hypno L. sejunctum.

Pterocladia J. Agardh 1851. Spec. Alg. II. p. 482.
Sonder 1854. Linnaea XXVI. 5. p. 520: g. Gelidiear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 244: g. Gelidiacear.

Pterocladis „Lamb. ex Sweet" Steud. 1840. Nomencl. I. p. 177; 1841. II. p. 413. (Pt. genistelloides.)
= Baccharis Vaill.

Pterocládos Boissier, Godr. vid. *seq.*

Pterocladus Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 348: subg. Statices. (St. sinuata, etc.)
Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 635 (*Pteroclados*): sect. Statices. — Par. (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 739 (*Pteroclados*).

Pterococcus Pall. 1776. It. App. p. 738. t. 5; 1777. Reis. russ. Reich II. App. p. 43: nov. g. pl. (P. aphyllus.) *Cf.* L'Herit. in Linn. Trans. I. p. 177 ex Reuss Rep. comm. II. p. 103 sub *Calligono.*

Endl. 1838. Gen. n. 1989 *c.* p. 308; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 50: sect. Calligoni.

C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 143: g. Calligonear. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 494. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 29.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521: g. Polygonear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 317 (228). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504.

Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6321: g. Persicariear.

Synon. Pallasia Linn. f.

Pterococcus Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 41: nov. g. Euphorbiacear. (Plukenetia corniculata W.)

= Sajorium Endl.

Pterocoma DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 37: sect. Dicomae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2930 *e.* p. 1386; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3785. 3.

Pterocymbium R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. pt. 3. p. 219. t. 45: nov. g. Sterculiacear., Scaphio aff. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. $5321/_4$.

Walp. 1846. Rep. V. p. 104: g. Sterculiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.

Pterodes Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 404: sect. Luzulae. (L. Forsteri, vernalis.)

Synon. Anthelophora C. Koch.

Pterodinia „Chev." Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Botrytideor. (Nomen.)

Pterodiscus Hook. 1844. Bot. Mag. t. 4117: nov. g. Pedalinear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 519.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.

Pterodon Vogel 1837. Linnaea XI. p. 384: nov. g. Geoffroyear.

Endl. 1841. Gen. n. 6730. p. 1307; 1841. Ench. p. 673: g. Dalbergiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6023. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Walp. 1846. Rep. V. p. 547. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Pterogastra Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 32: nov. g. Lasiandralium. (Chaetogastra divaricata, etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 553.

Pterogenium Fries vid. *Pterogonium.*

Pteroglossis Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 165; 1850. Ann. nat. hist. II. 5. p. 32: nov. g. Salpiglossidear. (P. laxa.)

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 182: g. Salpiglossear.

Pterogodium Harv. vid. *Pterygodium Swartz.*

Pterogoniaceae C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 826: nova trib. Muscor. Gen.: Pterogonium, Clastobryum, Hypnorum et Leskearum pars, Macrohymenium.

Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 291: trib. Pleurocarpor. Gen.: Leptodon, Pterogonium, Leucodon, Cyrtopus.

Pterogonium Swartz 1799. Musc. succ. p. 26: nov. g. Muscor. — Par. Schwägr. 1823. Suppl.

Pterogonium Swartz cont.

II. vol. I. 1. p. 30. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 728 (*Pterigonium*).

Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 719: g. Hypnoideor.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 287: g. Hypnoidear. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: g. Hypnear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 87 (*Pterogenium*).

Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 45: g. Maschalocarpear.

C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 826: g. Pterogoniacear. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 291.

Bayrh. 1849. Taun. p. 25: g. Hynacear.

C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 74: sect. Neckerae.

Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: g. Leucodontear. (serius Pylaisaeacear.)

Pterogramme Fisch. & Meyer .... Sert. Petrop. I. t. 6 adn. (Walp. Ann. bot. III. p. 100): sect. Nemophilae. (N. aurita et heterophylla.)

= Pholistoma Lilja.

Pterogyne*) L. R. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 140; 1844. Arch. Mus. IV. p. 130. t. 9: nov. g. Caesalpiniear., Haematoxylo aff. (P. nitens.)

Walp. 1846. Rep. V. p. 557: g. Eucaesalpiniear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Cynometrear.

Pterogynus DC. 1828. Prodr. III. p. 66: sect. Goniocarpi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4482 *b.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 702.

Pteroideae Rchb. 1828. Consp. p. 38: subdiv. Polypodiacear. indusiatar. Gen.: Pteris, Vittaria, Leptostegia, Lonchitis, Monogramma, Anthrophyum.

Rchb. 1837. Hdb. p. 138: fam. Thryptopteridum. Divis.: Hymenophylleae, Polypodieae, Amphibolocarpae. (= *Polypodiaceae Rchb. 1828.*)

Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 279: subtrib. Polypodiacear. Gen.: Adiantum, Cheilanthes, Hypolepis, Pteris, Lonchitis.

Pteroides Spreng. 1806. Fl. hal. (Römer Coll. bot. p. 277): ordo 3 Ateliae. Gen.: Osmunda, Botrychium, Ophioglossum.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 104: fam. 8 plant. Divis.: Schismatopterides, Poropterides, Stachyopterides.

Pterolaena DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 113; 1824. Prodr. I. p. 500: sect. Pterospermi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5316 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 538. — Endl. 1840. Gen. n. 5352 *b.* p. 1003; 1841. Ench. p. 520.

Pterolepis Schrad. 1821. Götting. Anz. p. 2071; 1832. Comm. Götting. VII. p. 130: nov. g. Cyperear.

Schult. 1824. Mant. II. p. 1. 45: g. Triandr. Monogyn.

Endl. 1837. Gen. n. 1000 *a.* p. 118; 1841.

*) *πτερόν, γυνή,* pistillus alatus.

Pterolepis Schrad. cont.
Ench. p. 64: sect. Scirpi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1477. 3.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 186: g. Cyperacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Scirpear.
Synon. Malacochaete Nees; Hymenochaete Palis.; Elytrospermum Mey.; Pterygolepis Rchb.

Pterolepis DC. 1828. Prodr. III. p. 140: sect. Osbeckiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4596 *c*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 758. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 245.
Endl. 1840. Gen. n. 6222. p. 1214; 1841. Ench. p. 646: g. Osbeckiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6730. — Walp. 1843. Rep. II. p. 137; 1846. V. p. 708. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 75 (sph. *Plerolepis*).
Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 619: g. Melastomacear.

Pterolobium R. Brown 1814 in Salt Abyssin. p. 65 (Verm. bot. Schr. I. p. 248): nov. g. pro *Kantuffa Bruce* institutum.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 283: g. Cassiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70).
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 811. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 106.
Endl. 1841. Gen. n. 6769. p. 1313; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6071. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 592.
Synon. Kantuffa Bruce; Cantuffa Gmel.; Reichardia Roth; Quartinia Rich.

Pterolobium Andrz. mss. ex C. A. Meyer 1831. Cauc. p. 185.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Siliculosar.
= Pachyphragma DC.

Pteroloma Desvaux mss. (a DC. Prodr. II. p. 326 ad Desmodii sect. Pleurolobium relatum.)
Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 217. 219; IV. p. 543: g. Euhedysarear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 543.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 257: g. Hedysarear.

Pteroloma Steud. & Hochst. in Schimp. herb. Arab. n. 851.
= Dipterygium Decne.

Pterolophoides DC. 1837. Prodr. VI. p. 581: subsect. Acrolophi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *ta*. p. 474; 1841. Ench. p. 246.

Pterolophus Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 34; 1827. v. 50. p. 247. 249; 1830. v. 60. p. 570: nov. g. Jaceinear. verar.
DC. 1837. Pr. VI. p. 571: sect. Centaureae. Subsect.: Eupterolophus, Jaceoides. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *g*. p. 473; 1841. Ench. p. 246. Subsect. eaed.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 2 *b*: subsect. Centaureae.

Pteromarathrum Koch mss.
= Prangos Lindl.

Pteromischum*) Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 77: grex Philodendri. (Monstera ligulata Schott, etc.)

Pteronema Endl. 1840. Gen. n. 6434 *b*. p. 1257; 1841. Ench. p. 667: sect. Jacksoniae.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5928: g. Pultenaeear.

Pteroneuron Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 10 (11): g. Arabidear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4860. p. 866; 1841. Ench. p. 448.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7006: g. Cardaminear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Arabidar.
= Pteroneurum DC.

Pteroneurum DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 231; 1821. Syst. II. p. 269; 1824. Prodr. I. p. 154: nov. g. Arabidear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 53. — Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4784; 1832. Fl. exc. p. 676. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 171. — Brongn. 1843. En. genr. p. 90 (*Pteronevron*). — Walp. 1846. Rep. V. p. 36.
Link 1822. En. II. p. 160: g. Tetradynam. Siliquos.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 884. n. 2310; 1831. Gen. II. p. 521. n. 2559 (*Pteronevron*): g. Siliquosar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 309. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 251. Sect.: Oxypteron, Cryptopteron. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 633. 699.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 41: g. Cruciferar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Cardaminear.
Synon. Pteroneuron Meisn., etc.

Pteronevron Spreng., Brongn. vid. *praeced.*

Pteronevron Fée 1852. Gen. Fil. p. 320: nov. g. Nephrolepidear. (Davallia parallela Hook.)

Pteronia Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1176; 1764. Gen. ed. VI. p. 414. n. 937; 1767. Syst. ed. XII. p. 538: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 614; 1784. Syst. p. 737. — Reich. 1778. Gen. p. 412. n. 1017. — Lour. 1790. Coch. II. p. 489. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 542. n. 1265. — Gmel. 1791. Syst. p. 1201. — Pers. 1797. Syst. p. 777; 1807. Ench. II. p. 391. n. 1806. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1776. n. 1459.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.
Gled. 1764. Syst. p. 248. n. 1024: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 126: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 174: g. Cinarocephalar. (verar.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 387.
Batsch 1802. Tab. p. 251: g. Capitatar.
Cass. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 65: g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 544; 1826. Syst. III. p. 439. n. 2683; 1831. Gen. II. p. 612. n. 3023: g. Eupatorinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2533: g. Chrysocomear.

---

*) μίσχος, pediculus.

Pteronia Linn. cont.
DC. 1836. Pr. V. p. 356: g. Solidaginear. Sect.: Scepinia, Pachyderis, Pterophorus. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2386. p. 386; 1841. Ench. p. 235. Sect. eaed. (Pachyderris loco Pachyderidis.) — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3340. Sect.: Pteronia, Pachyderris, Pterophora. — Walp. 1843. Rep. II. p. 970. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Baccharidear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Euasterear.
Synon. Pterophorus Vaill.; Scepinia et Pterophora Neck.; Pterophorus, Scepinia et Pachyderis Cass.; Pterophorus, Pteronia, Henanthus et Pachyderis Less.

Pteronia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 195: g. restrictum Chrysocomear.
= Scepiniae DC. pars.

Pterononis DC. 1825. Prodr. II. p. 165: subsect. Euononidis. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 162.
Endl. 1840. Gen. n. 6493 *a*. p. 1265; 1841. Ench. p. 668: sect. Ononidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5852. 5.

Pteronospora Lindl. vid. *Peronospora Corda.*

Pteropappus Lessing 1832. Syn. Compos. p. 166: subg. Asteris.
DC. 1836. Pr. V. p. 217: sect. Mairiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2296 *a*. p. 372; 1841. Ench. p. 233.
Synon. Mairia Nees.

Pterophora Necker 1790. Elem. bot. I. p. 78. n. 139: g. Siphoniphytor.
Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3340. 3: sect. Pteroniae.
= Pterophorus Vaill.

Pterophora Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 223: g. Gonolobear.
= Dregea E. Meyer.

Pterophora Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 94: sect. Tococae. (T. macroptera et stephanotricha.)

Pterophorus Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 315: g. Corymbiferar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 460; 1826. v. 44. p. 44; 1830. v. 60. p. 582: g. Chrysocomear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 195.
DC. 1836. Pr. V. p. 364: sect. Pteroniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2386 *c*. p. 386; 1841. Ench. p. 235.
Synon. Pterophora Neck.

Pterophycus J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 283: sect. Sargassi. Tribus unica: Pterocaulon.

Pterophylla D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 93: nov. g. Cunoniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 201. — Endl. 1839. Gen. n. 4658. p. 819; 1841. Ench. p. 409. — Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6218. — Walp. 1846. Rep. V. p. 834.
Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101): g. Cunoniacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 572: g. Weinmannear.

Pterophyllum Brongn. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 211. t. 12. f. 7. 8; 1828. Dict. v. 57. p. 100; 1828. Prodr. p. 95; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 112: g. foss. Cycadear. — Par. Morris 1841. Ann. and Mag. VII. p. 118. — Göpp. 1844. Arb. schles. Ges. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 614.
Endl. 1836. Gen. 710. p. 72; 1841. Ench. p. 50: g. Cycadeacear. — Par. Unger 1845. Syn. p. 154; 1846. Chlor. prot. p. LXIII.
Synon. Pterozamites Braun; Osmundites Jäger.

Pterophyllum Leman vid. *Pterygophyllum Brid.*

Pterophyllum „Nuttall mss.“ Torrey & Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 28: sect. Coptidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4792 *c*. p. 848; 1841. Ench. p. 435. — Rchb. 1841. Nom. p. 191. n. 7251. 3.

Pterophyllum Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 38: subsect. Tuberarii.

Pterophyllus Léveillé 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 178: nov. g. Agaricinor. (P. Bovei.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 315.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: g. Agaricineor.

Pterophyton Cassini 1818. Bull. soc. philom. p. 76; 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1826. v. 44. p. 48; 1829. v. 59. p. 139; 1830. v. 60. p. 576: nov. g. Helianthear. (Archetypar.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 737 (*Pterophytum*). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2636. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 336: sect. Actinomeridis. (A. helianthoides.)
= Actinomeris Nutt.

Pterophytum Wittst. vid. *praeced.*

Pteropodium DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 300 (209): nov. g. Catalpear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 239: g. Bignoniar. anomalar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear. dubium.

Pteropodium Willd. herb. ex Trin. mss. in Steud. Nom. I. p. 250; II. p. 414.
= Calamagrostis Adans.

Pteropodoxys Endl. 1840. Gen. n. 6058 *d*. p. 1172; 1841. Ench. p. 624: sect. Oxalidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7728. 3.

Pteropogon Necker 1790. Elem. bot. I. p. 109. n. 190: nov. g. Psydomorphytor., a Scabiosa L. sejunctum.

Pteropogon DC. 1837. Prodr. VI. p. 245: nov. g. Helichrysear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2748. p. 448; 1841. Ench. p. 243. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3476. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 479. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 245.
Fisch. & Meyer 1839. Ind. sext. sem. h. Petrop. Subg.: Colobophyllum.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.

Pteropogon DC. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.
Nees 1842. Linnaea XVI. p. 223. Char. reform.
F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 414. Sect.: Eupteropogon, Schönia, Helipteropsis.
Conf. Facelis Cass.

Pteropogon A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 266: g. Gnaphaliear. emendat. Sect.: Facelioides, Helichrysoides, Achyroclinoides, Pteropogonopsis?, Helipteroides? *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 286.

Pteropogonopsis A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 269: sect. Pteropogonis? (P. demissus n. sp.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 288.

Pteroponax Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 10. n. $4472/_1$ *b:* sect. Opoponacis.

Pteropsis Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 218: nov. g. Filicum. (Acrostichum heterophyllum L., etc.)
Meisn. 1843. Gen. p. 431 (332): g. Taenitidear.
= Pteropsis et Drymoglossum Presl.

Pteropsis Presl 1836. Pterid. p. 225: g. Taenitidear. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 140. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Endl. 1841. Spl. I. n. 611 *b.* p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Taenitidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 997. 1. — Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 431.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 66: g. Polypodiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 87: g. Vittariear.
Synon. Chilogramme Blume; Chilogramma Wittst.

Pteropyrum Jaubert & Spach 1846. Ill. pl. or. II. p. 7. t. 107—109: nov. g. Polygonear. Sect.: Streptocarya, Orthocarya. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 54. n. $1993/_3$. Sect. eaed. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 552. Sect. eaed.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 7. t. 1809: g. Polygonacear.
Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 30: g. Rhabarbarear. Sect. eaed.

Pterorrhynchium Nees 1834. Linnaea IX. p. 295: subg. Haplostylidis.

Pteroscleria Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 196: nov. g. Scleriear. *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Sclerear.
= Scleriae Berg. pars.

Pteroselinum Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. 450: sect. Peucedani. (P. austriacum, rablense; verticillare.)
= Selinoides DC. et Tommasinia Bert.

Pteroselinum Rchb. 1832. Fl. exc. p. 453; 1837. Hdb. p. 220; 1844. Fl. sax. p. 271: g. Peucedanear. (Peuced. alsaticum.)
= Palimbia Bess.

Pterosonchus Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 426. 448: subg. Sonchi. (S. asper.)

Pterospartum Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 146: subg. Genistae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 499.

Pterosperma Hassk. vid. *Pterospermum Schreb.*

Pterospermadendron Amman 1736. Comm. Ac. Petrop. VIII. p. 215. t. 16. 17: nov. g. plantar., a Linnaeo (Gen. ed. VI. p. 351) ad Pentapetem relatum.
= Pterospermum Schreb.

Pterospermum Schreb. 1791. Gen. II. p. 461. n. 1124: g. Monadelph. Dodecandr. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 728. n. 1281; 1809. En. p. 719. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 158.
Batsch 1802. Tab. p. 20: g. Festivar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 68: g. Malvacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 241. n. 1623. — Link 1822. En. II. p. 200. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 52.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 805; 1826. Syst. III. p. 80. n. 2414: g. Pentapetear.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 313: g. Dombeyacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 500. Sect. ut 1823. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 204. n. 5316. Sect. eaed. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 537. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 68. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 452. — Meisn. 1837. Gen. p. 34 (27). — Endl. 1840. Gen. n. 5352. p. 1003; 1841. Ench. p. 520. Sect. ut DC. — Wight 1842. Ic. pl. Ind. II. 3. p. 10 (*Peterospermum*). t. 631. — Walp. 1842. Rep. I. p. 350; 1846. V. p. 114. — Brongn. 1843. En. genr. p. 78.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100. 111: g. Dombeyear. Sect.: Velaga, Pterolaena. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 202. n. 7688. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 549. n. 2691: g. Büttnerear.
Wight 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 90. t. spl. 26: g. Byttneriacear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 205 (*Pterosperma*): g. Büttneriacear.
Synon. Pterospermadendron Amm.

Pterospora Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 269: nov. g. Decandr. Monogyn. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 53.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 293. n. 1550: g. Monotropear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 866. — Hook. 1834. Fl. bor. am. II. p. 48. — Rchb. 1837. Hdb. p. 206; 1841. Nom. p. 125. n. 4873. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 779. — Endl. 1839. Gen. n. 4353. p. 761; 1841. Ench. p. 375. — Meisn. 1839. Gen. p. 248 (156). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 445.
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3369: g. Pyrolear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 334. n. 1691: g. Ericear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 155.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 452: g. Monotropacear.

Pterostachys G. Don vid. *Pterostoechas Ging.*

Pterostegia Fischer & Meyer 1835. Ind. sec. sem. h. Petrop. p. 48: nov. g. Polygonear. (P. drymarioides.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. 1836. p. 303; Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 9 et Linnaea 1837. Litt. p. 118. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 100.
Endl. 1837. Gen. n. 1979. p. 305; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 44: g. Eriogonear. — Par. C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 142. — Meisn. 1841. Gen. p. 317 (229). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Benth. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 27.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 163. n. 6326: g. Coccolobear.

Pterostelma Wight 1834. Contrib. p. 39: nov. g. Asclepiadear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 888. — Blume 1850. Rumphia IV. p. 32.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 128: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3502. p. 596; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5041.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 513.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 633: g. Ceropegiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Pterostemon Schauer 1847. Linnaea XX. p. 736: nov. g. Pomacear., Myrtaceis aff. (P. mexicanus.) *Cf.* Griseb. in Arch. f. Naturg. 1848. II. p. 319. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 288.

Pterostephus Jaubert & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 86: subg. Gailloniae. (Spermacoce calyptera Decne.) — Simil. Walp. 1847. Rep. VI. p. 33.
Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 509: g. distinctum.

Pterostigma Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3; 1835. Scroph. ind. p. 20: nov. g. Gratiolear. (Adenosma villosum Bth., etc.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 538. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4624. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3924. p. 679; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (220). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 510. — Walp. 1845. Rep. III. p. 264. 963.
Hook. & Arn. 1836. Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 203. t. 45: g. Scrophularinear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 379; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear. Sect.: Cardiosepalum, Spathostigma. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 678. Sect. caed.
Synon. Spathestigma Hook. & Arn.

Pterostoechas Gingins 1826. Hist. Lavand. p. 158. (*Pseudostoechas* Steud. Nom. II. p. 405.)
Benth. 1833. Labiat. p. 149; 1848 in DC. Pr. XII. p. 146: sect. Lavandulae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 710 (*Pterostachys*). — Endl. 1838. Gen. n. 3585 *c.* p. 612; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4093. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 574.

Pterostylis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 326. Ed. Nees p. 182; 1813. Ht. kew. V. p. 204 (Verm. bot. Schr. II. p. 26): nov. g. Orchidear. (Pt. obtusa.) — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 53. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 714. n. 2976; 1831. Gen. II. p. 662. n. 3341. — Lindl. 1834 in Hook. journ. bot. I. p. 274. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 248.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 297: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 190. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528): g. Arethusear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1443; 1841. Nom. p. 55. n. 2163. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1595. p. 218; 1841. Ench. p. 114. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Lindl. 1840. Orchid. p. 387: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 5.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Acianthidar.
Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 598: g. Neottiear.

Pterostyrax Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. p. 94. t. 47: nov. g. Styracear. (Pt. corymbosum.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1410. n. $4252/_1$; 1841. Ench. p. 364. n. $4257/_1$. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5275. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 364. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 268. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593.

Pterota*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 146: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.
Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46): sect. Zanthoxyli. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5972 *b.* p. 1146; 1841. Ench. p. 609.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7476. 2: sect. Xanthoxyli.
Synon. Lacaris Hamilt.

Pterothamnion Nägeli . . . . . . : nov. g. Ceramiear. *Cf.* Bot. Zeit. 1858. Beil. p. 93.

Pterotheca Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 200; 1821. ibid. p. 125: nov. g. Lactucear. (Andryala nemausensis Vill.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 179. — Meisn. 1839. Gen. p. 236 (145). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 831.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1826. v. 44. p. 56; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 499.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2156; 1831. Fl. exc. p. 269: g. Andryalear.
Endl. 1838. Gen. n. 3019 *a.* p. 500; 1841. Ench. p. 250: sect. Lagoseridis.

*) πτερώτα, alata, ansata.

Pterotheca Cassini cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3723: g. Picridiear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 329: g. Crepoidear.
Synon. Trichocrepis Vis.; Lagoseridis sp. Bieb.
Pterotheca Presl 1831. Symb. bot. I. p. 55. t. 35: nov. g. Scirpear. (Schoenus barbatus Vahl.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 13.
Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1452. 2 α (*Pterothecia*): subsect. Sclerochaetii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.
= Haplostylis Nees pt.
Pterothecia Rchb. vid. *Pterotheca Presl.*
Pterothrix DC. 1837. Prodr. VI. p. 279: nov. g. Leysserear. Sect.: Relhanioides, Lucilioides. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2773. p. 452; 1841. Ench. p. 243. Sect. caed. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3532. Sect.: Pterothrix, Luciliothrichia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Pterotrichis Rchb. vid. *Pherotrichis Decne.*
Pterotrichum Kütz. 1843. Phycol. gener. p. 372; 1845. Phycol. germ. p. 284; 1849. Sp. Alg. p. 643: sect. Callithamnii.
Pterotropis DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 377; 1824. Prodr. I. p. 176: sect. Thlaspios. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 62. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1113; 1828. Consp. p. 182. n. 4742 *e*; 1832. Fl. exc. p. 658 (*Pterotropium*). — Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 96. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 191. — Endl. 1839. Gen. n. 4885 *e*. p. 870; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 164. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 143.
Pterotropium Rchb. vid. *praeced.*
Pterotropium DC. 1845. Prodr. IX. p. 552: sect. Heliophyti.
Pterotum*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 292. Ed. Willd. p. 358: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 370. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 461. n. 1783; 1830. Gen. I. p. 396. n. 1986. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 26.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 55: g. Polyandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5576: inter genera vix cognita. — Simil. Endl. 1841. Gen. n. 6853. p. 1328; 1841. Ench. p. 685. — Meisn. 1843. Comm. p. 372.
Pterozamites Braun .... in Münst. Beitr. VI. p. 39.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 111: sect. Zamitis.
= Pterophyllum Brongn. et Nilssonia Brongn.
Pterozonium Fée 1852. Gen. Fil. p. 178: nov. g. Leptogrammear. (Gymnogramme reniformis Mart.)

*) πτερωτός, alatus: a semine ala polyfida instructo.

Pterula Fries 1825. Pl. homon. p. 90 (1830. Linnaea V. p. 531. t. 11. f. 4): nov. g. Clavulator. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 57. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 298. — Endl. 1836. Gen. n. 412. p. 35; 1841. Ench. p. 20.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 799. n. 4143: g. Clavator.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 285: sect. Anthinae.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 427: g. Clavarieor. (genuinor.) — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 170: g. Isariear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 151.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Isariaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 339: g. Clavarineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 145: g. Isarieor.
Conf. Penicillaria Chev. et Anthina Fries.
Pterygieae Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 35: subordo Dipterocarpear. Gen.: Dipterocarpus, Dryobalanops, Anisoptera.
Pterygium „Corr." Endl. Gen. p. 1013 in synon. Dipterocarpi: vid. *Pterigium Corr.*
Pterygium Nyland. 1854. Bull. soc. bot. France; 1855. Flora p. 299: nov. g. Lichinear.
Pterygocalyx*) Maxim. 1858. Mém. sav. étr. Ac. Pet. IX. p. 198: nov. g. Gentianacear., Crawfurdiae aff. (P. volubilis.)
Pterygocarpae Meisn. (1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5); 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 28: trib. Polygonear. Subtrib.: Calligoneae, Rhabarbareae.
Pterygocarpum Walp. 1845. Rep. IV. p. 39: sect. Chascani.
Pterygocarpus Hochstett. 1843. Flora I. p. 78: nov. g. Asclepiadear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 76. n. $3507/_1$: g. Tylophorear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 491: g. Pergulariar.
= Hoya R. Brown.
Pterygodium**) Swartz 1800. Act. Holm. p. 217; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 35. t. 1. f. E: nov. g. Orchidear. (Ophrys alata L.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 160. — Pers. 1807. Ench. II. p. 509. n. 1980. — Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 287. — R. Brown 1813. Hort. kew. V. p. 196. (Verm. bot. Schr. II. p. 17.) — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 6 (*Pterigodium*). — Spreng. 1826. Syst. III. p. 699. n. 2939; 1831. Gen. II. p. 655. n. 3299.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 56. n. 1592: g. Gynandr. Monandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 452.
Thunb. 1807. Fl. cap. I. p. 106: g. Diandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 287: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1838. Orchid. p. 366: g. Ophry-

*) πτέρυξ, pluma, ala.
**) πτερυγώδης, alaeformis.

Pterygodium Swartz cont.
dear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1481; 1841. Nom. p. 51. n. 1892. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56 (*Pterigodium*). — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1539. p. 211; 1841. Ench. p. 113. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 319. 325 (*Pterogodium*). — Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Corycidar.

Pterygolepis Rchb. 1841. Nomencl. p. 236: nomen pro *Pterolepide Schrad.* propositum.

Pterygoloma Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 188. 211: nov. g. Columnear. (Alloplectus repens Hook.)

Pterygopappus Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 120: nov. g. Compositar. (P. Lawrencii.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 726: g. Helichrysear.

Pterygophora Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 73. t. 5: nov. g. Algar., Phasgano aff. (P. californica.)

Pterygophylla Brid. 1827. Bryol. II. p. XLVI: div. Pterygophylloideor. Gen.: Chaetephora, Pterygophyllum.

Pterygophylleae C. Müll. 1848. Linnaea XXI. p. 191. 194: trib. Muscor. Gen.: Pterygophyllum, Acosta.
Bayrh. 1849. Taunus p. 35: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Pterygophyllum.

Pterygophylloideae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): div. Pleurocarpiar. Sect.: Pterygophyllea, Trachypodea.

Pterygophylloïdei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLVI: fam. Pleurocarpor. Divis.: Pterygophylla, Brachypodes.

Pterygophyllum*) Brid. 1827. Bryol. II. p. 341: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLVI Pterygophyllor.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 48 (*Pterophyllum* ex Brid. mss.)
Endl. 1836. Gen. n. 587 *a.* p. 56; 1841. Ench. p. 32: sect. Hookeriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 965. 1. — Hampe 1847. Linnaea XX. p. 85. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 124.
C. Müll. 1848. Linnaea XXI. p. 194: g. Pterygophyllear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 35.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Neckerear.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 201: subsect. Eriopodis.
Bruch, Schimp. & Gümp. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: g. Hypnear. (serius Hookeriacear.)
Synon. Pterigophyllum Brid.

Pterygospermae Tausch 1834. Flora I. p. 344: trib. Mericarpar. Subtrib.: Mulineae, Angeliceae, Laserpitieae.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 380: series Umbelliferar. Gen.: Siler, Laserpitium, Elaeoselinum.

*) πτέρυξ, plumula.

Pterygospermeae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 134 (p. 153 *Pterigospermeae*): trib. Umbelliferar. Sect.: Mulineae, Angeliceae, Laserpitieae.

Pterygostachyum „Nees mss.“ Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 413: nov. g. Andropogonear. (Leptochloa pectinata Kunth?) *Cf. Pterigostachyum Nees.*

Pterygota Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 32: nov. g. Sterculiear. (Sterculia alata Roxb.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 30 (25). — Endl. 1840. Gen. n. 5321. p. 995; 1841. Ench. p. 516. — Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7700. — R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. Pt. 3. p. 234. — Walp. 1846. Rep. V. p. 103.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 502: g. Sterculiacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616 (*Pterigota*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Triphacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.

Pteryxia „Nuttall mss.“ Torrey & Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 624: sect. Cymopteri. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4491 *d.* p. 1414; 1841. Ench. p. 379 (*Pterixia*). — Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5495. 4. — Walp. 1843. Rep. II. p. 418.

Ptichotis Dumort. vid. *Ptychotis Koch.*

Ptilachis Rafin. 1834 in litt. ad DC.: subg. Antennariae.
= Margaripes DC. (Pr. VI. p. 270.)

Ptilagrostis*) Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 447: nov. g. Stipacear. (Lasiagrostis mongholica Tr.)

Ptilanthelium Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 166: nov. g. Rhynchosporear. (Pt. Chauvinii.)

Ptilepida Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 261: novum nomen pro *Actinella Pers.* propositum.

Ptileris Rafin. ex Steud. Nomencl. II. p. 415.
= Neoceis Cass.

Ptilerpa Harvey 1858. Ner. bor. am. III. p. 16: sect. Caulerpae. (C. plumaris Ag.)
= Corradoria Trevis.

Ptilidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 60: trib. Jungermannear. Gen.: Ptilidium, Trichocolea.

Ptilidia Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 101; 1838. ibid. IV. p. XXV: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Trichocolea, Ptilidium.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1341; 1841. Ench. p. 28: trib. Jungermanniacear. Gen. ead.

Ptilidieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 23: div. Jungermanniacear. Gen.: Trichocolea, Ptilidium.
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 238: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Trichocolea, Polyotus, Sendtnera, Ptilidium. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549. Gen. ead. — Bayrh. 1849. Taun. p. 50.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 23: sect. Jungermanniear. foliosar. Gen. ut Rchb. et Sendtnera.

Ptilidium Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 101; 1838. III. p. 17; 1838. IV. p. XXV: g. Ptilidior. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. X.

*) πτίλον, ala.

Ptilidium Nees cont.
p. 618. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/14. p. 1341; 1841. Ench. p. 28.
Corda 1835 in Sturm Jungerm. p. 162: g. Jungermanniacear.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 92: g. Lejeunear.
Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 828: g. Ptilidiear. — Par. Nees 1845. Syn. Hepat. p. 249. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 23. — Bayrh. 1849. Taun. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Ptilidar.
Synon. Blepharozia Dumort.

Ptilimnium Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 258: nov. g. vel subg. ex typo Ammios capillacei. *Cf.* Seringe Bull. bot. p. 217, Linnaea VIII. Litt. p. 82 et Wittst. Etym. Handw. p. 739 (*Ptilinium*).
= Discopleura DC.

Ptilina Nuttall mss. 1838 test. Torr. & Gray.
= Hypobrichia Curt.

Ptilinium Wittst. vid. *Ptilimnium Rafin.*

Ptilium Pers. vid. *Petilium Linn.*

Ptilium Sulliv. 1856. Musc. Un. St. p. ... : sect. Hypni. (H. crista castrensis.)
= Cupressina C. Müll. pt.

Ptilocalyx Torrey & A. Gray 1857. Rep. bot. exp. capt. Pope p. 14: nov. g. Borraginear. (P. Greggii.) *Cf.* Flora 1858. p. 624 et Müll. Ann. bot. V. p. 538.

Ptilochaeta Nees 1842 in Mart. Flor. Bras. fasc. III. p. 147: nov. g. Fissistylar.
Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Rhynchosporear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 139.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.

Ptilochaeta Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. Nr. 1: nov. g. Sanguisorbear. (*Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 265 et Flora 1844. p. 120.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 655.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 562: g. Sanguisorbacear.

Ptilochaeta Jaub. & Spach 1852. Ill. pl. or. IV. p. 83: subg. Pentanematis. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 202.

Ptilocladia Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 52; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 170: nov. g. Ceramiear. (Pt. pulchra.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. 619.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 674. n. 448: g. Callithamniear.

Ptilocnema*) D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 33: nov. g. Orchidear. (Pt. bracteatum.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 727. n. 2999.
Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1570: g. Malaxidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
= Pholidota Lindl.

Ptilomeris Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 381: nov. g. Gaillardiear. Sect.: Ptilomeris, Ptilopsis.
Endl. 1842. Spl. II. p. 45. n. 2601/1: g. Euheleniear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Walp. 1843. Rep. II. p. 628. Sect.: Euptilomeris, Ptilopsis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Heleniear.

Ptilomeris Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 381: sect. Ptilomeridis.
= Euptilomeris Walp.

Ptiloncilema Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Graminear. (Nomen.) An Eutriana abyssinica R. Br.?
Steud. 1854. Glum. I. p. 201: g. Pappophorear.
= Melanocenchris Nees.

Ptilonella Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 385: nov. g. Galinsogear. (Blepharipappus scaber Hook.)
= Blepharipappus Hook.

Ptilonia Harv. 1847. Ner. Austr. p. 124.
J. Agdh. .... Sp. Alg. II. p. 773.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 235: g. Laurenciacear.

Ptilophora Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 25: nov. g. Algar. (Phyllophora spissa Suhr.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Euhalymeniear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 794. n. 537: g. Chaetangiear.

Ptilophora „Torr. & Gray mss." Hook. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 253: sect. Scorzonellae.
A. Gray 1849. Mem. Amer. Ac. IV. 1 (Flora 1850. II. p. 714): g. Scorzonerear.

Ptilophyllum Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 211: subg. Myriophylli.
DC. 1828. Pr. III. p. 69: sect. Myriophylli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4477 *b.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 704. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 530. — Endl. 1841. Spl. I. n. 6135 *c.* p. 1427; 1841. Ench. p. 640.
Rchb. 1841. Nom. p. 169. n. 6545: g. Myriophyllear.
Synon. Purshia Rafin.; Burshia Raf., Poir.; Hylas Big.

Ptilophyllum Morris 1841. Ann. and Mag. n. h. VII. p. 116: nov. g. Cycadear. foss.
= Zamites Brongn.

Ptilopsis Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 382: sect. Ptilomeridis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 628.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 177: sect. Hymenoxydis.

Ptilorachis Brongn. vid. *seq.*

Ptilorhachis Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 84: nov. g. Rhachiopteridear. (Pt. dubia.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 86 (*Ptilorachis*): g. Rachiopteridear.

Ptilosciadium Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 149: nov. g. Rhynchosporear. (Pt. Lindenii.)

Ptilostemon Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 200; 1817. Dict. v. 7. p. 94: nov. g. Carduacear. (Serratula chamaepeuce L.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 415 (*Ptilostemum*). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 144.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 312. 330; 1826. v. 44. p. 58; 1830. v. 60. p. 572: g. Lamyrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2328.

*) πτίλον, pluma; κνημή, pedunculus.

Ptilostemon Cassini cont.
Less. 1832. Syn. p. 5: g. Serratulear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 657: sect. Chamaepeuces. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2889 *a*. p. 478; 1841. Ench. p. 247.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12: g. Carduinear.

Ptilostemum Steud. vid. *praeced.*

Ptilostephium*) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 253: nov. g. Helianthear. (Pt. coronopifolium, etc.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 492. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 17; 1826. v. 44. p. 60: g. Heleniear. (Sejungitur 1826 Carphostephium.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2596. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 570. n. 2777; 1831. Gen. II. p. 630. n. 3135: g. Radiatar.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 265; 1830. v. 60. p. 575: g. Galinsogear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3115. Sect.: Carphostephium, Ptilostephium. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
DC. 1836. Pr. V. p. 678: g. Eugalinsogear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2621. p. 426; 1841. Ench. p. 240. Sect.: Carphostephium, Ptilostephium. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133).

Ptilostephus Jaubert & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 87: subg. Gailloniae. (Jaubertia Aucheri Guill.) — Simil. Walp. 1847. Rep. VI. p. 34.
Synon. Jaubertia Guill.

Ptilota**) Agardh 1817. Syn. Alg. p. XIX. 39; 1822. Spec. I. 2. p. 384 (Aphor. p. 110); 1824. Syst. Alg. p. XXXIII. 195: nov. g. Floridear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 333. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 368. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 402; 1841. Brit. Alg. p. 84. — Menegh. 1838. Cenni p. 40. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 15. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 162.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 38: g. Phycoidator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 382: sect. Gastridii.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 188: g. Hydrophytar. loculatar.
Leman 1826. Dict. v. 44. p. 64: g. Fucacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 344. n. 3409; 1831. Gen. II. p. 751. n. 3805: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 89. p. 8; 1841. Ench. p. 6.
Bonnem. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 69: g. Epidermear.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 491: g. Sphaerococcear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 35; 1842. Alg. medit. p. 66: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 36. n. $122/_{22}$. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 169. — Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 318. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 144. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. 620.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 721: g. Plocamiear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Thamnophorear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 100; 1843. Phyc. gener. p. 377; 1845. Phyc. germ. p. 289; 1849. Sp. Alg. p. 669. n. 440: g. Callithamniear. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 218.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Ceramear.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Ceramiacear. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 257.
Synon. Plumaria Stackh.

Ptilothrixia A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 274: sect. Asterideae. (Spec. novae.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 203.

Ptilothus Dumort. vid. *Ptilotus R. Brown.*

Ptilotrichum C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 64: nov. g. Alyssinear. (Alyssum canescens DC.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Endl. 1839. Gen. n. 4876. p. 868; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 143.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6956: g. Alyssear. genuinar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 655: g. Siliculosar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 278: sect. Konigae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.
Synon. Tetradenia Spach.

Ptilotus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 415. Ed. Nees p. 277: nov. g. Amaranthacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIV. 536. n. 1038. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 543. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 65. (Injungitur Trichinium.)
Mart. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 318: g. Amarantacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 249.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4376: g. Achyranthear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17 (*Ptilothus*): g. Amaranthear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 198. n. 1006: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 864.
Endl. 1837. Gen. n. 1964. p. 302; 1841. Ench. p. 185: g. Aërvear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231); 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 630. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6429. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 281. Sect.: Phaenostachys, Euptilotus. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1036.

Ptilurus*) D. Don 1830. Trans. XVI. 2. p. 218: nov. g. Trixidear. (Pt. daucifolius.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 173. — Par. Less.

*) *πτίλον*, pluma; *στέφανος*, corona.
**) *πτιλωτός*, alatus, plumosus.

*) *οὐρά*, cauda.

Ptilurus D. Don cont.
1832. Syn. p. 407. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 56. — Endl. 1838. Gen. n. 2958. p. 491; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (142). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3772. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Ptosimopappus*) Boiss. (Voy. bot. App. p. 739) 1856. Diagn. pl. nov. III. Ser. 2. Nr. 3. p. 61: g. Cynarear. (Centaurea arborea Webb, Webbiana Schultz, etc.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 930: g. Centaurear.

Ptycanthera**) Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 606: nov. g. Pergulariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Stapeliar.

Ptychanthoides Nees 1845. Syn. Hepat. p. 294: sect. Phragmicomae.

Ptychanthus***) Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 211 not.; 1845. Syn. Hepat. p. 289: nov. g. Jubulear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $472/_{11}$. p. 1341; 1841. Ench. p. 28.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Jubulidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 622: g. Jungermanniear.

Ptycheteropteris Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 60: sect. Heteropteridis includens Stenotorum Griseb. olim.

Ptychnocarpa Poir. vid. *seq.*

Ptychocarpa R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 170 (Verm. bot. Schr. II. p. 271); 1810. Prodr. I. p. 378. Ed. Nees p. 234: sect. Grevilleae. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 412. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 432 (*Ptychnocarpa*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 476. — Endl. 1838. Gen. n. 2143*b*. p. 341; 1841. Ench. p. 215. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 527. — Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2393. 2.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear.

Ptychocarpus Hilsenb. in Sieber Herb. Maurit. ed. I. nr. 50.
= Riedlea Vent.

Ptychocarya „R. Br." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 119: g. Sclerear. (Nomen.)

Ptychocentrum Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 240: subg. Rhynchosiae.
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Rhynchosiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5841.
Endl. 1841. Gen. n. 6692 *d*. p. 1300; 1841. Ench. p. 672: sect. Rhynchosiae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 790.

Ptychochilus Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 431: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 61. n. $1506/_1$. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179.
? = Tropidia Lindl.

Ptychodea Willd. mss.
= Sipanea Aubl.

Ptychodon „Klotzsch mss." Endl. 1840. Gen. n. 6162 *b*. p. 1203; 1841. Ench. p. 643: sect. Lafoensiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 113.
Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6663: g. Lagerströmiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lagerstromear.

Ptychogaster Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 23. t. 12. f. 90; 1842. Mycol. p. 88: nov. g. Aethalinor. (Pt. albus.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 343. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 253.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489 (*Ptycogaster*): g. Reticularieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 244: g. Sclerodermaceor.

Ptychohypnum Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 71: sect. Hypni.

Ptychomanes R. Hedw. 1800. Filic. Fasc. II: novum nomen pro *Hymenophyllo* propositum.

Ptychomeria Benth. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 14: nov. g. Dictyostegear. Sect.: Diplomeria, Aplomeria.

Ptychomitriaceae Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. III. p. III: fam. Muscor. Gen.: Ptychomitrium, Notarisia, Glyphomitrium.

Ptychomitrion Mont. 1849 vid. *seq.*

Ptychomitrium Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 19: nov. g. Orthotrichoidear. (Racomitrium polyphyllum.)
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 43; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401 (*Ptychomitrion*): g. Orthotrichear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 91 (*Ptycomitrium*). — Bayrh. 1849. Taun. p. 14.
Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. (fasc. II. III) III. p. III: g. Ptychomitriacear.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 173: g. Coscinodontear.
= Brachysteleum Rchb.

Ptychopetalum Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 376: nov. g. Olacacear., Olaci aff.
Walp. 1846. Rep. V. p. 138: g. Olacear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 12. 21. — Endl. 1850. Spl. V. p. 72. n. $5492/_1$.

Ptychophyllum Presl 1843. Hymenophyll. p. 120: nov. g. Hymenophylloidear. (Hym. plicatum Kaulf.)

Ptychophyllum A. Braun 1855. Ind. sem. h. Berol. App.: subg. Panici. *Cf.* Anders. in Müll. Ann. bot. VI. p. 944.

Ptychopteris Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 76: nov. g. Protopteridear. (Sigillaria macrodiscus Brongn.)

Ptychosema Benth. 1839 in Lindl. Veg. Swan-River p. XVI: nov. g. Isotropidi aff. (Pt. pusillum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Galegear.

Ptychosperma Labill. 1809. Mém. Inst. Année 1808. Pt. 1. p. 251 c. ic.: nov. g. Palmar. (Pt. gracilis.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 623. n. 1989; 1830. Gen. I. p. 448. n. 2215. (Polyandr. Trigyn.) — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 69. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136.

---

*) πτώσιμος, occisus.
**) „πτυχη, foris."
***) πτυχη, plica.

Ptychosperma Labill. cont.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 15: g. Arecinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1640: g. Arecacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56 (*Psychosperma*): g. Arecinear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 17. Sect.: Seaforthia, Orthostichanthi, Drymophloeus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
= Seaforthia R. Brown?

Ptychostigma Hochstett. 1844. Flora I. p. 23: nov. g. Rubiacear. (Galiniera coffeoides Del.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
= Galiniera Delile.

Ptychostomum Hornschuch 1822. Syll. Ratisb. II. p. 62: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 70. — Par. Schwägr. 1823. Suppl. II. 1. p. 56. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 203. (odontostomor.)
Brid. 1826. Bryol. I. p. 597: g. Acrocarpor. (peristomor.) — Par. Hüb. 1833. Musc. germ. p. 492. (diploperistomor.)
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 727: g. Bryoideor. — Par. Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV. — Genth 1836. Nass. I. p. 248.
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 639: g. Bryaceor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Bryoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 539. p. 52; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 20.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 917: g. Calyptrobryor.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 88: sect. Bryi. — Par. C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 242. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 201.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Bryear.

Ptychotis*) Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 124; 1836. Syn. p. 284. Ed. II. p. 312: nov. g. Amminear. (Seseli saxifragum L.) — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 397. — Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3723; 1832. Fl. exc. p. 474; 1837. Hdb. p. 219 (genuinar.); 1841. Nom. p. 140. n. 5384. Sect. (1841) fere ut DC. — Link 1829. Hdb. I. p. 364. — DC. 1830. Pr. IV. p. 107. Sect.: Euptychotis, Trachyspermum, Heteroptycha. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 284. Sect. eaed. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 368. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4400. p. 770; 1841. Ench. p. 378. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 942. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Brongn. 1843. En. genr. p. 111. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 244. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 733. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 95 (*Ptycothis*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 737.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 23. 418: g. Umbellatar.

Ptychotis Koch cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34 (*Ptichotis*): g. Pimpinellear.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.
Synon. Ammoides Adans.; Bunium Lag.

Ptycnostigma Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 92. 202: sect. Droserae. (D. cistiflora L., pauciflora Banks.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 72.

Ptycogaster Léveillé vid. *Ptychogaster Corda.*

Ptycomitrium Fries vid. *Ptychomitrium Fürnr.*

Ptycothis A. Juss. vid. *Ptychotis Koch.*

Ptyxanthus*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 254: sect. Argyreiae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 585.
= Argyreiae Lour. pars.

Ptyxostoma Vahl 1810 in Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 96: nov. g. plant. (P. monogyna, myrtoides; Stilbe Lam. Ill. t. 856. f. 4.)
= Berardia Brongn.?

Pubeta Linn. 1775. Amoen. acad. VIII. Ed. 1785. p. 264: nov. g. Dioeciae non descriptum.
= Duroia Linn. f.

Puccinellia Parlatore 1850. Fl. ital. I. p. 366: nov. g. Graminear. (Poa distans L.)
= Atropis Rupr.

Puccinia**) Micheli 1728. Nov. pl. gen. p. 213. t. 92: g. pl. class. XVII. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 72 et Unger 1833. Exanth. Pfl. (Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 213.)
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 16: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 8: g. Fungor. — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 547. — Gmel. 1791. Syst. p. 1462. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 23. 281.
Pers. 1797. Tent. p. 38: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XV. 225: g. Gymnospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 356. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 50.
DC. 1805. Franç. II. p. 218; 1815. V. p. 54: g. Angiocarpor.
Linn. 1809. Berl. Mag. III. p. 7: g. Epiphytar.
Strauss 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 81: sect. Uredinis.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 29: g. Mucedinum entophytar.
Nees 1816. Syst. p. 17; 1817. Überbl. p. 4: g. Coniomycor. entophytor.
Mart. 1817. Erlang. p. 322: g. Coniomycetum (elementarium). — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 566. n. 3587 (liberorum). — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 88; 1842. Pl. cell. Cub. p. 293.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Hypodermior. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 196; 1832. Syst. III. 2. p. 509. — Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 14.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 543: g. Coccomidear.

*) πτύξ, plica; οὖς, auris.

*) Nomen a corolla plicata.
**) Dicat. Thom. Puccini, prof. Florent.

Puccinia Micheli cont.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Intestinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 521: g. Uredinear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75.
Link 1825. Spec. II. p. 67: g. Gymnomycetum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Uredineor. — Par. Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 68.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1038: g. Pulveraceor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 773. n. 3975: g. Atrichor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 218: g. Sporomycetum hyposporor.
Endl. 1836. Gen. n. 185. p. 17; 1841. Ench. p. 13: g. Entophytor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 6; 1838. II. p. 4; 1839. III. p. 4; 1840. IV. p. 9; 1842. V. p. 4. 50; 1842. Mycol. p. 15: g. Phragmidiacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Fl. III. H. 25. 26. p. 5. t. 3; 1851. Linnaea XXIV. p. 103. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 3.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 16: g. Phragmidiaceor. Sect.: Bullaria, Puccinia. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 21. — Bonord. 1851. Hdb. p. 47. — Tul. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 182. *Cf.* Flora 1855. p. 743.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Pucciniaeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 513: g. Puccinieor. Subg.: Dicaeoma.
Math. 1853. Belg. II. p. 430: g. Aecidinear.
Synon. Dicaeoma Nees; Triphragmium Link?; Solenodonta Cast.?

Pucciniaei Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 42: subordo Coniomycetum. Gen.: Xenodochus, Aregma, Triphragmium, Puccinia, Gymnosporangium, Podisoma.

Pucciniastri Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: div. Epiphytor. Gen.: Podisoma, Gymnosporangium.

Pucciniei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 512: subdiv. Uredineor. Gen.: Triphragmium, Puccinia, Solenodonta.
Tulasne 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 171: div. Uredineor. Gen.: Podisoma, Gymnosporangium.

Pucciniola Marchand 1829. Bijdr. tot nat. Wet. IV. p. 263: nov. g. Uredinum. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 185.

Pucedanum Hill vid. *Peucedanum Tourn.*

Pueraria*) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 97: nov. g. Leguminosar. (Hedysarum tuberosum Roxb.) — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 90. — Spreng. 1827. Cur. post. p. 263; 1831. Gen. II. p. 579. n. 2839.
DC. 1825. Pr. II. p. 240: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 220.

*) Dicat. cl. Puerari.

Pueraria DC. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3963: g. Glycinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Clitoriear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 205. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62). — Endl. 1841. Gen. n. 6632. p. 1288; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5788. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Pugionium Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 291. t. 142: nov. g. pro Buniade cornuta L. constitutum.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 115: g. Myagroidear.
Willd. 1800. Sp. III. p. 416. n. 1218: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 146.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 510: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 474. — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 160. — Leman 1826. Dict. v. 44. p. 92. — Ledeb. 1846. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 3. p. 117. t. 1. *Cf.* Flora 1847. II. p. 725.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 480: g. Siliculosar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 184. n. 1542. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 723. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 678.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 236; 1821. Syst. II. p. 424; 1824. Pr. I. p. 185: g. Euclidiear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV; 1837. Hdb. p. 258; 1841. Nom. p. 178. n. 6887. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 149. 199 (*Pugionum*). — Meisn. 1837. Gen. p. 12 (12). — Endl. 1839. Gen. n. 4898. p. 873; 1841. Ench. p. 449; 1850. Spl. V. p. 36. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 168. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 38.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 851. n. 2260; 1831. Gen. II. p. 512. n. 2507: g. Synclistar.
Rchb. 1828. Consp. p. 181. n. 4712: g. Cakilear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 326: g. Carcerulosar.
Bunge 1842. Linnaea XVI. p. 109: g. Chenopodear. Char. emend.
Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. 1910: g. Atriplicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 121: g. Eurotiear. *Cf.* A. DC. ibid. in nota.

Pugionum G. Don vid. *praeced.*

Pukateria*) Raoul 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 120: nov. g. inter Araliaceas et Corneas ambiguum. (P. littoralis.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 927.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 783: g. Cornacear. = Griselinia Forst.

Pulchia Arrab. ex Steud. Nomencl. II. p. 416: g. Octandr. Monogyn. (P. curiosa.) Quid?

*) *Poukater* indigenar.

Pulegium „C. Bauh." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 224. Ed. Hall. 1745. p. 230: g. pl. class. IX.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 659: g. Gymnotetraspermar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 193: g. Labiatar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 367.

DC. 1805. Franç. III. p. 537: sect. Menthae. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1022. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 43. — Koch 1837. Syn. p. 553. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 107. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 175. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 653. — Math. 1853. Belg. I. p. 417.

Opiz 1824. Flora I. p. 322: g. a Mentha distinctum.

Fres. 1828. Syll. Ratisb. II. p. 238.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Menthear.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 311: g. Satureinar.

Koch 1844. Syn. ed. II. p. 636: g. Menthoidear.

Pulicaria Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 461. t. 173: nov. g. Radiatar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 225. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 11. 328.

Mönch 1794. Meth. p. 602: g. Petalostemonis.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 539: g. Corymbiferar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 462. — Link 1822. En. II. p. 336. — Math. 1853. Belg. I. p. 278.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 483.

Presl 1822. Delic. Prag. I: g. Inulacear.

Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1503: sect. Inulae.

Link 1829. Hdb. I. p. 737: g. Asteroidear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Inulear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 361. Ed. II. p. 395. — Kunth 1838. Berol. I. p. 334. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3386. (genuinar.) Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 43. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 192. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 178.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 238: g. Asterear.

DC. 1836. Pr. V. p. 477: g. Euinulear. Sect.: Pulicaria, Tubilium. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2434. p. 395; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 509. — Schultz Bip. . . . in Webb Canar. II. p. 221. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 144. — Jaub. & Spach .... Ill. pl. or. IV. p. 65. Subgen.: Polychaeta, Decachaeta, Platychaeta. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 203.

Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954: g. Eupulicariear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 3: g. Asteracear.

Pulicaria Cassini 1822. Dict. v. 23. p. 565; 1826. v. 44. p. 93; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. restrict. Inulear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2461. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Less. 1832. Syn. p. 197. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 219. (verar.)

DC. 1836. Pr. V. p. 478: sect. Pulicariae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2434 *a.* p. 395; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3386. 1.

Pulicaria Cassini cont.

Pulicarieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 954; subdiv. Euinulear. Sect.: Eupulicarieae, Jasonieae, Printzieae.

Pulina Adans. 1763. Fam. II. p. 3: g. Byssor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 97.

Scop. 1777. Intr. p. 60: g. Crustacear. = Pulveraria Achar.

Pulmonarea „Koch" Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 6: sect. Hieracii. (*Cf. Pulmonariae* sect. Hieracii Gray.) — Par. Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 365. — Griseb. 1853. Abh. Gött. Ges. f. 1852. V. p. 98.

Fries 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 389; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 534; 1850. Nov. Act. Upsal. XIV. p. 86: series Hieracii. *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 804 (*Pulmonaria*). — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 996.

Pulmonaria Tourn. 1700. Inst. p. 136. t. 55: g. pl. class. II.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 9. Ed. Hall. 1745. p. 9: g. pl. class. I.

Linn. 1737. Gen. p. 37. n. 104; 1737. Cliff. p. 44; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 135; 1759. Syst. ed. X. p. 914. n. 169; 1762. Sp. ed. II. p. 194; 1764. Gen. ed. VI. p. 75. n. 184; 1767. Syst. ed. XII. p. 146: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 125. — Murr. 1774. Syst. p. 158; 1784. Syst. p. 187. — Reich. 1778. Gen. p. 77. n. 196. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 100. n. 244. — Gmel. 1791. Syst. p. 319. — Pers. 1797. Syst. p. 193; 1805. Ench. I. p. 160. n. 355. — Willd. 1797. Sp. I. p. 768. n. 279; 1809. En. p. 182.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 516: g. Asperifoliar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 159. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Schrank 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 94. (Char. emend.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 115. — Lehm. 1818. Asperif. p. 273. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. VII. 53. n. 629. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 115. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 547. n. 583; 1830. Gen. I. p. 124. n. 613. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 2. 33. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 179. — Bartl. 1830. Ord. p. 197. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 598.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 194. n. 801: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 420.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 130. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 389. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 301. — DC. 1805. Franç. III. p. 626; 1815. V. p. 420. — Hedw. 1806. Gen. p. 90. n. 408. — Link 1821. En. I. p. 169; 1829. Hdb. I. p. 580. — Lois. 1826. Dict. v. 44. p. 98. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 84. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 635.

Adans. 1763. Fam. II. p. 178: g. Borraginum.

Pulmonaria Tourn. cont.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 73: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 122: g. Monopetalar. Sejungitur Pneumaria.
Neck. 1790. El. I. p. 288. n. 455: g. Trachytophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 449: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2947; 1831. Fl. exc. p. 337; 1841. Nom. p. 111. n. 4319.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 353: g. Boraginear. (Distinguitur Mertensia.) — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 42.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 447: g. Nuculatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Pulmonariar.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Symphytear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 317.
Koch 1837. Syn. p. 503. Ed. II. p. 578: g. Lithospermear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 280 (190). — DC. 1846. Pr. X. p. 92. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 136. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 526.
Endl. 1839. Gen. n. 3759. p. 647; 1841. Ench. p. 320: g. Anchusear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 56.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 39: g. Asperifoliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
Synon. Bessera Schult.; Platynema Schrad.
Pulmonaria Hoffm. 1790. Pl. lich. p. ... t. 1. f. 2. t. 4. f. 2: nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 101.
Gmel. 1791. Syst. p. 1366: sect. Lichenis. (*Pulmonariae.*)
= Sticta Schreb.
Pulmonaria „Fries" Bot. Zeit. 1849. p. 804: vid. *Pulmonarea Fries.*
Pulmonariae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 422: sect. Hieracii. (H. murorum, sabaudum, etc.) *Cf. Pulmonarea Fries.*
Pulmonariae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: subtrib. Lithospermear. Gen.: Lithospermum, Colsmannia, Batschia, Lycopsis, Pulmonaria, Purchia, Molkea, Onosma, Onosmidium.
Pulsatilla*) Tourn. 1700. Inst. p. 248. t. 148: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 147. Ed. Hall. 1745. p. 161: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 163. n. 458; 1737. Fl. lapp. p. 181. Ed. Smith p. 189; 1737. Cliff. p. 223; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 256. n. 549; 1745. Fl. suec. p. 163; 1748. Ups. p. 155: g. Polyandr. Polygyn. (serius Anemonae insertum.) — Par. GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 263. 293. — Willd. 1809. En. p. 580.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 105.

*) Bauhino auctore sic nominatur, quod seminum tremuli pappi, levissimo flatu, huc atque illuc agitentur.

Pulsatilla Tourn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Multisiliquar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 460: g. Ranunculor.
Scop. 1777. Intr. p. 257: g. Polycarpiar.
Neck. 1790. El. II. p. 314. n. 1091: g. Acascophytor.
Pers. 1807. Ench. II. p. 96: sect. Anemones. — Par. MBieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 18. — DC. 1818. Syst. I. p. 189; 1824. Pr. I. p. 16. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 717. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 481. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 949. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 15. — Koch 1836. Syn. p. 7. Ed. II. p. 7. — Kunth 1838. Berol. I. p. 7. — Endl. 1839. Gen. n. 4773 *a*. p. 845; 1841. Ench. p. 434. Subsect.: Campanaria, Preonanthus. — Pritz. 1841. Linnaea XV. p. 565. — Walp. 1842. Rep. I. p. 14. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 10.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 732; 1825. Syst. II. p. 663. n. 2044; 1830. Gen. I. p. 462. n. 2276: g. Ranunculear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 725: g. Anemonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4945; 1832. Fl. exc. p. 732. Sect.: Preonanthus, Pulsatilla. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 19. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 297.
Link 1822. En. II. p. 88: g. Ranunculacear. — Par. C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 367. Sect.: Eu-Pulsatilla.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7232: g. Pulsatillear. Sect. ut 1828.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 253: g. Anemoninear. Sect. ut Rchb.
Pulsatilla Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4945 *b*; 1832. Fl. exc. p. 732; 1841. Nom. p. 190. n. 7232. 2: sect. Pulsatillae. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 255.
= Eupulsatilla C. A. Meyer.
Pulsatilleae Rchb. 1837. Handb. p. 276: subsect. Anemonear. genuinar. Gen.: Callianthemum, Anemone, Hepatica, Pulsatilla. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 190. Gen. ead. excluso Callianthemo.
Pulsatilloides DC. 1818. Syst. I. p. 195; 1824. Prodr. I. p. 18: sect. Anemones. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 17. — Pritz. 1841. Linnaea XV. p. 611. — Walp. 1842. Rep. I. p. 19.
Endl. 1839. Gen. n. 4773 *b* γ. p. 845; 1841. Ench. p. 434: subsect. Anemanthi.
Synon. Asteranemia Rchb.
Pultaenea Brongn. vid. *seq.*
Pultenaea*) Smith 1793. Spec. Bot. N. Holl. p. 35. t. 12; .... Linn. Trans. IX. p. 245.
Willd. 1799. Sp. II. p. 506. n. 807; 1809. En. p. 438: g. Decandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 453. n. 1006.
Smith 1805 in König Ann. of bot. I. p. 502: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805.

*) Dicat. Dr. Will. Pulteney.

Pultenaea Smith cont.
Expos. II. p. 212 (*Pultenea*). — Hedw. 1806. Gen. p. 294. n. 1169. — R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 17. (Verm. bot. Schr. II. p. 469.) — Link 1821. En. I. p. 404. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 350. n. 1654; 1830. Gen. I. p. 367. n. 1851. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 102. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1507.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 745: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 110. Sect.: Hymenota, Phyllota. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4061. Sect. eaed. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 122. Sect. eaed. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 179. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Hoffmsg. . . . . Verz. p. 191 (*Pulteneja*).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 35; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 81: g. Pultenaear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6446. p. 1258; 1841. Ench. p. 667 (exclusa sect. Phyllota). — Walp. 1842. Rep. I. p. 574; 1843. II. p. 832; 1846. V. p. 432. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 73. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 457.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5940: g. Pultenaeear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 127 (*Pultaenea*): g. Podalyriear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 636: g. Papilionacear.

Pultenaea Andrews . . . . Bot. Repos. t. 320.
= Podolobium R. Brown.

Pultenaeae Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 80; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 73: subtrib. Podalyriear. Gen.: Burtonia, Jacksonia, Daviesia, Viminaria, Sphaerolobium, Roëa, Phyllota, Aotus, Dillwynia, Eutaxia, Gastrolobium, Euchilus, Spadostyles, Pultenaea, Sclerothamnus. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1256; 1841. Ench. p. 667 (*Pulteneae*). Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 553 (*Pulteneae*). Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 269. Gen. ead.

Pultenaeeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 152: sect. Podaliriear. Gen. Pultenaear. Benth. et Pteronema.

Pultenea St. Hilaire vid. *Pultenaea Smith.*

Pulteneae Endl., Lindl. vid. *Pultenaeae Benth.*

Pulteneja Hoffmsg. vid. *Pultenaea Smith.*

Pulveracei Wahlenb. 1826. Fl. Succ. II. p. 920: div. Fungor. Gen.: Aecidium, Puccinia, Stilbospora, Melanconium, Sporidesmium, Fusarium, Aegerita, Tubercularia, Erysibe.

Pulveraria Willd. 1787. Fl. berol. p. 10.
= Patellaria Pers.

Pulveraria*) Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXIX. 1: nov. g. Stereothalamor. *Cf.* Leman 1826. Dict. p. 105.
Flörke 1807. Berl. Mag. I. p. 6. Char. emend.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Pulverariar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 350.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 328: g. Leprariar.
Endl. 1836. Gen. n. 126. p. 12; 1841. Ench. p. 9: g. Pulverariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 13. n. 503: g. Lprariacear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Pulveraridar.
Bayrh. 1849. Taun. p. 100: g. Anamorphosium.
Synon. Pulina Adans; Lepraria Achar.; Phytoconis Bory pt.; Leptuberia Rafin.

Pulverariae Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: cohors Fungor. Gen. Pulveraria, Conisporium, Fusidium.
Rchb. 1828. Consp. p. 19 (1832. Fl. exc. p. L); 1837. Hdb. p. 131: fam. Blastopsorar. Gen.: Pulveraria.

Pulveraridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: sect. Coniothalamear. Gen. Pulverariear. Endl.

Pulverarieae Endl. 1836. Gen. p. 11; 1841. Ench. p. 9: subordo Coniothalamor. Gen.: Arthronia, Incillaria, Arthronaria, Pulveraria.

Pulvereae Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 417: trib. Orchidear. Gen.: Calcearia, Zosterostylis, Thelymitra, Chlorosa, Epiphanes, Vanilla, Apostasia.

Pulvinaria Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Sphaeriar.? An subg. Sphaeriae? (Sphaeria concentrica P., sambucina P., cohaerens P., alnea Fr., striaeformis, decorticata, quercina, olivacea, fimbriata P.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 106.
Synon. Creopus Link, Bail?

Pulvinaria Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 272: nov. g. Sphaeriaceor. (*Hypocrea et Hypoxylon Fr.*)

Pumilea*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 188: nov. g. Pentandr. Triggn.
= Turnera Plum.

Pumilio Rchb. 1832. Fl. exc. p. 822: sect. Silenes. (S. dinarica Spr., pumilio Wulf., Elisabethae Jan.)
= Nanosilene Otth.

Pumilo Schlechtend. 1848. Linnaea XXI. p. 448: nov. g. Compositar. (P. argyrolepis.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 905 (dubiae affinitatis).
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 487: g. Angianthear.
Synon. Actinopappus Hook. f.

Punctaria Greville 1830. Alg. brit. p. 52. (Syn. p. XLII).
J. Agdh. 1836. Novit. p. 14.
Menegh. 1838. Cenni p. 42; 1842. Alg. ital. p. 172: g. Dictyotear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 763. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 41; 1848. Sp. Fuc. p. 72. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 25. n. 97. — Fries 1846. Summ.

*) „Nomen a pulvere et area."

*) Idem quod *pumila* s. *pumilio*.

Punctaria Greville cont.
veg. Scand. I. p. 123. — Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 350. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 183. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Zanard. 1843. Classif. p. 10: g. Asperococcear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 424: g. Punctariear. (*Synon. Phycolapathum et Phyllitis Kütz.*)
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 114: g. Dictyotacear.
Synon. Diplostromium pt. et Phycolapathum Kütz. (J. Agdh.)

Punctarieae Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 424: subtrib. Dictyotear. Gen.: Diplostromium, Soranthera, Punctaria.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 238: fam. Phaeosporear. Gen.: Asperococcus.

Puneera Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 179: nov. g. Witheringear.

Puneeria**) Stocks 1849. Journ. Bomb. Br. As. Soc. Nr. 12; 1850 in Wight Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 17. t. 1616: g. Solanear. (P. coagulans.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 162.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 685: sect. Withaniae.

Punica*) Tourn. 1700. Inst. p. 636. t. 407: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 152. Ed. Hall. 1745. p. 165: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 142. n. 400; 1737. Cliff. p. 184; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 122; 1753. Sp. I. p. 472; 1759. Syst. ed. X. p. 1056. n. 544; 1762. Sp. ed. II. p. 676; 1764. Gen. ed. VI. p. 248. n. 618; 1767. Syst. ed. XII. p. 341: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 341. — Murr. 1774. Syst. p. 384; 1784. Syst. p. 462. — Reich. 1778. Gen. p. 254. n. 673. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 335. n. 847. — Lour. 1790. Coch. I. p. 313. — Pers. 1797. Syst. p. 495. — Willd. 1799. Sp. II. p. 981. n. 980; 1809. En. p. 516. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 293. 301. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 499.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 275. n. 1129: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 679.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 88. — Juss. 1789. Gen. p. 325. — DC. 1805. Franç. IV. p. 426.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 86: g. Prunos et Myrtos conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 219: g. Calycanthemar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 183. t. 38. f. 1 (Granatum).
Neck. 1790. El. II. p. 73. n. 723: g. Sarcodiphytor.

*) Vox barbara *puneer*, caseus.
**) Mala punica, quae e Phoenicia allata sunt.

Punica Tourn. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 793: g. Polyandr. Monogyn.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 328: g. Myrtoidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 13.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 164: g. Myrtear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 850; 1825. Syst. II. p. 490. n. 1828. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 359 (*Grenadier*). — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738.
Pers. 1807. Ench. II. p. 33. n. 1212: g. Myrtacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 31. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1096. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 327. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 109. — Orb. 1849. Dict. VI. p. 320 (*Grenadier*).
Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 114: g. Calycocarpar.
Don 1826. Edinb. n. phil. journ. Jul. p. 134: g. Granatear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 3. — Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4579; 1832. Fl. exc. p. 638; 1837. Hdb. p. 247; 1841. Nom. p. 172. n. 6673. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 407. n. 2035. — Bartl. 1830. Ord. p. 325. — Link 1831. Hdb. II. p. 69. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 653. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 288. — Koch 1836. Syn. p. 238. Ed. II. p. 263. — Meisn. 1837. Gen. p. 107 (75). — Endl. 1840. Gen. n. 6340. p. 1236; 1841. Ench. p. 655. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 82. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 124. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 104. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 575. — Miq. 1855. Ind. bot. I. p. 494. — Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 464; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 513.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear.
Synon. Balaustia Bauh.; Granata malus Burm.

Punicella Turczan. 1852. Bull. Ac. Pet. X. p. 333: nov. g. Bäckeacear. (P. carinata.) = Balaustium Hook. (Turcz. 1853. Bull. Ac. Pet. XXVI. Nr. 1. p. 287.)

Punophila Schult. vid. *Bunophila Willd.*

Pupal Adans. 1763. Fam. II. p. 268: g. Amaranthor.
= Pupalia Juss.

Pupalea „Mart." Flora 1827. I. p. 110: vid. *Pupalia Mart.*

Pupalia Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 132; 1806. ibid. VII. p. 481: nov. g. Amaranthacear. (Achyranthes lappacea.)
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 331: g. Desmochaetear. Sect.: Desmochaeta, Orthochaeta. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1045.
Synon. Pupal-Valli Rheede; Pupal Adans.; Desmochaeta DC.

Pupalia Martius 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 321; 1826. Nov. gen. II. p. 60. t. 156. 158: nov. g. Amarantacear. (*Desmochaeta Kunth.* — *Cf.* Flora 1827. I. p. 110: *Pupalea*). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 275.

Pupalia Martius cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4372: g. Achyranthear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 199. n. 1011: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 866.
Endl. 1837. Gen. n. 1971. p. 303; 1841. Ench. p. 185: g. Desmochaetear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6417.
= Cyathula Lour.

Puralia „Hamilt." Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5577: inter genera vix cognita.

Purchia Dumort. vid. *Purshia Spreng.*

Purdiaea*) Planchon 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 123; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 250: nov. g. Cyrillear. (P. nutans.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 422.
Synon. Costaea A. Rich.

Purgosea**) Haworth 1828. Phil. Mag. III. p. 184: g. Pentandr. Pentagyn. (antea *Turgosea*, q. conf.)
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 103 (*Purgosia*): g. Crassulear.
= Pyrgosea Sweet.

Purgosia G. Don vid. *praeced.*

Purkingia Lindl. vid. *seq.*

Purkinjia***) Presl 1833. Symb. bot. II. p. 17. t. 64: nov. g. Ardisiacear. (P. nodosa.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 125. n. 4861: g. Ardisiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4226. p. 737; 1841. Ench. p. 359. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — Meisn. 1839. Gen. p. 253 (162)? — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 140 (dubiosum). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648 (*Purkingia*).
Endl. 1842. Spl. II. p. 67. n. 4226: g. Embeliear. dubium.

Purpurella Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 301: nov. g. Lasiandralium. (Chaetogastra muricata DC., etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 570.

Pursaetha „Linn." Auct. in synon. Entadae: vid. *Pusaetha Linn.*

Purshia†) Rafin. 1811. Nouv. genr. (Journ. Phys. LXXXIX. p. 257.) *Cf. Burshia Rafin.* 1808.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 32. 480. n. 585: g. Tetrandr. Monogyn.
= Ptilophyllum Nutt.

Purshia DC. 1816. Linn. Trans. XII. p. 157: nov. g. Rosacear. (Tigarea tridentata Pursh.) *Cf.* Isis 1829. p. 502.
DC. 1825. Pr. II. p. 541: g. Spiraeacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Bartl. 1830. Ord. p. 404. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 517. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 170. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 429.
Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 225: g. Pomacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4454: g. Spiraeear.

*) Dicat. inventori Purdie.
**) πύργος, turris.
***) Dicat. Joh. Evang. Purkinje, prof. Vratislav.
†) Dicat. Frid. Pursh, peregrinatori botanico.

Purshia DC. cont.
Meisn. 1837. Gen. p. 103 (73): g. Ulmariear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 428: g. Cercocarpear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6380. p. 1245; 1841. Ench. p. 659. — Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6483.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.
Synon. Tigarea Pursh; Kunzia Spreng.

Purshia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 450: g. Echiear., pro *Onosmodio Rich.* propositum.
Lehm. 1818. Asperif. II. p. 382: g. Asperifoliar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 502. 548. n. 584; 1830. Gen. I. p. 124. n. 614. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 598.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24 (*Purchia*): g. Pulmonariar.
= Onosmodium Rich.

Purshia Dennst. 1818. Schl. z. Ht. Malab. p. 35: nov. g. plant. (*Corosinam Rheede* IX. t. 68.)
= Centranthera R. Brown.

Puruma St. Hilaire vid. *Pourouma Aubl.*

Pusaetha Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 236. n. 644 in Append. (*Puswael Herm.* zeyl. 44.)
= Entada Adans.

Puschkinia*) Adams 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 164: nov. g. Hexandr. Monogyn. (P. scilloides.) *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. p. 37. — Par. MBieb. 1808. Taur. cauc. I. p. 277.
Link 1821. En. I. p. 328: g. Liliacear.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 115: g. Narcissear.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1371; 1841. Nom. p. 49. n. 1790: g. Scillear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Meisn. 1842. Gen. p. 400 (303). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXVII. 554: g. Asphodelear.
Endl. 1837. Gen. n. 1135. p. 146; 1841. Ench. p. 84: g. Hyacinthear. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 337. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 314. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 161.
Synon. Adamsia Willd.; Strangweja Bertol.?; Foxia Parlat.?

Pussac Endl. 1847 vid. *seq.*

Pussar Endl. 1837. Gen. n. 1868 *b.* p. 281; 1841. Ench. p. 168; 1847. Spl. IV. p. 36 (*Pussac*): sect. Artocarpi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2533. 2 (*Pussaria*).

Pussaria Rchb. vid. *praeced.*

Pustularia Roussel 1806. Fl. Calvad.: nov. g. a Sphaeria sejunctum. *Cf.* Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 143 (*Pustullaria*).
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 270.
= Sphaeria Hall.?

Pustullaria Desvaux vid. *praeced.*

Putaminea Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 31 plant. Gen.: Capparis, Breynia, Morisona, Crateva, Marcgravia.

*) Dicat. comiti Apolloni de Mussin-Puschkin.

Putamineae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 25 plant. Gen.: Cleome, Crataeva, Morisona, Capparis, Crescentia?, Marcgravia? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 376. Gen. ead. et Tanaecium, Possira.

Puteria St. Hil. vid. *Pouteria Aubl.*

Putoria Pers. 1805. Ench. I. p. 524: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Asperula calabrica L.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 118. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 65. n. 310.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Spermacoccear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 160: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 577. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 634. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 74. n. 2758. — Endl. 1838. Gen. n. 3110. p. 525; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (119). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 169: g. Rubiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Putorieae (*Putoriées*) A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 156: div. Spermacocear. Gen.: Ernodea, Cuncea, Hydrophilax, Scyphiphora, Putoria, Plocama, Serissa, Machaonia.
DC. 1830. Pr. IV. p. 575: subtrib. Spermacocear. Gen. ead. exclusa Machaonia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 633. Gen. ut DC. — Endl. 1838. Gen. p. 525; 1841. Ench. p. 271. Gen. ead. et Wiegmannia. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (119). Gen. ut Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48. Gen. ex DC.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: sect. Spermacocear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 74. Gen. ut Endl.

Putranjiva*) Wallich 1831. Catal. n. 6814 (Royle Himal. t. 100): g. Myriceis aff.
Endl. 1837. Gen. n. 1894. p. 287; 1841. Ench. p. 174: g. Putranjivear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258). — Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2458.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Urticeis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282: g. Buxear.
Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 252: g. Phyllanthear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 641: g. Phyllanthidear.
Synon. Pongolam Rheede.

Putranjiveae Endl. 1837. Gen. p. 287: fam. Antidesmeis aff. Gen.: Putranjiva, Nageja. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 174. Excluditur Nageja.
Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258): ordo Juliflorar. Gen. ut Endl. 1837.
Rchb. 1841. Nom. p. 65: subdiv. Myricear. Gen. ead.

*) *Pootra jeeva* Sanscr.

Putrescinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69: stirps Pollinaciae. Ordines: Tectigrania, Nudigrania. *Cf.* Leveillé 1849 in Orb. Dict. X. p. 642.

Putterlickia*) Endl. 1840. Gen. n. 5674. p. 1086; 1841. Ench. p. 574: nov. g. Evonymear. (Celastrus pyracanthus L.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7881. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 348.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 88: g. Celastrinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588: g. Euonymear.

Putzeysia**) Klotzsch 1855. Begon. p. 254: nov. g. Isopterygear.

Putzeysia Planch. & Lindl. . . . . *Cf.* Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 242.

Puya Molina 1782. Saggio p. 162 (Chile p. 176): nov. g. plant.
Juss. 1789. Gen. p. 447: g. Bromeliar.
Gmel. 1791. Syst. p. 553: g. Hexandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 123: g. Bromeliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 218. n. 889. — Juss. 1817. Dict. v. 5. spl. p. 83. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXIX. 1233. n. 1479. — Lindl. 1840. Bot. Regist. t. 11.
Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298): g. Tillandsiear.
Beer 1857. Bromel. p. 22. 141: g. Puyar.
Synon. Renealmia Feuill.; Pourretia Ruiz & Pav.; Achupalla Humb.; Pourettia Endl.

Puyae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 9. 22: div. Lepidanthear. Gen.: Puya.

Pycarda Lessing vid. *Pyrarda Cass.*

Pychnanthemum G. Don, Dietr. vid. *Pycnanthemum Michx.*

Pychnobotrys G. Don, Dietr. vid. *Pycnobotrys Benth.*

Pychnonepeta G. Don vid. *Pycnonepeta Benth.*

Pychnophyllum Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 114: nov. g. Nöggerathiear. (Flabellaria borassifolia Sternb.)

Pychnosphace G. Don vid. *Pycnosphace Benth.*

Pychnostachys G. Don, Dietr. vid. *Pycnostachys Hook.*

Pychnothymus G. Don vid. *Pycnothymus Benth.*

Pycnanthemon Spreng. vid. *Pycnanthemum Michx.*

Pycnanthemum***) Michx. 1803. Fl. bor. Am. II. p. 7. t. 33. 34: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (Nepeta virginica L.) — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 32. — Elliott 1821. Sketch II. p. 79.
Pers. 1807. Ench. II. p. 128. n. 1400: g. Labiatar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 718. n. 2083; 1831. Gen. II. p. 471. n. 2320 (*Pycnanthemon*). — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 119. (Duce Pers. injungitur Brachystemum.)

*) Dicat. A. Putterlick, botanico Vindobou.
**) Dicat. Jul. Putzeys, Bruxellensi.
***) πυκνός, densus.

Pycnanthemum Michx. cont.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 438: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2860. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.
Benth. 1834. Labiat. p. 326: g. Satureinear. Sect.: Tullia, Brachystemum. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 667. 762 (*Pychnanthemum*). Sect.: Tullia, Brachystemon. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. (restrict.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 68. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 407 (*Pychnanthemum*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 104. n. 4060: g. Origanear. (genuinar.) Sect. (1841): Pycnanthemum, Brachystemum. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3605. p. 616; 1841. Ench. p. 307. Sect. ut Benth. — Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). — Walp. 1845. Rep. III. p. 689. 982. Sect. eaed.
A. Gray 1844. Lond. journ. bot. III. p. 236. Conspectus generis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Origanidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 186: g. Thymear.

Pycnapophysium*) Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 602 *a;* 1841. Nom. p. 25. n. 878. 1: sect. Splachni. — Par Endl. 1836. Gen. n. 503 *a.* p. 49; 1841. Ench. p. 31.

Pycnarrhena Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 37: nov. g. Menispermacear. (Cocculus planifolius Wall.) — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 206 (dubiae tribus). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 134.

Pycneria Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 298: sect. Lachnostachydis.

Pycnoblaeria Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 697: sect. Blaeriae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4309 *b.* p. 1411; 1841. Ench. p. 369.

Pycnobotrys Benth. 1835. Labiat. p. 671; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 580: sect. Teucrii. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 864 (*Pychnobotrys*). — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *d.* p. 631; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4160. 5. — Walp. 1845. Rep. III. p. 908.

Pycnobotrys C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 255: sect. Muscari. (M. botryoides et racemosum.)
= Botryanthus Kunth.

Pycnocephalum Lessing 1831. Linnaea VI. p. 629: sect. Vernoniae. Subsect.: Lychnophora, Pycnocephalum.
DC. 1836. Pr. V. p. 83: g. Albertiniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2225. p. 361; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177 (123). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3860.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Gardn. 1842. Lond. journ. bot. I. p. 240: sect. Chrestae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 66. n. 2225 *b.* — Walp. 1843. Rep. II. p. 543; 1847. VI. p. 102.

*) ἀπόφυσις, pars adnata.

Pycnocephalum Lessing cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: g. Heterocomear.

Pycnocoma Benth. 1849. Niger Fl. p. 508: nov. g. Crotonear. (P. macrophylla.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 363: g. Acalyphear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 410: g. Crotonidear.

Pycnocomon Wallr. mss. ex Ejusd. Sched. crit. I. p. 46 sub *Succisa.*
= Cephalaria Schrad.

Pycnocomon „Dalech.", Wittst. vid. *Picnomon Lobel.*

Pycnocomum Link 1829. Handb. I. p. 683: g. Dipsacear.
= Cephalaria Schrad.?

Pycnocomus Hill 1769. Hort. kew. p. 67: nov. g. Associatar. (Centaurea sonchifolia.)

Pycnocycla Royle 1834. Himal. p. 232. t. 51. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 742 (*Pycnocyclus*).
Decne 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 257: g. Campylospermar., Orlayae aff.
Meisn. 1838. Gen. p. 150 (107): g. Echinophorear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 13.
Endl. 1839. Gen. n. 4521. p. 789; 1841. Ench. p. 380: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 424; 1846. V. p. 911.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139: g. Seselinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5339: g. Smyrniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.

Pycnocyclus Wittst. vid. *praeced.*

Pycnodoria*) Presl 1850. Epimel. bot. p. 460: nov. g. Lindsaeacear. (Pteris opaca Sm.), a Fée (Gen. Fil. p. 358) ad Pteridem revocatum.

Pycnoleucodon C. Müll. 1848. Linnaea XVIII. p. 684: sect. Leucodontis. (L. Kunzeanus.)
= Pterigynandrum Hedw.

Pycnonepeta Benth. 1834. Labiat. p. 469: sect. Nepetae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 803 (*Pychnonepeta*). — Endl. 1838. Gen. n. 3636 *b.* p. 622; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4084. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 775. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 371. (includens Stegionepetam Benth.) — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 373.

Pycnoneuron Endl., Rchb. vid. *seq.*

Pycnoneurum Decaisne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 340; 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: nov. g. Asclepiadear. (P. junciforme.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175): g. Cynoctonear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $3464/_2$. p. 1397 (*Pycnoneuron*); 1841. Ench. p. 299.
Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4955 (*Pycnoneuron*): g. Cynanchear. genuinar.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 532: g. Cynoctonar.

*) δορά, cutis.

Pycnophycus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 359; 1849. Sp. Alg. p. 604. n. 414: nov. g. Cystosirear.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 204: sect. Fucodii.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 644: g. Fucear.
Synon. Cervina Gray; Cymaduse Decne.

Pycnophyllum*) Rémy 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 355: nov. g. Caryophyllear. (P. tetrastichum.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 82: g. Spergulear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 55. n. 5230/1: g. Eualsinear. anomalum.

Pycnophyllum C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 567: sect. Trichostomi.

Pycnopodium Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 18; 1842. Anl. Mycol. p. 72: g. Pilobolidear. (*Pilobolus Corda* Ic. I. f. 285.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Piloboleor.?
= Pilobolus Tode?

Pycnopyrum C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 425 (Beitr. Fl. Or. Fasc. I. p. 137): sect. Agropyri. (Triticum cristatum, prostratum, etc.)
= Eremopyrum Ledeb.

Pycnosandra Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 191: nov. g. Phyllanthear. (Cyclostemon serratum Bl.)

Pycnosorus Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 63 in nota: nov. g. Compositar., Craspediae aff. (P. globosus.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 153: g. Angianthear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2722. p. 433; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 216 (136). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3528. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 99. — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 491.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Pycnospermeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phycol. gener. p. 333; 1846. Phycol. germ. p. 267; 1849. Sp. Alg. p. 547: ordo Gymnospermear. Fam.: Chordeae, Encoelieae, Dictyoteae, Sporochneae, Laminarieae.

Pycnosphace Benth. 1833. Labiat. p. 302; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 349: sect. Salviae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 753 (*Pychnosphace*). — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *k*. p. 615; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144. 12. — Walp. 1845. Rep. III. p. 671.
Synon. Leonia La Llave & Lex.

Pycnospora „R. Brown mss." Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 197: nov. g. Clitoriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 86 (62).
Endl. 1840. Gen. n. 6529. p. 1271; 1841. Ench. p. 669: g. Galegear. — Par. Rchb.

*) Nomen a foliis dense imbricatis.

Pycnospora R. Brown cont.
1841. Nom. p. 147. n. 5714. — Walp. 1842. Rep. I. p. 660.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555: g. Rhynchosiear.

Pycnostachys Hook. 1827. Exot. Fl. II. t. 202.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 222; 1831. Gen. II. p. 471. n. 2321: g. Labiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2869: g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Ocymear.
Benth. 1833. Labiat. p. 61: g. Ocymoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 667. 686 (*Pychnostachys*). — Rchb. 1837. Hdb. p. 189. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 385 (*Pychnostachys*).
Endl. 1838. Gen. n. 3579. p. 610; 1841. Ench. p. 306: g. Plectranthear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4143. — Walp. 1845. Rep. III. p. 521. 977.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Plectranthidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 83: g. Ocimear.
Synon. Echinostachys E. Meyer.

Pycnostelma Bunge 1834. Enum. p. ...: nov. g. Apocynear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 512: g. Haplostemmar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Apocynacear. dubium. (ibid. p. 626: g. Asclepiadear. verar.)

Pycnostylis Meisn. 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 329: sect. Persooniae.

Pycnothele Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXVI: sect. Baeomycetis.
= Pycnothelia Achar.

Pycnothelia Achar. 1810. Lich. univ. p. 571; 1814. Syn. Lich. p. 248: sect. Cenomyces. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 123 et Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 645. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 521. 1.
Mart. 1817. Erlang. p. 273: sect. Capitulariae.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 424: g. Cenomycidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 414 *a*: sect. Cladoniae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 168 *β*. p. 15; 1841. Ench. p. 11.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 110: g. Cladoniacear.
„Duf." Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: g. Lecidinear.
Synon. Pycnothele Achar.; Thamnolia Achar.; Siphonia Achar.

Pycnothymus Benth. 1834. Labiat. p. 354; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 211: sect. Satureiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 772 (*Pychnothymus*). — Endl. 1838. Gen. n. 3611 *c*. p. 617; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4055. 4. — Walp. 1845. Rep. III. p. 709.

Pycreus*) Palis. 1807. Fl. Owar. II. p. 48; 1819 in Lestib. Ess. Cypér.: nov. g. Cyperear. (Cyperus esculentus.) *Cf.* Flora 1821. I. p. 20, Schult. 1824. Mant. II. p. 4, Juss. 1826. Dict. v. 40. p. 194 (*Picreus*) et Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 124. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1081; 1830. Fl. exc. p. 72; 1841. Nom. p. 41. n. 1470. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 283; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 6; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 53; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 72. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 899.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Bluff & Nees 1836. Fl. germ. I. 1. p. ... : g. Cyperoideear. — Par. Rchb. 1844. Fl. sax. p. 54.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 419 (*Picreus*): sect. Cyperi. (C. flavescens, etc.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 622. — Webb 1850. Canar. III. p. 360. — Liebm. 1850. Mex. Halvgräs. p. ... — Steud. 1855. Glum. II. p. 2.
Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 254: subg. Cyperi.

Pycromyces Batt. . . . . *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 124.

Pygeum**) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 218. t. 46. f. 4: nov. g. plant. flore ignoto.
Colebr. 1818. Linn. Trans. XII. 2. p. 360. (Isis 1825. p. 818.)
Spreng. 1827. Cur. post. p. 192; 1830. Gen. I. p. 408. n. 2040: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 86.
Meisn. 1837. Gen. p. 102 (72): g. Amygdalear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6404. p. 1250; 1841. Ench. p. 663. — Walp. 1843. Rep. II. p. 8. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 360.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 558: g. Drupacear.
Römer 1847. Fam. nat. III. p. 3. 6: g. Amygdalacear. (restrict.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 641: g. Chrysobalanear.
Synon. Polydontia Blume; Polystorthia Blume; Polyodontia Meisn.

Pygmaea Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 60. 95; 1816. Ner. brit. ed. alt. (*cf.* Spreng. N. Entd. I. p. 98 et Leman 1826. Dict. v. 44. p. 127): nov. g. Fucor. (P. lichenoides: Lichen marinus Mich. t. 103.)

Pygon Bernhardi 1846. Allg. Thür. Gartenz. (Bot. Zeit. 1846. p. 399): subg. Sambuci. (S. racemosus L.)
= Botryosambucus Spach.

Pylaiella***) Bory 1825. Dict. class. IV. p. 993. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 127.
Conf. Pilayella.

Pylaisaea „Desvaux". *Cf. Pilaisaea Desv.* et *Pilaisea Leman.*
Brid. 1827. Bryol. II. p. 281: g. Pleurocarpor. peristomor. (p. XLV: g. Leskiar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 574: g. Leskeaceor.

*) Anagramma nominis Cyperus.
**) πυγή, podex.
***) Dicat. Bachelot de la Pylaie.

Pylaisaea Desvaux cont.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60 (*Pylaisea*): g. Hypnoidear.?
Endl. 1836. Gen. n. 571. p. 55; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 949: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypnear. — Par. Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47 (Leskea polyantha), serius Pylaisaeacear.
= Hypni subsect. Capillaria C. Müll.

Pylaisaeaceae Bruch, Schimp. .... Bryol. eur. V: fam. Muscor. Gen.: Thedenia, Pylaisaea, Homalothecium, Platygyrium, Lescuraea, Orthothecium, Cylindrothecium, Pterigynandrum, Pterogonium.

Pylaisea Fürnr. vid. *Pylaisaea Desv.*

Pyracantha Römer 1847. Fam. nat. syn. III. p. 104. 219: nov. g. Pomacear. (Cotoneaster Pyracantha, etc.)

Pyramia Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 458: nov. g. Osbeckiar.
Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81): g. Lavoisierear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6180. p. 1207; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6691. — Walp. 1843. Rep. II. p. 119. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1430: g. Melastomacear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 58: g. Pyramialium.

Pyramiales Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 58: trib. Melastomear. Gen.: Pyramia, Cambessedesia, Rhexia. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 868.

Pyramidanthus Rchb. 1841. Nomencl. p. 107. n. 4139. 6: sect. Plectranthi.
Synon. Pyramidium Benth.

Pyramidium Brid. 1826. Bryol. I. p. 107: g. Acrocarpor. gymnostomor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 136.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII: g. Gymnostomoideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 586: g. Gymnostomeor.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 727. n. 3683: g. Muscor. frondosor.
Endl. 1836. Gen. n. 486. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 861: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 113: g. Funariacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 86.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
Synon. Pyramidula Brid.; Pyramitrium Wallr.

Pyramidium Benth. 1832. Labiat. p. 44; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 61: sect. Plectranthi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 681. — Endl. 1838. Gen. n. 3575 *f.* p. 609; 1841. Ench. p. 306. — Walp. 1845. Rep. III. p. 510. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 947.
= Pyramidanthus Rchb.

Pyramidium Boissier 1853. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. Nr. 1. p. 46: nov. g. Cruciferar., Lachnolomati aff. (P. Griffithianum.) *Cf.* Flora 1854. p. 702.

Pyramidoptera Boissier 1856. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. Nr. 2. p. 106: nov. g. Umbelliferar., propriam tribum forsan constituens. (P. Cabulica.)

Pyramidostigma Walp. vid. *Pyramistigma Elk.*

Pyramidula Brid. 1822. Meth. musc. p. 20: nov. g. Gymnostomor. acrocarpor. (Gymnostomum tetragonum Schw.) — Par. Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 85.
Agdh. 1822. Aphor. p. 107: g. Gymnostomar.
C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 694: sect. Physcomitrii.
= Pyramidium Brid.

Pyramieae „Naud." Griseb. in Arch. f. Naturg. 1852. II. p. 391: vid. *Pyramiales Naud.*

Pyramistigma Elkan 1839. Mon. Papav. p. 21: sect. Papaveris. (P. caucasicum MB.) — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 112. (corr. *Pyramidostigma.*)

Pyramitrium Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 103: sect. Gymnostomi.
= Pyramidium Brid.

Pyrarda*) Cassini 1836. Dict. v. 41. p. 120: nov. g. Buphthalmear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224: g. Pyrardear.
Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 581: g. Grangeinear.
Less. 1832. Syn. p. 202 (sph. *Pycarda*): g. Conyzear.
DC. 1836. Pr. V. p. 373: sect. Grangeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2397 *c.* p. 388; 1841. Ench. p. 235. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3574. 3.

Pyrardeae Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 224: subdiv. Buphthalmear. Gen.: Egletes, Pyrarda, Grangea, Centipeda. *Cf. Grangeineae Cass.* 1830.

Pyrastrea Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 192: g. Pyrorum. (*Trossbirne.*)

Pyreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: subtrib. Pomacear. Gen.: Pyrus, Cydonia, Aronia, Sorbus, Raphiolepis, Photinia.

Pyrenacantha**) Hook. 1831. Bot. Miscell. II. p. 107. t. spl. 9. 10: nov. g. Stilaginear.? (P. volubilis.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2481.
Endl. 1837. Gen. n. 1893. p. 287; 1841. Ench. p. 173: g. Antidesmear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258).
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Urticeis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 256: g. Phytocrenear. — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 662.

*) Dicat. Franc. Pyrard, peregrinatori Gall.
**) πυρήν, nucleus.

Pyrenacantha Hook. cont.
R. Brown 1852. Pl. jav. rar. IV. p. . . . : g. Phytocreneis aff.
Synon. Cavanilla Thunb.; Jenkinsia Griff.; Moldenhauera Spreng.; Adelanthus Endl.

Pyrenacanthium Eschweiler 1833 (ubi?) sect. Pyrenastri.

Pyrenaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 315: ordo 7 class. VIII. Gen. §. 1: Clerodendrum, Ovieda, Volkameria, Aegiphila, Callicarpa, Vitex, Cornutia, Gmelina. §. 2: Citharexylum, Duranta, Lantana, Spielmannia. §. 3: Verbena, Zapania. §. 4: Selago, Hebenstretia.
DC. 1805. Franç. III. p. 501: fam. (43) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Vitex, Verbena.
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 390: fam. Corolliflorar. Gen.: Verbena.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae. Gen. ut DC.

Pyrenaria Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1119: nov. g. habitu Rosacear., sed Ternströmiaceis adnumerandum.
G. Don 1832. Gen. II. p. 651: g. Pomacear.? — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 164.
Meisn. 1837. Gen. p. 40 (30): g. Ternströmiacear.? (et p. 103 (72) Ulmariear.?) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
Endl. 1840. Gen. n. 5429. p. 1023; 1841. Ench. p. 532: g. dubium Ternströmiaceis aff. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 376.
Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7935: g. Ternströmiear.?
Korth. . . . . Verh. nat. Geschied. p. 145: g. Gordoniear. (Endl. Spl. III. p. 94.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 68. n. 5424/2.

Pyrenastrum Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 16. f. 15: nov. g. Verrucariar. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 142 et Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 652.
Fries 1825. Pl. homon. p. 265: g. Verrucarinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 372.
Meyer 1825. Flecht. p. 330: g. Myelocarpor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 248. n. 3369; 1831. Gen. II. p. 743. n. 3765.
Endl. 1836. Gen. n. 149. p. 13; 1841. Ench. p. 10: g. Verrucariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 526. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Verrucaridar.
Synon. Parmentaria Fée.

Pyrenidia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: subfam. Larnospermiae. Gen.: Pyrostria, Myonima, Guettarda, Matthiola, Psathura, Remniphyllum, Laugeria?, Viviania.

Pyrenium Tode 1790. Fung. meckl. I. p. 35. t. 6. f. 50: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 143. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1480.
Pers. 1797. Tent. p. 11: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. 235: g. Gymnospermor.?

Pyrenium Tode cont.

Fries 1823. Syst. myc. II. p. 243; 1828. Elench. II. p. 39: g. Sclerotiacear.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 567: g. Sclerotiear.

Fries 1825. Pl. homon. p. 94: g. Tremelleor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 285; 1841. Nom. p. 10. n. 417. — Endl. 1836. Gen. n. 400. p. 34; 1841. Ench. p. 20. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 309. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 785. n. 4071: g. Coniomycetum.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 862: g. Pyrenomycetum astomor.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notnm.

Math. 1853. Belg. II. p. 262: g. Tremellinear.

Pyrenocarpi Genth 1836. Fl. Nass. I. p. 314: div. Lichenum. Ordo unicus: Endocarpeae.

Pyrenocarpus Trevisan 1855. Flora p. 180: g. Sphaeromphalear. (Verrucaria umbonata Schär.) *Cf. Thelochroa Mass.*
= Sphaeromphale Rchb.?

Pyrenochia Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 171: nov. g. Mycetum, pro Dothidea pyrenophora Fr. propositum. *Cf. seq.*
= Dothidea Fries.

Pyrenochium Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Gastromycetum divis. 2.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Sphaeriaceor.

Pyrenocymatii Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 287: ordo 1 Lichenum. Gen.: Thrombium, Verrucaria, Endocarpon, Thelotrema.

Pyrenodermium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 272: nov. g. Sphaeriaceor. (Sphaeriae connatae Fr.)

Pyrenodesmia Massalongo 1853. Mon. blast. p. 119.

Arnold 1858. Flora p. 319: g. Lecanorear.
= Callopisma De Not. (Körb.)

Pyrenodium*) Fée 1841. Nov. Act. Leop. XVIII. Spl. I. p. 43: nov. g. Verrucariear. (Pyrenastri sp. Eschw., Trypethelii et Porinae sp. Fée antea.)

Pyrenodochium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 272: nov. g. Sphaeriaceor. (Sphaeriae lignosae Fries.)

Pyrenomycetes Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LI: subordo Uterinor. veror. Sect.: Xylomacei, Cytispori, Sphaeriacei, Phacidiacei. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 144.

Agdh. 1821. Aphor. p. 82; 1825. Cl. pl. p. 6; Isis 1826. p. 583: ordo Fungor. Divis.: Xylomaceae, Sphaeriaceae. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 6. — Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 743. Divis.: *cryptostomi* (gen. 351—356), *sphinctrostomi* (gen. 357—363) *eustomi* (gen. Sphaeria), *astomi* (gen. 365—375). — Endl. 1836. Gen. p. 31; 1841. Ench. p. 18. Trib. ut Fries 1823. — Bonord. 1851. Hdb. p. 261. Fam.: Hysteriacei, Sphaeriacei, Tuberacei.

*) πυρήν, nucleus. Diminut., ob nuclei exiguitatem.

Pyrenomycetes Fries cont.

Fries 1823. Syst. myc. II. p. 312: ordo Gasteromycetum. Divis.: Phacidiacei, Sphaeriacei, Cytisporei, Xylomacei.

Fries 1825. Pl. homon. p. 97: cohors Ascomycetum. Ordines ut 1823.

Fries 1836. Epicr. p. 1: fam. (tertia) Fungor. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 82. Gen.: Hypoxylon, Hypocrea, Dothidea, Erysiphe. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 375. (thalamiferor.) Ord.: Sphaeriacei, Dichaenacei, Perisporiacei, Cytisporacei, Apiosporinei, Phyllostictei.

Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 25; 1839. III. p. 20; 1840. IV. p. 37: fam. Myelomycetum. Gen. (1838): Leptothyrium, Labrella, Endotrichum, Cryptosporium, Apiosporium, Perisporium, Depazea, Erysiphe, Sphaeria, Chaetomium, Polystigma, Schizothecium. Accedunt 1839: Actinothyrium, Melanconium, Stegonosporium, Sporocadus, Prosthemium, Nemaspora, Sphaeronema, Acrospermum, Excipula, Phragmotrichum, Phacidium et 1840 Coniothyrium, Rhytisma.

Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 241: class. II. Fungor. Ordines: Sphaeriacei. . . . .

Schleid. 1843. Grundz. II. p. 38: Lichenibus adnumerat.

De Notar. 1844. Cenno pirenom. et 1845. Osserv. pirenom.

Bail 1858. Syst. p. 49: ordo Thecasporear. Fam.: Dothidei, Sphaeriacei.
Synon. Hypoxyla DC.

Pyrenophora Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 397: nov. g. Sphaeriaceor. (P. paradoxa.)

Pyrenopsis Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13 (Flora 1854. p. 235): nov. g. Lecanorear.

Pyrenosporangiae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 528): ordo Homorganor. rhizosporor. Fam.: Sphaeriaceae.

Pyrenotea*) Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323. 332: nov. g. Calicior. *Cf.* Flora 1823. Beil. II. p. 48 et Leman 1826. Dict. v. 44. p. 146.
= Pyrenothea Fries.

Pyrenothalami Bartl. 1830. Ord. p. 8: ordo Lichenum.
= Gasterothalami Fries.

Pyrenothea Fries 1825. Pl. homon. p. 265: g. Verrucarinar. *Cf.* Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 375. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 371.

Fries 1831. Lich. eur. p. 8. 449: g. Limboriear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 22. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 351. — Bayrh. 1849. Taun. p. 98.

Endl. 1836. Gen. n. 148. p. 13; 1841. Ench. p. 10: g. Verrucariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 525. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 121.

*) „Nomen nucleum protusum respicit."

Pyrenothea Fries cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Verrucaridar.
Synon. Pyrenotea Fries 1821; Leprantha Dufour; Thrombium Wallr.; Gelatinaria Flörk.

Pyrenotrichum Montagne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 376: nov. g. Fungor., Endotricho aff. (P. Splitgerberi.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor.

Pyrenula Achar. 1810. Lich. univ. p. 64. 314; 1814. Syn. p. 117: nov. g. Phymatoideor. (Thelotrema margaceum Wahlenb.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 147.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 494: g. Porinidar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 16: g. Verrucariar.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 243: sect. Verrucariae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 373*a*.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Verruceariear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 17. — Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 359. (emend.)
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 208: g. Verrucarior.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 384: g. Pyrenulear. — Par. Arnold 1858. Flora p. 555.
= Verrucariae Pers. pars?

Pyrenula Fée 1825. Crypt. écorç. t. 23. f. 3.
= Thelotrema Achar.?

Pyrenulatae Agardh 1821. Aphor. p. 91; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: div. Crustacear. Gen.: Verrucaria, Trypethelium, Glyphis, Chiodecton, Porina, Thelotrema.

Pyrenuleae Theobald 1858. Nat. Abh. Geb. Wett. p. 384: fam. Verrucariacear. Gen.: Pyrenula.
Arnold 1858. Flora p. 555: trib. Verrucariacear. Gen. id. et Bunodea.

Pyrethraria Pers. 1807. Enchir. II. p. 464: sect. Cotulae. (C. pyrethraria L.)
= Spilanthi sp.? (DC. Pr. VI. p. 81.)

Pyrethraria DC. 1837. Prodr. VI. p. 15: sect. Anacycli. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2643*a*. p. 430; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3051. 2.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 186: subg. Anacycli.

Pyrethreae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 276: subdiv. Chrysanthemear. Gen.: Gamolepis, Psilothamnus, Coinogyne, Venesaglia, Phymaspermum, Brachanthemum, Nananthea, Phalacroglossum, Adenachaena, Villanova, Brachymeris, Oliglossa, Matricaria; Egletes, Leucopsidium, Xanthocephalum, Pyrethrum, Courrantia, Rhytidospermum, Gastrostylum.

Pyrethrum Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 720: nov. g. Corymbiferar. (Tanacetum inodorum Auct.) — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 148 (corymbosum). — Vent. 1799. Tabl. II. p. 547. — DC. 1805. Franç. IV. p. 181; 1815. V. p. 477. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 453. — Link 1822. En. II. p. 341. — Math. 1853. Belg. I. p. 284.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 171: g. pl. class. VIII.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 201: g. Compositar. ordinis 4.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 430. t. 169: g. Radiatar. *Cf.* Juss. 1806. Ann. Mus. VIII. p. 170. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 204. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 566; 1826. Syst. III. p. 584. n. 2810; 1831. Gen. II. p. 634. n. 3165. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 117.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2150. n. 1511; 1809. En. p. 903: g. Syngenes. Superfl. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 168. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 436.
Rebent. 1804. Neom. p. 114: g. Pentandr. Monogyn.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 300: g. Anthemidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 514. — Link 1829. Hdb. I. p. 757. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 231. — Brongn. 1843. En. genr. p. 40 (sph. *Pyrethum*). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 201. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 85.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 178; 1826. v. 44. p. 148; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. Chrysanthemear. (verar.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 254. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 320. — DC. 1837. Pr. VI. p. 53. Sect.: Leucoglossa, Gymnocline, Xanthoglossa, Tridactylina, Dendranthema, Balsamita. — Endl. 1838. Gen. n. 2670. p. 434; 1841. Ench. p. 241. Sect. eaed. — Kunth 1838. Berol. I. p. 346. (legitimar.) — Meisn. 1839. Gen. p. 210 (134). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 174. (restrict.) — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3069. Sect. ut DC. (Pyrethrum loco Leucoglossae.) — Walp. 1843. Rep. II. p. 636; 1847. VI. p. 202. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 547. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2380: g. Matricariear.
Gaud. 1829. Helv. V. p. 346: sect. Chrysanthemi.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 279: g. Pyrethrear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 653: g. Senecionidear. Sect. ut DC.

Pyrethrum Medic. 1775. Act. Theod. Palat. III. p. 237. t. 18.
= Spilanthes Jacq.

Pyrethum Brongn. vid. *Pyrethrum Hall.*

Pyrgosea Sweet . . . . Hort. brit. p. 223.
Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 298: g. Crassulacear. (Crassula turrita Linn. f.)
Endl. 1839. Gen. n. 4610*e*. p. 809; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6177. 5. — Walp. 1843. Rep. II. p. 254.
Conf. Turgosea Haw.; Purgosea Haw.; Purgosia G. Don.

Pyrgus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 120. Ed. Willd. p. 148: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. racemosa.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 352. — Hedw. 1806. Gen. p. 131. n. 572.
Endl. 1839. Gen. n. 4222 *a α*. p. 736; 1841. Ench. p. 359: subsect. Euardisiae.
= Ardisia Swartz. (A. DC. Pr. VIII. p. 120.)

Pyrisperma Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 177: nov. g. Fungor., Tuberi aff. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 154.

Pyrispora „Rafin. N. York med. repos. II. Hex. V. p. 250“ Endl. 1836. Gen. p. 20: g. Tuberaceor. dubium.
= Pyrisperma Raf., Desv.

Pyrobolus**) Weinm. mss.
= Eurotium Link.

Pyrochaeta DC. 1836. Prodr. V. p. 349: sect. Apoplappi?
Endl. 1838. Gen. n. 2381 *e*. p. 386; 1841. Ench. p. 235: sect. Haplopappi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3335. 5.

Pyrochroa ***) Echweiler 1824. Syst. Lich. p. 15. f. 9: nov. g. Graphidear. (Graphis caribaea Ach.) *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 166.
= Ustalia Fries.

Pyrodochium „Bonord.“ Griseb. Jahresber. f. 1851. p. 428: vid. *Pyrenodochium Bonord.*

Pyrola †) Tourn. 1700. Inst. p. 256. t. 132: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 123. n. 345; 1737. Cliff. p. 162; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 396; 1759. Syst. ed. X. p. 1024. n. 490; 1762. Sp. ed. II. p. 567; 1764. Gen. ed. VI. p. 221. n. 554; 1767. Syst. ed. XII. p. 301. n. 545: g. Decandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 288. — Murr. 1774. Syst. p. 340; 1784. Syst. p. 408. — Reich. 1778. Gen. p. 225. n. 598. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 297. n. 752. — Gmel. 1791. Syst. p. 698. — Pers. 1797. Syst. p. 437; 1805. Ench. I. p. 483. n. 1094. — Willd. 1799. Sp. II. p. 621. n. 873; 1809. En. p. 456. — Rebent. 1804. Neom. p. 180. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 272.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 420 (*Pirola*): g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 292: g. pl. class. XIII.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 94. n. 385: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 71.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 462. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 254. Sect.: Pyrola, Chimaphila.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vaccinior.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 128: g. Diplosantherar.

Pyrola Tourn. cont.
Hill 1769. Ht. kew. p. 189: g. Pentapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 488 (*Pirola*): g. Vacciniatar.
Scop. 1777. Intr. p. 226: g. Nomadear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 303. t. 63. f. 4 (rotundifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 161: g. Ericar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 360. — Hedw. 1806. Gen. p. 312. n. 1235.
Neck. 1790. El. I. p. 218. n. 361: g. Dicroophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 215: g. Rhodoidear.
DC. 1805. Franç. III. p. 683; 1815. V. p. 431: g. Ericacear. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 60. 75.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 516; 1825. Syst. II. p. 316. n. 1574; 1830. Gen. I. p. 346. n. 1752: g. Ericear. — Par. D. Don 1824. Mem. Wern. Soc. V. 1. p. 224. (verar.) Monogr. — Link 1829. Hdb. I. p. 606. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 155. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 97. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 414. — Kunth 1838. Berol. II. p. 8. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1372. 1412. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 392.
Seringe 1819. Mus. helvet. III. p. 83. (Monogr.) Sect.: Pyrola, Chimaphila. *Cf.* Flora 1821. II. p. 691.
Radius 1821. Diss. de Pyrola. (*Cf.* Flora 1822. II. Beil. p. 13.) Sejungitur Chimaphila.
Link 1821. En. I. p. 393: g. Ericinar.
Lois. 1826. Dict. v. 44. p. 168: g. Ericinear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: g. Monotropear. (ibid. I. p. 682. Sect.: Pyrola, Chimophila.) — Par. Hook. 1834. Fl. bor. am. II. p. 45.
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3870; 1837. Hdb. p. 206: g. Pyrolear. (Distinguitur Chimophila.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. (p. 80 Pyrolacear.)
Koch 1837. Syn. p. 478. Ed. II. p. 550: g. Pyrolacear. Sect.: Pyrola, Parnassioides, Chimaphila. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4349. p. 760; 1841. Ench. p. 374. Sect.: Pyrola, Moneses. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 450. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 657. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 437.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 72: g. Pyroleacear. *Conf.* Chimaphila Pursh.

Pyrola Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 402: g. Ericinar. sejuncta Monese restrict. Sect.: Orpheus, Pyrola (P. media et minor), Alsoganum.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 863: g. Pyrolear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 772. — Meisn. 1839. Gen. p. 247 (155). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 517. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4876. (genuinar.) — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 505.
Endl. 1839. Gen. n. 4349 *a*. p. 761; 1841. Ench. p. 374: sect. Pyrolae.
Nutt. 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 271: g. Pyrolacear. Sect.: Scotophyllum. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 928.

Pyrola Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 18: g. Pyrolear., ad typum P. secundae restrict.
= Alsoganum Gray.

---

*) *πύργος*, turris: a staminibus in formam turris conicae mutuo inclinatis.
**) *πυροβόλος*, ignem ejiciens.
***) *πῦρ*, ignis.
†) Nomen a similitudine cum folio piri.

Pyrolaceae Agardh 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: div. Ericear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 47: fam. Hypericariear. Trib.: Monotropeae, Pyroleae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (173) Monopetalar. *Cf.* Lindl. 1837. Lond. and Edinb. phil. Mag. XI. p. 409.
Lindl. 1833. Nix. p. 27; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 219; 1847. Veg. kd. p. 450: ordo Ericalium. Gen. (1847) ut Endl. — Par. Alef. 1856. Linnaea XXVIII. p. 6. Subord.: Cyrilleae, Ledeae, Pyroleae.
Mart. 1835. Consp. p. 26.
Koch 1837. Syn. p. 478. Ed. II. p. 550: ordo Calyciflorar. Gen.: Pyrola. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 772. Trib.: Pyroleae, Galaceae.
Endl. 1839. Gen. p. 760; 1841. Ench. p. 374: fam. Ericaceis aff. Gen.: Cladothamnus, Chimophila, Pyrola; Galax. Accedit 1842 (Spl. II. p. 106) Shortia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 657. Gen. ut Endl.

Pyroleaceae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 72: fam. Ericoidear. Gen.: Pyrola, Galax.

Pyroleae Lindl. 1821. Coll. bot. t. 5. Synops. p. 175.
Rchb. 1828. Consp. p. 129: div. Ericacear. Gen.: Monotropa, Schweinitzia, Pterospora, Pyrola, Chimophila, Argophyllum, Galax; Lepuropetalon?, Befaria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: trib. Pyrolacear. Gen.: Pyrola, Chimophila.
D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152: trib. Ericacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 789. 863. Gen.: Pyrola, Chimaphila, Moneses, Cladothamnus. — Meisn. 1839. Gen. p. 247 (155). Gen.: Ledum, Cladothamnus, Pyrola, Moneses, Chimophila, Galax? — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 444. 516. Gen. ut G. Don et Galax.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: subdiv. Ericariar. Gen.: Diapensia, Pyxidanthera, Chimophila, Pyrola, Clethra. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 125. Sect.: *genuinae* (gen.: Moneses, Pyrola, Chimophila; Galaceae), Diapensieae, Clethreae.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 772: trib. Pyrolacear. Gen.: Pyrola, Moneses, Chimaphila.
Alef. 1856. Linnaea XXVIII. p. 8: subordo Pyrolacear. Gen.: Pyrola, Amelia, Thelaia, Monesis, Chimaphila.

Pyrolirion Herbert 1821. App. p. 37; 1825. Bot. Mag. App. p. IV: nov. g. Amaryllidear. (Cyrtanthiformium?) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Herb. 1837. Amaryll. p. 72. 183. (Hippeastriform.)
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1235: g. Cyrtanthear.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 804: sect. Amaryllidis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1273 *b*. p. 176; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1177. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1601. 2. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 12. 126.
Kunth 1850. Enum. V. p. 489: g. Hippeastrear.

Pyronema Carus 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 370. t. 27: nov. g. Mucedineor. (Thelephorae aff.: Nees ibid. p. 380.)
Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 415: g. Tremelleor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 36; 1842. Mycol. p. 149: g. Pyronemear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 308: g. Hymenulor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Agyrieor.
Heufl. 1858. Bonplandia p. 15: g. Rhizinacear.

Pyronemeae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 36; 1842. Anl. Mycol. p. XCIV. 149: fam. Ascophoror. Gen.: Pyronema, Midotis.

Pyronium „Salisb." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 666: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 36. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *k*.

Pyrophorum DC. 1825. Prodr. II. p. 633: sect. Pyri. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4470 *g*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 605. — Endl. 1840. Gen. n. 6342 *a*. p. 1237; 1841. Ench. p. 656. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 91. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 94. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 570.
= Pirophorum Neck.

Pyrostegia Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 523 (Bot. Bemerk. p. 93): nov. g. Eubignoniear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 512.

Pyrostoma G. F. W. Meyer 1818. Esseq. p. 119: nov. g. Scrophulariear.? (P. ternata.) *Cf.* Bull. soc. philom. 1820. p. 7.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 760. n. 2123; 1831. Gen. II. p. 479. n. 2366: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2931.
Bartl. 1830. Ord. p. 180: g. Viticear. — Par. Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 449. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 226. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4199.
Endl. 1838. Gen. n. 3698. p. 635; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 610. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 81.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 693; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 300: sect. Viticis.
Synon. Casarettoa Walp.

Pyrostria „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 206; 1820. Mém. Mus. VI. p. 397: nov. g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 586. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 446. — Hedw. 1806. Gen. p. 55. 367. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 3. 91. n. 414. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 176. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 94. n. 471. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 485.
Gmel. 1791. Syst. p. 246: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 614. n. 203. — Pers. 1805. Ench. I. p. 139. n. 259.
Batsch 1802. Tab. p. 235: g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 615. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2104; 1841.

Pyrostria Comm. cont.
Nom. p. 76. n. 2854. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 212. — DC. 1830. Pr. IV. p. 464. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 556. — Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117).
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Pyrenidiae.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 216: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
Endl. 1838. Gen. n. 3204. p. 542; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 313: g. Pyrostriear.

Pyrostria Roxb. 1820. Fl. Ind. ed. Wall. I. p. 403; ed. 1832. I. p. 388: g. Tetrandr. Monogyn.
= Eupyrena Wight & Arn.

Pyrostrieae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 313: subtrib. Psychotriear. Gen.: Gynochtodes, Pyrostria, Litosanthes, Lasianthus, Dysosmia, Dysosidendron, Hamiltonia.

Pyrotheca Salisb. ex Steud. Nomencl. II. p. 2. 422. (P. tinctoria.) *Cf. Gyrotheca Salisb.*
= Lachnanthes Ell.

Pyrrhanthus*) Jack „Malay. Misc.“ 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 156: nov. g. Combretacear. (P. littoreus.)

Pyrrhocoma Walp. vid. *Pyrrocoma Hook.*

Pyrrhopappus DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 144: nov. g. Lactucear. Sect.: Crinissa, Piesis. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 236 (144). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 429. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 495.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3739: g. Hieraciear. genuinar.
= Chondrillae Tourn. pars?

Pyrrhosa Blume 1835. Rumphia I. p. 190. t. 62. 63: sect. Myristicae. (An gen. Myristicear.?) — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 160. — A. DC. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 31; 1856. Pr. XIV. 1. p. 202.
Endl. 1839. Gen. n. 4708. p. 830; 1841. Ench. p. 419: g. Myristicear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241). — Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2587.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 302: g. Myristicacear.
Synon. Horsfieldia Willd.; Horsfielda Pers.

Pyrrhosia „Mirb. Bull. soc. philom. An IX. p. 70“ Endl. Gen. p. 60 in synon. Niphoboli: vid. *Pyrrosia Mirb.*

Pyrrhospora Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 209: nov. g. Biatorinar. (Biatorae sp. Fr.)

Pyrrhotrichia Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 238 in adnot. ad Rhynchosiam.
Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67): g. Phaseolear.
= Eriosema DC.

Pyrrocoma**) Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 306. t. 106: nov. g. Eupatoriear. (P. carthamoides.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. III. 1835. p. 111.
DC. 1836. Pr. V. p. 350: g. Solidaginear. Sect.: Eupyrrocoma, Chromochaeta? — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2382. p. 386; 1841.

Pyrrocoma Hook. cont.
Ench. p. 235. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 243. Sect.: Eupyrrocoma, Homopappus. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3336. Sect. ex DC. — Walp. 1843. Rep. II. p. 593. 969 (*Pyrrhocoma*). Sect. ut Torr. & Gray (Eupyrrhocoma). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 333: g. Chrysocomear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Baccharidear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (*Pyrrhocoma*): g. Erigerear.

Pyrrosia Mirbel Hist. nat. Buff. Éd. Deterv. Végét. V. p. 91: g. Filicum, teste Leman 1826. Dict. v. 44. p. 198. (An *Pyrrhosia* ex Endl.?) — Par. „Mirb. an IX. Bull. sc. nr. 47. p. 70“ Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 225.
= Niphobolus Kaulf.

Pyrularia Rich. 1803 in Michx. Fl. bor.. Am. II. p. 231: nov. g. Dioec. Pentandr. (Nyssoideum.)
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIX. 575. n. 1058: g. Pentandr. Monogyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 113: g. Santalacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2082. p. 327; 1841. Ench. p. 207. — Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2357 (dubium). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Santalear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240).
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 628: g. Thesiear.
Synon. Hamiltonia Mühlenb.; Calynux Raf.; Sphaerocarya Wall.; Scleropyron Arn.; Scleropyrum Wight.

Pyrus*) Tourn. 1700. Inst. p. 628. t. 404: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 126. Ed. Hall. 1745. p. 140: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 351 (*Pirus*): g. Pomiferar.
Juss. 1789. Gen. p. 335: g. Pomacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 335. — DC. 1805. Franç. IV. p. 429. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 109. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 103. 163.
Medic. 1793. Gesch. d. Bot. p. 64: g. emendat. Antho-Mallonandriae.
Mönch 1794. Meth. p. 679: g. Calycostemonis. (Pyrus, Sorbus et Cotoneaster.)
Borckh. 1795 in Röm. Arch. I. 3. p. 90. (Pyrus communis, Sorbus aucuparia, etc.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 181: g. Rosacear. — Par. Lois. 1826. Dict. v. 44. p. 104 (*Poirier*).
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 630: sect. Pyri. — Par. Koch 1836. Syn. p. 234. Ed. II. p. 260.
= Pyri Linn. pars.

Pyrus Linn. 1737. Gen. p. 145. n. 408; 1737. Cliff. p. 189; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 130; 1753. Sp. I. p. 479; 1759. Syst. ed. X. p. 1058. n. 550; 1762. Sp. ed. II. p. 686; 1764. Gen. ed. VI. p. 251. n. 626; 1767. Syst. ed. XII. p. 344: g. Icosandr. Penta-

*) *πυῤῥός*, igneus, rubescens.
**) *πυῤῥός*, fulvus; *κόμη*, capillus.

*) Vox latina, quare rectius *Pirus*.

Pyrus Linn. cont.
gyn., incluso Malo a praecedente discrepans. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 347. — Murr. 1774. Syst. p. 389; 1784. Syst. p. 466. — Reich. 1778. Gen. p. 257. n. 682. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 339. n. 858. — Lour. 1790. Coch. I. p. 321. — Pers. 1797. Syst. p. 509. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1012. n. 992; 1809. En. p. 525 (includens Crataegi L. partem). — Nutt. 1818. Gen. I. p. 306. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 295. 322. Sect.: Pyrus, Cydonia, Malus. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 510.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 275. n. 1133: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Pers. 1807. Ench. II. p. 40. n. 1231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 866; 1825. Syst. II. p. 509. n. 1857; 1830. Gen. I. p. 414. n. 2064. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 562. Sect.: Malus, Pyrus, Sorbus. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 311. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 222. — Link 1831. Hdb. II. p. 80. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 630. Sect.: Pyrus, Malus. — Koch 1836. Syn. p. 234. Ed. II. p. 260. Sect. eaed. — Kunth 1838. Berol. I. p. 207. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 91. Sect.: Pyrophorum, Malus. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 124. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 560. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 570. Sect. ut Griseb. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 313 (*Poirier*).
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 38.
Adans. 1763. Fam. II. p. 296: g. Rosar.
Scop. 1777. Intr. p. 219: g. Calycanthemar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 286. 290. *Cf. Lazarolus* et *Malus Med.*
Gmel. 1791. Syst. p. 841: g. Polyandr. Pentagyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 225.
Batsch 1802. Tab. p. 7: g. Pomiferar.
Cram. 1803. Disp. p. 120 in Dodecandr. Digyn. et p. 201 in Dioec. Icosandr. (P. dioica.)
Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. p. 97: sect. Pyri.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Pyrear.
= Pyri Lindl. pars.

Pyrus Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. p. 97: g. Pomacear. emend. (*Cf.* Flora 1823. I. p. 163.) Sect.: Pyrus, Sorbus, Chamaemespilus. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 633. Sect.: Pyrophorum, Malus, Aria, Torminaria, Eriolobus, Sorbus, Adenorachis, Chamaemespilus. — D. Don 1825. Nepal. p. 236. — Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4470. Sect.: Chamaemespilus, Aronia, Sorbus, Torminaria, Aria, Malus, Pyrophorum. — Bartl. 1830. Ord. p. 400. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 605. Sect. ut DC. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 203. — Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Webb .... Canar. II. p. 17. — Endl. 1840. Gen. n. 6342. p. 1237; 1841. Ench. p. 656. Sect. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 169. n. 6540. Sect. ut 1828 (Pyrus loco Pyrophori) et Eriolobus. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 152. Sect. ut DC. — Walp. 1843. Rep. II. p. 53. —

Pyrus Lindl. cont.
Ledeb. 1844. Ross. II. p. 94. Sect. ex DC. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 669.
Torr. & Gray 1840. North-Amer. I. p. 470: g. Pomear. Sect.: Malus, Adenorachis, Sorbus.
Synon. Pyrus, Malus et Sorbus Tourn.; Pyrus et Sorbus Linn.; Pirus Hall.; Pirophorum et Apirophorum Neck.; Lazarolus, Hahnia et Aucuparia Medic.

Pythagorea*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 243. Ed. Willd. p. 300: nov. g. Octandr. Tetragyn. (P. cochinchinensis.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 261. n. 1518; 1830. Gen. I. p. 325. n. 1658. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1329.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 859: g. Melastomear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5578: inter genera vix cognita.
= Blackwellia Comm.

Pythagorea Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 96: nov. g. Lythridear. (Lythrum lineare, alatum et virgatum?)
= Hyssopifolia DC.

Pythecoseris Spach vid. *Pithecoseris Mart.*

Pythion Martius 1831. Flora II. p. 458: nov. g. Aroidear. (Arum campanulatum Roxb.)
= Candarum Rchb.

Pythium**) Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 515: nov. g. Hydronematear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 211.
Fries 1825. Pl. homon. p. 344: g. Leptomitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 440; 1841. Nom. p. 18. n. 610.
= Leptomitus Agdh.?

Pythium Pringsheim 1857. Monatsber. Berl. Ak. p. 318: nov. g. Saprolegniear. (P. entophytum et monospermum.)

Pythonicae Endl. 1837. Gen. p. 236; 1841. Ench. p. 128: subtrib. Dracunculinar. Gen.: Pythonium, Amorphophallus. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 30. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). Gen. ead.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 34: trib. Aroidear. efilamentatar. stenozeugmaticar. anatropooar. Gen.: Plesmonium, Conophallus, Brachyspatha, Pythonium, Amorphophallus.

Pythonium Schott 1832. Melet. p. 17: nov. g. Dracunculear. (Thomsonia nepalensis Wall.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129.
Endl. 1837. Gen. n. 1680. p. 236; 1841. Ench. p. 128: g. Pythoniear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 30. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). — Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 36. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 201.
Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1092: g. Candarear.
Synon. Thomsonia Wall.

Pyxidantheae Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 141: subtrib. Miconialium. Gen.: Blakea, Topobea, Pyxidanthus, Creochiton.

Pyxidanthera***) Michx. 1803. Fl. bor. Am. I. p. 152. t. 17: nov. g. Pentandr. Monogyn.

---

*) Dicat. antiquo botanico Pythagorae.
**) πύθω, putrefacio.
***) πυξίς, pyxis.

Pyxidanthera Michx. cont.
— Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 175. n. 400. — Hedw. 1806. Gen. p. 109. n. 488.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXVI. 356. n. 713: g. Ericar.?
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 216: g. Convolvulaceis aff.?
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3393: g. Rhodoracear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Ericacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 156: g. Ericear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Pyrolear.
Endl. 1838. Gen. n. 4346. p. 760; 1841. Ench. p. 374: g. Diapensiacear. — Par Meisn. 1840. Gen. p. 272 (179). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 606.
Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4880: g. Diapensiear. — Par. A. DC. 1852. Pr. XIII. I. p. 692.

Pyxidanthera Mühlenb. 1813. Catal. Amer.
= Lepuropetalum Ell.

Pyxidanthus Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 150: nov. g. Pyxidanthear. (P. Lindenianus, etc.) *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 795.

Pyxidaria Lindern 1727. Alsat. I. p. 152. II. p. 267.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 237: g. pl. class.IX.
= Lindernia All.

Pyxidaria Gleditsch 1764. Syst. p. 291. n. 1183: g. Filicinar. frondosar.

Pyxidaria Bory .... Voy. p. 3: g. Lichenum. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 217.
Mart. 1817. Erlang. p. 261: sect. Capitulariae.
= Cenomyce Achar.

Pyxidaria Schott 1822. Bras. Nachr. II; Isis 1823. p. 1045 (*Pixydaria*). 1048 (*Pixidaria*): nov. g. Lecythidi aff.? (P. macrocarpa.)

Pyxidaria Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: subg. Discopleae. (*Pyxidicula Ehrenb.*)

Pyxidicula Ehrenb. (1834. Abh. Berl. Ak.); 1840. Ber. Ak. Berl. p. 216; 1844. ibid. p. 85: g. Bacillarior. *Cf.* Ehrenb. 1844. ib. p. 262: ubi Mastogonia et Stephanogonia tanquam genera, Stephanopyxis et Xanthiopyxis tanquam subgenera distinguuntur.
Kütz. 1844. Bacill. p. 51; 1845. Phyc. germ. p. 67; 1849. Sp. Alg. p. 21. n. 14: g. Melosirear. - Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 45.

Pyxidicula Ehrenb. cont.
Synon. Stephanopyxis et Xanthiopyxis Ehr.; Pyxidaria Trev.?

Pyxidium Ehrhart 1789. Beitr. IV. p. 44.
= Phascum Linn.

Pyxidium „Hill" Schreb. 1791. Gen. II. p. 768: sect. Lichenis.
Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 19: g. fam. primae plantar. lichenosar. (Lichen pyxidatus, etc.)
= Cenomyce Achar.

Pyxidium Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 565. 580: nov. g. Crateridear. (Trichia gymnosperma Pers. obs., Licea circumscissa Pers. syn.)

Pyxidium*) Moq.-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 262: sect. Amaranti. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 857. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1032.
Synon. Glomeraria Cavan.; Dimeranthus Rafin.

Pyxine Fries 1825. Pl. homon. p. 267: nov. g. Pyxinear. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 217. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 146. p. 13; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 187; 1849 in Orb. Dict. X. p. 667.
Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 393: g. Gyrophorear.
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 554: g. Gyrothalamar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Pyxinidar.

Pyxineae Fries 1825. Pl. homon. p. 266: trib. Idiothalamor. Gen.: Umbilicaria, Pyxine. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 13; 1841. Ench. p. 10. Gen. ead.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: trib. Gymnocarpor. Gen.: Gyrophora, Umbilicaria, Omphalodium, et (1849. ibid. X. p. 667) Pyxine.

Pyxinidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: trib. Idiothalamear. Gen.: Umbilicaria, Pyxine.

Pyxipoma Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 293: nov. g. Sesuviear. (Trianthema polyandrum Bl.) — Par Endl. 1840. Gen. n. 5171. p. 949; 1841. Ench. p. 501. — Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6341. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1060.
Meisn. 1843. Comm. p. 357: g. Portulacellar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Sesuvear.

Q.

Quadrella DC. 1824. Prodr. I. p. 251: sect. Capparidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4874 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 284. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 78.
Meisn. 1867. Gen. p. 17 (15): g. Cleomear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 185. n. 7107. (genuinar.)
= Colicodendron Mart.

Quadria*) Ruiz & Pavon 1794. Prodr. p. 16. t. 33; 1798. Fl. Peruv. I. p. 63. t. 99: nov. g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 44. p. 227.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 220.
= Gevuina Mol.

Quadriala**) Sieb. & Zuccar. 1845. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 2. p. 194. t. 2 B: nov. g. Cornear. (*Cf.* Flora 1846. II. p. 430.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 359.

---

*) Falso citatur Pyxidium Mönch, qui (Meth. pag. 358) fructificationis modum pro Blito et Amarantho indicat.

*) Dicat. Ant. de la Quadra, Hispano.

**) Nomen a fructu quadrialato.

Quadriala Sieb. cont.
Endl. 1850. Spl. V. p. 18. n. 4575/$_1$: g. Aucubear.

Quajacum Scopoli vid. *Guajacum Plum.*

Qualea*) Aublet 1775. Guian. I. p. 7. t. 1. 2: nov. g. Monandr. Monogyn. (Q. rosea et caerulea.) — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 7. n. 12. — Gmel. 1791. Syst. p. 10. — Willd. 1797. Sp. I. p. 18. n. 17. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 18. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 337. — Vahl 1805. Enum. I. p. 6. n. 5. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 5. 36. n. 25.
Scop. 1777. Intr. p. 93: g. Scitaminear.
Juss. 1789. Gen. p. 424: g. incertae sedis (Guttiferis aff.?). — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 4. 343.
Neck. 1790. El. III. p. 146. n. 1489: g. Cratoophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.
A. St. Hil. 1820. Mém. Mus. VI. p. 265. 269: g. Vochisiear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 229. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 17. n. 22 (1827. Cur. post. p. 4); 1830. Gen. I. p. 8. n. 20.
Mart. & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 130. t. 78—81: g. Vochysiacear. — Par. Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 78. — Endl. 1840. Gen. n. 6069. p. 1178; 1841. Ench. p. 630.
DC. 1828. Pr. III. p. 28: g. Vochysiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4510; 1841. Nom. p. 171. n. 6589. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 321. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 671. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 325. — Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 21.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 380: g. Vochyacear.

Quamoclidion Choisy 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 429: nov. g. Mirabilear. (Mirabilis triflora Benth.)

Quamoclit**) Tourn. 1700. Inst. p. 116. t. 39: g. pl. class. II.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 197.
Mönch 1794. Meth. p. 453: g. Petalostemonis. (Ipomoea coccinea L.)
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 433 (*cf.* Flora Lit. V. p. 127); 1845 in DC. Pr. IX. p. 335: g. Convolvulear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 258. — Endl. 1839. Gen. n. 3806. p. 654; 1841. Ench. p. 324. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 101. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4416. (genuinar). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 529.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 593: g. Convolvulinar.
Synon. Calboa Cavan.; Macrostema Pers.; Macrostoma Hedw.; Exogonium Moç. & Sess.; Morenoa La Llav. & Lex.?

Quapira „Aubl." Auct. in synon. Avicenniae: vid. *Guapira Aubl.*

*) *Qualé* nomen caribaeum Q. caeruleae.
**) Nomen americanum corruptum.

Quapoja Batsch 1802. Tab. affin. p. 89: g. Guttaeferar.
Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104: g. Guttiferar. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 233. = Quapoya Aubl.

Quapoya*) Aublet 1775. Guian. II. p. 897. t. 343. 344: nov. g. Dioec. Pentandr. (Q. scandens et Pana-panari.)
Juss. 1789. Gen. p. 256: g. Guttiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 28. — Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 167. t. 296.
Gmel. 1791. Syst. p. 514: g. Pentandr. Pentagyn.
Choisy 1824 in DC. Pr. I. p. 559: sect. Clusiae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 617. — Meisn. 1837. Gen. p. 42.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 308: g. Garciniear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Clusiear. (genuinar.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5437. p. 1025; 1841. Ench. p. 534. — Walp. 1842. Rep. I. p. 393. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8029: g. Clusiariar.
Synon. Smithia Scop.; Xanthe Schreb.; Quapoja Batsch.

Quararibea Aublet 1775. Guian. II. p. 691. t. 278: nov. g. Monadelph. Enneandr. (Q. Guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1014.
Cavan. 1785. Diss. II. App. II (*Guararibea*); 1787. Diss. III. p. 175. t. 71. f. 1.
Juss. 1789. Gen. p. 274: g. Malvacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 65.
DC. 1824. Pr. I. p. 477: sect. Myrodiae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 508. — Endl. 1840. Gen. n. 5313 *b.* p. 992; 1841. Ench. p. 515.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 30: g. Myrodiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25).
Rchb. 1837. Hdb. p. 295; 1841. Nom. p. 203. n. 7742: g. Quararibear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615: g. Adansoniear.
Synon. Gerberia Scop.; Gerbera Gmel.

Quararibeae Rchb. 1837. Handb. p. 295; 1841. Nomencl. p. 203: sect. Myrodiear. Gen.: Plagianthus, Quararibea, Myrodia et 1841 Hoheria.

Quarea Juss. vid. *Guarea Linn.*

Quartinia**) A. Rich. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 259: nov. g. Mimosear. (Q. abyssinica.)
= Pterolobium R. Brown. (A. Rich. in Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 179.)

Quartinia Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 94. n. 6145/$_1$: g. Eulythrariear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 673.
Meisn. 1843. Comm. p. 355: g. Salicariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lythrear.
Synon. Rhyacophila Hochst. (non Blume.)

Quassia***) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 553; 1764. Gen. ed. VI. p. 212. n. 529; 1767. Syst. ed. XII. p. 295. n. 525: g. Decandr. Monogyn. — Par Murr. 1774. Syst. p.

*) Nomen caribaeum *Quapoy.*
**) Dicat. Dr. Quartin-Dillon.
***) Dicat. negro Quassi.

Quassia Linn. cont.
333; 1784. Syst. p. 401. — Reich. 1778. Gen. p. 218. n. 578. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 288. n. 728. — Gmel. 1791. Syst. p. 682. — Pers. 1797. Syst. p. 428; 1805. Ench. I. p. 465. n. 1044. — Willd. 1799. Sp. II. p. 567. n. 849.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.

Scop. 1777. Intr. p. 251: g. Polycarpiar.

Juss. 1789. Gen. p. 282: g. Magnoliis aff.

Neck. 1790. El. II. p. 305. n. 1083: g. Synathrophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 77: g. Magnoliaceis aff.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 812; 1825. Syst. II. p. 319. n. 1578: g. Ochnear.

Link 1821. En. I. p. 400: g. Rutacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 666. 679. Sect.: Quassia, Simaruba.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 347. 1756: g. Simarubear.

= Quassia DC. et Simaruba Aubl.

Quassia Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 340. t. 70. f. 1 (simaruba).

Cram. 1803. Disp. p. 183: g. Monoec. Polyandr.

= Simaruba Aubl.

Quassia DC. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 324; 1824. Prodr. I. p. 733: g. Simarubear., disjuncta Simaruba restrict. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 513. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 271. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 385. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 809. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 373. — Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47). — Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 561. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 161.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 679: sect. Quassiae.

Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5174; 1841. Nom. p. 197. n. 7534: g. Quassiear.

Link 1831. Hdb. II. p. 227: g. Rutacear.

Endl. 1840. Gen. n. 5962. p. 1143; 1841. Ench. p. 607: g. Simarubacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1416. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 477. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 674.

Quassieae Rchb. 1828. Consp. p. 199 (1832. Fl. exc. p. 753); 1837. Hdb. p. 283: subdiv. Simarubear. Gen.: Quassia, Simaruba, Simaba, Tapiria, Samadera, Nima, Ebelingia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 197. Gen.: Quassia, Simaruba, Simaba, Samadera. *Affinia:* Nima, Picrasma, Harrisonia.

Quaternaria A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 201: sect. Mimusopis. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1042.

Quaternella Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 82; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Mönchia quaternella.)

= Mönchia Ehrh.

Quebitea*) Aublet 1775. Guian. II. p. 838. t. 327: nov. g. Gynandr. Polyandr. (Q. guianensis.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 278.

= Dracontium Linn.? (Rchb. Consp.)

*) Nomen caribaeum *Daquejoablle.*

Quekettia*) Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. Misc. p. 4; 1852. Fol. Orchid. 14 Oct.: nov. g. Vandear. (Q. microscopica.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1454/1. p. 1364; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2059. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.

Queltia Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 351: nov. g. Narcissear. (Narcissus Gouani Roth, etc.)

Haw. 1812. Syn. succ. p. 328. Ed. Schrank 1819. p. 362. App.; 1819. Suppl. p. 123: g. Narcissor.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 44: sect. Narcissi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1268*c*; 1830. Fl. exc. p. 88; 1841. Nom. p. 44. n. 1611. 4. — Schult. 1830. Syst. VII. p. 947. — Endl. 1836. Gen. n. 1289 *d*. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1168. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297).

Haw. 1831. Mon. Narciss. p. 5: g. Narcissinear. *Cf.* Kunth Enum. V. p. 721.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 439: subg. Narcissi.

Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 206: sect. Queltiae.

Queltia Herbert 1837. Amaryll. p. 62. 79. 310. 413: g. Narcissear. ampliat., includens Troëm, Schisanthem, Philogynem, Jonquillam et Diomedeae partem Haw. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 721. — Gay 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. X. p. 77.

Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 203: g. Narcissinear. Sect.: Illus, Diomedes, Tros, Queltia.

Quelusia Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 101. t. 6. f. 10: nov. g. Octandr. Monogyn. (Fuchsia coccinea Ait. ex Röm.)

DC. 1828. Pr. III. p. 36: sect. Fuchsiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4494*a*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 677.

Synon. Fuchsia Spach; Nahusia Schneev.; Thileo Feuill.; Ellobum et Spachia Lilja.

Quepinia Corda vid. *Guepinia.*

Querceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: trib. Quercinear. Gen.: Quercus.

Quercinae Presl 1822. Delic. Prag. I. (Isis 1823. p. 372.) Gen.: Quercus.

Quercineae (*Quercinées*) Juss. 1816. Dict. sc. nat. v. 2. spl. p. 12: nova fam. ab Amentaceis distincta. Gen.: Quercus.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11. 12: fam. Corylariear. Trib.: Corylaceae, Querceae.

Kunth 1838. Berol. II. p. 193: fam. Cupuliferar. Gen.: Quercus, Fagus.

Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257): trib. Cupuliferar. Gen.: Quercus, Lithocarpus, Synaedrys.

Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 145: sect. Cupuliferar. verar. Gen.: Quercus, Castanopsis.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 134: fam. Amentacear. Gen.: Castanea, Fagus, Quercus, Corylus, Ostrya, Carpinus.

Math. 1853. Belg. I. p. 490: trib. Amentacear. Gen.: Fagus, Castanea, Quercus, Corylus, Carpinus.

*) Dicat. Edwin J. Quekett.

Quercinium Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 101. n. 3: g. Juliflorar. foss.
Unger 1845. Chlor. prot. p. 107. t. 29 (1846. p. LXXIX); 1845. Syn. p. 217: g. Cupuliferar. foss. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 30. n. 1848/$_4$.
Synon. Klödenia Göpp.

Quercites Berger 1829. Verstein. p. 22. t. 4. = Camptopteris Sternb.?

Quercites Göppert 1844. Übers. foss. Fl. Schles. p. 219.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 30. n. 1848/$_1$: g. Cupuliferar. foss.
Synon. Quercus Ung.

Quercus Tourn. 1700. Inst. p. 582. t. 349: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 311: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 328 in class. XVI.) = Quercus Linn. pars.

Quercus Linn. 1737. Gen. p. 291. n. 726; 1737. Cliff. p. 448; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 994; 1759. Syst. ed. X. p. 1271. n. 949; 1763. Sp. ed. II. p. 1412; 1764. Gen. ed. VI. p. 495. n. 1070; 1767. Syst. ed. XII. p. 629: g. Monoec. Polyandr., injunctis Ilice et Subere a Tournefortiano discrepans. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 239. — Murr. 1774. Syst. p. 716; 1784. Syst. p. 857. — Reich. 1778. Gen. p. 492. n. 1168. — Lour. 1790. Coch. II. p. 571. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 646. n. 1447. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 364. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 194. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 423. n. 1692; 1809. En. p. 974. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 213. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 92. t. 296; 1832. Ind. III. p. 633. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 6. 160.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 159: g. Juliferar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 465. — Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 242.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 150: g. Amentacear. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 351. — Juss. 1789. Gen. p. 410. — Gis. 1792. Prael. p. 578. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 563. — Batsch 1802. Tab. p. 163. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 320. — DC. 1805. Franç. III. p. 308; 1815. V. p. 351. — Pers. 1807. Ench. II. p. 567. n. 2101. — Lois. 1817. Dict. v. 8. p. 396 (*Chêne*). — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 349; 1826. Syst. III. p. 856. n. 3124; 1831. Gen. II. p. 695. n. 3506. — Link 1822. En. II. p. 397. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 517. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 625.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 124. n. 515: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 347.
Adans. 1763. Fam. II. p. 375: g. Castanear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 492.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 175: g. Enneandr. Monogyn.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 182. t. 37. f. 3 (Robur).
Neck. 1790. El. III. p. 256. n. 1646: g. Axonophytor.

Quercus Linn. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 643: g. Octandr. Tetragyn.
Michx. 1801. Hist. d. Chên. de l'Amér. *Cf.* Schrad. Journ. 1800. II. p. 321.
Rebent. 1804. Neom. p. 179: g. Decandr. Monogyn.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 6: g. Cupuliferar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 353. — D. Don 1825. Nepal. p. 56. Sect.: Castanopsis. — Blume 1829. Fl. jav. fasc. XIII. XIV. p. 6. — Bartl. 1830. Ord. p. 100. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 77. — Koch 1837. Syn. p. 639. Ed. II. p. 736. — Endl. 1837. Gen. n. 1845. p. 274; 1841. Ench. p. 160; 1847. Spl. IV. p. 24. Sect. (1847): Lepidobalanus, Chlamydobalanus, Cyclobalanus. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 158. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 332. — G. (Guill.?) 1849 in Orb. Dict. III. p. 464 (*Chêne*). — Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 8; 1855. Ind. bat. I. p. 844. Subgen.: Pasania, Gyrolecana, Castaneopsis, Phegopsis. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 380. (ex Endl. 1847 et Blume.)
Juss. 1816. Dict. v. 2. spl. p. 12: g. Quercinear. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 194. — Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 145. Sect.: Robur, Cerroides, Erythrobalanos, Cerris, Gallifera, Suber, Coccifera. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 134. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 589. — Math. 1853. Belg. I. p. 492.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 246: g. Corylidear.
Presl 1822. Delic. Prag. I. p. ...: g. Quercinar.
Agdh. 1825. Aphor. p. 209: g. Corylacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 290.
Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1798; 1831. Fl. exc. p. 176; 1841. Nom. p. 66. n. 2470: g. Faginear. Sect. (1831): Suber, Robur, Aegilops. — Par. Döll 1842. Flora II. p. 725.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: g. Quercear.
Blanco 1837. Filipin. p. 725: g. Monoec. Hexandr.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 18. p. 286: g. Cupuliferear. Sect.: Castaneopsis. — Par. Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 115.
Synon. Quercus, Ilex et Suber Tourn.

Quercus Unger 1845. Chlor. protog. p. 106. t. 29. f. 1—3 (1846. p. LXXVIII); 1845. Syn. pl. foss. p. 216: g. Cupuliferar. foss. = Quercites Göpp.

Queria*) Löfling 1752. Itin. p. 48.
Linn. 1753. Sp. I. p. 90; 1759. Syst. ed. X. p. 882. n. 101; 1762. Sp. ed. II. p. 132; 1764. Gen. ed. VI. p. 43. n. 108; 1767. Syst. ed. XII. p. 105: g. Triandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 112; 1784. Syst. p. 130. — Reich. 1778. Gen. p. 45. n. 115. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 58. n. 141. — Gmel. 1791. Syst. p. 208. — Pers. 1797. Syst. p. 135; 1805. Ench. I. p. 112. n. 211. — Willd. 1797. Sp. I. p. 493. n. 163; 1809.

*) Dicat. Jos. Quer y Martinez, prof. Cadizensi.

Queria Löfling cont.
En. p. 137. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 57. 872. n. 398.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 300. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 238. — Batsch 1802. Tab. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 111. — Hedw. 1806. Gen. p. 52. 365. — Link 1821. En. I. p. 108. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 283.
Adans. 1763. Fam. II. p. 272: g. Spergular.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
Gled. 1764. Syst. p. 8. n. 24: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 351.
Scop. 1777. Intr. p. 334: g. Defloratar.
Neck. 1790. El. II. p. 181. n. 893: g. Aclithrophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 15 in Diandr. Digyn.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 37: g. Scleranthear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 387; 1825. Dict. v. 38. p. 9. — Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4254.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 836: g. Molluginear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 358. n. 1681: g. Paronychiar.
DC. 1828. Pr. III. p. 379: g. Queriacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 96.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: g. Queriear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 380. n. 1915: g. Paronychiear. (in Decandr. Trigyn.) — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1590.
Bartl. 1830. Ord. p. 305: g. Alsinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 204. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (21). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 497.
Link 1831. Hdb. II. p. 424: g. Paronychiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 235: g. Löfflingiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5226. p. 964; 1841. Ench. p. 505: g. Eualsinear. — Par. Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 341. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 249.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7774: g. Minuartiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 104: g. Polycarpear.

Queria Gärtn. 1791. Fruct. II. t. 128.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 158: g. Pentandr. Monogyn.
= Anychia Mix.

Queriaceae DC. 1828. Prodr. III. p. 379: trib. Paronychiear. Gen. unicum: Queria.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 96: trib. Scleranthear. Gen. id.

Querieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: trib. Scleranthidear. Gen.: Queria.

Quernales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 289: nixus Exogenar. diclinar. Ordines: Corylaceae, Juglandaceae.

Quesnelia Gaudich. Voy. Bonite t. 54: nov. g. Bromeliacear., non descriptum.
Beer 1857. Fam. Brom. p. 16. 49: g. Phlomostachyar.

Quiina*) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 19. t. 379: nov. g. imperfecte cognitum. (Q. guianensis.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 300 (*Quina*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795 (*Quuna*): inter genera indescripta.
Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 154: g. Clusiacear. *Cf.* Griseb. 1850. Arch. f. Nat. II. p. 319. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 191 (anomalum).
Endl. 1850. Spl. V. p. 67. n. 5422/1: g. dubium Ternströmiacear.
Conf. Guiina Crüg.

Quilamum**) Blanco 1837. Fl. de Filipin. p. 851: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Q. luteum.)
Endl. 1837. Gen. n. 6854. p. 1328; 1841. Ench. p. 685: inter genera apetala vix nota. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 372.
= Crypteronia Blume. (Endl. Spl. IV. p. 39.)

Quilesia Blanco 1837. Fl. de Filipin. p. 176: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Q. sericea.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 5497/1. p. 1423; 1841. Ench. p. 546; 1850. Spl. V. p. 72 (*Quillesia*): g. dubium Olacinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5269. — Meisn. 1843. Comm. p. 345. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 263. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 14. 25.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: g. Olacacear. (dubium.) — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 788.

Quillaja***) Molina 1782. Saggio p. 175: nov. g. plantar.
Juss. 1789. Gen. p. 444: g. incertae sedis.
Gmel. 1791. Syst. p. 767: g. Dodecandr. Tetragyn. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 465. n. 1796.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 386: g. Monoec. Dodecandr.
DC. 1825. Pr. II. p. 547: g. Spiraeacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 404. (descisc.) — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 448 (anomalum).
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 296: g. Rosacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 383. n. 1929. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1616.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4456: g. Spiraeacear.
D. Don 1831. Edinb. n. phil. journ. X. p. 230; XII. p. 110: g. Quillajear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 522. — Meisn. 1837. Gen. p. 103 (72). — Endl. 1840. Gen. n. 6397. p. 1248; 1841. Ench. p. 660. — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6517. — Walp. 1843. Rep. II. p. 52; 1846. V. p. 659. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565.
Synon. Smegmadermos Ruiz & Pav.; Smegmaria Willd.; Fontenellea St. Hil. & Tul.

Quillajeae D. Don 1831. Edinb. n. phil. journ. X. p. 229: nova fam. a Rosaceis et

*) Nomen caribaeum *Quina-rana*.
**) *Quilamo* nomen vernaculum.
***) *Quillai* Chilensium.

Quillajeae D. Don cont.
Spiraeaceis discrepans. Gen.: Kageneckia, Quillaja, Vauquelinia.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 522: ordo (82) Calyciflorar. Gen. ead. et Lindleya.
Meisn. 1837. Gen. p. 103 (72): trib. Spiraeacear. Gen. ead. et Euphronia. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1248; 1841. Ench. p. 660. Gen. ead. — Walp. 1843. Rep. II. p. 52. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 209. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 168: sect. Spiraeacear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: trib. Rosacear. Gen. ead.

Quillesia Endl. 1850 vid. *Quilesia Blanco.*

Quina Poir. vid. *Quiina Aubl.*

Quinaria*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 272. Ed. Willd. p. 334: nov. g. Decandr. Monogyn. (Lansium sylvestre Rumph.)
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 34. 49: g. Clausenear.
= Cookia Sonn.

Quinaria Rafin. 1830. Medic. fl.; 1832 in Loud. Gard. Mag. VIII. (Linnaea VIII. p. 69.)
= Ampelopsis Rich.

Quinchamala Willd. 1797. Sp. I. p. 1217. n. 470: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 5. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 122. n. 605. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 591.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 537. n. 576: g. Santalear.
= Quinchamalium Mol.

Quinchamalium Molina 1782. Saggio p. 151: nov. g. plant.
Juss. 1789. Gen. p. 75: g. Elaeagnor. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 2. n. 618.
Gmel. 1791. Syst. p. 493: g. Pentandr. Trigyn.
Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 1. t. 107: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 212. n. 481.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Elaeagnear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 175: g. Eleagnor. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 88. n. 401.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 350. Ed. Nees p. 206: g. Santalacear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 230. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 228. t. 52 A. 57 A. — Bartl. 1830. Ord. p. 113. — Endl. 1838. Gen. n. 2070. p. 325; 1841. Ench. p. 206. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788. — Philippi 1857. Bot. Zeit. p. 745.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 322: g. Santalear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 299: g. Osyridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1705; 1841. Nom. p. 62. n. 2346.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): g. Thesiear. — Par. A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 624.
Synon. Quinchamala Willd., Spreng.

*) Nomen a numero quinario partium.
**) *Quinchamali* Chilensium.

Quinetia Cassini 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. . . . ; 1830. Dict. v. 60. p. 579. 590: nov. g. Faustulear., Phaenopodae et Facelidi aff. (Q. Urvillei.)
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 63: g. Solidaginear.?
DC. 1837. Pr. VI. p. 158: g. Helichrysear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2728. p. 444; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3505. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Quinio Schlechtend. 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 732: nov. g. Menispermacear. (Q. cocculoides.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 136.

Quinquefolium Tourn. 1700. Inst. p. 296. t. 153: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 94. Ed. Hall. 1745. p. 106: g. pl. class. V.
Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.
= Potentilla Linn.

Quinquefolium Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Potentillae. (P. recta, verna.)
= Potentillastri pars Ser.

Quinquelobus Benjamin „mss. in Mart. fl. Bras.“ 1847. Linnaea XX. p. 316: nov. g. Utricularicar., non definitum. *Cf.* Benj. ibid. p. 761, ubi nomen *Benjaminia Mart.* substitutum est.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 1000: g. Lentibulariear.
= Benjaminia Mart.

Quinquelocularia C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 630: nov. g. Campanulear. (Campanula crispa Lam.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1050.

Quinquina Condam. 1738. Act. Ac. Paris. p. 226.
Endl. 1838. Gen. n. 3274 *a*. p. 556; 1841. Ench. p. 274: sect. Cinchonae.
= Cinchona Klotzsch.

Quinquineae Rchb. 1837. Handb. p. 180; 1841. Nomencl. p. 77: sect. Cinchonear. Gen. Eucinchonear. Endl. et subsect.: Naucleeae.

Quintilia Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1408. n. 4143/$_2$; 1841. Ench. p. 349. n. 4141: g. Didymocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4710: g. Henckeliear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 278: g. Epithemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 735: sect. Staurantherae.
Synon. Miquelia Blume; Anomorhegmia Meisn.

Quintinia*) A. DC. 1830. Mon. Campan. p. 92 in adnot.: nov. g. Escalloniear. (Q. Sieberi.) *Cf.* Endl. 1832. Flora II. p. 389. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 5. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 6. — Rchb. 1837. Hdb. p. 233; 1841. Nom. p. 160. n. 6251.

*) Dicat. La Quintinie, horticultori gallico.

Quintinia A. DC. cont.
(genuinar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 137 (101). — A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 356. — Endl. 1839. Gen. n. 4675. p. 822; 1841. Ench. p. 410. — Walp. 1843. Rep. II. p. 379. — Hook. 1853. N. Zeal. I. p. 78.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 195: g. Escallonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 752: g. Escalloniacear.

Qnisqualis*) Rumph. 1748. Amboin. V. p. 71.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 556; 1764. Gen. ed. VI. p. 215. n. 539; 1767. Syst. ed. XII. p. 297. n. 534: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 336; 1784. Syst. p. 403. — Reich. 1778. Gen. p. 221. n. 587. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 292. n. 739. — Lour. 1790. Coch. I. p. 274. — Gmel. 1791. Syst. p. 686. — Pers. 1797. Syst. p. 431; 1805. Ench. I. p. 470. n. 1073. — Willd. 1799. Sp. II. p. 579. n. 859. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 426.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Veprecular. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414.
Scop. 1777. Intr. p. 327: g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 78: g. Thymelaear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 181.
Neck. 1790. El. III. p. 390. n. 1834: g. Plyrontophytor.?
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 184: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 311. n. 1231.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 479: g. Onagrariar. — Par. Poir. 1825. Dict. v. 44. p. 307.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 351. Ed. Nees p. 207: g. Combretacear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 641. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1472. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 254.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 328: g. Bucidear.
Link 1821. En. I. p. 390: g. Thymelear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 331. n. 1619; 1830. Gen. I. p. 357. n. 1804: g. Combretear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 22. — Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4528; 1837. Hdb. p. 247; 1841. Nom. p. 171. n. 6610. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 667. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 318. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 316. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6089. p. 1183; 1841. Ench. p. 632. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 119. — Walp. 1843. Rep. II. p. 68; 1846. V. p. 663. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 610.

*) Quis? qualis? ob incertitudinem sedis. — Ex B[illegible] nomen indicum a Rumphio divulgatum.

Quisqualis Rumph. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Combretidear.
Synon. Udani Adans.; Aurora Nor. (Hassk.)

Quivisia*) „Commers." Juss. 1789. Gen. p. 264: nov. g. Meliar.
Cavan. 1789. Diss. VII. p. 367. t. 211—214: g. Monadelph.
Gmel. 1791. Syst. p. 633: g. Octandr. Monogyn.
Gis. 1792. Prael. p. 363: g. Trihilatar.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 42: g. Meliacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 467. n. 1061. — Hedw. 1806. Gen. p. 302. n. 1196. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 518. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 309. — Bartl. 1830. Ord. p. 356. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 85.
DC. 1824. Pr. I. p. 620: g. Meliear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 66. n. 2387; 1831. Gen. II. p. 542. n. 2657. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1837. Hdb. p. 313; 1841. Nom. p. 212. n. 8051. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 216. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 679. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 50 (36). — Endl. 1840. Gen. n. 5516. p. 1047; 1841. Ench. p. 550. — Walp. 1842. Rep. I. p. 426. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 79. 90. (restrict.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Rchb. 1868. Consp. p. 211. n. 5508: g. Strigiliear.

Quoia Endl., Rchb. vid. *Quoya Ner.*

Quoya**) Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 30: nov. g. Rhamnear. (Nomen.) *Cf.* Endl. Gen. p. 1104.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 5616 (*Quoia*): g. Rhamneis aff.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582 (*Quoia*): g. Rhamnacear.?

Quoya Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 453. t. 66: nov. g. Verbenacear.? (Q. cuneata.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3719. p. 638; 1841. Ench. p. 312 (dubium). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 619. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3233: g. Gesnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Beslseriear.
Meisn. 1840. Gen. p. 290 (198): g. Lippiear. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 37.
Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4219: g. Aegiphilear.?
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 697: g. Viticear.?

Quuna Lindl. vid. *Quiina Aubl.*

*) Vulgo *bois de Quiei.*
**) Dicat. J. R. C. Quoy, medico, peregrinatori.

R.

Rabdocaulis*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 359: sect. Coreopsidis. (C. angustifolia Ait., etc.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 614 (*Rhabdocaulis*).

Rabdochloa**) Palis. 1812. Agrost. p. 84: nov. g. Graminear. (Cynosurus monostachyos Vahl.) — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 314.
= *Conf.* Rhabdochloa Kunth.

Rabdosia Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 825: sect. Elsholtziae. (E. javanica Bl.)
Hassk. 1842. Flora Beibl. II. p. 25 (*Rhabdosia*): g. distinctum ex eodem typo.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Moschosmidar.

Rabdotus***) „Presl“ Sternb. 1838. Vers. II. p. 193: nov. g. Asparagaceitum. (Calamites verrucosus St.)
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 169; 1846. Chlor. prot. p. LXVII: g. Liliacear. foss.

Rabelaisia Planchon 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 519. t. 17. 18: nov. g. Diosmear. (R. Philippinensis et parvifolia.)
Endl. 1850. Spl. V. p. 102. n. $5994/_1$: g. Pilocarpear.
Synon. Lunasia Blanco; Lunana Lindl.

Rabenhorstia†) Rchb. „Hort. t. 100“ 1841. Nomencl. p. 159. n. 6209: g. Bruniear.
= Heterodon Meisn.

Rabenhorstia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 410: nov. g. Leveillineor. (Sphaeria clandestina, etc.)

Racamea††) A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 254; 1843. Arch. Mus. III. p. 601: sect. Camareae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 350. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 106.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7845: g. Gaudichaudiear.

Racapa Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 88. 123: nov. g. Xylocarpear. (Carapa? procera DC.)
= Carapae Aubl. pars.

Racaria Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 24. t. 382: nov. g. flore incognito. (R. sylvatica.) *Cf.* Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 316.
DC. 1824. Pr. I. p. 618: g. Sapindaceis aff., minus notum. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 675. — Endl. 1840. Gen. n. 5632. p. 1074; 1841. Ench. p. 562.
Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5230: g. Dodonaeacear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Sapindear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7604 (minus cognitum).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Sapindacear. dubium.

*) *ῥάβδος*, virga, scapus.
**) *ῥάβδος*, *χλόη*, gramen.
***) *ῥαβδωτός*, striatus, sulcatus.
†) Dicat. L. Rabenhorst, botanico Dresd.
††) Anagramma vocis Camarea.

Racelopus*) Dozy & Molkenb. 1855. Bryol. jav. Fasc. VI. p. ... : nov. g. Polytrichacear.
Conf. Rhacelopus C. Müll.

Rachia**) Klotzsch 1855. Begon. p. 188: nov. g. Begoniacear. (Begonia peltata Otto & D.)

Rachicallis***) DC. 1830. Prodr. IV. p. 433: nov. g. Hedyotear. (Hedyotis nitida HBK.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 535. — Meisn. 1838. Gen. p. 160.
Meisn. 1838. Comm. p. 115: sect. Hedyotidis.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 496: g. Rubiacear.
Schlechtend. 1856. Linnaea XXVIII. p. 490. Char. emend. Sejungitur Arcytophyllum.
Conf. Rhachicallis Endl.

Rachiopterideae Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 85: div. Filicum foss. Gen.: Zygopteris, Selenochlaena, Selenopteris, Gyropteris, Anachoropteris; Ptilorachis, Diplophacelis, Calopteris, Tempskia.

Raciocarpon Wittst. vid. *Rhakiocarpon Corda.*

Rack Bruce 1790. Trav. in Egypt. V. App. p. 44. t. 34.
= Avicennia Linn.

Racka Gmel. 1791. Syst. p. 245: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 13. 207. n. 477.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 332: g. Verbenaceis aff.?
= Avicennia Linn.

Racletia Adans. 1763. Fam. II. p. 449: g. Cistor.
= ...?

Racoblenna†) Massalongo 1853. Mem. lich. p. 139: nov. g. Lichenum. (Lecidea caesia Duf., etc.)
Arnold 1858. Flora I. p. 94: g. Racoblennear.

Racoblennaceae Arnold 1858. Flora I. p. 94: ordo Phycolichenum. Trib.: Racoblenneae.

Racoblenneae Arnold 1858. Flora I. p. 94: trib. Racoblennacear. Gen.: Racoblenna, Collolechia, Placynthium.

Racodia Fries 1821. Syst. mycol. p. XLVI: subsect. Byssor. solidor. Gen.: Racodium, Dematium?

Racodiaceae Fries 1825. Pl. homon. p. 303: trib. Byssacear. Gen.: Hypochnus, Colletosporium, Myxotrichum, Racodium, Helmisporium, Helicosporium, Gonytrichum, Oedemium, Trichosporum, Gliotrichum, Haplotrichum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166: fam. Mucedinum. Gen.: Racodium, Antennaria, Amphitrichum.

*) *ῥάκελος*, asper, spinosus.
**) Dicat. Hortulano L. Rach, Berol.
***) *ῥαχία*, rupes maritima: quasi ornamentum rupium maritimarum.
†) *ῥάκος*, lacinia; *βλέννα*, mucus.

Racodiacei Rchb. 1828. Consp. p. 5: subdiv. Byssaceor. genuinor. Gen. Racodiacear. Fries et Ophiotrichum, Clasterisporium?

Racodium*) Pers. 1797. Tent. p. 43: g. Nematothecii. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 336.

Pers. 1801. Syn. p. XIX. 701: g. Naematothecior.

GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 28. 384. g. Fungor.

Rebent. 1804. Neom. p. 393: g. Byssor. — Par. Nees 1816. Syst. p. 73; 1817. Überbl. p. 20. (solidor.)

Link 1809. Berl. Mag. III. p. 21: g. Mucedinum.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 54: g. Eleutherocarpor.

Fries 1815. Obs. myc. I. p. 215; 1818. II. p. 370: g. Sphaerioideor.

Mart. 1817. Erlang. p. 355: g. Inomycetum aëreor.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: g. Moniliar.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLVI: g. Racodior.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 557: g. Byssidear.

Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.

Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 67: g. Byssoideor. veror.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 545: g. Byssinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75.

Link 1824. Spec. I. p. 26: g. Hyphomycetum.

Fries 1825. Pl. homon. p. 303: g. Racodiacear. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1032: g. Mucoroideor.

Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 79: g. Racodiaceor.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 122: g. Byssear. — Par. Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 171.

Math. 1853. Belg. II. p. 469: g. Chloridear.

Synon. Rhacodium Spreng. et Auct.

Racomitrieae Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: div. Bryacear. Gen.: Racomitrium, Grimmia, Schistidium.

Racomitrium**) Brid. 1822. Meth. musc. p. 78: nov. g. Peristomor. acrocarpor. (Trichostomum canescens Schultz.)

Agdh. 1822. Aphor. p. 107: g. Muscor. — Par. Leman 1826. Dict. v. 44. p. 338.

Brid. 1826. Bryol. I. p. 207: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII Grimmioideor.)

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 592: g. Grimmiaceor.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Grimmioidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 83.

*) ῥακώδης, rugosus, pannosus.
**) ῥάκος, pannus laceratus.

Racomitrium Brid. cont.

Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 173 (*Rhacomitrium*): sect. Trichostomi. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 60.

Hüb. 1833. Musc. germ. p. 197: g. Aploperistomor.

Endl. 1836. Gen. n. 493. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.

Genth 1836. Nass. I. p. 174: g. Bryoideor.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 868: g. Calyptrobryor.

Bruch, Schimp. & Gümb. 1845. Bryol. eur. Fasc. 25—28: g. Grimmiacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 156. — Bayrh. 1849. Taun. p. 13.

Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: g. Racomitriear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Grimmiear.

C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 806 (*Rhacomitrium*): sect. Grimmiae.

Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 75: g. Grimmiar. Sect.: Dryptodon, Racomitrium.

Racopilaceae Wils. 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 120: trib. Pleurocarpor. Gen.: Racopilum.

Racopilum*) Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 36. 87; 1822. Mém. soc. Linn. I. p. 469: nov. g. Diplopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 227.

Agdh. 1822. Aphor. p. 109: g. Muscor. — Par. Schwägr. 1830. Suppl. III. 2. Sect. 2. t. 278. — Hornsch. 1833 in Endl. Norf. p. 4. (frondosor.)

Brid. 1822. Meth. musc. p. 52: g. Peristomor. pleurocarpor.

Brid. 1827. Bryol. II. p. 718: g. Hypophyllocarpor. (peristomor.) — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60. — Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 92. — Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 119; 1847. Linnaea XX. p. 94.

Brid. 1827. Bryol. p. XLVI: g. Jungermannioideor.

Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 538: g. Hypophyllocarpior.

Endl. 1836. Gen. n. 588. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 966: g. Calyptrobryor.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypopterygiear.

C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 11 (*Rhacopilum*): sect. Hypopterygii.

Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 120: g. Racopilacear.

Synon. Aubertia Palis. olim.

Racoplaca Fée 1825. Meth. Lich. p. 43. t. 2. f. 5: nov. g. Squammariear. epiphyllar. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 40. p. 105.

Endl. 1836. Gen. n. 387 *b*. p. 33; 1841. Ench. p. 19: sect. Strigulae? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 292. 2.

Racosperma Wittst. vid. *Rhacosperma Mart.*

Racotheca Wittst. vid. *Rhacotheca Bisch.*

*) ῥάκος, lacerus; πῖλος, pileus.

Racoubea Aublet 1775. Guian. I. p. 589. t. 236: nov. g. Polyandr. Trigyn. (R. guianensis.)
Endl. 1839. Gen. n. 5086 *b*. p. 923; 1841. Ench. p. 481: sect. Homalii.
Rchb. 1841. Nom. p. 177. n. 6866. 2: sect. Acomae.
Synon. Lagunezia Scop.

Radackia „Cham. & Endl. Fl. ins. Radack mss." Meisn. 1837. Comm. p. 69: nov. g. Cassicar. (indescriptum.)

Radamaea Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 509; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: nov. g. Gerardiear. verar. (Centranthera prostrata Boj.)

Raddia Bertol. .... Opusc. scient. Bologna III. p. 40.
= Olyra Linn.

Raddia Lindl. vid. *Radia A. Rich.*

Raddisia*) Leandro de Sacram. 1821. Denkschr. Ak. Münch. VII. p. 237: nov. g. Triandr. Monogyn. *Cf.* Schrank ibid. p. 244. — Par. Schult. 1822. Mant. I. p. 253.
DC. 1824. Pr. I. p. 570: g. Hippocrateacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 380. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 627. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 398. — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40).
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5384; 1837. Hdb. p. 301: g. Hippocratear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 179.
= Tontelea Aubl.

Rademachia Necker vid. *seq.*

Radermachia**) Thunb. 1776. Vet. Ac. Handl. XXXVI. p. 252 (*Rademachia*? ex Neck. et Reuss Rep. Comm. p. 91); 1781. Nov. gen. I. p. 24: nov. g. Monoec. Monandr.
Neck. 1790. El. III. p. 295. n. 1693 (*Rademachia*): g. Emproophytor.
= Artocarpus Forst.

Radia A. Rich. 1822 in Kunth Syn. pl. aequin. I. p. 300: g. Bromeliacear. (*Campderia A. Rich.*) — Par. Lindl. 1847. Bot. Regist. XIII. n. 1068 (*Raddia*)?
= Vellosia Vand. (Kunth Syn. IV. Corrig.)

Radia Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 36: subg. Thelaiae. (Pyrola occidentalis R. Br.)

Radiales Batsch 1802. Tab. affin. p. 131: ordo Liliacear. Fam.: Alliaceae, Melanthia, Melanoja.

Radiana Rafin. 1814. Specch. I. p. 88.
= Cypselea Turp.

Radiata Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 208: nov. g. ex typo Medicaginis radiatae L.

Radiatae Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 710: div. Corymbiferar. Gen.: Buphthalmum, Achillea, Chamaemelum, Matricaria, Pyrethrum, Caltha, Bellis; Bellidastrum, Erigeron, Aster, Solidago, Senecio, Arnica, Doronicum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 1: class. I. herbar. Typus: Helianthus.
Scop. 1777. Intr. p. 129: div. gentis secundae Compositar. Gen. §. 1: Solidago, Erigeron, Aster, Limbarda, Gorteria, Cineraria, Brachyoglottis; Lidbeckia, Othonna, Tagetes, Pectis, Helenium, Leysera, Matricaria, Bellium; Bellis, Hippia, Chrysanthemum, Osteospermum, Calendula, Cotula. §. 2: Tridax, Amellus; Verbesina, Coreopsis, Zinnia, Bailliaria, Silphium; Melampodium, Helianthus, Chrysogonum, Rudbeckia, Borrichia, Wedelia; Pardisium; Achillea, Anacyclus, Buphthalmum, Anthemis, Milleria, Micrelium, Polymnia, Encelia, Niebuhria, Parthenium, Eclipta, Sigesbeckia, Osmites. §. 3: Arnica, Arctotis, Zoëgea, Doronicum, Iva, Eriocephalus. §. 4: Seriphium, Corymbium.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 419: div. Compositiflorar.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 110: ordo Syngenesiae. Gen.: Bellis, Matricaria, Chrysanthemum, Pyrethrum, Jacobaea, Tussilago, Erigeron, Solidago, Aster, Pulicaria, Arnica, Doronicum, Achillea, Chamaemelum, Anthemis, Helianthus.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 886: sect. Synantherar. Typi subsectionum: Calendula, Aster, Artemisia, Helianthus.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 559: ordo 4 Compositar. Gen.: Conyza, Doronicum, Arnica, Inula, Erigeron, Solidago, Aster, Cineraria, Senecio, Boebera, Podolepis, Amellus, Starkea, Tridax, Tessaria, Munnozia; Leyssera, Rhanterium, Balbisia, Senecillis, Telekia; Bellium, Tagetes, Schlechtendalia, Donia, Heterospermum, Dysodia, Pectis, Schkuhria, Rosenia, Zinnia, Boltonia, Verbesina, Galinsogea, Helenium, Sanvitalia, Oedera; Bellis, Matricaria, Chrysanthemum, Pyrethrum, Lidbekia, Madia, Relhania, Georgia, Anthemis, Achillea, Nestlera, Eclipta, Siegesbekia, Tetragonotheca, Guardiola, Phaëthusa, Acmella, Pascalia, Ximenesia, Buphthalmum, Heliopsis; Helianthus, Galardia, Rudbekia, Cosmea, Coreopsis, Osmites, Tithonia, Pallasia, Sclerocarpus, Berkheya, Ursinia; Gorteria, Gazania, Cullumia, Cryptostemma, Didelta, Arctotheca; Calendula, Milleria, Chrysanthellum, Baltimora, Silphium, Polymnia, Wedelia, Bailleria, Chrysogonum, Melampodium, Arctotis, Osteospermum, Othonna, Eriocephalus, Iva, Parthenium.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 360: trib. 4 Syngenesiae. Gen. §. 1: Conyza, Erigeron, Inula, Aster, Solidago, Diplostephium, Boebera, Podolepis, Cineraria, Senecio, Werneria, Munnozia, Arnica, Doronicum, Apatanthus; Balbisia, Leyssera, Athrixia, Ptilostephium, Rhanterium, Kaulfussia, Senecillis; Tagetes, Bahia, Achyropappus, Schkuhria, Pectis, Bellium, Calotis, Helenium, Actinea, Brachyachyris, Oedera, Amellus, Grindelia, Gerbera, Tragoceros, Heterospermum, Verbesina, Zinnia, Rosenia, Boltonia, Galinsogea, Ferdinanda, Sanvitalia, Wedelia, Feaea, Leontophthalmum; Bellis, Matricaria, Chrysanthemum, Pyrethrum, Centrospermum, Cacosmia, Lidbeckia, Mnesitheon, Madia, Nestlera, Relhania, Jägeria, Phaë-

---
*) Dicat. Raddi, Florent.
**) Dicat. Joach. Corn. Math. Radermacher.

Radiatae Hall. cont.
thusa, Siegesbekia, Acmella, Anthemis, Achillea, Meyera, Pascalia, Eclipta, Diomedea, Heliopsis, Buphthalmum, Ximenesia, Tetragonotheca. §. 2: Arctotheca, Cryptostemma, Gazania, Gorteria, Berkheya, Cullumia, Ursinia, Didelta, Sclerocarpus, Pallasia, Gymnoloma, Georgia, Calliopsis, Eriocoma, Osmites, Rudbekia, Coreopsis, Cosmea, Viguiera, Helianthus, Galardia, Leptopoda, Balduina, Tithonia. §. 3: Melampodium, Millera, Unxia, Iva, Baltimora, Eriocephalus, Chrysogonum, Guardiola, Parthenium, Polymnia, Collaea, Calendula, Espeletia, Baillieria, Othonna, Osteospermum, Silphium, Arctotis. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 627. Gen. fere ead. et in §. 1: Calistemma, Podolepis, Tridax, Phialis, Mataxa, Wahlenbergia, in §. 2: Mussinia.
Rchb. 1841. Nom. p. 79: sect. Amphigynanthar. Subsect.: Calendulariae, Anthemideae, Astereae.

Radiati Linn. 1747. Class. pl. p. 356: nomen class. XIV. Tournefortianae. Gen.: Aster, Solidago, etc.

Radicalia Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. p. 1: ordo 1 Cryptogamiae. Gen.: Marsilea, Salvinia, Pilularia, Isoëtes.

Radicula Dillen. 1719. Nov. gen. p. 121. t. 6: g. ducibus Dodonaeo et J. Bauhino pro Raphano aquatico institutum.
Mönch 1794. Meth. p. 262: g. Thalamostemonis. (Sisymbrium sylvestre L.)
Vent. 1799. Tabl. III. p. 104: g. Cheiranthoidear.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 126: sect. Roripae.
= Brachylobos DC.

Radiola*) Dillen. 1717. Ephem. nat. cur. Cent. 5 et 6. App. p. 63. t. 9; 1719. Nov. gen. p. 126. t. 7: nov. g. plant.
Roth 1788. Germ. I. p. 71; 1789. II. p. 199: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 289. — Rebent. 1804. Neom. p. 76. — Pers. 1805. Ench. I. p. 153. n. 345. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Flora I. p. 869. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 377. 462.
Mönch 1794. Meth. p. 288: g. Thalamostemonis.
Hedw. 1806. Gen. p. 84. n. 387: g. Caryophyllear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 37. 517. n. 610. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 837 (anomal.); 1825. Syst. I. p. 498. n. 565.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 641: sect. Lini. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 57 (41).
DC. 1824. Pr. I. p. 428: g. Linear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 210. n. 5463; 1832. Fl. exc. p. 831. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 116. n. 589. — Bartl. 1830. Ord. p. 351. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 458. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 283. — Koch 1836. Syn. p. 129. Ed. II. p. 141. — Kunth

*) Nomen ob capsulas rotatim radiatimque dispositas.

Radiola Dillen. cont.
1838. Berol. I. p. 139. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 553. — Endl. 1840. Gen. n. 6057. p. 1171; 1841. Ench. p. 623. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 427. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 119. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 284.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Linidear.
Link 1831. Hdb. II. p. 233: g. Linoidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 306; 1841. Nom. p. 210. n. 7983: g. Radiolear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 485: g. Linacear.
Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 593; 1848. ibid. VII. p. 165: g. Eulinear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 94.
Synon. Linoides Rupp.; Linokarpum Mich.; Millegrana Adans.

Radioleae Rchb. 1837. Handb. p. 306; 1841. Nomencl. p. 210: subdiv. Linear. Gen.: Radiola.

Radiusia*) Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3884: g. Astragalear. *Cf.* Vogel 1838. Linnaea Litt. p. 4.
Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57): sect. Sophorae.
Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6042: g. Sophorear.
= Pseudosophora DC.

Radojitskya Turczan. 1852. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 176: nov. g. Thymelaeacear., Passerinae proximum. *Cf.* Flora 1853. II. p. 742.
= Lachnaea Linn.

Radula Dumort. 1822. Comm. bot. p. 112: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. complanata, umbrosa, asplenioides, tridenticulata, etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69; 1831. Syll. Jungerm. p. 37: g. Jungermanniear. Sect. (1831): Radulotypus, Scapania, Plagiochila.
= Radula, Scapania et Plagiochila Nees.

Radula Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 100: g. restrict. Lejeuniar.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 14: g. Radulear.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 92: g. Lejeunear.
Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 143; IV. p. XXVI: g. Jubulear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/13. p. 1341; 1841. Ench. p. 28. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 822.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 51; 1842. Pl. cell. Cub. p. 457; 1849 in Orb. Dict. X. p. 697: g. Jungermanniear.
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 253: g. Platyphyllar. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 22. — Bayrh. 1849. Taun. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Jubulidar.
Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 232: g. Porellear.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 154: g. Hepaticar. foliosar.
Synon. Martinellius Gray; Radulotypus Dumort.; Candolleae Raddi pars.

*) Dicat. J. W. M. Radius, prof. Lipsiensi.

Radula DC. 1838. Revis. Bignon. p. 8: sect. Bignoniae.
= Pithecoctenium Mart.

Radula Miquel 1844. Syst. Piperac. II. p. 426; 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 452; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 43: sect. Artanthes. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 17. n. $1823/_{11}$ *d*.

Radularii Rchb. 1828. Consp. p. 14: subdiv. Hydneor. Gen.: Gyrolophium, Radulum, Irpex, Sistotrema, Cyclomyces, Hydnum, Fistulina.

Raduleae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 13: trib. Jungermanniotypar. Gen.: Radula, Scapania, Plagiochila.

Radulotypus Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 38: sect. Radulae. (Jungermannia complanata.)
= Radula Nees.

Radulum Fries 1825. Pl. homon. p. 81; 1838. Epicr. p. 524: nov. g. Hydneor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 438. p. 39; 1841. Ench. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 468. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 177. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 401. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 167. — Bail 1858. Syst. p. 23. t. 29.
Fries 1828. Elench. I. p. 148: g. Pileator. — Par. Spreng. 1831. Gen. syst. II. p. 764. n. 3904.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 329: g. Radularior.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 328: g. Hydnaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 322: sect. Hydni.

Raetam Webb 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 278: subg. Retamae. (Genista Raetam Forsk.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 507.

Raffenaldia*) Godron .... Fl. juv. p. 5; .... ed. II. p. 52: nov. g. Raphanear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 220.
Synon. Cossonia Dur.

Raffleseae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 93: sect. Rafflesiacear. Gen.: Rafflesia, Sapria, Brugmansia.

Rafflesia**) R. Brown 1820. Linn. Trans. XIII. 1. p. 201 (Verm. bot. Schr. II. p. 605): nov. g. Asarineis aff.? (R. Arnoldi.) *Cf.* Isis 1823. p. 1367. t. 20 et Nees 1826 in R. Brown Verm. bot. Schr. II. p. 761.
Brongn. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 39 (Isis 1825. p. 1302): g. Cytinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1685. — Link 1829. Hdb. I. p. 368.
Blume ex Nees 1825. Flora II. p. 609; 1828. Fl. jav. fasc. I. p. 7. t. 1—3; 1833. Nov. fam. exp.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 90: g. Rhizanthear. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 8. n. 3209; 1831. Gen. II. p. 715. n. 3599.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 353: g. Dioec. Monadelph.

*) Dicat. Raffeneau-Delile, Monspeliensi.
**) Dicat. Stamford Raffles, gubernatori Sumatrae.

Rafflesia R. Brown cont.
Agdh. 1826. Aphor. p. 243: g. Hydnorinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: g. Rafflesiacear. — Par. Schott 1832. Melet. p. 14. — Endl. 1836. Gen. n. 727. p. 76; 1841. Ench. p. 54. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 554. — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275).
Bartl. 1830. Ord. p. 81: g. Cytineis aff.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum?
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): g. Palmacear.
Jack 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 259: g. Dioec. Gynandr.
Rchb. 1837. Hdb. p. 164; 1841. Nom. p. 61. n. 2331: g. Rafflesiear. — Par. R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. 3. p. 242. (Flora 1848. II. p. 539.) — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 512.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 93: g. Rafflesear.

Rafflesiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. 14: fam. Cytinariear. Gen.: Rafflesia, Rhizanthes.
Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 14: ordo Rhizanthear. Gen.: Brugmansia, Rafflesia. — Par. Lindl. 1833. Nix. p. 36. — Endl. 1836. Gen. p. 75; 1841. Ench. p. 53. Gen. ut Schott et Frostia, Apodanthes? — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275). Gen.: Pilostyles, Brugmansia, Rafflesia.
Mart. 1835. Consp. p. 18: ordo 105.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 392.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 551: trib. Cytinear. Gen.: Pilostyles, Rhizanthes, Rafflesia, Apodanthes?
R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. 3. p. 241 (Flora 1848. II. p. 539): ordo plant. Trib.: Rafflesieae, Hydnoreae, Cytineae, Apodantheae. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 512. (Rhizanthear.) Subord. iid.
Griff. 1842. Linn. Trans. XIX. p. 303. (Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 302.) Novum gen.: Sapria.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 115: fam. Asarinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 93: ordo Rhizogenar. Sect.: Raffleseae, Apodantheae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 698. Trib. ut Lindl.

Rafflesieae Rchb. 1837. Handb. p. 164: div. Cytinear. Gen.: Frostia, Zippelia, Rafflesia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 61. Gen.: Frostia, Mycetanthe, Rafflesia.
R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. 3. p. 242: trib. Rafflesiacear. Gen.: Rafflesia, Sapria, Brugmansia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 698. Gen. ead. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 512. Gen. ead.

Rafinesquia*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 429: nov. g. Scorzonerear., Tragopogoni aff. (P. californica.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 473. — Endl. 1842. Spl. II. p. 50. n. $2995/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 348.

*) Dicat. C. S. Rafinesque-Schmaltz, botanico.

Rafnia*) Thunb. 1800. Nov. gen. X. p. 144; 1800. Prodr. II. p. 123. 193; .... Fl. cap. p. 563: nov. g. Diadelph. Decandr. (Crotalaria amplexicaulis.) — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 949. n. 1335. — Pers. 1807. Ench. II. p. 280. n. 1683.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 216: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 354. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 229. n. 2538; 1831. Gen. II. p. 579. n. 2837.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 749: g. Spartiear.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 482. Sect.: Vascoa, Rafnia, Pelecynthis. — Endl. 1840. Gen. n. 6459. p. 1260; 1841. p. 667. Sect.: Vascoa, Rafnia. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5899. Sect. eaed. — Walp. 1842. Rep. I. p. 578. Sect. eaed. (*Cf.* Walp. Rep. II. p. 833.) — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 458. 463. Sect.: Vascoa, Eurafnia, Pelecynthis, Caminotropis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Borboniear.
Synon. Oedmannia Thunb.

Rafnia DC. 1825. Prodr. II. p. 118: g. restrict. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4050. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 129. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153.
Endl. 1840. Gen. n. 6459 *b.* p. 1261; 1841. Ench. p. 667: sect. Rafniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5899. 1.

Rafnia E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 11: g. Genistear. ulterius restrict. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59).
Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 463: sect. Rafniae.
= Eurafnia Benth.

Ragadiolus Beckm. vid. *Rhagadiolus Tourn.*

Ragadogonieae Klotzsch 1857. Bot. Zeit. p. 181: trib. Gymnocarpear. Gen.: Sphenanthera.

Ragatelus Presl 1843. Hymenoph. p. 108: nov. g. Trichomanear. (Trichomanes crinitum Sw.)

Ragiopteris**) Presl 1836. Pterid. p. 95: nov. g. Cystopteridear. (Onoclea sensibilis W.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 629 *b.* p. 1348; 1841. Ench. p. 36: sect. Onocleae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1017. 2.
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. IV. p. 186 genus e diversis frondibus errore constitutum censet. *Cf.* Fée Gen. Fil. p. 358.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
= Calypterium Bernh.?

Raiania Scopoli 1777. Introd. p. 99: g. Disparium.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 148: g. Hexandr. Trigyn.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 42. t. 14. f. 1.
= Rajania Linn.

Raillarda Endl. 1838. Gen. n. 2815. p. 460; 1841. Ench. p. 245: g. Eusenecionear. — Par. Meisn. 1839. Comm. p. 136.

*) Dicat. R. G. Rafn, prof. Hafniensi.
**) ῥάξ, ῥαγός, bacca.

Raillarda Endl. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32: g. Othonnear.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3372: g. Senecionear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
= Railliardia Gaudich.

Raillardia Spreng. vid. *Railliardia Gaudich.*

Railliarda DC. 1837. Prodr. VI. p. 440: g. Eusenecionear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 214.
= Railliardia Gaudich.

Railliardia*) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 469. t. 83: nov. g. Senecionear. (R. linearis.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 796. n. 4129 (*Raillardia*): g. Eupatorinar.
Synon. Railliarda DC.; Raillarda Endl.

Raineria De Notar. .... Syll. Musc. p. 1.
Endl. 1841. Spl. I. n. 505/3. p. 1345; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 883: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Splachnear.
= Tayloria Hook.

Rajana Ritgen vid. *seq.*

Rajania**) Linn. 1737. Gen. p. 306. n. 753; 1737. Cliff. p. 458; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. I. p. 1023; 1759. Syst. ed. X. p. 1293. n. 994; 1763. Sp. ed. II. p. 1461; 1764. Gen. ed. VI. p. 525. n. 1121; 1767. Syst. ed. XII. p. 655: p. Dioec. Hexandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 744; 1784. Syst. p. 888. — Reich. 1778. Gen. p. 520. n. 1226. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 692. n. 1529. — Pers. 1797. Syst. p. 930; 1807. Ench. II. p. 620. n. 2236. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 787. n. 1801.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 75. n. 317: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 154. n. 1381.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Juss. 1789. Gen p. 43: g. Asparagor.
Neck. 1790. El. III. p. 116. n. 1452: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 580: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Swartz 1797. Ind. occ. I. p. 638.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 149: g. Smilacear. Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 107. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 221.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
Link 1822. En. II. p. 427: g. Smilacinar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 170: g. Dioscorinar. Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 131 (*Rajana*).
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 357: g. Asparaginear.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1337; 1841. Nom. p. 48. n. 1745: g. Dioscorear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 291. n. 1508. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1200. p. 158; 1841. Ench. p. 92. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048.

*) Dicat. L. Railliard.
**) Dicat. Joh. Rajo, Anglo, botanico incomparabili. (Ht. Cliff.)

Rajania Linn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: g. Dioscoridear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 200.
Herb. 1837. Amaryll. p. 68. 123: g. Agavear.
Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308): g. Dioscoracear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 214: g. Dioscoreacear.
Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 68; 1850. Enum. V. p. 445: g. Dioscorinear.
Synon. Jan-Raia Plum.; Janraja Adans.; Raiania Scop.

Rajania Walt. 1788. Fl. Carolin. p. 53. 247: g. Dioec. Hexandr. (R. ovata.)
= Brunnichia Banks.

Raleighia*) Gardner 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 97: nov. g. Bixacear., a Benth. (ibid. in not.) ad Cunoniaceas prope Belangeriam translatum.
Walp. 1846. Rep. V. p. 834: g. Cunoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 572: g. Belangerear.

Ralfsia**) Berkeley .... Engl. Bot. Suppl. t. 2866: nov. g. Algar., ab Endl. (1843 Spl. III. p. 26) ad Hildenbrandtiam Nardo reductum.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124 (sph. *Rulfsia*): g. Dictyotear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 361.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 61: g. Chordariear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: g. Myrionemear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 543. n. 352: g. Mesogloeacear.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 130: g. Chordariacear.

Ramalina***) Achar. 1810. Lich. univ. p. 122. 598; 1814. Syn. Lich. p. 293: nov. g. Scutellator. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 426.
Mart. 1817. Erlang. p. 234: g. Lichenum scutellator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 406: g. Ramalinidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 117. — Körb. 1846. Lich. eur. spec. p. 3; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 38. — Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12. (Flora 1854. p. 234.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 187: g. Hymenocarpor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 829: sect. Lichenis.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 403; 1841. Nom. p. 16. n. 563: g. Usneacear. — Par. Fries 1831. Lich. eur. p. 1. 28; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 144. Sect.: CornicularIae, Dufoureae, Physciae.
Genth 1836. Nass. I. p. 327: g. Parmeliacear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 98.

*) Dicat. Sir Walter Raleigh, peregrinatori quondam inclyto.
**) Dicat. John Ralfs, botanico anglico.
***) Ramale: ob similitudinem thalli cum ramulis siccis.

Ramalina Achar. cont.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 234: g. Parmeliear. — Par. Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 212.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Usneidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349: g. Usneear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 61: g. Peltopsorar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 7: g. Cornicularior.
Math. 1853. Belg. II. p. 108: sect. Physciae.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 353: g. Usnear.
Arnold 1858. Flora p. 103: g. Everniear.
Synon. Platyphyllum Vent.; Ramallina Fries.

Ramalineae Agardh 1821. Aphor. p. 93; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Lichenum. Gen.: Sphaerophoron, Roccella, Evernia, Dufourea, Alectoria, Ramalina, Cornicularia, Usnea.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Cetraria, Roccelia, Borrera, Evernia, Ramalina.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 113: fam. Peltopsorar. Gen.: Cetraria, Hagenia, Evernia, Ramalina.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 3: fam. Lichenum heteromericor. acroblastor. Gen.: Ramalina, Evernia, Anaptychia, Cetraria.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12 (Flora 1854. p. 234): trib. Intricatar. Gen.: Alectoria, Evernia, Ramalina, Dufourea.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 38: fam. Thamnoblastor. Gen. ut antea.

Ramalinideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 395. 404: div. Homothalamear. Gen.: Cornicularia, Ramalina, Alectoria.

Ramallina Fries 1825. Pl. homon. p. 237: g. Usneacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 177. p. 16; 1841. Ench. p. 11.
= Ramalina Achar.

Ramantuella Walp. vid. *Ramatuella Poir., DC.*

Ramaria Holmsk. 1790. Coryph.; 1796 in Usteri n. Ann. XI. p. 118: nov. g. Coryphaeor. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 426.
Pers. 1801. Syn. p. XVIII. 585: sect. Clavariae. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 98. — Fries 1818. Obs. myc. II. p. 268; 1821. Syst. myc. I. p. 468; 1838. Epicr. p. 571; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 337. — Endl. 1836. Gen. n. 415 *b.* p. 36; 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 430. 1. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 321.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 52: g. Dermatothecior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 655: g. Clavaridear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 166: g. Clavariaceor.
Synon. Cladaria Ritg.

Ramatuela*) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 253. t. 656: nov. g. Combretacear. (R. argentea.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 255.
Conf. seq.

Ramatuella Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 426: g. Combretacear.

*) *Ramatuelle* in bibl. Banks. Dicat. botanico, antistiti Ramatuel.

Ramatuella Poir. cont.
DC. 1828. Pr. III. p. 16: g. Terminaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4539; 1841. Nom. p. 171. n. 6601. — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 661. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 296. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (79). — Endl. 1840. Gen. n. 6080. p. 1181; 1841. Ench. p. 632. — Walp. 1843. Rep. II. p. 63 (*Ramantuella*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718; g. Terminalear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132: g. Myrobalanear.
= praeced.

Ramirezia A. Rich. Fl. Cub. t. 39.
= Pöppigia Presl.

Ramonda Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 216. n. 491: g. Solanacear.
Hedw. 1806. Gen. p. 104. n. 467: g. Personatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Verbascinear.
= seq.

Ramondia*) Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 280: g. Personatar. — Par. Link 1821. En. I. p. 175.
DC. 1805. Franç. III. p. 606: g. Solanear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 459; 1825. Syst. I. p. 583. n. 629; 1830. Gen. I. p. 142. n. 711. — Lois. 1826. Dict. v. 44. p. 430. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 646.
Willd. 1809. En. p. 223: g. Pentandr. Monogyn.
Schrad. 1813. Mon. gen. Verbasci.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVII. 185. n. 670: g. Scrophulariar.
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3278; 1831. Fl. exc. p. 388: g. Daturear.
Link 1829. Hdb. I. p. 558: g. Scrofularinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Beslериear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 498: g. Verbascinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Cyrtandrear.
Endl. 1839. Gen. n. 4024. p. 695; 1841. Ench. p. 341: g. Scrophularineis aff. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Walp. 1845. Rep. III. p. 438. 973.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (212): p. Ramondiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4690. — DC. 1845. Pr. IX. p. 272.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 57: g. Hydroleacear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 506: g. Ramondiacear.
Synon. Ramonda Rich.; Myconia Lapeyr.; Chaixia Lapeyr.

Ramondia Mirbel .... Bull. soc. philom. XI. p. 179.
= Lygodium Swartz.

Ramondiaceae (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 506: ordo plant. Gen.: Ramondia.

*) Dicat. L. F. E. de Ramond de Carbonnières, professori.

Ramondieae DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 302 (212): subtrib. Didymocarpear. Gen.: Henckelia, Rhynchoglossum, Ramondia, Haberlea, Loxonia, Loxophyllum, Klugia, Glossanthus. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 272. Gen.: Ramondia, Haberlea, Conandron.
Rchb. 1841. Nom. p. 120: sect. Cyrtandrear. Gen.: Ramondia, Haberlea, Rehmannia.

Ramontchi Endl. 1839. Gen. n. 5079 *a*. p. 921; 1841. Ench. p. 479: sect. Flacourtiac. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 205.
= Stigmarota Lour.

Ramphicarpa Rchb., Wight vid. *Rhamphicarpa Benth.*

Ramphidia Lindl. .... Journ. Proc. Linn. I. p. 181: nov. g. a Goodyera sejunctum.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 730: g. Physuridar.

Ramphocarpus*) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 438. n. 1269: g. Comizophytor., a Geranio L. sejunctum.

Ramphospermum „Andrz." Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LVII; 1828. ibid. II. p. 1104. 1186 (*Rhamphospermum*); 1828. Consp. p. 185. n. 4815: g. Brassicear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 15 (13. 341: *Rhamphospermum*). — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 182 (*Rhamphosperma*).
Bartl. 1830. Ord. p. 265: g. Siliquosar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 693; 1841. Nom. p. 183. n. 7041. 3: sect. Sinapios.
= Leucosinapis DC.

Ramspekia Scopoli 1777. Introd. p. 145. n. 543: g. Opulinar.
Neck. 1790. El. I. p. 136. n. 234: g. Sphanidophytor.
= Posoqueria Aubl.

Ramtilla DC. 1834 in Wight Contrib. bot. ind. p. 18.
= Guizotia Cass.

Ramularia Roussel 1806. Fl. Calvad., teste Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 144. (Ulva Lactuca etc.)
= Ulvastrum DC.

Ramularia Unger 1835. Exanth. Pfl. p. 169. t. 2.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 7; 1842. Mycol. p. 23: g. Sporotrichacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 77: g. Sporotrichor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 493: g. Trichosporeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.
= Sporotrichum Link?

Ramusia E. Meyer 1838. Cat. pl. Dreg. (indescript.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Acanthacear. minus notum.
= Asystasia Blume.

Ramusia Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 309: nov. g. Gendarussear. (Justicia tridentata E. Mey.)

Ranales Lindl. 1833. Nix. plant. Ed. germ. p. 14: nixus Albuminosar. Ordines: Ranun-

*) ῥάμφος, rostrum curvum.

Ranales Lindl. cont.
culaceae, Papaveraceae, Nymphaeaceae, Nelumboneae, Cephaloteae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 416: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Magnoliaceae, Anonaceae, Dilleniaceae, Ranunculaceae, Sarraceniaceae, Papaveraceae.

Ranaria Chamisso 1833. Linnaea VIII. p. 30: nov. g. Scrofularinear. (R. monnierioides.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 547: g. Gratiolear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269.
Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222): sect. Herpestis.
= Caconapaea Benth. pt.

Rancagua*) Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 15. t. 24. 25: nov. g. Tagetineas cum Flavericis connectens. (Tagetes Fevillei Bert.)
Endl. 1838. Gen. n. 2614. p. 424; 1841. Ench. p. 240: g. Euheleniear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 180.
Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3204: g. Heleniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
= Lasthenia Cass.

Randalia Petiv. 1704. Gazophyl. t. 53.
„Palis. mss." Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. 47. t. 5. f. 2: g. Eriocaulonear. (Eriocaulon decangulare, etc.) *Cf.* Kunth 1841. Enum. III. p. 543 adnot.
= Nasmythia Huds.

Randia**) „Houst." Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 485; 1742. Gen. ed. II. p. 523. n. 1014; 1753. Sp. II. p. 1192: g. incertae sedis.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 214. n. 894: g. Petalostemonum.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 143: g. Tetrandr. Monogyn.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 920. n. 194; 1762. Sp. ed. II. p. 213; 1764. Gen. ed. VI. p. 85. n. 211; 1767. Syst. ed. XII. p. 154. n. 210: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 166; 1784. Syst. p. 197. — Reich. 1778. Gen. p. 87. n. 225. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 111. n. 275. — Gmel. 1791. Syst. p. 335. — Pers. 1797. Syst. p. 204. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 68. t. 220. (reform.) — Hedw. 1806. Gen. p. 145. n. 626. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 144; ed. 1832. I. p. 525.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 199; 1820. Mém. Mus. VI. p. 392. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 572. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 436. — Pers. 1805. Ench. I. p. 199. n. 444. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVIII. 246. n. 923. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 332 (*Gratgal*). — Link 1821. En. I. p. 226. — Kunth 1824. Syn. III. p. 59. (sect. VI.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 981. — Benth. 1849. Niger Fl. p. 382. Sect.: Ceriscus, Genipantha, Oxyceras, Euclinia.
Adans. 1763. Fam. II. p. 147: g. Aparinium.
Rüling 1774. Ord. p. 34 (*Rhandia*): g. Fraxinos et Loniceras conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 145: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 128. t. 26. f. 6 (aculeata).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 294; 1789. Phil. Bot. I. p. 141.
Neck. 1790. El. II. p. 52. n. 691: g. Arcythophytor.
Swartz 1791. Obs. bot. p. 61: Gardeniae injungit.
Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 138. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2084.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 409: g. Gardeniacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Cham. 1834. Linnaea IX. p. 246.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
DC. 1830. Pr. IV. p. 384: g. Gardeniear. Sect.: Oxyceros, Euclinia. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 499. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 396. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 414. Subg.: Oxyceras. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2961. (genuinar.) Sect.: Randia, Euclinia. — Brongn. 1843. En. genr. p. 50. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 712.
Endl. 1838. Gen. n. 3304. p. 561; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear. Sect. ut DC. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 518. 943; 1847. VI. p. 73. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 134.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 799: sect. Solenae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 226: g. Randiear.
Synon. Oxyceros Lour.; Ceriscus Gärtn.; Talangninia Chapel.

Randieae (Klotzsch 1853) Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 197: subtrib. Gardeniear. Gen.: Zuccarinia, Lucinaea, Lecananthus, Psilobium, Platymerium, Gonyanera, Petunga, Stylocoryna, Griffithia, Pseudixora, Mussaenda, Adenosacme, Fernelia, Gynopachys, Urophyllum, Praravinia, Randia.

Rangium Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 200: g. Oleinear. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 644; II. p. 431.
= Forsythia Vahl?

Ranmanissa Endl. 1839. Gen. n. 4988 *b.* p. 891; 1841. Ench. p. 456: sect. Polanisiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 185. n. 7105. 2.

Ranugia*) Schlechtend. 1851. Linnaea XXIV. p. 728. sect. Anguriae. An gen. proprium? (A. rhizantha Pöpp.)

Ranuncella Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 204: subg. Ranunculi. (R. aconitifolius, alpestris, parnassifolius, angustifolius.)
= Hecatoniae DC. pars.

*) Nomen chilense *Rancagua*.
**) Dixit hanc Houstonus a Johanne Randio, pharmacopoeo anglo. (Ht. Cliff.)

*) Anagramma nominis Anguria.

Ranunculaceae Juss. (1773. Rec. de l'Acad. d. sc.) 1789. Gen. p. 231: ordo 1 class. XIII. Gen. §. 1: Clematis, Atragene, Thalictrum, Hydrastis, Anemone, Hamadryas, Adonis, Ranunculus, Ficaria, Myosurus. §. 2: Trollius, Helleborus, Isopyrum, Nigella, Garidella, Aquilegia, Delphinium, Aconitum. §. 3: Caltha, Paeonia, Zanthorhiza, Cimicifuga. §. 4: Actaea, Podophyllum. (*Cf.* Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 472; 1827. Dict. v. 45. p. 43.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 52. Gen. fere ead.

DC. 1805. Franç. IV. p. 871: fam. (91) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Clematis, Thalictrum, Anemone, Hepatica, Ficaria, Adonis, Ranunculus, Myosurus, Trollius, Helleborus, Nigella, Garidella, Aquilegia, Delphinium, Aconitum, Caltha, Paeonia, Actaea. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 890. Typi sectionum: Clematis, Ranunculus, Helleborus, Delphinium, Paeonia, Actaea.

Biria 1811. Hist. d. Renonc. (Montpell.)

DC. 1818. Syst. I. p. 125 (1819. Théor. élém. p. 243): ordo 1 Thalamiflorar. Trib.: Clematideae, Anemoneae, Ranunculeae, Helleboreae, *spuriae* (gen.: Actaea, Zanthorhiza, Paeonia). — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 2. Trib. eaed. (Paeoniaceae loco Ranunculacear. spuriar.) — Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 2. Trib. ut DC. 1824. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 2. Nova tribus: Myosuroideae.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 708: fam. Thalamiflorar. Divis. ut DC. 1818.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamunguliae.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 588: ordo Polycarpellar.

Bartl. 1830. Ord. p. 252: ordo (142) Polycarpicar. Divis. ut DC. exclusis Paeoniaceis. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 1. 437 (3). Trib. ut DC. 1824. (Paeonieae loco Paeoniacear.) — Endl. 1839. Gen. p. 843; 1841. Ench. p. 433. Trib. eaed.

Link 1831. Hdb. II. p. 276: ordo 32 Allostemonum. Sect.: Aconiteae, Anemonideae.

Lindl. 1833. Nix. p. 14; 1847. Veg. kd. p. 425: ordo Ranalium. Subord.: Clemateae, Anemoneae, Ranunculeae, Helleboreae, Actaeeae.

Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 451. Sect.: Clematideae, Ranunculinae, Achlydeae?, Nandineae.

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 186: fam. (108) Polycarpicar. Trib.: Ranunculeae, Clematideae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. XXVI. 96: fam. Ranunculinear. Trib. ut Meisn.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 715: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Trib. ut DC.

Synon. Ranunculi B. Juss.; Ranunculeae Neck., St. Hil. *Cf. Ranunculinae Bernh.*

Ranunculaceae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LX: fam. Cyclospermar. Divis.: Ranunculeae, Anemoneae, Helleboreae, Magnoliaceae, Anonaceae, Dilleniaceae.

Ranunculaceae Rchb. cont.

Rchb. 1828. Consp. p. 191; 1832. Fl. exc. p. 717; 1837. Hdb. p. 275; 1841. Nom. p. 190: fam. Ranunculiflorar. Divis.: Ranunculeae, Dillenieae, Magnolieae (1841 Magnoliaceae).

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 50: fam. Ranunculariear. Trib. ut DC. 1824 et Delimaceae, Dilleniaceae.

Ranunculariae Rchb. 1837. Handb. p. 276: sect. Ranunculear. genuinar. Gen.: Batrachium, Ranunculus, Krapfia.

Ranunculariеae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam.: Ranunculaceae, Magnoliaceae, Anonaceae, Menispermaceae.

Ranunculastrum DC. 1824. Prodr. I. p. 27: sect. Ranunculi. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 731. — Presl 1826. Sicul. I. p. 12. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 972; 1828. Consp. p. 191. n. 4941 *b.* — Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 26. — Endl. 1839. Gen. n. 4783 *b.* p. 847; 1841. Ench. p. 434. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 28. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 303. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 35.

Webb 1836. Canar. I. p. 8: sect. Chrysobatrachii.

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 217: subg. Ranunculi.

Ranunculeae Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 482: ordo plant. Gen.: Helleborus, Adonis, Caltha, Anemone, Myosurus, Thalictrum, Ranunculus, Aquilegia, Delphinium.

St. Hil. 1805. Expós. I. p. 484. t. 68: fam. plant. Gen. Ranunculacear. Juss. 1789 et in §. 1: Anamenia. *Affine:* Nelumbium.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 730: fam. 78 plant. Divis.: 1. *verae.* Gen.: Ranunculus, Adonis, Anamenia, Hamadryas, Thalictrum, Rhynchotheca, Clematis, Atragene, Anemone, Pulsatilla, Hepatica, Hydrastis, Myosurus; 2. *descisc.:* Vallea, Paeonia, Cimicifuga, Xanthorrhiza, Caltha, Helleborus, Coptis, Isopyrum, Trollius, Garidelia, Nigella; Aquilegia, Delphinium, Aconitum.

Rchb. 1828. Consp. p. 191; 1832. Fl. exc. p. 718; 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190: div. Ranunculacear. Subdivis.: *genuinae* (1828 gen.: Myosurus, Ceratocephalus, Adonis, Hamadryas, Hydrastis, Knowltonia, Casalea, Batrachium, Ficaria, Ranunculus, Aphanostemma — 1837 sect.: Ceratocephaleae, Ficariae, Ranunculariae [1841 Ranunculeae *genuinae.* Gen.: Batrachium, Ranunculus, Oxygraphis]), Anemoneae, Helleboreae.

Conf. Ranunculaceae Juss.

Ranunculeae DC. 1818. Syst. I. p. 130. 228; 1824. Prodr. I. p. 25: trib. Ranunculacear. Gen.: Myosurus, Ceratocephalus, Ranunculus, Ficaria. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. Gen. ead. et Batrachium. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 24. Gen. ut DC. et Casalea, Aphanostemma. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). Gen.: Myosurus, Ceratocephalus, Casalea, Ranunculus, Callianthemum, Krapfia, Aphanostemma. — Spach

Ranunculeae DC. cont.
1839. Vég. phan. VII. p. 189. Sect.: Ranunculineae, Adonineae, Anemonineae. — Endl. 1839. Gen. p. 846. Gen.: Casalea, Ranunculus, Ceratocephalus, Ficaria. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1419 et Ench. p. 434) Oxygraphis et 1850 (Spl. V. p. 29) Hamadryas. — Brongn. 1843. En. genr. p. 97. Gen. ex DC. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 717. Gen. ut Endl. 1841.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 715: div. Ranunculacear. Gen.: Ficaria, Ranunculus, Batrachium, Myosurus. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX. Gen.: Myosurus, Ceratocephalus, Ranunculus. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. Gen.: Myosurus, Casalea, Aphanostemma, Ranunculus, Ficaria.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 451: subsect. Ranunculinar. Gen. ut Bartl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428: subordo Ranunculacear. Gen. ut Endl. 1841.

Ranunculi B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 38 plant. Gen.: Actaea, Clematis, Anemone, Atragene, Thalictrum, Adonis, Paeonia, Caltha, Myosurus, Ranunculus, Helleborus, Isopyrum, Trollius, Aquilegia, Delphinium, Aconitum, Garidella, Nigella.
Adans. 1763. Fam. II. p. 451: fam. 55 plant. Gen. §. 1: Delphinium, Aconitum, Aquilegia, Olfa, Helleboroides, Helleborus, Trollius, Paeonia, Populago, Damasonium. §. 2: Sagitta, Alisma, Scotanum (serius Ficaria), Ranunculus, Adonis, Myosuros, Oriba, Thalictrum, Isopyrum, Anemone, Pulsatilla, Muralta, Naravel, Clematis.

Ranunculiflorae Rchb. 1828. Consp. p. 191; 1832. Fl. exc. p. 651. 717; 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 190: formatio Schizocarpicar. Fam.: Ranunculaceae, Rutaceae, Sapindaceae.

Ranunculinae Bernhardi 1833. Linnaea VIII. p. 451: sect. Ranunculacear. Subsect.: Anemoneae, Ranunculeae, Helleboreae, Paeonieae.

Ranunculineae Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 1: subordo Ranunculacear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 190: sect. Ranunculear. Gen.: Myosurus, Ceratocephalus, Oxygraphis, Callianthemum, Pachyloma, Ficaria, Casalea, Aphanostemma, Hecatonia, Batrachium, Ranunculus, Cyprianthe.

Ranunculineae Brongn. 1843. Enum. genr. p. XXVI. 96: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Dilleniaceae, Ranunculaceae, Sarracenieae?

Ranunculoides Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 36: nov. g. plant.
= Batrachium DC.

Ranunculus*) Tourn. 1700. Inst. p. 285. t. 149: g. pl. class. VI., ab Auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 90. Ed. Hall. 1745. p. 101: g. pl. class. V.
Vaill. 1719. Act. Ac. Paris. p. 39. Distinguitur Ranunculoides.

*) Nomen ex Plinio. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 183.

Ranunculus Tourn. cont.
Linn. 1737. Gen. p. 165. n. 464; 1737. Cliff. p. 228; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 156; 1753. Sp. I. p. 548; 1759. Syst. ed. X. p. 1086. n. 619; 1762. Sp. ed. II. p. 772; 1764. Gen. ed. VI. p. 281. n. 699; 1767. Syst. ed. XII. p. 378: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 392. — Murr. 1774. Syst. p. 428; 1784. Syst. p. 515. — Reich. 1778. Gen. p. 286. n. 757. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 377. n. 953. — Gmel. 1791. Syst. p. 877. — Pers. 1797. Syst. p. 551; 1807. Ench. II. p. 102. n. 1363. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1307. n. 1086; 1809. En. p. 586. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 23. — Elliott 1821. Sketch II. p. 56. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 671.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 321: g. Gymnopolyspermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 115. n. 475: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 211. Sejunguntur Ficaria et Ceratocephala.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 111. — Gis. 1792. Prael. p. 376. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 343.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 459.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 201: g. Polyantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 186: g. Pentapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 482: g. Ranunculear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 488. — DC. 1818. Syst. I. p. 231. Sect.: Batrachium, Ranunculus. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 730; 1825. Syst. II. p. 645. n. 2037; 1830. Gen. I. p. 459. n. 2263. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 715. Sect.: Ranunculus, Leiosperma. (Excluditur Batrachium.) — DC. 1824. Pr. I. p. 26. Sect.: Batrachium, Ranunculastrum, Thora, Hecatonia, Echinella. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 730. Sect. ut DC. 1824. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4941; 1828 ap. Mössl. II. p. 906. 967. Sect.: Batrachium (in Consp. exclusum), Hecatonia, Ranunculastrum, Philonotis. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50 (*Renunculus*). Distinguitur Batrachium. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 25. Sect. ut DC. 1824. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 718. Sect.: Batrachium, Hecatonia, Ranunculus, Philonotis. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Koch 1836. Syn. p. 11. Ed. II. p. 12. Sect.: Batrachium, Hecatonia, Ranunculus. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Kunth 1838. Berol. I. p. 14. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 15. — Endl. 1839. Gen. n. 4783. p. 847; 1841. Ench. p. 434. Sect. ut DC. (1841 Philonotis loco Echinellae.) — Rchb. 1841. Nom. p. 190. n. 7221. (genuinar.) Sect.: Echinobatrachium, Hecatonia, Thora, Ranunculus, Krapfia. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 27. Sect. ex DC. — Walp. 1842. Rep. I. p. 33; 1843. II. p. 738; 1846. V. p. 4. — Brongn. 1843. En. genr. p. 97. — Fries

Ranunculus Linn. cont.
1846. Summ. veg. Scand. I. p. 25. Sect.: Hecatonia, Heliophthalmum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 18. Sect.: Batrachium, Vesicastrum, Euranunculus, Ranunculastrum, Brachybiastrum, Hecatonia. — De Vriese 1851. Pl. Jungh. I. p. 77. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 28. Sect. ex DC. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 16.
Scop. 1777. Intr. p. 258: g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 353. t. 74. f. 4 (muricatus).
Juss. 1789. Gen. p. 233: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 58. — DC. 1805. Franç. IV. p. 889; 1815. V. p. 636. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 41. — Link 1822. En. II. p. 94. — Kunth 1824. Syn. III. p. 114. — D. Don 1825. Nepal. p. 194. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 6. — Presl 1826. Sicul. I. p. 11. Sect.: Ranunculastrum, Hecatonia, Echinella. — Lois. 1827. Dict. v. 45. p. 45 (*Rénoncule*). — Gaud. 1828. Helv. III. p. 421. 521. Sect. ut DC. 1818. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 304. — Webb 1836. Canar. I. p. 5. Trib.: Leucobatrachium, Chrysobatrachium. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 312. Sect. ut DC. — Steud. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 263. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 755. Sect. ut Koch. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 8.
Neck. 1790. El. I. p. 311. n. 1087: g. Acascophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 47: g. Multisiliquosar.
Cram. 1803. Disp. p. 70 in Pentandr. Polygyn. (R. hederaceus) et p. 113 in Decandr. Polygyn. (parviflorus.)
Link 1831. Hdb. II. p. 388: g. Anemonidear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 3: g. Ranunculinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276: g. Ranunculariar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 302: g. Anemonear. Sect.: Batrachium, Hecatonia, Ranunculastrum, Euranunculus, Echinella.

Ranunculus (alatus) Poir. Dict. VI. p. 127 ex DC. Prodr. VI. p. 143.
= Solivae Ruiz & Pav. spec.

Ranunculus Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 203: g. Ranunculinear., valde restrict. Subgen.: Ranuncella, Thora, Flammula, Auricomus, Chrysanthe, Ranunculastrum.

Raoulia*) Hook. f. 1846 in Raoul Pl. Nouv. Zéel. p. 20; 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 134. t. 36 a: nov. g. Helichrysear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 238.

Rapa Tourn. 1700. Inst. p. 228. t. 113: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 75. Ed. Hall. 1745. p. 83: g. pl. class. IV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 417: g. Erucar.
= Brassicae Linn. pars.

Rapanea Aublet 1775. Guian. I. p. 121. t. 46: nov. g. Pentandr. Monogyn. (P. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 330.

*) Dicat. M. E. Raoul, medico gallico.

Rapanea Aublet cont.
Juss. 1789. Gen. p. 288: g. Berberidibus aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 88: g. Berberideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 130. n. 567.
Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 451: g. a Myrsine vix diversum.
= Myrsine A. DC.

Rapatea Aublet 1775. Guian. I. p. 305. t. 118: nov. g. Hexandr. Monogyn. (R. paludosa.)
Scop. 1777. Intr. p. 205: g. Pseudocompositar.
Juss. 1789. Gen. p. 44: g. Juncor. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXII. 1148.
Batsch 1802. Tab. p. 125: g. Ephemeror.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 111: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 226. n. 923. — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. 45.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 239: g. Juncear. — Par. Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 453.
Agdh. 1823. Aphor. p. 157: g. Xyridear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 121.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1145: g. Restionear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: g. Rapateacear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 405 (310). — Schomb. 1845. Rapat. Frid. Aug. etc. (restrict.) — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 127.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1053. p. 131; 1841. Ench. p. 76: g. Rapatear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 366. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1678. — Steud. 1855. Glum. II. p. 312.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 51. t. 168.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 187: g. Xyridacear.
Synon. Mnasium Schreb.

Rapateaceae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 60. 62: fam. Juncariear. Gen.: Rapatea.
Meisn. 1842. Gen. p. 405 (310): subordo Juncacear. Gen.: Rapatea, Spathanthus.
Schomb. 1845. Rapat. Frid. Aug.: fam. plant. Gen. ead. et Saxo-Fridericia, Cephalostemon.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 125. Gen.: Rapatea, Spathanthus, Schoenocephalium.

Rapateae Endl. 1837. Gen. p. 131; 1841. Ench. p. 75: fam. Juncaceis aff. Gen.: Rapatea. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 366. 599. Gen.: Rapatea, Spatanthus.
Rchb. 1841. Nom. p. 46: subdiv. Juncear. Gen.: Rapatea.
Steud. 1855. Glum. II. p. 312: fam. Juncear. Gen.: Rapatea, Schoenocephalum, Saxofridericia, Spatanthus.

Raphaneae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 153. 649; 1824. Prodr. I. p. 225: trib. Orthoplocear. Gen.: Crambe, Didesmus, Enarthrocarpus, Raphanus et 1824 Rapistrum. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 256. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 885; 1841. Ench. p. 451. Gen. ead. et Raphanistrum. Accedunt 1850 (Spl. V. p. 40) Condylocarpus, Otocarpus.

Raphaneae DC. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV: subdiv. Lomentacear. Gen. ut DC. 1824.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 312: ordo Cruciferar.
Koch 1836. Syn. p. 77. Ed. II. p. 83: trib. Lomentacear. Gen.: Rapistrum, Crambe, Raphanus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179: subdiv. Synclistar. Gen.: Crambe, Raphanus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 93: trib. Cruciferar. Gen. ex DC.
Raphaneae Rchb. 1828. Consp. p. 181 (1832. Fl. exc. p. 655): subdiv. Lomentacear. Sect.: Buniadeae, Zilleae, Rapistreae.
Raphani Adans. 1763. Fam. II. p. 422: sect. 4 Cruciferar. Gen.: Isatis, Ionthlaspi, Calepina, Laelia, Bricour, Erucago, Cakile, Crambe, Raphanus, Raphanistrum.
Raphanidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Orthoplocear. Gen. Raphanear. Endl.
Raphanideae Link 1831. Handb. II. p. 281: sect. Cruciferar. Gen.: Raphanus, Raphanistrum, Rapistrum, Crambe, Goldbachia, Chorispora, Cakile, Anastatica.
Raphanis Mönch 1794. Meth. p. 267: g. Thalamostemonis. (Cochlearia Armoracia L.)
= Armoracia Rupp.
Raphanis „Theophr." DC. 1821. Syst. II. p. 663; 1824. Prodr. I. p. 228: sect. Raphani. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 71. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 700.
= Raphanus Tourn.
Raphanistreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Siliquastrar. Gen.: Raphanus, Cakile, Rapistrum, Chorispora.
Raphanistreae Rchb. 1837. Handb. p. 259; 1841. Nomencl. p. 179: subdiv. Synclistar. Gen.: Rapistrum, Didesmus, Enarthrocarpus, Raphanistrum.
Raphanistrum Tourn. 1700. Inst. p. 230. t. 115: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 65. Ed. Hall. 1745. p. 71: g. pl. class. IV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 424: g. Raphanor.
Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 39; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 39: g. Crucifloror. (*Kreuzblüthen.*)
Mönch 1794. Meth. p. 217: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 100: g. Erucacear.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 473: g. Tetradynam. (Pericarpiferar.)
Smel. 1805. Nov. Act. Petr. XIV. p. 490: g. Siliquosar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 687: g. Cruciferar.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 666; 1824. Pr. I. p. 229: sect. Raphani. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 109. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 262. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 72. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 701.
Wallr. 1822. Sched. crit. p. 336: g. Nauciferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4728; 1832. Fl. exc. p. 656: g. Rapistrear.

Raphanistrum Tourn. cont.
Link 1831. Hdb. II. p. 281: g. Raphanidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179. n. 6915: g. Raphanistrear.
Endl. 1839. Gen. n. 4971. p. 886; 1841. Ench. p. 451: g. Raphanear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 224. — Walp. 1842. Rep. I. p. 189.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 287: g. Lomentacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Raphanidar.
Synon. Dondisia Scop.; Ormycarpus Neck.; Durandea Delarbr.
Raphanus*) Tourn. 1700. Inst. p. 229. t. 114: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 66: g. pl. class. IV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 424: g. Raphanor.
Scop. 1777. Intr. p. 316: g. Siliquosar. — Par. Smel. 1805. Nov. Act. Petr. XIV. p. 489.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 340; 1789. Phil. Bot. I. p. 192.
Neck. 1790. El. III. p. 81. n. 1408: g. Styridophytor. Distinguitur Ormycarpus.
Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 41; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 39: g. Crucifloror. (*Kreuzblüthen.*)
Mönch 1794. Meth. p. 216: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 99: g. Erucacear.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245: sect. Raphani. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 108. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 260.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 687: g. Cruciferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4729; 1832. Fl. exc. p. 656: g. Rapistrear.
Link 1831. Hdb. II. p. 281: g. Raphanidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179. n. 6917: g. Raphanear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4972. p. 886; 1841. Ench. p. 451. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 225. — Walp. 1842. Rep. I. p. 189.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Raphanidar.
Synon. Raphanis DC.; Lapsana Caesalp.?
Raphanus Linn. 1737. Gen. p. 196. n. 539; 1737. Cliff. p. 340; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 188; 1753. Sp. II. p. 669; 1759. Syst. ed. X. p. 1136. n. 736; 1763. Sp. ed. II. p. 935; 1764. Gen. ed. VI. p. 343. n. 822; 1767. Syst. ed. XII. p. 445: g. Tetradynam. Siliquos. (injuncto Raphanistro ampliat.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 504; 1784. Syst. p. 603. — Reich. 1778. Gen. p. 343. n. 886. — Lour. 1790. Coch. II. p. 396. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 445. n. 1098. — Gmel. 1791. Syst. p. 990. — Pers. 1797. Syst. p. 640. — Willd. 1800. Sp. III. p. 560. n. 1247; 1809. En. p. 688. — Link 1822. En. II. p. 175. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 125.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 555: g. Tetrapetalar. cruciatar.

*) Dioscoridi ῥαφανίς. (ῥάφανος, brassica,)

Raphanus Linn. cont.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 66. n. 276: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir. III. p. 266. — Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 37. — Hill 1769. Ht. kew. p. 172[21]. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Pers. 1807. Ench. II. p. 408. n. 1577. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 715. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 425. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 192. 389 (*Rhaphanus*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 728.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 238. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 500. — DC. 1805. Franç. IV. p. 642; 1815. V. p. 588. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 129. (Verm. bot. Schr. V. p. 75.) Disjungitur Chorispermum. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 347 (*Radis*).

Rebent. 1804. Neom. p. 155: g. Hexandr. Monogyn.

DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 662; 1824. Pr. I. p. 228: g. Raphanear. Sect.: Raphanis, Raphanistrum. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 108. Sect.: Raphanus, Raphanistrum. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 260. Sect. ut Presl. — Koch 1836. Syn. p. 78. Ed. II. p. 83. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Kunth 1838. Berol. I. p. 62. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 119. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 183 (*Rhaphanus*). — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 71. Sect. ut DC. — Duch. 1843 in Orb. Dict. X. p. 700 (*Raifort*). Sect. ut DC.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 855. n. 2274; 1831. Gen. II. p. 514. n. 2518: g. Synclistar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Raphanistrear.

Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.

Webb 1836. Canar. I. p. 82: g. Enarthrocarpear.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 333: g. Lomentosar.

= Raphanus et Raphanistrum Tourn.

Raphelingia Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Asphodelear., inter Ornithogalum et Gageam collocatum. (Nomen.)

Raphia Palis. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 84: nov. g. Palmar. (Fl. Owar. t. 44—46.)

„Comm." Mart. .... Palm. p. 217.

Kunth 1841. Enum. III. p. 216: g. Calamear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139.

Meisn. 1842. Gen. p. 354 (265): subg. Sagi.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 89: g. Lepidocarynear.

= Sagus Gärtn.

Raphidia „Carm. mss." Harvey 1841. Man. brit. Alg. p. 153: sect. Rivulariae. (R. angulosa Roth.

Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. ... : g. Rivularicar. (An *Rhaphidia?* ex Kütz.)

= Rivularia Roth?

Raphidophora*) Hassk. vid. *Rhaphidophora Hassk.*

Raphidophyllum Hochstett. 1841. Flora II. p. 666: nov. g. Gerardiear. — Par Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Walp. 1845. Rep. III. p. 389. 970.

= Sopubia Hamilt. *Cf.* Hochst. in Flora 1844. p. 26.

Raphidospora Rchb., Dietr. vid. *Rhaphidospora Nees.*

Raphidostegium Schimp. 1852. Bryol. eur. V: subg. Rhynchostegii. (Hypnum demissum Wils.)

Raphioacme Wittst. vid. *Raphionacme Harv.*

Raphiolepis Lindl. 1820. Bot. Regist. VI. t. 486; 1821. Linn. Trans. XIII. p. 105: nov. g. Pomacear. (Crataegus indica L.) *Cf.* Flora 1823. I. p. 171. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 630. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 508. n. 1855; 1830. Gen. I. p. 415. n. 2069. — Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4461. — Bartl. 1830. Ord. p. 400. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 78. — Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 162. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 124. — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 720.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Pyrear.

Sieb. & Zucc. 1835. Fl. japon. I. p. 162. t. 85.

Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. sub n. 1956: g. Pomear.

Conf. Rhaphiolepis Poir.

Raphionacme Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 22: nov. g. Periplocear., Streptocauloni aff. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 752 (*Raphioacme*). — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 366. — Endl. 1843. Spl. III. p. 75. n. 3434/$_1$. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 480 (*Rhaphionacme*). — Turczan. 1848. Bull. Musc. XXII. 1. p. 250 (*Rhaphionacme*).

= Apoxyanthera Hochst. (Decne in DC. Pr. VIII. p. 665.)

Raphiospora Massalongo....

Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 267: g. Lecidinar.

Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Eulecideinar.

Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 337 (*Rhaphiospora*): sect. Biatorae.

Raphiostylis Miers vid. *Rhaphiostylis Planch.*

Raphis Batsch 1802. Tab. affin. p. 156: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 77. — Palis. 1812. Agrost. p. 120. — Leman 1826. Dict. v. 44. p. 457.

Blanco 1837. Filipin. p. 45: g. Triandr. Digyn.

= Rhaphis Lour.

Raphisanthe Lilja 1841. Linnaea XV. p. 263: nov. g. Loasear. (Loasa lateritia Hook.)

= Cajophora Presl.

Raphispermum Benth. vid. *Rhaphispermum Benth.*

Raphistemma Wallich 1831. Pl. As. rar. II. p. 50. t. 163: nov. g. Asclepiadear. (R. pulchellum.) *Cf.* Isis 1834. p. 976 (*Rhaphistemma*). — Par. Steud. 1841. Nom. II.

*) *ῥαφίς*, acus.

Raphistemma Wallich cont.
p. 445 (*Rhapistemma*). — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.)
Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 54.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 145: g. Asclepiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3472. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Calotropidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4985.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 516: g. Haplostemmar.
Conf. Rhaphistemma Meisn., etc.

Rapinia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 127. Ed. Willd. p. 156: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. herbacea.)
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 456: g. Solanear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LV. 682. n. 830. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 458. — Juss. 1827. Dict v. 49. p. 408. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3314.
Bartl. 1831. Ord. p. 194: g. Solanacear.
= Pongatium Juss.

Rapistreae Rchb. 1828. Consp. p. 182; 1832. Fl. exc. p. 655: subdiv. Raphanear. Gen.: Crambe, Rapistrum, Didesmus, Enarthrocarpus, Raphanistrum, Raphanus.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 155: trib. Cruciferar. Gen.: Morisia, Rapistrum, Crambe.

Rapistrum Tourn. 1700. Inst. p. 210. t. 99: g. pl. class. V, diversa complectens.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 58: g. pl. class. IV.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 190. (Crambe hispanica L.)
Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 19; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 37: g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen.*)
Mönch 1794. Meth. p. 211: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 113: g. Myagroidear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 509: g. Cruciferar. (perenne et paniculatum.) — Par. Lois. 1826. Dict. v. 44. p. 459.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 724: g. Siliculosar.
= Rapistrum Boerh., Leptocrambe DC., etc.

Rapistrum Boerh. 1710. Lugd. Bat. p. 406.
Smel. 1805. Nov. Act. Petr. XIV. p. 479: g. Siliculosar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 185. n. 1546. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 679.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 474: g. Cruciferar. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 160. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 124.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 237; 1821. Syst. II. p. 430: g. Cakilinear.
Link 1822. En. II. p. 147: g. Tetradynam. Siliculos.

*) Dicat. Renato Rapini.

Rapistrum Boerh. cont.
DC. 1824. Pr. I. p. 227: g. Raphanear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 106. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 259. — Koch 1836. Syn. p. 77. Ed. II. p. 83. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4968. p. 886; 1841. Ench. p. 451. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 223. — Walp. 1842. Rep. I. p. 189. — Brongn. 1843. En. genr. p. 93. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 219.
Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4725; 1832. Fl. exc. p. 655: g. Rapistrear. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 155.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Raphanistrear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179. n. 6912.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 282: g. Raphanidear.
Webb 1836. Canar. I. p. 86: g. Enarthrocarpear.
Spach 1830. Vég. phan. VI. p. 322: g. Lomentosar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 287: g. Lomentacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Raphanidar.
Synon. Crambe Adans.; Schrankia Medic.; Condylocarya Bess.; Arthrolobus Andrz.; Arthrobolus Wittst.

Rapistrum Bergeret .... Phytonomat. univ. III. p. 165.
= Calepina Adans.

Rapistrum Hall. 1768. Helvet. I. p. 224.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 285. t. 141. f. 9 (paniculatum).
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 334: g. Nauciferar.
= Neslia Desv.

Rapistrum R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 74 (Verm. bot. Schr. V. p. 7): g. Cruciferar. (Bunias aegyptiaca W. et Myagrum paniculatum W.)
= Ochthodium DC.

Rapourea Rchb., Endl. vid. *Ropourea Aubl.*

Rapunculus Tourn. 1700. Inst. p. 113. t. 38: g. pl. class. I.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 497: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 248: g. pl. class. IX.
Adans. 1760. Fam. II. p. 134: g. Campanular.
Scop. 1772. Carn. I. p. 150: g. Pentandr. Monogyn.
Mönch 1794. Meth. p. 494: g. Petalostemonis.
= Phyteuma Linn.

Rapunculus Endl. 1838. Gen. n. 3082 *b*. p. 517; 1841. Spl. I. p. 1392; 1841. Ench. p. 266: sect. Phyteumatis. Subsect. (1841): Hedranthum, Podanthum.

Rapunculus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 280: sect. Campanulae. (C. patula, Rapunculus, etc.)

Rapuntium Lobel. 1576. Hist. p. 178.
= Phyteuma Linn.

Rapuntium Tourn. 1700. Inst. p. 163. t. 51: g. pl. class. III.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 31: g. pl. class. I.

Rapuntium Tourn. cont.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 151. t. 30. f. 9 (siphiliticum).
Mönch 1794. Meth. p. 655: g. Calycostemonis.
= Lobelia Linn.

Rapuntium Chevall. 1826. Fl. Paris. II. p. 526.
= Campanulae sect. Medium A. DC.

Rapuntium Presl 1836. Mon. Lobel. p. 11; 1837 in Eckl. & Zeyh. En. pl. Afr. III. p. 394: g. Lobeliear. Sect.: Xanthomeria, Stenotium, Sphaerangium. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 357: sect. Lobeliae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 706. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 868.

Raputia Aublet 1775. Guian. II. p. 670. t. 272: nov. g. Didynam. Angiosperm. (R. aromatica.)
Scop. 1777. Intr. p. 168: g. Personatar.
Juss. 1789. Gen. p. 421: g. incertae sedis.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 351: g. Pentandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 14. 349: g. Diandr. Monogyn. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 55. 138. n. 75. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 461.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 893: g. Myoporear.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 152: g. Cuspariear.
DC. 1824. Pr. I. p. 734: g. Simarubear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2915: g. Verbenear.
= Galipeae St. Hil. pars.

Raram Adans. 1763. Fam. II. p. 35: g. Panicor.
= Cenchrus Linn.

Raspailia*) Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4223: g. Bruniacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4598. p. 806; 1841. Ench. p. 402. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 159. n. 6202: g. Bruniear.
= Raspalia Brongn.

Raspailia Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. 239.
= Nowodworskya Presl.

Raspalia Brongn. 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 377: nov. g. Bruniacear. (Brunia microphylla Thunb.?) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 374. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 48. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 476. — Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. I. p. 140. — Meisn. 1837. Gen. p. 72 (52). — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 260 (*Raspallia*).
Synon. Raspailia Rchb., Endl.

Raspallia Arnott vid. *praeced.*

Rassia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 12. n. 623: nov. g. Darinyphytor., a Gentiana L. sejunctum.

Rassovia Hedwig vid. *Bassovia Aubl.*

Rathea**) Karsten 1858. Wochenschr. f. Gärtn. u. Pfl. Nr. 48. p. 377: nov. g. Palmar., Reineckeae aff.
= Synechanthus Karst.? (Karst. 1858. Wochenschr. p. 408.)

Rathkea Schumacher 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Skrift. IV. p. 129: nov. g. plant. (Robinia squamata Vahl.) *Cf.* Fér. Bull. sc. nat. XXIV. p. 327.
Meisn. 1837. Comm. p. 65. 351: g. Euhedysarear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6604. p. 1283; 1841. Ench. p. 670. — Walp. 1846. Rep. V. p. 521. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5972: g. Onobrychear.
Synon. Acrotaphros Steud.; Pictetia Hochst.

Ratibida Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 100: nov. g. ex typo Rudbeckiae columnaris Pursh.
DC. 1836. Pr. V. p. 559: sect. Obeliscariae. — Par Endl. 1838. Gen. n. 2516 *b*. p. 409; 1841. Ench. p. 238. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3627. 2.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 315: sect. Lepachydis. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 160.

Ratonia*) DC. 1824. Prodr. I. p. 618: nov. g. minus cognitum, Sapindaceis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5231: g. Dodonaeacear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38): g. Sapindear.?
= Cupania Plum.

Ratzeburgia*) Kunth 1830. Gram. p. 487. t. 158; 1833. Agrost. p. 468: nov. g. Rottbölliacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 928. p. 105; 1841. Ench. p. 60. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 409.
R. Brown 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 46 (Verm. bot. Schr. V. p. 370): g. Graminear.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1366: g. Rottböllicar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Rottböllear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 360 Ophiuro injungit.
Synon. Aikinia Wall.

Rauia Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 167. t. 23. 24: nov. g. Fraxinellar. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 515.
Schult. 1824. Mant. II. Add. p. 211 (*Ravia*): g. Diandr. Monogyn.
= Galipeae St. Hil. pars.

Raumeria Göppert 1844. Übers. p. 217.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 163; 1846. Chlor. prot. p. LXV: g. Cycadeacear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 108: g. Cycadear.

Raussinia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 419. n. 1244: g. Omoplephytor.
= Pachira Aubl.

Rauvolfia*) Plum. 1703. Gen. p. 19. t. 40: nov. g. plant.
Linn. 1737. Gen. p. 62. n. 179; 1737. Cliff. p. 75; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 92. n. 216; 1753. Sp. I. p. 208; 1759. Syst. ed. X. p. 944. n. 259; 1762.

*) Dicat. Fr. V. Raspail, chemico et botanico.
**) Dicat. Dr. Gerhard vom Rath, Bonn.

*) *Raton* Hispanorum.
**) Dicat. Jul. Th. Chr. Ratzeburg, professori.
***) Dicat. Leon. Rauvolfio, per Syriam peregrinatori. (Ht. Cliff.)

Rauvolfia Plum. cont.
Sp. ed. II. p. 303; 1764. Gen. ed. VI. p. 115. n. 293; 1767. Syst. ed. XII. p. 188. n. 290: g. Pentandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 180. — Jacq. 1763. Amer. p. 47. — Murr. 1774. Syst. p. 208; 1784. Syst. p. 250.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sapotar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 171: g. Apocynor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar.
Scop. 1777. Intr. p. 154: g. Monocarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 148: g. Apocinear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 336. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 516.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 431: g. Apocineis aff.
Conf. Rauwolfia Auct.

Rauwolffia Gled. vid seq.

Rauwolfia Gled. 1749. Berl. V. p. 128 (*Rauwolffia*); 1764. Syst. p. 212. n. 887: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Contortor.
Reich. 1778. Gen. p. 118. n. 316: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 160. n. 411. — Gmel. 1791. Syst. p. 432. — Pers. 1797. Syst. p. 262. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1217. n. 471; 1809. En. p. 273. — Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 543.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 242. t. 52. f. 4 (nitida et canescens).
Neck. 1790. El. I. p. 265. n. 423: g. Campylophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 201.
Pers. 1805. Ench. I. p. 265. n. 605: g. Apocynear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 231. (verar.) — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIX. 524. n. 807. — Link 1821. En. I. p. 207. — Kunth 1823. Syn. II. p. 298. (verar.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1033.
Hedw. 1806. Gen. p. 121. n. 532: g. Apocinear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 404; 1825. Syst. I. p. 834. n. 957; 1830. Gen. I. p. 206. n. 1052: g. Carissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578; II. p. 881. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3554; 1841. Nom. p. 134. n. 5209: g. Rauwolfiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 205.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 98: g. Alyxiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3391. p. 581; 1841. Ench. p. 294: g. Ophioxylear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 336: g. Eucarissear.
Conf. Rauvolfia Plum.

Rauwolfia Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 26. t. 152: g. Pentandr. Monogyn. reformat. *Cf.* D. Don in Edinb. n. phil. journ. X. p. 236.
= Citharexylon Linn.

Rauwolfieae Rchb. 1828. Consp. p. 134: subdiv. Carissear. Gen: Bolivaria; Mitreola, Spigelia, Cynoctonum, Ochrosia, Rauwolfia, Alyxia, Vallesia, Thevetia, Voacanga, Ophioxylon. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 211. Gen. ead. exclusis 2 primis. — Rchb. 1841. Nom. p. 134. Gen. Ophioxylear. Endl.
Bartl. 1830. Ord. p. 205: div. Apocynear. Gen.: Cerbera, Dicaryum, Thevetia, Vallesia, Voacanga, Rauwolfia, Ochrosia, Cynoctonum; Alyxia; Ophioxylon.

Ravenala Adans. 1763. Fam. II. p. 67: g. Zingiberum.
Scop. 1777. Intr. p. 96 (*Ravenalla*): g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 62: g. Musar.
Gmel. 1791. Syst. p. 567. g. Hexandr. Monogyn.
Gis. 1792. Prael. p. 199. 210. 230: g. Scitaminear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 152: g. Musacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 227. n. 924. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 520. — Rchb. 1828. Consp. p. 71. n. 1612. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 63. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXVI. 1299. — Brongn. 1843. Én. gen. p. 24.
Endl. 1837. Gen. n. 1650. p. 228; 1841. Ench. p. 123: g. Uraniear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 144.
Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2236: g. Ravenalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 164: g. Uranear.
Synon. Urania Schreb.

Ravenaleae Rchb. 1841. Nomencl. p. 57: subdiv. Musear. Gen.: Phenacospermum, Musa, Strelitzia, Ravenala.

Ravenalla Scopoli vid. *Ravenala Adans.*

Ravenia Vellozo Fl. Flum. I. t. 39: g. Diandr. Monogyn. (infelix) ex Steud. Nom. II. p. 439.
Planch. 1853. Bull. Ac. Brux. XXI. 1. p. 188 in not.; Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 75 adnot.: g. Cuspariear.
= Lemonia Lindl.

Ravensara*) Sonnerat 1782. It. ind. II. p. 226. t. 127.
Gmel. 1791. Syst. p. 754: g. Dodecandr. Monogyn.
= Agathophyllum Juss.

Ravia Schult. Mant. II. Add. p. 211 (et DC. et Endl. in Synon. Galipeae); vid. *Rauia Nees & Mart.*

Ravnia Örsted 1852. Centralamer. Rubiac. p. 27: nov. g. Eucinchonear., Hilliae aff. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 130.

Rayania „Walt." Auct. in synon. Brunnichiae: vid. *Rajania Walt.*

Razisea**) Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 30: nov. g. Acanthacear. (R. spicata.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 640.

Razoumoeskia „Neck." Juss. vid. *seq.*

---

*) Nomen malaiicum.
**) Dicat. Af Razis, Arabum rei herbariae perito seculi decimi.

Razoumowskia*) Hoffm. 1808. Hort. Mosq. n. 1. f. 1. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 44. p. 526 (*Razoumoeskia*) et Wittst. Etym. Handw. p. 753 (*Razumovskia*).
= Arceuthobium Bieb.

Razumovia Spreng. mss. olim. *Cf.* Juss. 1826. Dict. v. 44. p. 526.
= Humea Smith.

Razumovia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 406 (Cent. nov. pl. n. 54): nov. g. Personatar. anomalar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 812. n. 2194: g. Scrofularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3234: g. Gesnerear.?
= Centranthera R. Brown.

Razumovskia Wittst. vid. *Razoumowskia Hoffm.*

Rea**) „Bertero 1830 in Herb." Decne 1833 in Guillem. Arch. bot. I. p. 509: nov. g. Cichoracear. (R. macrantha, etc.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 242: g. Hieraciear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.
= Dendroseris Don.

Reana Brignoli 1849. Sem. Mutinens.; 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 365: nov. g. Zeinear. (R. Giovannini.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 711: g. Phalaridear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 9.

Reaumurea Steud. vid. *seq.*

Reaumuria***) „Hasselq." Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1081. 1374. n. 1152; 1762. Sp. ed. II. p. 754; 1764. Gen. ed. VI. p. 276. n. 686; 1767. Syst. ed. XII. p. 372: g. Polyandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 421; 1784. Syst. p. 506. — Reich. 1778. Gen. p. 281. n. 743. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 371. n. 936. — Gmel. 1791. Syst. p. 851. — Pers. 1797. Syst. p. 542; 1807. Ench. II. p. 85. n. 1336. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1249. n. 1070; 1809. En. p. 578.
Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Gled. 1764. Syst. p. 114. n. 473: g. Thalamostemonum.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Callitrichas et Salsolas conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 263: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 316: g. Ficoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 267. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 143. — Link 1822. En. II. p. 84. — DC. 1828. Pr. III. p. 456. (spuriar.)
Neck. 1790. El. II. p. 275. n. 1036: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 38: g. Fimbriatar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 844: g. Aizoidár.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 632. n. 2012; 1830. Gen. I. p. 454. n. 2241: g. Aizoidear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 439 (*Reaumurea*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 293.

Reaumuria Hasselq. cont.
Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 2: g. Ficoidar.
Ehrenb. 1827. Linnaea II. p. 273: g. Reaumuriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4416; 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166. n. 6467. — Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Tamariscinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 287. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 479.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 155: g. Reaumuriacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5480. p. 1038; 1841. Ench. p. 542. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 74. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 138. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 407. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 327 (ex Jaub. & Spach).
Jaub. & Spach 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 377. (Monogr.)
Synon. Beaumulix Willd.?

Reaumuriaceae G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 155: ordo (116) Calyciflorar. Gen.: Reaumuria, Hololachna.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 91.) 1847. Veg. kd. p. 407: ordo Guttiferalium. Gen. u. Endl.
Endl. 1840. Gen. p. 1037; 1841. Ench. p. 542: ordo (220) Guttiferar. Gen. ut Don et Eichwaldia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 74: fam. Guttiferar. Gen.: Reaumuria.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 740. Gen. ut Don. *Cf.* Jaub. & Spach 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 377 et Griseb. 1848. Arch. f. Naturg. II. p. 324.
Synon. Reaumurieae Ehrenb.

Reaumurieae Ehrenb. 1827. Linnaea II. p. 274; 1827. Ann. sc. nat. XII. p. 68.
Rchb. 1828. Consp. p. 166: subdiv. Tamariscear. Gen.: Hololachne, Reaumuria.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (37) Thalamiflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Cistalium.
Mart. 1835. Consp. p. 61: ordo 298.
Rchb. 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166: subdiv. Tamariscinear. Gen. ut antea et 1841 Eichwaldia.
Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93): subordo Tamariscinear. Gen. ut Rchb. 1828.

Rebis Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 26; 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 148: nov. g. Grossulariear. (Ribes macrobotrys Rz. & Pav.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 233.
= Ribesiae DC. pars.

Rebouillia*) Raddi 1818. Opusc. scient. Bologn. II. p. 357: nov. g. Hepaticar. (Marchantia hemisphaerica.) *Cf.* Leman 1827. Dict. p. 45. p. 3. — Par. Bertol. 1819. Amoen. it. p. 440.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 528 *d*: sect. Marchantiae.
Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 970. 975: g. Marchantiear.
Endl. 1836. Gen. n. 468. p. 45; 1841. Spl. I. p. 1338; 1841. Ench. p. 27: g. Marchantiacear.

*) Dicat. comiti Alexis Razumovski.
**) Dicat. prof. Ré, Taurin.
***) Dicat. René Ant. Ferchault Réaumur, physico.

*) Dicat. Eugen. Reboul, Aquaesextiensi, botanico meritissimo.

Rebouillia Raddi cont
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. xxx. 197: g. Jecorariar.
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 846: g. Grimaldiear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 9.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.
= Reboulia Nees.

Rebouilliariae Rchb. 1837. Handb. p. 137: div. Marchantiacear.

Reboulea*) Kunth 1830. Gram. p. 341. t. 84; 1833. Agrost. p. 368: g. Festucacear. (Aira obtusata Michx.) — Par. Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 452. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 365. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 249. — Steud. 1854. Glum. I. p. 287.
= Eatonia Rafin.

Reboulia „Raddi emend." Nees 1846. Syn. Hepat. p. 547: g. Jecorariar.
Bayrh. 1849. Taun. p. 55: g. Marchantiear.
Synon. Asterella Palis.; Rhakiocarpon, Achiton et Mesoregma Corda; Rebouillia et Reboullia Raddi.

Reboullia Raddi 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17. Ed. Nees p. 3: g. Hepaticar.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 59; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549: g. Marchantiear.
= Reboulia Nees.

Recchia**) „Moç. & Sess. Fl. mex. ic. ined." DC. 1818. Syst. I. p. 411: nov. g. Delimacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 72. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4).
DC. 1824. Pr. I. p. 70: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4977. — — Endl. 1839. Gen. n. 4767. p. 843; 1841. Ench. p. 432. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424. (?)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 360. n. 1689; 1830. Gen. I. p. 373. n. 1885: g. Dilleniear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1524.
Leman 1827. Dict. v. 45. p. 4: g. Dilleniacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7269: g. Recchiear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413.

Recchieae Rchb. 1837. Handb. p. 277; 1841. Nomencl. p. 191: sect. Delimear. Gen.: Recchia. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413. Gen. id.

Receveura Flor. Flum. V. t. 119. 120: g. Polyandr. Trigyn. (cordata et graveolens) ex Steud. Nom. II. p. 440.
= Brathys Mut.

Rechsteineria Regel 1848. Flora I. p. 247; 1849. ibid. p. 178: nov. g. Gesnerear. (Gesneria allagophylla). — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1066.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203: g. Eugesnerear. — Par. Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 9. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 431 (sph. *Bechsteineria*).

*) Dicat. Eug. de Reboul.
**) Dicat. Nardo Antonio Reccho.

Rectembryae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 129: subordo Leguminosar. Tribus: Mimoseae, Cassieae, Cerceae.

Rectembryae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 25: cohors Incompletar. Nixus: Amentales, Urticales, Casuarales, Datiscales.

Rectembryae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 621: div. Solanacear. Gen.: Cestrum, Dunalia, Habrothamnus, Jochroma, Acocanthera, Vestia, Fabiana, Sessea, Retzia.

Rectembryeae Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148: vid. *Solanaceae.*

Rectomitra Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 6: nov. g. Charianthear. (Ewyckia galeata Korth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 611.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 261: g. Kibessiear. (An Ewyckiae consociandum?) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 799.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 569: sect. Ewyckiae.

Redia*) Casaretto 1842. Nov. Stirp. Bras. dec. VI. 51: nov. g. Euphorbiacear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 89. n. 5795/2: g. Acalyphear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 407: g. Crotonidear.
Synon. Psilostachys Turcz.?

Redoutea**) Ventenat 1800. Jard. Cels. t. 11.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 293: g. Malvacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 258. — DC. 1824. Pr. I. p. 457. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 109. n. 2444; 1831. Gen. II. p. 557. n. 2723. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 487.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Hibiscear.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5271: g. Ketmiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 346: g. Malvear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 288: g. Fugosiear.
= Cienfuegosia Cavan.

Redowskia***) Chamisso & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 32: nov. g. Cruciferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4809: g. Sisymbrear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 265: g. Siliquosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 223: g. Lepidinear.
Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11): g. Alyssinear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 161.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6948: g. Clypeolear.
Endl. 1839. Gen. n. 4931. p. 889; 1841. Ench. p. 451: g. Diplecolobear. dubium. *Cf.* Walp. 1842. Rep. I. p. 192.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 672: g. Siliculosar.

Redutea Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 64: g. Malvacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 254. n. 1640. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 800. (genuinar.) — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 12.
= Redoutea Vent.

*) Dicat. Fr. Redi.
**) Dicat. pictori botanico Redouté.
***) Dicat. D. Redowski, botanico rossico.

Reevesia*) Lindl. 1827 in Brand. Quart. journ. III. p. 109; 1829. Bot. Regist. XV. t. 1236. *Cf.* Ann. sc. nat. XII. 1827. p. 143.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 550. n. 2694: g. Büttnerear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 518: g. Sterculiacear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 519 (anomalum).
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 31: g. Reevesiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25). — Rchb. 1837. Hdb. p. 295; 1841. Nom. p. 203. n. 7737. — Endl. 1840. Gen. n. 5318. p. 993; 1841. Ench. p. 516. — Walp. 1842. Rep. I. p. 334 (sphalm. *Reveesia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361: g. Helicterear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615.

Reevesieae Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 31: div. Helicterear. Gen.: Ungeria, Reevesia. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 993. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 203. Gen. ead.
Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25): trib. Helicterear. Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 295: sect. Myrodiear. Gen.: Reevesia.
Endl. 1841. Ench. p. 516: subtrib. Helicterear. Gen. ut antea.

Regelia**) Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 243: nov. g. Lophostemonear. (R. ciliata.)
Schauer 1843. Diss. grat.; 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 148; 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 7: g. Calothamnear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 748.

Regmandra Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 60: subsect. Dulcamarae.

Regmatodon***) Brid. 1827. Bryol. II. p. 204: nov. g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV g. Sciurodeor.)
Schwägr. 1827. Suppl. III. 1. Sect. 1. t. 204: g. Muscor. frondosor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Hypnoidear.
Endl. 1836. Gen. p. 56. n. 578: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 956: g. Calyptrobryor.
Conf. Rhegmatodon.

Rehmannia†) Libosch. 1835 in Fisch. Ind. sem. h. Petrop. I. p. 36: nov. g. Rhinanthacear. (Digitalis glutinosa Gärtn.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. 1836. p. 123 et Linnaea X. Litt. p. 100.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 54: g. Digitalear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3914. p. 677; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 506. — Brongn. 1843. En. genr. p. 59. — Walp. 1845. Rep. III. p. 254. 962.

Rehmannia Libosch. cont.
Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1960: g. Scrophulariacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Cyrtandrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4692: g. Ramondiear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 275: g. Loxoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.

Reichardia Roth 1787. Bot. Abhandl. u. Beob. p. 35: nov. g. pro Scorzonera tingitana et picroide L. propositum.
Mönch 1794. Meth. p. 545: g. Petalostemonis.
= Picridium Desf.

Reichardia Roth 1800. Catal. II. p. 64.
= Maurandia Ort. (Roth Sp. pl. p. 210.)

Reichardia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 32: nov. g. pl. (*Sjovanna Amelpodi Rheede* VI. t. 47.)
= Tabernaemontana Linn.

Reichardia Roth 1821. Nov. pl. spec. p. 210: nov. g. Decandr. Monogyn., a Caesalpinia L. segregatum.
DC. 1825. Pr. II. p. 484: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 433.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 332. n. 1625; 1830. Gen. I. p. 361. n. 1818: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379 (err. *Richardia*). 1495.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4146: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.)
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
= Pterolobium R. Brown.

Reichelia Schreb. 1789. Gen. I. p. 200. n. 512: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 499. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1502. n. 574. — Pers. 1805. Ench. I. p. 329. n. 733.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 466; 1825. Syst. I. p. 940. n. 1115; 1830. Gen. I. p. 229. n. 1203: g. Convolvulear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 999: g. Convolvulacear.
= Hydrolea Linn.

Reichenbachia*) Spreng. ex Fée Crypt. cort. p. 136.
= Usnea Hoffm.

Reichenbachia Spreng. 1823. Bull. soc. philom. p. 54. t. 1; 1825. Syst. I. p. 28. 94. n. 120; 1830. Gen. I. p. 30. n. 134: nov. g. Nyctaginear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 110. — Endl. 1837. Gen. n. 2009. p. 312; 1841. Ench. p. 193. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 107. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 516.
Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 217. 260: g. Diandr. Monogyn.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVIII; 1837. Hdb. p. 174: g. Pisoniear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230).
Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1844: g. Allioniacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2604: g. Allioniear.

*) Dicat. John Reeves, Canton, botanophilo.
**) Dicat. Ed. Regel, Turicensi.
***) ῥῆγμα, fissura.
†) Dicat. Jos. Rehmann, medico.

*) Dicat. H. G. L. Reichenbach, prof. Lipsiensi.

Reichenbachia Spreng. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 507: g. Nyctaginacear.
Choisy 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 439: g. Boerhaaviear.
Reichenheimia*) Klotzsch 1855. Begon. p. 174: nov. g. Begoniacear.
Reichertia**) Karsten 1848. Bot. Zeit. p. 397; 1858. Fl. Columb. I. p. 59. t. 29 A. B: nov. g. Gentianear. (R. rosea.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 80: g. Chlorear.
Reidia***) Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 27. t. 1903. 1904: nov. g. Phyllanthear. (Phyllanthus tetrandrus Roxb.)
= Eriococcus Hassk. (Baill.)
Reiffenscheidia Steud. vid. *seq.*
Reifferscheidia†) Presl 1836. Reliq. Hänk. II. p. 74. t. 62: nov. g. Dilleniacear. (R. speciosa.) — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 440 (*Reiffenscheidia*).
Meisn. 1837. Gen. p. 2 (5): g. Dillenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Endl. 1839. Gen. n. 4748. p. 840; 1841. Ench. p. 431: g. Dilleniear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 312.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413 (*Reifferschiedia*): g. Deliminear.
Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7279: g. Hibbertiear. genuinar.
Reifferschiedia Spach vid. *praeced.*
Reilia Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 311: nov. g. Junceis aff. (Xerotidear.)
Reimaria††) Flügge 1810. Monogr. Pasp. I. p. 217.
Palis. 1812. Agrost. p. 13: g. Graminear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 25. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 125.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 582 (Verm. bot. Schr. I. p. 114): g. Panicear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 67; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 84; 1822. Syn. I. p. 163; 1830. Gram. p. 23; 1833. Agrost. p. 40. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 152. — Agdh. 1823. Aphor. p. 148. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 15. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 169. — Endl. 1837. Gen. n. 760. p. 82; 1841. Ench. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1282. — Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 16.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 61. 289. n. 116: g. Diandr. Digyn. (ibid. II. p. 14 in Triandr. Digyn.) — Par. Trin. 1820. Fund. p. 94.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 123. n. 133; 1830. Gen. I. p. 33. n. 148: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 879: g. Paspalacear.

*) Dicat. fratribus L. et M. Reichenheim, Berolin.
**) Dicat. prof. Reichert, Dorpat.
***) Dicat. Lieut. Colonel Francis A. Reid, Madras.
†) Dicat. comiti Salm-Reifferscheid.
††) Dicat. J. A. H. Reimarus, professori.

Reimaria Flügge cont.
Schltd. 1852. Bot. Zeit. p. 15. Sect.: Eureimaria, Dichromus.
Reineckea Kunth 1844. Abh. Berl. Ak. f. 1842. p. 29; 1850. ibid. (f. 1848) p. 46; 1850. Enum. V. p. 21: nov. g. Dracaenear. (Sanseviera carnea Andr. = *Sanseviella Rchb.* absque charact.) *Cf.* Karsten 1858. Wochenschr. p. 377.
Reineckea Karsten 1858 in Koch & Fintelm. Wochenschr. Nr. 44: nov. g. Palmar.
Reinera Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 33: nov. g. plant. (*Curinil Rheede* VII. t. 25.)
= Curinila Röm. & Schult.
Reineria Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 44: nov. g. Thalamostemonis.
DC. 1825. Pr. II. p. 251: sect. Tephrosiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3892 *d.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 330. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 211. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 109. — Endl. 1840. Gen. n. 6539 *a.* p. 1273; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 673.
Reinhardtia Liebm. .... in Mart. Gen. Palm. III. p. 311: nov. g. Arecinear. (R. elegans.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 459.
Reinwardta Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5411: g. Ternströmiear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 60: g. Gordoniear.
Meisn. 1837. Gen. p. 40 (30): g. Ternströmiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 302: g. Reinwardtear.
= Reinwardtia Blume.
Reinwardteae Rchb. 1837. Handb. p. 302: subdiv. Ternströmiear. Gen.: Eurya, Reinwardta.
Reinwardtia*) Dumort. 1822. Comment. bot. p. 19: nov. g. ex typo Lini trigyni Roxb. *Cf. Macrolinum Rchb.*
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: g. Linacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Linidear.
Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 593; 1848. ibid. VII. p. 522: g. Eulinear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 96; 1851. II. p. 135.
= Linum Dill.?
Reinwardtia „Blume“ Nees 1824. Syll. Ratisb. I. p. 96: nov. g. Tiliacear., ad Dilleniaceas transiens. *Cf. Reinwardta Rchb.*
Bartl. 1830. Ord. p. 335: g. Camelliaceis aff.
= Saurauja Willd.
Reinwardtia Spreng. 1825. Syst. I. p. 527. 863. n. 1005: nov. g. Convolvulear. (Dufourea glabra Kunth.)
= Dufourea Kunth.
Reinwardtia Korthals .... Verh. nat. Geschied. p. 101. t. 12.
Endl. 1842. Spl. II. p. 81. n. $5408/_1$: g. Ternströmiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 129.

*) Dicat. prof. Reinwardt, Bataviae.

Reinwardtia Korthals cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 344: g. Ternströmiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.

Reisseckia Rchb. vid. *seq.*

Reissekia*) Endl. 1840. Gen. n. 5747. p. 1103; 1841. Ench. p. 581: nov. g. Gouaniear. (Gouania smilacina Sm.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5574 (*Reisseckia*).
Meisn. 1843. Comm. p. 348: g. Rhamnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear. (*Synon. Helinus E. Mey.*, *Willemetia Eckl. & Z.*)

Rejoua**) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 450. t. 61: nov. g. Apocynear. (Tabernaemontana aurantiaca Gaudich.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 92: g. Tabernaemontanear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 374: sect. Tabernaemontanae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 423.

Rejouia „Gaud." Endl. in synon. Tabernaemontanae: vid. *Rejoua Gaudich.*

Relbunium Endl. 1838. Gen. n. 3100 *o.* p. 523; 1841. Ench. p. 271: sect. Galii. (Rubiae sp. DC.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 459.
Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2748. 1: sect. Rubiae.

Relchela***) Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 101: nov. g. Panicear. (R. panicoides, antea *Lechlera Steud.* in litt.) *Cf.* Hochst. in Flora 1857. p. 328.
= Triodia R. Brown.

Relhamia Gmel. 1791. Syst. p. 247: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
= Curtisia Ait.

Relhania†) L'Herit. 1788. Sert. p. 22.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 563. n. 1304: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Thunb. 1800. Prodr. II. p. 145. 193; 1801. Nov. gen. XVI. p. 189. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2135. n. 1508. — Pers. 1807. Ench. II. p. 457. n. 1868.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 567; 1826. Syst. III. p. 589. n. 2817; 1831. Gen. II. p. 635. n. 3172: g. Radiatar.
Link 1822. En. II. p. 340: g. Corymbiferar.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 560; 1827. v. 45. p. 29: g. Gnaphaliear. Sect. (1827): Relhania, Eclopes. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2406. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579: g. Leyserear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 374: g. Relhaniear. Subgen.: Relhania, Psilophyllum. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 286. Sect.: Metalasioides, Psilophyllum. — Endl. 1838. Gen. n. 2781. p. 453; 1841. Ench. p. 244. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3540. Sect. ut Less. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 731: g. Osmitear.

Relhania Lessing 1832. Syn. Compos. p. 374: subg. Relhaniae. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3540. 1.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.
= Metalasioides DC.

Relhania „Gmel." DC. Prodr. II. p. 12 in synon. Curtisiae: vid. *Relhamia Gmel.*

Relhanieae Lessing 1831. Linnaea VI. p. 232; 1832. Syn. Compos. p. 370: subtrib. Senecionidear. Divis. (1832): Carpesieae, *Relhanieae* (gen.: Relhania, Ammobium, Eclopes, Rhynchocarpus, Bellidiastrum, Osmites, Osmitopsis). — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. Gen. ut Endl.
DC. 1837. Pr. VI. p. 280: div. Gnaphaliear. Gen.: Carpesium, Syncephalum, Oligodora, Nestlera, Polychaetia, Relhania, Eclopes, Rhynchopsidium, Osmites, Osmitopsis. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 452; 1841. Ench. p. 244. Gen. ead. et Amblyocarpum. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). Gen. ut Endl. et Arrowsmithia? — Rchb. 1841. Nom. p. 90. Gen. ut Endl.
Fenzl 1839. Flora II. p. 730: div. Gnaphaliear. restricta. Subdivis.: Ammobiae, Osmiteae. (= *Relhanieae* div. *Less.*)

Relhanioides DC. 1837. Prodr. VI. p. 280: sect. Pterothricis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2773 *a.* p. 452; 1841. Ench. p. 243.

Relhanum Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 598. 661: nov. g. Geoglossidear. (Phallus conicus Fl. dan., Leotia? conica Pers.)
= . . . ?

Rellesta Turczan. 1848. Bull. Mosc. II. p. 337: nomen pro *Stellera Turcz.* propositum.

Remberta Miquel 1844. Linnaea XVIII. p. 94: sect. Dodonaeae. (D. hirtella.)

Rembertia Adans. 1763. Fam. II. p. 226: g. Jasminor.
= Diapensia Linn.

Remè Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar.
= Sesuvium Linn.

Remeira Scopoli vid. *Remirea Aubl.*

Remigia Wittst. vid. *seq.*

Remija Meisn., Spach, Rchb. vid. *seq.*

Remijia*) DC. 1829. Bibl. un. sc. II. p. 185; 1830. Prodr. IV. p. 357: nov. g. Cinchonear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 755 (*Remigia*). — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 158 (113) [*Remija*]. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 391 (*Remija*). — J. 1849 in Orb. Dict. X. p. 749.
Endl. 1838. Gen. n. 3273. p. 555; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 509.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2909 (*Remija*): g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Wedd. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 13. Revisio generis.
Synon. Macrocnemum Vell.

---

*) Dicat. Reisseck, botanico Vindobon.
**) Dicat. chemico Rejou.
***) Anagramma nominis Lechlerae.
†) Dicat. Rich. Relhan, florae Cantabridg. auctori.

*) *Quina de Remijo* Brasil.

Remirea Aublet 1775. Guian. I. p. 44. t. 16: nov. g. Triandr. Monogyn. (R. maritima.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 57. n. 119. — Vahl 1806. Enum. II. p. 391. n. 127.
Scop. 1777. Intr. p. 75 (*Remeira*): g. Graminum. (legitimor.) — Par. Link 1821. En. I. p. 40. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 5.
Juss. 1789. Gen. p. 34: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 90. — Hedw. 1806. Gen. p. 34. 361. — Palis. 1812. Agrost. p. 143. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 6. 240. n. 189. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 37.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 236. Ed. Nees p. 92: g. Cyperacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 237. n. 237. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 228.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 21 et Schult. 1824. Mant. II. p. 4): g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1087. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 51. n. 246. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 286; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 60. — Kunth 1837. Cyper. p. 138. — Meisn. 1843. Gen. p. 410 (313). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Steud. 1855. Glum. II. p. 71.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 910: g. Cinnear.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 979. p. 114; 1841. Ench. p. 64: g. Schoenoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1461.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.
Synon. Miegia Schreb.

Remniphyllum Rafin. vid. *Retiniphyllum Humb. & Bonpl.*

Remusatia*) Schott 1832. Melet. bot. p. 18: nov. g. Colocasiear. (Caladium viviparum Nees.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1682. p. 236; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 35. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1094. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (270). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 39.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Caladiear.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 43: g. Colocasinar. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 204.

Renalmia**) Plumier 1703. Nov. gen. p. 37. t. 38.
Conf. Renealmia Linn. 1737.

Renanthera***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 521. Ed. Willd. p. 636: nov. g. Gynandr. Monandr. (R. coccinea.)
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 19 (Linnaea II. p. 532): g. Orchidear. (tribus incertae.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 39. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 666. n. 3360.
Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1541; 1841. Nom. p. 54. n. 2079: g. Vandear. — Par. Lindl. 1833. Orchid. p. 217. — Endl. 1837. Gen. n. 1473. p. 204; 1841. Ench. p. 111; 1843. Spl. III. p. 61. Sect. (1843): Nephranthera, Arachnanthe. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (280). — Brongn. 1843. En. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 60; 1850. Rumphia IV. p. 54. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 566. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 698. Sect.: verae, Arachnanthe.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Rchb. f. 1854. Xen. Orchid. I. p. 86. t. 35. Revisio. Sect.: Eurenanthera, Arrhynchium, Arachnanthe. *Cf.* Miq. Fl. Ind. bat. III. p. 743.
Synon. Aërides Swartz; Arachnis Blume; Arachnanthe Blume; Nephranthera Hassk.

Renardia*) Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. p. 466: nov. g. Antidesmati aff. (R. lejocarpa.)

Renealmia „Plumier (*Renalmia*)“ Linn. 1737. Gen. p. 340. n. 853; 1737. Cliff. p. 129; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 136. n. 314; 1753. Sp. I. p. 286; 1759. Syst. ed. X. p. 974. n. 358: g. Hexandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Muricatar.
= Tillandsia Linn.

Renealmia Feuillé 1725. Journ. obs. III. p. 59. t. 30.
= Pourretia Ruiz & Pav.

Renealmia Houtt. .... Pfl. Syst. VI. p. 319. t. 47. f. 1.
= Nymphaeanthe Rchb.

Renealmia Linn. f. 1781. Suppl. p. 7. n. 1350: g. Monandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 50. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 2. n. 2. — Gmel. 1791. Syst. p. 5. — Pers. 1797. Syst. p. 49. — Willd. 1797. Sp. I. p. 6. n. 3; 1809. En. p. 3.
Neck. 1790. El. III. p. 147. n. 1491: g. Cratoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 188: g. Scitaminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 2. n. 3. — Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 167. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 13.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 279: g. Zingiberear. (Alpinia nutans Sm. et mutica Roxb.)
Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 41: g. Amomear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Endl. 1837. Gen. n. 1631. p. 224; 1841. Ench. p. 119: g. Alpiniar.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 25. t. 134—136 (in tab. err. *Alpinia*).
Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 141: g. Alpiniear. — Par. Rchb. 1841.

---

*) Dicat. J. P. A. Rémusat, Paris.
**) Dicat. Paulo Renealmo, Blesensi, Dr. med.
***) Nomen a lobis antherae reniformibus.

*) Dicat. Renard, primo societatis Mosquensis secretario.

Renealmia Linn. cont.
Nom. p. 57. n. 2219. — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (291).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.
Synon. Alpinia Plum.; Gethyra Salisb.; Peperidium Lindl.

Renealmia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 591. Ed. Nees p. 447: g. Iridear. (antea Sisyrinchii sp., qd. conf.) — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 172.
Schult. 1822. Mant. I. p. 251: g. Triandr. Monogyn.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Moraeacear.
= Libertia Spreng.

Renellia „Korth." Flora 1851. p. 539: vid. *Rennellia.*

Renggeria*) Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 42 (31): g. Clusiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5436. p. 1025; 1841. Ench. p. 534. — Walp. 1842. Rep. I. p. 393; 1843. II. p. 811. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 364.
Rchb. 1837. Hdb. p. 310: g. Havetiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8025: g. Clusiariar.
Synon. Schweiggera Mart.

Rengifa**) Pöppig & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 12. t. 210: nov. g. Renggeriae aff. (R. peruviana.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 82. n. 5436/1: g. Clusiear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 345. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.

Rennellia Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 255: nov. g. Morindeas cum Pavetta conjungens. *Cf.* Griseb. Jahresber. et Flora 1851. p. 539 (*Renellia*).
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 752: g. Coffeear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 248: g. Morindear.

Rensselaeria Beck Bot. in Darlingt. Fl. cestr. p. 530.
= Peltandra Rafin.

Renunculus Dumort. vid. *Ranunculus Tourn.*

Repandra***) Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1835. Bot. Regist. n. 1701: nov. g. Ophrydear. (Disa cornuta, etc.) *Cf.* Endl. Gen. p. 211. n. 1537 *a.* — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1480. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1838. Orchid. p. 347. 349: sect. Disae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1539 *b a.* p. 1365; 1841. Ench. p. 112: subsect. Calodisae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1882. 2 *a.*

Reptonia A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 153: g. Monotheceear. (*Synon. Edgeworthia Falc.*)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648: g. Theophrastear.
= Monotheca A. DC.

Requienia†) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 91: nov. g. Leguminosar. (Podalyria obcordata Lam.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 227. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 571. n. 2780.
DC. 1825. Pr. II. p. 168: g. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4026; 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 151. n. 5887. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 164. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6471. p. 1262; 1841. Ench. p. 668.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Psoraliear.

Reseda*) Tourn. 1700. Inst. p. 423. t. 238: g. pl. class. XI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 275. Ed. Hall. 1745. p. 289: g. pl. class. XII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 315: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 54.
Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4824 *b*; 1832. Fl. exc. p. 696; 1841. Nom. p. 183. n. 7050. 2: sect. Resedae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5011 *b.* p. 896; 1841. Ench. p. 458. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 235. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 241.
Webb 1836. Canar. I. p. 101: g. Resedacear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 97: g. Resedinear. (restrict.)
= Resedastrum Duby.

Reseda Linn. 1737. Gen. p. 158. n. 447; 1737. Cliff. p. 212; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 246. n. 534; 1748. Ups. p. 149: g. Polyandr. Trigyn., injuncta Luteola ampliat.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 106. n. 436: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 57.
Linn. 1753. Sp. I. p. 448; 1759. Syst. ed. X. p. 1046. n. 535; 1762. Sp. ed. II. p. 643; 1764. Gen. ed. VI. p. 242. n. 608; 1767. Syst. ed. XII. p. 329: g. Dodecandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 331. — Murr. 1774. Syst. p. 372; 1784. Syst. p. 448. — Reich. 1778. Gen. p. 248. n. 664. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 326. n. 831. — Lour. 1790. Coch. I. p. 299. — Gmel. 1791. Syst. p. 758. — Pers. 1797. Syst. p. 480; 1807. Ench. II. p. 9. n. 1138. — Willd. 1799. Sp. II. p. 876. n. 958; 1809. En. p. 499. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 267.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Capparidum. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 407. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 777.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Miscellanear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594.
Hill 1769. Ht. kew. p. 221: g. Hexapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 481; g. Capparear.
Scop. 1777. Intr. p. 323: g. Disciferar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 368. t. 75. f. 7 (R. Phyteuma).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 202. *Cf. Reseda* et *Luteola Tourn., Med.*

*) Dicat. Dr. J. R. Rengger, Helveto.
**) Dicat. missionario Manuel del Castillo Rengifo.
***) [illegible]
†) Dicat. Requien, botanico Avignon.

*) Nomen ex Plinio a resedando. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 183

Reseda Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 245: g. Capparidibus aff.
Neck. 1790. El. II. p. 242. n. 991: g. Eredophytor. Disjungitur Astrocarpus.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 122: g. Capparideis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 5. — DC. 1805. Franç. IV. p. 724; 1815. V. p. 599.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.
Cram. 1803. Disp. p. 112 in Decandr. Tetragyn. (R. undata) et p. 120 in Dodecandr. Tetragyn. (odorata, etc.)
Tristan 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 392: g. familiae propriae aut Cistis injungendae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 666: g. Resedacear. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64; 1829. Anal. fam. p. 49. — R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 227. *Cf.* Ann. sc. nat. IX. 1826. p. 213. — Presl 1826. Sicul. I. p. 112. — Lois. 1827. Dict. v. 45. p. 228. — Bartl. 1830. Ord. p. 259. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 287. — Koch 1836. Syn. p. 89. Ed. II. p. 96. Sect.: Resedastrum, Luteola. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Kunth 1838. Berol. I. p. 64. — Endl. 1839. Gen. n. 5011. p. 896; 1841. Ench. p. 458. Sect: Luteola, Reseda. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 235. Sect. eaed. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 28. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 240. Sect. eaed. — Walp. 1843. Rep. II. p. 751. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 356. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 187. Sect. ut Koch et Leucoreseda. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 65. — J. Müll. 1857. Mon. Réséd. p. 96. Sect.: Leucoreseda, Resedastrum, Glaucoreseda, Luteola.
Link 1822. En. II. p. 8; 1831. Hdb. II. p. 323: g. Resedinar.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 300: g. Gruinalium?
Spreng. 1825. Syst. II. p. 463. n. 1791; 1830. Gen. I. p. 397. n. 1994: g. Resedear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII; 1828. Consp. p. 186. n. 4824; 1832. Fl. exc. p. 696; 1841. Nom. p. 183. n. 7050. Sect.: Luteola, Reseda, et 1841 Resedina.
Synon. Reseda et Luteola Tourn.; Guadarella Caesalp.

Resedaceae DC. 1813. Théor. élém. p. 214; 1819. ed. II. p. 244: ordo Thalamiflorar., a Tristan 1811 (Ann. Mus. XVII. p. 392. 402) indicatus. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 286. Gen.: Reseda, Ochradenus. — Koch 1836. Syn. p. 88. Ed. II. p. 96. Gen.: Reseda. — Pritz. 1843 in Walp. Rep. II. p. 751. Gen. ut Endl. — Walp. 1846. Rep. V. p. 33. Accedit Holopetalum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 665: fam. Thalamiflorar. Gen.: Reseda.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64: fam. Thalamunguliac. Gen.: Reseda, Astrocarpa.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valvisporar.
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 227. (Verm. bot. Schr. IV. p. 38.) Gen.: Reseda, Ochradenus. *Cf.* Ann. sc. nat. IX. 1826. p. 213.

Resedaceae DC. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Resedaricar. Gen. ut 1822.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (89) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 258: ordo (145) Rhoeadear. Gen. ut R. Brown et Sesamella. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 437.
Agdh. 1833. Flora p. 113: fam. Ranunculaceis proxime aff.
Lindl. 1833. Nix. p. 18: ordo Crucialium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 62. (Coll. bot. t. 22.)
St. Hil. .... Ann. soc. roy. d'Orl. XIII.
St. Hil. 1837. Deuxième mém. s. l. Living Réséd. (Montpell.)
Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16): ordo 14 plant. Gen. ut R. Brown et Astrocarpus.
Kunth 1838. Berol. I. p. 64: fam. Polypetatar. staminibus hypogynis. Gen.: Reseda.
Endl. 1839. Gen. p. 895; 1821. Ench. p. 457: ordo Rhoeadum. Gen. ut Meisn. et Oligomeris, Caylusea.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 93: fam. (102) Rhoeadear. Sect.: Resedineae, Astrocarpineae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 89: fam. Cruciferinear. Gen.: Astrocarpus, Caylusea, Reseda, Oligomeris.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 356: ordo Cistalium. Gen. ut Endl. et Holopetalum.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 66: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.
J. Müll. 1857. Mon. fam. Réséd. Gen.: Ochradenus, Reseda, Holopetalum, Oligomeris, Astrocarpus, Caylusea. *Cf.* Flora 1858. p. 558.

Resedarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam.: Frankeniaceae, Resedaceae, Sauvagesiaceae, Parnassiaceae.

Resedastrum Duby 1828. Bot. gall. I. p. 66.
Koch 1836. Syn. p. 89. Ed. II. p. 96: sect. Resedae. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 187. — J. Müll. 1857. Mon. Réséd. p. 116.
Synon. Reseda Tourn.; Eresda Spach.

Resedeaceae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 203: ordo plant. Gen.: Datisca.

Resedeae Spreng. 1825. Syst. II. p. 463; 1830. Gen. I. p. 397.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII: subdiv. Cruciferar. sect. 4. Gen.: Reseda, Ochradenus.
Rchb. 1828. Consp. p. 186 (1832. Fl. exc. p. 695): div. Tetradynamar. Gen.: Sesamella, Reseda, Singana, Calispermum?
Rchb. 1837. Hdb. p. 261; 1841. Nom. p. 183: subdiv. Acroschistar. Gen.: Resedella, Luteola (1841 reducta), Reseda.

Resedella Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 106: nov. g. Resedacear. (Reseda subulata Del.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 261; 1841. Nom. p. 183. n. 7049: g. Resedear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 96: g. Resedinear.
= Oligomeris Camb.

Resedina Rchb. (Deutschl. Fl. p. 111) 1841. Nomencl. p. 183. n. 7050. 3: sect. Resedae.

Resedinae Link (1821. Enum. I. p. 294) 1831. Hdb. II. p. 322: ordo 9 Allostemonum. Gen.: Reseda.

Resedineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 96: sect. Resedacear. Gen.: Ochradenus, Reseda, Eresda, Luteola, Resedella.

Resinariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 66: ordo Rosacear. Fam.: Terebinthinaceae, Rhamni.

Perleb 1830. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Calycopetalar. Fam. 207—220. (Rhamneae, etc.)

Restia Rchb. vid. *Restio Linn.*

Restiaceae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 243. Ed. Nees p. 99: ordo Monocotyledonum, a Juncis Juss. separatus. Gen.: Restio, Lepyrodia, Lyginia, Anarthria, Loxocarya, Leptocarpus, Chaetanthus, Hypolaena, Aphelia, Desvauxia, Alepyrum, Eriocaulon, Xyris. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 251. Sect.: Eriocauleae, Xyrideae.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 186: ordo 1 fam. 15 plant. Gen.: Restio, Thamnochortus, Elegia, Willdenowia, Lyginia, Leptocarpus; Eriocaulon, Hyphydra; Desvauxia, Xyris.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Thalamauliae.

Link 1822. En. II. p. 420; 1829. Hdb. I. p. 134: subordo Juncear. Gen.: Restio, Lomandra, Eriocaulon.

Agdh. 1823. Aphor. p. 156; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: div. Juncacear. Gen. ut R. Brown (excepta Xyride) et Elegia, Willdenowia, Hyphydra, Astelia.

Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 270. Gen. §. 1: Thamnochortus, Loxocarya, Chaetanthus, Restio, Willdenowia, Leptanthus, Schoenodum; Hypolaena, Elegia, Lepirodia, Anarthria, Calopsis, Chondopetalum, Lyginia; Calorophus? §. 2. Xyris, Abolboda, Johnsonia, Gaimarda. §. 3: Eriocaulon, Tonina. §. 4: Alepyrum, Devauxia, Tristycha; Aphelia?

Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41: fam. Monocotyledonear. Gen. §. 1: Tamnochortus, Loxocarya, Chaetanthus. §. 2: Restio, Willdenowia. §. 3: Schoenodum, Lyginia, Leptocarpus. §. 4. Cannomois, Hypolaena, Calopsis. §. 5: Elegia, Chondropetalum, Calorophus, Anarthria, Lepyrodia. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 81. Gen. ut Endl.

Bartl. 1830. Ord. p. 35: ordo (25) Juncinar. Divis.: Desvauxieae, Restioneae, Eriocauleae.

Nees 1830. Linnaea V. p. 627. Gen. capensia: Restio, Nematanthus, Hypolaena, Willdenowia, Lepidanthus.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 120: trib. Juncacear. Gen. ut Agdh.

Lindl. 1833. Nix. p. 36: ordo Glumacear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 246. Gen.: Anthochorthus, Anarthria, Lyginia, Dowea, Lepyrodia, Rhodocoma, Loxocarya, Ischyrolepis, Desmocladus, Onychosepalum, Restio; Schoenodon, Staberoha, Askidiosperma, Calopsis; Thamnochortus, Leptocarpus, Lepidobolus, Chaetodiscus, Chaetanthus, Elegia, Willdenowia, Cannomois, Boeckhia, Craspedolepis, Ceratocaryum, Mesanthus, Cucullifera, Hypolaena, Calorophus, Hypodiscus. *Anomala*: Prionosepalum, Leucoploeus.

Mart. (1835. Consp. p. 8: ordo 37) 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 71: fam. Enantioblastar.

Endl. 1837. Gen. p. 120; 1841. Ench. p. 66: ordo Enantioblastar. Gen.: Leptocarpus, Loxocarya, Chaetanthus, Hypolaena, Willdenowia, Anthochortus, Ceratocaryum, Lepidanthus, Anarthria, Lyginia, Lepyrodia, Thamnochortus, Elegia, Restio. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 10) Schoenodum, Boeckhia, Cannomois, Staberoha, Calopsis, Dovea, Rhodocoma. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). Gen. ut Endl. et Mesanthus, Cucullifera, Hypodiscus, Leucoploeus. — Unger 1845. Syn. p. 168; 1846. Chlor. prot. p. LXVI. Gen. foss.: Palaeoxyris.

Rchb. 1837. Hdb. p. 148; 1841. Nom. p. 42: div. Commelynacear. Gen. ut Endl. et Mesanthus.

Kunth 1841. Enum. III. p. 381: ordo Monocotyledonum staminibus perigynis. Gen.: Restio, Calopsis, Thamnochortus, Staberoha, Schoenodum, Cannomois, Boeckhia, Hypolaena, Willdenowia, Dovea, Elegia, Lepyrodia, Anarthria, Lyginia, Loxocarya, Leptocarpus, Chaetanthus, Rhodocoma, Hypodiscus, Leucoploeus, Ceratocaryum, Cucullifera, Mesanthus, Anthochortus.

Brongn. 1843. En. genr. p. 12: fam. Juncinear. Gen.: Restio, Willdenowia. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 138. Trib. ut Bartl.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121: ordo Glumalium. Gen. ut Endl. 1842 et Hypodiscus, Leucoploeus, Mesanthus.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Enantioblastear.

Restiacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 189: ordo plant. foss. Gen.: Palaeoxyris.

Restiaria*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 639. Ed. Willd. p. 785: nov. g. Dioec. (ordinis incerti. — R. cordata.)

Restieae Spreng. 1830. Gen. I. p. 46: fam. Junceis finitima. Gen.: Xyris, Abolboda, Restio, Leptocarpus, Thamnochortus, Willdenovia, Lyginia, Hypochlaena.

Restio*) Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 735. n. 1331: g. Dioec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 737; 1784. Syst. p. 881. — Reich. 1778. Gen. p. 512. n. 1204. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 676. n. 1495. — Pers. 1797. Syst. p. 923; 1807. Ench. II. p. 606. n. 2190. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 718. n. 1766.

Rottb. 1772. Ic. rar. t. 2. (Spreng.)

Scop. 1777. Intr. p. 81: g. Liliacear.

Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790. (Amoen. ac. X.) p. 26: g. Graminum amentaceor.

Juss. 1789. Gen. p. 44: g. Juncor.

Gmel. 1791. Syst. p. 201: g. Triandr. Trigyn.

Gis. 1792. Prael. p. 129: g. Calamariar.

*) Nomen ab usu caulis restibus formandis idonei.

**) Si latinum nomen est, idem est ac restiarius. (Beckm. Lex. bot. p. 181.)

Restio Linn. cont.
Thunb. 1794. Prodr. I. p. 14; 1818. Fl. cap. I. p. 316: g. Triandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 152: g. Juncear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 109: g. Juncinear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 244. Ed. Nees p. 100: g. Restiacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 186; 1825. Syst. I. p. 183. n. 208. — Link 1822. En. II. p. 421; 1829. Hdb. I. p. 134. — Agdh. 1823. Aphor. p. 156. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 271 et Poir. ibid. p. 273. — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. — Nees 1830. Linnaea V. p. 634; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 57. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Endl. 1837. Gen. n. 1021. p. 122; 1841. Ench. p. 67; 1842. Spl. II. p. 11. — Kunth 1841. Enum. III. p. 382. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1511. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Brongn. 1843. En. genr. p. 12. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 249.
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Restionear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1133 (sphalm. *Restia*). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. — Bartl. 1830. Ord. p. 36. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 47. n. 217: g. Restiear.
Synon. Calorophus Labill.

Restioneae „Palis. mss." Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: fam. Monocotyledonear. Gen.: Thamnochortus, Loxocarya?, Chaetanthus?; Restio, Willdenowia, Schoenodum, Lyginia, Leptocarpus.
Rchb. 1828. Consp. p. 57: div. Commelinacear. Gen.: Centrolepis, Alepyrum, Aphelia, Elegia, Lepyrodia, Anarthria, Restio, Loxocarya, Leptocarpus, Thamnochortus, Willdenowia, Lyginia, Hypolaena, Chaetanthus; Rapatea.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. 62: fam. Juncariear. Gen.: Restio, Willdenovia, Thamnochortus, Chaetanthus, Leptocarpus, Hypolaena, Eligia, Lepyrodia, Anarthria, Calopsis, Lygnia.
Bartl. 1830. Ord. p. 36: div. Restiacear. Gen.: Restio, Elegia, Lepyrodia, Thamnochortus, Loxocarya, Leptocarpus, Chaetanthus, Hypolaena, Willdenowia.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139: trib. Restiacear. Gen. ut Bartl. et Cannomois, Calopsis, Staberoha, Schoenodum, Boeckhia, Dovea, Anarthria, Lyginia, Rhodocoma, Hypodiscus, Leucoploeus, Ceratocaryum, Cucullifera, Mesanthus, Anthochortus.

Restrepia*) HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 366. t. 94: nov. g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 347. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 291: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125 (*Ristrepia*).
Agdh. 1823. Aphor. p. 189 (*Ristrepia*): g. Massulatar.

*) Dicat. Jos. Eman. Restrepio.

Restrepia HBK. cont.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 742. n. 3033; 1831. Gen. II. p. 674. n. 3406: g. Orchidear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 279.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1560.
Lindl. 1830. Orchid. p. 14: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1329. p. 188; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1916. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (276). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 34. t. 59.
Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. Misc. p. 68; 1847. Veg. kd. p. 181: g. Pleurothallidar.

Resupinaria Benth. 1834. Labiat. p. 464; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 369: sect. Lophanthi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 803. — Endl. 1838. Gen. n. 3635 *b.* p. 622; 1841. Ench. p. 307. — Walp. 1845. Rep. III. p. 774.

Resupinata Spreng. 1831. Gen. II. p. 764: sect. Thelephorae.

Resupinatus Nees 1816. Syst. p. 197; 1817. Überbl. p. 49: sect. Agarici. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 423.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 617: g. Agaricidear.
= Pleurotus Fries pt.

Retama*) Boissier 1839. Voy. Espagne p. 143: nov. g. ex typo Spartii monospermi L. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 241.
Endl. 1840. Gen. n. 6501. p. 1266; 1841. Ench. p. 668: g. Genistear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5895. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 4. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — Webb 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 276 (subgen.: Raetam, Sphaerosparton); 1846. Canar. II. p. 53. — Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. III. p. 567. — Walp. 1846. Rep. V. p. 506.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
Synon. Spartium Link 1831.

Retanilla DC. 1825. Prodr. II. p. 28: sect. Colletiae?
Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 364: g. Rhamnear. — Par. Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 157. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 34. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (50).
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3810: g. Frangulacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5734. p. 1099; 1841. Ench. p. 581: g. Colletiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5607.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
Synon. Molinea Comm.

Retencourtia A. Juss. vid. *Betencourtia St. Hil.*

*) Nomen hispanicum.

Reticula Adans. 1763. Fam. II. p. 3: g. Byssor. = . . . ?

Reticularia Baumg. 1790. Fl. Lips. p. 841. = Sticta Schreb.

Reticularia Bulliard .... Champ. p. 85: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 285. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1471. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 13. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 4.

DC. 1805. Franç. II. p. 258: g. Angiocarpor.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Spumidear.

Fries 1825. Pl. homon. p. 147; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 83; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 449: g. Aethalinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 177; 1841. Nom. p. 9. n. 349. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 254. — Bonord. 1851. Hdb. p. 218.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Spumariacear.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 774. n. 3978: g. Aërogasterum.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 337: g. Placogasterum.

Endl. 1836. Gen. n. 321. p. 27; 1841. Ench. p. 17: g. Aethalineor.

Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 23: g. Physareor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 22; 1842. Mycol. p. 89: g. Reticulariacear. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 14.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Reticularieor.

Math. 1853. Belg. II. p. 394: g. Fuliginear.

Synon. Diphtherium Ehrenb.; Diphterium Brongn.; Enteridium Ehrenb.; Lignydium Link; Lignidium Fries.

Reticularia C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 525: sect. Conomitrii. (Fissidens palmatus Hedw., etc.)

Synon. Areofissidens C. Müll.

Reticulariaceae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 22; 1842. Anl. Mycol. p. LXXV. 89: fam. Dermatogasterum. Gen.: Reticularia, Diphtherium, Enteridium. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 142. Gen.: Enteridium.

Reticulariei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: sect. Coniogastror. Gen.: Reticularia, Aethalium, Lignidium, Diphtherium, Enteridium, Lachnobolus?, Ptycogaster?

Retigerus Raddi 1829. Mem. soc. Ital. Moden. XX. p. 46: nov. g. Fungor. *Cf.* Linnaea 1837. Litt. p. 52.

= Hymenophallus Nees.

Retinaria Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 187. t. 120. f. 4.

Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5573. 2: sect. Gouaniae.

= Gouania Jacq.

Retiniphyllum*) Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 86. t. 25: nov. g. Rubiacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XV. 225. n. 909. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 289.

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 421: g. Guettardear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 68. — DC. 1830. Pr. IV. p. 466. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 557. — Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2858. (genuinar.)

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84 (*Remniphyllum*): g. Pyrenidiae.

Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2097 *b*: sect. Nonateliae.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 208: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.

Endl. 1838. Gen. n. 3208. p. 543; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 488.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.

*) ῥητίνη, resina.

Retinispora Sieb. & Zuccar. 1842. Fl. japon. II. p. 36.

Endl. 1847. Syn. Conif. p. 63; 1847. Spl. IV. p. 4. n. 1799 *b*: sect. Chamaecyparidis.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear. = Chamaecyparis Spach.

Retinodendron Zenker 1833. Beitr. Gesch. Urw. p. 3: nov. g. Coniferar. *Cf.* Flora Lit. III. p. 75. — Par. Unger 1845. Syn. p. 212; 1846. Chlor. prot. p. LXXVII (dubiae affinitatis).

Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 141. 190: g. Araucariear.?

Synon. Retinoxylon Endl.

Retinodendron Korthals 1839. Verh. nat. Geschied. Ned. Bez. p. 55. t. 8.

= Isauxis Arn.

Retinoxylon Endl. 1847. Syn. Conif. p. 282; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 12. n. 1816/19: g. Cupressinear. foss.

= Retinodendron Zenk.

Retiporus Batsch 1783. Elench. p. 107.

Math. 1853. Belg. II. p. 336: sect. Polypori.

= Agaricon Adans.

Rettbergia Raddi 1823. Agrost. bras. p. 17. t. 1. f. 1: nov. g. Graminear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1064 (dubium).

Nees 1829. Agrost. Bras. p. 535: g. Bambusear. verar.

Nees 1834. Linnaea IX. p. 489: sect. Chusqueae. — Par. Rupr. 1839. Mém. Ac. Pet. III. Bot. p. 124. — Steud. 1854. Glum. I. p. 337.

Retzia*) Thunb. 1776. Physiogr. Sällsk. Handl. (Act. soc. Lund.) I. p. 55; 1781. Nov. gen. I. p. 4; 1794. Prodr. I. p. 34; 1818. Fl. cap. II. p. 14: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. capensis.) — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 18. n. 1368. — Murr. 1784. Syst. p. 196. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 115. n. 285. — Gmel. 1791. Syst. p. 333. — Pers. 1797. Syst. p. 203; 1805. Ench. I. p. 176. n. 414. — Willd. 1797. Sp. I. p. 843. n. 321.

Juss. 1789. Gen. p. 133: g. Convolvulor. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXI. 205. n. 687.

*) Dicat. Andr. Joh. Retzius, prof. Lund.

Retzia Thunb. cont.
Neck. 1790. El. II. p. 21. n. 639: g. Darinyphytor.
Gis. 1792. Prael. p. 393: g. Campanacear.
Batsch 1802. Tab. p. 210: g. Convolvulacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 101. n. 453. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 297. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 680.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 307: g. Convolvulear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 466; 1825. Syst. I. p. 589. n. 641; 1830. Gen. I. p. 151. n. 756. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3006.
Bartl. 1830. Ord. p. 192: g. Retziacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 306. — Endl. 1839. Gen. n. 3876. p. 669; 1841. Ench. p. 337. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179). — Walp. 1845. Rep. III. p. 125. 956.
Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4773: g. Vestiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 181: g. incertae sedis.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 581: g. Retziear.
Synon. Solenostigma Klotzsch.

Retziaceae Bartling 1830. Ord. p. 192: fam. Convolvulacear. desciscentium. Gen.: Retzia, Lonchostoma. *Cf.* A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 83.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 306: ordo Corollaeflorar. Gen. ead.
Endl. 1839. Gen. p. 669; 1841. Ench. p. 334: fam. Tubiflorar. incertae sedis. Gen. ead.
Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179): ordo Tubiflorar. Gen. ead.

Retzieae Dunal in DC. Prodr. XIII. 1. p. 580: subtrib. Solanear. Gen.: Lonchostoma, Retzia.

Reussia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 33: nov. g. plant. (*Valli-kara Rheede* VII. t. 18.)
= Paederia Linn.

Reussia Endl. 1834. Atakta t. 26; 1837. Gen. n. 1089. p. 139; 1841. Ench. p. 81: nov. g. Pontederacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1526: g. Pontederear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 257.
Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301): g. Pontederiacear. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 96. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 424.

Reussia „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 125: nov. g. Acrostichaceitum. (Filicites scolopendrioides Brongn.)
= Crematopteris Schimp.

Reutera*) Boissier 1838. Elench. pl. Hisp. austr. p. 46.
Endl. 1839. Gen. n. 4411. p. 772; 1841. Ench. p. 378: g. Amminear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5398. — Meisn. 1843. Comm. p. 358. — Walp. 1843. Rep. II. p. 395.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

*) Dicat. F. G. Reuter, botanico Genevensi.

Reveesia Walp. vid. *Reevesia Lindl.*

Reveesieae Walp. vid. *Reevesieae.*

Rex Amaroris Rumph. 1741. Amboin. II. p. 129. t. 41.
= Soulamea Lam.

Reyesia Clos 1849 in Gay Fl. Chil. IV. p. 418. t. 52: nov. g. Bignoniacear. (R. chilensis.) *Cf.* Griseb. in Arch. f. Naturg. 1850. II. p. 326.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 93: g. Eccremocarpear.?

Reynandia Rchb. vid. *seq.*

Reynaudia Kunth 1830. Gram. p. 28. t. 9; 1833. Agrost. p. 39: nov. g. Phalaridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 758. p. 82; 1841. Ench. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1239 (*Reynandia*). — Meisn. 1843. Gen. p. 416 (318). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 169.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 239: g. Phalaroidear.
Trin. 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 18: g. Vilfeor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 152: g. Vilfear.

Reyniba*) Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4874 *b*: sect. Capparidis.
= Breyniastrum DC.

Reynoldsia A. Gray 1853. Char. n. gen. p. 10 (Proc. Amer. Ac. III. *Cf.* Flora 1855. p. 622 et Ann. sc. nat. 4e sér. IV. 1855. p. 177); 1855. Un. St. expl. exp. p. 724: nov. g. Araliacear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 82.

Reynouthria Houtt. (?) vid. *seq.*

Reynoutria Houtt. .... Syst. veg. VI. p. 627: g. Decandr. Monogyn. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 443 (*Reynouthria*). — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 702.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 292 (*Reynouthria*): g. incertae sedis.

Rhabarbareae Meisn. 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 30: subtrib. Pterygocarpar. Gen.: Pteropyrum, Rheum, Oxyria.

Rhabarbarum**) Tourn. 1700. Inst. p. 89. t. 18: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 277: g. Persicariar.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 24.
Mönch 1794. Meth. p. 628: g. Petalostemonis.
= Rheum Linn.

Rhabdia***) Martius 1827. Nov. gen. II. 2. p. 136. t. 195: nov. g. Ehretiacear. (Rh. lycioides.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 379. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 391. — Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 57.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 340; 1830. Gen. I. p. 135. n. 674: g. Asperifoliar.
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2990: g. Hydrophyllear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Ehretiear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 512.
Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear. —

*) Anagramma ex Breynia.
**) ῥᾶ, (Dioscoridis) barbarum.
***) ῥάβδος, virga, quia frutex virgas praebet.

Rhabdia Martius cont.
Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4366. — Endl. 1839. Gen. n. 3744. p. 645; 1841. Ench. p. 320. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (186). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653: g. Tournefortear.

Rhabdium Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 116: g. Temachinor.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Fragilariear. (*Denticula Kütz.*)
= Styllaria Agdh.

Rhabdocalyx A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 474: sect. Cordiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629: g. Cordiacear.

Rhabdocarpus Göpp. & Berg. 1848 in Berg. Diss. de fruct. et sem.: nov. g. Cycadear. foss. *Cf.* Flora 1849. I. p. 121.
= Nöggerathia Sternb.

Rhabdocaulis Walp. vid. *Rabdocaulis Nutt.*

Rhabdocaulon Benth. 1834. Labiat. p. 411; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 248: sect. Keithiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 788. — Endl. 1838. Gen. n. 3620 *c.* p. 619; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4119. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 743. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 173.

Rhabdochloa Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Chloridear.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 37. 617. n. 319: g. Graminear.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): sect. Chloridis.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 865 *b:* sect. Leptochloae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Cynodonear.
= Rabdochloa Palis.

Rhabdocrinum Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1352: nov. g. Tulipacear. (Anthericum serotinum.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50.
= Lloydia Salisb.

Rhabdocyathus L. & C. Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 66: sect. Cyathi. (C. striatus Hoffm.)

Rhabdonema Kütz. 1844. Bacill. p. 126; 1845. Phycol. germ. p. 110; 1849. Sp. Alg. p. 115. n. 68: nov. g. Striatellear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 41: g. Achnanthear.

Rhabdonia Hook. f. & Harv. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 408 (Alg. Tasman. p. 12): nov. g. Cryptonemear. (R. coccinea.)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 723. n. 482: g. Halymeniear.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 681: g. Dumontiear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 153: g. Rhodymeniacear.

Rhabdosciadium Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 68: nov. g. Scandicinear. (Rh. Aucheri.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 909.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Rhabdosciadium Boissier cont.
Endl. 1850. Spl. V. p. 13. n. $4516/_1$: g. Scandicinar.

Rhabdosia Hassk. vid. *Rabdosia Blume.*

Rhabdospora Westend. 1857. Bull. Ac. Brux. 2e sér. II. p. 573: subg. Septoriae.

Rhabdosporium Chevall. 1826. Fl. Paris. p. 428. t. 11.
= Stilbospora Pers.

Rhabdothamnus*) A. Cunningh. 1838 in Jard. Ann. nat. hist. I. p. 460: nov. g. Cyrtandracear. (Rh. Solandri.) — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 186.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 121: g. Cyrtandrear. *Cf.* Flora 1842. p. 219 et Endl. Spl. I. p. 1408. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 581.
Endl. 1839. Gen. p. 718. n. 4145; 1841. Ench. p. 349. n. 4148: g. Didymocarpear.
Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213): g. Gesneriear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4713: g. Henckeliear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 277: g. Loxoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.

Rhabdotheca Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 424; 1830. v. 60. p. 568: nov. g. Lactucear. (Archetypar. verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145. — Endl. 1841. Spl. I. n. 3017. p. 1388; 1841. Ench. p. 250. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2164: g. Scorzonerear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 180: sect. Microrhynchi. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 832.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3729: g. Picridiear. Sect.: Rhabdotheca, Launea.
Webb 1849 in Hook. Niger Fl. p. 145: Zollikoferiam DC. injungit.
Synon. Launaea Cass.; Launaya Rchb.; Microrhynchus Less.; Microrynchus Schultz; Ammoseris Endl.

Rhabdotheca C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 519: sect. Encalyptae.

Rhabdoweisia Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: nov. g. Weisiacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 128.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402 (*Rhabdoweissia*): g. Weissiear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 7 (*Rhabdoweissia*): g. Weissiacear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 649: sect. Weisiae.

Rhabdoweissia Bayrh., Mont. vid. *praeced.*

Rhacelopus C. Müll. 1857. Bot. Zeit. p. 531: sect. Polytrichi.
Conf. Racelopus Dozy & Molk.

Rhachicallis Endl. 1838. Gen. n. 3240 *k.* p. 550; 1841. Ench. p. 273: sect. Hedyotidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 10. — Walp. 1843. Rep. II. p. 501.

---

*) ῥάβδος, virga; θάμνος, frutex.

Rhachicallis Endl. cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374: g. Hedyotidear.
Benth. 1845. Pl. Hartweg. II. p. 195: g. Rubiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
= Rachicallis DC.

Rhachiopterideae Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 83: fam. Filicum fossilium. Gen.: Selenopteris, Gyropteris, Anachoropteris, Ptilorhachis, Diplophacelus, Calopteris.

Rhachiospermae Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 105: ordo Filicum. Divis.: Ophioglossae, Osmundeae, Gleicheniae spicatae. Gen. §. 1: Botrychium, Helminthostachis, Ophioglossum. §. 2: Osmunda. §. 3: Aneimia, Lygodium, Schizaea.

Rhachyobryum Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 107: subg. Lycopodii.
= Stachygynandrum Brongn.

Rhaciocarpon Corda in Opiz Beitr. I. p. 649 (ex Endl.): vid. *Rhakiocarpon Corda.*

Rhacodiei Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 103: sect. Mucorinor. Gen.: Camptoum, Gonosporium, Arthrinium, Ospriosporium, Actinocladium, Gonytrichum, Rhacodium, Melanotrichum, Myxotrichum; Mystrosporium, Septosporium, Macroon, Mydonosporium, Balanium, Gongylocladium, Oedemium, Helminthosporium, Cladosporium, Leptotrichum, Azosma, Mydonotrichum, Polythrincium, Trichaegum, Coccosporium, Helicoma, Helicosporium, Triposporium, Amphitrichum, Cephalotrichum, Cephalothecium, Brachycladium.

Rhacodium Spreng. 1827. Syst. IV. p. 557. n. 3570; 1831. Gen. II. p. 781. n. 4041: g. Byssoideor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 169: g. Asporomycetum rhizomorphor.
Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15: g. Byssor. rhizomorphor.
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 85: g. Byssaceor. (destructorior.) — Par. Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 394.
Mont. 1842 in Orb. Dict. II. p. 792: g. Coenogoniear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 105: g. Rhacodieor.
= Racodium Pers.

Rhacoma*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 896. 1361. n. 1114; 1762. Sp. ed. II. p. 169; 1764. Gen. ed. VI. p. 58. n. 144; 1767. Syst. ed. XII. p. 123: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 132; 1784. Syst. p. 157. — Reich. 1778. Gen. p. 59. n. 150. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 78. n. 188. — Gmel. 1791. Syst. p. 255. — Pers. 1797. Syst. p. 163.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar.
Gled. 1764. Syst. p. 28. n. 111: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 185: g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 7. n. 612: g. Darinyphytor.
= Myginda Jacq.

Rhacoma Adans. 1763. Fam. II. p. 117: g. Xeranthemor.

Rhacoma Adans. cont.
DC. 1837. Pr. VI. p. 665: sect. Leuzeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2895 *a*. p. 480; 1841. Ench. p. 247.
Synon. Leuzea Cass.

Rhacomitrium Wallr., C. Müll. vid. *Racomitrium Brid.*

Rhacopilum C. Müll. vid. *Racopilum Palis.*

Rhacosperma Martius 1829. Catal. h. Monac. p. 188. (*Racosperma* ex Wittst. Etym. Handw. p. 749.)
Endl. 1841. Gen. n. 6834 *a*. p. 1326; 1841. Ench. p. 683: sect. Acaciae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6131. 1.

Rhacotheca Bisch. . . . . . in Hochst. & Seub. Fl. Azor. p. 12. t. 14. (*Racotheca* ex Wittst. Etym. Handw. p. 749.)
Nees 1846. Syn. Hepat. p. 573: g. Jecorariar.

Rhadinocarpus**) Vogel 1838. Linnaea XII. p. 108: nov. g. Hedysarear. (Rh. multiflorus, brasiliensis et acutifolius.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Endl. 1841. Gen. n. 6628. p. 1287; 1841. Ench. p. 671: g. Alhagear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5990. — Meisn. 1843. Comm. p. 351.

Rhaeades Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 30 plant. Gen.: Papaver, Argemone, Chelidonium, Bocconia, Sanguinaria, Actaea, Podophyllum.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 481. Gen.: Monotropa, Chelidonium, Papaver, Nymphaea, Fumaria, Impatiens.
Conf. Rhoeadeae Linn.

Rhagadioleae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 392: subtrib. Cichoracear. Div.: *legitimae* (Kölpinia, Rhagadiolus), Hedypnoideae.

Rhagadioloides Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 201: g. Cichoracear.
= Hedypnois Tourn.

Rhagadiolus**) Tourn. 1700. Inst. p. 479. t. 272: g. pl. class. XIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 204. Ed. Hall. 1745. p. 210: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 211: g. Cichoracear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 168. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 483. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 372. — DC. 1805. Franç. IV. p. 4. — Link 1829. Hdb. I. p. 813.
Scop. 1777. Intr. p. 122: g. Semiflosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 60. n. 111: g. Glossariphytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 534. n. 1248: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1625. n. 1424; 1809. En. p. 833. — Pers. 1807. Ench. II. p. 379. n. 1782. — Link 1822. En. II. p. 295.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 354. t. 157: g. Ligulatar.
Mönch 1794. Meth. p. 532: g. Petalostemonis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 583; 1826. Syst. III. p. 672. n. 2907: g. Lapsanear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30.

*) Nomen ex Plinio: graece ῥάκωμα.

*) ῥαδινός, gracilis: ob gracilem leguminis figuram.
**) Nomen e voce etrurica *ragaggiolo* ortum, quare melius *Ragadiolus*. (Beckmann Lex. bot. p. 184.)

Rhagadiolus Tourn. cont.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 61; 1827. v. 45. p. 302: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Lampsanear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 416. Ed. II. p. 478. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 77. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 771. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 648. n. 3265: g. Cichorear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 257: g. Liguliflorar.
Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Canar. II. p. 392: g. Rhagadiolear. legitimar.
Jaub. & Spach 1849. Ill. pl. or. p. ... t. 284. Sejungitur Garhadiolus. *Cf.* Flora 1852. II. p. 715.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 290: g. Hyoseridear.
Synon. Rhagodiolus Rchb., Less., Endl.; Lapsanae sp. Linn.

Rhaganus E. Meyer mss.
= Natalia Hochst.

Rhagocarpium Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 557: sect. Boucheae. — Par. Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 10 (*Rhagocarpum*).

Rhagocarpum Wight vid. *praeced.*

Rhagodia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 408. Ed. Nees p. 264: nov. g. Chenopodear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 309; 1830. Gen. I. p. 202. n. 1031. — Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4352. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 872.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLVII. 567. n. 1047: g. Atriplicear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 307.
Link 1821. En. I. p. 150: g. Atriplicinar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 825. n. 935: g. Amarantear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Riviniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Endl. 1837. Gen. n. 1932. p. 296; 1841. Ench. p. 181: g. Kochiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Moq.-Tand. 1840. Chenop. en. p. 9: g. Anserinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6368: g. Betear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 49.
Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 636: g. Camphorosmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.

Rhagodiolus Rchb. 1825. Consp. p. 97. n. 2122: g. Hyoseridear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 249: g. Cichoriacear.
Less. 1832. Syn. p. 127: g. Lampsanear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2970. p. 494; 1841. Ench. p. 249. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3670.
= Rhagadiolus Tourn.

Rhagrostis Buxbaum 1729. Cent. III. p. 30. t. 55.
= Agriophyllum Bieb.

Rhakiocarpon*) Corda 1829 in Opiz Beitr. I. p. 648 (*Rhaciocarpon?* ex Endl.; *Raciöcarpon* ex Wittst.); 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Marchantiacear. (Rh. conspersum.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 76.
= Reboulia Nees.

Rhammus Dumort. vid. *Rhamnus Linn.*

Rhamnaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 107; 1847. Veg. kingd. p. 581: ordo Rhamnalium. Gen. Rhamnear. Endl.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 259: ordo Dicotyledonum. Gen.: Berchemia, Rhamnus, Sageretia, Ceanothus.

Rhamnales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 20: nixus Syncarpar. Ordines: Rhamneae, Chailletiaceae, Tremandreae, Nitrariaceae, Burseraceae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 576: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Penaeaceae, Aquilariaceae, Ulmaceae, Rhamnaceae, Chailletiaceae, Hippocrateaceae, Celastraceae, Stackhousiaceae, Sapotaceae, Styracaceae.

Rhamnarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: ordo Calypetalar. Fam.: Rhamnideae, Celastrineae, Aristoteliaceae.

Rhamneaceae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 188: ordo pl. Gen.: Ilex, Hovenia, Paliurus, Zizyphus, Rhamnus.

Rhamneae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 264. t. 107: fam. plant. Gen. Rhamnorum Juss. Accedunt §. 1: Bursaria, Pittosporum. §. 2: Schäfferia, Doratium, Tralliana. §. 6: Staavia, Columella.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 554 (Verm. bot. Schr. I. p. 52): ordo pl. e Rhamnis Juss. restrictus. Gen.: Rhamnus, Ziziphus, Paliurus, Ceanothus, Colletia, Cryptandra, Phylica, Gouania, Ventilago; Hovenia? *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 309.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 901: fam. Dicotyledonum polypetalar. Typi sectionum: Evonymus, Ilex, Rhamnus, Zizyphus.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 658: fam. 64 plant. Gen.: Rhamnus, Zizyphus, Colletia, Phylica, Ceanothus, Hovenia, Picramnia, Opelia, Castela, Ilex, Valentinia, Pomaderris, Schrebera, Elaeodendron, Myginda, Cassine, Staphylea, Bursaria, Evonymus, Polycardia, Pilocarpus, Celastrus, Glossopetalum, Linconia, Gouania, Plectronia; Hydnocarpus, Billardieria, Pittosporum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 620: fam. Calyciflorar. Gen.: Rhamnus.
DC. 1825. II. p. 19: ordo (56) Calyciflorar. Gen.: Zizyphus, Paliurus, Berchemia, Rhamnus, Condalia, Colletia, Goupia, Carpodetus, Ceanothus, Pomaderris, Phylica, Cryptandra, Ventilago, Gouania, Hovenia. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syn-

*) ῥάκιον, pannus, lacinia, ruga.

Rhamneae St. Hil. cont.
carpar.) — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 21. Gen. ut Brongn. 1827 et Sphaerocarya, Trevoa, Discaria, Bartlingia, Solenantha, Tetrapasma. *Affinia:* Coupia, Carpodetus, Schäfferia, Olinia, Daphniphyllum.
Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 320: fam. Pomaceis et Büttneriaceis aff. Gen.: Paliurus, Zizyphus, Condalia, Berchemia, Ventilago, Sageretia, Rhamnus, Scutia, Retanilla, Colletia, Hovenia, Colubrina, Ceanothus, Willemetia, Pomaderris, Cryptandra, Trichocephalus, Phylica, Soulangia, Gouania, Crumenaria. *Cf.* Isis 1834. p. 921.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLV; 1828. Consp. p. 145; 1837. Hdb. p. 222: fam. Parviflorar. Divis.: Gouaniaceae, Ceanotheae, Frangulaceae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 486. Gen.: Paliurus, Rhamnus, Frangula. — Rchb. 1841. Nom. p. 143. Divis.: Gouanieae, Phyliceae, Franguleae.
Bartl. 1830. Ord. p. 375: ordo (220) Tricoccar. Gen. ut DC. (exclusis Goupia, Carpodeto, Gouania, Hovenia) et Sageretia, Retanilla, Colubrina, Willemetia, Trichocephalus, Soulangia, Crumenaria.
Link 1831. Hdb. II. p. 118: ordo 35 Perigynar. Gen.: Zizyphus, Paliurus, Rhamnus, Ceanothus, Phylica.
Lindl. 1833. Nix. p. 20: ordo Rhamnalium.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 437: fam. (27) Tricoccar. Gen. ut Brongn. et *affinia?* Goupia, Carpodetus, Olinia, Opilia.
Meisn. 1837. Gen. p. 70 (49): ordo 62 plant. Gen. fere ut G. Don et Crypteronia?, Adolphia, Karwinskia, Strombosia?, Lepionurus?, Pennantia?, Botryceras?, Samara, Mayepea?
Endl. 1840. Gen. p. 1094; 1841. Ench. p. 579: ordo Frangulacear. Trib.: Paliureae, Franguleae, Colletieae, Phyliceae, Pomaderreae, Gouanieae. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 440.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: fam. Rhamnoidear. Trib.: Phyliceae, Zizypheae, Gouanieae.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 354. Trib.: Zizypheae, Colubrineae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 86: fam. Dicotyledonear. polypetalar. perigynar. Trib. ut Endl.
Conf. Rhamni Juss.; Rhamnoideae Vent.; Rhamnaceae Lindl.; Rhamneaceae D. Don.

Rhamni B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 58 plant. Gen.: Rhamnus, Ziziphus, Paliurus, Ceanothus, Celastrus, Bosea, Cassine, Evonymus, Staphylea, Ilex, Prinos, Phylica, Gouania.
Juss. 1789. Gen. p. 376: ordo 13 class. XIV. Gen. §. 1: Staphylea, Evonymus, Polycardia, Celastrus. §. 2: Myginda, Goupia, Rubentia, Cassine, Schrebera, Ilex, Prinos. §. 3: Mayepea, Samara, Rhamnus, Ziziphus, Paliurus. §. 4: Colletia, Ceanothus, Hovenia, Phylica. §. 5. *Affinia:* Brunia, Bumalda, Gouania, Plectronia, Carpodetus, Aucuba, Votomita.
Batsch 1802. Tab. p. 70: fam. Resinariar. Gen.: Staphylea, Evonymus, Polycardia, Celastrus, Myginda, Glossopetalum, Rubentia, Cassine, Schrebera, Ilex, Prinos, Ceranthus, Samara, Rhamnus, Colletia, Ceanothus, Hovenia, Phylica, Brunia, Bumalda.
Cassel 1810. Nat. Fam. p. 132.

Rhamnicastrum Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 193. n. 410: g. Polyandr. obscurum. (*Aembilla Herm.* zeyl. 19.)
= Embelia Juss.

Rhamnideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 41: fam. Rhamnariear. Gen.: Zizyphus, Paliurus, Berchemia, Rhamnus, Ceanothus, Pomaderris, Phylica, Gouania, Hovenia, Ventilago.

Rhamnidieae Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 96 (genus: Nemopanthes).
= Rhamnoideae Vent.

Rhamnoideae Vent. 1799. Tabl. III. p. 460: ordo 13 class. XIV. Gen. §. 1: Staphylea, Evonymus, Polycardia, Celastrus. §. 2: Myginda, Elaeodendrum, Cassine, Ilex, Prinos. §. 3: Rhamnus, Ziziphus, Paliurus. §. 4: Colletia, Ceanothus, Phylica. §. 5. *Affinia:* Brunia, Staavia, Gouania, Plectronia, Aucuba.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar. (Div.: Celastrinae.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXXI. 121: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Penaeaceae, Rhamneae, Stackhousieae?
Conf. Rhamni Juss.

Rhamnoides Tourn. 1700. Coroll. p. 52. t. 481: g. pl. class. XVIII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 161: g. ordinis 3 class. III.
Mönch 1794. Meth. p. 343: g. Thalamostemonis.
= Hippophaë Linn.

Rhamnopsis Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4879: nov. g. Flacourtiear. (Flac. sepiaria Roxb.)
= Ramontchi Endl.

Rhamnus*) Tourn. 1700. Inst. p. 593. t. 366: g. pl. class. XX.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 163: g. ordinis 3 class. III.
Koch 1836. Syn. p. 148. Ed. II. p. 162: sect. Rhamni.
= Cervispina Dill.

Rhamnus Linn. 1737. Gen. p. 58. n. 165; 1737. Cliff. p. 69; 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 80. n. 184; 1748. Ups. p. 46; 1753. Sp. I. p. 193; 1759. Syst. ed. X. p. 937. n. 235; 1762. Sp. ed. II. p. 279; 1764. Gen. ed. VI. p. 105. n. 265; 1767. Syst. ed. XII. p. 178. n. 264: g. Pentandr. Monogyn., injunctis Alaterno et Frangula ampliat. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 162. — Murr. 1774. Syst. p. 194; 1784. Syst. p. 232. — Reich. 1778. Gen. p. 107. n. 284. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 142. n. 358. — Lour. 1790. Coch. I. p. 157. — Gmel. 1791. Syst. p. 398. — Pers. 1797. Syst. p. 243. n. 265. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1092. n. 405; 1809. En. p.

*) Nomen Veteribus.

Rhamnus Linn. cont.
249. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 71. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 152. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 349; ed. 1832. I. p. 603. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 11. 221.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 216. n. 904: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Veprecular.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rhamnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 380. — Batsch 1802. Tab. p. 70.
Adans. 1763. Fam. II. p. 305: g. Zizyphor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 208. — Gis. 1792. Prael. p. 499. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 144.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 106: g. Incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 490: g. Jujubinear.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 299. 300. 302. 305. *Cf. Zizyphus, Alaternus, Frangula* et *Paliurus Med.*
Vent. 1799. Tabl. III. p. 469: g. Rhamnoidear. — Par. Link 1821. En. I. p. 227. — Unger 1845. Syn. p. 238; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII. 146. t. 49. f. 14. t. 50. f. 1—4.
Cram. 1803. Disp. p. 188 in Dioec. Tetrandr. (catharticus, etc.) et p. 208 in Polygam. Trioec.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 270: g. Rhamnear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 238. n. 532. — Hedw. 1806. Gen. p. 151. n. 645. — R. Brown 1814. Flind. voy. II. p. 554. (Verm. bot. Schr. I. p. 52.) — Mirb. 1815. Élém. II. p. 902. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 659; 1825. Syst. I. p. 767. n. 837; 1830. Gen. I. p. 181. n. 915. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIII. 276. n. 943. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 620. Sect.: Rhamnus, Frangula. — DC. 1825. Pr. II. p. 23. Sect.: Alaternus, Cervispina, Frangula, Antirhamnus? — — Lois. 1825. Dict. v. 34. p. 482 (*Nerprun*). — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 50. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 174. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1139. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 360. Sect. ut Gray. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 252. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — Link 1831. Hdb. II. p. 119. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 487. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 29. Sect.: Marcorella, Frangula, Antirhamnus? — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 122. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 447. Sect. ut Gray. — Koch 1836. Syn. p. 148. Ed. II. p. 162. Sect.: Cervispina, Rhamnus, Alaternus, Frangula. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51). — Kunth 1838. Berol. I. p. 252. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 149. Sect.: Eurhamnus, Frangula. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 335. Sect. ut Gray. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 626 (*Nerprun*). Sect. ut Gray.
DC. 1805. Franç. IV. p. 622: g. Frangulacear. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59. — Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3822. Sect.: Alaternus, Cervispina, Frangula.
D. Don 1825. Nepal. p. 190: g. Rhamneacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41 (sph. *Rhamnus*): g. Rhamnidear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 260: g. Rhamnacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582.
Endl. 1840. Gen. n. 5722. p. 1097; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. Sect. ut Gray. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 501. Sect.: Cervispina, Frangula. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 646.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 22: g. Zizyphear.
Synon. Cervispina Riv., Rupp.; Rhamnus, Alaternus et Frangula Tourn.; Marcorella etc. Neck.

Rhamnus Necker 1790. Elem. bot. II. p. 123. n. 801: g. restrictum Plyrontophytor. Sejunguntur Girtanneria, Marcorella, Berchemia, Aspidocarpus, Hettlingeria, Forgerouxa, Verlangia.

Rhamnus Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 620: sect. Rhamni. — Par. Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 362. Subsect.: Alaterni, Rhamni. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 448. — Endl. 1840. Gen. n. 5722 *a*. p. 1097; 1841. Ench. p. 581. Subsect.: Alaternus, Cervispina. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 335.
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5586: g. Frangulear. genuinar. Sect.: Rhamnus, Alaternus.
Webb .... Canar. II. p. 130: g. Rhamnear. Sect.: Persephonia, Alaternus.
= Eurhamnus Griseb.

Rhamphicarpa*) Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 368; 1846 in DC. Prodr. X. p. 503; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: nov. g. Buchnerear. (Gerardia tubulosa L.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 585. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4637. (genuinar. — *Ramphicarpa*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 526. — Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 2 (*Ramphicarpa*). t. 1415.
Endl. 1839. Gen. n. 3962. p. 685; 1841. Ench. p. 339: g. Eubuchnerear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Walp. 1845. Rep. III. p. 305. 966.
Synon. Macrosiphon Hochst.

Rhamphosperma Hassk. vid. *Ramphospermum.*

Rhamphospermum Meisn. vid. *praeced.*

Rhandia Rüling vid. *Randia Houst.*

Rhantericae Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: subdiv. Inulear. Archetypar. Gen.: Rhanterium, Cylindrocline, Molpadia, Neurolaena?

Rhanterium**) Desfont. 1799. Fl. atlant. II. p. 291. t. 240.

*) ῥάμφος, rostrum curvum.
**) ῥαντήρ, irrigator.

Rhanterium Desfont. cont.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2105. n. 1490: g. Syngenes. Superfl. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 452. n. 1858.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 420: g. Corymbiferar. anomalar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 562; 1826. Syst. III. p. 570. n. 2778; 1831. Gen. II. p. 630. n. 3134: g. Radiatar.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 565; 1827. v. 45. p. 312: g. Inulear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2470; 1841. Nom. p. 87. n. 3397. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Less. 1832. Syn. p. 199. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Rhanteriear.
DC. 1836. Pr. V. p. 463: g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2425. p. 393; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 193 (129).
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955 (*Rhantherium*): g. Eudontospermear.

Rhantherium Schultz Bip. vid. *praeced.*

Rhaphanus Gaudin, Hassk. vid. *Raphanus Linn.*

Rhaphedospera Wight vid. *Rhaphidospora Nees.*

Rhaphidium*) Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 144; 1849. Sp. Alg. p. 195. n. 151: nov. g. Desmidiear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 52.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Pediastrear.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 82: g. Tetrasporear.

Rhaphidogloca Brébiss. vid. *seq.*

Rhaphidogloea**) Kütz. 1844. Bacill. p. 110; 1845. Phyc. germ. p. 99; 1849. Sp. Alg. p. 97. n. 54: nov. g. Naviculear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 34.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Homoeocladiear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418 (sph. *Rhaphidogloca*): g. Schizonemear.

Rhaphidophora Hasskarl 1842. Flora Beibl. II. p. 11: nov. g. pl. (Pothos pertusus Roxb.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 63: g. Aroidear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 58 (*Raphidophora*): g. Callacear.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Callear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 194. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 762.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 185: subg. Scindapsi.

Rhaphidophyllum Hochst. Nov. gen. pl. Afr. p. 10: vid. *Raphidophyllum Hochst.*

Rhaphidosperma „Don in Sweet" Steud. Nomencl. II. p. 445.
= seq.

Rhaphidospora Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 115; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 499: nov. g. Diclipterear. (Justicia glabra Kön.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190 (*Raphidospora*); 1841. Nom. p. 110. n. 4291 (*Rhapidospora*). — Endl. 1839. Gen. n. 4098. p. 707; 1841. Ench. p. 344. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Wight 1850. Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 7 (*Rhaphedospera*). t. 1554. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 849.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 81 (*Raphidospora*): g. Acanthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Diclipteridar.
Synon. Rhaphidosperma Don.

Rhaphidospora Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 401: nov. g. Rhaphidosporeor.

Rhaphidosporei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 401: div. Dichaenaceor. Gen.: Corynelia, Lophium, Actidium, Ostropa, Rhaphidospora.

Rhaphiodon Schauer 1844. Flora I. p. 345: nov. g. Hyptidear. (Zapania Echinus Nees & Mart.) — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 524. 978.
= Xanthiophaea Mart.

Rhaphiolepis Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 314: g. Rosacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 415. n. 2069: g. Pomacear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 601. — Endl. 1840. Gen. n. 6352. p. 1239; 1841. Ench. p. 656. — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6529. — Walp. 1843. Rep. II. p. 57. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 560. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 100. 113. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 388.
= Raphiolepis Lindl.

Rhaphionacme Walp. vid. *Raphionacme Harv.*

Rhaphiospora Theob. vid. *Raphiospora Mass.*

Rhaphiostylis Planch. 1849 in Hook. Niger Fl. p. 259: nov. g. Olacinear. (Apodytes Beninensis Hook. f.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 179.
Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 222. 390 (*Raphiostylis*): g. Icacinear.

Rhaphis*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 552. Ed. Willd. p. 676: nov. g. Monoec. Triandr. (Rh. trivialis — *Cussu Rumph.* Amb. lib. 10. cap. 8. t. 5. f. 1.) *Cf. Raphis Batsch*, etc.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 971. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 153: g. Panicear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 148.
= Andropogon Nees?

Rhaphispermum Benth. 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 685; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 509 (p. 507 *Raphispermum*): nov. g. Gerardiear. verar.

Rhaphistemma Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175): g. Calotropidear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 483. 742: g. Haplostemmar.

---

*) ῥαφίς, acus.
**) γλοῖα, gluten.

*) ῥαφίς, acus.

Rhaphistemma Meisn. cont.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 477: g. Haplostemmeär.
Vid. Raphistemma Wall.

Rhaphoneis Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Akad. p. 74: nov. g. Naviculaceor., Surirellae aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 49. n. 31: g. Surirellear.

Rhapidospora Rchb. vid. *Rhaphidospora Nees.*

Rhapis*) Linn. f. 1789 in Ait. Hort. kew. III. p. 474.
Gmel. 1791. Syst. p. 568: g. Hexandr. Monogyn.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 772. n. 1687: g. Palmar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 42. — Link 1822. En. II. p. 437; 1829. Hdb. I. p. 264. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 137. n. 1335; 1830. Gen. I. p. 282. n. 1463. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1201.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 1093. n. 1903; 1809. En. p. 1058: g. Polygam. Monoec.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 204: g. Corysphear.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 9: g. Coryphinar. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. XCIV. 1490. — Kunth 1841. Enum. III. p. 251. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 61.
Rchb. 1828. Consp. p. 73. n. 1655: g. Coryphacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Coryphinear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 16. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 62.
Mart. .... Palm. p. 253: g. Sabalinar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1761. p. 253; 1841. Ench. p. 136. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2290. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (266).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.
Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424: g. Sabalinear.
Synon. Sjuro, Sodio et Soo-Tsiku Kämpf.

Rhapistemma Steud. vid. *Raphistemma Wall.*

Rhapontica Hill 1769. Hort. kew. p. 69: nov. g. Associatar. (Centaurea Rhapontica L.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 607. n. 2989: g. Cynarear.
= Eurhaponticum DC.

Rhaponticeae Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 309: subdiv. Serratulear. verar. Gen.: Rhaponticum, Leuzea, Fornicium, Stemmacantha. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 101. Gen. ead.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 338; 1827. v. 50. p. 463; 1830. v. 60. p. 572: div. Carduinear. Gen. ead. et Cestrinus, Acroptilon?

Rhaponticoides Vaillant 1718. Act. Acad. Paris. p. 177: g. Cynarocephalar.

Rhaponticoides Jaub. & Spach .... Illustr. pl. or. III. p. 13: sect. Phaeopappi. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 445.

Rhaponticum*) Vaillant 1718. Act. Acad. Paris. p. 175: g. Cynarocephalar., ab Auctoribus vario sensu adoptatum.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 687: g. Capitatar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 135. (Rh. Jacea, eriophorum, Calcitrapa, paniculatum.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 117: g. Xeranthemor.
Scop. 1777. Intr. p. 124: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 174: g. Cinarocephalar. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 504. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 386.
DC. 1805. Franç. IV. p. 90: sect. Centaureae. — Par. Link 1822. En. II. p. 360. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 406.
Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 315: g. Compositar. Flosculosar.
Less. 1832. Syn. p. 6: g. Serratulear. Subgen.: Klasea, Mastrucium, Stemmacantha, Leuzea, Alfredia.

Rhaponticum Mönch 1794. Meth. p. 562: g. Petalostemonis. (Centaurea jacea L.)
= Jacea Tourn.

Rhaponticum DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 155. 187: g. emendat. Carduacear. (Rh. scariosum et uniflorum.) — Par. Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 94. — Bartl. 1830. Ord. p. 144. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 289.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 309. 319; 1830. v. 60. p. 572: g. Rhaponticear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2311.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Carduinear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12.
Koch 1837. Syn. p. 407: sect. Serratulae. — Simil. Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 327; .... in Webb Canar. II. p. 370.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3891. 2: sect. Rhapontici.
= Eurhaponticum DC.

Rhaponticum DC. 1837. Prodr. VI. p. 663: g. denuo emendat. Serratulear. Sect.: Stemmacantha, Eurhaponticum, Cestrinus, Cestrinoides. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2894. p. 479; 1841. Ench. p. 247. Sect. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3891. Sect.: Stemmacantha, Rhaponticum, Cestrinus, Cestrinopsis. — Brongn. 1843. En. genr. p. 35. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 750. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 238: g. Centauriear. Sect.: Stemmacantha, Eurhaponticum.
Schultz Bip. 1852. Flora I. p. 153: subg. Serratulae. Sect. ut DC.
Synon. Centaurium Hall.; Rhapontica et Colymbada Hill; Hookia Neck.?; Rhaponticum, Stemmacantha et Cestrinus Cass.

Rhaptomeris Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 36. 41: nov. g. Cissampelidear. (Cocculus Burmanni DC.), ab Hook. f. & Thoms. (1855. Fl. Ind. I. p. 200) Cycleae injunctum.

*) *ῥαπίς*, virga.

*) *ῥᾶ* (Dioscoridis) ponticum.

Rhaptostylum*) Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 139. t. 125: nov. g. Decandr. Trigyn., ordinis incerti.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 690: g. Samydear.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 78. t. 621: g. Celastrinis aff.? — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 191.
Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 317: g. Rhamnear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 355. n. 1796: g. Decandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1471.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 21: g. Ilicineis aff. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5713. p. 1094; 1841. Ench. p. 578.
Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48): g. Evonymear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5257: g. Aquifoliaceis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598: g. Aquifoliacear.

Rhazya**) Decaisne 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 80: nov. g. Apocynear. (Rh. stricta.) — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 514.
Endl. 1838. Gen. n. 3403. p. 582; 1841. Ench. p. 294: g. Plumeriear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172).
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5169: g. Vincear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 385: g. Tabernaemontanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Rhea „Bert.“ Endl. Ench. p. 241 in synon. Dendroseridis: vid. *Rea Bert.*

Rheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Rumicinear. Gen.: Rheum, Oxyria.

Rhedia Batsch vid. *Rheedia Linn.*

Rheedea Linn. 1737. Gen. p. 364. n. 912; 1742. Gen. ed. II. p. 523. n. 1011: g. incertae sedis, pro *Vanrheedia Plum.* propositum.
= Rheedia Linn.

Rheedia Linn. 1753. Sp. II. p. 1193; 1759. Syst. ed. X. p. 1356. n. 1102: g. incertae sedis.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 719; 1764. Gen. ed. VI. p. 260. n. 641; 1767. Syst. ed. XII. p. 358: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 405; 1784. Syst. p. 487. — Reich. 1778. Gen. p. 265. n. 698. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 348. n. 875. — Gmel. 1791. Syst. p. 805. — Pers. 1797. Syst. p. 522.
Adans. 1763. Fam. II. p. 442: g. Cistor.
Gled. 1764. Syst. p. 120. n. 491: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 267: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 258: g. Guttiferar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 150. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 30. — Pers. 1807. Ench. II. p. 69. n. 1286. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 410 (*Cyroyer*). — Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104. — DC. 1824.

Rheedia Linn. cont.
Pr. I. p. 564 (dubium). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 605. n. 1960. — Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 424. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 268.
Neck. 1790. El. II. p. 266. n. 1018: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 90 (*Rhedia*): g. Guttaeferar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 784: g. Mesuëar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: g. Guttinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5493: g. Mangostanear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 441. n. 2184: g. Flacourtiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 294: g. Calophyllear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 619: g. Garciniear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 308. — Meisn. 1837. Gen. p. 43 (32).
Rchb. 1837. Hdb. p. 311; 1841. Nom. p. 212. n. 8038: g. Rheediear.
Endl. 1840. Gen. n. 5450. p. 1028; 1841. Ench. p. 535: g. dubium Clusiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.
Synon. Vanrheedia Plum., Rheedea Linn.

Rheedieae Rchb. 1837. Handb. p. 311; 1841. Nomencl. p. 212: sect. Mangostanear. Gen.: Rheedia.

Rhegmatodon „Brid. emend.“ Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 558: g. Leucodontinor.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 735. n. 3729: g. Muscor. frondosor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400; 1849. ibid. X. p. 747: g. Neckerear.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 29: g. Neckeracear.
Synon. Regmatodon Brid.; Macrohymenium Müll.

Rhegmostomei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: trib. Endothecor. Sect.: Hysteriei, Cliostomei.

Rheidia „Wight Icon.“ Hassk. Hort. Bogor. p. 27 in not. vid. *Reidia Wight.*

Rheitrophyllum*) Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 56; 1844. Cat. Bogor. alt. p. 123: nov. g. Echitear., Alstoniae aff. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 475.
Meisn. 1843. Comm. p. 366: g. Alstoniear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 80: g. Cyrtandrear., Lysionoto aff.?
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 431: g. Parsonsiear.

Rhesa Rchb., Walp. vid. *Bhesa Hamilt.*

Rhetinodendreae Meisn. 1839. Gen. pl. vasc. p. 216 (136): div. Senecionear. Gen.: Rhetinodendron, Robinsonia.
= Balbisieae DC.

Rhetinodendron**) Meisn. 1839. Gen. pl. vasc. p. 216 (136): g. Rhetinodendrear.
= Balbisia DC.

Rhetsa „Wight & Arn.“ Endl. 1840. Gen. n. 5972 *f.* p. 1147; 1841. Ench. p. 609: sect. Zanthoxyli.
Synon. Tipalia Dennst.

---

*) ῥάπτω, consuo, uno.
**) Dicat. Rhazy, medico arab.

*) ῥεῖθρον, canalis.
**) ῥητίνη, resina.

Rheum*) Linn. 1737. Gen. p. 120. n. 339; 1737. Cliff. p. 155; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 98; 1753. Sp. I. p. 371; 1759. Syst. ed. X. p. 1010. n. 454; 1762. Sp. ed. II. p. 531; 1764. Gen. ed. VI. p. 201. n. 506; 1767. Syst. ed. XII. p. 281. n. 501: g. Enneandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 319; 1784. Syst. p. 385. — Reich. 1778. Gen. p. 206. n. 549. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 271. n. 692. — Lour. 1790. Coch. I. p. 255. — Gmel. 1791. Syst. p. 654. — Pers. 1797. Syst. p. 412; 1805. Ench. I. p. 451. n. 1000. — Willd. 1799. Sp. II. p. 488. n. 803; 1809. En. p. 435. —. Gaud. 1828. Helv. III. p. 55. 57.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Vaginalium. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 176. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 246.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 82. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 251. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 194. — DC. 1805. Franç. III. p. 379. — Hedw. 1806. Gen. p. 292. n. 1163. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 305; 1825. Syst. II. p. 272. n. 1530; 1830. Gen. I. p. 329. n. 1673. — Campd. 1819. Mém. Rum. p. 18. — Link 1821. En. I. p. 389; 1829. Hdb. I. p. 308. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. — D. Don 1825. Nepal. p. 75. — Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 346. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 415 (*Rhubarbe*). — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4287. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 90. — Endl. 1837. Gen. n. 1984. p. 306; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 45. (verar.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1367. — Meisn. 1840. Gen. p. 316 (228). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 528. — Brongn. 1843. En. genr. p. 100. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 123 (*Rhubarbe*).

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.

Gled. 1764. Syst. p. 227. n. 938: g. Petalostemonum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 335: g. Monopetalar. incompletar.

Scop. 1777. Intr. p. 344: g. Seminudar.

Neck. 1790. El. II. p. 213. n. 946: g. Sysellophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 177. t. 191.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Rhear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6312: g. Rumicear. — Par. C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 143. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 496.

Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 32: g. Rhabarbarear.

Synon. Rhabarbarum Tourn.

Rhexantha Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 478: sect. Rhexiae. (R. lutea Walt.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 6200 c. p. 1427; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6708. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 126.

Rhexia*) Linn. 1737. Coroll. p. 6. n. 953; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 161. n. 375; 1753. Sp. I. p. 346; 1759. Syst. ed. X. p. 998. n. 423; 1762. Sp. ed. II. p. 491; 1764. Gen. ed. VI. p. 187. n. 468; 1767. Syst. ed. XII. p. 263. n. 463: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 295; 1784. Syst. p. 357. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 334. t. 129. — Reich. 1778. Gen. p. 189. n. 504. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 249. n. 636. — Gmel. 1791. Syst. p. 605. — Pers. 1797. Syst. p. 381; 1805. Ench. I. p. 406. n. 918. — Willd. 1799. Sp. II. p. 301. n. 729. — Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 83. t. 318—321. (reform.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 243. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 35.

Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 268. n. 1104: g. Calycostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Calycanthemor.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salicariar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332.

Hill 1769. Ht. kew. p. 172 ²: g. Tetrapetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 212: g. Dumosar.

Juss. 1789. Gen. p. 330: g. Melastomar.

Neck. 1790. El. I. p. 226. n. 374: g. Dicrophytor.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 297; 1807. Mém. Inst. I. p. 11: g. Melastomear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 174. — Hedw. 1806. Gen. p. 266. n. 1072. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 857; 1825. Syst. II. p. 305. n. 1558; 1830. Gen. I. p. 306. n. 1566. — Link 1821. En. I. p. 380; 1831. Hdb. II. p. 62. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 508. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 169. — Kunth 1824. Syn. III. p. 438. — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 220 (*Quadrette*). — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV. — Bartl. 1830. Ord. p. 329.

Batsch 1802. Tab. p. 80: g. Rhynganthar.

Cram. 1803. Disp. p. 108 in Decandr. Monogyn.

R. Brown 1818 in Tuckey Congo p. 435 (Verm. bot. Schr. I. p. 209): g. Melastomacear. (emend.) — Par. D. Don 1823. Mem. Wern. Soc. IV. p. 297. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 476. Sect.: Eurhexia, Calorhexia, Rhexantha. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1272. — Brongn. 1843. En. genr. p. 118.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: g. Rhexidear.

DC. 1828. Pr. III. p. 121: g. Rhexiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4586; 1841. Nom. p. 173. n. 6708. Sect. (1841) ut Torr. & Gray. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 746. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 226. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). —

*) ῥῆον Dioscoridis.

*) ῥῆξις, ruptura, fractura. (Linn. Phil. bot. p. 185.)

Rhexia Linn. cont.
Endl. 1840. Gen. n. 6200. p. 1211; 1841. Spl. I. p. 1427; 1841. Ench. p. 646. Sect. (1841) ut Torr. & Gray. — Walp. 1843. Rep. II. p. 126. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. nat. 3e sér. XV. p. 63: g. Pyramialium.
Synon. Alifanus Adans.

Rhexideae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae. Gen.: Rhexia, Melastoma.

Rhexieae DC. 1828. Prodr. III. p. 114: trib. Melastomear. Gen.: Appendicularia, Comolia, Spennera, Microlicia, Ernestia, Siphanthera, Rhexia, Heteronoma, Pachyloma, Oxyspora, Tricentrum, Marcetia, Trembleya, Adelobotrys. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 729. 741. Gen. ead. — Endl. 1840. Gen. p. 1210; 1841. Ench. p. 646. Gen.: Dicrananthera, Poteranthera, Spennera, Noterophila, Microlicia, Fritzschia, Ernestia, Rhexia, Heteronoma, Heterocentron, Oxyspora, Tricentrum, Marcetia, Trembleya, Adelobotrys. Accedit 1842 (Spl. II. p. 94) Leiostegia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. Gen. ead. et Uranthera, Chaetostoma.
Rchb. 1828. Consp. p. 173: sect. Melastomear. (cochliospermar.) Gen. ut DC. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 205. 221. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. (genuinar.) Gen. ut Endl.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Melastomacear. Gen.: Rhexia, Spennera, Microlicia. — Par. Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 287. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 74. Gen. ut Endl. et Uranthera.
Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82): subtrib. Melastomear. Gen. ut DC. et Dicrananthera, Noterophila, Fritzschia.

Rhigiophyllum Endl. vid. *Rigiophyllum Less.*

Rhigiophyllum*) Hochstett. 1842. Flora I. p. 232: nov. g. Campanulacear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 72. n. $3091/_1$ (anomalum).
Meisn. 1843. Comm. p. 364: g. Prismatocarpear. ?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: g. Campanulear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 388: g. Mercierear. non satis notum.

Rhigiostachys Endl. vid. *Rigiostachys Planch.*

Rhigiothamnus Lessing 1832. Syn. Compos. p. 109: subg. Dicomae.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 37: sect. Dicomae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2930 *b.* p. 487; 1841. Ench. p. 248.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9: g. Xeranthemear.
Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3418: g. Mutisiear.

Rhigozum Burch. 1824. Trav. I. p. 299. 389. *Cf.* Endl. Gen. p. 715.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123: g. Bignoniear. minus cognitum.
Meisn. 1840. Gen. p. 301 (201): g. Gelsemiear.

*) ῥιγέω, rigidus sum.

Rhigozum Burch. cont.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1406. n. $4116/_1$; 1841. Ench. p. 346. n. $4116/_2$: g. Tecomear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4549.
Fenzl 1841. Denkschr. Regensb. Ges. III. p. 200.
DC. 1845. Pr. IX. p. 233: g. Catalpear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.
Synon. Rhizogum Rchb., Harv.

Rhinacanthus*) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 108; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 442: nov. g. Eranthemear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4283. — Endl. 1839. Gen. n. 4090. p. 706; 1841. Ench. p. 344. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 157. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 833.
Dietr. 1839. Syn. X. p. 31. 78: g. Acanthacear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.

Rhinactina Willd. 1807. Berl. Mag. I. p. 139: nov. g. Syngenes., Perdicio aff.
= Jungia Linn. f.

Rhinactina Lessing 1831. Linnaea VI. p. 119; 1832. Syn. Compos. p. 162: nov. g. Asterear. (Rh. limoniifolia.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)
Nees 1833. Aster. p. 176: g. Asterum genuinor.
DC. 1836. Pr. V. p. 278: g. Diplopappear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2322. p. 377; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3276. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 485. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.

Rhinanthaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 227. t. 40: fam. pl. Gen. §. 1: Salmonea, Polygala, Veronica, Sibthorpia, Disandra. §. 2: Ourisia, Piripea, Erinus, Manulea, Castilleia, Euphrasia, Buchnera, Bartsia, Pedicularis, Rhinanthus, Melampyrum. §. 3: Hyobanche, Obolaria, Orobanche, Lathraea.
DC. 1805. Franç. III. p. 454: fam. (40) Dicotyledonum monopetalar. Ordines: *Rhinanthaceae* (gen.: Polygala, Veronica, Sibthorpia, Euphrasia, Bartsia, Rhinanthus, Pedicularis, Melampyrum, Tozzia), Orobancheae.
Juss. 1809. Ann. Mus. XIV. p. 394.
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 539. Ed. II. p. 620. Gen.: Tozzia, Melampyrum, Pedicularis, Rhinanthus, Bartsia, Trixago, Euphrasia.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 303: fam. Corolliflorar. Gen.: Veronica, Sibthorpia, Euphrasia, Odontites, Bartsia, Rhinanthus, Pedicularia, Melampyrum.
Link (1822. En. II. p. 134) 1829. Hdb. I. p. 513: subordo Personatar. Gen.: Alectorolophus, Bartsia, Rhinanthus, Euphrasia,

*) ῥίν, nasus; Acanthus.

Rhinanthaceae Jaume cont.
Pedicularis, Melampyrum, Veronica, Diplophyllum, Sibthorpia, Distandra.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (212) Monopetalar.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: fam. Personatar., a Scrophularineis sejuncta. Gen.: Rhinanthus, Pedicularis, Melampyrum; Cymbarieae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 618: ordo Corollaeflorar. Tribus: Rhinanthieae, Cymbarieae.

Rhinantharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20: ordo Torocoronar. Fam.: Acanthideae, Orobanchideae, Rhinanthideae, Crescentiaceae.

Rhinantheae Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 249. (*Les rhinanthées* ou *pediculaires.*)
= Pediculares Juss.

Rhinantheae (*rhinanthées proprement dites*) Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 249: sect. 2 Pedicularium.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 390: ordo Personatar. Gen.: Rhinanthus, Alectorolophus, Gymnandra, Bartsia, Xenopoma, Euphrasia, Pedicularis, Melampyrum, Nemesia, Sanchezia.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 329: ordo pl. Gen.: Castilleja, Pedicularis, Euphrasia, Lamourouxia, Büchnera, Gerardia. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 99. Accedunt Veronica et Sibthorpia.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 680; 1831. Gen. II. p. 485: div. Personatar. Gen.: Rhinanthus, Alectorolophus, Bartsia, Euphrasia, Lamourouxia, Castilleia, Camphyleia, Pedicularis, Melampyrum, Orthocarpus, Gomaria. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVII. Gen.: Veronica, Paederota, Wulfenia; Melampyrum; Scoparia, Tozzia, Euphrasia, Euchroma, Bartsia, Castilleia, Alectorolophus, Rhinanthus, Pedicularis. — Rchb. 1837. Hdb. p. 197; 1841. Nom. p. 115. Subdivis.: Melampyreae, Tozzieae, Pedicularinae.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 320: ordo Hypocorollear. Gen. §. 1: Microcarpaea, Veronica, Leptandra, Sibthorpia, Disandra. §. 2: Ourisia, Erinus, Manulea, Castilleia, Bartsia, Eucroma, Escobedia, Mimulus, Lamourouxia, Gymnandra, Euphrasia, Buchnera, Centranthera, Pedicularis, Rhinanthus, Melampyrum, Mazus, Lafuentea; Tozzia.
Bartl. 1830. Ord. p. 172: div. Scrophularinar. Gen.: Euphrasia, Odontites, Bartsia, Alectorolophus, Gymnandra, Castilleja, Euchroma, Centranthera, Lamourouxia, Rhinanthus, Lafuentea, Campyleia, Escobedia, Pedicularis, Melampyrum, Tozzia.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6; 1835. Scroph. ind. p. 50: trib. Scrophularinear. Gen.: Orthocarpus, Castilleja, Schwalbea; Lamourouxia, Cymbaria, Odontites, Euphrasia, Siphonostegia, Bartsia, Pedicularis, Rhinanthus, Elephas, Melampyrum. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 692; 1841. Ench. p. 340. Gen. ead. et Adenostegia, Triphysaria, Bungea, Tozzia. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. 329. Gen. ut Endl. et Euchroma, Oncorhynchus, Trixago, Prosopia.

Rhinantheae Juss. cont.
— Meisn. 1840. Gen. p. 312 (222). Gen. ut Endl. et Parentucellia, Obolaria? — Brongn. 1843. Én. genr. p. 61. Gen. ex Benth.

Rhinantheae Rchb. 1828. Consp. p. 120: div. Personatar. latius circumscripta. Subdivis.: Orobancheae, Pedicularinae, Acanthaceae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 357. Subdivis.: Pedicularinae, Selagineae, Acantheae.

Rhinantheae Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 527: sect. Euphrasiear. Gen.: Cymbaria, Bungea, Rhinanthus, Rhynchocorys, Pedicularis.

Rhinanthera Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1121: nov. g. ad Rosaceas, Capparideas et Flacourtianeas accedens.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 57: g. Homalinear.
Meisn. 1837. Gen. p. 17 (16): g. Capparear.? et p. 104 (73) Ulmariear.?
Rchb. 1837. Hdb. p. 267: g. Morisoniear.
Endl. 1839. Gen. p. 919. n. 5069: g. Prockiear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 86: g. Icosandr. Monogyn.
= Phoberos Lour.

Rhinanthideae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae. Gen.: Antirrhinum, Veronica, etc.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 23: fam. Rhinanthariear. Trib.: Melampyraceae, Limoselleae, Bignoniaceae, Mimuleae, Veroniceae, Antirrhineae, Digitalideae, Erineae, Scrophularieae, Verbascineae.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 189. 423; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: subordo Scrophulariacear. Trib.: Sibthorpieae (Sibthorpeae), Buddleieae (Buddleeae), Digitaleae, Veroniceae, Buchnereae, Gerardieae, Euphrasieae. — Simil. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459. Trib. eaed.

Rhinanthieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 618: trib. Rhinanthacear. Gen.: Rhinanthus, Elephas, Pedicularis, Melampyrum, Parentucellia, Triphysaria.

Rhinanthinae Wahlenb. 1824. Fl. suec. I. p. LXXIII: div. Personatar. Gen.: Rhinanthus, Bartsia, Euphrasia, Melampyrum, Pedicularis, Veronica.

Rhinanthoideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 295: ordo 3 class. VIII. Gen. §. 1: Polygala, Veronica, Calceolaria, Disandra. §. 2: Sibthorpia, Castileia, Euphrasia, Pedicularis, Rhinanthus, Melampyrum.

Rhinanthoidei Pers. 1807. Ench. II. p. 147: fam. pl. Gen.: Sibthorpia, Erinus, Manulea, Gomara, Buchnera, Euphrasia, Castilleja, Bartsia, Rhinanthus, Melampyrum, Escobedia, Pedicularis.

Rhinanthus*) Linn. 1737. Gen. p. 184. n. 511; 1737. Cliff. p. 325; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 603; 1759. Syst. ed. X. p. 1107. n. 658; 1763. Sp. ed. II. p. 840; 1764. Gen. ed. VI. p. 304. n. 740; 1767. Syst. ed. XII. p. 405: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 459;

*) *ῥίν*, nasus; *ἄνθος*, flos.

Rhinanthus Linn. cont.
1784. Syst. p. 549. — Reich. 1778. Gen. p. 306. n. 798. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 400. n. 997. — Gmel. 1791. Syst. p. 922. — Pers. 1797. Syst. p. 585. — Willd. 1800. Sp. III. p. 188. n. 1131; 1809. En. p. 635. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 56.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 176. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Gled. 1764. Syst. p. 174. n. 712: g. Petalostemonum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 202: g. Ringentium.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 296: g. Angiospermar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 264: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 101: g. Pedicularium.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 300: g. Rhinanthoidear. — Simil. Pers. 1807. Ench. II. p. 151. n. 1457.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 232: g. Rhinanthacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 478. — Link 1822. En. II. p. 134. — D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112.
Lois. 1817. Dict. v. 9. p. 534 (*Cocrète*): g. Rhinanthear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321.
= Rhinanthus MBieb. et Alectorolophus Hall.

Rhinanthus Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. V. (1751.) p. 129: g. Petalostemonum, sejuncto Elephante restrict.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 255. t. 54. f. 5 (Crista galli).
Neck. 1790. El. I. p. 335. n. 522: g. Chasmatophytor. Distinguitur Probosciphora.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 383: g. Capsuliferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 68: g. Tetrandr. Monogyn.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 311: g. Rhinanthacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 544. Ed. II. p. 626.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 386: g. Rhinanthinar.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 7. 106: g. Personatar.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6; 1846 in DC. Pr. X. p. 557: g. Rhinanthear. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 79. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 61. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 11. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 265.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 618: g. Rhinanthiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 612: g. Scrophulariacear.
Math. 1853. Belg. I. p. 388: g. Pediculariнear.
= Alectorolophus Hall.

Rhinanthus Marsch.-Bieb. 1808. Fl. taur. caucas. II. p. 68. n. 318: g. Didynam. Angiosperm. restrict. (Rh. orientalis.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 391; 1825. Syst. II. p. 771. n. 2150; 1831. Gen. II. p. 485. n. 2393: g. Rhinanthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 172. — Endl. 1839. Gen. n. 4016. p. 694; 1841. Ench. p. 340. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Meisn. 1840. Gen. p. 312 (223). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 553. — Walp. 1845. Rep. III. p. 433. 972.
Stev. 1823. Mém. soc. Mosc. VI. p. 3: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3076; 1841. Nom. p. 115. n. 4462: g. Pedicularinar.
Link 1829. Hdb. I. p. 514: g. Rhinanthacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Melampyracear.
C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 683: g. Euphrasiear.
Synon. Elephas Tourn.; Probosciphora Neck.; Rhynchocorys Griseb.

Rhinanthus D. Don 1825. Fl. Nepal. p. 94: g. Pedicularear. (Rh. bifidus.)
= Pedicularis sp. (Benth. in DC. Pr. X. p. 580.)

Rhinchocorys Benth. vid. *Rhynchocorys Griseb.*

Rhinchoglossum Blume vid. *Rhynchoglossum (Bl.) G. Don.*

Rhinchospora Gaudich. vid. *Rhynchospora (Vahl) Willd.*

Rhinchothecum Dietr. vid. *Rhynchothecum R. Brown.*

Rhiniachne Hochstett. Herb. Abyssin. Ed. II. n. 2056.
= Jardinea Steud.

Rhinium Schreb. 1791. Gen. II. p. 701. n. 1545: g. Dioec. Icosandr. (*Tigarea Aubl.*)
= Tetracera Linn.

Rhinocarpus „Bertero & Balbis mss." Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 335; 1825 in HBK. gen. VII. p. 5. t. 601; 1825. Syn. IV. p. 146: nov. g. Terebinthacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3868: g. Anacardiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 63.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 344. n. 1740: g. Terebinthear.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (55): g. Cassuviear.
= Anacardium Rottb.?

Rhinocerotis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 344: subg. Elytropappi.
DC. 1837. Pr. VI. p. 256: sect. Elytropappi.

Rhinolobium Arnott .... in Johnst. Mag. Zool. and Bot. II. p. 420.
Endl. 1843. Spl. III. p. 76. n. $3493/_1$: g. Euasclepiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.
= Lagarinthus E. Meyer.

Rhinopetalum Fischer 1830. Edinb. n. phil. journ. p. 19.
Bernh. 1835. Flora II. p. 597; 1840. ibid. II. p. 393: g. Tulipacear. — Par. Endl.

Rhinopetalum Fischer cont. 1837. Gen. n. 1097. p. 141; 1841. Ench. p. 83. — Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1757. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 148.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 255. g. Liliear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 254.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Tulipear.

Rhinostegia Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. Nr. 1. p. 56: nov. g. Santalacear. *Cf.* Flora 1844. p. 121 et Endl. Spl. IV. p. 58. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788.
= Thesium Linn. (A. DC. Pr. XIV. p. 637.)

Rhinotrichum Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 17. t. 4. f. 232; 1842. V. p. 12; 1842. Anl. Mycol. p. 46: nov. g. Psiloniacear. (Rh. simplex.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 72. (?) — Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 41. t. 21. 22; 1851. Linnaea XXIV. p. 121.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 501: g. Dematiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Menisporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 91: g. Pleurosporiaceor.

Rhipidion*) Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 312: nov. g. Algar. (Ulva flabelliformis Wulf.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 760 (*Rhipidium*).
= Udotea Lamx.

Rhipidium Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 742: g. Hymenomycetum gymnosporor. (Agaricus stypticus Bull.)

Rhipidium „Bernh." Endl. in synon. Schizaeae: vid. *Ripidium Bernh.*

Rhipidium „Targ." Wittst. vid. *Rhipidion Targ.*

Rhipidium „Trin." Wittst. vid. *Ripidium Trin.*

Rhipidodendron Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 243: g. Spathacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Galanthear.
Endl. 1837. Gen. n. 1115 *d.* p. 143; 1841. Ench. p. 83: sect. Aloës. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1842. 4. — Meisn. 1842. Gen. p. 398. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 533. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 357.
= Rhipidodendrum Willd.

Rhipidodendrum**) Willd. 1811. Berl. Mag. V. p. 164: nov. g. ab Aloë disjunctum. (A. plicatilis et dichotoma.)
Haw. 1821. Revis. succ. p. 45: g. Hexandr. Monogyn.
Salm-D. 1834. Hort. Dyck. p. 311: sect. Aloës.
Synon. Kumara Medic.; Aloë Rchb.; Rhipidodendron Spreng.

Rhipidophora Kütz. 1844. Bacill. p. 121; 1845. Phycol. germ. p. 107; 1849. Sp. Alg. p. 111. n. 61: g. Licmophorear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 44. — Math. 1853. Belg. II. p. 534.
Synon. Styllariae Bory pars; Stylaria Trevis.

Rhipidopteris Schott 1834. Gen. Filic. Fasc. III. t. 3 in not.: nov. g. Filicum. (Acrostichum flabellatum, peltatum, foeniculaceum, tripartitum.)
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 150: sect. Polybotryae.
Fée 1844. Acrost. p. 14. 78; 1852. Gen. Fil. p. 49: g. Acrostichear.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 428: sect. Acrostichi.
Synon. Peltapteris Link.

Rhipidosiphon Montagne 1842 in d'Urv. voy. Pol. p. 22. t. 7. f. 3.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 30 in adnot.: g. Oliviear.?
Endl. 1843. Spl. III. p. 17. n. 46: g. Acetabulariear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; XI. p. 110.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Acetabularidar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 493. n. 309: g. Vaucheriear.

Rhipidostigma Hasskarl 1855. Retzia I. p. 103: nov. g. Ebenacear. (R. Zollingeri et Teijsmanni.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 476. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1051.

Rhipocephalus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phycol. gener. p. 311; 1849. Sp. Alg. p. 506. n. 320: nov. g. Codiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Halimedear.
Synon. Halipsygma Endl.

Rhipogonium „Trev." Flora 1843. p. 465: vid. *Rhipozonium Kütz.*

Rhipogonum Spreng., Dietr., Hook. f. vid. *Ripogonum Forst.*

Rhipozonium Kütz. 1841. Polyp. calcif. p. 21.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465: *Rhipogonium*): g. Codiear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phyc. gener. p. 309; 1845. Phyc. germ. p. 253.
= Udotea Lamx.?

Rhipsalidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 748: trib. Cactacear. Gen.: Rhipsalis, Lepismium.

Rhipsalideae DC. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 26; 1828. Prodr. III. p. 475: trib. Cactear. Gen. unicum: Rhipsalis. *Cf.* Link 1831. Hdb. II. p. 12. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 176. Gen. id. — Salm-D. 1840 in Otto's Gartenz. p. 60. Gen.: Rhipsalis, Lepismium, Hariota. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1422; 1841. Ench. p. 496. Gen. ead. — Walp. 1843. Rep. II. p. 279. Gen.: Rhipsalis, Lepismium. — Salm-D. 1845. Cact. h. Dyck. p. 38. Gen.: Rhipsalis, Pfeiffera, Lepismium. — Först. 1846. Hdb. Cact. p. 447. Gen.: Rhipsalis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42: trib. Cactidar. Gen.: Rhipsalis.
Rchb. 1837. Hdb. p. 233: subdiv. Cactear. (genuinar.) Gen.: Rhipsalis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 161. Gen.: Rhipsalis, Lepismium, Hariota.

*) ῥιπίδιον, umbraculum.
**) ῥιπίς, flabellum; δένδρον, arbor.

Rhipsalis Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 137. t. 28. f. 1.: nov. g. plant. (Cassyta polysperma Ait.)
Haw. 1812. Syn. succ. p. 186 (Ed. Schrank 1819. p. 224); 1819. Suppl. p. 83: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 410. n. 2047.
Hook. 1822. Exot. fl. I. t. 2. *Cf.* Flora 1823. I. p. 36.
Link 1822. En. II. p. 23: sect. Cacti. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 496.
DC. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 77; 1828. Pr. III. p. 475: g. Rhipsalidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 176. — Rchb. 1837. Hdb. p. 233. — Först. 1846. Cact. p. 447. Sect.: Rhipsalis, Pfeiffera, Lepismium.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: g. Nopalear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 143; 1846. ibid. XIII. p. 388.
Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4247: g. Cactear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 944. n. 5160. Sect.: Rhipsalis, Lepismium, Hariota. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 38. 117. — Brongn. 1843. En. genr. p. 106. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 637.
Zuccar. 1837. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. II. p. 686: Opuntiae inserendam proponit.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 748: g. Rhipsalidar.
= Rhipsalis et Hariota DC.

Rhipsalis DC. 1834. Mém. Cact. p. 22: g. Rhipsalidear. restrict. — Par. Salm-D. 1840 in Otto's Gartenz. p. 60. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1422; 1841. Ench. p. 496. n. 5160. — Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6258.
Pfeiff. 1837. Enum. Cact. p. 129; 1837. Beschr. Cact. p. 140: g. Cactear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 128 (92). — Walp. 1846. Rep. V. p. 821. (rotatar.)
Miq. 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 116: subg. Hariotae. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 944. n. 5160 *a*.
Walp. 1843. Rep. II. p. 342: subg. Rhipsalidis.
Synon. Hariota Adans.

Rhitidolepis „Artis" Flora 1827. I. p. 139: vid. *Rhytidolepis Sternb.*

Rhitisma Brongn. vid. *Rhytisma Fries.*

*Rhizantheae**) Blume (1825. Batav. Cour.) Nees 1825. Flora II. p. 609: nova fam. plant., Marsileaceis aff. Gen.: Rafflesia.
Blume 1828. Fl. jav. (Fasc. I. II) Rhizanth. p. 3. Gen. jav.: Rafflesia, Brugmansia.
Blume 1833. Nov. fam. exp.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 90. Gen.: Rafflesia, Cytinus, Aphyteja, Apodanthes.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 8; 1831. Gen. II. p. 715: fam. Cryptogamar. primae sectionis. Gen.: Rafflesia.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 10: class. plantar. Ordines: Balanophoreae, Cytineae, Rafflesiaceae.
Lindl. 1833. Nix. p. 36: class. IV. plant. Ordines ut Schott & Endl. et Cynomorieae.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 389.

*) ῥίζα, radix; ἄνθος, flos.

Rhizantheae Blume cont.
Endl. 1836. Gen. p. 72; 1841. Ench. p. 51: classis unica Acrobryor. hysterophytor. Ordines ut Schott & Endl. — Par. Unger 1838. Aphor.
Meisn. 1842. Gen. p. 366. 442 (274): class. 39 Monocotyledonear. Ordines ut Endl.

Rhizanthes Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 14: g. Rafflesiacear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 553.
= Brugmansia Blume.

Rhizidium A. Braun 1856. Berl. Monatsber. p. 587: nov. g. Chytridio aff.

Rhizina Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 161: nov. g. Fungor. (Helvella acaulis Pers.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 375.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 18. 29 (*Rhizine*): g. Pezizar.
Pers. 1822. Mycol. I. p. 216: g. Helvelloideor.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 32; 1828. Elench. II. p. 4: g. Mitrator. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 765. n. 3912.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 573: g. Pezizear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 298.
Fries 1825. Pl. homon. p. 85: g. Cupulator. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 317. — Endl. 1836. Gen. n. 431. p. 38; 1841. Ench. p. 21.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182 (*Rhizinia*): g. Pezizoideor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Helvellacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 559: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 449: g. Pezizeor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 376. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 347: g. (inter Helvellas et Pezizas medium) Helvellaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 200: g. Rhizinaceor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 62. t. 20.
Synon. Octosporae sp. Hedw.; Elvellae sp. Schäff.

Rhizinacei Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 200: fam. Discomycetum. Gen.: Rhizina, Corticium. — Par. Bail 1858. Syst. p. 62.

Rhizine Ehrenb. vid *Rhizina Fries.*

Rhizinia Link vid. *praeced.*

Rhizirideum „Don" Schult. 1830. Syst. VII. p. 1062: sect. Allii. — Par. Koch 1837. Syn. p. 716. Ed. II. p. 828. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 418 (*Rhiziridium*). — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 236. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 178. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 211.

Rhiziridium Kunth vid. *praeced.*

Rhizo-Acroblastae Rchb. 1828. Consp. p. 43; 1830. Fl. exc. p. 3. 5: ordo Acroblastar. Formationes: Limnobiae, Helobiae.

Rhizoblastae Willd. 1796 in Usteri n. Ann. XI. p. 19: div. Geoblastar.

Rhizobolaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 398: ordo Guttiferalium. Gen.: Caryocar, Anthodiscus.

Rhizoboleae DC. 1824. Prodr. I. p. 599: ordo (42) Thalamiflorar. Gen.: Caryocar.

Rhizoboleae DC. cont.
— Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 653. Gen. id.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: subdiv. Sapindacear. Gen. id.
Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 322.
Rchb. 1828. Consp. p. 205: div. Bombacear. Gen. id. et Geissois.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 47: fam. Hypericariear. Gen.: Caryocar.
Bartl. 1830. Ord. p. 365: ordo (214) Malpighinar. Gen. id.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 781: div. Oxalidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Guttalium.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 9: fam. (33) Malpighinear. Gen. ut DC.
Meisn. 1837. Gen. p. 43 (32): ordo 32 plant. (p. 439 Lamprophyllar.) Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 295; 1841. Nom. p. 203: subdiv. Bombacear. Gen.: Caryocar; Ophelus? (1841 Anthodiscus.)
Endl. 1840. Gen. p. 1075; 1841. Ench. p. 565: ordo Acerum. Gen.: Caryocar, Anthodiscus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 87: fam. Aesculinear.?
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 112: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.

Rhizobolus „Gärtn." Schreb. 1789. Gen. I. p. 369. n. 932: g. Polyandr. Tetragyn. — Par. Gmel., 1791. Syst. p. 840.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 93. t. 98. f. 1 (Pekea tuberculosa Aubl.)
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 394. t. 5. f. 2 (Rh. Saouvari): g. inter Terebintaceas et Sapindos medium.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 699: g. Sapindear.
= Caryocar Linn.

Rhizobotrya Tausch 1836. Flora I. p. 33: nov. g. Cruciferar. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 192 et Koch 1841. Flora p. 159.
Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11): g. Alyssinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: g. Armoraciear.
Endl. 1839. Gen. n. 4882 *a.* p. 870; 1841. Ench. p. 449: sect. Cochleariae.
= Kernera Med.

Rhizocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 34: class. IV. Cryptogamor. Gen.: Pilularia, Marsilea, Salvinia, Isoëtes.

Rhizocarpae Batsch 1802. Tab. affin. p. 261: fam. Chlorophyllor. Gen.: Marsilea, Salvinia, Pilularia, Isoëtes.
Agdh. 1822. Aphor. p. 111; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 583: ordo Tetradidymar. Gen. ead. et Azolla.
Bischoff 1828. Krypt. Gew. (Nürnb.)
Bartl. 1830. Ord. p. 15: class. Vegetabilium vascularium cryptogamor. Ord.: Salviniaceae, Marsileaceae, Isoëteae.
= Hydropterides Willd.

Rhizocarpeae Genth 1836. Fl. Nass. I. p. 3. 43: ordo Filicoidear. Gen.: Pilularia, Marsilea, Salvinia.
Meisn. 1843. Gen. p. 436 (338): ordo Filicum. Subord.: Isoëteae, Marsileaceae, Salviniaceae.
Schleid. 1843. Grundz. II. p. 97: div. unica Athalamicar.
Metten. 1846. Beitr. z. Kenntn. d. Rhizoc. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 692.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 16. 125: fam. Cryptogamar. Subord.: Marsileaceae, Salviniaceae.

Rhizocarpi Brid. 1827. Bryol. II. p. XXXIX. 663: class. 4 Muscor. Gen. unicum: Rhizogonium. — Par. Brid. ibid. p. XLVI. Familia unica: Rhizopodes.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 94: subdiv. Acromitrior. Gen. id.

Rhizocarpon „Ramond" DC. 1805. Fl. franç. II. p. 365; 1815. V. p. 183: nov. g. Lichenum. (Lichen geographicus L.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 377 et Wittst. Etym. Handw. p. 761 (*Rhizocarpum*).
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 105: sect. Lecideae. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 343.
Math. 1853. Belg. II. p. 141: sect. Patellariae.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 258: g. Lecidinar.
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Eulecideinar. (*Synon. Diplotomma Mass.*)
Arnold 1858. Flora p. 478: g. Lecidear.
Synon. Graphidium Link.

Rhizocarpum Wittst. vid. *praeced.*

Rhizocephalus Boissier 1844. Diagn. pl. nov. or. I. Nr. 5. p. 68: nov. g. Phalaridear., Crypsidi aff. (R. orientalis.)
Steud. 1854. Glum. I. p. 152: g. Vilfear.

Rhizocladus Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 34. n. 1859 *B*: sect. Ficus.
Synon. Tenorea Gasparr.; Erosma Booth?

Rhizoclonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phycol. gener. p. 261; 1845. Phycol. germ. p. 205; 1849. Sp. Alg. p. 383. n. 255: nov. g. Confervear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 19. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 91.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 105: sect. Confervae.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ... : g. Zygnemacear.?

Rhizococcum Desmaz. ...
= Hydrogastrum Desv.

Rhizocoleophyta Rchb. 1837. Handb. p. 141; 1841. Nomencl. p. 31: ordo Coleophytor. Formationes: Limnobiae, Helobiae.
Conf. Rhizo-Acroblastae Rchb.

Rhizocorallon Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 301: g. pl. class. XIV.
= Corallorhiza Hall.

Rhizocoryne Kütz. mss. 1838.
= Laurencia Lamx.

Rhizoctonei Rchb. 1841. Nomencl. p. 8: sect. Sclerotiaceor. genuinor. Gen.: Chaetocypha, Anixia, Mylitta, Rhizoctonia, Pachyma. — Simil. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 244.

Rhizoctonia*) DC. 1815. Mém. Mus. II. p. 216. t. 1; 1815. Fl. franç. V. p. 110: nov. g. Angiocarpor. (Sclerotium crocorum Fl. franç.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 378.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum abnormium.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Tuberacear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 265; 1828. Elench. II. p. 45; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 479: g. Sclerotiacear. Tribus (1828): Thanatophyta, Sclerotioidea.
Link 1824. Spec. I. p. 119: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 565: g. Sclerotiear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 776. n. 3997. — Math. 1853. Belg. II. p. 401.
Fries 1825. Pl. homon. p. 155: g. Rhizogoneor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 159. — Endl. 1836. Gen. n. 289. p. 24; 1841. Ench. p. 16. Sect.: Bryochisium, Thanatophytum.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 996: g. Hymenomycor. anomalor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Sclerotidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 325: g. Rhizoctoneor. Sect. ut Endl. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 245.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.

Rhizogenae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 83: class. III. plant. Nixus: Rhizogenae. Ordines: Balanophoraceae, Cytinaceae, Rafflesiaceae.

Rhizoglossum Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 307: nov. g. Ophioglossear. (Ophioglossum Bergianum Schl.)
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 120: sect. Ophioglossi.

Rhizogoneae Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 223: sect. Perisporiacear. Gen.: Pachyma, Mylitta, Anixia.

Rhizogonei Fries 1825. Pl. homon. p. 153: trib. Sclerotiaceor. Gen.: Pachyma, Mylitta, Cenococcum, Anixia, Rhizoctonia. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. Gen. ead. — Endl. 1836. Gen. p. 24; 1841. Ench. p. 16. Gen. ead. (excluso Cenococco.)

Rhizogonia Endl. 1836. Gen. n. 281 *e.* p. 24; 1841. Ench. p. 16: sect. Sclerotii.

Rhizogoniaceae C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 802: trib. Muscor. Gen.: Rhizogonium, Rhizopelma, Hymenodon.

Rhizogonieae Montagne 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399; 1849. ibid. XI. p. 113: trib. Pleurocarpor. Gen.: Rhizogonium, Hymenodon.

Rhizogonium Brid. 1827. Bryol. II. p. 663: g. Rhizocarpor. peristomor. (p. XLVI g. Rhizopodum.)
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 544: g. Entophyllocarpior.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Entophyllocarpor.?

Rhizogonium Brid. cont.
Endl. 1836. Gen. n. 594. p. 59 (*Rhizonium*); 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 972 (*Rhizonium*): g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 803: g. Rhizogoniacear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 115.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 172: sect. Mnii.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399; 1849. ibid. XI. p. 113: g. Rhizogoniear.

Rhizogum Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3268: g. Bignoniear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 235.
Bartl. 1830. Ord. p. 186: g. Bignoniacear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131. = Rhigozum Burch.

Rhizomorpha Roth 1791 in Usteri Ann. I. t. 1. f. 2. 3; 1797. Catal. bot. I. p. 233: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 380. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1485. — Hoffm. 1796. Comm. Götting. XII. 1. p. 35. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 28. 387. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 19; 1846. Chlor. prot. p. XXIX. — Bonord. 1851. Hdb. p. 278 (sedis incognitae).
Pers. 1801. Syn. p. XX. 704: g. Naematothecior.
Batsch 1802. Tab. p. 271: g. Byssinor.
Rebent. 1804. Neom. p. 391: g. Byssor. — Par. Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 54 (fibrilliformium).
DC. 1805. Franç. II. p. 280; 1815. V. p. 115: g. Hypoxylor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 22: g. Mucedinum? dubium.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 54: g. Eleutherocarpor.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 118. 587; 1814. Syn. Lich. p. 288: g. Cephaloideor.
Mart. 1817. Erlang. p. 359: g. Inomycetum terrestrium.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 488: g. Rhizomorphidar.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Sphaerophoror.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: g. Sphaeriar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.
Eschw. 1822. De fruct. gen. Rhizom. comm. (Elberf.) *Cf.* Flora 1822. II. p. 725.
Fries 1825. Pl. homon. p. 296: g. Rhizomorphear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 778. n. 4008.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1032: g. Mucoroideor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 542. n. 3543: g. Gastromycetum.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 98: g. Rhizomorpheor. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Byssinear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 172: g. Asporomycetum rhizomorphor.
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 87: g. Byssaceor.

*) κτονέω, neco.

Rhizomorpha Roth cont. (destructorior.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 63.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 382: g. Sphaeriaceor.

Math. 1853. Belg. II. p. 402: g. Sclerotiear.

Rhizomorpheae Fries 1825. Pl. homon. p. 296: trib. Byssacear. Gen.: Rhizomorpha, Thamnomyces, Synalissa, Coenocarpus, Melidium, Phycomyces, Ascophora, Periconia? *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 385.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 778: div. Gastromycetum. Gen.: Rhizomorpha, Thamnomyces, Melidium, Chaenocarpus, Synalissa.

Rhizomorphei Rchb. 1828. Consp. p. 6: subdiv. Byssaceor. genuinor. Gen. Rhizomorphear. Fries. (Ascidiophora loco Ascophorae.)

Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15: sect. Byssor. Gen.: Protonema, Tophora, Byssus, Rhacodium, Rhizomorpha.

Rhizomorphidae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 487: div. Idiothalamear. Gen.: Sphaerophoron, Rhizomorpha.

Rhizonium Endl., vid. *Rhizogonium Brid.*

Rhizonium Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 46. t. 27: nov. g. Orchidear. foss. (Rh. orchideiforme.)

Rhizopelma*) C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 803: nov. g. Rhizogoniacear. (Rhizog. Novae Hollandiae Brid.), serius ab Auctore ad Rhizogonium revocatum.

Rhizophora**) Linn. 1737. Gen. p. 137. n. 386; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 443; 1759. Syst. ed. X. p. 1043. n. 524; 1762. Sp. ed. II. p. 634; 1764. Gen. ed. VI. p. 236. n. 592; 1767. Syst. ed. XII. p. 325: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 141. t. 89. — Murr. 1774. Syst. p. 367; 1784. Syst. p. 442. — Reich. 1778. Gen. p. 242. n. 646. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 317. n. 806. — Lour. 1790. Coch. I. p. 296. — Gmel. 1791. Syst. p. 746. — Pers. 1797. Syst. p. 473; 1807. Ench. II. p. 2. n. 1156. — Willd. 1799. Sp. II. p. 843. n. 931. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 459.

Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 206 (*Rizophora*).

Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: g. Candelarium.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.

Gled. 1764. Syst. p. 105. n. 428: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 234: g. Nomadear.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 212. t. 45. f. 1 (Mangle et gymnorrhiza).

Juss. 1789. Gen. p. 213: g. Caprifolior.

Neck. 1790. El. II. p. 360. n. 1160: g. Osariphytor. Disjungitur Azophora.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 601: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 458.

Batsch 1802. Tab. p. 240: g. Viscinar.

Cram. 1803. Disp. p. 91 in Octandr. Monogyn. (Rh. Mangle.)

*) πέλμα, solea.
**) ῥίζα, radix; φέρω, fero. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 185.

Rhizophora Linn. cont.

Thouars 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 31. t. 4.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 549 (Verm. bot. Schr. I. p. 42): g. Rhizophorear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 446. — Kunth 1824. Syn. III. p. 86. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 235. n. 1476; 1830. Gen. I. p. 316. n. 1613. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 386. — DC. 1828. Pr. III. p. 31 (injuncta Bruguiera Lam.) Sect.: Mangles, Kandelia, Kanilia, Paletuviera. — Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1968; 1841. Nom. p. 171. n. 6617. (restrict.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 91. — Bartl. 1830. Ord. p. 320. — Link 1831. Hdb. II. p. 60. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 673. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 310. (restrict.) — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 332. (verar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85). — Griff. 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 121. — Arnott 1838. Ann. nat. hist. I. p. 361. Sejunguntur Ceriops et Kandelia. — Endl. 1840. Gen. n. 6098. p. 1185; 1841. Ench. p. 634. Sect.: Mangle, Aërope. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1301. — Walp. 1843. Rep. II. p. 70. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 539. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 131. Sect. ut Endl. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 415 (*Paletuvier*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 583. Sect. eaed. — Tulasne 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 108. (sincerar.)

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. V. p. 80: g. Rhizophoriae.

Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 201: g. Loranthear.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 40; 1847. Veg. kd. p. 728: g. Rhizophoracear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 484.

Rhizophoraceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 40.

Meisn. 1838. Gen. p. 119 (84): ordo 77 plant. (p. 440 Calycanthemar.) Trib.: Cassipoureae?, Rhizophoreae et genus Olisbea?

Torr & Gray 1840. North-Am. I. p. 483. Gen.: Rhizophora.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 727: ordo Myrtalium. Gen.: Rhizophora, Ceriops, Kandelia, Bruguiera, Carallia.

Rhizophoreae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 549 (Verm. bot. Schr. I. p. 42. — Gen. rem. p. 17): novus ordo plant. Gen.: Rhizophora, Bruguiera, Carallia. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 389.

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 446: ordo pl. Gen.: Rhizophora.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.

DC. 1828. Pr. III. p. 31: ordo (70) Calyciflorar. Gen.: Olisbea?, Rhizophora, Carallia; Cassipourea? — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.). — G. Don 1832. Gen syst. II. p. 672. Gen. ut DC. — Endl. 1840. Gen. p. 1184; 1841. Ench. p. 634. Gen. ut Arnott 1838 excepto ultimo. — Walp. 1843. Rep. II. p. 70. Gen. ead.

Rhizophoreae R. Brown cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 93: sect. Loranthear. Gen. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33. 34: fam. Lorantharicar. Gen.: Rhizophora, Carallia.
Link 1831. Hdb. II. p. 59: ordo 19 Perigynar. Gen.: Rhizophora.
Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo Onagralium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 179: div. Caprifoliacear.
Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85): trib. Rhizophoracear. Gen. ut R. Brown et Kandelia.
Griff. (Trans. soc. Calc.) 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 117. Gen. ut Meisn.
Arnott 1838 in Jard. Ann. nat. hist. I. p. 359. Gen. ead. et Ceriops, Dryptopetalum.
Rchb. 1841. Nom. p. 171: sect. Combretear. Gen. ut Endl. et Aërope.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 119: fam. Oenotherinear.? Gen.: Carallia.
B. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 114: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 131. Novum gen.: Kanilia.
Synon Rhizophoraceae Lindl.; Rhizophoreae genuinae Bartl.

Rhizophoreae Bartl. 1830. Ord. p. 319: ordo (184) Calyciflorar. ampliat. Divis.: *genuinae* (gen.: Rhizophora, Bruguiera, Carallia, Codia; Olisbea), Legnotideae.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 330: fam. (63) Calyciflorar. Sect: *verae* (gen. ut Bartl. excepta Bruguiera), Legnotideae.
Tulasne 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 106. Divis.: *sincerae* (gen.: Rhizophora, Ceriops, Bruguiera, Carallia), Legnotideae.

Rhizophoria Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: fam. Nantiandriae. Gen.: Rhizophora, Bruguiera, Mangium, Aegiceras?

Rhizophydium Schenk . . . . : g. Algar.

Rhizophyllineae Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: trib. Floridear. Gen.: Rhizophyllis, Fauchea.

Rhizophyllis Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 334; 1849. Sp. Alg. p. 877. n. 579: nov. g. Delesseriear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 174.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XI. p. 114: g. Rhizophyllinear.

Rhizophyllum Palis. 1805. Fl. Owar. p. 22: nov. g. Hepaticar. ex typo Marsileae Mich. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 391.
= Pellia Raddi?

Rhizophyllum Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 349: sect. Dendrolirii.

Rhizophyllus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 399: sect. Asphodeli. (Asphodeli rhizophylli Koch.)
Synon. Gamon Gay.

Rhizopodes Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII: fam. unica Rhizocarpor. Gen. unicum: Rhizogonium.

Rhizopogon Fries 1818. Symb. p. 5; 1823. Syst. mycol. II. p. 293: nov. g. Tuberacear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 393. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 27; 1842. Mycol. p. 110.

Rhizopogon Fries cont.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 564: g. Tuberear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 400.
Fries 1825. Pl. homon. p. 129: g. Tuberaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 222. — Bonord. 1851. Hdb. p. 277.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 997: g. Angiogastrum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 762. n. 3888: g. Myelomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 868: g. Pyrenomycetum asporor.
Endl. 1836. Gen. n. 348. p. 30; 1841. Ench. p. 17: g. Tubereor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 330. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 246.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 85: g. Gasteromycetum.
Corda 1841 in Sturm Fl. H. 19. 20. p. 43. t. 14.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 435: g. Hymenogastreor.
Bail 1858. Syst. p. 10: g. Euhymenogastreor.
Synon. Hysteromyces Vittad.

Rhizopogon Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 67. t. 5. f. 44. 45: g. Tuberacear. (Rh. album et magnatum.)
= Euchoiromyces Tul.

Rhizopterides Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 9: ordo 3 Cryptogamiae. Gen.: Isoëtes, Pilularia.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 2: ordo 1 Filicum. Gen.: Isoëtes, Pilularia, Salvinia, Marsilea.
= Hydropterides Willd.

Rhizopus Ehrenb. 1821. Nov. Act. Leop. X. p. 198. t. 11: nov. g. Fungor. (Mucor stolonifer Ehr.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 394.
Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 139 *a:* sect. Mucoris.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 20; 1842. V. p. 17; 1842. Mycol. p. 68: g. Mucoroidear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 230: g. Mucoroideor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Ascophoreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 123: g. Mucorum.
= Mucor Mich.?

Rhizosolenia Ehrenb. 1843. Amer. p. 134; 1844. Ber. Berl. Ak. p. 88: nov. g. Polygastricor.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eulysigoniear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 24. n. 16: g. Melosirear.

Rhizosonchus Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 425: sect. Dendrosonchi. (Sonchus radicatus Ht. kew.)

Rhizosperma Meyen 1834. Reise I. p. 337; 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 523: nov. g. ab Azolla Lam. disjunctum. (*Synon. Azolla R. Brown.*)
Endl. 1841. Ench. p. 44. n. 688 *b:* sect. Azollae. — Par. Metten. 1847. Linnaea XX. p. 273.

Rhizospermae Wiggers 1780. Prodr. fl. Holsat. p. 74: ordo 3 Cryptogamiae. Gen.: Pilularia, Isoëtes.

DC. 1805. Franç. II. p. 577: fam. Monocotyledonum cryptogamar. Gen.: Pilularia, Marsilea, Salvinia.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 110: fam. 10 plant. Gen. ead. et Isoëtes, Azolla; Equisetum?

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 8; 1831. Gen. II. p. 716: fam. Cryptogamar. primae sectionis. Gen. ut 1817 excepto Equiseto. — Simil. Leman 1827. Dict. v. 45. p. 395. Divis.: Marsileaceae, Salvinieae.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 105: ordo Filicum. Gen. ut Spreng.

Link 1841. Fil. h. Berol. p. 5: div. Filicum. Ordo: Salviniaceae.

Rhizospermeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: fam. Arcaniae. Gen.: Marsilea, Pilularia.

Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 4: class. Astomatophorar.

= Hydropterides Willd.

Rhizosporae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Synorganor. sporiferor. Sect.: Marsileacea, Isoëtea.

Meyer 1836. Chlor. hann. p. 684: cohors Cryptogamar. vascular. Fam.: Pilularieae.

Rhizosporium Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 2: nov. g. Uredineor. genuinor. (Erysibe subterranea L.)

Rhizostroma*) Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 79: nov. g. Fungor. (Rhizomorpha xylostroma et corticata.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 399.

Rhodactinea**) Gardn. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 449: nov. g. ex typo Barnadesiae roseae Lindl.

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 455: g. Mutisiacear.

Rhodalsine Gay 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. ... : nov. g. Alsinear. (Arenaria procumbens.)

Rhodamina Rchb. vid. *seq.*

Rhodamnia Jack 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 153: nov. g. Myrtacear. (Rh. cinerea.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 757 (dubium).

Meisn. 1837. Gen. p. 107 (76): g. Chamaelaucicar.

Endl. 1840. Gen. n. 6338. p. 1235; 1841. Ench. p. 651: g. dubium Lecythidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6801 (*Rhodamina*).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738: g. Myrtear. — Par. Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 77. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 478.

Conf. Monoxora Wight.

Rhodanthe Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. t. 1703: nov. g. Gnaphalicar. (Rh. Manglesii.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IV. 1835. p. 123, Linnaea X. Litt. p. 59 et Bot. Mag. t. 3483. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26. — Brongn. 1843. En. genr. p. 39.

DC. 1837. Pr. VI. p. 159: g. Helichrysear.

*) *στρῶμα*, stragulum.
**) *ῥόδον*, rosa; *ἀκτίν*, radius.

Rhodanthe Lindl. cont.

— Par. Endl. 1838. Gen. n. 2730. p. 444; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3503. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 447. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.

Rhodanthos Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. sem. h. Petr. p. 44: sect. Oenotherae. (O. purpurea, tenella, quadrivulnera, etc.)

= Godetia Spach.

Rhodanthos Lehm. 1853 in Otto's Hamb. Gartenz. p. ... : sect. Nymphaeae.

Rhodapium Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 8. n. 4456 *c:* sect. Angelicae. (A. rosaefolia Hook.)

Rhodax*) Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 363: nov. g. Helianthemoidear. (Helianthemum marifolium, paniculatum, etc.)

Bernh. 1838. Flora II. p. 687: g. Cistacear.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 37: g. Cistinear.

= Pseudocisti Dunal pars.

Rhodea „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 109: nov. g. Hymenophyllaceitum.

= Hymenophyllites Göpp.

Rhodea Endl., Rchb., Brongn., Lindl. vid. *Rohdea Roth.*

Rhodhymenia Decaisne vid. *Rhodomenia Grev.*

Rhodia Adans. 1763. Fam. II. p. 248: g. Sedorum.

= Rhodiola Linn.

Rhodiola**) Linn. 1737. Gen. p. 318. n. 774; 1737. Fl. lapp. p. 304. Ed. Smith p. 315; 1737. Cliff. p. 470; 1740. Syst. p. 32; 1742. Gen. ed. II. p. 498. n. 934: g. Polygam. Dioec.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 85. n. 358: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 63.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 274. — Batsch 1802. Tab. p. 27. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 653.

Linn. 1753. Sp. II. p. 1035; 1759. Syst. ed. X. p. 1294. n. 997; 1763. Sp. ed. II. p. 1465; 1764. Gen. ed. VI. p. 526. n. 1124; 1767. Syst. ed. XII. p. 657: g. Dioec. Octandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 745; 1784. Syst. p. 889. — Reich. 1778. Gen. p. 522. n. 1229. — Lour. 1790. Coch. II. p. 627. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 693. n. 1532. — Pers. 1797. Syst. p. 932; 1807. Ench. II. p. 625. n. 2251. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 807. n. 1811. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 199. 292.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 307.

Hill 1769. Ht. kew. p. 419: g. Dioicear.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 174: g. Diplosantherar.

Scop. 1777. Intr. p. 255: sect. Sedi. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 539. — Rchb.

*) *ῥόδαξ*, rosa parva.
**) Diminutivum ex Radix rhodia.

Rhodiola Linn. cont.
1828. Consp. p. 158. n. 4189 *a*. — Endl. 1850. Spl. V. p. 21. n. 4622 *a*.
Neck. 1790. El. II. p. 296. n. 1065: g. Synathrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 645: g. Octandr. Tetragyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 125: g. Crassulear. — Par. Lois. 1827. Dict. v. 45. p. 400.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 110. Ed. Schrank 1819. p. 121: g. Pentandr. Pentagyn.
D. Don 1825. Nepal. p. 213: g. Crassulacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 23. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 546. — Koch 1836. Syn. p. 256. Ed. II. p. 282.
Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6186: g. Sedear. genuinar.
Synon. Rosea Riv.; Rhodia Adans.

Rhodocallis Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 35: nov. g. Algar., a Ptilota disjunctum. Sect.: Rhodocallis, Euptilota.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubiae affinitatis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 670. n. 441: g. Callithamnear.

Rhodocarpon Lönnroth 1858. Flora II. p. 617: nov. g. Lichenum. (*Synon. Endocarpon Mass.* Ric.; *Endocarpum* et *Placidium Mass.* Synon.; *Endocarpon* et *Endopyrenium Körb.*)

Rhodocephalus Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 21; 1839. III. p. 12; 1842. V. p. 16; 1842. Mycol. p. 63: nov. g. Aspergillinor. (Rh. candidus.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 151.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Oidieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 75: g. Torulaceor.

Rhodocerasus Römer 1847. Fam. nat. syn. III. p. 5. 93: sect. Microcerasi.

Rhodochiton „Zuccar. mss." Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2; 1846 in DC. Prodr. X. p. 298; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: nov. g. Antirrhinear. — Par. Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1755. — Rchb. 1837. Hdb. p. 198. — Endl. 1839. Gen. n. 3896. p. 674; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (215). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 59. — Walp. 1845. Rep. III. p. 231. 959.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4496: g. Linariear. genuinar.

Rhodochlaena Spreng. vid. *Rhodolaena Pet.-Th.*

Rhodochlamys Schauer 1847. Linnaea XX. p. 706: nov. g. Melittear. (Rh. speciosa.) — Par. Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 699.

Rhodocistus Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 367: nov. g. Cistoidear. (Cistus symphytifolius Lam.)
Webb 1836. Canar. I. p. 124. t. 12: g. Cistinear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 92.
Endl. 1839. Gen. n. 5028 *c*. p. 904; 1841. Ench. p. 467: sect. Cisti. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7193. 3.

Rhodocladia Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 679: nov. g. Gigartinear. (Fucus Lamberti Turn.)

Rhodocoma Agardh (Spec. I.); 1821. Aphor. p. 98: nov. g. Confervoidear.

Rhodocoma Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 450.
Kunth 1841. Enum. III. p. 480: g. Restiacear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 11. n. 1019/3. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 248.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139: g. Restionear.

Rhododaphne Gesn. 1553. Tab. coll. Ed. Wolf 1587. p. 102.
= Epilobium Linn.

Rhododaphne Caesalp. 1583. De plant. lib. 3. (Linn. 1747. Class. pl. p. 8.)
= Nerium Linn.

Rhododendra Juss. 1789. Gen. p. 158: ordo 2 class. IX. Gen. §. 1: Kalmia, Rhododendrum, Azalea. §. 2: Rhodora, Ledum, Befaria, Itea.

Rhododendreae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 508: ordo Ericear. Gen.: Rhododendron, Kalmia, Azalea, Cryptandra, Menziesia, Epigaea, Rhodora, Ledum, Itea, Weinmannia, Cunonia, Cyrilla, Bejaria. *Aff.*: Monotropa.
Rchb. 1837. Hdb. p. 207: subdiv. Rhodorear. Gen.: Rhodora, Anthodendron, Rhododendron, Rhodothamnus.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 712: subtrib. Rhodorear. Gen.: Bryanthus, Phyllodoce, Daboecia, Menziesia, Loiseleuria, Osmothamnus, Azalea, Rhodora, Rhododendron, Kalmia.
Endl. 1839. Gen. p. 758: subordo Ericacear. Gen.: Azalea, Kalmia, Rhodothamnus, Rhododendron, Befaria, Leiophyllum, Ledum. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1412 et Ench. p. 371) Osmothamnus. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 127: subdiv. Rhodoracear. Gen.: Rhodora, Anthodendron, Loiseleuria, Rhododendron.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 72: trib. Ericacear. Gen. fere ut Endl. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 392. Gen. ut Endl. 1839.

Rhododendron*) Linn. 1753. Sp. I. p. 392; 1759. Syst. ed. X. p. 1023. n. 484; 1762. Sp. ed. II. p. 562; 1767. Syst. ed. XII. p. 299. n. 539: g. Decandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 286 (includens Ledum). — Murr. 1774. Syst. p. 337; 1784. Syst. p. 405. — Pers. 1797. Syst. p. 433. n. 548; 1805. Ench. I. p. 475. n. 1085. — Willd. 1799. Sp. II. p. 603. n. 867; 1809. En. p. 451. — Elliott 1817. Sketch I. p. 483. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 268. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 409.
Gled. 1764. Syst. p. 90. n. 369: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 194: g. Speciosar.
Batsch 1802. Tab. p. 215: g. Rhodoidear.

*) Quasi Rosa arborescens.

Rhododendron Linn. cont.
DC. 1805. Franç. III. p. 672: g. Rhodoracear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 319. n. 1259. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 232 (*Rosage*). — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. 667. 686 (sejungitur Rhodothamnus); 1828. Consp. p. 129. n. 3399; 1831. Fl. exc. p. 417. — Koch 1837. Syn. p. 477. Sect.: genuina, Rhodothamnus. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1117.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 509: g. Rhododendrear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 207; 1841. Nom. p. 127. n. 4948. Sect. (1841): Rhododendron, Pogonanthum, Hymenanthes, Buramia. — Endl. 1839. Gen. n. 4341. p. 759; 1841. Ench. p. 371. Sect.: Anthodendron, Rhodora, Eurhododendron, Booram, Hymenanthes. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 719. Sect.: Buramia, Hymenanthes, Eurhododendron, Pogonanthum, Chamaecistus, Tsutsusi. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 919. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 118. Sect. ut DC.
Link 1821. En. I. p. 392: g. Ledinar.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 249: g. Bicornium.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 292. n. 1548; 1830. Gen. I. p. 334. n. 1689: g. Ericear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 603. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 155. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 96. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 42. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1403. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 392.
D. Don .... Edinb. n. phil. journ. VI. p. 49.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 843: g. Rhodorear. Sect.: Ponticum, Booram, Pogonanthum, Lepipherum, Chamaecistus, Tsutsusi, Pentanthera, Rhodora. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 499. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 549. Sect.: Eurhododendron, Chamaecistus. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 435. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1057. Sect.: Eurhododendron, Tsutsugi.
Meisn. 1839. Gen. p. 246 (154): g. Andromedear.
Nutt. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 353. Sect.: Rhododendron, Cleiodendron, Calodendron, Eurhodium, Liriothamnus, Sarcodendron, Sciadendron.
Synon. Rhododendrum Auct.

Rhododendros Adans. 1763. Fam. p. 164: g. Vaccinior.
= Andromeda? et Kalmia Linn.

Rhododendrum B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 218. n. 548: g. Decandr. Monogyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 223. n. 592. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 181. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 294. n. 746. — Gmel. 1791. Syst. p. 694. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 61. 70.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 304. t. 63. f. 6 (maximum).
Juss. 1789. Gen. p. 158: g. Rhododendror.

Rhododendrum B. Juss. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 214. n. 353: g. Dicroophytor. Sejungitur Adodendrum.
Mönch 1794. Meth. p. 45: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 452: g. Rhodoracear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 353. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 883. — D. Don 1825. Nepal. p. 152. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 410. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27.
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 85. t. 19. (Vireya javanica Blume.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 72: g. Rhododendrear. — Par. Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 499. Sect.: Eurhododendrum.
= Rhododendron Linn.

Rhododermis Harvey . . .
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Spongiocarpidar.
= Hildenbrandtia Nardo.

Rhodoëssa Perty . . . . . . : g. Algar.

Rhodognaphalium Schultz Bip. 1854 in Seem. Bot. of Herald p. 310: subg. Gnaphalii. Sect.: Eurhodognaphalium, Metalasiopsis. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 284.

Rhodoideae Batsch 1802. Tab. affin. p. 215: fam. Biforar. Gen.: Kalmia, Rhododendron, Azalea; Itea, Clethra, Ledum, Pyrola, Monotropa, Rhodora.

Rhodolaena Petit-Thouars 1807. Vég. îl. Afr. III. p. 47: nov. g. Chlaenacear. — Par. Juss. 1817. Dict. v. 9. p. 386. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 825; 1825. Syst. II. p. 595. n. 1914 (*Rhodochlaena*); 1830. Gen. I. p. 436. n. 2162. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 405. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 210. n. 5476; 1841. Nom. p. 211. n. 8018. — Endl. 1840. Gen. n. 5401. p. 1016; 1841. Ench. p. 528. — Meisn. 1843. Comm. p. 344. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 487.
Pet.-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 56 in Römer Collect. bot. p. 208: g. Chlenacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 522. — Bartl. 1830. Ord. p. 337. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 562. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 57. — Meisn. 1837. Gen. p. 35. — Rchb. 1837. Hdb. p. 308.
Synon. Pandora Nor.?

Rhodoleia Champion 1850. Bot. Mag. t. 4509: nov. g. Hamamelidear. (Rh. Championi.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 273: g. Altingiear. — Par. Miq. 1857. Mededeel. k. Ak. d. W. VI. p. 122; 1858 in Müll. Ann. bot. V. p. 86.

Rhodolippia Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 591; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 248: sect. Lippiae.

Rhodolirium Philippi 1858. Linnaea XXIX. p. 65: nov. g. Amaryllidear. (Rh. montanum et andinum.)

Rhodomela*) Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 368 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. p. XXXIV. 196: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman

*) „Nomen a constanto ex rubro in nigrum mutatione coloris."

Rhodomela Agardh cont.
1827. Dict. v. 45. p. 406. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 333. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 330. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 401; 1841. Brit. Alg. p. 66. — Menegh. 1838. Cenni p. 38. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 153.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193: g. Fucoidear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 342. n. 3407; 1831. Gen. II. p. 750. n. 3804: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 90. p. 8; 1841. Ench. p. 6. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 36.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 214: g. Hydrophytor. dubiae sedis.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 490: g. Sphaerococcear. Sect.: Gigartina, Odonthalia, Volubilaria.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 202.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 86: g. Chromatophycoidear.
Duby 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. . . .; 1833. ibid. VI. p. 8: g. Ceramiear. (Injungitur Rytiphlaea.)
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 86: g. Myclothamnior.
Decne 1840. Bull. Ac. Brux. VII. 1. p. 414; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): g. Rytiphlear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 28; 1842. Alg. medit. p. 67: g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 46. n. $122/_{61}$. (*Synon. Fuscaria Stackh.*) — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 125. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 182; 1852. Linnaea XXV. p. 699. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 262. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 169. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XI. p. 120.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 737: g. Plocamiear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 23; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 225: g. Rhodomelacear.
= Lophura Kütz., etc. etc.

Rhodomelaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 9: ordo Desmiospermear. Gen.: Amansia, Odonthalia, Alsidium, Acanthophora, Chondria, Rhodomela, Rytiphlaea, Digenia, Polysiphonia, Bostrychia, Dasya.

Rhodomelaeneae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 125: series Fucacear. Divis.: Rhodomeleae, Chondrieae, Corallineae.

Rhodomeleae Rchb. 1837. Handb. p. 136: div. Floridear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 23; 1842. Alg. medit. p. 67. 116: trib. Floridear. Gen.: Dasya, Polysiphonia, Alsidium, Digenea, Rhodomela, Acanthophora, Odonthalia, Dictyomenia, Botryocarpa, Rytiphlaea, Amansia, Polyzonia, Dictyurus, Hemitrema, Claudea. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 44. Gen. ead. (exclusis 3 ultimis) et Heterosiphonia, Leveillea, Heterocladia. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54. Gen. ut Endl. et Dasyopsis, Trichothamnion, Melanthalia, Kützingia, Lenormandia, Volubilaria, Spirrymenia, Epineuron.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 125: div. Rhodomelaenear. Gen.: Odonthalia, Rhodomela, Dasya, Polysiphonia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: subordo Ceramiacear. Gen. ut Endl. et Pollexfenia.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 260: fam. Floridear. Gen. ut Fries 1846 et Bonnemaisonia, Laurencia, Lomentaria, Chylocladia, Corallina, Melobesia.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 156: sect. Sphaerococcear. Gen.: Dasya, Trichothamnion, Polysiphonia, Rytiphlaea, Acanthophora, Dictyomenia, Alsidium, Rhodomela.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : trib. Delesseriacear. Gen.: Polysiphonia, Laurencia, Dasya, Alsidium, Digenea, Rhodomela, Rytiphloea, etc.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: trib. Centrothalamar. Subtrib.: Lomentarieae, Bonnemaisonieae, Deliseineae, Dasyeae, Polysiphonieae, Eurhodomeleae, Heterocladieae, Carpoblepharideae, Rytiphlaeineae, Amansieae, Claudeineae.

Rhodomelites Sternb. 1838. Vers. II. p. 25: nov. g. Floridoitum.
Unger 1843 in Endl. Gen. Spl. III. p. 56. n. $122/_{105}$: g. Algar. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 60.
Unger 1845. Syn. p. 13; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII: g. Floridear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear. foss.

Rhodomenia*) Greville 1830. Alg. Brit. p. 84 (Syn. p. LVIII.)
A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 329: g. Floridear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 398; 1841. Brit. Alg. p. 60. — Menegh. 1838. Cenni p. 37. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg.
Endl. 1836. Gen. n. 94 *e*. p. 8; 1841. Ench. p. 6: sect. Sphaerococci. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 409. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 172.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 744: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 153; 1848. Flora II. p. 415: g. Sphaerococcoidear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 51. n. $122/_{81}$. (*Synon. Palmaria, Bifida* et *Ciliaria Stackh.*) — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 191.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361 (*Rhodhymenia*): g. Gasterocarpear. *Cf.* Flora 1843. p. 99.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126 (*Rodhymenia*): g. Sphaerococcear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 295.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Chondrear.
Synon. Rhodymenia Mont.

Rhodomeniaceae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. . . . : ordo 3 Floridear. Trib.: Plocamieae, Chondreae, Gracilarieae.

---

*) ὑμην, tela.

Rhodomyrtus DC. 1828. Prodr. III. p. 240: sect. Myrti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4685 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 835. — Endl. 1840. Gen. n. 6316 *b*. p. 1232; 1841. Ench. p. 651.
Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 6855: g. Psidiear.
Hassk. 1842. Flora II. Beil. p. 35; 1844. Cat. Bogor. alt. p. 260: g. Myrtear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 354. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738. — Wight 1847. Spic. Neilgh. I. p. 59. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 313. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 76. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 477.

Rhodonema*) Martens 1827. Reise n. Vened. t. 8.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 331: g. Solenotar.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 60: subg. Dasyae.
= Dasyae Agdh. pars.

Rhodonisa Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 70: sect. Nisae.

Rhodophiala Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 545: nov. g. Chlidantho, Eustephiae et Chrysiphialae aff. (An *Placea Miers?*)
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 295. 296: g. Amaryllear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 835.
Kunth 1850. Enum. V. p. 853: g. Hippeastrear.

Rhodophora Necker 1790. Elem. bot. II. p. 91. n. 754: g. Sarcodiphytor.
Endl. 1840. Gen. n. 6357 *b*. p. 1241; 1841. Ench. p. 659: sect. Rosae.
= Rosa Tourn.

Rhodophyceae Ruprecht (Alg. Ochot.) 1855. Mém. Ac. Petersb. 6e sér. VII. Bot. p. 27; div. Algar. Subdivis.: Endosporeae, Exosporeae. *Cf. Rhodospermeae Harv.*

Rhodophyllis Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 23: nov. g. Algar. (Rhodomenia bifida Grev.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubiae affinitatis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 786. n. 523: g. Sphaerococcear. (*Synon. Leptophyllium Näg.*)
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 151; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 247: g. Rhodymeniacear.

Rhodoplexia Harvey 1844 in Hook. Icon. III. pt. 1. t. 613: nov. g. Algar., Dictyuro aff.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Claudeinear.
= Haloplegma Mont.

Rhodopolii Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 195: subtrib. Clitopili.

Rhodopsis Bunge 1830 in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 224: sect. Rosae. (R. berberifolia Pall.)
= Hulthemia Dumort.

Rhodopsis Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 368; 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 91: sect. Cisti.
= Erythrocisti Dun. pars.

*) νῆμα, filum, tela.

Rhodopsis Endl. 1840. Gen. n. 6357 *a*. p. 1241; 1841. Ench. p. 659: sect. Rosae. (R. sericea Royle.)
Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6526: g. Rosear. genuinar.

Rhodopsis Lilja 1840. Fl. Suppl. I. p. 42.
= Cistanthe Spach.

Rhodora*) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 561; 1764. Gen. ed. VI. p. 218. n. 547: g. Decandr. Monogyn. — Par. L'Herit. 1785. Stirp. fasc. 6. p. 141. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 294. n. 745. — Willd. 1799. Sp. II. p. 603. n. 866; 1809. En. p. 450. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 268.
Adans. 1763. Fam. II. p. (21: *Rodora*): g. Vaccinior.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Giş. 1792. Prael. p. 337.
Juss. 1789. Gen. p. 159: g. Rhododendror. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 411.
Mönch 1794. Meth. p. 67: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 454: g. Rhodoracear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 354. — Pers. 1805. Ench. I. p. 477. n. 1084. — Hedw. 1806. Gen. p. 301. n. 1193. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 410. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 129. n. 3398. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27.
Batsch 1802. Tab. p. 215: g. Rhodoidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 510: g. Rhododendrear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 207; 1841. Nom. p. 127. n. 4945. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 719. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 72.
Link 1821. En. I. p. 391: g. Ledinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 332. n. 1623; 1830. Gen. I. p. 358. n. 1810: g. Ericear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 155. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 42. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1472.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 848: sect. Rhododendri. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4341 *b*. p. 759; 1841. Ench. p. 371.
Meisn. 1839. Gen. p. 246 (154): g. Andromedear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 512: g. Rhodorear.

Rhodoraceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 449: ordo 2 class. IX. Gen. §. 1: Kalmia, Rhododendrum, Epigaea, Azalea. §. 2: Rhodora, Ledum, Befaria, Itea. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 421.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 352. t. 55: fam. pl. Gen. ut Vent. et in §. 2 Menziesia.
DC. 1805. Franç. III. p. 671: fam. (53) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Ledum, Rhododendron, Azalea, Menziesia. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 883. Gen.: Rhododendrum, Erica, Vaccinium.
DC. 1813. Théor. élém. p. 216.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: div. Ericear.
D. Don 1825. Nepal. p. 152: sect. Ericear. Gen.: Rhododendrum.

*) Nomen ex Plinio.

Rhodoraceae Vent. cont.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 409: ordo Pericorollear. Gen. §. 1: Kalmia, Rhododendrum, Azalea, Epigaea, Loiseleuria, Menziesia; Sonerila?, Enkianthus? §. 2: Rhodora, Ledum, Leiophyllum, Befaria.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: div. Ericear. Gen.: Rhodora, Anthodendron, Rhododendron, Leiophyllum, Kalmia, Ledum.
Rchb. 1828. Consp. p. 129 (1831. Fl. exc. p. 416): div. Ericacear. Gen.: Sonerila; Azalea, Pyxidanthera, Diapensia, Epigaea, Calodryum; Anthodendron, Rhodora, Rhododendron, Rhodothamnus; Ledum, Fischera, Kalmia; Elliottia, Cliftonia, Clethra, Cuellaria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 127. Subdivis.: Daboecieae, Rhododendreae, Ledeae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 27: fam. Ericariear. Gen.: Rhododendrum, Azalea, Rhodora, Kalmia, Loiseleuria, Ledum, Epigea, Ammyrsine.
Koch 1837. Syn. p. 477: trib. Ericinear. Gen.: Azalea, Rhododendron, Ledum.
Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 12: ordo Bicornium. *Cf.* Walp. Ann. bot. II. p. 1117.

Rhodoreae D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152: trib. Ericacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 788. 842. Gen.: Rhododendron, Vireya, Bejaria, Hymenanthes, Kalmia, Menziesia, Azalea, Leiophyllum, Ledum. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 712. Subtrib.: Rhododendreae, Ledeae. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 444. 496. Gen.: Loiseleuria, Kalmia, Rhodothamnus, Rhododendron, Rhodora, Azalea, Hymenanthes, Befaria, Leiophyllum, Ledum.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 221.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: div. Ericacear. Subdivis.: Chamaeledeae, Rhododendreae, Ledeae.
Koch 1844. Syn. ed. II. p. 548: trib. Ericinear. Gen.: Azalea, Rhododendron, Ledum.

Rhodorhiza Meisn. vid. *seq.*

Rhodorrhiza Webb 1841. Bot. Regist. Misc. p. 69: nov. g. Convolvulacear. (Conv. scoparius, etc.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 59. n. 3802/$_1$: g. Convolvulear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 366 (*Rodorhiza*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631. — Webb .... Canar. III. p. 28. Sect.: Orthocladia, Helicocladia.

Rhodoseris Turczan. 1851. Bull. Mosc. XXIV. 2. p. 94: nov. g. Nassauviear. (Rh. conspicua.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 311.

Rhodospatha Pöppig 1845. Nov. pl. gen. III. p. 91. t. 300: nov. g. Aroidear. (R. latifolia et oblongata.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 761: g. Callear.

Rhodospermeae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 397; 1841. Man. brit. Alg. p. 5. 47: series 2 Algar. Trib.: Gastrocarpeae, Florideae, Ceramieae, et 1841 Gloiocladeae, Spongiocarpeae, Furcellarieae.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 45; 1853. ibid. II. p. 1: subclass. Algar. Series: Desmiospermeae, Gongylospermeae.

Rhodostachya Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 414: sect. Schranckiae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 883.

Rhodostachys Philippi 1858. Linnaea XXIX. p. 57: nov. g. Bromeliacear. (Rh. andina.)

Rhodostegia Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 532: sect. Cynoctoni. (Cynanchum roseum R. Br.)

Rhodostoma Scheidweiler 1842 in Otto's Gartenz. Nr. 36. p. 286: nov. g. Gardeniacear. (Rh. gardenioides.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 74. n. 3331/$_1$: g. Rubiacear. incertae sedis. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 78.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Hassk. 1855. Retzia I. p. 20: g. Psychotriae et Coussareae aff. (Müll. Ann. bot. V. p. 137.)

Rhodothamnus Rchb. 1827 in Mössl. Handb. ed. sec. I. p. 667. 688: nov. g. Decandr. Monogyn. (Rhododendron Chamaecistus L.) *Cf.* Flora 1828. II. p. 541.
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3400; 1831. Fl. exc. p. 417: g. Rhodoracear.
Koch 1837. Syn. p. 478: sect. Rhododendri.
Rchb. 1837. Hdb. p. 207: g. Rhododendrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4340. p. 759; 1841. Ench. p. 371. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455.
Meisn. 1839. Gen. p. 246 (154): g. Andromedear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 499: g. Rhodorear.
Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4943: g. Daboeciear.
Synon. Ledum Mich.; Adodendrum Neck.; Chamaecistus Don.

Rhodotrichia Menegh. mss.
= Actinococcus Kütz. (Trevis.)

Rhodotypos Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 185. t. 99: nov. g. Rosacear. (Rh. kerrioides.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 95. n. 6393/$_1$ (*Rhodotypus*): g. Spiraear. verar. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 658.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Ulmariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565 (*Rhodotypus*): g. Spiraeidar.

Rhodotypus Endl., Lindl. vid. *praeced.*

Rhodoxys Endl. 1840. Gen. n. 6058 *h.* p. 1172; 1841. Ench. p. 624: sect. Oxalidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7728. 9.

Rhodymenia Montagne 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 44: nomen emendat. pro *Rhodomenia* propositum.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 151: g. Floridear.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 307; 1849. Sp. Alg. p. 778: sect. Sphaerococci.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XI. p. 121: g. Plocariear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 147; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 248: g. Rhodymeniacear.
= Rhodomenia Grev.

Rhodymeniaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 144: ordo Gongylospermear. Gen.:

Rhodymeniaceae Harvey cont. Rhodymenia, Euthora, Rhodophyllis, Plocamium, Rhabdonia, Cordylecladia.

Rhodymenieae „J. Agardh" Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 682: fam. Floridear. Gen.: Euthora, Plocamium.

Rhodytapium Zanardini 1843. Sagg. classif. Fic. p. 16 in adnot.: nov. g. pro Hildenbrandia Paroliniana Zan. propositum, a Trevis. (Alghe coccot. p. 102) Cruoriae adscriptum, a Kütz. (Sp. Alg. p. 695) ad Hildenbrandtiam restitutum.

Rhoeadeae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 27 plant. Gen.: Bocconia, Argemone, Chelidonium, Papaver, Sanguinaria, Podophyllum. (*Cf. Rhaeades L.*) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 383. Gen. ead.

Batsch 1802. Tab. p. 87: fam. Capnanthemar. Gen.: Securidaca, Polygala, Fumaria, Hypecoum, Bocconia, Chelidonium, Sanguinaria, Argemone, Papaver.

Rhoeadeae Bartl. 1830. Ord. p. 254: class. (44) Gymnoblastor. Ordines: Tremandreae, Polygaleae, Resedaceae, Fumariaceae, Papaveraceae, Cruciferae, Capparideae.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 291: class. (17) Dicotyledonear. Fam. ut Bartl.

Meisn. 1843. Gen. p. 437: class. III. Diplochlamydear. Ord.: Papaveraceae, Fumariaceae, Cruciferae, Capparideae, Resedaceae.

Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 116: ordo Choristopetalar.

Rhoeades Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 67. 137: ordo Multi-staminum. Gen.: Papaver, Chelidonium, Glaucium, Actaea, Nymphaea.

Rhoeades Endl. 1839. Gen. p. 854; 1841. Ench. p. 441: class. (43) Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Papaveraceae, Cruciferae, Capparideae, Resedaceae, Datisceae.

Rhoeadium Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 16: sect. Papaveris. (P. Rhoeas L.) *Cf.* Endl. Spl. I. p. 1419. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7078. 3.

Rhoeas*) Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 463 (*Rhoeades*): sect. Papaveris. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 292.

Rhoeo „Hance Pl. nov. Austr. Chin. diagn. I. p. 12". Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 659: nov. g. Commelynacear. (Tradescantia discolor Sm.)

Rhoiacarpos**) A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 637: nov. g. Thesiear. (Santalum capense Spr.)

Rhoiformes Link 1821. Enum. I. p. 290: ordo pl. Gen.: Rhus.

Rhomalium***) Endl. 1839. Gen. n. 4900 *b.* p. 873; 1841. Ench. p. 449: sect. Chorisporae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6905. 2.

Rhombifolium†) L. C. Rich. mss. (ex DC.) = Neurocarpum Desv.

---

*) *Rhoeas* et *Rhoea*, veteribus genus papaveris.
**) *Ῥοιά*, Punica Granatum.
***) ῥωμαλέος, validus.
†) ῥόμβος, turbo, trochus.

Rhomboda „Lindl." Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 747: g. Physuridar.

Rhombolobium Rich. mss. (ex Kunth.) = Neurocarpum Desv.

Rhombolythrum Link 1833. Hort. Berol. II. p. 296: g. Graminear. (*Rhombolytrum Link* ex Trin. mss.: Steud. Nom. II. p. 451.)
= . . . ?

Rhombolytrum Steud. vid. *praeced.*

Rhombospora Korthals 1850. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 114: nov. g. Cinchonacear., Wendlandiae, Greeniae et Rondeletiae aff. (R. Commersonii.) *Cf.* Flora 1851. p. 525.

Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 780: g. Eucinchonear.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 155: g. Cinchonear.

Rhopala*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 62. n. 144: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1820. Fl. Ind. ed. Wall. I. p. 364; ed. 1832. I. p. 361.

Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar.

R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 190 (Verm. bot. Schr. II. p. 295): g. Proteacear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 152. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 428. n. 553. — Kunth 1822. Syn. I. p. 448. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 481. n. 525. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 535. — Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 79.

Pohl 1827. Pl. Bras. I. p. 106. t. 86—90: g. Protear.

Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1761: g. Lambertiear.

Endl. 1838. Gen. n. 2148. p. 341; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 87: g. Hakeear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2398.

Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 35. t. 149.

Meisn. 1841. Gen. p. 333 (245): g. Rhopalear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 121: g. Grevillear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 424.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.
Synon. Roupala Aubl.; Ropala Gmel.; Rupala Willd.; Leinkeria Scop.: Leinckeria Neck.

Rhopaleae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 332 (245): trib. Proteacear. Gen.: Anadenia, Manglesia, Grevillea, Hakea, Lambertia, Xylomelum, Orites, Rhopala, Andripetalum, Helicia, Knightia, Lomatia, Stenocarpus, Telopea, Embothrium, Oreocallis.

Rhopalidium Fries (& Mont.) 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 476: g. Coryneaceor. (Syst. mycol. III. p. 516 c.)

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor. (Puccinia Brassicae Mont.)

Rhopalocnemis**) Junghuhn 1841. Nov. Act. Leop. XVIII. Spl. I. p. 213: nov. g. Balanophorear. (R. phalloides.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 771. — Göpp.

---

*) ῥόπαλον, clava.
**) ῥόπαλον, clava; κνημίς, ocrea.

Rhopalocnemis Junghuhn cont. 1849. Flora I. p. 104. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1066.
Meisn. 1842. Comm. p. 274: g. Cynomoriear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 6. n. $722/_1$: g. Helosiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 90: g. Helosidar.
Synon. Lytogomphus Jungh.

Rhopalomyces Corda 1839. Prachtfl. Schimm. p. 3. t. 2: nov. g. Fungor., Haplotricho simile. (Rh. elegans.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 169: g. Polyactideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 61: g. Stilbinor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 102: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Dematieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 113: g. Basidiophoror.

Rhopalostigma Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Solanacear. (*Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 42. t. 6. f. A: Rh. microphyllum et pendulum, genus Lyciear.)

Rhopalum Endl. 1836. Gen. n. 430 *a γ*. p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Mollisiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 1. *b. c.*

Rhophostemon Wittst. vid. *Roptrostemon Blume.*

Rhopium Schreb. 1791. Gen. II. p. 608. n. 1382: g. Gynandr. Triandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 150. n. 1618. — Pers. 1807. Ench. II. p. 526. n. 2010. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 750. n. 3049; 1831. Gen. II. p. 678. n. 3423.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 881: g. Aristolochiar.
= Meborea Aubl.

Rhopsidium*) Schott 1851. Östr. Prim. p. 13: subsect. Nothobritanicae. (Primula Flörkeana Facch.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 464. 468.

Rhuacophila**) Blume 1830. Enum. pl. Jav. I. p. 13: nov. g. Asparagear., Eustrepho proximum. (Rh. javanica.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 763 (*Rhyacophila*). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1161. p. 150; 1841. Ench. p. 84. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XXVII. 317. n. 1355: g. Asparaginear. *Cf.* Schult. 1830. ibid. Add. p. 1672.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1820: g. Dracaenear.
= Dianella Linn. (Kunth Enum. V. p. 43.)

Rhumora Gaudich. vid. *Ruhmora Raddi.*

Rhus***) Tourn. 1700. Inst. p. 611. t. 381: g. pl. class. XXI.

*) ῥώψ, frutices?
**) ῥύαξ, fons, fluvius.
***) Nomen ex Plinio.

Rhus Tourn. cont.
Mönch 1794. Meth. p. 72: g. Thalamostemonis.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3850 *c*; 1831. Fl. exc. p. 489: sect. Rhois.
Endl. 1840. Gen. n. 5905 *c α*. p. 1131; 1841. Ench. p. 599: subsect. Rhois.

Rhus Linn. 1737. Gen. p. 84. n. 241; 1737. Cliff. p. 110; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 68; 1753. Sp. I. p. 265; 1759. Syst. ed. X. p. 963. n. 331; 1762. Sp. ed. II. p. 379; 1764. Gen. ed. VI. p. 146. n. 369; 1767. Syst. ed. XII. p. 217. n. 366: g. Pentandr. Trigyn. ampliat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 242; 1784. Syst. p. 292. — Reich. 1778. Gen. p. 149. n. 399. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 197. n. 502. — Lour. 1790. Coch. I. p. 183. — Gmel. 1791. Syst. p. 494. — Pers. 1797. Syst. p. 310; 1805. Ench. I. p. 324. n. 726. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1477. n. 566; 1809. En. p. 323. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 212. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 203. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 32. — Gmel. 1826. Bad. IV. p. 213. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 25. 442. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 98.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 37. n. 141: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.
Scop. 1777. Intr. p. 325: g. Disciferar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 205. t. 44. f. 2 (Rh. Vernix).
Walt. 1788. Carol. p. 56. 255. n. 417: g. Polygam. Dioec.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 304. *Cf. Toxicodendron Med.*
Juss. 1789. Gen. p. 369: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 442. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 250. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59. — D. Don 1825. Nepal. p. 248. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1164.
Neck. 1790. El. II. p. 225. n. 963: g. Eredophytor. Segregantur Pocophorum et Cotinus.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
Cram. 1803. Disp. p. 193: in Dioec. Pentandr.
DC. 1805. Franç. IV. p. 614: g. Terebinthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 205. n. 843. — Spreng. 1818. Anal. II. 2. p. 653; 1825. Syst. I. p. 926. n. 1108; 1830. Gen. I. p. 231. n. 1214. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXII. 643. — Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 337; 1825. Syn. IV. p. 148. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 8. — Lois. 1827. Dict. v. 51. p. 374 (*Sumac*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1002. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 133. Sect.: Sumac, Cotinus. — Webb .... Canar. II. p. 125. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 340.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 431 (Verm. bot. Schr. I. p. 199): g. Cassuviar.

Rhus Linn. cont.
Link 1821. En. I. p. 290: g. Rhoiformium.
DC. 1825. Pr. II. p. 66: g. Sumachinear. Sect.: Cotinus, Metopium, Sumac, Thezera, Lobadium. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Link 1831. Hdb. II. p. 125. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 489. Sect.: Cotinus, Toxicodendron, Rhus. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 69. Sect. ut DC. (Sumach pro Sumac.) — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 209. Sect. ut DC. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 380.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 172: g. Anacardiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 551; 1843. II. p. 829; 1846. V. p. 414.
Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54): g. Cassuviear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 146. n. 5668: g. Pistaciear. Sect. (1841) ut DC. (Rhus et Toxicodendron loco Sumac.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 84.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 216: g. Anacardiacear. Sect.: Cotinus, Sumac, Lobadium, Malosma. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5905. p. 1130; 1841. Ench. p. 559. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 508. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 84. t. 22 (1846. p. LXXXV); 1845. Syn. p. 242. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 95 (*Sumac*). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 447.
Synon. Rhus et Toxicodendron Tourn.; Vernix Adans.; Pocophorum Neck.; Terminthia Bernh.?; Philostemon Rafin.?; Philostemum Steud.

Rhuyschiana Adans. 1763. Fam. II. p. 194: g. Labiatar.
= Hyssopus Linn.?

Rhyacophila*) Hochstett. 1841. Flora II. p. 659: nov. g. Lythrariear.
= Quartinia Endl. (propter Rhuacophilam Blume.)

Rhyacophila Wittst. vid. *Rhuacophila Blume.*

Rhychospora Ritgen vid. *Rhynchospora.*

Rhyditospermum Walp. vid. *Rhytidospermum Schultz.*

Rhyma „Scop." Endl. Gen. et Ench. in synon. Mesuae: vid. *Rhynea Scop.*

Rhymovis „Pers." Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 453: g. Agaricinor.
Synon. Paxillus Fries; Ruthea Opat.

Rhyncanthera „Blume" A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 35: g. Apostasiacear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 184.
= seq.

Rhynchandra Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 56. n. 2202: g. Apostasiear.? *Cf.* Endl. Spl. II. p. 22.
Synon. Rhynchanthera Blume; Rhyncanthera A. Rich.

Rhynchanthera DC. 1828. Prodr. III. p. 106: nov. g. Lavoisierear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 736. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 214. — Meisn. 1838. Gen. p. 114 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6183. p. 1208; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6694. — Walp. 1843. Rep. II. p. 120; 1846. V. p. 682. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4611: g. Merianiear.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 120. t. 259. 260: g. Melastomacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1431.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 342. n. 1728.
Cham. 1834. Linnaea IX. p. 377.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 206: g. Microlicialium.
Synon. Proboscidia Rich.; Thenardia Fl. mex.

Rhynchanthera Blume (mss.?)
= Rhynchandra Rchb.

Rhynchelythrum Steud. vid. *seq.*

Rhynchelytrum Nees 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 446.
Endl. 1837. Gen. n. 769. p. 83; 1841. Ench. p. 57: g. Panicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1270. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 119 (*Rhynchelythrum*).
Nees 1841. Gram. cap. p. 64.

Rhynchocarpa Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 403: nov. g. Cucurbitear., pro Trichosanthe foetidissimo Jacq. indicatum. — Par. Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 275. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 268. — Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. n. 5129. p. 936; 1841. Ench. p. 491: g. Melothriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3957. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 9. 29.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 116: g. Cucurbitacear.

Rhynchocarpus Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Didynam. Angiosperm.

Rhynchocarpus Lessing 1832. Syn. Compos. p. 382: nov. g. Relhaniear. (Relhania lateriflora L'Her.)
= Rhynchopsidium DC.

Rhynchococceae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 390. 403; 1845. Phycol. germ. p. 304; 1849. Sp. Alg. p. 754: fam. Periblastear. Gen.: Rhynchococcus, Calliblepharis.

Rhynchococcus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 403; 1845. Phycol. germ. p. 304; 1849. Sp. Alg. p. 754. n. 504: nov. g. Rhynchococcear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 171: g. Sphaerococcoidear.
Synon. Coronopifolia Stackh.; Cylichnos Targ.

Rhynchocorys Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 12: g. Rhinanthear. (Rhinanthus Elephas L.) — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 558. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 267.

*) ῥύαξ, rivus.
**) ῥύγχος, rostrum, proboscis.

Rhynchocorys Griseb. cont.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.
= Rhinanthus MBieb.

Rhynchodium Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 484 (Bot. Bemerk. p. 54): nov. g. a Psoralea sejunctum. (Ps. acaulis Stev. etc.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 230: g. Galegear.

Rhynchoglossum Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 741 (*Rhinchoglossum*): nov. g. Rhinanthear., Gerardiae aff.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 618: g. Scrophularinear.? minus notum.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (212): g. Ramondiear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 274: g. Loxoniear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 522.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.
Synon. Loxotis R. Brown; Antonia Brown; Knappia F. Bauer.

Rhynchohypnum Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 72: sect. Hypni.

Rhyncholacis Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 95; 1852. Arch. Mus. VI. p. 81; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 240: nov. g. Eulacidear. (Rh. Hydrocichorium et macrocarpa.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 778. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 434.

Rhyncholepis Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 339: subg. Micropodis. (Walp. Rep. II. p. 599. 973.)

Rhyncholepis Miquel 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 491: nov. g. Piperear. (Rh. Cumingiana, etc.)
Miq. 1843. Syst. Piperac. p. 282: g. Piperinar. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 16. n. 1823/2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar.

Rhyncholobium Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 242 adnot.: sect. Dunbariae.

Rhyncholopha Bunge .... Bull. sc. Ac. Pet. VIII. Nr. 16; 1843. Bull. Pet. I. p. 384: sect. Pedicularis. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 277. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 680.

Rhynchonema Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 443. n. 276: nov. g. Zygnemacear. (Zygnemae sp. Auct.)
Math. 1853. Belg. II. p. 507: g. Zygnemear.

Rhynchopera Klotzsch & Karst. 1850. Ausw. Venez. t. 7: nov. g. Pleurothallear. (Rh. punctata.) — Par. Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 521.

Rhynchopetalum Fresen. 1838. Flora II. p. 603 (Mus. Senkenb. III. p. 66. t. 4): nov. g. Lobeliacear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 396: g. Lobeliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3988. — Meisn. 1843. Comm. p. 364.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3070. p. 1392; 1841. Ench. p. 264: g. Delisseacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Delissear.

Rhynchophorum Miquel 1843. Syst. Piperac. p. 178; 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 427; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 20: sect. Peperomiae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 15. n. 1821 c γ.

Rhynchopsidium DC. 1836. Mém. soc. Genèv. VII. 2. p. 286; 1837. Prodr. VI. p. 290: g. Relhaniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2783. p. 454; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3542. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 731: g. Osmitear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.
Synon. Nanophyton et Rhynchocarpus Less.

Rhynchorrhiza Boissier mss.
= Boreava Jaub. & Spach. (Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 378 in adnot.)

Rhynchosia Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 460. Ed. Willd. p. 561: nov. g. Diadelph. Decandr. (R. volubilis.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 427. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 299. n. 1706.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 763; 1826. Syst. III. p. 193. n. 2512; 1831. Gen. II. p. 577. n. 2819: g. Leguminosar.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 252.
Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5837: g. Rhynchosiear.
= Eurhynchosia Wight & Arn.

Rhynchosia DC. 1825. Prodr. II. p. 384: g. emend. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3933. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 344. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67). — Brongn. 1843. En. genr. p. 131. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 433.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 237: g. Euphaseolear. Subgen.: Eurhynchosia, Phyllomatia, Ptychocentrum.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Rhynchosiear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 283. Sect.: Eurhyncosia, Arcyphyllum. — Endl. 1841. Gen. n. 6692. p. 1300; 1841. Ench. p. 672. Sect.: Copisma, Arcyphyllum, Phyllomatia, Ptychocentrum, Pitcheria, Eurhynchosia. — Walp. 1842. Rep. I. p. 785; 1846. V. p. 540. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 168. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 567.
Synon. Dolicholus Med.; Glycine Nutt.; Arciphyllum Ell.

Rhynchosieae Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: subtrib. Phaseolear. Gen.: Orthodanum, Eriosema, Rhynchosia, Phyllomatia, Ptychocentrum, Nomismia, Cylista, Cyanospermum, Chrysonias. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 535; 1842. Rep. I. p. 784. Gen. ead. et Copisma (1839), Chrysoscias (nec Chrysonias Benth.), Flemmingia. — Endl. 1841. Gen. p. 1299; 1841. Ench. p. 672. Gen.: Orthodanum, Eriosema, Rhynchosia, Nomismia, Cylista, Cyano-

Rhynchósieae Benth. cont.
spermum, Chrysoscias; Flemingia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. et Hidrosia, Pycnospora. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 150: sect. Glycinear. Gen. ut Endl. et Copisma, Arcyphyllum, Phyllomatia, Ptychocentrum, Pitcheria.

Rhynchosioides Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 243 adnot.: sect. Atylosiae. (Dolichos elongatus Wall.)

Rhynchospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: series Umbellatar. Trib. unica: Scandicineae.
Tausch 1834. Flora I. p. 342: trib. Mericarpar. Subtrib.: Scandicineae, Cumineae.

Rhynchospermeae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 132. 143: trib. Umbelliferar. Sect.: Scandicineae, Cumineae.

Rhynchospermum Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 7: nov. g. Compositar.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 902: g. Asterear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)
DC. 1836. Pr. V. p. 296: g. Erigerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2333. p. 379; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3264: g. Erigeronear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 32: g. Asterinear.

Rhynchospora Vahl 1806. Enum. II. p. 229. n. 113 (*Rynchospora*): g. Triandr. Monogyn., a Schoeno L. distinctum. — Par. (emend. nom.) Willd. 1809. En. p. 71. — Elliott 1817. Sketch I. p. 57. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 33. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 69.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 229. Ed. Nees p. 85: g. Cyperacear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153. (verar.) — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 2. 82. n. 173. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 71 (p. 42 *Rhyncospora*). — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 14. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 194. n. 218. — Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 415 (*Rhinchospora*). — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 427. — A. Gray 1836. Ann. Lyc. N. York III. (Monogr.) *Cf.* Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 26. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 187.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 24 et Schult. 1824. Mant. II. p. 5): g. Cyperear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 49. n. 227. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 119 (sph. *Rhychospora*).
Link 1827. Hort. I. p. 179; 1829. Hdb. I. p. 99 (*Rynchospora*): g. Cyperoidear.
Gaud. 1828. Helv. I. p. 103: sect. Schoeni.
Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1109; 1830. Fl. exc. p. 74: g. Dulichiear.
Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. p. . . .: g. Scirpear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 738. Ed. II. p. 851. — Math. 1853. Belg. I. p. 573. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 383.

Rhynchospora Vahl cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: g. Schoenear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 12.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 297; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 105: g. Rhynchosporear. (restrict.) — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 287; 1838. Berol. II. p. 326. — Endl. 1837. Gen. n. 967. p. 113; 1841. Ench. p. 63. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1449. — Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 258. — Steud. 1855. Glum. II. p. 139. Sect.: Eriochaete, Rhynchospora. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 335.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 141: g. Fissistylar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.
Synon. Cyperella Mich.; Schoenus Scop.; Phaeocephalum Ehrh.; Lonchostylis Torr.

Rhynchospora Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271: g. Schoenear. emend. Sect.: Dichromena, Spermodon, Haloschoenus, Mitrospora, Haplostylis, Calyptrostylis, Eurhynchospora.

Rhynchosporeae Nees 1834. Linnaea IX. p. 294; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 97: trib. Cyperacear. Gen. §. 1: Morisia, Haplostylis, Mitrospora, Calyptrostylis, Cephaloschoenus, Diplochaete, Ceratoschoenus. §. 2: Spermodon, Haloschoenus, Echinoschoenus, Zosterospermum, Rhynchospora. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 112; 1841. Ench. p. 63. Subtrib.: *verae* (gen.: Haplostylis, Rhynchospora, Chaetospora, Cyathocoma?; Trianoptiles, Nomochloa, Machaerina, Buekia, Lepidosperma, Oreobolus), Schoenoideae. — Kunth 1837. Cyper. p. 274. Gen.: Dichromena, Arthrostylis, Pleurostachys, Ecklonia, Rhynchospora, Cladium, Caustis, Lepisia, Elynanthus, Buekia, Ideleria, Asterochaete, Machaerina, Baumea, Vincentia, Chapelliera, Lepidosperma, Sclerochaetium, Carpha, Cyathocoma, Chaetospora, Blysmus, Dulichium, Hemichlaena, Acrolepis, Gahnia, Lampocarya, Schoenus. — Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 109. Subtrib.: Haloschoeni, Haplostyleae, Fissistylae. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). Gen.: Cyathocoma, Asterochaete, Ideleria, Buekia, Trianoptiles, Carpha, Chaetospora, Dulichium, Machaerina, Pleurostachys, Sclerochaetium, Lepidosperma, Rhynchospora, Blysmus, Anogyna, Caustis, Vincentia, Dichromena, Cladium, Zosterospermum, Gahnia, Lampocarya, Arthrostylis, Lepisia, Elynanthus, Baumea, Chapelliera, Schoenus, Hemichlaena, Acrolepis. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. Gen. ead. et Psilocarya. — Steud. 1855. Glum. II. p. 134. Gen.: Dichromena, Spermodon, Arthrostylis, Pleurostachys, Ptilochaeta, Ecklonia, Rhynchospora, Ptilosciadium, Discopodium, Ceratoschoenus, Psilocarya, Eriospora, Zosterospermum, Calyptrolepis, Cladium, Caustis, Didymonema, Syziganthus, Lepisia, Elynanthus, Buekia,

Rhynchosporeae Nees cont.
Ideleria, Asterochaete, Trichochaeta, Gymnochaeta, Macharina, Baumea, Vincentia, Cyclocampe, Chapelliera, Lepidosperma, Sclerochaetium, Macrochaetium, Tetralepis, Cyatochaete, Carpha, Cyatocoma, Tricostularia, Anthophyllum, Chaetospora, Mesomelaena, Blysmus, Gahnia, Terobera, Vauthiera, Schoenus, Gymnoschoenus, Ptilanthelium, Isoschoenus.
Torr. 1836. Ann. Lyc. N. York III. p. 357.
Rchb. 1841. Nom. p. 40: subdiv. Cyperinar. Sect.: *verae* (gen.: Chaetospora, Cyathocoma, Ideleria, Carpha, Rhynchospora, Haplostylis, Trianoptiles, Nomochloa, Machaerina, Bueckia, Lepidosperma, Oreobolus), Schoenoideae, Cladieae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: subordo Cyperacear. Trib.: Rhynchosporidae, Schoenidae.

Rhynchosporidae Lindl 1847. Veg. kingd. p. 119: trib. Rhynchosporear. Gen. Rhynchosporear. verar. Endl. et Morisia, Mitrospora, Pterotheca, Calyptrostylis, Ephippiorhynchium, Diplochaete, Ceratoschoenus.

Rhynchostegiella Schimp. 1852. Bryol. eur. V: subg. Rhynchostegii. (Hypnum tenellum.)

Rhynchostegium Schimp. 1852. Bryol. eur. V: nov. g. Hypnacear. Subgen.: Raphidostegium, Rhynchostegiella, Rhynchostegium.
Conf. Aptychus Müll.

Rhynchostele Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 770: nov. g. Orchidear. (Odontoglossum pygmaeum Lindl.)

Rhynchostemon Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 333: nov. g. Thomasiear. (Thomasia glutinosa et canescens Lindl.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 162: g. Lasiopetalear.

Rhynchostylis Tausch 1834. Flora I. p. 343: nov. g. Scandicinear. (Chaerophyllum hirsutum L.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IV. 1835. p. 46. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133.
Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107): sect. Chaerophylli.
= Euchaerophyllum DC.?

Rhynchostylis Hassk. vid. *Rynchostylis Blume.*

Rhynchotechum Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 775; 1828. Fl. jav. Praef. p. VIII (*Rhynchotoechum*): nov. g. Cyrtandrear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 663. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). — DC. 1845. Pr. IX. p. 285.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672 (*Rhynchotecum*): g. Cyrtandridar. (*Synon. Cheilosandra Griff.*)
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 749: g. Eucyrtandrear.
Synon. Corysanthera Wall.; Rhynchothecum R. Brown; Rhynchotheum, Rhynchothechum Endl.; Rhyncothecum A. DC.

Rhynchotecum Lindl. vid. *praeced.*

Rhynchotheca Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 82. t. 15: nov. g. Polyandr. Pentagyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 92. n. 1341 (sph. *Rhynchotheha*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 731: g. Ranunculear.

Rhynchotheca Ruiz & Pav. cont.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 232: g. Geraniaceis aff. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 227. — Bartl. 1830. Ord. p. 349. — Meisn. 1837. Comm. p. 41.
DC. 1824. Pr. I. p. 637: g. Geraniacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 714. — Meisn. 1837. Gen. p. 57.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 356. n. 1671; 1830. Gen. I. p. 369. n. 1867: g. Geraniear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 431. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5283; 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 202. n. 7697: g. Rhynchothecear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6049. p. 1169; 1841. Ench. p. 621.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 489: g. Oxalidacear.
Synon. Aulacostigma Turczan.

Rhynchotheceae Rchb. 1828. Consp. p. 203 (1832. Fl. exc. p. 775); 1841. Nom. p. 202: subdiv. Sterculiear. Gen.: Rhynchotheca.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: subdiv. Sterculiariar. Gen. id.
Endl. 1840. Gen. p. 1169; 1841. Ench. p. 621: fam. Geraniaceis aff. Gen. id.

Rhynchothechum Endl. vid. *seq.*

Rhynchothecum R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 122: g. Cyrtandrear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. — Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4717. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367 (581 *Rhinchothecum*).
Endl. 1839. Gen. p. 719. n. 4148; 1841. Spl. I. p. 1408. n. 4148. 4153 (*Rhynchotheum*); 1841. Ench. p. 349. n. 4150 (*Rhynchothechum*): g. Eucyrtandrear.
= Rhynchotechum Blume.

Rhynchotheha Pers. vid. *Rhynchotheca Rz. & Pav.*

Rhynchotherium „R. Brown" Flora 1842. p. 219: sphalm. pro *Rhynchothecum R. Brown.*

Rhynchotheum Endl. vid. *Rhynchothecum R. Brown.*

Rhynchotoechum Blume vid. *Rhynchotechum Blume.*

Rhyncospermum A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 431: nov. g. Echitear. (Echites rhyncosperma Wall.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601 (*Rynchospermum*): g. Wrightiear.
Synon. Trachelospermum Lemaire.

Rhyncospora Juss. vid. *Rhynchospora.*

Rhyncothecum A. DC. Prodr. IX. p. 285 in nota: vid. *Rhynchotechum Blume.*

Rhynea Scopoli 1777. Introd. p. 262. n. 1185: g. Polyandrar.
= Mesua Linn.

Rhynea*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 154: nov. g. Cassiniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2725. p. 443; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3511. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729: g. Eucassiniear.

*) Dicat. Guil. ten Rhyne.

Rhynea DC. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.

Rhynganthae Batsch 1802. Tab. affin. p. 80: fam. Calycanthemar. Gen.: Rhexia, Osbeckia, Melastoma, Blackea.

Rhyparia Hassk. vid. *Ryparia Blnme.*

Rhypis Röm. & Schult. vid. *Rhytis Lour.*

Rhysospermum*) Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 232. t. 224.
= Notelaea Vent.

Rhyssocarpus Endl. 1843. Bot. Zeit. p. 459; 1843. Gen. Suppl. III. p. 73. n. $3234/_2$: nov. g. Isertiear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 53.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Isertidar.

Rhyssolobium**) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 217: nov. g. Asclepiadear. verar. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212.
Endl. 1838. Gen. n. 3470. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4967. (genuinar.)
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 626: g. Gymnemar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Rhyssophysalis Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 316: nov. g. Algar. (Fucus tremelloides Bert.)
= Alcyonidium Lamx.

Rhyssopterys Wittst. vid. *Ryssopterys Blume.*

Rhyssostelma Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 590: nov. g. Oxypetalar. (Cynanchum nigricans Vahl.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.

Rhystophyllum Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 79; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Hypnum crispum L.)
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 46: subsect. Euneckerae.

Rhytachne***) Desvaux 1825 in Hamilt. Fl. Ind. occ. p. 11: nov. g. Graminum. (Rh. rottböllioides.)
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 833: g. Cenchrinar?
Kunth 1833. Agrost. p. 522: g. Graminear. dubium. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 109 (*Rytachne*); 1841. Ench. p. 60. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1432 (*Rytachne*).
Meisn. 1843. Gen. p. 427 (326): g. Rottbölliaceär.? — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Steud. 1854. Glum. I. p. 358.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116 (*Rytachne*): inter gen. Graminacear. dubia.

Rhytidandra A. Gray 1853. Char. n. gen. p. 4 (Proc. Amer. Ac. III): nov. g. Olacacear. *Cf.* Flora 1855. p. 396.
A. Gray 1854. Mem. Amer. Ac. n. ser. V. p. 334: g. Alangiear.

*) ῥυσός, rugosus.
**) ῥυσσός, rugosus.
***) ῥυτίς, ruga, plica; ἄχνη, palea.

Rhytidandra A. Gray cont.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 352: g. Olacacinear.

Rhytidanthe Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 63: nov. g. Helichrysear. (Rh. scabra.)
= Leptorhynchus Less.

Rhytidea Spreng. 1830, Dietr. vid. *Rytidea Spreng.*

Rhytidium Sulliv. 1856. Musc. Un. St.: sect. Hypni. (H. rugosum.)
= Drepanophyllaria Müll. pt.

Rhytidocarpaea Wittst. vid. *Rutidocarpaea DC.*

Rhytidofloyos*) Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 30. t. 9.: g. Sigillariear. (Rh. tenuis.)

Rhytidolepis**) Sternb. 1820. Vers. I. p. 32: g. plantar. primodialium.
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXIII: g. Filicum anomalar. (Sigillaria Brongn., Palmacites Schloth.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 342.
Artis 1825. Antedil. Phyt. ....: g. pl. foss. (*Rhitidolepis* ex Flora 1827. I. p. 139.)
= Sigillaria Brongn.

Rhytidophylleae Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 199: subtrib. Gesnerear. Gen.: Houttea, Moussonia, Codonophora, Capanea, Rhytidophyllum, Duchartrea, Pentarhaphia, Ophianthe, Conradia, Arctocalyx, Solenophora.

Rhytidophyllum Endl., Hanst. vid. *Rytidophyllum Mart.*

Rhytidopoterium Endl. vid. *Rutidopoterium DC.*

Rhytidosis Wittst. vid. *Rutidosis DC.*

Rhytidosperma Endl. vid. *Rytidosperma Meyer.*

Rhytidospermum Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 277: nov. g. Pyrethrear. (Matricaria inodora L.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 196 (*Rhyditospermum*): sect. Tripleurospermi.

Rhytidostylis Rchb. vid. *Rytidostylis Hook.*

Rhytiglossa Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 444; 1841. Linnaea XV. p. 364: nov. g. Justiciear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 488 (*Rytiglossa*).
Endl. 1839. Gen. n. 4084. p. 705; 1841. Ench. p. 343: g. Gendarussear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (205). — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4277. — Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 118; 1847 in DC. Pr. XI. p. 335. — Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 42. Sect.: Psiloglossa, Strobiloglossa. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 661. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 824.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.

Rhytiphlaea Fries vid. *Rytiphlaea Agdh.*

Rhytiphloea Rchb., Spreng. vid. *praeced.*

Rhytis***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 660. Ed. Willd. p. 811: nov. g. Polygam. Dioec. (R. fruticosa.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 434.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 58 (sph. *Rhypis*). 874. n. 403: g. Triandr. Trigyn.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 914. n. 3204;

*) ῥυτιδόφλοιος, cortice rugoso praeditus.
**) ῥυτίς, ruga; λεπίς, cortex.
***) ῥυτίς, ruga: a bacca rugosa.

Rhytis Lour. cont.
1831. Gen. II. p. 714. n. 3598: g. Tricoccar.?
Endl. 1841. Spl. I. n. 5887/1. p. 1425; 1841. Ench. p. 589: g. dubium Euphorbiacear. — Par. Meisn. 1841. Comm. p. 250. — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7456.

Rhytisma Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 565; 1828. Elench. II. p. 126; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 370: nov. g. Phacidiaceor. Sect. (1849): Dryphele, Neurotrema, Leptospila. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 435. — Par. A. Lib. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Bail 1858. Syst. p. 57. t. 18.
Agdh. 1823. Aphor. p. 83: g. Sphaeriacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 586 (*Rhitisma*): g. Phacidiacear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 241.
Fries 1825. Pl. homon. p. 117: g. Phacidieor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 254; 1841. Nom. p. 7. n. 275. — Endl. 1836. Gen. n. 372. p. 32; 1841. Ench. p. 19. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 35; 1842. Mycol. p. 145.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Sclerotiacear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1018: g. Sclerogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 411. n. 3458; 1831. Gen. II. p. 760. n. 3876: g. Sphaerioideor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Xylomatear.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 45: g. Pyrenomycetum.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 357: g. Discomycetum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 161: g. Hysteriaceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 261. (*Synon. Micropeltis Mont.*)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.
Synon. Placuntium Ehrenb.; Xeilaria et Cheilaria Lib.; Cryptomyces Grev.?

Rhytispermum Link 1829. Handb. I. p. 579: g. Borraginear. (Lithospermum arvense L.)
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 336; 1841. Nom. p. 111. n. 4322. 1: sect. Lithospermi. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3761 *a*. p. 648; 1841. Ench. p. 321. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 85. — DC. 1846. Pr. X. p. 73. — Koch 1849. Linnaea XXII. p. 638. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 129.
Decne .... in Webb Canar. III. p. 50: g. Boraginear.
= Aegonychon Gray.

Riana Aublet 1775. Guian. I. p. 237. t. 94: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 396. — Blanco 1837. Filipin. p. 850.
Juss. 1789. Gen. p. 287: g. Berberidibus aff.
Batsch 1802. Tab. p. 114: g. Berberinar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 87: g. Berberideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 157. n. 671.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIX. 347. n. 971: g. Berberidum.

Riana Aublet cont.
Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 437: g. Violacear.
= Alsodeiae Pet.-Th. pars.

Rianuga*) Schlechtend. 1851. Linnaea XXIV. p. 748: sect. Anguriae. (A. aculeolata.) An genus proprium?

Ribeirea Arrud. ex Steud. Nomencl. II. p. 457: g. Rosacear.? (R. sorbilis.) Quid?

Ribes Rupp. 1718. Fl. jen. p. 365: g. pl. class. I.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 548: sect. Ribis. Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 562. Subsect.: Ribesia, Botryocarpum.
= Ribesia Pers.

Ribes**) Linn. 1737. Gen. p. 68. n. 195; 1737. Cliff. p. 82; 1740. Syst. p. 20: g. Pentandr. Digyn.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 87. n. 202; 1748. Ups. p. 50; 1753. Sp. I. p. 200; 1759. Syst. ed. X. p. 941. n. 247; 1762. Sp. ed. II. p. 290; 1764. Gen. ed. VI. p. 111. n. 281; 1767. Syst. ed. XII. p. 184. n. 278: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 201; 1784. Syst. p. 242. — Reich. 1778. Gen. p. 114. n. 301. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 154. n. 390. — Gmel. 1791. Syst. p. 419. — Pers. 1797. Syst. p. 254; 1805. Ench. I. p. 251. n. 575. Sect. (1805): Ribesia, Grossularia. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1153. n. 445; 1809. En. p. 262. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 140. — Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 512. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 11. 227.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 345: g. Pomiferar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 7.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 263. n. 1088: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 683.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 173: g. Calyciflorar.
Scop. 1777. Intr. p. 108: g. Strictar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 271. 272. *Cf. Ribesium Dill.* et *Grossularia Tourn.*
Juss. 1789. Gen. p. 310: g. Cactor.
Neck. 1790. El. II. p. 134. n. 816: g. Coryphophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 287: g. inter Saxifrageas et Cactoideas intermedium.
Cram. 1803. Disp. p. 191: in Dioec. Pentandr. (R. alpinum, etc.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 134: g. Nopalear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 168. n. 707. Sect. ut Pers. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XL. 492. n. 1016. Sect. eaed.
DC. 1805. Franç. IV. p. 406: g. Grossulariar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 548. Sect.: Ribes, Grossularia. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 59. — Kunth 1824. Syn. III. p. 365.

---

*) Anagramma nominis Anguriae.
**) *Ribes* nomen arabicum, pro Ribe et Grossularia conjunctis adoptatum. (Ht. Cliff.)

Ribes Linn. cont.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 897: g. Grossulacear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 544. Sect. ut Endl. et Robsonia.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 846; 1825. Syst. I. p. 810. n. 911: g. Cerear.
Link 1821. En. I. p. 236: g. Ribesinar.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 106.
Lois. 1822. Dict. v. 19. p. 500 (*Groseillier*): g. Grossulariear. — Par. Berland. 1826. Mém. Genève III. 2. p. 55; 1828 in DC. Pr. III. p. 477. Sect.: Robsonia, Grossularia, Ribesia, Symphocalyx. — Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4247 (sect. ut Berl.); 1837. Hdb. p. 233. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 266. — Bartl. 1830. Ord. p. 276. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 194. n. 984. — Link 1831. Hdb. II. p. 6. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 229. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 177. Sect.: Grossularia, Botrycarpum, Ribesia, Symphocalyx. — Koch 1836. Syn. p. 265. Ed. II. p. 292. Sect. ut Pers. — Meisn. 1838. Gen. p. 128 (93). — Kunth 1838. Berol. I. p. 159. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 194. Sect. ut Pers. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 634. Sect. eaed.
Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 145: g. Pomaceis aff.
Juss. 1825. Dict. v. 35. p. 145: g. Opuntiacear.
D. Don 1825. Nepal. p. 208: g. Grosulariar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42: g. Grossulariacear. (restrict.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 751.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 561: g. Ribesiacear. Sect. ut Gray. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4682. p. 824; 1841. Ench. p. 413. Sect.: Grossularia, Ribesia, Siphocalyx. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 337. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108. — Walp. 1843. Rep. II. p. 357; 1846. V. p. 822. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 22.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 850: g. Ribesiar.
Rchb. 1841. Nom. p. 160. n. 6248: g. Ribesiear. Sect.: Grossularia, Botryocarpum, Ribes, Siphonocalyx.
Synon. Piperastrum Ruell.; Grossularia Tourn.

Ribes Burm. 1768. Fl. ind. p. 62. t. 23.
= Embelia Juss.

Ribes A. Rich. 1823. Bot. med. II. p. 487: g. restrict. Ribesiar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: g. restrict. Ribesiear.
= Ribesiae Pers. pars.

Ribes Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 160: g. restrict. Grossulariear. Sect.: Conostylium, Cylindrostylium, Berisia.

Ribesia Pers. 1805. Ench. I. p. 251: sect. Ribis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 168. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 492. — Berland. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 56; 1828 in DC. Pr. III. p. 479. — Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4247 *c*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 185. — Koch 1836. Syn. p. 265. Ed. II. p. 292. — Endl. 1839. Gen. n. 4682 *b*. p. 824 (sph. *Bibesia*); 1841. Ench. p. 413. — Torr. & Gray. 1840. North-Am. I. p. 549. — Walp. 1843. Rep. II. p. 358. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 195. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 635.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 562: subsect. Ribis.
Synon. Ribes Rupp.; Ribesium Dill., Med.; Ribes et Botrycarpum A. Rich.; Coreosma, Botryocarpum, Cerophyllum et Rebis Spach.

Ribesiaceae Rchb. 1828. Consp. p. 160 (1832. Fl. exc. p. 561); 1841. Nomencl. p. 160: fam. Sediflorar. Divis.: Cacteae, Grossularieae (1841 Ribesieae), Escallonieae.

Ribesiaceae Endl. 1839. Gen. p. 823; 1841. Ench. p. 412: ordo (171) Corniculatar. Gen.: Ribes, Robsonia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 108: fam. Saxifraginear. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 134: fam. Dicotyledonear. polypetalar. perigynar. Gen. ead.

Ribesiae A. Rich. 1823. Bot. med. II. p. 487.
= Ribesiaceae Endl.

Ribesieae Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 439. (Praeferendum familiae nomen Grossulariear.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: div. Cactear. Gen.: Grossularia, Ribes, Botrycarpum.
Rchb. 1841. Nom. p. 160 (sphalm. *Bibesieae*): div. Ribesiacear. Gen.: Ribes, Robsonia.

Ribesinae Link 1821. Enum. I. p. 236: ordo plant.
= Ribesiaceae Endl.

Ribesioides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 190. n. 403: g. Pentandr. obscurum.
= Embelia Juss.

Ribesium Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 324. t. 244. f. 315.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 120. *Cf.* Ribes nigrum, rubrum et Dillenii Med. Vorles. IV. 1. p. 271.
= Ribesia Pers.

Ricardia Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior., ibid. p. (23) ad Aparines transatum.
Scop. 1777. Intr. p. 141: g. Opulinar.
= Richardsonia Kunth.

Ricardia Derbès & Solier 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 211: nov. g. Algar., Halosaccio aff. (R. Montagnei.) *Cf.* Bot. Zeit. 1858. Beil. p. 94.

Ricasolia De Notaris 1851. Giorn. bot. it. II. 1. p. 178: nov. g. pro Sticta glomerata et herbacea propositum.

Ricasolia Massalongo 1853. Mem. lich. p. 47: nov. g. Lichenum. (L. candicans, etc.)
= Berengeria Trevis.

Ricaurtea*) Triana 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 47: nov. g. Delimear. (R. nitida.)

Riccardius Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 683: nov. g. Jungermannidear. (Jung. multifida et pinguis et Riccia fluitans L.)
= Aneura Dumort. et Ricciae sp.

*) Dicat. Ricaurte, heroi Novo-Granatensi.

Riccia*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 106. t. 57: g. pl. class. XVI.
Linn. 1737. Gen. p. 325. n. 796; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1138; 1759. Syst. ed. X. p. 1339. n. 1063; 1763. Sp. ed. II. p. 1605; 1764. Gen. ed. VI. p. 566. n. 1200; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 708: g. Algar. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Murr. 1774. Syst. p. 804; 1784. Syst. p. 956. — Reich. 1778. Gen. p. 561. n. 1317. — Roth 1788. Germ. I. p. 489. — Gmel. 1791. Syst. p. 1354. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Mönch 1794. Meth. p. 752. (terrestr.) — Pers. 1797. Syst. p. 995. — Rebent. 1804. Neom. p. 282.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 128: g. Muscis adfine.
Adans. 1763. Fam. II. p. 15: g. Hepaticar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 8. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 766. n. 1666. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 39. — Roth 1800. Germ. III. p. 428. — Batsch 1802. Tab. p. 266. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 15. 152. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 23. — DC. 1805. Franç. II. p. 415; 1815. V. p. 193. — Raddi 1818. Opusc. sc. Bol. II. p. 349; 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17. — A. Braun 1821. Flora II. p. 756. Sejungitur Ricciella. — Agdh. 1821. Aphor. p. 104. — Leman 1827. Dict. v. 45. p. 439. — Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 116.
Gled. 1764. Syst. p. 299. n. 1203: g. Algacear. (nudar.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 448.
Neck. 1771. Meth. musc. p. 41. 255: g. Muscor. frondescentium.
Scop. 1777. Intr. p. 65: g. Inundatar.
Wigg. 1780. Holsat. p. 83: g. Sphaerospermar.
Neck. 1790. El. III. p. 346. n. 1762: g. Athrosophytor.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 94: g. Ecalyptrator.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. x: g. Homallophyllar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 65.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 40: g. Ascidiocarpor.
Schwägr. 1814. Musc. hep. prodr. p. 37: g. Muscor. hepaticor. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 794. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 236. n. 3359; 1831. Gen. II. p. 740. n. 3755.
Mart. 1817. Erlang. p. 197: g. Homalophyllar. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 88.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 679: g. Ricciadear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: g. Phialicarpear.
Rchb. 1828. Consp. p. 30. n. 515: g. Riccieor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 70; 1831. Syll. Jung. p. 7: g. Ricciacear. — Par. Corda 1829 in Opiz Beitr. I.; 1830 in Sturm Jungerm. p. 6; 1832. ibid. p. 100. (Sejungitur Ricciocarpos.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 78. — Endl. 1836. Gen. n. 454. p. 43;

*) Dicat. Petr. Franc. Ricci, Florentino.

Riccia Micheli cont.
1841. Ench. p. 25. Sect. ut Bisch. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57. (restrict.)
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 36: g. Lichenastror. cryptocephalor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 86; 1838. ibid. IV. p. XXXII. 385: g. Ricciear. Sect. (1838): Lichenoides, Hemiseuma, Spongodes, Ricciella. — Par. Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 25. — Lehm. 1834. Pugill. p. ... — Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 1037. 1039. Sect.: Ricciae verae s. Lichenoides, Ricciellae, Hemiseumata. — Lindenb. 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 413. 417. — Genth 1836. Nass. I. p. 62. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 93. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 65; 1849 in Orb. Dict. XI. p. 134. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 798. Sect.: Hemiseuma, Ricciella, Riccia. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 2. — Bayrh. 1849. Taun. p. 55.
Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 235: g. Euricciear. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 598.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 171: g. Ricciar.
Synon. Lemna Rafin.; Ricciella Braun; Ricciocarpon Corda; Salviniella Hüb.
Riccia Flor. Flum. XI. t. 116.
= Padina Adans.
Ricciaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. 70: fam. unica Ricciariear. Gen.: Riccia, Tessellina, Sphaerocarpus.
Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 7: div. Hepaticar. Gen.: ead. et Ricciella, Corsinia, Brissocarpus.
Endl. 1836. Gen. p. 43; 1841. Ench. p. 24: ordo Hepaticar. Gen.: Riccia, Sphaerocarpus, Oxymitra, Corsinia, Sedgwickia. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57. Gen.: Duriaea, Riccia, Lichenoides, Ricciella, Hemiseumata, Sphaerocarpus, Oxymitra, Corsinia.
Rchb. 1841. Nom. p. 22: fam. Thallobryor. Divis.: Riccieae, Targionieae, Anthoceroteae.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 2: fam. Hepaticar. Sect. ut Rchb.
Synon. Phialicarpeae Dumort.
Ricciaceae Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 6: unica tribus Homallophyllor. Gen.: Riccia, Ricciocarpon.
Bayrh. 1849. Taun. p. 55: trib. Hepaticar.
= Euriccieae Bory & Mont.
Ricciadeae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 679: div. Hepaticar. Gen.: Riccia.
Ricciae Mitten 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 127: div. Hepaticar. Gen.: Riccia.
Ricciarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: ordo Mitrogynar. Fam. unica: Ricciaceae.
Ricciea Rchb. 1828. Consp. p. 30; 1832. Fl. exc. p. L: fam. Gongylobryor. Gen. unicum: Riccia.
Riccieae Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 86: trib. Hepaticar. Gen.: Sphaerocarpus, Corsinia, Riccia. — Par. Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 964. 1037. Gen.

Riccieae Nees cont.
ead. et Oxymitra. — Lindenb. 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 363. Gen. ead. — Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXXII. Gen. ead. — Brongn. 1843. En. genr. p. 3. — Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 234. Sect.: Duriaeeae, Corsinieae, Euriccieae. — Nees 1846. Syn. Hepat. p. 592. Sect. eaed. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549. Gen. ut Bisch. et Duriaea.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 25: div. Homallophyllar. (Disjunguntur Corsinieae.) Gen.: Riccia, Ricciella. — Simil. Rchb. 1837. Hdb. p. 136.
Genth 1836. Nass. I. p. 54. 62: ordo Hepaticar. Gen. ut Hüb.
Rchb. 1841. Nom. p. 22: div. Ricciacear. Gen. ut Bisch. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 2. Gen.: Riccia, Sphaerocarpus.

Ricciella A. Braun 1821. Flora II. p. 756: nov. g. Hepaticar. (Riccia fluitans et canaliculata.) — Par. Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 115.
Corda 1829 in Opiz Beitr. I. p. ...: g. Ricciacear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 78. — Par. Dumort. 1831. Syll. Jung. p. 7. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 31: g. Ricciear. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 65. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 93.
Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 1040: sect. Ricciae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 454 *b*. p. 43; 1841. Ench. p. 25. — Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. 437; 1846. Syn. Hepat. p. 609. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 798 *b*. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 2.

Ricciocarpon Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 6: vid. *seq.*

Ricciocarpos Corda 1829 in Opiz Beitr. I (Linnaea V. Litt. p. 78); 1832 in Sturm Jungerm. p. 103: g. Ricciacear. (Riccia natans L.)
= Hemiseuma Bisch.

Richaeia*) Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 84 in Römer Collect. bot. p. 215: nov. g. familiae incertae. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 446 (*Richeia*).
Bartl. 1830. Ord. p. 320: g. Legnotidear.
= Cassipourea Aubl.

Richardaria Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: subfam. Larnospermiae. Gen.: Richardia.

Richardia**) „Houst.“ Linn. 1737. Gen. p. 100. n. 285; 1737. Cliff. p. 133; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 330; 1759. Syst. ed. X. p. 988. n. 397; 1762. Sp. ed. II. p. 470; 1764. Gen. ed. VI. p. 174. n. 439; 1767. Syst. ed. XII. p. 251. n. 434: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 281; 1784. Syst. p. 341. — Reich. 1778. Gen. p. 176. n. 472. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 230. n. 591. — Gmel. 1791. Syst. p. 573. — Pers. 1797. Syst. p. 364. — Willd. 1799. Sp. II. p. 422. n. 671.

Richardia Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 218. n. 908: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 198; 1820. Mém. Mus. VI. p. 372. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 570. — Batsch 1802. Tab. p. 232. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 433. — Pers. 1805. Ench. I. p. 392. n. 863. — Hedw. 1806. Gen. p. 222. n. 901. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 127. n. 1309; 1830. Gen. I. p. 243. n. 1270. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 443. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XV. 85.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 123. t. 25. f. 11 (scabra).
Neck. 1790. El. I. p. 207. n. 347: g. Phyllastrophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 89: in Octandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 600: g. Spermacocear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 210.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Richardariae.
= Richardsonia Kunth.

Richardia Kunth 1818. Mém. Mus. IV. p. 437: nov. g. Aroidear. (Calla aethiopica L.) — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 132. — Schott 1829. Wien. Zeitschr. p. .... — Mart. 1831. Flora II. p. 457. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 135. — Rich. 1833 in Guillem. Arch. bot. I. p. ... (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 772: g. Callear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 67.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: g. Arear.
Schott 1832. Melet. p. 20; 1856. Syn. Aroid. I. p. 131: g. Richardiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1696. p. 238; 1841. Ench. p. 129. — Kunth 1841. Enum. III. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1108. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 51.
Brongn. 1843. En. genr. p. 13: g. Colocasiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Anaporear.
Synon. Zantedeschiae Spreng. pars.

Richardia Roth ....
= Podospermum DC. (Lindl. Veg. kingd. p. 715.)

Richardia Dietr. Syn. II. p. 1379: vid. *Reichardia Roth.*

Richardieae Schott 1832. Melet. bot. p. 20: subtrib. Anaporear. Gen.: Homalomena, Aglaonema, Richardia. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 238; 1841. Ench. p. 129. Gen. ead. (Homalonema.) — Kunth 1841. Enum. III. p. 54. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (269). Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 142: subdiv. Callacear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 40: sect. Anaporear. Gen.: Homalonema, Richardia.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 131: trib. Aroidear. efilamentatar. pachyzeugmaticar. peristatogonear. Gen.: Richardia.

*) Dicat. amico Riche.
**) Dicat. Richardsonio.

Richardsonia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 337. n. 1755: nov. g. Phryganophytor., a Jungermannia L. disjunctum.
= . . . ?

Richardsonia Kunth 1818. Mém. Mus. IV. p. 430: nomen pro *Richardia L.* propositum.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 350: g. Spermacocear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 19. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI; 1841. Nom. p. 74. n. 2775. (genuinar.) — Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 350. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 154. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 466. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
Mart. 1825. Mat. med. bras. in Denkschr. Münchn. Ak. IX. p. 86: g. Rubiacear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 657.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1995: g. Coffeacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Spermacoccear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 567: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 627. — Endl. 1838. Gen. n. 3126. p. 528; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Synon. Richardia Linn.; Schiedea Bartl.

Richea*) Labill. 1798. Voy. rech. Lapeyr. I. p. 187. t. 16. Ed. germ. (1801.) I. p. 153: nov. g. Cinarocephalar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 498. n. 4961: g. Syngenes. Segregat.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 544: g. Eupatorinar.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Leontopodiear.
= Craspedia Forst.

Richea R. Brown 1810. Prodr. I. p. 555. Ed. Nees p. 411: nov. g. Epacridear. (R. dracophylla.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIII. 488. n. 785. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 631. n. 679; 1830. Gen. I. p. 156. n. 780. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 445. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Bartl. 1830. Ord. p. 658. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 690.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3344: g. Richeacear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 785: g. Epacriear.
Endl. 1839. Gen. n. 4291. p. 750; 1841. Ench. p. 368: g. Epacrear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 769. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 433.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4811: g. Richeear.

Richeaceae Rchb. 1828. Consp. p. 128: sect. Epacrear. Gen.: Cystanthe, Richea, Dracophyllum.

*) Dicat. Riche.

Richeeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 123: sect. Epacrear. Gen. Richeacear. Rchb. et Pilitis, Sphenotoma.

Richeia Poir. vid. *Richaeia Pet.-Th.*

Richella A. Gray 1852. Proc. Amer. Ac. II. p. 325: nov. g. Anonacear., Polyalthiae aff.

Richeria*) Vahl 1796. Eclog. I. p. 30. t. 4.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 1122. n. 1922: g. Polygam. Dioec.
Pers. 1807. Ench. II. p. 616. n. 2215: g. Dioec. Pentandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 371: g. Euphorbiear.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXI. 271. n. 937: g. Euphorbiar. An rectius *Bellevalia* dicenda?
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 16. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 446.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 766. n. 834; 1830. Gen. I. p. 181. n. 914: g. Tricoccar. (Pentandr. Monogyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5097; 1841. Nom. p. 195. n. 7437: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5861. p. 1122; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 343 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282: g. Cluytiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 597: g. Wielandiidear.
Synon. Podocalyx Klotzsch?

Richiea G. Don, Dietr. vid. *Ritchiea R. Brown.*

Richnophora Leman vid. *Ricnophora Pers.*

Richtera Rchb. 1841. Nomencl. p. 208. n. 7913: g. Mocanerear. (*Anneslea Wall.*, non Andr.) *Cf.* Rchb. Nom. Syn. p. 8.

Richteria Karelin & Kiril. 1842. Bull. soc. Mosc. I. p. 126: nov. g. Heleniear., Bahiae proximum. (R. pyrethroides.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 313 et Linnaea XVI. Litt. p. 310. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Endl. 1843. Spl. III. p. 69. n. 2591/2: g. Euheleniear. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 518. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 176.

Ricinaceae Nor. mss. *Cf.* Petit-Th. Vég. îl. Afr. p. 28.
= Euphorbiaceae R. Brown.

Ricineae Rchb. 1828. Consp. p. 195: subdiv. Euphorbiacear. Gen.: Argythamnia, Ditaxis, Caperonia, Crozophora, Croton, Crotonopsis, Adelia, Acidoton, Adriana, Rottlera, Codiaeum, Gelonium, Hisingera, Mozinna, Amperea, Ricinocarpus, Ricinus, Manihot, Cnidoscolus, Adenorhopium, Jatropha, Elaeococca, Aleurites, Anda, Siphonia, Mabea, Hyaenanche, Garcia.
Bartl. 1830. Ord. p. 371: div. Euphorbiacear. Gen. ead. (Janipha loco Manihot.)
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 764: subdiv. Euphorbiear. Gen.: Crozophora, Ricinus.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487. 499: trib. Euphorbiacear. Gen. ut Bartl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193:

*) Dicat. Richer de Belleval.

Ricineae Rchb. cont.
sect. Euphorbiear. Subsect.: Hippomaneae, Acalypheae, *genuinae* (gen. 1837: Pluknetia; Rottlera, Gelonium; Adelia, Acidoton, Adriana, Hisingera, Amperea, Ricinus, Manihot, Cnidoscolus, Siphonia, Mabea, 1841: Adelia, Hendecandra, Haematospermum, Baliospermum, Acidoton, Cheilosa, Adriania, Adisca?, Rottlera, Gelonium, Hemicyclia, Hisingera, Amperea, Spathiostemon, Ricinus, Manihot, Cnidoscolus, Elaterispermum, Siphonia, Mabea).

Ricinideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 289: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Ricinus, Spathiostemon, Coelodiscus.

Ricinocarpodendron Amman 1736. Comm. Ac. Petrop. VIII. p. 212. t. 14: nov. g. plant.

Ricinocarpos Marchant 1723. Mém. Ac. Paris. p. 174. t. 9. 10: nov. g. plant.
Desf. 1817. Mém. Mus. III. p. 459. t. 22: g. Euphorbiacear. (R. pinifolia.)
Conf. Ricinocarpus A. Juss.

Ricinocarpus Boerh. 1710. Lugd. Bat. I. p. 254. *Cf. Ricinokarpos Burm.*
= Croton Linn.

Ricinocarpus A. Juss. 1824. Euphorb. p. 36: g. Euphorbiacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 457. — Klotzsch 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 229.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5056: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5812. p. 1115; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7394. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (253): g. Jatrophear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 343: g. Jatrophidear.
Synon. Ricinocarpos March.; Röperia Spreng.; Echinosphaera Sieb.

Ricinoides Tourn. 1700. Inst. p. 655. t. 423. App.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 200. t. 90.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 227: g. Monoeciae.
Mönch 1794. Meth. p. 286: g. Thalamostemonis.
= Croton Linn.

Ricinokarpos Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 202. t. 92.
= Ricinocarpus Boerh.?

Ricinus*) Tourn. 1700. Inst. p. 532: g. pl. class. XV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 310: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 328 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 295. n. 734; 1737. Cliff. p. 450; 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 465. n. 883; 1748. Ups. p. 289: g. Monoec. Polyadelph.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 142. n. 595: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1007; 1759. Syst. ed. X. p. 1276. n. 962; 1763. Sp. ed. II. p. 1430; 1764. Gen. ed. VI. p. 503. n. 1085; 1767. Syst. ed. XII. p. 636: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 723; 1784. Syst. p. 865. — Reich. 1778. Gen. p. 500. n. 1184. — Lour. 1790. Coch. II. p. 584. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 655. n. 1464. — Pers. 1797. Syst. p. 909. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 564. n. 1720; 1809. En. p. 995. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 226. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 689.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 388.
Adans. 1763. Fam. II. p. 357: g. Tithymalor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 244. — Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 878. n. 3138; 1831. Gen. II. p. 698. n. 3522.
Hill 1769. Ht. kew. p. 372: g. Monophyllar.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 270: g. Monadelph. Dodecandr.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 257; 1789. Phil. Bot. I. p. 101.
Neck. 1790. El. II. p. 334. n. 1121: g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1074: g. Monadelph. Polyandr.
Mönch 1794. Meth. p. 697: g. Calycostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 493: g. Tithymaloidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 282: g. Euphorbiacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 346. — Pers. 1807. Ench. II. p. 587. n. 2141. — Link 1822. En. II. p. 407; 1831. Hdb. II. p. 435. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 36. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 447. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 135.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 366: g. Euphorbiear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 622: g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5809. p. 1115; 1841. Ench. p. 588. — Brongn. 1843. En. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — Webb .... Canar. III. p. 234.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5057; 1832. Fl. exc. p. 764; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 194. n. 7375: g. Ricinear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 506.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Acalyphear.
Blanco 1837. Filipin. p. 761: g. Monoec. Adelph.
Meisn. 1841. Gen. p. 339 (252): g. Rottlerear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 289: g. Ricinidear.

Ricnophora*) Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 7. t. 18. f. 5: nov. g. Merulinor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 447 (*Richnophora*).
= Phlebiae Fries pars.

*) Nomen, quod grana ferat ricino animalculo similia.

*) ῥικνός, rigidus, corrugatus.

Ricotia Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 912; 1764. Gen. ed. VI. p. 337. n. 810; 1767. Syst. ed. XII. p. 438: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 496; 1784. Syst. p. 593. — Reich. 1778. Gen. p. 338. n. 874. — Lour. 1790. Coch. II. p. 397. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 440. n. 1086. — Gmel. 1791. Syst. p. 979. — Pers. 1797. Syst. p. 630. — Willd. 1800. Sp. III. p. 477. n. 1235; 1809. En. p. 675.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 172[18]. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 491.
Gled. 1764. Syst. p. 64. n. 264: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 271.
Juss. 1789. Gen. p. 239: g. Cruciferar. (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 504. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 98. (Verm. bot. Schr. V. p. 37.) — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 462.
Neck. 1790. El. III. p. 100. n. 1432: g. Brachytophytor.
Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 95; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 39: g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen.*)
Vent. 1799. Tabl. III. p. 106: g. Alyssoidear.
Pers. 1807. Ench. II. p. 194. n. 1565: g. Siliculosar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 859. n. 2282; 1831. Gen. II. p. 515. n. 2526. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 635.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 231; 1821. Syst. II. p. 284; 1824. Pr. I. p. 157: g. Alyssinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4771. — Link 1831. Hdb. II. p. 293. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 174. — Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Endl. 1839. Gen. n. 4864. p. 866; 1841. Ench. p. 448.
Link 1822. En. II. p. 159: g. Tetradynam. Siliculos.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6947: g. Clypeolear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 90: g. Allyssinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.
Synon. Scopolia Adans.

Ridan Adans. 1763. Fam. II. p. 130: g. Bidentum.
= Actinomeris Nutt.

Riddellia*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 371: nov. g. Tagetinear. (R. Tagetina.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 362. — Endl. 1842. Spl. II. p. 44. n. 2579/1.
Meisn. 1843. Comm. p. 362: g. Tagetear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 172.

*) Dicat. prof. J. L. Riddell, botanico.

Riddellia Nuttall cont.
A. Gray 1849. Pl. Fendl. p. 94 adnot. (*cf.* Flora 1850. p. 712): g. Heleniear., Bahiae aff.

Ridelia Spach vid. *Riedelia Cham.*

Ridlea Spreng. vid. *Riedlea Vent.*

Ridleia Endl., Walp. vid. *praeced.*

Ridolfia*) Morris 1841. Enum. sem. h. Taurin.: nov. g. Amminear. (Foeniculum segetum Presl.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 115. Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 69. n. 4413/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 358. — Walp. 1843. Rep. II. p. 396.
Parlat. .... in Webb Canar. II. p. 158 (*Ridolphia*): g. Seselinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.
Visiani 1849. Fl. dalm. III. 1.

Ridolphia Parlat. vid. *praeced.*

Riedelia Trinius mss.
= Ischaemum Linn.

Riedelia Chamisso 1832. Linnaea VII. p. 240: nov. g. Verbenacear. (R. lippioides.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227 (*Ridelia*): g. Verbenear.
= Zapaniae Juss. pars.

Riedera Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 358: nov. g. Bulgariaceor., Ascobolo aff.

Riedlea**) Ventenat 1807. Mém. Inst. sc. phys. I. p. 2: nov. g. Hermanniar. (R. serrata.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 822 (*Ridlea*): g. Hermanniear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 66. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 465. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46 (*Riedlia*). — Endl. 1840. Gen. n. 5338. p. 1000 (*Ridleia*); 1841. Ench. p. 519. — Walp. 1842. Rep. I. p. 343; 1843. II. p. 797; 1846. V. p. 112 (*Ridleia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5309: g. Dombeyacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 343: g. Hermanniacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7702: g. Büttneriear. genuinar.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 205; 1848. Pl. jav. rar. p. 314 (*Riedleja*): g. Büttneriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Hermannear.
Synon. Melochia Medic.; Altheria Pet.-Th.; Lochemia Arn.; Mougeotia Kunth; Riedleia DC.; Ptychocarpus Hilsenb.

Riedlea Mirbel ...... : g. pro Osmunda crispa L. institutum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 465.
= Cryptogramma R. Brown.

Riedleia DC. 1824. Prodr. I. p. 490: g. Hermanniear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 529. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 65. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 78.
Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 227: g. Büttneriacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 292: g. Büttnerear. genuinar.
= Riedlea Vent.

*) Dicat. Cosm. Ridolfi, prof. Pisano.
**) Dicat. J. Riedlé.

Riedleja Hassk. vid. *Riedlea Vent.*
Riedlia Dumort. vid. *praeced.*
Riella „Rafin." Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: g. Tylostomeor.? (Nomen.)
Riella *) Montagne 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 11: g. Ricciear., antea *Duriaea Bory & Mont.* (Rabenh. Decad. Hepat. eur. 1855. Nr. 9.)
Riencourtia **) Cassini 1827. Dict. v. 45. p. 466; 1829. v. 59. p. 235; 1830. v. 60. p. 577: g. Milleriear. — Par Less. 1832. Syn. p. 215. — DC. 1836. Pr. V. p. 503. — Endl. 1838. Gen. n. 2459. p. 399; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3000. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Steud. 1841. Nom. II. p. 460 (*Rincourtia*): g. Helianthear.
Synon. Tetrantha Poit.; Riencurtia Cass.
Riencurtia Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mai p. 26; 1825. Dict. v. 38. p. 18: nov. g. Milleriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2721.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.
= Riencourtia Cass.
Riesenbachia Presl 1835. Reliq. Hänk. II. p. 36. t. 54.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 413: g. Riesenbachiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Lopeziear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 121 (87). — Endl. 1840. Gen. n. 6127. p. 1194; 1841. Ench. p. 638. — Walp. 1846. Rep. V. p. 669. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 105.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Circear.
Riesenbachieae Spach 1835. Hist. vég. phan. IX. p. 339. 413: sect. Lopeziear. Gen. unicum: Riesenbachia.
Riessia ***) Fresen. 1852. Beitr. z. Mycol. II. II. c. tab. (Flora 1854. p. 698): nov. g. Cytisporeor.?, Isariae comparatum.
Rigidae Batsch 1802. Tab. affin. p. 230: ordo Monopetalar. Fam.: Stellatae, Rubiaceae, Coffeaceae, Cinchoneae, Guettardeae, Congregatae.
Rigidella Lindl. 1840. Bot. Regist. t. 16: nov. g. Iridear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1229/_1$. p. 1360; 1841. Ench. p. 98. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1568. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293).
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 3: g. Ferrariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Rigidifoliae Rchb. 1828. Consp. p. 79; 1831. Fl. exc. p. 145. 153; 1837. Hdb. p. 161; 1841. Nom. p. 61: ordo Synchlamydear. Formationes: Inconspicuae, Ambiguae.
Rigiophyllum Lessing 1832. Syn. Compos. p. 380: subg. Eclopis.
DC. 1837. Pr. VI. p. 289: sect. Eclopis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2782 c. p. 454; 1841. Ench. p. 244 (*Rhigiophyllum*). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3541. 3.
Spach. 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.
Rigiostachys Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 29 in adnot.: nov. g. Ochnaceis aff. (R. bracteata.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 202: g. Connaracear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 97. n. $5953/_1$ (*Rhigiostachys*): g. Surianear.
Rigocarpus Necker 1790. Elem. bot. I. p. 238. n. 386: nov. g. Sygolliphytor., a Cucumere L. distinctum.
= Citrullus Neck.
Rigodium *) „Kunze mss." Schwägr. 1844. Linnaea XVIII. p. 559: nov. g. Muscor. (R. implexum.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403 (minus cognitum).
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 262: sect. Hypni. — Simil. Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 70.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 444: subsect. Rigodii. (Hypnum praelongum L. etc.)
Rigodium C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 418: sect. Hypni emend. Subsect.: Drepanophyllaria, Homomallia, Strigodium, Anacamptophyllum, Rigodium, Plicaria, Julia.
Rima Sonnerat 1776. Voy. p. 99. t. 57—60.
Endl. 1837. Gen. n. 1868 c. p. 281; 1841. Ench. p. 168: sect. Artocarpi.
Rimaria Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 79; 1849. Sp. Alg. p. 48: sect. Synedrae.
Rimatae s. *Spurie gyratae* Swartz 1806. Syn. Fil. p. 1. 150: div. Filicum. Gen.: Schizaea, Lygodium, Anemia, Mohria, Osmunda, Todea, Mertensia, Gleichenia, Angiopteris.
Rimatae Agardh 1821. Aphor. p. 91; 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: div. Crustacear. Gen.: Spiloma, Arthonia, Opegrapha, Graphis.
Rimella Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: nov. g. Lycoperdear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 471.
Fries 1825. Pl. homon. p. 139: g. Lycoperdineor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 196. *Cf.* Endl. Gen. p. 29.
Rincourtia Steud. vid. *Riencourtia Cass.*
Rindera **) Pallas 1771. It. I. App. p. 486. t. F; 1776. Reis. russ. Reich I. App. p. 34: nov. g. plant. (R. tetraspis.)
Scop. 1777. Intr. p. 160: g. Asperifoliar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. x. 83. n. 641. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 193. — Bartl. 1830. Ord. p. 197.
Neck. 1790. El. I. p. 290. n. 459: g. Trachytophytor.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2953: g. Echiear.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 239: g. Boragear.?
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 311: g. Rinderear.

*) Nomen in honorem dom. Du Rieu de Maisonneuve.
**) Cassinii uxor e gente De Riencourt.
***) Dicat. Dr. Riess, botanico.

*) ῥῖγος, rigor.
**) Dicat. Dr. Rinder, medico Moscoviensi.

Rindera Pallas cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 192; 1841. Nom. p. 112. n. 4354: g. Cynoglossear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3781. p. 650; 1841. Ench. p. 321. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). — A. DC. 1846. Pr. X. p. 170. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 564. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 173.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 30: g. Asperifoliear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 56: g. Anchusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.
Synon. Tetraspis Wallr.

Rindereae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 309: subtrib. Boragiear. Gen.: Mattia, Solenanthus, Rindera, Trichodesma.

Rinemospermae *) La Llave & Lexarza 1825. Nov. veget. descr. II. Orch. p. 1: ordo plant. Sect.: hypogeae, epigeae, epidendrae.
= Orchideae Hall.

Ringentes Gmel. 1768. Fl. Sibir. III. p. 193: class. XII. plant. Gen.: Digitalis, Scrophularia, Antirrhinum, Cymbaria, Dodartia, Melampyrum, Bartsia, Rhinanthus, Pedicularis, Euphrasia, Odontites, Orobanche, Veronica, Circaea, Pinguicula. Ordo II. *Gymnospermae.* Gen.: Salvia, Scutellaria, Dracocephalum, Leonurus, Prunella, Nepeta, Betonica, Stachys, Galeopsis, Lamium, Phlomis, Glechoma, Lavendula, Hyssopus, Origanum, Clinopodium, Thymus, Mentha, Lycopus, Amethystea.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 233: class. plant. Ordines: Gymnospermae, Angiospermae. *Genera deliquescentia*: Lycopus, Verbena, Mentha, Veronica, Limosella, Digitalis.
Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: ordo plant. Divis.: Halleriae, Digitales, Martyniae, Veronicae, Anacardia, Antirrhina, Pediculares.

Ringentes Batsch 1802. Tab. affin. p. 92: class. III. plant. Ordines: Papilionaceae, Gloriales.

Rinodina Achar. 1810. Lich. univ. p. 344; 1814. Syn. Lich. p. 146: sect. Lecanorae. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 473. — Par Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 68.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 448: g. Lecidear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 243: sect. Parmeliae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 402 *a.*
Fries 1825. Pl. homon. p. 245: sect. Zeorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 400 *b.*

Rinodina Massalongo 1852. Ricerch. auton. Lich. crost. (Flora 1854. p. 315): g. Lichenum.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 122: g. Lecanorinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p 373: sect. Psorae.
Arnold 1858. Flora p. 317: g. Lecanorear.
= Berengeria Trevis.?

Rinorea Aublet 1775. Guian. I. p. 235. t. 93: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 396.
Scop. 1777. Intr. p. 278: g. Icosandrar.

*) ῥίνημα, ramentum: semina scobiformia.

Rinorea Aublet cont.
Juss. 1789. Gen. g. 287: g. Berberidum. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXV. 325. n. 954.
Batsch 1802. Tab. p. 114: g. Berberinar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 86: g. Berberidear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 474.
DC. 1824. Pr. I. p. 312: g. Alsodinear. — Par G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 341. — Meisn. 1837. Gen. p. 21 (18).
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7155: g. Conohoriear.
= Alsodeiae Pet.-Th. pars.

Rinzia *) Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 239: nov. g. Bäckear. (R. Fumana.)
Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 108: g. Bäckeear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 735.

Riochreuxia Lindl. vid. *seq.*

Riocreuxia **) Decaisne 1848 in DC. Prodr. VIII. p. 640: nov. g. Ceropegiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627 (*Riochreuxia*): g. Stapeliar.

Riousia Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 198: sect. Ourisiae.
= Euourisia Endl.

Ripariaceae Bruch & Schimp..... Bryol. eur. Fasc. 16: fam. Muscor. Gen.: Cinclidotus.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 81: fam. Clonocarpor.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 241: subdiv. Clonocarpor. Gen.: Cinclidotus.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen. id.
Bayrh. 1849. Taun. p. 25: fam. Muscor. frondosor. Gen. id.

Riparieae Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: div. Bryacear. Gen.: Cinclidotus.

Ripidium ***) Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 127: nov. g. Filicum agyratar. (Acrostichum dichotomum Forst.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 475.
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 335: sect. Schizaeae.
= Schizaea Smith pt.

Ripidium Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 169: nov. g. Graminum. (Andropogon strictus et Saccharum Ravennae.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 760 (*Rhipidium*).

Ripogonum †) Forst. 1776. Char. gen. p. 49. t. 25: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 374. n. 823.
Scop. 1777. Intr. p. 84: g. Liliacear.
Juss. 1789. Gen. p. 41: g. Asparagor.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 101: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 243. n. 989. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 293. — Ed. Nees p. 149. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 222. — Agdh. 1823. Aphor. p. 161. — Rchb. 1828. Consp.

*) Dicat. Sebast. et Jacobo Rinz, Francofurt..
**) Dicat Alfr. Riocreux, pictori.
***) ῥιπίδιον, parvum flabellum.
†) ῥίψ, vimen; γόνυ, articulus.

Ripogonum Forst. cont.
p. 64. n. 1332. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXV. 313. — Endl. 1833. Norf. p. 29. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 46; 1850. Enum. V. p. 270. (?) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 216. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 253 (*Rhipogonum*).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 99. n. 1271; 1830. Gen. I. p. 263. n. 1369 (*Rhipogonum*): g. Sarmentacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1122 (*Rhipogonum*).
Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 475: g. Asparaginear. — Par A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 151.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Smilacinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 53: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1185. p. 155; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1735.

Riqueria Pers. 1805. Ench. I. p. 152. n. 340: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 84. n. 391. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 36. 497. n. 603. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 117. n. 594. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 556.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 497. n. 560: g. Rubiacear.? — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 460.
= Riqueuria Ruiz & Pav.

Riqueuria *) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 18; 1798. Fl. peruv. I. p. 70: nov. g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 345. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 476.
Synon. Riqueria Pers.

Rissoa **) Walker-Arnott. 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 324: nov. g. Aurantiacear. (Limonia citrifolia Moon.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XI. 1839. p. 63. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 458.
Endl. 1840. Gen. n. 5504. p. 1044; 1841. Ench. p. 548: g. Limonear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 381. — Meisn. 1843. Comm. p. 345.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8102: g. Limonicar. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 32.42.

Rissoella J. Agardh 1850. Öfvers.; 1850. Flora II. p. 742: nov. g. Floridear. (Fucus verruculosus Bert.)

Ristrepia Agardh, Ritg. vid. *Restrepia Kunth.*

Ritcheia Brongn. vid. *seq.*

Ritchiea ***) R. Brown 1826 in Clappert. narr. p. 223 (Verm. bot. Schr. IV. p. 35): nov. g. pro Crataeva fragrante constitutum.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 276 (*Richiea*): g. Capparear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 17(15). — Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7125. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 5004. p. 894; 1841. Ench. p. 456. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89 (*Ritcheia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 60.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 232 (*Richiea*): g. Capparidear.

Ritinophora Necker 1790. Elem. bot. II. p. 229. n. 971: g. Eredophytor.
= Icica Aubl.

Ritro Endl. 1838. Gen. n. 2847 *b*. p. 467; 1841. Ench. p. 245: sect. Echinopis. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 280.

Rittera *) Schreb. 1789. Gen. I. p. 364. n. 919: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 935.
Vahl 1791. Symb. II. p. 60. t. 34.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
Correa 1807. Ann. Mus. IX. p. 289. t. f. 2. R. pinnatae fructus).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 776: g. Capparidum.
= Possira Aubl.

Rivea **) Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 407 (*Cf.* Flora Lit. V. p. 124); 1845 in DC. Prodr. IX. p. 325: nov. g. Argyreiear. — Par G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 253. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182). — Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 12. t. 1356. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 584.
Endl. 1839. Gen. n. 3809. p. 654; 1841. Ench. p. 324: g. Convolvulear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 95. — Rchb. 1841. Nom p. 113. n. 4419. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.

Riveria ***) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 267. t. 659 bis: nov. g. Leguminosar. (R. nitens.) *Cf.* Vogel in Linnaea 1838. Litt. p. 3, ubi Swartziae inseritur. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 261. — DC. 1825. Pr. II. p. 524 (minus notum). — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 467.
Meisn. 1837. Gen. p. 92 (66): g. Phaseolear.?
Endl. 1841. Gen. n. 6807. p. 1320; 1841. Ench. p. 675: g. Caesalpiniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6049: g. Ceratoniear.

Rivicoa A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 170: sect. Lucumae. (L. Rivicoa Gärtn.)

Rivina †) Plumier 1703. Gen. p. 47. t. 39.
Linn. 1737. Gen. p. 31. n. 86; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 31; 1753. Sp. I. p. 121; 1759. Syst. ed. X. p. 899. n. 150; 1762. Sp. ed. II. p. 177; 1767. Syst. ed. XII. p. 128: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 148 (p. 149 *Rivinia*). — Murr. 1774. Syst. p. 138; 1784. Syst. p. 165. — Reich. 1778. Gen. p. 166. n. 174. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 87. n. 219. — Gmel. 1791. Syst. p. 278. — Pers. 1797. Syst. p. 171; 1805. Ench. I. p. 149. n. 323. — Willd. 1797. Sp. I. p. 694. n. 255; 1809. En. p. 169. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 104.

---

*) Dicat. Lud. Riqueur.
**) Dicat. J. A. Risso, Niciensi.
***) Dicat. Jos. Ritchie, peregrinator

*) Dicat. prof. Jo. Jac. Ritter, Franequerae.
**) Dicat. Aug. de la Rive, medico Genevensi.
***) Dicat. Mariano de Rivero.
†) Dicat. Aug. Quirino Rivino, Lipsiensi.

Rivina Plumier cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 262: g. Blitor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Gled. 1764. Syst. p. 29. n. 114: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 1729: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 340: g. Defloratar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 375. t. 77. f. 5 (humilis).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 119.
Neck. 1790. El. II. p. 184. n. 898: g. Aclithrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
Cram. 1803. Disp. p. 90: in Octandr. Monogyn. (R. octandra) et p. 119 in Dodecandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 76. n. 356: g. Atriplicear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 29. 459. n. 566. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 484.
Schrad. 1808. Comm. Gotting. XVI. p. 136.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 183: g. Chenopodear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 471. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 452. n. 482; 1830. Gen. I. p. 109. n. 548. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 541.
R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. App. 5. p. 454 (Verm. bot. Schr. I. p. 265): g. Phytolaccear. — Par Bartl. 1825. Beitr. II. p, 173; 1830. Ord. p. 299. — Link 1829. Hdb. I. p. 391. — Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 172. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 243. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 101.
Link 1821. En. I. p. 110: g. Atriplicinar.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. p. 30: in Chenopodiaceis.
Agdh. 1825. Aphor. p. 218: g. Rivinear. (genuinar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4395; 1841. Nom. p. 166. n. 6445. — Endl. 1840. Gen. n. 5257. p. 976; 1841. Ench. p. 508. — Meisn. 1840. Gen. p. 316 (227). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 10. Sect.: Villamilla, Piercea. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1013.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Riviniear.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 626: g. Rivinar. Disjungitur Trichostigma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 509: g. Phytolaccacear.
Synon. Solanoides Tourn.: Rivinia Linn.; Piercea Mill.

Rivinae A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 626: trib. Phytolaccear. Gen. Rivina, Trichostigma, Petiveria.

Rivineae Agardh 1825. Aphor. p. 218; 1825. Class. plant. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Oleracear. Trib.: *genuinae* (gen.: Rivina, Bosea, Digera, Microtea, Ancistrocarpus), Phytolacceae.
Rchb. 1828. Consp. p. 165: sect. Phytolaccear. Gen.: Microtea, Ancistrocarpus, Cryptocarpus, Bosea, Rivina, Salvadora. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 166. Subsect.: *genuinae* (gen.: Mohlana, Rivina), Limeae, Phytolacceae genuinae, Gyrostemoneae.
Endl. 1840. Gen. p. 976; 1841. Ench p. 508:

Rivineae Agardh cont.
trib. Petiveriear. Gen.: Mohlana, Rivina. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. p. 10. Gen. ead. et Ledenbergia. (*Synon. Rivinidia* pt. *Rafin.*)
Meisn. 1840. Gen. p. 316 (227): trib. Petiveriacear. Gen. ut Endl. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 132. Gen. ead.

Rivinia Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 35; 1764. Gen. ed. VI. p. 63. n. 162: g. Tetrandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 271.
Juss. 1789. Gen. p. 84: g. Atriplicum.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 255: g. Chenopodear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 197: g. Atriplicear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 320: g. Amarantear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Riviniacear.
= Rivina Plum.

Riviniaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: trib. Chenopodiacear. Gen.: Rivinia, Salvadora, Bosaea, Rhagodia.

Rivinidia Rafin. 1836. Fl. tell. (ex Moq.-Tand.) = Rivineae Moq.-Tand.

Rivinieae Rchb. 1837. Handb. p. 239: sect. Phytolaccear. Gen.: Cryptocarpus, Microtea, Ancistrocarpus, Bosea, Rivina, Phytolacca.

Rivularia Roth 1797. Catal. I. p. 212; 1800. Tent. fl. germ. III. p. 543; 1802. Neue Beitr. I. p. 259: nov. g. Algar, (Ulva incrassata Huds.) *Cf.* Konig Ann. of bot. I. p. 247 et Leman 1827. Dict. v. 45. p. 488. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 5. — Mart. 1817. Erlang. p. 300 (vegetantium).
Palis. ex Desv. 1808. Journ. bot. I. p. 124: g. Iliodear.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45: g. Hypepidermidocarpor.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXXVIII. 130: g. Tremellinar. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 915.
Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: g. Confervar. *Cf.* Flora 1821. II. p. 511.
Agdh. 1821. Aphor. p. 97; 1824. Syst. p. XIX. 24: g. Nostochinar. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190. — Endl. 1836. Gen. n. 32. p. 3; 1841. Ench. p. 3.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 284: g. Oscillatoridear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 348; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130: g. Undinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 423.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78: g. Nostocinear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 756. n. 3851: g. Tremellacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 8: g. Myxophysalidum.
Menegh. 1838. Cenni p. 27: g. Rivulariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 591. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 9. (Sejungitur

Rivularia Roth cont.
Gloiotrichia.) — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. (Flora 1843. p. 92.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 12. n. 17. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phyc. gener. p. 238; 1845. Phyc. germ. p. 187; 1849. Sp. Alg. p. 336. n. 231. (restrict.) — Römer 1845. Deutschl. Alg. p. 29. — Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 91. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52; 1849. ibid. XI. p. 139. — Math. 1853. Belg. II. p. 514.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 190: g. Nostochinear.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 150: g. Oscillatoriear. Sect.: Rivularia, Scytochloria, Raphidia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Rivularidar.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. heterocytidear.
Harv. 1858. Ner. bor. am III. p. 109: g. Oscillatoriacear.
Conf. Gaillardotella Bory; Raphidia Hass.; Stylobasis Schwabe; Stypnion Rafin.; Gloiotrichia J. Agdh.

Rivularia Rafin. . . . . . . g. Rivuliniar. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 490.

Rivularia Bonnemais. 1822. Journ. Phys. CXIV. p. 180: g. Hydrophytar. loculatar.
= Chaetophora Schrank.

Rivularia Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Rivulariear., includens Linkiam, Scytochloriam (?), Raphidiam, Listiam, Euactidem, Diplotrichiam, Zonotrichiam et Gloiotrichiam.

Rivularia Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 436: g. Rivulariear. (Rivul. atra Roth.)
= Dasyactis Kütz.

Rivularidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 18: trib. Oscillatorear. Gen. Rivulariear. J. Agdh.

Rivularieae Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 27: fam. Algar. Gen. Corynephora, Rivularia, Linckia, Listia?, Chaetophora, Hydrocoryne, Scythymenia?
Rchb. 1841. Nom. p. 18: subdiv. Nostochinar. genuinar. Gen. ead. et Scytochloria, Myrionema.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 8: trib. Zoospermear. Gen.: Gloiotrichia, Rivularia, Zonotrichia, Diplotrichia. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. Gen. ead.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): trib. Lyngbyoidear. Gen.: Rivularia.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. 332 (Flora 1843. p. 92): trib. Zoosporear. Gen. ut J. Agdh.
Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 12: trib. Oscillatoriear. Gen. ut J. Agdh.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phyc. gener. p. 235: fam. Gloeosiphear. Gen.: Physactis, Heteractis, Chalaractis, Ainactis, Limnactis, Rivularia, Dasyactis, Euactis. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl.

Rivularieae Meneghini cont.
p. 28. (hypospermear.) Gen.: Inomeria, Dasyactis, Rivularia, Limnactis, Chalaractis, Physactis.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . . . : fam. Algar. filiformium. Gen.: Rivularia, Raphidia, Lithonema.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 185; 1849. Sp. Alg. p. 332: fam. Oscillarinar. Gen.: Physactis, Heteractis, Ainactis, Limnactis, Rivularia, Dasyactis, Euactis, Inomeria, Capsosira; Diplotrichia?, Anhaltia?
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 89: sect. Oscillatoriear. Gen.: Merizomeria, Mastichonema, Geocyclus, Actinococcus, Gloiotrichia, Physactis, Zonotrichia, Diplotrichia, Chalaractis, Rivularia, Chaetophora, Cruoria, Thorea, Batrachospermum.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: trib. Oscillarinar. Subtrib.: Mastichothriceae, Eurivularieae.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 436: fam. Syntamiidear. Gen.: Rivularia.
Math. 1853. Belg. II. p. 514: trib. 20 Algar. Gen.: Rivularia, Hormospora, Stigeoclonium.

Rivuliniae Rafin . . . . . div. Algar. Gen.: Rivularia, Nostocus, Endosperma, Sclernax, Pexisperma, Spermipole. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 490.

Rixea*) Morren 1845. Ann. soc. Gand. . . . nov. g. ex typo Tropaeoli azurei Miers. *Cf.* Flora 1846. I. p. 317.

Rizoa**) Cavan. 1800. Anal. cienc. nat. III. p. 133. t. 29; 1801. Icon. VI. p. 56. t. 578: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (R. ovatifolia.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 121. n. 1386: g. Labiatar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 745. n. 2106; 1831. Gen. II. p. 476. n. 2348. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 501.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 438: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2891. — Bartl. 1830. Ord. p. 183.
= Gardoquia Ruiz & Pav.

Rizophora Burm. vid. *Rhizophora Linn.*

Robbia***) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 444: nov. g. Echitear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Robergea†) Desmaz. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 177: nov. g. Pyrenomycetum, Dothideae aff. (R. unica.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 397 (*Robergia*): subg. Haloniae?

Robergia Schreb. 1789. I. p. 309. n. 787: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 729. — Willd. 1799. Sp. II. p. 752. n. 910. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 455.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
Pers. 1805. Ench. I. p. 510. n. 1136: g. Terebinthacear. — Par. Spreng 1825. Syst.

*) Dicat. Josse Rixe.
**) Dicat. Salvatori Rizo.
***) Dicat. Dr. Robb.
†) Dicat. amico Roberge.

Robergia Schreb. cont.
II. p. 439. n. 1735. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 502.
= Rourea Aubl.

Robergia Fries vid. *Robergea Desmaz.*

Robertia Scopoli 1777. Introd. p. 154: g. Monocarpiar. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 504 et Wittst. Etym. Handw. p. 768 (*Robertsia*).
Neck. 1790. El. I. p. 266. n. 425: g. Campylophytor.
= Sideroxylon Linn.

Robertia Rich. mss.
= Phyllocladus Rich.

Robertia Mérat 1812. Fl. Paris. p. 211.
= Eranthis Salisb.

Robertia*) DC. 1815. Fl. franç. V. p. 453: nov. g. Cichoracear. (R. taraxacoides). — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 504. — Link 1829. Hdb. I. p. 794.
Link 1822. En. II. p. 294: g. Syngenes. Aequal.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 64: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.
Guss..... Pl. rar. p. 330.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 661. n. 2887; 1831. Gen. II. p. 645. n. 3246: g. Cichorear.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422. 434; 1830. v. 60. p. 569: g. Hypochaeridear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 96. — Endl. 1838. Gen. n. 2988. p. 496; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3750. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2160: g. Andryalear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.
Less. 1832. Syn. p. 131: g. Hypochoeridear. — Par. Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 295.
Schultz Bip. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 91: subg. Achyrophori.

Robertium „Picard Note sur les Géran." (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 306: sect. Geranii. (G. Robertianum et lucidum.)

Robertsia Wittst. vid. *Robertia Scop.*

Robertsonia Haworth 1812. Syn. succ. p. 321. Ed. Schrank 1819. p. 354: nov. g. a Saxifraga L. distinctum.
Haw. 1821. Saxifr. en. p. 52: g. Saxifragear. Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 528. — Link 1831. Hdb. II. p. 39. — Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 158. n. 6156. (genuinar.) Sect. (1841): Hirculus, Micranthes, Arabidia, Micropetalum, Robertsonia, Diptera.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 707; 1828. Consp. p. 159. n. 4203 *d;* 1832. Fl. exc. p. 560: sect. Saxifragae. — Par. Sternb. 1831. Rev. Saxifr.
= Hydatica Neck.

*) Dicat. Robert, botanico corsicano.

Robillarda Cast. 1845. Cat. pl. Mars. p. 205.
= Pestalozzia Fries.

Robina Aublet 1775. Guian. II. p. 768. t. 307. 308 (p. 769 *Robinia*): g. Diadelph. Decandr. (R. Panacoco et Nicou.)
= Lonchocarpus HBK.

Robinia*) Linn. 1737. Gen. p. 220. n. 585; 1737. Cliff. p. 354; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 212; 1753. Sp. II. p. 722; 1759. Syst. ed. X. p. 1161. n. 775; 1763. Sp. ed. II. p. 1043; 1764. Gen. ed. VI. p. 378. n. 879; 1767. Syst. ed. XII. p. 490: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 556; 1784. Syst. p. 668. — Reich. 1778. Gen. p. 378. n. 953. — Lour. 1790. Coch. II. p. 455. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 501. n. 1195. — Gmel. 1791. Syst. p. 1115. — Pers. 1797. Syst. p. 705; 1807. Ench. II. p. 311. n. 1724. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1131. n. 1364; 1809. En. p. 769. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 326.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 132. n. 547: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 392. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 79. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 143.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 15. — Scop. 1777. Intr. p. 305. — Juss. 1789. Gen. p. 358. (Sejungitur Caragana.) — Vent. 1799. Tabl. III. p. 408. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 227. — DC. 1805. Franç. IV. p. 561. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 754; 1826. Syst. III. p. 245. n. 2558; 1831. Gen. II. p. 584. n. 2868. — Link 1822. En. II. p. 242. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 505. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 434. 526.
Adans. 1763. Fam. II. p. 323: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 291: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 23. n. 1328: g. Cyteophytor.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 261. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3898; 1832. Fl. exc. p. 514; 1841. Nom. p. 148. n. 5735. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 237. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 257. — Meisn. 1837. Gen. p. 89(63). — Torr. & Gray 1838. North.-Am. I. p. 294. — Endl. 1840. Gen. n. 6546. p. 1274; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 679. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr.) 1848. France I. p. 454. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 491.
Link 1831. Hdb. II. p. 199: g. Galegoidear.
Synon. Pseudoacacia Tourn.; Pseudacacia Mönch.

*) Dicat. Joh. Robino, prof. quondam Paris., indice Horti Parisini 1601 claro. (Ht. Cliff.)

Robinia Roxb. 1814. Cat. Calc. p. 56.
= Mundulea DC.

Robinsonia*) Scopoli 1777. Introd. p. 218. n. 963: g. Calycanthemar.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 337. n. 852: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 999. n. 985. — Pers. 1807. Ench. II. p. 33. n. 1217. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 511.
Neck. 1790. El. II. p. 77. n. 729: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 796: g. Polyandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 871: g. Rosaceis aff.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 489. n. 1827: g. Myrtear.
= Touroulia Aubl.

Robinsonia DC. 1833 in Guillem. Arch. bot. II. p. 333.
Decne 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 27. Char. reform.
DC. 1837. Pr. VI. p. 447: g. Balbisiear. Sect.: Symphyochaeta, Eleutherochaeta, Eleutherolepis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2821. p. 461; 1841. Ench. p. 245. Sect. eaed. (Robinsonia loco Symphyochaetae.)
Meisn. 1839. Gen. p. 216 (136): g. Rhetinodendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Senecionear.

Robiquetia**) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 426. t. 34: nov. g. Orchidear. (R. ascendens.)
Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1507: g. Vandear.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
= Saccolabium Lindl.

Robonia Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5167 *b*: sect. Boroniae. (Ic. exot. 73. 74.)

Robsonia***) Berland. 1826. Mém. soc. Genèv. III. p. 56. t. 1; 1828 in DC. Prodr. III. p. 477: sect. Ribis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4247 *a*. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 544.
Rchb. 1837. Hdb. p. 233: g. Grossulariear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 180.
Endl. 1839. Gen. n. 4683. p. 824; 1841. Ench. p. 413: g. Ribesiacear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 361. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108.
Rchb. 1841. Nom. p. 160. n. 6249: g. Ribesicar.

Robur Rchb. 1831. Fl. exc. p. 177: sect. Quercus. (Q. pubescens, Esculus, Robur, etc.) — Simil. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 148.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 24. n. 1845 *A* I: subsect. Esculi. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 380.

Robynsia Drapiez .... Herb. gén. de l'amat. II.
= Bravoa Llave & Lex. (Lemaire in Orb. Dict. II. p. 729.)

*) Dicat. Thom. Robinson, Anglo.
**) Dicat. P. J. Robiquet, chemico, prof. Paris.
***) Dicat. Steph. Robson, botanico anglico.

Robynsia*) Mart. & Gal. 1843. Bull. Ac. Brux. X. 2. p. 193: nov. g. Phaseolear., Mucunae aff. (R. macrophylla.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 534: g. Erythrinear.

Rocama**) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 71: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 455.
Scop. 1777. Intr. p. 335: g. Defloratar.
DC. 1828. Pr. III. p. 352: sect. Trianthemae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 72. — Endl. 1840. Gen. n. 5168 *a*. p. 948; 1841. Ench. p. 501. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1058.
Synon. Papularia Forsk.; Portulacastrum Medic.

Roccardia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 74. n. 132: nov. g. Siphoniphytor., a Stähelina L. sejunctum.
= Syncarpha DC.?

Roccelia Dumort. vid. *seq.*

Roccella***) DC. 1805. Fl. franç. II. p. 334; 1815. V. p. 179: nov. g. Lichenum. (Lichen roccella L.) — Par. Leman 1827. Dict. v. 45. p. 514 (*Orseille*).
Pers. 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 18: sect. Physciae.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 81. 439; 1814. Syn. Lich. p. 243: g. Discoideor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 425 (p. 409 *Rocella*): g. Peltidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71 (*Roccelia*).
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Sphaerophoror.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 23: g. Plocariar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 237; 1831. Lich. eur. p. 2. 33: g. Usneacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 176. p. 16; 1841. Ench. p. 11. — Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 562. — Körb. 1846. Lich. eur. sp. p. 3.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 101: g. Parmeliacear.
Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 214: g. Parmeliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Usneidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349; 1849. ibid. XI. p. 144: g. Usneear.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 7: g. Cornicularior.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 11 (Flora 1854. p. 234): g. Roccellear.

Roccelleae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 11 (Flora 1854. p. 234): trib. Intricatar. Gen.: Roccella.

Rocella Gray vid. *Roccella DC.*

Rocella Arnott vid. *Rorella Rupp.*

Rochea Scopoli 1777. Introd. p. 296. n. 1340: nov. g. Leguminosar. spuriar. (*Man-Todda Rheede* IX. t. 22.)
= Aeschynomene Linn.

Rochea DC. .... Pl. grass. n. 103; 1828. Prodr. III. p. 393: g. Crassulear. Sect.: Danielia, Francisceа (p. 486 Franciscaria). — Par. Poir. 1822. Dict. v. 25. p. 283

*) Dicat. D. Robyns, Bruxell.
**) Arabice *Rokama*.
***) Nomen lusitanicum.

Rochea DC. cont. (*Larochea*). — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 106. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.

Link 1821. En. I. p. 299: g. Sempervivar.

Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4181: g. Sedear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Cotyledonear.

Bartl. 1830. Ord. p. 310: g. Crassulacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 21. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 82. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 237: sect. Crassulae.

Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Umbilicear. Sect.: Danielia, Franciscaria.

Endl. 1839. Gen. n. 4615. p. 810; 1841. Ench. p. 405: g. Rochear. Sect. eaed.

Synon. Larochea Pers.; Larochea et Kalosanthes Haw.; Dietrichia Tratt.; Crassula Adans.

Rochea Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 322: nov. g. Gladiolear. (Ixia Rochensis *α* Ker.)

Rocheae Endl. 1839. Gen. p. 809; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulear. isostemonum. Gen.: Thisantha, Grammanthes, Cyrtogyne, Rochea. Accedit 1850 (Spl. V. p. 20) Sphaeritis.

Rchb. 1841. Nom. p. 158: subsect. Crassulear. Gen. ut Endl. (Larochea) et Dietrichia.

Rochefortia*) Swartz 1788. Prodr. p. 4. 53; 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 551. t. 10: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 797. n. 1740. — Gmel. 1791. Syst. p. 458. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1328. n. 508. — Pers. 1805. Ench. I. p. 290. n. 648. — Hedw. 1806. Gen. p. 182. n. 750.

Gis. 1792. Prael. p. 499: g. Dumosar.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 477; 1825. Syst. I. p. 861. n. 1003; 1830. Gen. I. p. 214. n. 1101: g. Gentianear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 919.

Schult. 1820. Syst. VI. p. XX. 209: g. Rhamnear. (aff. Schreberae.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 517. (?)

Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3498: g. Chironiear.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 392: g. Cordiacear.?

Meisn. 1840. Comm. p. 180: g. Hydroleacear.? — Par. Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 185.

Endl. 1841. Gen. n. 6874. p. 1331; 1841. Ench. p. 685: inter genera gamopetala dubiae sedis.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. monopetalum incertae sedis.

Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 160. 252: g. Boraginear.

Synon. Lutrostylis Don.

Rochelia Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XI. 108. n. 645: g. Asperifoliar. = Echinospermum Swartz.

Rochelia**) Rchb. 1824. Flora I. p. 243: nov. g. Asperifoliar. (Lithospermum dispermum L.) — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 172.

Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2970; 1831. Fl. exc. p. 346: g. Borraginear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3787. p. 651; 1841. Ench. p. 321 (anomalum). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 104.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Cynoglossear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 351. — Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 111. n. 4344. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187).

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 30: g. Asperifoliear.

A. DC. 1846. Pr. X. p. 175: g. Rocheliear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 564. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 175.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.?

Synon. Messerschmidia Asso.

Rochelieae A. DC. 1846. Prodr. X. p. 175: trib. Borraginear. Gen.: Rochelia.

Rochetia Meisn. 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 261: sect. Leucospermi.

Rochonia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 345: nov. g. Solidaginear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2380. p. 385; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3334. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Rodetia**) Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 323: nov. g. Aervear. (Deeringia Amherstiana Wall.)

Rodhymenia Fries vid. *Rhodomenia Grev.*

Rodigia Spreng. 1820. Neue Entd. I. p. 275; 1826. Syst. III. p. 365. 654. n. 2882; 1831. Gen. II. p. 645. n. 3241: nov. g. Cichorear. (Crepis rhoeadifolia MB.)

Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2158: g. Andryalear.

Link 1829. Hdb. I. p. 798: g. Cichoracear.

Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3021/₁. p. 1388; 1841. Ench. p. 251. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.

DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 98: g. Rodigiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3740. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6: g. Crepidear.

Rodigieae DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 98: subtrib. Cichoracear. Gen.: Rodigia, Ammogeton, Pachylepis, Pinaropappus. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). Gen. ead. et Apatanthus?

Rchb. 1841. Nom. p. 96: subdiv. Hypochaeridear. Gen. ut Meisn. et Voigtia.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 34: subtrib. Chicoracear. Gen.: Rodigia.

Rodolobus Juss. vid. *Podolobus Rafin.*

Rodora Adans. vid. *Rhodora Linn.*

---

*) Dicat. Rochefort, peregrinatori in Antillis.
**) Dicat. Ant. Rochel, botanico Pestinensi.

*) Dicat. Al. Rochon, peregrinatori.
**) Dicat. H. J. A. Rodet, prof. Tolosensi.

Rodriguesia Brongn. vid. *seq.*

Rodrigueza Dumort. vid. *seq.*

Rodriguezia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 115. t. 25: nov. g. Gynandr. Diandr.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 367. t. 92: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 348. — Bartl. 1830. Ord. p. 57.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 719. n. 2984; 1831. Gen. II. p. 664. n. 3352: g. Orchidear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 148.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 194: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1533; 1841. Nom. p. 54. n. 2060. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57 (*Rodrigueza*). — Endl. 1837. Gen. n. 1455. p. 202; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27 (*Rodriguesia*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 126: g. Ceropagar.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 41. t. 70.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Ionopsidar. (*Synon. Gomeza R. Br.*)
Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 771. Char. reform. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 690.
Synon. Burlingtonia Lindl.; Bourlingtonia Endl.

Rodschiedia**) Gärtn. Meyer & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 413. 435: nov. g. Tetradynam. Siliculos. (Thlaspi bursa pastoris L.)
= Capsella Vent.

Rodschiedia Miquel 1844. Linnaea XVIII. p. 585: nov. g. Amherstiear. (R. surinamensis.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 571.

Rodschieldia „Fl. Wett.“ Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 149: vid. *Rodschiedia GMS.*

Roea „Hügel mss.“ Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 34; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 77: nov. g. Pultenaear. (R. linophylla.) — Par. Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 58. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 269 (*Roeea*).
Endl. 1840. Gen. n. 6438. p. 1257; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 429. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1506: g. Papilionacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5932: g. Pultenaear.
Meisn. 1843. Comm. p. 350: g. Sophorear.
Synon. Hugelroea Steud.

Roeea A. Juss. vid. *praeced.*

Rögneria C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 413: nov. g. Festucacear., Brachypodio aff. (R. causasica.) — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 328.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 777: g. Bromear.

*) Dicat. Eman. Rodriguez, botanico hispano.
**) Dicat. E. K. Rodschied.

Röhlingia*) Dennstädt 1828. Schl. z. Hort. Malabar. p. 31: nov. g. plant. (*Acara-Patsjotti Rheede* V. t. 8.)
= Tetracera Linn.

Röhlingia Röpert mss. olim. *Cf.* Röp. 1820. Flora I. p. 113.
= Eranthis Salisb.

Roela Scopoli vid. *Roella Linn.*

Roelana Commers. mss.
= Erythroxylon Kunth.

Roëlla**) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 492. t. 35; 1737. Coroll. p. 4. n. 946; 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 71. n. 164; 1753. Sp. I. p. 170; 1759. Syst. ed. X. p. 927. n. 202; 1762. Sp. ed. II. p. 241; 1764. Gen. ed. VI. p. 88. n. 220; 1767. Syst. ed. XII. p. 162. n. 218: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 176; 1784. Syst. p. 211. — Reich. 1778. Gen. p. 91. n. 235. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 118. n. 291. — Gmel. 1791. Syst. p. 353. — Pers. 1797. Syst. p. 219; 1805. Ench. I. p. 193. n. 430. — Willd. 1797. Sp. I. p. 918. n. 330. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 28.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 200. n. 830: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Campanular. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 134.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 149 (*Roela*). — Gis. 1792. Prael. p. 393.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 154. t. 31. f. 3 (ciliata).
Juss. 1789. Gen. p. 165: g. Campanulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 471. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. VI. 73. n. 874. — Link 1821. En. I. p. 217. — — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 149. — Bartl. 1830. Ord. p. 152. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 559.
Neck. 1790. El. I. p. 235. n. 380: g. Sygolliphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 212: g. Campanulatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 368: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 138. n. 598. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 524; 1825. Syst. I. p. 723. n. 785; 1830. Gen. I. p. 163. n. 819. — Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2795. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — A. DC. 1830. Camp. p. 172. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 716.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 745: g. Jasionear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186: g. Canarinear.
Endl. 1838. Gen. n. 3081. p. 316; 1841. Ench. p. 266: g. Prismatocarpear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 242 (149). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 445: g. Wahlenbergiear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 31.

*) Dicat. Joh. Chr. Röhling, flor. german. auctori.
**) Dicat. Guil. Roëll, prof. in theatro anatom. Amstelodamensi. (Ht. Cliff.)

Roëlla Linn. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4041: g. Roëllear.
Synon. Aculeosa Pluk.
Roëlleae Rchb. 1841. Nomencl. p. 103: subsect. Canarinear. Gen.: Roëlla, Edraianthus.
Roelloides Banks ex Steud. Nomencl. II. p. 397. 463.
= Prismatocarpus L'Herit.
Rölpinia Scopoli vid. *Kölpinia Scop.*
Römeria*) Medic. 1792 in Usteri Ann. III. p. 15.
DC. 1821. Syst. II. p. 92; 1824. Pr. I. p. 122: g. Papaveracear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 261. — Link 1831. Hdb. II. p. 279. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 137. — Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 92. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 223. — Brongn. 1843. En. genr. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 60. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 256.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Chelidoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4852: g. Papaverear. — Par. Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 463. — Endl. 1839. Gen. n. 4825. p. 856; 1841. Ench. p. 443. (verar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 115. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 291. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 174.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 52: g. Chelidoniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 264.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 28: g. Chelidoninear.
Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7070: g. Römeriear.
Römeria Mönch 1794. Meth. p. 341: nov. g. Thalamostemonis. (Amaranthus polygonoides L.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 152.
= Amblogyna Rafin.
Römeria Thunb. 1798. Nov. gen. IX. p. 130; 1799 in Römer Arch. II. 1. p. 5; 1800. Prodr. II. p. 184; 1818. Fl. cap. II. p. 67: g. Pentandr. Monogyn. (Sideroxylon argenteum, inerme et melanophlaeum Thunb. Prodr. p. 36.) *Cf.* Meisn. Comm. p. 55 sub *Heeria.* — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 115. n. 507.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 499: g. Sapotear.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3602: g. Myrsinear.
Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 142: g. Anacardiear.
= Myrsine A. DC.?
= Heeria Meisn.
Römeria Trattin. 1802. Gen. pl. p. 88.
= Steriphoma Spreng.
Römeria „Zea mss." Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 61. 287. n. 114: nov. g. Diandr. Digyn., Cyperoideas cum Gramineis conjungens. (R. Zeae.)
= Diarrhena Palis.

*) Dicat. Joh. Jac. Römer, botanico Turicensi.

Römeria Raddi 1820. Mem. soc. ital. XVIII. p. 46. Ed. Nees 1841. p. 22. t. 7: nov. g. Hepaticar. (Jungermannia multifida, palmata, pinguis.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 152.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 530*a*: sect. Merckiae.
= Aneura Dumort.
Römerieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 184: sect. Chelidoniear. Gen.: Römeria.
Röpera*) A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 454. t. 15: nov. g. Zygophyllear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 392. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 770. (verar.) — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 306. (genuinar.) — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — Endl. 1840. Gen. n. 6035. p. 1163; 1841. Ench. p. 616. — Steud. 1841. Nom. II. p. 463 (*Röperia*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 494; 1843. II. p. 823. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 164. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5196; 1841. Nom. p. 198. n. 7550: g. Guajacear.
Röperia Spreng. 1826. Syst. III. p. 13. 147. n. 2472; 1831. Gen. II. p. 564. n. 2757: nov. g. Tricoccar. (Ricinocarpus pinifolius Desf.)
= Ricinocarpos Desfont.
Röperia Steud. vid. *Röpera A. Juss.*
Röslinia Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 211: nov. g. Petalostemonis. (Chironia baccifera L.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 153.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 203 (*Roslinia*): g. Chironiear.
Endl. 1838. Gen. p. 601. n. 3536*c*: sect. Chironiae. — Par. Griseb. 1839. Gent. gen. p. 105; 1845 in DC. Pr. IX. p. 41. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 10. — Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5116. 3.
Röstalia Ritg. vid. *seq.*
Röstelia Rebentisch 1804. Pr. fl. Neomarch. p. 350. t. 2. f. 9: nov. g. Gymnospermor. (Lycoperdon cancellatum L.) *Cf.* Schrad. n. Journ. I. p. 148; Leman 1827. Dict. v. 46. p. 153 et Unger 1833. Exanth. Pfl. (Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 214: *Röstellia*). — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 49.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 6: fam. Caeomatis.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 29: subg. Hypodermii.
Nees 1816. Syst. p. 12; 1817. Überbl. p. 1: subg. Caeomatis. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 312.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 533: g. Coeomidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Intestinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 521: subg. Aecidii.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 9*c*: sect. Aecidii. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 182*b*. p. 17; 1841. Ench. p. 13. — Math. 1853. Belg. II. p. 443.

*) Dicat. Joh. Aug. Chr. Röper, prof. Basil., tnm Rostock.

Röstelia Rebentisch cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92 (*Röstalia*): g. Leptomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 12: g. Uredineor. genuinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 20.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 19. 55; 1842. Mycol. p. 74: g. Aecidiacear. — Par. Bail 1858. Syst. p. 7. t. 18 (*Graphiola*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 510: g. Aecidineor. — Par. Tul. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 174. *Cf.* Flora 1855. p. 732. (*Synon. Centridium* et *Ciglides Chev.*)
Bonord. 1851. Hdb. p. 54: g. Aecidiaceor.
Synon. Ceratites Link; Cronartium Fries?

Röstellia „Link" Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 214: vid. *praeced.*

Röttlera Vahl 1805. Enum. I. p. 87. n. 31: nov. g. Diandr. Monogyn. (Gratiola montana Röttl. in litt.) — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 10. n. 48. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 54. 129. n. 69 (*Rottlera*).
= Didymocarpus Wall.

Rogeria*) Gay 1824. Ann. sc. nat. I. p. 457: nov. g. Pedalinear. (non definitum.) — Par. Endl. 1832. Linnaea VII. p. 11. t. 3. f. 50—73; 1839. Gen. n. 4179. p. 724; 1841. Ench. p. 351. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 625. — DC. 1845. Pr. IX. p. 256.
Delile .... Cent. pl. voy. Caill. p. 78. t. 73.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3250: g. Sesamear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 176. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 249.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198; 1841. Nom. p. 116. n. 4535: g. Martyniear.
Meisn. 1840. Gen. p. 298 (206): g. Pedaliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.

Rogiera Planchon 1850. Fl. d. serr. V. t. 442; 1852. ibid. VIII. p. 13: nov. g. Rondeletiear. (Rondeletia cordata Benth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 775.

Rohbergia Roxb. . . .
= Phlebochiton Wall.?

Rohdea**) Roth 1821. Nov. pl. spec. p. 196: nov. g. Hexandr. Monogyn. (Orontium japonicum.)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 118. n. 1291; 1830. Gen. I. p. 264. n. 1377: g. Aroidear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XIX. 172. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1123.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 779: g. Taccear.
Bartl. 1830. Ord. p. 68: g. Orontiacear.
Blume 1834 in Hoev. & Vriese Tijdschr. I. p. 83. t. 3: g. Asparaginear. s. Smilacear. *Cf.* Isis 1840. p. 341.
Endl. 1837. Gen. n. 1189. p. 155 (err. *Rhodea*); 1841. Ench. p. 90: g. Aspidistrear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 18 (*Rhodea*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205 (*Rhodea*). — Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 49; 1850. Enum. V. p. 320.

*) Dicat. Thom. Roger, botanophilo Paris.
**) „Dicat. in gratam memoriam optimi Rohde".

Rohdea Roth cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1124 (*Rhodea*): g. Tupistrear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210: g. Asparagear.

Rohria*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 30. n. 63: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 93. — Willd. 1797. Sp. I. p. 186. n. 79.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Hedw. 1806. Gen. p. 131. n. 571: g. Pentandr. Monogyn.
= Tapura Aubl.

Rohria Vahl 1791. Danske Nat. Selsk. Skrivt. I. 2. p. 15: nov. g. Polygam. Frustran. (Gorteria herbacea L.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 155.
Thunb. 1798. Nov. gen. IX. p. 123; 1800. Prodr. II. p. 139. 193: g. Syngenes. Hermaphrodit.
= Berkheya Ehrh.

Roia Scopoli 1777. Introd. p. 226. n. 1014: g. Nomadear.
= Swietenia Linn.

Roioc**) Plumier 1703. Gen. p. 11. t. 26.
Adans. 1763. Fam. II. p. 146: g. Aparinium.
DC. 1830. Pr. IV. p. 446: sect. Morindae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 544. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 419. — Endl. 1838. Gen. n. 3183 *a.* p. 539; 1841. Ench. p. 272.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 426 (*Royoc*): subg. Morindae.

Rokeika Scopoli vid. *seq.*

Rokejeka***) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 90: nov. g. Decandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 703.
Scop. 1777. Intr. p. 224 (*Rokeika*): g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 313: g. Portulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 139. — Hedw. 1806. Gen. p. 329. n. 1297 (*Rokeieka*). — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 169.
Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5359 *c*; 1841. Nom. p. 205. n. 7811. 2: sect. Gypsophilae. — Par. A. Braun 1843. Flora p. 382.
Synon. Struthium Ser.

Rolandra†) Rottböll 1775. Coll. soc. med. havn. II. p. 256: nov. g. plant.
Scop. 1777. Intr. p. 119: g. Compositar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 673. n. 2911; 1831. Gen. II. p. 649. n. 3277. (desciscent.)
Swartz 1788. Prodr. p. 8. 116; 1806. Ind. occ. III. p. 1388. t. 17: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 593. n. 1355. — Gmel. 1791. Syst. p. 1280. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2400. n. 1581. — Pers. 1807. Ench. II. p. 499. n. 1967.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 152: g. Echinopear.

*) Dicat. Jul. Bernh. Rohr, botanico.
**) *Roioc* nomen vernaculum.
***) Arabice *Rokaejeka.*
†) Dicat. Dr. Rolander, Linnaei discipulo.

Rolandra Rottböll cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 538: g. Cynarear.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 27: g. Echinopsidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 366.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 170: g. Vernoniear. — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 332. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 343; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2047. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1831. Linnaea VI. p. 693; 1832. Syn. p. 150. — DC. 1836. Pr. V. p. 90. — Endl. 1838. Gen. n. 2234. p. 363; 1841. Ench. p. 232 (sph. *Solandra*). — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709 (*Solandra*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 261.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3931: g. Lagascear.

Rolandreae Cassini 1828. Dict. v. 57. p. 338; 1830. v. 60. p. 587: div. Vernoniear. Gen.: Trichospira, Spiracantha, Shawia; Odontoloma, Noccaea, Tetranthus?, Caesulia?, Rolandra, Corymbium, Gundelsheimera. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 88. Gen.: Gundelia, Corymbium, Rolandra, Spiracantha, Trichospira, Lagascea. — Endl. 1838. Gen. p. 362; 1841. Ench. p. 232. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). Gen. ead. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. Gen.: Eremanthus, Haplostephium, Shawia, Monosis, Adenocyclus, Odontoloma, Trichospira, Spiracantha, Lagasca, Nocca, Caesulia?, Rolandra, Corymbium, Gundelia.
Rchb. 1828. Consp. p. 103: subdiv. Echinopear. Gen.: Trichospira, Rolandra, Gundelia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Corymbium, Rolandra, Noccea, Gundelia, Trichospira. — Par Less. 1831. Linnaea VI. p. 691; 1832. Syn. p. 150. Gen.: Corymbium, Spiracantha, Rolandra, Lagascea, Noccaea, Gundelia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 100 (sphalm. *Bolandreae*): subdiv. Segregatar. Divis.: Elephantopeae, Lagasceae, Bojereae.

Roldana *) La Llave & Lexarza 1825. Nov. veg. descr. II. p. 10: nov. g. Polygam. Superfl. (R. lobata.)
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. 12: sect. Senecionis.
= Senecionis Less. pars.

Rolfinkia Zenk. 1835. Pl. ind. t. 14.
= Phyllocephalum Blume.

Rollandia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 458. t. 74: nov. g. Lobeliacear. (R. lanceolata.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 698.
Presl 1836. Mon. Lobel. p. 47: g. Delisseacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3067. p. 513; 1841. Ench. p. 264. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 344. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148).
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102. n. 4001: g. Delisseear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572: g. Delissear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693.

Rollinia *) St. Hilaire 1825. Fl. Bras. I. p. 28. t. 5: nov. g. Anonacear. (Anona dolabripetala Raddi.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 247. — A. DC. 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 199. t. 1. 2. *Cf.* Flora Lit. III. p. 101. — Schltd. 1834. Linnaea IX. p. 315. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 503. — Mart. 1841. Fl. Bras. fasc. II. p. 17.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 202; 1830. Gen. I. p. 456. n. 2247: g. Anonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4997; 1841. Nom. p. 193. n. 7326. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 90. — Endl. 1839. Gen. n. 4724. p. 834; 1841. Ench. p. 423. — Walp. 1842. Rep. I. p. 90; 1843. II. p. 748. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 294. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 57.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278: g. Annonear. genuinar.

Rolofa Adans. 1763. Fam. II. p. 256: g. Alsinium.
DC. 1828. Pr. III. p. 455: sect. Glini. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4403 *b.* — G. Don 1831. Gen. syst. III. p. 154.
= Euglinus Endl.

Romana Vell. Flor. Flum I. t. 147: g. Rubiacear. ? (campestris, crenata et integerrima) ex Steud. Nom. II. p. 464.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 47: inter genera nondum descripta.
= Buddleia Linn.

Romanoa Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 199 in adnot.: novum nomen pro *Anabaena A. Juss.* (nec *Bory*) propositum.

Romanzoffia **) Chamisso 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 71. t. 14: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Flora 1821. II. p. 518.
Cham. & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 607: g. Scrofularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3071: g. Veronicear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 103 (?)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Romanzoviacear.
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 118. t. 3. f. 1; 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 249: g. Hydroleacear.? *Cf.* Flora Lit. V. p. 117 et Isis 1836. p. 475. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3836. p. 661; 1841. Ench. p. 330. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (180). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 105.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 643: g. Sibthorpiacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4402: g. Hydroleear.
Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 185: g. Na-

*) Dicat. Eugen. Montano y Roldan.

*) Dicat. C. Rollin, prof. Paris.
**) Dicat. comiti de Romanzoff.

Romanzoffia Cham. cont.
mear. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 180.
Synon. Romanzowia DC.; Romanzovia Spreng.

Romanzovia Spreng. 1825. Syst. I. p. 584. n. 632: g. Saxifragear.?
Spreng. 1830. Gen. I. p. 149. n. 745: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 658.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 114: g. Sibthorpiacear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639: g. Hydrophyllacear.
= Romanzoffia Cham.

Romanzoviaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Gentianacear. Gen.: Romanzoffia.

Romanzowia DC. 1824. Prodr. I. p. 319: g. Droseracear.? (An potius Saxifragear.?) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 346.
= Romanzoffia Cham.

Rombut Adans. 1763. Fam. II. p. 284: g. Thymelaear.
= Cassyta Linn.

Romneya *) Harvey 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 74. t. 3: nov. g. Papaveraceae., Papaveri aff. (R. Coulteri.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431.
Walp. 1846. Rep. V. p. 21: g. Bocconiear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 31. n. 4821/1: g. Papaverear. verar.

Romulea Maratti 1772. Plantarum Romuleae et Saturniae sp. not. (Rom.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 46: sect. Ixiae. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 26.
Eckl. 1827. Verz. p. 18: g. Ixiacear.
Planch. 1852. Fl. d. serr. VIII. p. 33: g. Iridear.
= Trichonema Ker?

Ronabea Aublet 1775. Guian. I. p. 154. t. 59: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. latifolia.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 365. — Blanco 1837. Filipin. p. 162.
Scop. 1777. Intr. p. 144 (*Ronobea*): g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 205; 1820. Mém. Mus. VI. p. 380: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 444. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. X. 192. n. 890. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 188. — A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 207.
Neck. 1790. El. I. p. 136. n. 235: g. Sphanidophytor.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Coffeariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2038: g. Coffeacear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 270; 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 265. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2798.
DC. 1830. Pr. IV. p. 503: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 584. — Endl. 1838. Gen. n. 3148. p. 532; 1841. Ench. p. 271.

Ronabea Aubl. cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Synon. Viscoides Jacq.

Roncela Rchb., Spach vid. *Roucela Dumort.*

Rondachine Bosc . . .
= Brasenia Schreb.

Rondeletia *) Plumier 1703. Gen. p. 15. t. 12.
Linn. 1737. Gen. p. 59. n. 169; 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 72. n. 165; 1753. Sp. I. p. 172; 1759. Syst. ed. X. p. 928. n. 206; 1762. Sp. ed. II. p. 243; 1764. Gen. ed. VI. p. 90. n. 224; 1767. Syst. ed. XII. p. 163. n. 223: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 177; 1784. Syst. p. 212. — Reich. 1778. Gen. p. 92. n. 240. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 120. n. 296. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 66. Char. emend. — Gmel. 1791. Syst. p. 359. — Pers. 1797. Syst. p. 220. — Willd. 1797. Sp. I. p. 930. n. 336; 1809. En. p. 215. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 133; ed. 1832. I. p. 521.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 200. n. 827: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Dumosar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402.
Scop. 1777. Intr. p. 140: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 201; 1820. Mém. Mus. VI. p. 384: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 575. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 440. — Pers. 1805. Ench. I. p. 203. n. 456. — Hedw. 1806. Gen. p. 137. n. 592. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVII. 229. n. 919. — Link 1821. En. I. p. 227. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 707. n. 757; 1830. Gen. I. p. 163. n. 822. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 974. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 200. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 717.
Neck. 1790. El. I. p. 147. n. 256: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 393. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 609. — Kunth 1824. Syn. III. p. 47. — D. Don 1825. Nepal. p. 138. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2050. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32 (*Rondoletia*). — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 271.
Cram. 1803. Disp. p. 36: in Tetrandr. Monogyn.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 38. t. 184.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 165: g. Hedyotidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Cham. 1834. Linnaea IX. p. 240. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180. — Brongn. 1843. En. genr. p. 50.
DC. 1830. Pr. IV. p. 406: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 514. — Endl. 1838. Gen. n. 3254. p. 552; 1841.

*) Dicat. Dr. Romney Robinson.

*) Dicat. Guillelmo Rondelet, Monspessulano.

Rondeletia Plumier cont.
Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2889. — Walp. 1843. Rep. II. p. 505; 1847. VI. p. 59. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 117.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1905: g. Cinchonacear.
Benth. 1845. Pl. Hartweg. II. p. 191. Sect.: Dirrhynchia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Petesia P. Browne; Lightfootia Schreb.; Willdenowia Gmel.; Arachnimorpha Desv.

Rondeleticae DC. 1830. Prodr. IV. p. 401: subtrib. Hedyotidear. Gen.: Condaminea, Macrocnemum, Chimarrhis, Augustea, Portlandia, Bikkia, Isidorea, Spallanzania, Rondeletia, Wendlandia, Xanthophytum, Carphalea, Sipanea, Virecta, Ophiorhiza, Argostemma, Spiradiclis, Tula, Dentella. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 511. Gen. ead. et Alseis, Deppea. — Meisn. 1838. Gen. p. 158 (114). Gen. ead. (exclusa Dentella) et Greenea, Adenosacme, Rotheria, Neurocalyx. — Endl. 1838. Gen. p. 550. Gen.: Tula, Spiradiclis, Argostemma, Ophiorrhiza, Lipostoma, Virecta, Sipanea, Carphalea, Xanthophytum, Greenia, Wendlandia, Adenosacme, Rondeletia, Spallanzania, Isidorea, Bikkia, Portlandia, Schreibersia, Chimarrhis, Macrocnemum, Condaminea. Emittuntur 1841 (Spl. I. p. 1393 et Ench. p. 273) Argostemma et Xanthophytum, et accedunt (ibid.): Leptopetalum, Lerchea, Choristes, et 1842 (Spl. II. p. 53) Lindenia.
Rchb. 1841. Nom. p. 77: subsect. Hedyotidear. Gen. fere ut Endl.

Rondoletia Dumort. vid. *Rondeletia Plum.*

Ronnowia Buchoz .... Diss. pl. 18. (Dec. III. pl. 8.)
= Omphalea Linn. (Baill.)

Ronobea Scopoli vid. *Ronabea Aubl.*

Ropala Gmel. 1791. Syst. p. 225: g. Tetrandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Protearíar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 337: g. Embothriear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 106. n. 535: g. Proteacear.
= Rhopala Schreb.

Rophostemon Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1578: g. Neottiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2145 (*Rophostemum*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 452; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1552. p. 113; 1842. Spl. II. p. 19.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Cranichidear.
= Roptrostemon Blume.

Rophostemum Rchb. vid. *praeced.*

Ropourea*) Aublet 1775. Guian. I. p. 198. t. 78: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. guianensis.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 350 (*Ropurea*). — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LVIII. 706. n. 845 (*Ropurea*). — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 220.
Juss. 1789. Gen. p. 421: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 127. n. 556.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2976 (*Rapourea*): g. Hydrophyllear. ?
Meisn. 1840. Comm. p. 185: g. Cordiacear. ?
Endl. 1841. Gen. n. 6873. p. 1331 (*Rapourea*); 1841. Ench. p. 685: inter genera minus cognita.
Synon. Idesia Scop.; Plotia Neck.; Camax Schreb.

Roptrostemon**) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VI: novum nomen pro *Cordyla Blume* (non *Lour.*) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 763 (*Rhophostemon*).
Synon. Cordyla Blume; Rophostemon Endl.; Rophostemum Rchb.

Ropurea St. Hil., Röm. & Schult. vid. *Ropourea.*

Roram „Adans." Endl. in synon. Cenchri: vid. *Raram Adans.*

Rorella Rupp. 1718. Fl. jen. p. 102. Ed. Hall. 1745. p. 114: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 372: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
DC. 1824. Pr. I. p. 317: sect. Droserae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4910 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 343. — Arn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 313 (sphalm. *Rocella*). — Walp. 1846. Rep. V. p. 61.
Synon. Ros Solis Tourn.; Rossolis Adans.

Rorelleae Rchb. 1837. Handb. p. 271; 1841. Nomencl. p. 188: subdiv. Droserear. Gen.: Aldrovanda, Drosera, Drosophyllum.

Rorida „Forsk." Gmel. 1791. Syst. p. 260: g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 13.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4864: g. Cleomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 266. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296.
= Roridula Forsk.

Roridula Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 567. n. 1234; 1767. Syst. ed. XII. p. 185: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 203; 1784. Syst. p. 244. — Reich. 1778. Gen. p. 115. n. 307. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 157. n. 400. — Gmel. 1791. Syst. p. 422. — Pers. 1797. Syst. p. 256; 1805. Ench. I. p. 253. n. 578. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1184. n. 457. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 353. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXIV. 436. n. 993.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.
Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 298. t. 62. f. 8 (muscicapa).
Juss. 1789. Gen. p. 426: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 165. n. 696.

*) Nomen vernaculum *Aroupourou.*
**) *ῥόπτρον*, clava, baculus.

Roridula Linn. cont.
Neck. 1790. El. III. p. 390. n. 1835: g. Catotaphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 31: g. Ciliatar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 778: g. Capparidum.
DC. 1824. Pr. I. p. 320: g. Droseracear. — Par. St. Hil. 1824. Mém. Mus. XI. p. 63. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 222. — Bartl. 1830. Ord. p. 286. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 347. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 488. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (19). — Endl. 1839. Gen. n. 5038. p. 908; 1841. Ench. p. 469. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 434. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 307 (anomalum).
Spreng. 1825. Syst. I. p. 791. n. 873; 1830. Gen. I. p. 183. n. 929: g. Droserear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX; 1828. Consp. p. 189. n. 4911. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 821.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188. n. 7179: g. Roridulear. — Par. Griseb. 1849. Arch. f. Naturg. II. p. 421.
Synon. Iridion Burm. (Ireum Burm. ex Steud.)

Roridula Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 35: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Droserae simile.) *Cf.* Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 13 in adnot.
= Siliquaria Forsk.

Roriduleae Rchb. 1837. Handb. p. 272; 1841. Nomencl. p. 188: subdiv. Droserear. Gen.: Byblis, Roridula.
Griseb. 1849. Arch. f. Naturg. II. p. 421: fam. inter Sauvagesieas et Pittosporeas collocanda. Gen. ead.

Roripa Scopoli 1760. Fl. carn. ed. I. p. 520.
Adans. 1763. Fam. II. p. 41[illegible] g. Erucar.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 504: g. Siliculosar.
Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7012: g. Roripear. Sect.: Leiolobium, Roripa.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 265: g. Latiseptar. (emend.) Sect.: Nasturtiola.
Wenderoth 1846. Fl. hass. p. 220: g. Siliquosar.
= Brachylobos DC.

Roripa „Bess. Enum. Volh." (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 125: g. Alyssinear. ampliat. Sect.: Radicula, Armoracia.

Roripeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 182: subsect. Arabidear. genuinar. Gen.: Clandestinaria?, Barbaraea, Roripa; Tetrapoma.

Ros Solis Tourn. 1700. Inst. p. 245. t. 127: g. pl. class. VI.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 207. t. 94. f. 1. 2.
= Rorella Rupp.

Rosa Tourn. 1700. Inst. p. 636. t. 408: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 124. Ed. Hall. 1745. p. 138: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 146. n. 412; 1737. Cliff. p. 191; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 132; 1753. Sp. I. p. 491; 1759. Syst. ed. X. p. 1062. n. 556; 1762. Sp. ed. II. p. 703; 1764. Gen. ed. VI. p. 254. n. 631; 1767. Syst. ed. XII. p. 348: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p.

Rosa Tourn. cont.
351. — Murr. 1774. Syst. p. 393; 1784. Syst. p. 473. — Reich. 1778. Gen. p. 259. n. 687. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 341. n. 863. — Lour. 1790. Coch. I. p. 322. — Pers. 1797. Syst. p. 507; 1807. Ench. II. p. 47. n. 1237. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1063. n. 997; 1809. En. p. 543. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 308. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 295. 334. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 512.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 347: g. Pomiferar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 276. n. 1138: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 687.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 313.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 183. — Mirb. 1815. Elém. II. p. 900. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 860 (genuinar.); 1825. Syst. II. p. 546. n. 1874; 1830. Gen. I. p. 417. n. 2081. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 567. — Link 1822. En. II. p. 55; 1831. Hdb. II. p. 82. — D. Don 1825. Nepal. p. 235. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 247. — Bartl. 1830. Ord. p. 401. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 8. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 194. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 211.
Adans. 1763. Fam. II. p. 294: g. Rosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 335. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 338. — DC. 1805. Franç. IV. p. 436; 1815. V. p. 532. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 222. — Kunth 1824. Syn. III. p. 468. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 612.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 176: g. Calyciflorar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 84.
Scop. 1777. Intr. p. 221: g. Calycanthemar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 374. t. 73. f. 4 (canina).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 292; 1789. Phil. Bot. I. p. 139.
Gmel. 1791. Syst. p. 853: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 230.
Rich. 1816 in Nestl. Potent. p. 16: g. Fragariacear.
Woods 1816. Linn. Trans. XII. 1. (Isis 1829. p. 602.) Syn. spec. Brit.
Redouté & Thoré 1817—1820. Monogr. c. ic.
Seringe 1818. Mus. helv. hist. nat. I. 1. p. 1. *Cf.* Flora 1821. II. p. 685.
Lindl. 1820. Monogr. c. ic.
Thory 1820. Prodr. de la monogr. du genre Rosier.
Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 114: g. Calycocarpar.
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 597: g. Rosear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII; 1828. Consp. p. 167. n. 4432; 1837. Hdb. p. 243; 1841. Nom. p. 168. n. 6525. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II.

Rosa Tourn. cont.
p. 224. Sect.: Rhodopsis, Rosa. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 564. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 198. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 301. — Koch 1836. Syn. p. 221. Ed. II. p. 245. — Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 16. — Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74). — Kunth 1838. Berol. I. p. 198. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 457. — Endl. 1840. Gen. n. 6357. p. 1240; 1841. Ench. p. 659. Sect.: Rhodopsis, Rhodophora. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125. — Walp. 1843. Rep. II. p. 11; 1846. V. p. 649. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 72. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 551. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 384. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 654.
Wallr. 1828. Rosae plant. gen. historia. (Nordhus.)
Koch 1831. Linnaea VI. p. 261. Spec. german.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 104: g. Dryadear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Rosidar.
Synon. Rhodophora Neck.

Rosaceae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 59 plant. Gen.: Sanguisorba, Poterium, Cliffortia, Alchimilla, Aphanes, Agrimonia, Nevrada, Rosa, Tormentilla, Sibbaldia, Fragaria, Comarum, Potentilla, Dryas, Geum, Rubus, Amygdalus, Cerasus, Prunus, Crataegus, Sorbus, Mespilus, Pyrus, Spiraea; Aesculus, Acer.
Juss. 1789. Gen. p. 334: ordo 10 class. XIV. Sect.: Pomaceae, Rosae, Sanguisorbae, Potentillae, Spiraeae, Prockiae, Amygdaleae. *Affinia:* Plinia, Ludia, Blakwellia, Homalium, Napimoga. (*Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 224.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 331. Sect.: Pomaceae, Rosae, Agrimonieae, Dryadeae, Ulmariae, Amygdaleae.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 180. t. 102. 103. Gen. fere ut Juss.
DC. 1805. Franç. IV. p. 427: fam. (71) Dicotyledonum polypetalar. Ord.: Pomaceae, Rosae, Agrimoniaceae, Dryadeae, Ulmariae, Drupaceae. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 900. Typi sectionum: Malus, Rosa, Sibbaldia, Fragaria, Spiraea.
Cassel 1810. Nat. Fam. p. 121.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 859: fam. 100 plant. Divis.: *genuinae* (gen.: Rosa), Sanguisorbeae, Potentilleae, Spiraeeae, Pomaceae, Amygdaleae, affines.
DC. 1819. Théor. elém. p. 245; 1825. Pr. II. p. 525: ordo (64) Calyciflorar. Trib.: Chrysobalaneae, Amygdaleae, Spiraeaceae, Neuradeae, Dryadeae, Sanguisorbeae, Roseae, Pomaceae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 523. Trib.: Dryadeae, Neuradeae, Roseae. — Koch 1836. Syn. p. 207. Ed. II. p. 230. Trib.: Spiraeaceae, Dryadeae, Roseae. — Walp. 1843. Rep. II. p. 11. Subord. ut Endl.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 210: ordo pl. Sect.: Pomaceae, Potentillaceae, Rosae, Sanguisorbeae, Amygdaleae.

Rosaceae B. Juss. cont.
Trattin. 1823—1824. Rosacear. monogr. 4 vol.
Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 225. Trib.: Pomaceae, Roseae, Sanguisorbeae, Potentilleae, Amygdaleae, Spiraeae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: fam. Rosiflorar. Divis.: Sanguisorbeae, Potentilleae, Roseae, Spiraeaceae, Pomaceae, Chrysobalaneae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 166. Divis.: Cliffortieae, Roseae, Pomaceae. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 588. Divis.: Cliffortieae, Potentilleae, Roseae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 241; 1841. Nom. p. 167. Divis.: Sanguisorbeae, Potentilleae, Roseae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Rosariear. Trib.: Pomaceae, Roseae, Agrimoniaceae, Fragariaceae, Rubeae, Spiraeaceae.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 340: ordo pl. Trib.: Fragariaceae, Sanguisorbeae.
Lindl. 1833. Nix. p. 21; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 143; 1847. Veg. kd. p. 563: ordo Rosalium. Trib.: Rosidae, Potentillidae, Spiraeidae, Quillajeae, Neuradeae?
Meisn. 1837. Gen. p. 101 (71): ordo 71 plantar. (p. 440 Rosiflorar.) Trib. ut DC. 1825.
Endl. 1840. Gen. p. 1240; 1841. Ench. p. 658: ordo (272) Rosiflorar. Subord.: Roseae, Dryadeae, Spiraeaceae, Neuradeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 125: fam. Rosinear. Trib.: Roseae, Dryadeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 207. Fam. ut Endl. et Pomaceae, Amygdaleae, Chrysobalaneae.

Rosaceae Batsch 1802. Tab. affin. p. 1: class. I. plant. Ordines: Frugariae, Columnariae, Difformariae, Umbraculariae, Oxydariae, Adonariae, Multisetariae, Resinariae.

Rosaceae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 566: fam. Calyciflorar. Gen. unicum: Rosa.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Icosandrar.
Bartl. 1830. Ord. p. 400: ordo (238) Calophytar. Gen. id.
Link 1831. Hdb. II. p. 82: ordo 30 Perigynar. Gen. id.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 1: fam. 9 Calophytar. Gen.: Rosa, Lowea.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 83: fam. Rosiflorar.
= Roseae Camb.

Rosae Adans. 1763. Fam. II. p. 286: fam. 41 plant. Gen. §. 1: Cliffortia, Pimpinella, Sanguisorba, Agrimonia, Neuras. §. 2: Aphanes, Alchimilla, Basteria, Rosa, Rubus, Fragaria, Pancovia, Caryophyllata, Dryas, Potentilla, Quinquefolium, Sibaldia, Dalibarda, Filipendula, Aruncus, Spiraea. §. 3: Pyrus, Sorbus, Crataegus, Mespilus.
= Rosaceae Juss.

Rosae Juss. 1789. Gen. p. 335: sect. Rosacear. Gen. unicum: Rosa. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 338 (*Rosiers*). Gen. id. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 222. Gen. id.
DC. 1805. Franç. IV. p. 436: ordo Rosacear. Gen. id.

Rosae Juss. cont.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 612: sect. Sanguisorbear. Gen. id.
= Roseae Camb.

Rosales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 21: nixus Apocarpar. Ord.: Rosaceae, Leguminosae, Connaraceae, Chrysobalaneae, Calycantheae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 539: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Calycanthaceae, Chrysobalanaceae, Fabaceae, Drupaceae, Pomaceae, Sanguisorbaceae, Rosaceae.

Rosalesia La Llave & Lexarza 1824. Nov. veg. descr. I. p. 9: nov. g. Polygam. Aequal. (Eupatorear.: R. glandulosa.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 611. n. 3016: g. Eupatorinar.
Endl. 1838. Gen. p. 502; 1841. Ench. p. 251: inter genera Compositar. penitus dubia.

Rosaria Carm. mss.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Lyngbyear.
= Meloseira Agdh.

Rosarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36: ordo Calypetalar. Fam.: Calycanthideae, Rosaceae, Amygdalineae, Leguminosae.

Roscia Dietr. Syn. I. p. 552: vid. *Boscia Thunb.*

Roscoea*) Smith 1804. Exot. bot. t. 100; 1817. Linn. Trans. XII. p. 460.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 2. 19: g. Scitaminear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 9. n. 8; 1830. Gen. I. p. 5. n. 8. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 10.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 237: g. Amomear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1601. — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1625. p. 223; 1841. Ench. p. 119: g. Zingiberum.
Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2213: g. Zingiberear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.

Roscoea Roxb. 1832. Fl. Ind. III. p. 54: nov. g. Didynam. Angiosperm. (R. pentandra, villosa et tomentosa.)
= Congea Roxb.

Roscyna**) Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 429; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 364: nov. g. Androsaeminear. (Hypericum Ascyron L.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8002: g. Androsaemear.
Endl. 1840. Gen. n. 5464 *k*. p. 1033; 1841. Ench. p. 539: sect. Hyperici.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 20: g. Hypericear.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 360: g. Hypericinear.

*) Dicat. Will. Roscoe, botanico Liverpool.
**) Anagramma vocis Ascyron.

Rosea „Rivin." Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 91: g. pl. class. IV.
= Rhodiola Linn.

Rosea*) Martius 1826. Nov. gen. II. p. 58. t. 155; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. p. 305: nov. g. Amarantacear. *Cf.* Flora 1827. I. p. 110. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 271.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4356: g. Gomphrenear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 343: sect. Iresines.

Rosea Klotzsch 1853. Ber. Berl. Ak. p. 501; 1853. Flora II. p. 718: nov. g. Randiear. (R. geminiflora et crassifolia.)
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 132: g. Gardenicar.

Roseae Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 225: trib. Rosacear. Gen. unicum: Rosa. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 596. Gen. id. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. Gen. id. et Hulthemia. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 564. Gen.: Rosa. — Koch 1836. Syn. p. 221. Ed. II. p. 245. Gen. id. — Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74). — Brongn. 1843. En. genr. p. 125. Gen.: Rosa, Hulthenia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: div. Rosacear. Gen.: Rosa. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 208. Gen.: Rosa, Hultemia.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 301: subordo Rosacear. — Par. Webb 1836. Canar. I. p. 16. Gen.: Rosa. — Endl. 1840. Gen. p. 1240; 1841. Ench. p. 659. Gen.: Rosa, Hulthemia.
Synon. Rosae Juss.; Rosaceae Gray; Rosidae Lindl.

Roseae Rchb. 1828. Consp. p. 167: div. Rosacear. Gen.: Poterium, Sanguisorba, Acaena, Polylepis, Margyricarpus, Alchimilla, Cercocarpus; Brayera, Aremonia, Agrimonia; Rosa. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 609. Subdivis.: Sanguisorbeae, Spirariae, Pomaceae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 243; 1841. Nom. p. 168. Divis.: Agrimonieae, *genuinae* (gen.: Rosa, Hultenia et 1841 Rhodopsis), Pomaceae.

Roseae Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 94: trib. Rosacear. Subtrib.: Spiraeaceae, Dryadeae verae.

Rosellinia**) De Notaris 1844. Cenn. Pirenom. (Bot. Zeit. 1845. p. 484): nov. g. Haplosphaeriar.
De Notar. 1845. Atti di VI. riun. p. 484. Typus: Sphaeria aquila Fr.

Rosenbergia „Örsted Nat. For. Vid. Medd." Karsten 1858. Fl. Columb. I. p. 27. t. 14: g. Cobaeacear.

Rosenia***) Thunb. 1800. Nov. gen. XII. p. 161; 1800. Prodr. II. p. 161. 194; 1818. Fl. cap. p. 692: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2134. n. 1507. — Pers. 1807. Ench. II. p. 457. n. 1867.

*) In memoriam Val. Rose, quondam apud Berolinenses pharmacopoli et chemici eximii.
**) Dicat. Ferd. Pio Rosellini, Pisano.
***) Dicat. equiti Rosén a Rosenstein et equiti Rosenblad.

Rosenia Thunb. cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 564; 1826. Syst. III. p. 579. n. 2799; 1831. Gen. II. p. 632. n. 3148: g. Radiatar.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 560: g. Gnaphaliear. (?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2407.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 245: g. Corymbiferar.
Cass. 1827. Dict v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579: g. Leyserear. (?)
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.?
Less. 1832. Syn. p. 369: g. Leysseriear. — Par. Fenzl 1839. Flora II. p. 730.
DC. 1837. Pr. VI. p. 280: g. Leysserear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2774. p. 452; 1841. Ench. p. 243. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3533. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Rosidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 564: trib. Rosacear. Gen.: Rosa, Lowea.

Rosiflorae Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1828. Consp. p. 161; 1832. Fl. exc. p. 437. 563; 1837. Hdb. p. 217; 1841. Nom. p. 161: formatio Confinium. Fam.: Portulacaceae, Aizoideae, Rosaceae.
Endl. 1840. Gen. p. 1236; 1841. Ench. p. 655: class. (61) Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Pomaceae, Calycantheae, Rosaceae, Amygdaleae, Chrysobalaneae.
Meisn. 1843. Gen. p. 440: class. 15 Diplochlamydear. Ordines: Rosaceae, Calycantheae, Myrtineae.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 42: class. Calyciflorar. Fam.: Pomaceae, Senticosae, Drupaceae, Papilionaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 80: ordo Choristopetalar. Fam.: Amygdaleae, Spiraeaceae, Sanguisorbeae, Rosaceae, Pomaceae.

Rosilla Lessing 1832. Syn. Compos. p. 245: nov. g. Rosillear.
DC. 1836. Pr. V. p. 668: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2605. p. 424; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 306 (133).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3198. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Rosilleae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 246: div. Heleniear. Gen. unicum: Rosilla.

Rosineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXXI. 124: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Pomaceae, Neuradeae, Spireaceae, Rosaceae, Amygdaleae, Chrysobalaneae.

Roslinia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 357. n. 558: nov. g. Chasmatophytor., a Justicia L. sejunctum.
= . . . ?

Roslinia G. Don vid. *Röslinia Mönch.*

Rosmarineae Endl. 1838. Gen. p. 615: subtrib. Monardear. Gen.: Rosmarinus, Monarda, Blephilia, Zizyphora. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1400 et Ench. p. 307) Fladermannia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (192). Gen. ut Endl. 1838. — Walp. 1845. Rep. III. p. 680. Gen. ead.

Rosmarinidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Monardear. Gen. Rosmarinear. Endl.

Rosmarinus*) Tourn. 1700. Inst. p. 195. t. 92: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 228. Ed. Hall. 1745. p. 233: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 6. n. 18; 1737. Cliff. p. 14; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 11; 1753. Sp. I. p. 23; 1759. Syst. ed. X. p. 853. n. 35; 1762. Sp. ed. II. p. 33; 1764. Gen. ed. VI. p. 16. n. 38; 1767. Syst. ed. XII. p. 64: g. Diandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 26. — Murr. 1774. Syst. p. 64; 1784. Syst. p. 68. — Reich. 1778. Gen. p. 18. n. 41. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 22. n. 49. — Lour. 1790. Coch. I. p. 27. — Gmel. 1791. Syst. p. 44. — Pers. 1797. Syst. p. 69; 1805. Ench. I. p. 24. n. 63. — Willd. 1797. Sp. I. p. 126. n. 62; 1809. En. p. 33. — Vahl 1805. Enum. I. p. 220. n. 55. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 59. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 347. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 7. 57.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 156. n. 643: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 372.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 164. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 188. — Juss. 1789. Gen. p. 111. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 329. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 256. — DC. 1805. Franç. III. p. 506. — Hedw. 1806. Gen. p. 16. 350. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 58. 214. n. 95. — Link 1821. En. I. p. 17; 1829. Hdb. I. p. 498. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 69. n. 95; 1830. Gen. I. p. 17. n. 65. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 186 (*Romarin*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 96. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 195.
Hill 1769. Ht. kew. p. 240: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1790. El. I. p. 298. n. 466: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 430: g. Salviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2806; 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4146. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXV: g. Melissear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 316: g. Monardear. — Par. Benth. 1833. Labiat. p. 314; 1848 in DC. Pr. XII. p. 360. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 757. — Koch 1837. Syn. p. 553. Ed. II. p. 636. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 184. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 68. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 113. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 669.
Endl. 1838. Gen. n. 3599. p. 615; 1841. Ench. p. 307: g. Rosmarinear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (192). — Walp. 1845. Rep. III. p. 680. 980.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Rosmarinidar.

*) Nomen ex Plinio.

Rospidios *) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 220: nov. g. Ebenacear. (Diospyros vaccinoides Lindl.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 596.

Rossenia Flor. Flum. I. t. 77: g. Terebinthacear.? (pentaphylla) ex Steud. Nom. II. p. 473.
= Galipea St. Hil.

Rossmässlera Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 113. n. 4390: g. Giliear.
= Fenzlia Benth. (= Giliae sect. Dianthoides.)

Rossmannia **) Klotsch 1855. Begon. p. 219: nov. g. Begoniacear. (Begonia repens Herb. Ruizii.)

Rossolis Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar. (*Cf. Ros Solis Tourn.*)
Mönch 1794. Meth. p. 57: g. Petalostemonis.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 92. 191: sect. Droserae. (D. maritima, rotundifolia, spiralis.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 70.
= Rorella Rupp.

Rostcovia Spreng. vid. *Rostkovia Desv.*

Rostellaria Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 135. t. 207.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 208: g. Sapotacear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.
= Bumelia Swartz?

Rostellaria Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 100: nov. g. Gendarussear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 704. n. 4079. — Spach 1840. Vég. phan. IV. p. 146.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 67: g. Acanthacear.
= Rostellularia Rchb.

Rostellularia Rchb. 1837. Handb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4271: g. Gendarussear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4079. p. 1406; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 368. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 825.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Justiciadar.
Synon. Rostellaria Nees, non Zoolog.

Rosthornia Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 101: g. Juliflorar foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 225; 1846. Chlor. prot. p. LXXXI: g. Salicinar.

Rostkovia ***) Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 324. t. 12. f. 1; 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41 (*Rostkowia*): nov. g. Juncinear. (Juncus magellanicus Lam.)
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 238 (*Rostkowia*): sect. Junci. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1287 *a*. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 271 (*Rostcovia*).
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 299: g. Juncear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192: g. Juncacear.

Rostkowia Juss., Desv. 1828 vid. *praeced.*

Rostraria Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 149. t. 13: nov. g. Triandr. Digyn. (Bromus dactyloides Roth.)
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 993: g. Festucacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 73: sect. Avenae.
Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 65: sect. Triseti. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 863 *b*. p. 96; 1841. Ench. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1212. 2.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163: g. Avenacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Synon. Köleria Link.

Rosularia DC. 1828. Prodr. III. p. 399: sect. Umbilici. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4187 *a*; 1841. Nom. p. 158. n. 6196. 4. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 111. — Endl. 1839. Gen. n. 4620 *d*. p. 811; 1841. Ench. p. 405. — Walp. 1843. Rep. II. p. 258. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 175.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1626: subsect. Umbilici.

Rotaceae Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: ordo 52 plant. Gen.: Gentiana, Exacum, Chironia, Swertia, Lysimachia, Anagallis, Trientalis, Centunculus, Hottonia?, Samolus?
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 20 plant. Gen. §. 1: Trientalis, Centunculus, Anagallis, Lysimachia, Phlox, Exacum, Gentiana, Swertia, Chironia, Sarothra. §. 2: Ascyrum, Hypericum, Cistus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346. Gen. ead. et (in §. 1) Chlora.

Rotaceae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20: div. Primulacear. Gen.: Lysimachia, Trientalis, Anagallis, Centunculus, Glaux, Samolus.

Rotaea Cesati 1850 in Rabenh. Herb. viv. mycol. Cent. XV: nov. g. Erysibear. *Cf.* Bot. Zeit. 1851. p. 180 et Flora 1851. p. 75.

Rotala Linn 1771. Mant. II. p. 143. n. 1289: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 74; 1784. Syst. p. 82. — Reich. 1778. Gen. p. 25. n. 56. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 32. n. 69. — Gmel. 1791. Syst. p. 105. — Pers. 1797. Syst. p. 83; 1805. Ench. I. p. 40. n. 88. — Willd. 1797. Sp. I. p. 189. n. 85. — Vahl 1806. Enum. II. p. 26. n. 79.
Scop. 1777. Intr. p. 334: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 303: g. Caryophylleis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 120. — Hedw. 1806. Gen. p. 32. 360.
Neck. 1790. El. II. p. 181. n. 892: g. Aclithrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 349: g. Caryophyllcor.
Batsch 1802. Tab. p. 34: g. Caryophyllear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 301.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 42; 1815. Mém. Mus. II. p. 381: g. Salicariear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 345. 521. n. 149. — DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 83; 1828. Pr. III. p. 75. — Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4552; 1841. Nom. p. 172. n. 6637. — Bartl.

*) Anagramma vocis Diospyros.
**) Dicat. Dr. Jul. Rossmann, Giessensi.
***) Dicat. Fr. W. Gottl. Rostkovio, Stettin.

Rotala Linn. cont.
1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 707. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. — Meisn. 1838. Gen. p. 117 (83).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 711; 1825. Syst. I. p. 180. n. 200; 1830. Gen. I. p. 46. n. 211: g. Salicariar.
Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 454: g. Lythrariar.
Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 567: g. Lythrariear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 303: g. Lythrear. — Par. Wight 1839. Ic. pl. Ind. t. 217. Char. emend. in explic. tabul. fasc. 12. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 614.
Endl. 1840. Gen. n. 6143. p. 1199; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 101.
Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 136: g. Lythrariacear.
Synon. Ortegioides Sol.? Eutelia R. Brown.

Rotala Lindl. vid. *Rotula Lour.*

Rotang Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 209. n. 468: g. Triandr.
Adans. 1763. Fam. II. p. 24: g. Palmar.
= Calamus Linn.

Rotbollia Nutt. vid. *Rottböllia Linn. f.*

Rothenbergia Cotta 1843. N. Jahrb. f. Min. p. 411.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 259; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIX: g. incertae sedis.

Rotheria *) Meyen 1834. Reise I. p. 402: nov. g. Rondeletiear. (R. lanceolata.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114).
= Cruckshanksia Hook. & Arn.

Rothia **) Schreb. 1791. Gen. II. p. 531. n. 1241: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1611. n. 1416; 1809. En. p. 830. — Link 1822. En. II. p. 292.
Gis. 1792. Prael. p. 538: g. Semiflosculosor.
Batsch 1802. Tab. p. 250: g. Semiflosculosar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 348: sect. Andryalae. — Par. Schultz Bip..... in Webb Canar. II. p. 412.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 579; 1826. Syst. III. p. 633. n. 2875; 1831. Gen. II. p. 644. n. 3233: g. Cichorear.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 64; 1827. v. 46. p. 311; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Less. 1832. Syn. p. 141. — Endl. 1838. Gen. n. 3023. p. 501; 1841. Ench. p. 251. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2160 c: g. Andryalear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 306: g. Hieracear.
Link 1829. Hdb. I. p. 795: g. Cichoracear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.
Synon. Voigtia Roth.

*) Dicat. praesidi Rother.
**) Dicat. Alex. Guil. Roth, botanico.

Rothia Lamarck 1792. Journ. hist. nat. I. p. 16. t. 1. (Illustr. t. 667.)
= Hymenopappus L'Herit.

Rothia Pers. 1807. Ench. II. p. 301. n. 1709: g. Diadelph. Decandr.
DC. 1825. Pr. II. p. 382: g. Phaseolear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 342. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 195: g. Trifoliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61). *Cf.* p. 82 (59) inter Genisteas.
Endl. 1840. Gen. p. 1263. n. 6475: g. Genistear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 606. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 459.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Lotononidear.
= Westonia Spreng.

Rothmannia *) Thunb. 1776. Vetensk. Ac. Handl. p. 65: nov. g. plant.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2081: g. Cinchonear.?
Endl. 1838. Gen. n. 3305 *d.* p. 562; 1841. Ench. p. 275: sect. Gardeniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2962. 4.
Benth. 1849. Niger Fl. p. 382: g. Rubiacear.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 794: sect. Randiae.

Rothmannia Salisb..... Parad. t. 65.
= Euclinia DC.

Rotiflorae Rchb. 1828. Consp. p. 127; 1831. Fl. exc. p. 187. 393: ordo Synpetalar. Formationes: Crateriflorae, Stelliflorae.

Rotmania Necker 1790. Elem. bot. II. p. 450. n. 1284: g. Chorisophytor.
= Eperua Aubl.

Rottbölia Scopoli 1777. Introd. p. 233. n. 1060: g. Nomadear.
Neck. 1790. El. II. p. 362. n. 1163: g. Osariphytor.
= Ximenia Plum.

Rottbölia Dumort. vid. *Rottböllia Linn. f.*

Rottbölla Murr. 1784. Syst. p. 124. n. 1360: g. Triandr. Digyn. — Par. Swartz 1791. Obs. bot. p. 42. — Pers. 1797. Syst. p. 129; 1805. Ench. I. p. 106. n. 192. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 45. n. 353.
Trin. 1820. Fund. p. 183: g. Graminum. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 65. n. 318.
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 820: g. Ophiurear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Endl. 1837. Gen. n. 926. p. 105; 1841. Ench. p. 60: g. Rottbölliacear. Sect.: Hemipus, Stegosia, Coelorhachis.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1365: g. Rottbölliear. Sect. eaed. (Rottbölla loco Hemipodis.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Rottböllear.
= Rottböllia Linn. f.

Rottbölla Swartz 1810. Berl. Mag. IV. p. 88. t. 5.
Palis. 1812. Agrost. p. 108: g. Graminear.

*) Dicat. G. Rothmann, peregrinatori.

Rottbölla Swartz cont.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Hordeacear. (An Paniceis affinior?)
= Stenotaphrum Trin.

Rottbölleae Rchb. 1830. Fl. exc. p. 15: div. Graminear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: trib. Graminacear. Gen. Rottbölliacearum Kunth et Xerochloa.

Rottböllia *) Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790 (Amoen. ac. X.) p. 22: nov. g. Graminum (rachideorum). — Par. Gis. 1792. Prael. p. 136. — Host 1801. Gram. I. p. 18. t. 23. 24.
Linn. f. 1781. Suppl. p. 13. n. 1360: g. Triandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 196. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 23; 1818. Fl. cap. I. p. 439. — Willd. 1797. Sp. I. p. 463. n. 148; 1809. En. p. 129. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 17. 30. 42. t. 132. 156. 157. 181. 182; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 353; ed. 1832. I. p. 353. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 410. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 83 (*Rotbollia*).
Schreb. 1791. Gen. II. p. 721. n. 1573: g. Polygam. Monoec.
Mönch 1794. Meth. p. 53: g. Thalamostemonis.
Batsch 1802. Tab. p. 156: g. Graminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 47 (*Rottbölla*). 364. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 206. Ed. Nees p. 62. (emend.) — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 783. n. 353. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 299. n. 313. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 317. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 62.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 175: g. Hordeacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 151.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 94 (*Rottbölia*): g. Ophiurear.
Kunth 1830. Gram. p. 154; 1833. Agrost. p. 466: g. Rottbölliacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 396. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Steud. 1854. Glum. I. p. 360. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 406.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 249: g. Andropogineor.
Synon. Rottbölla Murr.; Rottbollia Juss.; Rottbolla Desf.

Rottbölliaceae Kunth 1830. Gram. p. 150; 1833. Agrost. p. 460: trib. (12) Graminear. Gen.: Nardus, Psilurus, Lepturus, Oropetium, Ophiurus, Hemarthria, Mnesithea, Rottböllia, Ratzeburgia, Tripsacum, Manisuris. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 104. Gen. ead. et Xerochloa, Prionachne. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1354 et Ench. p. 60) Vossia. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 472. Gen. novum: Euchlaena. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (326). Gen. ut Endl. et Rhytachne? — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. Gen. fere ead. — Steud. 1854. Glum. I. p. 356. Gen.: Psilurus, Nemostachys, Lepturus, Lepturopsis, Rhytachne, Oropetium, Kerinozoma, Didactylon, Hemarthria, Mandelorna, Vossia, Ophiurus, Jardinea, Chondrolaena, Diastemanthe, Rottböllia, Chauvinia, Tripsacum, Manisuris.
Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. ...: subtrib. Saccharinar: Gen.: Rottböllia, Ophiurus.
Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 48: trib. 14 Graminear. Gen. europ.: Nardus, Psilurus, Lepturus.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 359: subtrib. Poacear. Gen.: Oropetium, Lepturus, Kerinozoma, Ophiurus, Hemarthria, Rottböllia, Ratzeburgia, Manisuris.

Rottböllieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 38: sect. Triticear. Gen.: Nardus, Psilurus, Lepturus, Oropetium, Ophiurus, Hemarthria, Vossia, Mnesithea, Rottbölla, Ratzeburgia, Xerochloa, Tripsacum, Prionachne, Manisuris.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 140. 173. 195: trib. Graminear.

Rottbolla Desfont. 1798. Fl. Atlant. I. p....: g. Triandr. Digyn. (Schrad. Journ. 1799. I. p. 345.)
DC. 1805. Franç. III. p. 78; 1815. V. p. 280: g. Graminear.
= Rottböllia Linn. f.

Rottbollia Juss. 1789. Gen. p. 31: g. Graminear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 103. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 80.
Cavan. 1791. Icon. I. p. 27. t. 39: g. Triandr. Digyn. — Par. Delile 1824. Descr. de l'Egypte XIX. p. 177.
= Rottböllia Linn. f.

Rottlera *) Willd. 1797 in Götting. Journ. Wiss. I. 1: nov. g. Euphorbiar. (R. indica.) *Cf.* Römer Arch. I. 3. p. 134.
Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 36. t. 168: g. Dioec. Polyandr. (R. tinctoria.)
Willd. 1805. Sp. IV. p. 832. n. 1829: g. Dioec. Icosandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 628. n. 2269. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 826.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 367: g. Euphorbiear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 194: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 32. t. 9. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 319.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 606: g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5819. p. 1116; 1841. Ench. p. 588. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 877. n. 3136; 1831. Gen. II. p. 697. n. 3520: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5050; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 194. n. 7369: g. Ricinear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (252): g. Rottlerear.
Hassk. 1842. Flora II. Beibl. p. 40 Mappam Juss. et Adiscam Bl. injungit.
Zolling. 1856. Linnaea XXVIII. p. 310: g.

---

*) Dicat. Chr. Fr. Rottböll, prof. botan. Hafn.

*) Dicat. Rottler, missionario danico.

Rottlera Willd. cont.
Acalyphear. Sect.: Pseudo-Rottlera?, Stylanthus, Eurottlera.
Baill. 1858. Euphorb. p. 421: g. Crotonidear. Sect. ut Zoll. et Plagianthera, Trelotra.
Synon. Mallotus Lour.; Adisca Blume.
Rottlera Röm. & Schult. vid. *Röttlera Vahl.*
Rottlera*) Brid. 1826. Bryol. I. p. 105: nov. g. Acrocarpor. gymnostomor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 320 (*Rottleria*).
= Hyophila Brid.
Rottlereae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 339 (252): subtrib. Crotonear. Gen.: Ricinus, Spathiostemon, Homonoia?, Mabea, Elateriospermum, Siphonia, Amperea, Hendecandra, Hemicyclia, Cheilosa, Hisingera, Baliospermum, Haematospermum, Rottlera, Acidoton, Adelia, Adriania, Gelonium, Suregada?
Rottleria Leman vid. *Rottlera Brid.*
Rotula**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 121. Ed. Willd. p. 149: nov. g. Pentandr. Monogyn. (R. aquatica.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LII. 545. n. 817. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 670. n. 734; 1830. Gen. I. p. 136. n. 677. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 631.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 322: g. Borraginear.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2975: g. Hydrophyllear.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): g. Tournefortiear. ?
Endl. 1841. Gen. n. 6875. p. 1331; 1841. Ench. p. 685: inter genera gamopetala minus nota.
DC. 1845. Pr. IX. p. 531: g. Ehretiear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653 (*Rotala*): g. Tournefortear.
Rotula DC. 1805. Fl. franç. II. p. 158: sect. Agarici. — Par. Leman 1820. Dict. v. 17. p. 206.
Fries 1838. Epicr. p. 384. 602: subg. Marasmii.
Rotularia Sternb. 1821. Vers. I. p. 33: g. plantar. primordialium.
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXII: g. Najadear. foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 344.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 111: g. Najadum foss.
Presl 1838. Verh. Ges. vat. Mus. Böhm. p. 26.
= Sphenophyllum Brongn.
Roubiaeva Brongn. vid. *seq.*
Roubieua Carey vid. *seq.*
Roubieva***) Moquin-Tand. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 292: nov. g. Chenopodear. (Chenopodium multifidum L.) — Par. Carey 1849 in Sillim. Amer. journ. VII. p. 167 (*Roubieua*). *Cf.* Bot. Zeit. 1850. p. 528.
Endl. 1837. Gen. n. 1923. p. 295; 1841. Ench. p. 181; 1842. Spl. II. p. 32: g. Blitear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6377. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 80.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 42: g. Anserinear.

*) Dicat. Rever. Rottler.
**) Nomen a corollae forma.
***) Dicat. J. Roubieu, prof. bot. Monspeliensi.

Roubieva Moquin-Tand. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 101 (*Roubiaeva*): g. Cyclolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 23: g. Chenopodiear.
Synon. Ambrina Spach.
Roucela*) Dumort. 1822. Comm. bot. p. 14: nov. g. a Campanula distinctum. (C. Erinus L.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Campanulear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 296 (*Roncela*): g. Lobeliacear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 536 (*Roncela*): g. Campanulacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4023. 1: sect. Campanulae.
= Eucodon A. DC.
Roucheria Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 141. 594. t. 2; 1848. ibid. VII. p. 526: nov. g. Hugoniear. (R. calophylla.) *Cf.* Planch. Ann. sc. nat. 1854. II. p. 262. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 97.
Synon. Sarcotheca Blume.
Rouhamon**) Aublet 1775. Guian. I. p. 93. t. 36: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (R. guianensis), a Blume dubie cum Strychno L. junctum.
Hedw. 1806. Gen. p. 56. 369: g. Apocineis aff.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 332: g. Apocinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3568: g. Cerberear.
Bartl. 1830. Ord. p. 205: g. Carissear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 484: g. Strychnear. — Phr. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.
DC. 1845. Pr. IX. p. 17: g. Eustrychnear.
Synon. Chemnicia Scop.; Lasiostoma Schreb.; Curare Humb.
Roulinia***) Brongn. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 320: nov. g. Liliacear. (Cordyline parviflora Kunth.)
Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299): g. Tillandsiear.
= Dasylirion Zucc.?
Roulinia †) Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 516: nov. g. Haplostemmar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.
Roumea Poit. emend. DC. 1824. Prodr. I. p. 256: g. Flacourtiear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 632. n. 2014; 1830. Gen. I. p. 454. n. 2240. — Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4880; 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7134. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 292. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 133.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: g. Flacourtianear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 279. — Endl. 1839. Gen. n. 5080. p. 921; 1841. Ench. p. 479.

*) Dicat. dom. Roucel, Alost.
**) Nomen caribaeum *Rouhahamon.*
***) Dicat. Roulin, Columbiae perscrutatori.
†) Dicat. Dr. Roulin.

Roumea Poit. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Flacourtear.
Synon. Rumea Poit.; Kölera Willd.; Bessera Spreng.; Limacia Dietr.

Roumea Wall. mss.
= Daphne Linn. (Meisn. in DC. Pr. XIV. p. 530.)

Roupala *) Aublet 1775. Guian. I. p. 83. t. 32: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (R. montana.)
Juss. 1789. Gen. p. 79: g. Protear.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 212. t. 217.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 186: g. Proteacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 72. n. 343. — Bartl. 1830. Ord. p. 117.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear.
Synon. Leinkeria Scop.; Leinckeria Neck.; Rhopala Schreb.; Ropala Gmel.; Rupala Vahl.

Roupallia Hassk. vid. *seq.*

Roupellia Wall. & Hook. 1849. Niger Fl. p. 449 (Bot. Mag. t. 4466): nov. g. Tabernaemontanear. (R. grata.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 36.
Hassk. 1857. Flora I. p. 103 (*Roupallia*): g. Apocynear.

Rourea Aublet 1775. Guian. I. p. 467. t. 187: nov. g. Decandr. Pentagyn. (R. frutescens), a DC., Endl. aliisque ad Connarum relatum.
Scop. 1777. Intr. p. 234: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 369: g. Terebintacear.— Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 150 (*Rurea*). — Hedw. 1806. Gen. p. 337. n. 1327.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 431 (Verm. bot. Schr. I. p. 201): g. Connaracear. — Par. Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 360 (Gen. Tereb. p. 28); 1825. Syn. IV. p. 167. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 41. — Rchb. 1823. Consp. p. 146. n. 3827. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 143. — Benth. 1849 in Hook. Niger Fl. p. 288. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 17. p. 261.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 384. n. 1933: g. Terebinthear?
Rchb. 1837. Hdb. p. 224: g. Connarear. — Par. Planch. 1850. Linnaea XXIII. p. 413. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 295.
Synon. Santaloides Linn.; Robergia Schreb.; Malbrancia Neck.

Roureopsis Planchon 1850. Linnaea XXIII. p. 423: nov. g. Connarear. (Connarus javanicus Bl.?) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 299.

Roussaea DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 522: g. Roussaeacear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (166).
= Roussea Smith.

Roussaeaceae DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 521: ordo (108) Calyciflorar. Gen. unicum: Roussaea.
Meisn. 1839. Gen. p. 258 (166): ordo Contortar. Gen. id.

*) Etymologia nominis desideratur. Num a ῥόπαλον, clava, unde emendatio Schreberiana?

Roussea *) Smith 1789. Ic. ined. I. 6. t. 16. (Lam. t. 75.) *Cf.* A. DC. 1830. Mon. Campan. p. 94.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 792. n. 1727: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 237 (*Russea*). — Willd. 1797. Sp. I. p. 607. n. 190. — Pers. 1805. Ench. I. p. 130. n. 247. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 3. 92. n. 418 (*Roussoa*); 1827. Mant. III. p. 50. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 419. n. 429. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 345.
Poir. 1804. Dict. bot. VI. p. 318.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 166. t. 212.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 367: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 55. 367.
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3633: g. Mimusopear.?
Spreng. 1830. Gen. I. p. 86. n. 426: g. Solanear.? — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 444.
Bojer 1837. Hort. Maurit. p. 246 (*Rousseauvia*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: g. Brexiear.?
Endl. 1839. Gen. p. 823. n. 4680; 1841. Ench. p. 411. n. 4679: g. Rousseacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6257.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 573: g. Brexiacear.
Synon. Roussaea DC.

Rousseaceae Endl. 1839. Gen. p. 823; 1841. Ench. p. 411: fam. Corniculatar., Escallonieis aff. Gen. unicum: Roussea.
Rchb. 1841. Nom. p. 161: subdiv. Escallonear. Gen. id.

Rousseauvia Bojer vid. *Roussea Smith.*

Rousseauxia **) DC. 1828. Prodr. III. p. 152: nov. g. Miconiear. (Melastoma chrysophylla Desr.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 766. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (81). — Endl. 1840. Gen. n. 6226. p. 1215; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6734. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4619: g. Blakeacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 49: g. Lasiandralium dubium.

Rousselia ***) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 503: nov. g. Parietariear. (Urtica lappulacea Sw.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2502. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 208 (Flora 1855. p. 525); 1857. ibid. VII. p. 392.
Endl. 1837. Gen. n. 1885 *f.* p. 285; 1841. Ench. p. 170: sect. Parietariae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear.

Roussoa Röm. & Schult. vid. *Roussea Smith.*

Roxbourghia Endl. vid. *Roxburghia Jones.*

Roxbourghiaceae Endl. vid. *Roxburghiaceae Wall.*

Roxbourghieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 48: sect. Convallariear. Gen.: Roxburghia.

Roxburghia †) „Jones mss.“ Roxb. 1795. Pl. Corom. I. p. 29. t. 32; 1832. Fl. ind. II. p. 234: nov. g. Octandr. Monogyn. (R.

*) Dicat. Jean. Jacques Rousseau.
**) Dicat. Desrousseaux.
***) Dicat. H. F. A. de Roussel, prof. Caen.
†) Dicat. Will. Roxburgh, botanico Madras.

Roxburghia Jones cont.
gloriosoides.) — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 321. n. 738. — Pers. 1805. Ench. I. p. 412. n. 927. — Hedw. 1806. Gen. p. 265. n. 1067.
Smith 1804. Exot. Bot. I. p. 111. t. 57: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 896: g. Carissear.
Link 1821. En. II. p. 380: g. Salicariar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 214. n. 1433: g. Smilacinar.?
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 786: g. Taccear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 310. n. 1586: g. Sarmentacear.? — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1277.
Lindl. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 49. t. 282; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 360; 1847. Veg. kd. p. 220: g. Roxburghiacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1197. p. 157 (*Roxbourghia*); 1841. Ench. p. 90. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (305). — Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 42; 1850. Enum. V. p. 286. — Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 27. t. 2061. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 566.
Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1742: g. Roxbourghiear.
Griff. 1843. Calc. journ. IV. Nr. 13. Char. emend. *Cf.* Flora 1844. II. p. 436.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 231: g. Parideis aff.
Synon. Ubium Rumph.; Stemona Lour.; Roxburgia Schrank.

Roxburghia König (teste Endl. Gen. p. 1042). = Olax Linn.

Roxburghiaceae Lindl. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 50.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo Smilalium.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 360) 1847. Veg. kd. p. 219: ordo Dictyogenar. Gen.: Roxburghia.
Endl. 1837. Gen. p. 157; 1841. Ench. p. 90: fam. Smilaceis aff. Gen.: Roxbourghia.
Meisn. 1842. Gen. p. 402 (305): subordo Liliacear. Gen.: Philesia, Lapageria, Roxburghia.
Kunth 1850. Enum. V. p. 286: fam. Monocotyledonum. Gen.: Roxburghia.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 646: ordo Coronariar.

Roxburgia Schrank 1825. Flora I. p. 81: g. Tetrandr. Monogyn. Char. emend.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 377: g. Octandr. Monogyn.
Blume 1830. En. pl. Jav. p. 8: g. Colchicacear.
= Roxburghia Jones.

Roydsia*) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 86. t. 289; 1832. Fl. Ind. II. p. 643: nov. g. Polyandr. Monogyn. (R. suaveolens.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 484. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 607. n. 1958; 1830. Gen. I. p. 443. n. 2191.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1786 b: g. Aquilarinar.

*) Dicat. Sir John Royds.

Roydsia Roxb. cont.
Meisn. 1837. Gen. p. 101 (72): g. Chrysobalanear.?
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296: g. Capparear. (?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7129. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. (?)
Endl. 1839. Gen. n. 5009. p. 895; 1841. Ench. p. 456: g. Capparideis aff.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 270: g. Capparidear.

Royena*) Linn. 1737. Gen. p. 114. n. 325; 1737. Hort. Cliff. p. 149: g. Octandr. Digyn.
Linn. 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 193. n. 436; 1753. Sp. I. p. 397; 1759. Syst. ed. X. p. 1025. n. 491; 1762. Sp. ed. II. p. 568; 1764. Gen. ed. VI. p. 221. n. 555; 1767. Syst. ed. XII. p. 302. n. 550: g. Decandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 341; 1784. Syst. p. 410. — Reich. 1778. Gen. p. 226. n. 603. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 299. n. 759. — Gmel. 1791. Syst. p. 702. — Pers. 1797. Syst. p. 438; 1805. Ench. I. p. 486. n. 1106. — Willd. 1799. Sp. II. p. 613. n. 882; 1809. En. p. 456.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p 228. n. 943: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 145: g. Vaccinior.
Scop 1777. Intr. p. 185: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 156: g. Guajacanar.* — Par. Link 1821. En. I. p. 410.
Neck. 1790. El. I. p. 221. n. 366: g. Dicroophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 445: g. Ebenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 347. — Hedw. 1806. Gen. p. 327. n. 1288. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 378. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27. — Bartl. 1830. Ord. p. 161. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 42. — Endl. 1839. Gen. n. 4251. p. 743; 1841. Ench. p. 363. — Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 413. — Brongn. 1843. En. genr. p. 72. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 210. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 596. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 457.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
Desfont. 1805. Ann. Mus. VI. p. 445. Char. reform.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 506; 1825. Syst. II. p. 360. n. 1686; 1830. Gen. I. p. 373. n. 1881 (*Royenia*): g. Styracear. — Par. Dietr. 1840. Syn. p. 1382. 1524.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3652: g. Mimusopear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214; 1841. Nom. p. 136. n. 5292: g. Diospyrear.
Synon. Staphylodendron Herm.; Diospyri sp. Desfont.

*) Dicat. Adriano v. Royen, prof. bot. in Academia Lugduno-Batava.

Royena Houst. mss.
= Hoitzia Juss.

Royenia Spreng., Dietr. vid. *Royena Linn.*

Roylea*) Wallich 1830. Pl. As. rar. I. p. 57. t. 74: nov. g. Nepetear. (Ballota cinerea Don?) *Cf.* Isis 1831. p. 382.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 803. n. 4157: g. Labiatar.
Benth. 1834. Labiat. p. 601: g. Stachydear. Par. G. Don 1837. Gen. syst. I. p. 845. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 456.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Marrubiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3660. p. 628; 1841. Ench. p. 308: g. Ballotear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 288 (196). — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4101. — Walp. 1845. Rep. III. p. 867. 989.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 516: g. Lamiear.

Roylea Nees Herb. ex Trin. mss. in Steud. Nomencl. II. p. 379. 475. (R. Pennisetum.)
= Pommereulla Linn. f.

Royoc Spach vid. *Roioc Pl., DC.*

Rubachia**) Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 11; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 28: nov. g. Myrcioidear. (Eugenia spiciflora Nees & Mart.)

Rubeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: trib. Rosacear. Gen.: Rubus, Dalibarda.
Rchb. 1837. Handb. p. 243; 1841. Nomencl. p. 168: subdiv. Potentillear. Gen.: Cylactis, Rubus. (1841: Dalibarda, Rubus.)

Rubella Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 41: g. Pyror. (*Russelet.*)

Rubentia***) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 378: nov. g. Rhamnor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 70.
Gmel. 1791. Syst. p. 408: g. Pentandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 267: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 168. n. 705.
= Elaeodendron Jacq.

Rubentia Bojer ex Steud. Nomencl. II. p. 475. 690. (R. angustifolia.)
= Toddalia Juss.

Rubeola Tourn. 1700. Inst. p. 130. t. 50: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 7. Ed. Hall. 1745. p. 7: g. pl. class. I.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 208.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 457: g. Stellatar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 144: g. Aparinium.
Mönch 1794. Meth. p. 525: g. Petalostemonis.
Tausch 1835. Flora I. p. 338: sect. Galii.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 167: sect. Asperulae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 23. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 463.
= Crucianella Linn.

Rubia Tourn. 1700. Inst. p. 113. t. 38: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 41. Ed. Hall. 1745. p. 43.
Linn. 1737. Gen. p. 24. n. 63; 1737. Cliff. p. 35; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 28; 1753. Sp. I. p. 109; 1759. Syst. ed. X. p. 893. n. 119; 1762. Sp. ed. II. p. 158; 1764. Gen. ed. VI. p. 52. n. 127; 1767. Syst. ed. XII. p. 119: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 106. — Murr. 1774. Syst. p. 128; 1784. Syst. p. 152. — Reich. 1778. Gen. p. 54. n. 134. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 69. n. 164. — Gmel. 1791. Syst. p. 242. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 30; 1818. Fl. cap. I. p. 550. — Pers. 1797. Syst. p. 157; 1805. Ench. I. p. 129. n. 244. — Willd. 1797. Sp. I. p. 603. n. 187; 1809. En. p. 155. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 93. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 797. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 383; ed. 1832. I. p. 374. — Schult. 1827. Mant. III. p. 12.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 462: g. Stellatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 520. — Batsch 1802. Tab. p. 231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 597. — D. Don 1825. Nepal. p. 133. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 375. 448. — Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1990; 1831. Fl. exc. p. 210; 1841. Nom. p. 74. n. 2748. Sect.: Relbunium, Rubia. — DC. 1830. Pr. IV. p. 588. — Bartl. 1830. Ord. p. 209. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 642. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 442. — Koch 1836. Syn. p. 328. Ed. II. p. 360. — Endl. 1838. Gen. n. 3101. p. 523; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 470. — Walp. 1843. Rep. II. p. 460; 1847. VI. p. 18. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 405. — Webb .... Canar. II. p. 186. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 337.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 197; 1820. Mém. Mus. VI. p. 370. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 567. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 431. — DC. 1805. Franç. IV. p. 267. — Hedw. 1806. Gen. p. 64. 373. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 209. n. 480. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 139 (*Garance*). — Link 1821. En. I. p. 138; 1829. Hdb. I. p. 655. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 485. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 396. n. 389; 1830. Gen. I. p. 92. n. 456. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 944. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 460. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 155. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 13.
Gled. 1764. Syst. p. 163. n. 665: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 501.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 166: g. Fructiflorar.

*) Dicat. John Forbes Royle.
**) Dicat. pharmacopolae Rubach.
***) Nomen a vernaculo Mauritianorum nomine: *Bois [illegible]*

Rubia Tourn. cont.
Hill 1769. Ht. kew. p. 117: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 138: g. Aparinium.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 270; 1789. Phil. Bot. I. p. 118.
Neck. 1790. El. I. p. 198. n. 330: g. Phyllastrophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 54: in Pentandr. Monogyn.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 338: g. Galear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 12.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Coffeariae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Galiear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 132: g. Asperulear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 48.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 771: g. Galiacear.
B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 25 (*Garance*): g. Coffeacear.
Synon. Aparines Adans. pars.

Rubiacea Rafin. 1820. Mém. gén. sc. phys. VI. p. 83: subordo Sphanidiae. Fam.: Larnospermia, Aparinia, Cephalantia.

Rubiaceae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo plant. Gen.: Sherardia, Asperula, Galium, Crucianella, Valantia, Rubia, Phyllis, Spermacoce, Diodia, Hedyotis, Oldenlandia, Anthospermum, Mitchella, Paederia, Cephalanthus, Lippia, Ixora, Knoxia, Pavetta, Coffea, Chiococca, Morinda, Genipa, Randia, Cinchona, Catesbaea, Petesia, Psychotria, Portlandia, Hamelia, Richardia.
Juss. 1789. Gen. p. 196: ordo 2 class. XI. Gen. §. 1: Sherardia, Asperula, Gallium, Crucianella, Valantia, Rubia, Anthospermum. §. 2: Houstonia, Knoxia, Spermacoce, Diodia, Galopina, Richardia, Phyllis. §. 3: Hedyotis, Oldenlandia, Carphalea, Coccocipsilum, Gomozia, Nacibea, Tontanea, Petesia, Fernelia, Catesbaea. §. 4: Randia, Bellonia, Virecta, Macrocnemum, Bertiera, Dentella, Mussaenda, Cinchona, Tocoyena, Posoqueria, Rondeletia, Genipa, Gardenia, Portlandia. §. 5: Coutarea, Hillia, Duroia. §. 6: Chomelia, Pavetta, Ixora, Coussarea, Malanea, Antirhea. §. 7: Chimarrhis, Chiococca, Psychotria, Coffea, Canthium, Ronabea, Paederia, Coprosma, Simira. §. 8: Nonatelia, Laugeria, Erithalis, Psathura, Myonima, Pyrostria, Vangueria, Mathiola, Guettarda. §. 9: Hamelia, Patima, Sabicea. §. 10: Mitchella, Canephora, Patabea, Evea, Tapogomea, Morinda, Nauclea, Cephalanthus. §. 11: Serissa, Pagamea, Faramea, Hydrophylax. *Cf.* Juss. 1807. Ann. Mus. X. p. 313; 1820. Mém. Mus. VI. p. 365 (Flora 1821. II. p. 667 et Schult. Mant. III. p. 12); 1827. Dict. v. 46. p. 385; nec non R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 563. (Verm. bot. Schr. I. p. 72.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 563. Gen. fere ead. in sectionibus iisdem.
Batsch 1802. Tab. p. 232: fam. Rigidar. Gen.: Houstonia, Knoxia, Spermacoce, Diodia, Galopina, Richardia, Phyllis.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 428. t. 63. 64. Gen. ut Juss. et in §. 2: Hydrophylax, Siderodendrum, §. 3: Hoffmannia, Scolosanthus, §. 4: Stevensia, Danais, §. 6: Frölichia, §. 8: Isertia.
DC. 1805. Franç. IV. p. 242: fam. (60) Dicotyledonum. Gen.: Sherardia, Asperula, Crucianella, Galium, Vaillantia, Rubia. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 887.
DC. 1807. Ann. Mus. IX. p. 216; 1816. Propr. méd. ed. II. p. 168. Trib.: Stellatae, Coffeaceae, Cinchonaceae, Guettardaceae.
Cassel 1810. Nat. Fam. p. 163.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 596: fam. 59 plant. Ord.: Stellatae, Spermacoceae, Coffeaceae, Cinchoneae, Guettardeae, Mitchelleae.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 335: ordo pl. Sect.: Galeae, Spermacoceae, Coffeaceae, Cephalantheae, Hedyotideae, Gardeniaceae, Hameliaceae, Guettardeae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246; 1830. Pr. IV. p. 341: ordo (98) Calyciflorar. Trib. (1830): Cinchonaceae, Gardeniaceae, Hedyotideae, Isertieae, Hamelieae, Cordiereae, Guettardaceae, Paederieae, Coffeaceae, Spermacoceae, Anthospermeae, Stellatae, Operculariеae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 453. Trib. eaed.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 480: fam. Calyciflorar. Gen.: Sherardia, Asperula, Galium, Rubia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Fructitubiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar. (Div.: Opercularieae.)
D. Don 1825. Nepal. p. 133. Fam.: Stellatae, Stipulariae, Cinchoneae.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 133. Char. emend.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI: fam. Aggregatar. Divis.: Stellatae, Spermacoceae, Coffeaceae, Cinchoneae, Guettardeae, Cephaëlideae, Schradereae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 93; 1831. Fl. exc. p. 204. Divis.: Stellatae, Coffeaceae, Cinchoneae, Guettardeae, Hameliaceae, Cephaëlideae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 179; 1841. Nom. p. 74. Divis.: Stellatae, Anthospermeae, Coffeariae.
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 220. 309; 1829. ibid. IV. p. 1. 130. Sect.: Stellatae, Anthospermeae, Spermacoceae, Psychotriaceae, Cephaëlideae, Coccocypseleae, Cephalantheae, Hedyotideae, Manettieae, Cinchoneae, Guettardeae, Hameliaceae, Gardeniaceae.
Link 1829. Hdb. I. p. 643: ordo Epanthar. (Subordo: Stellatae.) Gen.: Sherardia, Asperula, Galium, Valantia, Crucianella, Rubia, Phyllis, Spermacoce, Richardsonia, Chiococca, Psychotria, Coffea, Cephaëlis, Cephalanthus, Bouvardia, Cinchona, Exostemma, Gardenia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. 32: fam. Rubiariear. Trib.: Cinchoneae, Guettardeae, Vanguerieae, Psathureae, Psychotrieae, Machaonieae, Pavetteae, Spermacocceae, Galieae.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 81. Trib.: Asperuleae, Anthospermeae, O-

Rubiaceae Juss. cont.
percularIae, Spermacoceae, Coffeaceae, Guettardaceae, Cordiereae, Hameliaceae, Isertiae, Gardeniae, Cinchoneae.

Bartl. 1830. Ord. p. 208: ordo (125) Rubiacinar. Divis.: Stellatae, Anthospermeae, Spermacoceae, Hedyotideae, Cinchoneae, Gardenieae, Guettardeae, Psychotrieae, Cephalantheae, Operculariéae. Sejunguntur Lygodysodeaceae.

Meisn. 1838. Gen. p. 156 (112): ordo Rubioidear. Trib.: Cinchonaceae, Hedyotideae, Gardeniaceae, Isertieae, Hamelieae, Cordiereae, Guettardaceae, Paederieae, Coffeaceae, Spermacoceae, Anthospermeae, Stellatae, Operculariéae.

Endl. 1838. Gen. p. 520; 1841. Ench. p. 269: ordo (127) Caprifolior. Subord.: Coffeaceae, Cinchonaceae.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 369: fam. (125) Rubiacinear. Sect.: Cinchoneae, Gardenieae, Hedyotideae, Isertieae, Hamelieae, Cordiereae, Guettardaceae, Paederieae, Coffeaceae, Spermacoceae, Anthospermeae, Stellatae, Opercularieae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 48: fam. Coffeinear. Tribus fere Candolleanae.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 251: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Divis., tribus et genera ut Endl.

Conf. Aparines Adans.; Stellatae et Contortar. gen. Linn.; Galiaceae Lindl.

Rubiacinae Bartl. 1830. Ord. p. 206: class. (37) Gymnoblastor. Ord.: Lygodysodeaceae, Rubiaceae, Caprifoliaceae, Viburneae.

Meisn. 1843. Gen. p. 441: class. 21 Diplochlamydear. Ordines ut Bartl., exceptis Viburneis. *Cf. Rubioideae Meisn.*

Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 136: ordo Gamopetalar. Fam.: Viburneae, Caprifoliaceae, Stellatae, Cinchonaceae.

Rubiacineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 301: class. (XXV.) Dicotyledoneor. monopetalor. Fam. Rubiacinar. Bartl.

Rubiarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: ordo Gynocoronar. Fam.: Operculariaceae, Gardeniaceae, Rubiaceae.

Rubiatae Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 470: ordo plant. Gen.: Gallium, Valantia.

Rubigo Pers. 1801. Synops. p. 214: sect. Uredinis. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 390. — Par. Strauss 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 81. — Mart. 1817. Erlang. p. 316. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 8.

Rubigo Link 1809. Berl. Mag. III. p. 22: nov. g. Mucedinum.

Nees 1816. Syst. p. 64; 1817. Überbl. p. 17: g. Byssor. entophytor.

Mart. 1817. Erlang. p. 347: g. Inomycetum aëreor.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 555: g. Erinicidear.

Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 529: g. Phylleriear.

Rubigo Link cont.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.

= Grumaria Kunze.

Rubioideae Meisn. 1838. Gen. pl. vasc. p. 156 (112): class. plant. Ordines: Lippayeae, Rubiaceae, Lygodysodeaceae.

Rubioides Soland. mss. ex Gärtn. Fruct. I. p. 112.

= Opercularia Gärtn.

Rubus Tourn. 1700. Inst. p. 614. t. 385: g. pl. class. XXI.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 128. Ed. Hall. 1745. p. 142: g. pl. class. V.

Linn. 1737. Gen. p. 146. n. 413; 1737. Cliff. p. 192; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 133; 1753. Sp. I. p. 492; 1759. Syst. ed. X. p. 1063. n. 557; 1762. Sp. ed. II. p. 706; 1764. Gen. ed. VI. p. 254. n. 632; 1767. Syst. ed. XII. p. 349: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 355. — Murr. 1774. Syst. p. 395; 1784. Syst. p. 475. — Reich. 1778. Gen. p. 259. n. 688. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 342. n. 864. — Lour. 1790. Coch. I. p. 324. — Pers. 1797. Syst. p. 510; 1807. Ench. II. p. 50. n. 1238. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1080. n. 998; 1809. En. p. 548. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 308. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 295. 359.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 343: g. Gymnopolyspermar.

Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 276. n. 1139: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 670.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 316.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 188. — Link 1822. En. II. p. 60. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 223. Sect.: Chamaebatus, Stelechobatus. — D. Don 1825. Nepal. p. 233. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1106. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 189 (*Ronce*). — Spreng. 1830. Gen. I. p. 416. n. 2075. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 165. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 196 (*Ronce*). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 52.

Adans. 1763. Fam. II. p. 294: g. Rosar.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 178: g. Calyciflorar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 81.

Hill 1769. Ht. kew. p. 216: g. Pentapetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 220: g. Calycanthemar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 350. t. 73. f. 9 (fruticosus).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 309; 1789. Phil. Bot. I. p. 160.

Juss. 1789. Gen. p. 338: g. Potentillar. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 298.

Neck. 1790. El. II. p. 90. n. 751: g. Sarcodiphytor. Segregantur Dalibarda et Bossekia.

Gmel. 1791. Syst. p. 855: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 231.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 349: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 473;

Rubus Tourn. cont.
1815. V. p. 544. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 585. Sect.: Chamaemorus, Rubus. — Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 556. — Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 230. — Link 1831. Hdb. II. p. 107. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 529. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 177. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Koch 1836. Syn. p. 210. Ed. II. p. 233. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (74). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 103. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 536. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 373.

Cram. 1803. Disp. p. 201: in Dioec. Icosandr. (R. Chamaemorus.)

Nestl. 1816. Diss. Potent. p. 16: g. Fragariacear. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 340.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 865; 1825. Syst. II. p. 527. n. 1862: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4448; 1832. Fl. exc. p. 599. — Kunth 1838. Berol. I. p. 196. — Webb & Berth..... Canar. II. p. 15.

Weihe & Nees 1822. Die deutschen Brombeerstr. *Cf.* Flora 1823. II. p. 721.

HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 219: g. Potentillacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 466.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Rubear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 243; 1841. Nom. p. 168. n. 6509.

Arrhen. 1840. Monogr. Rubor. Suec.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 449: g. Dalibardear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6360. p. 1241; 1841. Ench. p. 659. — Walp. 1843. Rep. II. p. 13; 1846. V. p. 649. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 65. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 716 (*Framboisier*). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 657.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.

Sendtn. 1856. Flora p. 193.

Metsch 1856. Linnaea XXVIII. p. 102.

Wimm. 1856. Verhandl. schles. Ges. p. 2.

Molendo 1857. Flora p. 465.

Müll. 1858. Flora Nr. 9—12.

Synon. Bossekia Neck.?; Cylactis Rafin.?

Ruckeria *) DC. 1837. Prodr. VI. p. 483: nov. g. Othonnear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2829. p. 463; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3233. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Rudbechia „Adans." DC. Prodr. III. et Endl. in synon. Conocarpi: vid. *Rudbeckia Adans.*

Rudbeckia **) Linn. 1737. Gen. p. 262. n. 669; 1737. Cliff. p. 420; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 269; 1753. Sp. II. p. 906; 1759. Syst. ed. X. p. 1228. n. 878; 1763. Sp. ed. II. p. 1279; 1764. Gen. ed. VI. p. 440. n. 980; 1767. Syst. ed. XII. p. 570: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 650; 1784. Syst. p. 782. — Reich. 1778. Gen. p. 436. n. 1061. — Curt. 1790. Bot. Mag. I. t. 2. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 574. n. 1324. — Gmel. 1791. Syst. p. 1258. — Pers. 1797. Syst. p. 823; 1807. Ench. II. p. 476. n. 1916. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2246. n. 1536; 1809. En. p. 921. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 178.

Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 258. n. 1069: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 590. Sejungitur Echinacea.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 189. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 532. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 417. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 412. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1352. 1532. Sect.: Rudbeckia (Cass.), Obeliscaria, Dracopis, Echinacea.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540. — Link 1822. En. II. p. 352.

Hill 1769. Ht. kew. p. 10: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 570; 1826. Syst. III. p. 611. n. 2847 (*Rudbekia*); 1831. Gen. II. p. 640. n. 3205.

Scop. 1777. Intr. p. 131 (*Rudbekia*): g. Flosculosar.

Neck. 1790. El. I. p. 18. n. 31: g. Actinophytor. Disjungitur Brauneria.

Schrad. 1808. N. Journ. II. 2. p. 54; 1808. Comm. Gotting. XVI. p. 126. Char. emend.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 244: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 486. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.

Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 398. 401; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2663; 1841. Nom. p. 92. n. 3629. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1832. Syn. p. 226. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 311. — DC. 1836. Pr. V. p. 555. — Endl. 1838. Gen. n. 2514. p. 409; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 153. Sect.: Centrocarpha, Obeliscaria. — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 354. Subg.: Akosmia. — Walp. 1843. Rep. II. p. 611. 977 (sect.: Eurudbeckia, Macrocline, Acosmia); 1847. VI. p. 159. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Link 1829. Hdb. I. p. 773: g. Coreopsidear.

Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 307: g. Euhelianthear. Sect.: Rudbeckia, Macrocline, Acosmia.

---

*) Dicat. J. Fr. Rucker.
**) Dicat. Nobilissimis Rudbeckiis, Olao patri et Olao filio, Upsaliensibus.

Rudbeckia Linn. cont.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 260: g. Senecionidear.
Synon. Obeliscotheca Vaill.; Heliophthalmum Rafin.

Rudbeckia Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor.
= Conocarpus Gärtn.

Rudbeckia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 307: sect. Rudbeckiae.
= Eurudbeckia Walp.

Rudbeckieae Cassini 1821. Dict. v. 20. p. 347; 1825. v. 38. p. 17: sect. Heliantheae. Gen. (1825): Baltimora, Chatiakella, Diomedea, Dracopis, Echinacea, Eclipta, Ferdinanda?, Fougeria, Gymnolomia?, Helicta, Heliophthalmum?, Heliopsis, Kallias, Obeliscaria, Pascalia, Podanthus, Rudbeckia, Stemmodontia?, Tilesia?, Tithonia, Wedelia, Wulffia? — Par. Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 397; 1829. v. 54. p. 461; 1830. v. 60. p. 576. Subdivis.: *verae* (gen.: Tithonia, Echinacea, Dracopis, Obeliscaria, Rudbeckia, Heliopthalmum [1827]?, Gymnoloma, Chatiakella, Wulffia, Tilesia?, Podanthus?, Euxenia 1830), Heliopsideae, Baltimoreae. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. Gen.: Tithonia, Echinacea, Rudbeckia, Dracopis, Andrieuxia, Anomostephium, Aspilia, Gymnopsis, Wulffia, Tilesia, Euxenia; Ferdinanda, Borrichia, Heliopsis, Kallias, Balsamorhiza, Pascalia, Rumfordia, Helicta, Alarçonia, Stemmodontia, Wedelia, Trichostephus, Eclipta; Baltimora, Chrysogonum.
Rchb. 1828. Consp. p. 110: subdiv. Heliantheae. Gen. ut Cass. 1825 (Adelmannia loco Diomedeae) et Selloa.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Helianthidear. gen.: Baltimora, Eclipta, Heliopsis, Rudbeckia, Echinacea.

Rudbeckieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 225: div. Heliantheae. restricta. Gen.: Lepachys, Echinacea, Rudbeckia, Dracopis, Eriocoma, Aldama, Gymnoloma, Encelia, Chrysostemma, Calliopsis. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 554. Gen.: Echinacea, Rudbeckia, Dracopis, Obeliscaria, Andrieuxia, Anomostephium, Aspilia, Gymnopsis, Wulffia, Montagnaea, Sclerocarpus, Encelia, Philoglossa, Chrysostemma, Calliopsis, Peramibus. — Endl. 1838. Gen. p. 409; 1841. Ench. p. 238. Gen. ead. Accedit 1842 (Spl. II. p. 42) Echinomeria. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. Gen. ut DC. et Epilepis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. 1842.

Rudbekia Scop., Spreng. vid. *Rudbeckia Linn.*

Rudgea *) Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 327. t. 18. 19.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XI. 195. n. 893: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 380. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 755. n. 805; 1830. Gen. I. p. 171. n. 861. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 774.

Rudgea Salisb. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2037: g. Coffeacear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 169. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotricar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2801.
DC. 1830. Pr. IV. p. 503: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 584. — Endl. 1838. Gen. n. 3151. p. 533; 1841. Ench. p. 272.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Ruditanthera Walp. vid. *Rutidanthera Planch.*

Rudolfo-Römeria Steud. in Sched. pl. Schimp. abyssin. nr. 752. *Cf.* Hochstett. in Flora 1844. p. 30.
= Kniphofia Mönch.

Rudolphia Medic. 1787. Malv. p. 111: nov. g. Monadelph. Decandr. (Malpighia urens L.) *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 299; 1789. Phil. Bot. I. p. 152.

Rudolphia *) Willd. 1801. Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 451; 1801. Spec. III. 2. p. 918. n. 1324: nov. g. Diadelph. Decandr. (Erythrina planisiliqua L.)
Vent. 1807. Mém. Inst. I. p. 17: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 751; 1826. Syst. III. p. 244. n. 2554; 1831. Gen. II. p. 582. n. 2857. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 418.
Pers. 1807. Ench. II. p. 279: sect. Buteae.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 414. — Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3957. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 373. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 357. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66).
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 432: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 95.
Endl. 1841. Gen. n. 6669. p. 1295; 1841. Ench. p. 672: g. Erythrinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5825. — Walp. 1842. Rep. I. p. 769. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Rühssia **) Karsten 1849. Verh. Berl. Gartenbauver. XIX. 2. p. 304; 1856. Linnaea XXVIII. p. 423: nov. g. Hoyear.

Ruelia Scopoli vid. *Ruellia Linn.*

Rülingia ***) Ehrhart 1788. Beitr. III. p. 132: nov. g. plantar. (Portulaca Anacampseros L.)
Haw. 1812. Syn. succ. p. 124 (Ed. Schrank 1819. p. 136); 1819. Suppl. p. 64 (*Rulingia*): g. Dodecandr. Monogyn.
= Anacampseros Sims.

Rülingia Spreng. vid. *Rulingia R. Brown.*

*) Dicat. Ed. Rudge, botanico anglico.

*) Dicat. Dr. C. Asm. Rudolphi Greifswald. et Rudolph Petropol.

**) Dicat. C. Rühss, consuli borussico in Porto Cabello.

***) Dicat. Dr. J. Ph. Rüling, Northeimiensi.

Ruellia*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 12. t. 2.
Dill. 1732. Hort. Eltham. p. 328. t. 248. f. 320.
Linn. 1737. Gen. p. 41. n. 114: g. Pentandr. Monogyn.
Linn. 1737. Cliff. p. 318; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 295. n. 616; 1748. Ups. p. 148; 1753. Sp. II. p. 634; 1759. Syst. ed. X. p. 1120. n. 702; 1763. Sp. ed. II. p. 884; 1764. Gen. ed. VI. p. 323. n. 784; 1767. Syst. ed. XII. p. 424: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 481; 1784. Syst. p. 575. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 666. t. 270. 271. — Reich. 1778. Gen. p. 325. n. 847. — Lour. 1790. Coch. II. p. 380. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 423. n. 1050. — Gmel. 1791. Syst. p. 957. — Pers. 1797. Syst. p. 612. — Willd. 1800. Sp. III. p. 362. n. 1195; 1809. En. p. 655. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 44. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 108. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 41.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 177. n. 726: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 512.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 210. — Scop. 1777. Intr. p. 174 (*Ruelia*). — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 103.
Hill 1769. Ht. kew. p. 270: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 254. t. 54. f. 3 (strepens).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 228; 1789. Phil. Bot. I. p. 74.
Neck. 1790. El. I. p. 362. n. 559: g. Plasyrgophytor. Sejungitur Aubletia.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 304: g. Acanthoidear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 175. n. 1525.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 238: g. Acanthacear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 477. Ed. Nees p. 333. Disjungitur Hygrophila. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 238. — Link 1822. En. II. p. 132; 1829. Hdb. I. p. 502. — Kunth 1823. Syn. II. p. 35. — D. Don 1825. Nepal. p. 119. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 794. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 423. — Bartl. 1830. Ord. p. 184.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 409; 1825. Syst. II. p. 820. n. 2214; 1831. Gen. II. p. 499. n. 2457: g. Acanthear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 50. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII; 1828. ibid. II. p. 994. 1096; 1828. Consp. p. 122. n. 3122. Sect. (ap. Mössl.): Ruellia, Eranthemum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: g. Acanthinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Ruelliear. — Par. Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75; 1841. Linnaea XV. p. 554; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 55; 1847 in DC. Pr. XI. p. 143. — Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4244. — Endl. 1839. Gen. n. 4047. p. 699; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — J. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 263. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 785.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 586: g. Echmatacanthor.
Brongn. 1843. En. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Vég. kd. p. 679: g. Ruellidar.
Synon. Aubletia Neck.?; Pattersonia Gmel.

Ruelliariae Rchb. 1837. Handb. p. 190: subsect. Justiciear. Gen.: Cryptophragmium, Phlogacanthus, Loxanthus, Endopogon, Crossandra.

Ruellidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 679: trib. Echmatacanthor. Gen. Ruelliear. Endl. 1842 et Micraea, Salpixanthus.

Ruellieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Acanthidear. Gen.: Ruellia, Hygrophila, Blechum, Aphelandra, Barleria, Crossandra, Phaylopsis, Lepidagathis.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75 (1841. Linnaea XV. p. 353): subtrib. Echmatacanthor. Gen.: Dyschoriste, Petalidium, Ruellia, Phlebophyllum, Buteraea, Adenacanthus, Stenosiphonium, Strobilanthes, Aechmanthera, Goldfussia, Asystasia, Echinacanthus, Leptacanthus. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 699; 1841. Ench. p. 243. Gen. ead. et Chaetacanthus, Dipteracanthus, Aphragmia, Calophanes, Stephanophysum, Stenandrium. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 62. 106): Dizygandra, Trichanthera, Cryphiacanthus. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). Gen. ut Endl. et Staurogyne?
Rchb. 1837. Hdb. p. 190: subsect. Acanthear. Gen.: Echinacanthus, Dipteracanthus, Ruellia, Aechmanthera, Stenosiphonium, Strobilanthus, Goldfussia, Asystasia, Petalidium, Dyschoriste, Leptacanthus, Phlebophyllum, Adenacanthus.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144: sect. Echmatacanthor. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 109: div. Esmatacanthar. Gen. ead.
Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 23: trib. Acanthacear. Gen.: Calophanes, Dipteracanthus, Siphonacanthus, Homotropium, Cryphiacanthus, Stephanophysum, Eurychanes, Stemonacanthus, Ruellia, Arrhostoxylon, Ancylogyne, Stachyacanthus.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 99: trib. Echmatacanthear. Gen. §. 1: Phlebophyllum, Codonacanthus, Endopogon; Stenosiphonium, Dyschoriste, Calophanes, Homotropium, Fabria, Petalidium, Dipteracanthus, Hemigraphis, Ruellia, Crabbea, Asystasia, Echinacanthus, Stachyacanthus, Triaenacanthus, Leptacanthus, Aechmanthera, Goldfussia, Strobilanthes, Buteraea, Adenacanthus, Cryphiacanthus, Siphonacanthus, Stephanophysum, Stemonacanthus, Paulo-Wilhelmia,

*) Dicat. Joanni Ruellio, Dioscoridis translatori et commentatori, etc. (Ht. Cliff.)

Ruellieae Dumort. cont.
Eurychanes, Arrhostoxylum. §. 2: Onychacanthus, Trichanthera, Macrostegia, Sclerocalyx, Ophthalmacanthus, Whitefieldia, Ancylogyne; Androcentrum?

Rüppellia A. Richard 1847. Fl. Abyssin. I. p. 203: nov. g. Hedysarear. (R. abyssinica.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 411: g. Euhedysarear.

Rugendasia*) „Schiede mss." Schlechtend. 1841. Hort. Hall. p. 14.
= Weldenia Schult. f.

Rugenia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 78. n. 731 (gall. *Rugénée*): g. Sarcodiphytor.
= Eugenia Mich.

Rugunia Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 219: sect. Scleriae. (Fructus globosus rugosus.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 83 et Steud. Glum. II. p. 167.

Ruitzia Batsch vid. *Ruizia Cavan.*

Ruizia**) Cavan. 1786. Diss. II. App. II; 1787. Diss. III. p. 117. t. 36. 37: nov. g. Monadelphiae. (R. cordata, etc.)
Juss. 1789. Gen. p. 275: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 190. — Batsch 1802. Tab. p. 19 (*Ruitzia*). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 66. — Pers. 1807. Ench. II. p. 253. n. 1635. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 799. — Link 1822. En. II. p. 212. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 431.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 466. n. 1135: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1068. — Willd. 1800. Sp. III. p. 798. n. 1292.
Gis. 1792. Prael. p. 451: g. Columniferar.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 313: g. Dombeyacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 497. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 204. n. 5314. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 535. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 445. — Meisn. 1837. Gen. p. 34 (27). — Endl. 1840. Gen. n. 5342. p. 1001; 1841. Ench. p. 520. — Walp. 1843. Rep. II. p. 797. — Brongn. 1843. En. genr. p. 78.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: g. Dombeyear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 201. n. 7681. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 123. n. 2449: g. Pentapetear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 558. n. 2728: g. Büttnerear.
Synon. Konigia Comm.

Ruizia Pavon 1794 in Ruiz & Pav. Prodr. p. 125. t. 29: nov. g. Dioec. Icosandr.
Bartl. 1830. Ord. p. 104: g. Amborear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 91.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: g. Monimiacear.
Endl. 1837. Gen. p. 314. n. 2019: g. Monimiear.
= Boldea Juss.

*) Dicat. Joh. Mor. Rugendas, pictori, peregrinatori.
**) Dicat. Hyppolito Ruiz.

Rulac Adans. 1763. Fam. II. p. 383: g. Tiliar.
Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 45. (Acer Negundo.)
= Negundo Mönch.

Rulfsia Fries vid. *Ralfsia.*

Rulingea Dumort. vid. *seq.*

Rulingia*) R. Brown 1820. Bot. Mag. t. 2191. 3182 (Verm. bot. Schr. V. p. 328): nov. g. Büttneriacear. (R. pannosa.) — Par. Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 237.
DC. 1824. Pr. I. p. 486: sect. Byttneriae. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 490.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 140 in adnot.
Spreng. 1825. Syst. p. 790 (*Rülingia*): sect. Büttnerae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46 (*Rulingea*): g. Buttneriear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 79.
Endl. 1837. En. pl. Hügel. p. 12 (*Rullingia*): g. Byttneriacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 32 (26): g. Büttneriear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5328. p. 997; 1841. Ench. p. 519. — Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7705. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 337. — Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 351. Sect.: Eurulingia, Saccophora.
Rchb. 1837. Hdb. p. 292: g. Büttnerear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Byttnerear.

Rulingia „Ehrh." Haworth vid. *Rülingia Ehrh.*

Rullingia Endl. vid. *Rulingia R. Brown.*

Rumastra „Camb." Wittst. vid. *seq.*

Rumastrum Campdera 1819. Mon. du genre Rumex p. 34. 107: sect. Rumicis. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. 1441. — Endl. 1837. Gen. n. 1993 *b.* p. 309; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 53.

Rumea**) Poiteau 1815. Mém. Mus. I. p. 62: nov. g. Tiliaceis aff. (R. coriacea.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 817: g. Tiliacear.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 238 in adnot.: g. Bixinar. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 244 adnot.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 433: g. Dioec. Polyandr.
Conf. Roumea DC.

Rumex Linn. 1737. Gen. p. 105. n. 300; 1737. Cliff. p. 138; 1740. Syst. p. 22; 1748. Ups. p. 89; 1753. Sp. I. p. 333; 1759. Syst. ed. X. p. 990. n. 407; 1762. Sp. ed. II. p. 476; 1764. Gen. ed. VI. p. 178. n. 451; 1767. Syst. ed. XII. p. 254. n. 446: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 284; 1784. Syst. p. 346. — Reich. 1778. Gen. p. 180. n. 485. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 238. n. 613. — Lour. 1790. Coch. I. p. 216. — Gmel. 1791. Syst. p. 584. — Pers. 1797. Syst. p. 369; 1805. Ench. I. p. 394. n. 876. — Willd. 1799. Sp. II. p. 249. n. 699; 1809. En. p. 396. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 347. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 240. — Gaud. 1828. Helv. II.

*) Dicat. J. P. Ruling, auctori systematis naturalis.
**) Dicat. philanthropo, Philippe-Rose Roume de St. Laurent.

Rumex Linn. cont.
p. 470. 577. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 208.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Vaginalium. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 176. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 220.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 82; 1826. Dict. v. 42. p. 346. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 251. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 193. — DC. 1805. Franç. III. p. 371; 1815. V. p. 367. Sect.: Lapathum, Acetosa, Oxyria. — Hedw. 1806. Gen. p. 253. n. 1028. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 305; 1825. Syst. II. p. 158. n. 1385; 1830. Gen. I. p. 293. n. 1514. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 180. — Campd. 1819. Mon. du genre Rumex p. 18. 60. Sect.: Lapathum, Rumastrum, Acetosa. — Link 1821. En. I. p. 349; 1829. Hdb. I. p. 305. — Kunth 1822. Syn. I. p. 469; 1838. Berol. II. p. 165. Sect.: Lapathum, Acetosa. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. — Lois. 1825. Dict. v. 38. p. 132 (*Patience*). — D. Don 1825. Nepal. p. 74. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 480. Sect.: Lapathum, Acetosa. — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4286; 1832. Fl. exc. p. 568. Sect. eaed. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XC. 1385. Sect. ut Campd. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 57. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Koch 1837. Syn. p. 612. Ed. II. p. 704. Sect. ut Rchb. — Endl. 1837. Gen. n. 1993. p. 308; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 51. (verar.) Sect. ut Campd. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1216. — Meisn. 1841. Gen. p. 317 (228); 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 625. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 523. Subgen. ut Bl. & Fing. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 100. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 316. Sect. ut Spach. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 263. Sect. eaed. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 207. (verar.) Sect. eaed. et Anisosepalum. — Webb .... Canar. III. p. 214. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 211. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 34. Sect. ut Bluff.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Gled. 1764. Syst. p. 68. n. 285: g. Thalamostemonum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 110: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 162: g. Tripetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 486: g. Polygonatar.
Scop. 1777. Intr. p. 344: g. Seminudar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 322. (R. spinosus. *Cf. Vibo Medic.*)
Neck. 1790. El. II. p. 213. n. 947: g. Sysellophytor. Sejunguntur Emex et Acetosa.
Cram. 1803. Disp. p. 79 in Hexandr. Digyn. (R. digynus) et p. 195 in Dioec. Hexandr. (R. Acetosa, etc.)
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 154. Sect.: Nemolapathum, Hippolapathum, Acetosa.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Rumicear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6311. Sect. (1841): Acetosa, Lapathum, Rumex. — C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 143. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 499. Sect. ut Bl. & Fing. — Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 7; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 41. Sect. eaed. et Acetosella.
Meisn. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 63.
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 994: g. Apterocarpar. Sect. ut Meisn. 1856.
Synon. Lapathum et Acetosa Tourn.; Lapatum Hall.; Nemolapathum Ehrh.

Rumfordia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 549: nov. g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2505. p. 407; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3136. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21: g. Rudbeckiear.

Rumhora Desv. vid. *Rumohra Raddi.*

Rumia**) Hoffm. 1816. Umbell. ed. II. p. 171: nov. g. Umbelliferar. (Cachrys taurica Willd.) — Par. Link 1821. En. I. p. 271. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Koch 1825. Umbell. p. 129 in add.
Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3728; 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5374: g. Amminear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 98. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 275. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4390. p. 768; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 939. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 110. — Walp. 1843. Rep. II. p. 391; 1846. V. p. 848.
Ledeb. 1845. Ross. II. p. 280: g. Seselinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Rumia Link Hort. Berol. I. p. 271. (?) = Capnophyllum Gärtn.

Rumiceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Rumicinear. Gen.: Rumex, Atraphaxis, Tragopyrum, Emex, Podopterus, Polygonella.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162: subdiv. Polygonear. Gen.: Oxyria, Emex, Rumex, Rheum, Polygonella (1841 omissa), Tragopyrum, Atraphaxis.
C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 143: trib. Polygonacear. verar. Gen. ead. et Gonopyrum. *Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 34.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 41: subtrib. Apterocarpar. Gen.: Rumex, Atraphaxis, Polygonella, Thysanella.

Rumicineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: fam. Polygonariear. Trib.: Rumiceae, Rheae.

---

*) Dicat. Benj. Thomson, comiti de Rumford.
**) Rumia vel Rumina, Romanorum Dea, quae lactantibus praesidebat.

Rumohra*) Raddi 1819. Op. scient. III. p. 290: nov. g. Filicum. *Cf.* Kunze 1824. Flora I. p. 333. — Par. Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 262 (*Rumhora*).
Gaudich 1826. Freyc. voy. Bot. p. 344: g. Aspidiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 681 *c*: sect. Aspidii.
= Polystichum Roth.

Rumpfia Linn. 1737. Gen. p. 9. n. 25; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 20. n. 41; 1764. Gen. ed. VI. p. 23. n. 47: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 99.
Scop. 1777. Intr. p. 208: g. Dumosar.
= Rumphia Linn.

Rumphia **) Linn. 1753. Sp. II. p. 1193; 1759. Syst. ed. X. p. 1356. n. 1103: g. pl. incertae sedis. *Cf.* Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 161.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 49; 1767. Syst. ed. XII. p. 73. n. 47: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 74; 1784. Syst. p. 81. — Reich. 1778. Gen p. 24. n. 51. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 31. n. 64. — Pers. 1797. Syst. p. 83; 1805. Ench. I. p. 39. n. 84. — Willd. 1797. Sp. I. p. 187. n. 80. — Vahl 1806. Enum. II. p. 36. n. 85.
Juss. 1789. Gen. p. 370: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 444. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 251. — Hedw. 1806. Gen. p. 31.358. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 348. 548. n. 164.
Neck. 1790. El. II. p. 127. n. 809: g. Plyrontophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 176. n. 192; 1830. Gen. I. p. 43. n. 198: g. Terebinthear.?
DC. 1825. Pr. II. p. 90: g. Terebinthaceis aff.? — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 77.
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4512: g. Vochysiear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56): g. Burseracear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5925. p. 1134; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5679: g. Spondiear.?
Synon. Rumpfia Linn.; Tsjem-Tani Adans.

Runcina Allemand 1770. Nov. Act. Nat. Cur. IV. p. 94: nov. g. plant.

Runcinaria C. Müll. 1854. Bot. Zeit. p. 545: sect. Vittariae.

Rungia ***) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 109; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 469: nov. g. Diclipterear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190: 1841. Nom. p. 110. n. 4285. — Endl. 1839. Gen. n. 4092. p. 706; 1841. Ench. p. 344. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 839.
Dietr. 1139. Syn. I. p. 31. 78; g. Acanthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Diclipteridar.

Rupala Vahl 1794. Symb. III. p. 20.
Willd. 1797. Spec. I. p. 536. n. 167: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 117. n. 219.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 26. n. 553: g. Proteacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 341 (*Roupale*).
Agdh. 1826. Aphor. p. 237: g. Embothriear.
= Roupala Aubl.

Rupifraga Otth 1824 in DC. Prodr. I. p. 375: sect Silenes. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 405. — Endl. 1840. Gen. n. 5248 *e*. p. 973; 1841. Ench. p. 506; 1843. Spl. III. p. 93. n. 5248 *g*. — Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7828. 4. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 316. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 168.
Synon. Stachyphylla Presl.

Rupifragia Sternb. 1831. Revis. Saxifr. p....: sect. Saxifragae.

Rupinia Linn. f. 1781. Suppl. p. 69. n. 1435: g. Algar. (*Aytonia Forst.*) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 455.
Rchb. 1828. Consp. p. 30. n. 519: g. Hypophyllinor.
= Plagiochasma Lehm. & Lind.

Rupinia Corda 1829 in Opiz Beitr. I. (*Cf.* Linnaea V. Litt. p. 78); 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Corsiniacear. (Riccia pyramidata W.)
= Oxymitra Bisch.

Ruppia *) Linn. 1737. Gen. p. 277. n. 699; 1737. Cliff. p. 436; 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 442. n. 842: g. Gynandr. Polyandr.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 30. n. 120: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Inundatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 66. — Gis. 1792. Prael. p. 326.
Linn. 1753. Sp. I. p. 127; 1759. Syst. ed. X. p. 902. n. 161; 1762. Sp. ed. II. p. 184; 1764. Gen. ed. VI. p. 68. n. 175; 1767. Syst. ed. XII. p. 131: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 141; 1784. Syst. p. 169. — Reich. 1778. Gen. p. 70. n. 187. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 92. n. 235. — Gmel. 1791. Syst. p. 289. — Pers. 1797. Syst. p. 175; 1805. Ench. I. p. 152. n. 342. — Willd. 1797. Sp. I. p. 717. n. 270. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 111. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 860.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Aroidear.
Juss. 1789. Gen. p. 19: g. Naiadum. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 37. 518. n. 611. *Cf.* Schult. Mant. III. p. 18. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 500. n. 567;

*) Dicat. C. de Rumohr.
**) Dicat. G. Eberh. Rumpf. Hanoviensi.
***) Dicat. F. F. Runge, prof. Vratislav.

*) Dicat. Henr. Bernh. Ruppio, botanico primario, praepero fato licet abrepto. (Ht. Cliff.)

Ruppia Linn. cont.
1830. Gen. I. p. 117. n. 597. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 111.
Neck. 1790. El. III. p. 278. n. 1670: g. Catabophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 23. t. 84.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 81: g. Fluvialium. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 53. — Hedw. 1806. Gen. p. 85. n. 393. — Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 371. — Kunth 1822. Syn. I. p. 135.
DC. 1805. Franç. III. p. 183: g. Alismacear.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 46: g. Potamophilar. — Par. Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 108.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 117: g. Najadum. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 427. 558.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 32: g. Fluviatilium.
Agdh. 1822. Aphor. p. 124: g. Najadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 72. — Endl. 1837. Gen. n. 1661. p. 231; 1841. Ench. p. 125. — Unger 1845. Syn. p. 177; 1846. Chlor. prot. (p. 45. 66. t. 15) p. LXIX. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 21.
Wallr. . . . Ann. bot. p. 151. Char. emend.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 430: g. Aroideis aff.
Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 456: g. Potamear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 678. Ed. II. p. 781. — Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1136. — Math. 1853. Belg. I. p. 510.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XX; 1828. Consp. p. 43. n. 761: g. Potamogear.
Link 1829. Hdb. I. p. 286: g. Hydrogetonum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Potamogetonear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 6.
Kunth 1841. Enum. III. p. 122: g. Ruppiear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 15.
Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272): g. Zosterear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 210: g. Juncaginacear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 236: g. Naiadacear.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 324: g. Zosteracear.
Synon. Buccaferrea Mich.; Bucafer Adans.

Ruppieae Kunth 1841. Enum. III. p. 122: trib. Fluvialium. Gen.: Ruppia.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 15: trib. Najadear. Gen. id. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 566. Gen. id.

Rupprechtia Endl. vid. *Ruprechtia Meyer.*

Rupprechtia „Rchb." Endl. Gen. Suppl. II. p. 77 in synon. Plinthi: vid. *Ruprechtia Rchb.*

Ruprechtia*) C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 148: nov. g. Triplaridear. — Par. Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 53; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 178. Sect.: Euruprechtia, *Apetalae.*
Endl. 1842. Spl. II. n. 1997 *b.* p. 35 (*Rupprechtia*); 1847. Spl. IV. p. 55: sect. Triplaridis.

*) Dicat. F. J. Ruprecht, Petropol.

Ruprechtia C. A. Meyer cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504 (*Rupprechtia*): g. Triplarear.
Synon. Magonia Vell.; Blochmannia Weig., Rchb.

Ruprechtia Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 166. n. 6460: g. Galeniear.
= Plinthus Fenzl.

Rurea St. Hilaire vid. *Rourea Aubl.*

Rusceae Rchb. 1837. Handb. p. 153: subdiv. Smilacinar.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 46; 1850. Enum. V. p. 272: trib. Smilacinear. Gen.: Ruscus, Danaë, Semele.

Ruscinae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 223: ordo Sarmentacear. Gen.: Ruscus, Veratrum, Flagellaria, Uvularia, Streptopus, Convallaria, Ophiopogon, Paris.

Ruscineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Asparaginear. Gen.: Ruscus.

Ruscus Tourn. 1700. Inst. p. 79. t. 15: g. pl. class. I.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 143. Ed. Hall. 1745. p. 157: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 313. n. 767; 1737. Cliff. p. 465; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 300; 1753. Sp. II. p. 1041; 1759. Syst. ed. X. p. 1299. n. 1008; 1763. Sp. ed. II. p. 1474; 1764. Gen. ed. VI. p. 534. n. 1139; 1767. Syst. ed. XII. p. 662: g. Dioec. Syngenes. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 269. — Murr. 1774. Syst. p. 751; 1784. Syst. p. 896. — Reich. 1778. Gen. p. 530. n. 1246. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 709. n. 1559. — Pers. 1797. Syst. p. 938.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 237. n. 976: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 365.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 52: g. Asparagor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 42.
Hill 1769. Ht. kew. p. 424: g. Dioicear.
Scop. 1777. Intr. p. 84: g. Liliacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 60. t. 16. f. 8 (racemosus).
Neck. 1790. El. III. p. 392. n. 1837: g. Gonoophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 104: g. Triandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. 1. p. 13; 1818. Fl. cap. I. p. 160.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 147: g. Smilacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 105. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 189. — Agdh. 1823. Aphor. p. 161. — Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1331; 1830. Fl. exc. p. 100. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 402.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
Cram. 1803. Disp. p. 204: g. Dioec. Monadelph. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 874. n. 1854; 1809. En. p. 1025. — Pers. 1807. Ench. II. p. 636. n. 2301. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 202. 306.
DC. 1805. Franç. III. p. 179: g. Asparagear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Koch 1837. Syn. p. 706. Ed. II. p. 815. — Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Brongn. 1843. En. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan.

Ruscus Tourn. cont.
XII. p. 221. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Math. 1853. Belg. I. p. 535.
Spreng. 1817. Anl. II. p. 223; 1826. Syst. III. p. 18. n. 2337; 1831. Gen. II. p. 526. n. 2586: g. Ruscinar. (in Monadelph. Triandr.)
Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 340 (*Fragon*): g. Asparaginear.
Link 1822. En. II. p. 434: g. Smilacinar.
Link 1829. Hdb. I. p. 274: g. Asparaginar., sejuncta Danaidia restrict.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Ruscinear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1188. p. 155; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. Sect.: Ruscus (Link), Danaida. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1738. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 129. Sect. ut Endl. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 233.
Rchb. 1837. Hdb. p. 153: g. Ruscear. — Par. Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 46; 1850. Enum. V. p. 273. Distinguuntur Danaë et Semele.
Synon. Bislingua Caesalp.

Russea Gmel. vid. *Roussea Smith.*

Russegera Steud. vid. *seq.*

Russeggera*) Endl. 1839. Nov. stirp. Decad. I. 46 (Icon. t. 94): nov. g. Acanthacear. (R. collina.) — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 487 (*Russegera*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 596.
Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202): g. Russeggerear.
Endl. 1841. Spl. I. n. $4072/_1$. p. 1405; 1841. Ench. p. 343: g. Acanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4229. (genuinar.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Acanthidar.
= Lepidagathis Willd.

Russeggereae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 293 (202): trib. Acanthacear. Gen.: Russeggera, Schwabea.

Russelia**) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 178. t. 113: nov. g. Didynam. Angiosperm. (R. sarmentosa.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 776 (*Russellia*). — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 419. n. 1041. — Cavan. 1799. Icon. V. p. 8. t. 415. — Willd. 1800. Sp. III. p. 344. n. 1181.
Gled. 1764. Syst. p. 179. n. 734: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 172: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 273. — Link 1822. En. II. p. 144. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 457.
Juss. 1789. Gen. p. 118: g. Scrophulariar. (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 164. n. 1480: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3194. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24. — Bartl. 1830. Ord. p. 171.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 358: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 119.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 811. n. 2192; 1831. Gen. II. p. 493. n. 2431: g. Scrofularinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 549.

*) Dicat. Jos. Russegger, peregrinatori.
**) Dicat. Alex. Russel, medico Halepensi.

Russelia Jacq. cont.
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 3: g. Scrofularinear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2; 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1773: g. Digitalear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3910. p. 677; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 505. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 59. — Walp. 1845. Rep. III. p. 251. 961.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 513: g. Scrophulariear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Gratiolear.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4507: g. Cheloniear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 331; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.

Russelia Linn. f. 1781. Suppl. p. 24. n. 1376: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 270. — Gmel. 1791. Syst. p. 463. — Pers. 1797. Syst. p. 285.
= Vahlia Thunb.

Russelia König (teste Roxb. Fl. Ind. III. p. 364): nov. g. ex typo Hedysari sennoidis.
= Ormocarpum Palis.

Russellia Wittst. vid. *Russelia Jacq.*

Russula Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 100: nov. g. Fungor. (Agaricus sanguineus Batsch.) *Cf.* Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 12 et Leman 1827. Dict. v. 46. p. 459.
Pers. 1797. Tent. p. 65: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 438: sect. Agarici. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 139. — Nees 1816. Syst. p. 199; 1817. Überbl. p. 50. — Mart. 1817. Erlang. p. 423. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 202.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 37: g. Fungor. primae seriei.
Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 65; 1818. II. p. 195: fam. Agarici, an distinctum genus?
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 618: g. Mycenadear.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 54: trib. Leucospori.
Fries 1825. Pl. homon. p. 76; 1838. Epicr. p. 349; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 310: g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 346. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 447. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 183. 188. — Bail 1858. Syst. p. 33. t. 33.
Endl. 1836. Gen. n. 453 *VII. g.* p. 41; 1841. Ench. p. 22: subsect. Cortinarii.
Math. 1853. Belg. II. p. 373: subsect. Leucospori.

Russularis Rchb. 1841. Nomencl. p. 12. n. 494. 4: sect. Lactarii. (Tribus: *Russulares Fries.*)

Rustia Klotzsch 1846 in Hayne Arzneigew. XIV. adnot. ad t. 14.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 68: g. Eucinchonear.

Rustica G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 464: sect. Nicotianae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 8.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 560: subsect. Didicliae.

Ruta*) Tourn. 1700. Inst. p. 257. t. 133: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 80. Ed. Hall. 1745. p. 89: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 111. n. 314; 1737. Cliff. p. 145; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 161. n. 374: g. Octandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 90.
Linn. 1748. Ups. p. 102; 1753. Sp. I. p. 383; 1759. Syst. ed. X. p. 1019. n. 469; 1762. Sp. ed. II. p. 548; 1764. Gen. ed. VI. p. 210. n. 523; 1767. Syst. ed. XII. p. 293. n. 517: g. Decandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 285. — Murr. 1774. Syst. p. 331; 1784. Syst. p. 397. — Reich. 1778. Gen. p. 214. n. 565. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 286. n. 725. — Lour. 1790. Coch. I. p. 269. — Gmel. 1791. Syst. p. 676. — Pers. 1797. Syst. p. 425. — Willd. 1799. Sp. II. p. 542. n. 827; 1809. En. p. 446. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 60. 65. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 373.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 93. n. 383: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 66.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 376.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 176: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 188: g. Pentapetalar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Thalictra et Papavera conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 323: g. Disciferar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 208; 1789. Phil. Bot. I. p. 58.
Juss. 1789. Gen. p. 297: g. Rutacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 227. — Batsch 1802. Tab. p. 55. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 464. n. 1041. — DC. 1805. Franç. IV. p. 731; 1815. V. p. 600. — Hedw. 1806. Gen. p. 306. n. 1214. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 672; 1825. Syst. II. p. 320. n. 1580; 1830. Gen. I. p. 348. n. 1757. — Link 1821. En. I. p. 398; 1831. Hdb. II. p. 224. — D. Don 1825. Nepal. p. 206. — Presl 1826. Sicul. I. p. 215. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 420 (*Rue*). — Bartl. 1830. Ord. p. 390. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 107; 1842. Ross. I. p. 490. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 315. — Koch 1836. Syn. p. 145. Ed. II. p. 158. (verar.) — Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 13. — Endl. 1840. Gen. n. 6027. p. 1160; 1841. Ench. p. 614. Sect.: Ruteria (1842. Spl. II. Desmophyllum), Ruta. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1416. — Walp 1842. Rep. I. p. 517. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 128. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 262 (*Rue*).
Neck. 1790. El. II. p. 230. n. 972: g. Eredophytor.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 34): g. Diosmear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 709. Sect.: Ruteriae et aliae tres.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140: g. Rutear. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 462. — Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5122; 1832. Fl. exc. p. 765; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. n. 7491. (genuinar.) Sect. (1841): Ruta, Ruteria. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 778. — Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 328.
Synon. Pseudo-Ruta Mich.

Ruta muraria Tourn. 1700. Inst. p. 541. t. 317: g. pl. class. XVI.

Rutaceae Juss. 1789. Gen. p. 296: ordo 21 class. XIII. Gen. §. 1: Tribulus, Fagonia, Zygophyllum, Guajacum. §. 2: Ruta, Peganum, Dictamnus. §. 3. *Affinia:* Melianthus, Diosma, Empleurum, Aruba. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 460.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 223: ordo 20 class. XIII. Gen. ut Juss.
Batsch 1802. Tab. p. 55: fam. Adonariarum. Gen. ead. et Gevuina, Aulacia.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 102. t. 90. Gen. ut Juss. Accedunt in §. 1 Larrea, §. 2 Boronia, §. 3 Correa.
DC. 1805. Franç. IV. p. 730: fam. (79) Dicotyledonum polypetalar. Gen. Tribulus, Peganum, Dictamnus. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 894.
Spreng. 1818. Anl. II. p. 672: fam. 67 plant. Gen.: Ruta, Peganum, Dictamnus, Calodendron, Jambolifera, Zieria, Eriostemon, Crowea, Guaiacum, Zygophyllum, Fagonia, Tribulus.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245; 1824. Pr. I. p. 709: ordo (51) Thalamiflorar., sejunctis Zygophylleis restrictus. Trib.: Diosmeae, Cusparieae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 775. Trib. ut DC. 1822.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140. Sect.: Ruteae, Diosmeae, Zanthoxyleae, Cusparieae. *Cf.* St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 152. 378.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamisertiae.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 92.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 589: ordo Gynobasear.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 384. Trib.: Zygophylleae, Ruteae, Diosmeae, Zanthoxyleae, Simarubeae. *Cf.* Desf. 1826. Ann. sc. nat. VII. p. 419 et A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 275, ubi fam. eaed. (Rutaceae loco Rutear. Trib.: Ruteae, Biebersteinieae.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI: fam. Cyclospermar. Divis. ut A. Juss. et Meliantheae, Acereae, Ochnaceae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. 45: fam. Rutariear. Trib.: Simarubeae, Diosmeae, Ruteae, Zanthoxyleae.
Bartl. 1830. Ord. p. 389: ordo (230) Terebinthinar. Gen.: Peganum, Ruta, Aplophyllum, Bönninghausenia. *Aff.* Cyminosma.

*) „Sic dicta, quod propter multiplices, quos de se praebet usus, maxime eruitur. Fabro Gesneri auctore." (Beckmann Lex bot. p. 187.)

Rutaceae Juss. cont.
Link 1831. Hdb. II. p. 223: ordo 5 Anastemonum. Gen.: Peganum, Ruta, Dictamnus, Adenandra, Diosma, Quassia, Simaruba.
Lindl. 1833. Nix. p. 16; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 130; 1847. Veg. kd. p. 469: ordo Rutalium. Trib.: Cusparieae, Pilocarpeae, Boronieae, Eudiosmeae, Dictamneae, Ruteae, Cneoreae?
Schott 1834. Fragm. bot. Rutac. *Cf.* Ann. sc. nat. 1834. II. p. 230.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 313: fam. (17) Terebinthinear. Gen. ut Bartl.
Endl. 1840. Gen. p. 1159; 1841. Ench. p. 614: ordo Terebinthinear. Gen.: Peganum, Bönninghausenia, Ruta, Haplophyllum, Tetradiclis. Accedit 1843 (Spl. III. p. 100) Malacocarpus.
Colla 1843. Obs. sur. la fam. des Rutacées, etc.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 83: fam. Therebinthinear. Gen.: Ruta, Bönninghausenia.

Rutaceae Rchb. 1828. Consp. p. 194; 1832. Fl. exc. p. 752; 1837. Handb. p. 279; 1841. Nomencl. p. 193: fam. Ranunculiflorar. Divis.: Euphorbiaceae (1832 et 1837 Euphorbieae), Rutariae, Simarubeae.

Rutaceae Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 59. 439 (43): class. 12 Diplochlamydear. Ord.: Zygophylleae, Ruteae, Diosmeae, Zanthoxylaceae, Simarubeae, Ochnaceae.

Rutae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 40 plant. Gen.: Ruta, Dictamnus, Peganum, Fagonia, Zygophyllum, Guaiacum, Diosma, Lawsonia, Cistus, Hypericum, Ascyrum.

Rutaea*) Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 80. 93: nov. g. Meliear. (Turraea floribunda Hochst.)
= Turraeae Linn. pars.

Rutales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 15: nixus Gynobasicar. Ord.: Ochnaceae, Simarubaceae, Rutaceae, Zygophylleae, Xanthoxyleae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 456: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Aurantiaceae, Amyridaceae, Cedrelaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, Connaraceae, Rutaceae, Xanthoxylaceae, Ochnaceae, Simarubaceae, Zygophyllaceae, Elatinaceae, Podostemaceae.

Rutariae Rchb. 1828. Consp. p. 196; 1832. Fl. exc. p. 765: div. Rutacear. Subdivis.: Empetreae, Stackhousieae, Ruteae, Moringeae, Zanthoxyleae, Diosmeae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. Subdivis.: Empetreae, Zanthoxyleae (1841 Xanthoxyleae), Ruteae.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Thalamopetalar. Fam. 272—282.

Rutarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42: ordo Toropetalar. Fam.: Euphorbiaceae, Coriarieae, Ochnaceae, Rutaceae.

Ruteae DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140: trib. Rutacear. Gen.: Ruta, Peganum. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 461. Gen. ead. et Aplophyllum. *Aff.:* Cyminosma. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. Gen. ead. — G. Don 1831. Gen. syst. I.

*) Nomen ex anagr. Turraeae.

Ruteae DC. cont.
p. 778. Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. Gen.: Biebersteinia, Bönninghausenia, Ruta, Haplophyllum. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 275. Gen. ut 1825 et Malacocarpus, Desmophyllum, Bönninghausenia, Tetradiclis.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI: div. Rutacear. Gen. ut A. Juss. et Cneorum.
Rchb. 1828. Consp. p. 197; 1832. Fl. exc. p. 765: subdiv. Rutariar. Gen. ut A. Juss. et Bönninghausenia.
Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44): ordo Rutacear. Gen. ut Rchb. et Acronychia.

Ruteae Rchb. 1837. Handb. p. 282; 1841. Nomencl. p. 196: subdiv. Rutariar. Sect.: *genuinae* (gen.: Peganum, Haplophyllum, Ruta, Bönninghausenia), Diosmeae, Moringeae (1841 exclusae).

Ruteria Medic. (Vorles. II. p. 280) 1789. Phil. Bot. I. p. 208: nov. g. ex typo Psoraleae pinnatae L.
Mönch 1794. Meth. p. 115: g. Thalamostemonis.
= Psoraleae Linn. pars.

Ruteria „Medic." DC. 1824. Prodr. I. p. 710: sect. Rutae. (Ruta pinnata L.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 778. — Endl. 1840. Gen. n. 6027 *a*. p. 1161; 1841. Ench. p. 614. — Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7491. 2.
= Desmophyllum WB.

Ruthea Opatowski 1836 in Wiegm. Arch. Jahrg. II. 1. p. 4: nov. g. Boletoideor. (Agaricus lateralis Schäff.) *Cf.* Flora Lit. VI. p. 137.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 497: g. Agaricinor. genuinor. Sect.: Tapinia, Lepista.
= Rhymovis Pers.

Rutica Necker 1790. Elem. bot. II. p. 202. n. 924: nov. g. Sysellophytor., ab Urtica L. separatum.

Rutidanthera Planchon 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 261; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 599: subg. Godoyae. — Simil. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 123 (*Ruditanthera*). 177. — Endl. 1850. Spl. V. p. 98. n. 5957 *b* (*Rytidanthera*).

Rutidea DC. 1807. Ann. Mus. IX. p. 219: nov. g. Coffeacear. (R. parviflora.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. IX. 170. n. 885. — Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2026. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 179. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 378: g. Rubiacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 471. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 759.
DC. 1830. Pr. IV. p. 495: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 577.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.
Synon. Rytidea Spreng., Endl.; Rhytidea Spreng.; Ryditea Walp.

Rutidocarpaea DC. 1837. Prodr. VI. p. 72: sect. Dimorphotheeae. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 764 (*Rhytidocarpaea*). — Par.

Rutidocarpaea DC. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 2672 *f.* p. 435; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3085. 6.

Rutidocaryum DC. 1846. Prodr. X. p. 130: sect. Eritrichii. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 153.

Rutidochlamys Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 497: nov. g. Helichrysear. (Rutidosis arachnoidea Hook.)

Rutidopoterium DC. 1825. Prodr. II. p. 594: sect. Poterii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4422 *b.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 595. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 488. — Endl. 1840. Gen. n. 6374 *a.* p. 1244 (*Rytidopoterium*); 1841. Ench. p. 659 (*Rhytidopoterium*).

Rutidosis*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 158: nov. g. Helichrysear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 765 (*Rhytidosis*). — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
Synon. Rytidosis Endl.

Rutidotheca A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 555: sect. Heliophyti.

Rutilia Flor. Flum. IV. t. 19: g. Octandr. Monogyn. (ternata) ex Steud. Nom. II. p. 488.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 48; 1841. Ench. p. 686: inter genera nondum descripta.

Rutosma A. Gray 1849. Gen. bor. am. II. p. 143: nov. g. Rutacear.

Ruttya**) Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 27: nov. g. Acanthacear.
Meisn. 1843. Comm. p. 367: g. Ruelliear.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 309: g. Gendarussear.

Ruyschia***) Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 75. t. 51. f. 2: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 3. 50; 1797. Ind. occ. I. p. 501. t. 11. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 144. n. 363. — Gmel. 1791. Syst. p. 407. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1116. n. 414. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 355. — Pers. 1805. Ench. I. p. 249. n. 560. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVI. 331. n. 958. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 472.
Juss. 1789. Gen. p. 428: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 155. n. 661.
Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104: g. Guttiferar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 792. n. 877; 1830. Gen. I. p. 189. n. 954. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 835.
Choisy 1824 in DC. Pr. I. p. 566: g. Norantear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 281. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 625. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 127.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVIII; 1828. Consp. p. 210. n. 5483: g. Marcgraviear.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 174. t. 292—294: g. Marcgraviacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 44 (32). — Endl. 1840. Gen. n. 5459. p. 1030; 1841. Ench. p. 537. — Walp. 1842. Rep. I. p. 398; 1843. II. p. 811; 1846. V. p. 145. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 404.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Noranthear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 310; 1841. Nom. p. 211. n. 8023: g. Ruyschiear.
Synon. Souroubea Aubl.; Surubea St. Hil.; Loghania Scop.; Logania Gmel.

Ruyschiana „Mill. Dict." Benth. 1834. Labiat. p. 499; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 402: sect. Dracocephali. — Par. Koch 1837. Syn. p. 563. Ed. II. p. 647. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 814. — Endl. 1838. Gen. n. 3638 *e.* p. 623; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4089. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 796. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 389.

Ruyschieae Rchb. 1837. Handb. p. 310; 1841. Nomencl. p. 211: subdiv. Marcgraviear. Gen.: Norantea, Ruyschia.

Ryana Wittst. vid. *Ryania Vahl.*

Ryanaea DC. 1824. Prodr. I. p. 255: g. Patrisiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 279. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 291. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 132 (*Ryanea*). — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 129. 135.
Meisn. 1838. Gen. p. 124 (89): sect. Patrisiae.
= Ryaniae Vahl pars.

Ryanea Spach vid. *praeced.*

Ryania*) Vahl 1796. Eclog. Amer. I. p. 51. t. 9. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 777 (*Ryana*).
Willd. 1799. Sp. II. p. 1164. n. 1030: g. Polyandr. Monogyn.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 439 (Verm. bot. Schr. I. p. 217): g. Passiflorear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 607. n. 1955; 1830. Gen. I. p. 440. n. 2181: g. Flacourtiear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 267.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 474: g. Tiliacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: g. Flacourtianear.
Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4919; 1837. Hdb. p. 273: g. Patrisiear.
Endl. 1839. Gen. n. 5093. p. 925; 1841. Ench. p. 482: g. Paropsiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5068. — Walp. 1843. Rep. II. p. 218.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.
Synon. Patrisia Rich.; Ryanaea et Patrisia DC.

Rydbeckia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 182. n. 1538: nov. g. Gonoophytor., ab Antherico L. disjunctum.
= Phalangium Tourn. (Juss. in Dict. v. 46. p. 475.)

Ryditea Walp. vid. *Rytidea Spreng.*

---

*) ῥυτίδωσις, rugositas.
**) Dicat. J. Rutty.
***) Dicat. Frid. Ruysch, prof. Amstelodam.

*) Dicat. Joh. Ryan, collectori plantarum.

Ryditophyllum Walp. vid. *Rytidophyllum Mart.*

Ryditostylis Walp. vid. *Rytidostylis Hook. & Arn.*

Rykia*) De Vriese 1854. Pl. nov. h. Lugd. Bat. (Linnaea XXVI. p. 763); 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 268: nov. g. Pandanear. (Pandanus furcatus Roxb.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 858.

Rymia Endl. 1839. Gen. n. 4250. p. 743; 1841. Ench. p. 363: nov. g. Ebenacear. (Royena polyandra L.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 400.
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5291: g. Diospyrear.

Rymia A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 216: sect. Eucleae.

Rynchospermum Lindl. vid. *Rhyncospermum A. DC.*

Rynchospora Vahl, Link vid. *Rhynchospora.*

Rynchostylis Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 258: nov. g. Orchidear. — Par. Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 128 (*Rhynchostylis*).
= Saccolabium Lindl.?

Ryparia Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VIII: g. Euphorbiacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5836. p. 1118; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7392. (genuinar.) — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 239 (*Ryparia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 339: g. Jatrophidear.
Synon. Ryparosa Blume.

Ryparosa**) Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 600: g. Crotonear.
= Ryparia Blume.

Rysodium Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 105: sect. Astragali. (A. pterostylis DC.)

Ryssopteris Hasskarl vid. *seq.*

Ryssopterys „Blume mss." A. Juss. 1837 in Deless. Ic. sel. III. p. 21. t. 35: nov. g. Malpighiacear. (R. timorensis.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 764 (*Rhyssopterys*). — Par. Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 133 (*Ryssopteris*).
Endl. 1840. Gen. n. 5580. p. 1062; 1841. Ench. p. 557: g. Notopterygiar.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 286; 1843. Arch. Mus. III. p. 383. t. 11: g. Banisteriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7859. — Meisn. 1843. Comm. p. 347. — Walp. 1846. Rep. V. p. 220.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Banisterear.

Rytachne Endl., Rchb. vid. *Rhytachne Desv.*

Rytidanthera Endl. vid. *Rutidanthera Planch.*

Rytidea Spreng. 1825. Syst. I. p. 754. n. 801; 1830. Gen. I. p. 169. n. 850 (*Rhytidea*):

*) Dicat. Ammirall J. C. Ryk.
**) ῥυπαρός, sordidus.

Rytidea Spreng. cont.
g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 570 (*Rhytidea*).
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2805.
Endl. 1838. Gen. n. 3155. p. 534; 1841. Ench. p. 272: g. Coffear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 479 (*Ryditea*).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
= Rutidea DC.

Rytidoloma Turczan. 1852. Bull. soc. Mosc. Nr. 2 (Flora 1853. p. 723): nov. g. Asclepiadear., Dictyantho aff.

Rytidophylleae Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 9: trib. Gesneracear. Subtrib.: Moussonieae, Eurytidophylleae, Solenophoreae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 431.

Rytidophyllum Martius 1829. Nov. gen. III. p. 38: nov. g. Gesnerear. (Gesnera tomentosa L.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 8. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672 (*Rhytidophyllum*). — Regel 1848. Flora p. 246.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 650: g. Conradiear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 524: g. Gesneriear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 574. — Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358.
Endl. 1839. Gen. n. 4168. p. 722; 1841. Ench. p. 349 (*Rhytidophyllum*): g. Eugesnerear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 721 (*Ryditophyllum*).
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4677: g. Gloxiniear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 6. t. 206.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 199. 205 (*Rhytidophyllum*): g. Rhytidophyllear.
Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Eurytidophyllear.

Rytidopoterium Endl. vid. *Rutidopoterium DC.*

Rytidosis Endl. 1838. Gen. n. 2729. p. 444; 1841. Ench. p. 242: g. Helichrysear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3504.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
= Rutidosis DC.

Rytidosperma C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 359: sect. Arthrosolenis. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2100 C (*Rhytidosperma*).

Rytidosperma Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 425: nov. g. Avenacear.

Rytidospermum Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 474: sect. Magnoliae. (M. Umbrella Lam.)
= Magnoliastri DC. pars.

Rytidostylis Hook. & Harv. 1841 in Beech. voy. Bot. p. 424.
Endl. 1841. Spl. I. n. 5145/1. p. 1422; 1841. Ench. p. 491: g. Cucurbitear. minus notum. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Walp. 1843. Rep. II. p. 204 (*Ryditostylis*).

Rytidostylis Hook. & Harv. cont.
stylis); 1846. V. p. 762. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 20. 109. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3948 (*Rhytidostylis*): g. Bryoniear.?

Rytidotrochis Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 126: subg. Lagerströmiae.

Rytiglossa Steud. vid. *Rhytiglossa Nees.*

Rytigynia Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 12. p. 178: nov. g. Euguettardear. (R. senegalensis.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 766.

Rytilix Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 83): nov. g. Cyperacear. (Manisuris granularis et myurus.)

Rytiphlaea Agardh 1817. Alg. p. XXV: nov. g. Confervoidear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 478.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 382: sect. Gastridii.
Agdh. 1824. Syst. p. XXX. 160; 1828. Spec. II. 1. p. 50: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 70. p. 6; 1841. Ench. p. 4. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 709.
Fries 1825. Pl. homon. p. 333 (*Rhytiphlaea*): g. Floridear.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 489 (*Rhytiphloea*): g. Sphaerococcear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Ceramidear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 751. p. 306 (*Rhytiphloea*): g. Floridar.
Duby 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 6: Rhodomelae injungit.
Decne 1840. Bull. Ac. Brux. VII. 1. p. 414; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): g. Rytiphlear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 26; 1842. Alg. medit. p. 145: g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 47. n. $122/_{66}$. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 168. — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 700.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 334; 1849. Sp. Alg. p. 844. n. 553: g. Rytiphlaeacear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: g. Rytiphlaeinear.
Derb. & Sol. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 275: g. Antherozoidear.

Rytiphlaea Agardh cont.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 28; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 224: g. Rhodomelacear.
Synon. Lophyros Targ. pt.; Rytiphloea Menegh.

Rytiphlaeaceae Kütz. 1843. Phycol. gener. p. 442. 447; 1845. Phycol. germ. p. 334: fam. Platynoblastear. Gen.: Rytiphlaea, Dictyomenia.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 844: fam. Axonoblastear. Gen. ead. et Kützingia, Odonthalia, Spirhymenia, Epineuron, Lenormandia. = Rytiphloeaceae Kütz.

Rytiphlaeineae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 107: subtrib. Rhodomelear. Gen.: Rytiphlaea, Kützingia, Dictyomenia, Epineuron.

Rytiphleae Decaisne 1840. Bull. Ac. Brux. VII. 1. p. 414 (*Rytiphlées*): nova fam. Algar. Gen.: Amansia, Dictyomenia, Rytiphlaea, Rhodomela, Osmundaria.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 161 (*Rytiphleaeae*); 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Bindera, Polysiphonia, Rhodomela, Odonthalia, Dictyomenia, Spirhymenia, Rytiphlaea, Amansia; Leveillea, Polyzonia; Acanthophora, Dictyurus.
Brongn. 1843. En. genr. p. 2: fam. Choristosporear.

Rytiphleaeae Decaisne 1841 vid. *praeced.*

Rytiphloea Menegh. 1838. Cenni p. 32: g. Ceramiear.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 152: g. Floridear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phyc. gener. p. 447: g. Rytiphloeacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Rhodomelear. — Par. Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ... — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XI. p. 279.
= Rytiphlaea Agdh.

Rytiphloeaceae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106: fam. Platynoblastear. Gen.: Rytiphloea, Dictyomenia.
Conf. Rytiphlaeaceae Kütz.

S.

Sabadilla*) Brandt & Ratzeb. 1837 in Hayne Arzneigew. XIII. t. 27. *Cf.* Schlechtend. 1844. Linnaea XVIII. p. 444.
Synon. Asagraea Lindl.; Asagraya Wittst. *Cf.* Schoenocaulon A. Gray.

Sabal Adans. 1763. Fam. II. p. 495: g. Palmar. *Cf.* Guers. in Bull. soc. philom. Nr. 67. t. 25. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 250. n. 1016. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 137. n. 1333; 1830. Gen. I. p. 282. n. 1461. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1201.
Pers. 1805. Ench. I. p. 399. n. 892: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Elliott 1817. Sketch I. p. 430. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 230.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 8; .... Palm. p. 255: g. Sabalinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1652; 1841. Nom. p. 58. n. 2294. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XCIII. 1485. — Endl. 1837. Gen. n. 1758. p. 253; 1841. Ench. p. 136. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (267).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Sabalinear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424.
Kunth 1841. Enum. III. p. 245: g. Coryphinar.

*) Nomen a voce hispanica *cebadilla*.

Sabal Adans. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 16: g. Coryphinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 106.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.

Sabalidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 139: subtrib. Coryphear. Gen. Sabalinar. Endl. et Saribus, Pericycla.

Sabalinae Martius 1824. Palm. fam. p. 7 (Flora 1824. I. p. 351): series 1 Palmar. Gen.: Chamaedorea; Thrinax, Sabal, Licuala.
Rchb. 1828. Consp. p. 72: subdiv. Palmar. genuinar. Gen. ead.
Endl. 1837. Gen. p. 252 (ex Mart. mss.); 1841. Ench. p. 136: subtrib. Coryphinar. Gen.: Corypha, Livistona, Licuala, Brahea, Copernicia, Sabal, Chamaerops, Trithrinax, Rhapis, Thrinax. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 357 (266). Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 158: sect. Coryphariar.
Rchb. 1841. Nom. p. 58: subdiv. Coryphinar. Gen. ut Endl.

Sabalineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: trib. Palmar. Gen.: Chamaedorea, Sabal, Thrinax, Licuala.
Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424: subtrib. Coryphinear. Gen. Sabalinar. Endl.

Sabatia Adans. 1763. Fam. II. p. 503: g. Apocynor.
Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346: g. Gentianear.
= Sabbatia Salisb.?

Sabattia DC. vid. *Sabbatia Mönch.*

Sabazia Cassini 1827. Dict. v. 46. p. 480: nov. g. Heleniear. (Eclipta humilis Kth.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 264; 1830. v. 60. p. 575: g. Galinsogear.
Less. 1830. Linnaea V. p. 148: g. Helianthear.
Less. 1832. Syn. p. 211: g. Siegesbeckiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 496: g. Ecliptear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2452. p. 398; 1841. Ench. p. 237. Sect.: Ecliptoides, Viborgioides. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3102. Sect.: Sabazia, Viborgianthe. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Synon. Wiborgia HBK.; Viborgia Steud.; Baziasa Steud.

Sabazia Rchb. 1841. Nomencl. p. 81. n. 3102. 1: sect. Sabaziae.
= Ecliptoides Endl.

Sabbata Arrab. ex Steud. Nomencl. II. p. 489: g. Cichoracear. (Sp. polyphylla et romana.) Quid?

Sabbatia Mönch 1794. Meth. p. 386: nov. g. Petalostemonis. (Satureia juliana L.)
DC. 1805. Franç. III. p. 524 (*Sabattia*): sect. Satureiae.
= Micromeria Benth.

Sabbatia*) Salisb. 1805. Parad. Lond. t. 32.
Pursh 1814. Fl. bor. am. I. p. 138.
Elliott 1817. Sketch I. p. 282: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 135. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XV. 173. n. 662.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 474; 1825. Syst. I. p. 580. n. 620; 1830. Gen. I. p. 143. n. 715: g. Gentianear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 482. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 35. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 647. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3493: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3546. p. 603; 1841. Ench. p. 302.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 206: g. Chironiar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5094: g. Erythraeariar.
Griseb. 1838 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 69; 1839. Gent. gen. p. 120: g. Chlorear. Sect.: Eusabbatia, Pseudochironia. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 4.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 49: g. Sabbatiear.
Synon. Sabatia Adans.?

Sabbatieae Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 49: div. Chlorear. Gen.: Sabbatia, Eustoma, Zygostigma, Sebaea, Lagenias.

Sabbazia „Cass." Steud. Nomencl. II. p. 489: lege *Sabazia Cass.*

Sabdariffa DC. 1824. Prodr. I. p. 453: sect. Hibisci. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5273 *g;* 1841. Nom. p. 200. n. 7642. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 483. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 52.
Endl. 1840. Gen. n. 5277 *b γ*. p. 982; 1841. Ench. p. 512: subsect. Ketmiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370: g. Hibiscear.

Sabia*) Colebr. 1817. Linn. Trans. XII. p. 355. t. 14.
Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 308: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 779. n. 852; 1830. Gen. I. p. 179. n. 904. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 69: g. Anacardiear.
Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55): g. Spondiacear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5927. p. 1135; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. (anomalum.) — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 557. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. (?)
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5682: g. Spondicar. anomalum.
Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 23. p. 368: g. Sabiacear. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 209. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 138.
Synon. Meniscosta Blume; Meniscotia Rchb.; Enantia Falc.

Sabiaceae Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 23. p. 368: nova fam. inter Menispermaceas et Lardizabaleas media. Gen.: Sabia. *Cf.* Griseb. 1851. Arch. f. Naturg. II. p. 361.

*) Dicat. L. Sabbati, botanico italo.

*) *Soobja* Bengalensium.

Sabiaceae Blume cont.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 206. (Müll. Ann. bot. IV. p. 137.) Gen. id.

Sabicea Aublet 1775. Guian. I. p. 192. t. 75. 76: nov. g. Pentandr. Monogyn. (S. cinerea et aspera.) — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 3. 46. — Gmel. 1791. Syst. p. 367.
Juss. 1789. Gen. p. 207; 1820. Mém. Mus. VI. p. 400: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 448. — Pers. 1805. Ench. I. p. 203. n. 455. — Hedw. 1806. Gen. p. 149. n. 638. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XX. 264. n. 927. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 492.
Neck. 1790. El. I. p. 139. n. 241: g. Sphanidophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 489: g. Asperifoliar.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 417: g. Hameliacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 66. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2114. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 192. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 227.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Hamellidiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Hedyotidear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 439: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 539. — Endl. 1838. Gen. n. 3224. p. 546; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2921. — Walp. 1843. Rep. II. p. 489.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.
Synon. Schwenkfelda Schreb.; Schwenkfeldia Willd.; Paiva Fl. Flum.

Sabina*) Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 336: g. pl. class. XVI.
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 291; 1842. Vég. phan. XI. p. 313: sect. Juniperi. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 17; 1847. Gen. Spl. IV. p. 2. n. 1789 c. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 681. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 444. — (Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 159.
Synon. Cedrus Tourn.

Sabinaea Walp. vid. *seq.*

Sabinea**) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 92: nov. g. Leguminosar. (Robinia florida Vahl.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 495. — Spreng. 1827. Cur. post. p. 263; 1831. Gen. II. p. 584. n. 2871.
DC. 1825. Pr. II. p. 263: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3900; 1841. Nom. p. 148. n. 5737. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 239. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6548. p. 1274; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 680 (*Sabinaea*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Sabinites Endl. 1847. Syn. Conif. p. 271: sect. Juniperitis.

*) A Sabinis populis, apud quos frequentissima fuit, dicta creditur.
**) Dicat. J. Sabine, botanico Londin.

Sabsab Adans. 1763. Fam. II. p. 31: g. Phalaridum.
= Paspalum Linn.

Sabulina Rchb. 1832. Fl. exc. p. 785: g. Stellarinar. Sect.: Sabulina (tenuifolia, setacea, austriaca, striata, etc.), Alsinanthus, serius (Fl. sax. 1844. p. 433) Sabulina, Tryphane.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 208: g. Alsinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7768: g. Minuartiear.
= Alsines Wahlenb. pars.

Sabulineae Fenzl 1840 in Endl. Gen. p. 963; 1841. Ench. p. 505: trib. Alsinear. Subtrib.: Sagineae, Eualsineae. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 245. Subtrib. eaed.
Rchb. 1841. Nom. p. 204: sect. Stellarinar. Subsect.: Buffonieae, Cherlerieae, Minuartieae.

Sacaglottis G. Don vid. *Sacoglottis Mart.*

Saccanthera Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 329: sect. Pentstemonis.

Saccarum St. Hil. vid. *Saccharum Linn.*

Saccellium Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 46. t. 13: nov. g. Rhamnor. *Cf.* Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 80.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 207: g. Borraginear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 228.
Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 531: g. Borraginear.
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2991: g. Hydrophyllear.?
Spreng. 1831. Gen. II. p. 692. n. 3493: g. Monoec. Pentandr.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): g. Cordiacear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 501: g. Cordiear.?
Synon. Sacellium Spreng.

Saccharapia Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 49: g. Pyror. (*Zuckerbirne.*)

Sacchareae Griseb. 1844. Rumel. II. p. 472; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265: subtrib. Panicear. Gen.: Imperata, Erianthus, Andropogon, Pollinia, Sorghum. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 364. Cohortes: Zoysieae, Andropogoneae, Anthistirieae, Eusacchareae.

Saccharina Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 53. 65: nov. g. Fucor. (Fucus saccharinus L.)
= Laminariae Lamx. pars.

Saccharinae Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 181; 1822. Syn. I. p. 237: trib. 7 Graminear. Gen.: Perotis, Saccharum, Imperata, Eriochrysis, Erianthus, Andropogon, Anthistiria, Calamina, Apluda, Sorghum, Diectomis, Elionurus. *Dubia*: Rhaphis, Ischaemum, Meoschium, Pogonatherum, Dimeria, Arthraxon. — Par. Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 140. 171. 182.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 176: ordo 7 Graminum. Gen.: Saccharum, Erianthus, Imperata, Perotis, Pogonatherum, Andropogon, Pollinia, Anatherum, Cymbopogon,

Saccharinae Kunth cont.
Anthesteria, Tetrapogon, Apluda, Zeugites, Sorghum.
Rchb. 1828. Consp. p. 52 (1830. Fl. exc. p. 33): div. Graminear. Gen.: Elyonurus, Diectomis, Meoschium, Lepeocercis, Pogonatherum, Heteropogon, Schizopogon, Rhaphis, Cymbopogon, Andropogon, Pollinia, Thelepogon, Dimeria, Xerochloa, Apluda, Zeugites, Spodiopogon, Anthestiria, Calamina, Calamochloë, Sorghum; Perotis, Diplachyrium, Imperata; Erianthus, Saccharum; Pharus, Leptaspis. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31. Gen. ead. (exclusis paucis) et Hierochloë, Anthoxanthum.
Rchb. 1837. Hdb. p. 146: subdiv. Andropogonear.
Saccharinae Presl 1830 in Reliq. Hänk. I. p. ... : trib. Graminear. Subtrib.: Hordeaceae, Ischaemeae, Rottbölliaceae, Tripsacineae, Andropogoneae, Anthistiriaceae.
Saccharinae Rchb. 1841. Nomencl. p. 37: div. Graminear. Subdivis.: Pappophoreae, Chlorideae, Andropogoneae.
Saccharineae Nees 1829. Agrost. Bras. p. 312: fam. Graminear. Gen.: Eriochrysis, Erianthus, Saccharum, Arthropogon, Anatherum, Andropogon, Schizachyrium, Diectomis, Trachypogon, Elionurus, Spodiopogon, Heteropogon, Hypogynium, Anthesteria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Calliflorar. Gen.: Imperata, Saccharum, Erianthus, Perotis, Eriochrysis.
Saccharophorum Necker 1790. Elem. bot. III. p. 209. n. 1576: g. Achyrophytor.
Endl. 1837. Gen. n. 939 *a*. p. 107; 1841. Ench. p. 60: sect. Sacchari.
Synon. Tricholaena Schrad.
Saccharum*) Linn. 1737. Gen. p. 18. n. 49; 1737. Cliff. p. 26; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 19; 1753. Sp. I. p. 54; 1759. Syst. ed. X. p. 869. n. 68; 1762. Sp. ed. II. p. 79; 1764. Gen. ed. VI. p. 32. n. 73; 1767. Syst. ed. XII. p. 85: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 88; 1784. Syst. p. 103. — Reich. 1778. Gen. p. 33. n. 79. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 45. n. 104. — Lour. 1790. Coch. I. p. 52. — Gmel. 1791. Syst. p. 152. — Pers. 1797. Syst. p. 105; 1805. Ench. I. p. 102. n. 184. — Willd. 1797. Sp. I. p. 320. n. 122; 1809. En. p. 82. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 59. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 26. t. 232; 1824. Ind. ed. Wall. I. p. 239; ed. 1832. p. 234. — Trin. 1820. Fund. p. 167. t. 15. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 536.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 135. — Link 1821. En. I. p. 105. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 61. n. 299.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 394. — Juss. 1789. Gen. p. 30. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 100. — Poir. 1804. Dict. v. 6. p. 337 (*Canamelle*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 76 (*Saccarum*). — DC. 1805. Franç. III. p. 29. — Hedw. 1806. Gen. p. 35.

*) σάκχαρ s. σάκχαρον Graecorum.

Saccharum Linn. cont.
Sect.: Imperata, Erianthus. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 203. Ed. Nees p. 59. — Palis. 1812. Agrost. p. 6. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 12. 285. n. 213. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 281. n. 296. — Link 1829. Hdb. I. p. 90. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 98.
Gled. 1764. Syst. p. 14. n. 50: g. Thalamostemonum.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 583 (Verm. bot. Schr. I. p. 114): g. Panicear.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 181; 1822. Syn. I. p. 237: g. Saccharinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 176. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 989; 1830. Fl. exc. p. 34. Sect.: Eriochrysis, Saccharum. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Link 1827. Hort. I. p. 236: g. Villiflorar.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 317: g. Saccharinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64. — Boit. 1849 in Orb. Dict. III. p. 121 (*Canne à sucre*).
Kunth 1830. Gram. p. 158: g. Andropoginear.
Kunth 1833. Agrost. p. 474: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 939. p. 107; 1841. Ench. p. 60. Sect.: Saccharophorum, Eriopogon. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 20. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 398. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1356. Sect.: Eriopogon, Saccharum. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Brongn. 1843. En. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Steud. 1854. Glum. I. p. 405. Sect.: Saccharum, Erianthus.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 308: g. Andropogineor. Sect.: Saccharum, Erianthus.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265: g. Sacchareár.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 507: g. Eusacchareár.
Synon. Canna mellea Caesalp.; Sacharum Gled.; Phragmites Adans.
Saccidium Lindl. 1835. Orchid. gen. p. 301: nov. g. Ophrydear. (Orchidea pilosa Burch.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1518. p. 209; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1860. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Holotrichidar.
Saccocalyx*) Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 107: sect. Astragali. (A. lineatus, etc.)
Saccocalyx Cosson & Durieu 1853. Ann. sc. 3e sér. XX. p. 80: nov. g. Satureiear. (S. satureioides.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 670.
Saccochilus*) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VIII: g. Orchidear.
= Saccolabium Lindl.

*) σάκκος, saccus.
**) χεῖλος, labium.

Saccoglottis Endl. 1840. Gen. n. 5485. p. 1040; 1841. Ench. p. 545: g. Humiriacear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 425; 1846. V. p. 372. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 298. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 447.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8094: g. Humiriear.
= Sacoglottis Mart.

Saccogyna Dumort. 1822. Comment. bot. p. 113: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. viticulosa, Weberi.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Jungermanniear.
Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 74; 1835. Obs. Jung. p. 21: g. Saccogynear.
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 102; 1836. II. p. 389; 1838. IV. p. XXIII; 1845. Syn. Hepat. p. 194: g. Geocalycear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $427/_{23}$. p. 1343; 1841. Ench. p. 28. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 814. — Gottsche 1845. Nov. Act. Leop. XXI. 2. p. 425. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 283.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Geocalycidar.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 145: g. Hepaticar. foliosar.
Synon. Lippius Gray; Syckorea Corda.

Saccogyneae Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 72: subtrib. Jungermanniacear. Gen.: Cincinnulus, Calypogia, Saccogyna.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 20 (*Saccogineae*): trib. Jungermanniotypar. Gen.: Calypogea, Cincinnulus, Saccogyna, Geocalyx.

Saccolabium Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 292: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1552; 1833. Orchid. p. 220: g. Vandear. (ampliat.) Sect.: Saccolabium, Ceratidium. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1480. p. 205; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2086. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 691.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Synon. Saccochilus Blume; Rynchostylis Blume; Rhynchostylis Hassk.; Gastrochilus Don; Robiquetia Gaudich.; Gussonea Rich.; Gussonia Spreng.; Carteretia A. Rich.

Saccolina Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 404 *a*: sect. Peltigerae.
= Erioderma Fée?

Saccoloma Kaulf. 1820. Berl. Jahrb. f. Pharm. p. 57; 1824. En. Fil. p. 224: nov. g. Polypodiacear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 527. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.)
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Dicksoniear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 684: g. Davalliacear. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 41.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 725. n. 3666: g. Filicum verar.
Presl 1836. Pterid. p. 125: g. Davalliear.
Endl. 1836. Gen. p. 63. n. 647: g. Polypodiear.

Saccoloma Kaulf. cont.
Endl. 1841. Spl. I. n. 643 *b*. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: sect. Davalliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1032. 2. — Meisn. 1842. Gen. p. 434 (335).
J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 432: g. Dicksoniar.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 170: subg. Davalliae.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 320: g. Nephrolepidear.
Synon. Neuropteris Desv. (Fée.)

Sacconia*) Endl. 1838. Gen. n. 3196. p. 541; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 487.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2846: g. Guettardear. genuinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
Synon. Crusea A. Rich.; Chione DC., non Zool.

Saccopetaleae Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 91: trib. Anonacear. Gen.: Miliusa, Saccopetalum, Alphonsea.
= Miliuseae Hook. f. & Thoms.

Saccopetalum Bennett 1838 in Horsf. Pl. Jav. rar. p. 165. t. 35: nov. g. Annonacear. (S. Horsfieldii.)
Endl. 1841. Spl. I. n. $4712/_1$. p. 1418; 1841. Ench. p. 422: g. Bocagear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422.
Meisn. 1843. Comm. p. 339: g. Anonacear.
Hook. f. & Thoms. 1844. Fl. Ind. I. p. 92: g. Saccopetalear. (p. 151 Miliusear.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 76.
Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 302. 325 (sphalm. *Sarcopetalum*): g. Guatteriear.

Saccophora Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 358: sect. Rulingiae. (R. corylifolia Grah.)

Saccophorum Wittst. vid. *seq.*

Saccophorus Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 32 adnot.: novum nomen pro *Buxbaumia W. & M.* propositum. (*Saccophorum* Wittst. Etym. Handw. p. 779.)

Saccorhiza „De la Pyl. Fl. Terre Neuve p. 23“ J. Agardh 1848. Spec. Fuc. p. 137: nov. g. Laminariear. (Laminaria bulbosa Lamx.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: g. Eulaminariear.
= Haligenia Decne.

Saccothecium „Mont.“ Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 43: g. Sphaeriaceor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 398. (S. saepincola.) — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.

Sacculigera Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. XXXV: sect. Persooniae. (P. macrostachys.)

Saccus Hamilt. vid. *Soccus Rumph.*

Sacellium Spreng. 1826. Syst. III. p. 851. n. 3112: g. Rhamnear.
Endl. 1839. Gen. n. 3739. p. 644; 1841. Ench. p. 319: g. (dubium) Cordiacear. — Par.

*) Dicat. Agostino Sacconi, botanico saeculi XVII.

Sacellium Spreng. cont.
Spach 1840. Vég. phan. X. p. 32. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629. (?)
Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4372: g. Cordicear. dubium.
= Saccellium Humb. & Bonpl.

Sacharinae Agardh 1823. Aphor. p. 152: trib. Graminear. Gen.: Sacharum, Perotis, Ischaemum, Andropogon, Dimeria, Pollinia, Elyonurus, Anthistiria, Apluda, Zeugites, Sorghum.

Sacharomyces Meyen . . . . Pfl. Phys. III. p. 455. t. 10. f. 22.
= Torula Pers.? (Corda Icon. VI. p. 5.)

Sacharum Gleditsch 1749. Mém. Ac. Berl. V. (1751) p. 123: g. Thalamostemonis.
Scop. 1777. Intr. p. 75: g. Graminum legitimor.
Swartz 1788. Prodr. p. 21: g. Triandr. Digyn. — Par. Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 81. 226. — Blanco 1837. Filipin. p. 42.
Batsch 1802. Tab. p. 156: g. Graminear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.
= Saccharum Linn.

Sacidium Nees 1823 in Kunze Mykol. Heft. II. p. 64. t. 2. f. 2: nov. g. Fungor. (S. Chenopodii.) *Cf.* Isis 1825. p. 69 et Leman 1827. Dict. v. 46. p. 536.
Fries 1825. Pl. homon. p. 122: g. Xylomaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 234.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 264: g. Cytisporeor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 124: g. Sphaeronemear.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 64: g. Sphaeropsideor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 420.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
= Phoma Fries?

Sackea*) Rostkov. 1844 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. V. p. 4. 33. t. 15. 16: nov. g. a Bovista sejunctum. (S. nigrescens et plumbea.)
= Bovista Fries.

Sacoglottis**) Martius 1827. Nov. gen. II. p. 146: nov. g. inter Styracinas et Meliaceas medium. (S. amazonica.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 380.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 676 (*Sacaglottis*): g. Humiriacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 47 (34). — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 4. 5. — Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 103. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 385.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314: g. Humiriear.
Synon. Saccoglottis Endl.

Sacranthus „Don" Endl. Ench. p. 331 in synon. Nicotianae: vid. *Sairanthus G. Don.*

Sadlera Leman vid. *seq.*

Sadleria***) Kaulfuss 1824. Enum. Fil. p. 161: nov. g. Polypodiacear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 538 (*Sadlera*). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 18. (indusiatar.)

*) Dicat. Dr. Sack.
**) σάκος s. σάκκος, saccus.
***) Dicat. Jos. Sadler, prof. botan. Pestin.

Sadleria Kaulf. cont.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Blechnear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 95. n. 3265; 1831. Gen. II. p. 723. n. 3658: g. Filicum verar.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 712: g. Blechnoidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Presl 1850. Epimel. bot. p. 480: g. Blechnopsidear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 79: g. Lomariear.
= Blechni Willd. pars.

Saelanthus*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 33: nov. g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 539.
Scop. 1777. Intr. p. 102: g. Disparium.
= Cissus Linn.

Saesia „Adans." Endl. in synon. Daedaleae: vid. *Sesia Adans.*

Safran Medic. 1790. Act. Theod. Palat. VI. p. 473: nov. g. ex typo Croci sativi et officinalis L.

Sagedia**) Achar. 1810. Lich. univ. p. 71. 327. t. 6; 1814. Syn. Lich. p. 134: nov. g. Phymatoideor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 47. p. 2.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Scutellatar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 259; 1831. Lich. eur. p. 7. 412: g. Endocarpear. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 390. — Endl. 1836. Gen. n. 156. p. 14; 1841. Ench. p. 10. — Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 537. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; XI. p. 286. — Bayrh. 1849. Taun. p. 94.
Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 378: g. Endocarpicar.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 16: g. Verrucariear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 120. — Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 362. — Arnold 1858. Flora p. 553. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 383.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Pertusariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Endocarpidar.
Synon. Enterographa Fée; Stigmatidium Meyer?

Sagenaria „Sternb. Vers. I. p. 10" ex Unger. Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 224: g. Vegetabilium foss. class. II.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 177: g. Lycopodiacitum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 129; 1846. Chlor. prot. p. LVII: sect. Lepidodendri.
Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 20. t. 6: g. Sagenariacear.

Sagenariaceae Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 17: fam. plant. foss. Gen.: Lomatofloyos, Sagenaria, Leptoxylum, Heterangium.
Conf. Lepidodendreae Endl.

Sagenia***) Presl 1836. Pterid. p. 86: nov. g. Aspidiariar. (Polypodium lobatum Rich.)

*) *Saela* Arabum.
**) „σάγη, scutum, tegmen; εἶδος, similis."
***) σαγήνη, rete.

Sagenia Presl cont.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 410; 1842. ibid. IV. p. 184: g. Aspidiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 312.
Endl. 1841. Spl. I. n. 640 *e*. p. 1349; 1841. Ench. p. 37: sect. Aspidii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1028. 5. — Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Sagenopteris Presl 1838 in Sternb. Vers. II. p. 164: g. Filicitum.
= Acrostichites Göpp.

Sagenopteris „Brongn." A. Braun 1847. Flora I. p. 84: g. Marsileacear. foss.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 82: g. Filicum foss.

Sageraea Dalzell 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 207: nov. g. Bocagear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 93: g. Uvariear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 50.

Sageretia*) Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 359: nov. g. Rhamnear. (Rhamnus theezans Vahl.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 22 (p. 28 *Segeretia*). — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51).
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3812: g. Frangulacear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 263: g. Rhamnacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582.
Endl. 1840. Gen. n. 5720. p. 1096; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5591. (genuinar.) — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 645.

Sagina Linn. 1737. Gen. p. 118. n. 336; 1740. Syst. ed. II. p. 22: g. Octandr. Tetragyn.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 55. n. 129; 1753. Sp. I. p. 128; 1759. Syst. ed. X. p. 902. n. 162; 1762. Sp. ed. II. p. 185; 1764. Gen. ed. VI. p. 68. n. 176; 1767. Syst. ed. XII. p. 131: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 119. — Murr. 1774. Syst. p. 141; 1784. Syst. p. 169. — Reich. 1778. Gen. p. 71. n. 188. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 93. n. 236. — Gmel. 1791. Syst. p. 289. — Pers. 1797. Syst. p. 175; 1805. Ench. I. p. 153. n. 343. — Willd. 1797. Sp. I. p. 718. n. 271; 1809. En. p. 173. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 109. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 864. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 377. 482.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 26. n. 104: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 234.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 300. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 239. — Batsch 1802. Tab. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 111. — Hedw. 1806. Gen. p. 83. n. 385. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III.

*) Dicat. Sageret, botanico Paris.

Sagina Linn. cont.
p. 36. 497. n. 604. — Link 1821. En. I. p. 149. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 19. — Kunth 1824. Syn. III. p. 339. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 497. n. 562; 1830. Gen. I. p. 116. n. 587. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 3. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 155. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 172. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 552.
Adans. 1763. Fam. II. p. 257: g. Alsinium.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[8]: g. Tetrapetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 152. n. 843: g. Catotaphytor.
Cram. 1803. Disp. p. 40 in Tetrandr. Monogyn. (virginica) et p. 68 in Pentandr. Pentagyn.
DC. 1805. Franç. IV. p. 768; 1824. Pr. I. p. 389: g. Alsinear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 651. — Presl 1826. Sicul. I. p. 157. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 206. n. 5341. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Rel. Hänk. II. 1. p. 14; 1830. Ord. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 419. — Link 1831. Hdb. II. p. 250. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 43. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (22). — Webb & Berth. ... Canar. I. p. 146. — Kunth 1838. Berol. I. p. 121. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 177. — Godr. 1842. Obs. fam. Alsin. (Flora 1842. Lit. p. 90.) Emend. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 117. Sect.: Saginella, Spergella. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 196. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 497.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 834: g. Saginear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 204. n. 7761. — Endl. 1840. Gen. n. 5224. p. 963; 1841. Ench. p. 505. — Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 338. — Gren. (& Godr.) 1848. France. I. p. 245. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 246. Sect. ut Koch 1843.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 109: g. Alsinacear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 793: g. Stellarinar. Sect.: Sagina, Saginaria.
Synon. Alsinella Dill.; Agina Neck.; Phaloë Dumort.

Sagina Koch 1836. Syn. p. 108: g. Alsinear.
= Saginella Koch 1843.

Saginaria Rchb. 1832. Fl. exc. p. 794: sect. Saginae. (Arenaria quadrivalvis R. Br.)
= Alsines sp. Koch.

Sagineae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 834: div. Caryophyllear. Gen.: Sagina, Buffonia, Möhringia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 297: sect. Stellarinar. Gen.: Buffonia, Möhringia, Leucostemma; Goufeia, Dichoglottis, Brachystemma, Odontostemma; Sagina, Mönchia, Esmarchia; Alsinella, Spergulastrum. — Par.

Sagineae Spreng. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 204. Gen.: Sagina, Spergella.
Fenzl 1840 in Endl. Gen. p. 963; 1841. Ench. p. 505: subtrib. Sabulinear. Gen.: Sagina. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 245. Gen. id.

Saginella Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5227 *i*. p. 965; 1841. Ench. p. 505: sect. Alsines.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7770: g. Minuartiear.

Saginella Koch 1841. Flora II. p. 503: sect. Spergulae.
Koch 1843. Syn. ed. II. p. 117: sect. Saginae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 277.

Sagiolechia*) Massalongo 1854. Geneacaena Lich. p. 11: nov. g. Lichenum. (S. protuberans.)
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Eulecideinar.
Arnold 1858. Flora p. 508: g. Sarcogynear.

Sagitta „C. Bauh." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 54. Ed. Hall. 1745. p. 60: g. pl. class. III.
Vaill. 1719. Act. Ac. Paris. p. 25: g. plant.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 104. t. 4: g. Gymnopolyspermar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 459: g. Ranunculor.
Scop. 1772. Carn. II. p. 239: g. Monoec. Polyandr.
Mönch 1794. Meth. p. 219: g. Thalamostemonis.
= Sagittaria Linn.

Sagittaria**) Linn. 1737. Gen. p. 289. n. 723; 1737. Cliff. p. 446; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 993; 1759. Syst. ed. X. p. 1270. n. 946; 1763. Sp. ed. II. p. 1410; 1764. Gen. ed. VI. p. 494. n. 1067; 1767. Syst. ed. XII. p. 628: g. Monoec. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 715; 1784. Syst. p. 856. — Reich. 1778. Gen. p. 490. n. 1164. — Lour. 1790. Coch. II. p. 570. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 643. n. 1441. — Pers. 1797. Syst. p. 900; 1807. Ench. II. p. 563. n. 2087. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 189. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 409. n. 1687; 1809. En. p. 971. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 212. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 5. 156. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 644.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 208.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 300: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Tripetalodear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 46.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tripetaloidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 167. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 620.
Gled. 1764. Syst. p. 109. n. 445: g. Thalamostemonum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 207: g. Polyantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 160: g. Tripetalar.

Sagittaria Linn. cont.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462: g. Aracear.
Scop. 1777. Intr. p. 258: g. Polycarpiar.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 242: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 884. — Rebent. 1804. Neom. p. 228.
Neck. 1790. El. II. p. 325. n. 1111: g. Acascophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 159: g. Alismoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 122: g. Potameor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 113: g. Juncinear.
DC. 1805. Franç. III. p. 190: g. Alismacear. — Par. Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 250. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 128 (*Fléchière*). — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 215. — Kunth 1822. Syn. I. p. 261; 1838. Berol. II. p. 296; 1841. Enum. III. p. 155. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65. — Link 1822. En. II. p. 392; 1829. Hdb. I. p. 280. — D. Don 1825. Nepal. p. 22. — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 34. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 12. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 355. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 209. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 41. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 167. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 241. Subgen.: Sagittela, Lophiocarpus.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 268: g. Butomear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 265: g. Hydrocharidum. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 21.
Agdh. 1822. Aphor. p. 126: g. Alismear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 212 [a]. n. 894 [b]. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 454. n. 2242. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 113. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 246. — Endl. 1837. Gen. n. 1042. p. 128; 1841. Ench. p. 72. — Meisn. 1842. Gen. p. 364 (273). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 109.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 632. n. 2015: g. Hydrocharidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Sagittariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1143.
Synon. Sagitta Bauh., Rupp.

Sagittarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: trib. Alismacear. Gen.: Sagittaria.
Rchb. 1841. Nom. p. 33: subdiv. Alismear. Gen. id.

Sagittela Miquel 1856. Ind. bat. III. p. 241: subg. Sagittariae.

Sagmen Hill 1769. Hort. kew. p. 66: nov. g. Associatar., ex typo Centaureae Scabiosae L.
= Lopholoma Cass.

Sagoinae Rchb. 1828. Consp. p. 71; 1837. Handb. p. 158: subdiv. Palmar. genuinar. Gen.: Calamus, Sagus; Nipa; Lepidocaryum.

Sagonea*) Aublet 1775. Guian. I. p. 285. t. 111: nov. g. Pentandr. Trigyn. (S. palustris.)

*) *σάγιον*, lodix: *λίγος*, tectum. (?)
**) *Sagitta* Plinii.

*) Nomen caribaeum *Sagoun-sagou*.

Sagonea Aublet cont.
Scop. 1777. Intr. p. 192: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 134: g. Convolvulor. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXII. 666.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 309: g. Convolvulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 206. n. 849. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3001.
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 24: g. Convolvulacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 190: g. Hydroleacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 194: g. Hydrolear.
= Hydrolea Linn.

Sagotia*) Duchassaing & Walp. 1850. Linnaea XXIII. p. 737: nov. g. Desmodio proximum. (Hedysarum triflorum L.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 412: g. Euhedysarear.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 222: sect. Desmodii. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 238.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 409 (sphalm. *Lagotia*): g. Diosmear.

Sagraea**) DC. 1828. Prodr. III. p. 170: nov. g. Miconiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 780. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6243. p. 1218; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1376. 1458. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6751. — Walp. 1846. Rep. V. p. 713. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4631: g. Blakeacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 309. n. 1580: g. Melastomear. (Octandr. Monogyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 330.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 92: g. Clidemiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 774.
Synon. Leandroides DC.?

Saguaster major Rumph. 1741. Amboin. I. p. 64. t. 14. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. V. 2. p. 316 (*Seguaster*).
= Caryota Linn.?

Saguaster minor Rumph. 1741. Amboin. I. p. 67. t. 15. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 316 (*Seguaster*).
= Harina Hamilt.?

Saguerus Rumph. 1741. Amboin. I. p. 57.
Adans. 1763. Fam. II. p. 24: g. Palmar. — Par. Link 1822. En. II. p. 392.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 626: g. Monoec. Polyandr.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
= Arenga Labill.

Sagus Rumph. 1741. Amboin. I. p. 72. t. 17. 18. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 318.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 27. t. 10. f. 1.
Gis. 1792. Prael. p. 43: g. Palmar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 131. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 93. — Pers. 1807. Ench. II. p. 562. n. 2082. — Link 1822. En. II. p. 391; 1829. Hdb. I. p. 258. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 25. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 287.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 403. n. 1683: g. Monoec. Hexandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 623.
Mart. 1824. Gen. Palm. bras. fasc. II. p. 53. t. 45. 48; 1824. Palm. fam. p. 12: g. Lepidocaryor.
Rchb. 1828. Consp. p. 71. n. 1617: g. Sagoinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Lepidocaryear.
Endl. 1837. Gen. n. 1741. p. 250; 1841. Ench. p. 135: g. Lepidocaryinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2243.
Meisn. 1842. Gen. p. 354 (265): g. Calamear. Subgen.: Metroxylon, Raphia. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 16. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 140: sect. Metroxyli.
Synon. Palma - pinus Lobel.; Raphia Palis.

Sahagunia*) Liebm. 1851. Mexico's neldeagt. Plant.; 1852. K. danske Selsk. Skr. V. 2. p. 316: nov. g. Morear.

Sahlbergia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 262. n. 418: nov. g. Campylophytor., e speciebus Gardeniae Th. formatum.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2082: g. Cinchonear.?
= Piringa Juss.

Saintmorysia Endl. 1838. Gen. n. 2692. p. 438; 1841. Ench. p. 242: g. Athanasiear. Sect.: Athanasioides, Stilpnoides. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3849. Sect.: Saintmorysia, Stilpnopsis. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 211.
Synon. Morysia Cass.

Sairanthus*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 399. 467: nov. g. Nicotianear. (Nicotiana glutinosa L.)
= Nicotiana Linn.

Sairanthus „Hook. f. mss." Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 164: g. Nicotianear.

Sairocarpus Nuttall mss.
= Antirrhinum Adans. (Benth. in DC. Pr. X. p. 592.)

Saivala Wallich 1831. Catal. n. 5047. (*Saivola* ex Wittst.)
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 4: g. Hydrocharidear.
= Blyxa Pet.-Th.

Saivola Wittst. vid. *praeced.*

Sajor Rumph. 1741. Amboin. I. t. 70. f. 2.
= Sajorium Endl.

Sajorium Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 98. n. $5784/_1$: g. Acalyphear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 480: g. Dysopsidear. (ampliat.) Sect.: Pluknetia, Hedraiostylus, Anabaena.
Synon. Sajor Rumph.; Pterococcus Hassk.; Ceratococcus Meisn.

---

*) Dicat. P. Sagot, medico Francogall.
**) Dicat. Ramon de la Sagra.

*) Dicat. Bernardino de Sahagun.
**) σαίρω, ringo: ob corollam ringentem.

Sakaki Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 777. (Banks Ic. Kämpf. t. 33.)
= Cleyera Thunb.

Salaberria Wittstein vid. *seq.*

Salabertia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 238. n. 985: g. Eredophytor. *Cf.* Wittst. Handw. p. 780 (*Salaberria*).
= Tapirira Aubl.

Salacca Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 3: nov. g. Palmar. (Calamus Salacca W.)
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 64: g. Lepidocaryinar.
Conf. Salakka Reinw.; Zalacca Rumph., Blume.

Salacia Linn. 1771. Mant. II. p. 159. n. 1326: g. Gynandr. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 683; 1784. Syst. p. 820. — Reich. 1778. Gen. p. 460. n. 1105. — Lour. 1790. Coch. II. p. 526. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 607. n. 1380. — Pers. 1797. Syst. p. 865; 1807. Ench. II. p. 525. n. 2009. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 150. n. 1617. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 384.
Scop. 1777. Intr. p. 98: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 424: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. III. p. 109. n. 1438: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 107: g. Triandr. Monogyn.
Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 180; 1827. v. 47. p. 46: g. Hippocraticear. — Par. Poir. 1827. ibid. — R. Brown 1818. Tuck. Cong. App. V. p. 486. (Verm. bot. Schr. I. p. 187.)
DC. 1824. Pr. I. p. 570: g. Hippocrateacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI. — Bartl. 1830. Ord. p. 380. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 627. Sect.: Anthodon, Salacia. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 104. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 400. — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40). — Endl. 1840. Gen. n. 5702. p. 1091; 1841. Ench. p. 576. (restrict.) — Walp. 1846. Rep. V. p. 146. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 585. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 369. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 93.
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5385: g. Hippocratear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 44. n. 202. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 179.
Rchb. 1837. Hdb. p. 301; 1841. Nom. p. 208. n. 7908: g. Salaciear.
Synon. Calypso Pet.-Th.; Johnia Roxb.; Salacioides Pet.-Th.

Salacia Cambess. 1829 in St. Hilaire Fl. Bras. II. p. 104: g. Hippocrateacear. (S. obtusifolia, etc.)
= Tontelea Aubl.

Salacieae Rchb. 1837. Handb. p. 301: subdiv. Hippocratear. Gen.: Anthodon, Salacia, Johnia. — Par. Rchb. 1841. Nomencl. p. 208. Gen.: Tontelea, Salacia.

Salacioides Pet.-Thouars Gen. Madag. t. 6: vid. *Calypso Pet.-Thouars.*

Salacistis Rchb. f. 1857. Bonplandia V. p. 36; 1858. Xen. Orchid. p. 214. t. 87: nov. g.

Salacistis Rchb.
Orchidear., Goodyerae aff. (S. novembrilis.)
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 745: g. Physuridar.

Salakka Reinwardt 1823. Cat. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Dioec.
= Salacca Reinw.

Salamonia Endl. vid. *Salomonia Lour.*

Salanthus „Forsk." Meisn. Comm. p. 51 in synon. Cissi: vid. *Saelanthus Forsk.*

Salaxideae Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 699: subtrib. Ericear. Gen.: Eremia, Grisebachia, Acrostemon, Simocheilus, Sympieza, Syndesmanthus, Codonanthemum, Coilostigma, Codonostigma Scyphogyne, Lagenocarpus, Salaxis. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 751; 1841. Ench. p. 369. Divis.: Coilostigmeae, Sympiezeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 392: subsect. Ericinear. verar. Gen.: Salaxis, Lagenocarpus, Omphalocaryon, Codonostigma, Coilostigma, Codonanthemum, Syndesmanthus, Sympieza, Simocheilus, Acrostemon, Grisebachia, Finckea, Eremia, Microtrema, Thoracosperma.

Salaxis*) Salisb. 1802. Linn. Trans. VI. p. 317: nov. g. ab Erica L. sejunctum.
Willd. 1809. En. p. 415: g. Octandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 514; 1825. Syst. II. p. 202. n. 1409; 1830. Gen. I. p. 299. n. 1530: g. Ericear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 156. — Klotzsch 1834. Linnaea IX. p. 351; 1838. ibid. XII. p. 211. (Symphysandrar.) — D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 157 (normalium). — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 828. — Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1260. Sect.: Philippia, Salaxis. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4904. (genuinar.) Sect.: Salaxis, Coccosperma.
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 76: g. Ericinear.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 710: g. Salaxidear. Sect.: Eusalaxis, Coccosperma. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 392.
Endl. 1839. Gen. n. 4294. p. 751; 1841. Ench. p. 369: g. Coilostigmear. Sect. ut Benth.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.

Salbadora Batsch vid. *Salvadora Linn.*

Saldanha Flor. Flum. III. t. 257: g. Hexandr. Monogyn. (illustris et nobilis) ex Steud. Nom. II. p. 493.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 49 inter genera nondum descripta.

Saldinia A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 206: nov. g. Guettardacear. (Morinda axillaris Poir.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 483: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 569. — Endl. 1838. Gen. n. 3165. p. 536; 1841. Ench. p. 272.

*) *ἅλος*, vacillatio; axis. (?)

Saldinia A. Rich. cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2815: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Salica Hill 1769. Hort. kew. p. 172(24): nov. g. Tetrapetalar. (Lythrum Thymifolia L.) = Hyssopifolia C. Bauh.

Salicaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 186) 1847. Veg. kingd. p. 254: ordo Amentalium. Gen.: Salix, Populus.

Salicaria*) Tourn. 1700. Inst. p. 253. t. 129: g. pl. class. VI. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 133. Ed. Hall. 1745. p. 146.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 405: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 234: g. Salicariar.
Mönch 1794. Meth. p. 664: g. Calycostemonis. = Lythrum Linn.

Salicaria DC. 1826. Mém. soc. Genèv. III. 2. p. 77; 1828. Prodr. III. p. 82: sect. Lythri. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4558 *c.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 712. — Endl 1840. Gen. n. 6149 *c.* p. 1201; 1841. Ench. p. 643. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 10. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 110. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 127.

Salicariae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 56 plant. Gen.: Isnardia, Ammania, Peplis, Glaux, Rhexia, Lythrum, Bäckea, Osbeckia.
Adans. 1763. Fam. II. p. 232: fam. 31 plant. Gen.: Grislea, Parsonsia, Cuphea, Salicaria, Chabraea, Ammannia, Alifanus, Kadali, Tjongina.
Juss. 1789. Gen. p. 330: ordo 9 class. XIV. Gen. §. 1: Lagerstromia, Munchausia, Pemphis, Ginoria, Grislea, Lausonia, Crenea, Lythrum, Acisanthera, Parsonsia, Cuphea. §. 2: Isnardia, Ammannia, Glaux, Peplis.
Batsch 1802. Tab. p. 79: fam. Calycanthemar. Gen. ut Juss. (exclusis 2 primis et Acisanthera.)
DC. 1805. Franç. IV. p. 409: fam. (68) Dicotyledonum. Gen.: Lythrum, Glaux, Suffrenia, Peplis, Ceratophyllum.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 707: fam. 75 plant. Gen.: Lythrum, Crenea, Cuphea, Woodfordia, Grislea, Lagerströmia, Calyplectus, Ginoria, Lawsonia, Peplis, Ammannia, Suffrenia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245 (*Salicaires*): ordo Calyciflorar. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 552: fam. Calyciflorar. Gen.: Lythrum, Portula.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: ordo Calycanthemar. (Div.: Tamaricinae.)
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 639: div. Lythrariear. Gen.: Suffrenia, Peplis, Ammannia, Lythrum.
Lindl. 1833. Nix. pl. p. 17: ordo Onagralium.

*) Nomen a salicis foliorum similitudine.

Salicarieae St. Hilaire 1815. Mém. Mus. II. p. 377: fam. plant. placenta centrali donatar. Gen.: Pemphis, Suffrenia, Adenaria, Lythrum, Cuphea, etc.
DC. 1826. Mém. soc. Genèv. III. 2. p. 71; 1828. Pr. III. p. 75: trib. Lythrariear. Gen.: Rotala, Cryptotheca, Suffrenia, Ameletia, Peplis, Ammannia, Lythrum, Cuphea, Acisanthera, Fatioa, Pemphis, Heimia, Diplusodon, Physocalymna, Decodon, Nesaea, Crenea, Lawsonia, Antherylium, Dodecas, Ginoria, Adenaria, Grislea. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 707. Gen. ead. et Abatia. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. Gen. ut DC. et Hydropityon? — Meisn. 1838. Gen. p. 117 (83). Gen. fere ut DC. et Pleurophora, Didiplis, Anisotes, Physopodium?, Symmetria?, Honottia?, Hydropityon?, Henslowia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: fam. Onagriflorar. Divis.: Lythreae, Melastomeae.
Rchb. 1828. Consp. p. 172; 1837. Hdb. p. 248: subdiv. Lythrear. Gen.: Suffrenia, Ameletia, Rotala; Elatine, Bergia, Peplis, Ammannia, Cryptotheca, Lythrum, Cuphea, Acisanthera, Fatioa, Pemphis, Heimia, Diplusodon, Physocalymma, Decodon, Nesaea, Crenea, Lawsonia, Antherilium, Dodecas, Ginoria, Adenaria, Grislea, Physopodium?, Symmetria? (Emittuntur 1837 Elatine et Bergia.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 172. Gen. Eulythrariear. Endl. et Didiplis?, Decodon, Heimia, Lythropsis, Anisotes.
Bartl. 1830. Ord. p. 317: div. Lythrariear. Gen. ut DC. et Hydropityon?

Salicarinae Link 1821. Enum. I. p. 142. = Lythrarieae DC.

Saliceae HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 22: ordo plant. Gen.: Salix.
D. Don 1825. Nepal. p. 58: div. Amentacear. Gen. id. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 83 (1831. Fl. exc. p. 165); 1837. Hdb. p. 172. Gen.: Salix, Morella, Populus.

Salicinae L. C. Rich. mss. (A. Rich. Elém. ed. IV. p. 560.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 227: fam. Monochlamydear. Gen.: Salix, Populus.
Agdh. 1825. Aphor. p. 208; 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: trib. Amentacear. Gen. ead. et Liquidambar.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (84) Achlamydear.
Bartl. 1830. Ord. p. 118: class. (27) Gymnoblastor. Ordo unicus: Salicinae. (Gen. ut Gray.)
Lindl. 1833. Nix. p. 26: ordo Salicinalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 186.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 223; 1846. Chlor. prot. p. LXXX: ordo Juliflorar. Gen. ut Gray et Rosthornia.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 174: g. Iteoidear.

Salicinales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 26: nixus Achlamydear. Ord.: Salicinae, Plataneae, Balsamifluae.

Salicineae Mirbel 1815. Élém. II. p. 905: fam. Dicotyledonum apetalar. Gen. §. 1: Salix, Populus. §. 2: Betula, Alnus.

Salicineae Mirbel cont.
Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. tot nat. Wet. I (*cf.* Linnaea I. p. 668): trib. Amentacear. Gen.: Populus, Tremula, Salix. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 482. Gen.: Salix, Populus.
Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 81: fam. Amentacear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 134. Gen. ut Dumort.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11. 12: fam. Populariear. Gen.: Salix, Populus.
Koch 1837. Syn. p. 641. Ed. II. p. 739: ordo Monochlamydear. Gen.: Salix, Populus.
Endl. 1837. Gen. p. 290; 1841. Ench. p. 177: ordo Juliflorar. Gen. ead. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 66: div. Amentacear. Gen. ead.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 359: class. (36) Dicotyledonum apetalar. Fam. unica: Salicineae. (Gen. ut Koch.)
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 314: fam. Dicotyledonear. apetalar. diclinar. Gen. ead.
Leybold 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 225. Gen. bras.: Salix.

Salicomia Link vid. *Salicornia.*

Salicorneae Rchb. 1837. Handb. p. 238: sect. Chenopodear. Gen.: Salicornia, Halocnemum.
Rchb. 1841. Nom. p. 164: div. Cyclolobear. Gen. ead. et Halostachys.

Salicornia Tourn. 1700. Corol. p. 51. t. 485: g. pl. class. XV.
Linn. 1737. Cliff. p. 490; 1740. Syst. p. 16; 1742. Gen. ed. II. p. 4. n. 8; 1753. Sp. I. p. 3; 1759. Syst. ed. X. p. 843. n. 10; 1762. Sp. ed. II. p. 5; 1764. Gen. ed. VI. p. 5. n. 10; 1767. Syst. ed. XII. p. 51: g. Monandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 3. — Murr. 1774. Syst. p. 50; 1784. Syst. p. 52. — Reich. 1778. Gen. p. 5. n. 10. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 8. n. 14. — Gmel. 1791. Syst. p. 15. — Pers. 1797. Syst. p. 52; 1805. Ench. I. p. 5. n. 22. — Willd. 1797. Sp. I. p. 23. n. 22; 1809. En. p. 7. — Vahl 1805. Enum. I. p. 9. n. 10. — Thunb. 1807. Fl. cap. I. p. 33. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 1. Ed. Schrank 1819. p. 1. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 2. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 82; ed. 1832. p. 84.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 1. n. 2: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 319.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 23: g. Holeracear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 261: g. Blitor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 1.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 8: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 366: g. Monophyllar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 338: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 86: g. Atriplicum. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 6. 38. n. 31.
Neck. 1790. El. II. p. 199. n. 918: g. Syscelophytor.

Salicornia Tourn. cont.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 260: g. Chenopodear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 396. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 410. Ed. Nees p. 266. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 310; 1825. Syst. I. p. 18. n. 29; 1830. Gen. I. p. 10. n. 30. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 193. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 287. — Kunth 1822. Syn. I. p. 478. — Agdh. 1825. Aphor. p. 215. — Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4319. — Link 1831. Hdb. II. p. 414. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 25. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 307.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
Cram. 1803. Disp. p. 13: g. Diandr. Monogyn. — Par. Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 69. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 289.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 202: g. Attriplicear.
Hedw. 1806. Gen. p. 5. 344: g. Atriplicear. — Par. Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 82. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI.
Link 1821. En. I. p. 5 (sph. *Salicomia*): g. Atriplicinar.
Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 2. 371: g. Salicorniear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 576. — Koch 1837. Syn. p. 603. Ed. II. p. 693. — Endl. 1837. Gen. n. 1908 p. 293; 1841. Ench. p. 181. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234). — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 27. Subgen.: Eusalicornia, Arthrocnemum. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1019.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Salicorniar.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 238; 1841. Nom. p. 164. n. 6357: g. Salicornear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 101: g. Cyclolobear.
= Salicornia Moq. et Arthrocnemum Moq.

Salicornia Moquin-Tand. 1840. Chenop. p. 113; 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 144: g. restrict. Salicorniear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 733. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 31. n. 1908. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 767.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 216.
Synon. Eusalicornia Gren.

Salicorniae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: trib. Chenopodiacear. Gen.: Salicornia.

Salicornieae C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 371: trib. Cyclolobear. Gen.: Halocnemum, Salicornia. — Par. Koch 1837. Syn. p. 603. Ed. II. p. 693. Gen.: Salicornia. — Endl. 1837. Gen. p. 292; 1841. Ench. p. 181. Gen. ut Meyer. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 31) Arthrocnemum et 1843 (Spl. III. p. 63) Halostachys. — Moq.-Tand. 1840. Chenop. en. p. 108. Gen. ut Meyer et Arthrocnemum. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234). Gen. ut Meyer. — A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315. Gen. ut Moq. — Moq.-Tand. 1849 in DC.

Salicornieae C. A. Meyer cont. Pr. XIII. 2. p. 144. Gen. ut 1840 et Kalidium, Halostachys.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 576: subdiv. Atriplicear. Gen.: Salicornia.

Salimori Rumph. 1741. Amboin. II. t. 75.
Adans. 1763. Fam. II. p. 177: g. Borraginum. = . . . ?

Salisburia*) Smith 1797. Linn. Trans. III. p. 340: nov. g. plant.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 472. n. 1700; 1809. En. p. 984: g. Monoec. Polyandr.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. 121: g. Monocarpar.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 297: g. Taxinar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 218: g. Taxear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 61. n. 2340.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 865. n. 3128: g. Amentacear.
A. Rich. 1826. Conif. p. 133. t. 3: g. Taxinear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1803. p. 262; 1841. Ench. p. 144; 1847. Syn. Conif. p. 236; 1847. Gen. Spl. IV. p. 10. n. 1814.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 703. n. 3543: g. Coniferar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 231: g. Taxacear.
Synon. Ginkgo Kämpf.; Ginko Adans.; Salisburya Link.

Salisburya Link 1822. Enum. II. p. 402: g. Amentacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 470: g. Salisburyacear.
Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264): g. Taxinear.
= Salisburia Smith.

Salisburyaceae Link 1831. Handb. II. p. 469: ordo 9 Amentacear. Gen.: Salisburya.

Salisia Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. x: nov. g. Myrtacear. (S. pulchella.) — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 75.
Endl. 1840. Gen. n. 6308. p. 1230; 1841. Ench. p. 650: g. Leptospermear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6839. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Euleptospermear.

Salisia Regel 1848. Ind. sem. h. Turic.; 1851. Linnaea XXIV. p. 197: nov. g. a Gloxinia sejunctum. (G. maculata L.)
= Gloxinia Decne.

Salisia Regel 1849. Flora I. p. 179: nov. g. Gesnerear. (S. gloxiniaefolia.)
= Ligeria Decne.

Saliunca**) Miquel 1844. Syst. Piper. II. p. 525; 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 469; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 61: sect. Artanthes. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. n. $1823/_{11}$ *i*.

Salivaria DC. 1836. Prodr. V. p. 624: sect. Spilanthis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2553 *b*. p. 415; 1841. Ench. p. 239. — Walp. 1843. Rep. II. p. 622. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 80.
Synon. Spilanthes Jacq.

Salix Tourn. 1700. Inst. p. 590. t. 364: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 312: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 331 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 300. n. 742; 1737. Cliff. p. 454; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 295; 1753. Sp. II. p. 1015; 1759. Syst. ed. X. p. 1286. n. 976; 1763. Sp. ed. II. p. 1442; 1764. Gen. ed. VI. p. 514. n. 1098; 1767. Syst. ed. XII. p. 647: g. Dioec. Diandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 252. — Murr. 1774. Syst. p. 735; 1784. Syst. p. 879. — Reich. 1778. Gen. p. 510. n. 1201. — Lour. 1790. Coch. II. p. 609. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 674. n. 1493. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 66. t. 97; 1832. Ind. III. p. 753. — Pers. 1797. Syst. p. 921; 1807. Ench. II. p. 598. n. 2170. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 395. 404. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 225. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 653. n. 1756; 1809. En. p. 1002. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 230. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 196. 204.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 151: g. Juliferar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 446. — Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 241.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 153: g. Amentacear. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 350. — Juss. 1789. Gen. p. 408. — Gis. 1792. Prael. p. 578. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 554. — Batsch 1802. Tab. p. 163. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 317. — DC. 1805. Franç. III. p. 282; 1815. V. p. 337. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 345; 1825. Syst. I. p. 27. n. 129; 1830. Gen. I. p. 31. n. 137. — Link 1822. En. II. p. 413. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 516. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 633. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 426 (*Saule*). — Rchb. 1829 ap. Mössl. III. p. 1731. — Trautv. 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 251.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 5. n. 15: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 335.
Adans. 1763. Fam. II. p. 376: g. Castanear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 492.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 24; 1794. Prodr. I. p. 6; 1807. Fl. cap. I. p. 138: g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 72. — Rebent. 1804. Neom. p. 7.
Hoffm. 1785. Hist. Salicum. (Lips.)
Neck. 1790. El. III. p. 262. n. 1657: g. Axonophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 15 in Diandr. Digyn. (S. hermaphroditica), p. 187 in Dioec. Monandr. et Dioec. Triandr. et p. 194 in Dioec. Pentandr.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 906: g. Salicinear. — Par. Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. I. (sect.: Capri-Salix, Viti-Salix); 1829. Anal. fam. p. 12. — Endl.

*) Dicat. Rich. Ant. Salisbury, botanico anglico.
**) Nomen ex Plinio, sed planta diversa.

Salix Tourn. cont.
1837. Gen. n. 1903. p. 290; 1841. Ench. p. 177. — Koch 1837. Syn. p. 641. Ed. II. p. 739. — Kunth 1838. Berol. II. p. 203. — Hook. .... Fl. bor. am. II. p. 144. — Fries 1840. Botan. Notiser p. 145; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 55. Sect.: Amerina, Helix, Vetrix, Caprea, Chamelix. — Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 361. — Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2463. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 134. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 343. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 372 (*Saule*). — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 596. — Math. 1853. Belg. I. p. 482. Sect.: Cinerella, Daphnella, Viminella, Albella, Arbuscula. — Leyb. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 227. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 122.
Seringe 1815. Monogr. des Saules. (Berne.)
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 22: g. Salicear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 364. — D. Don 1825. Nepal. p. 58. — Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1787; 1831. Fl. exc. p. 165.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 227: g. Salicinar. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 208. — Bartl. 1830. Ord. p. 119. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 224; 1846. Chlor. prot. p. LXXX.
Host 1828. Salix. (Vindob.)
Koch 1828. De Salicibus Eur. comm. (Erlang.)
Sadler 1831. Syn. Salic. hung. (Pesth.)
Fries 1832. Novit. fl. Suec. Mant. p. 21. (Comm. de Salicibus Sueciae.) Tribus: Amerina, Chrysanthos, Vetrix, Chamelix.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 186; 1847. Veg. kd. p. 254: g. Salicacear.
Anders. 1845. Salices Lappon.

Salken Adans. 1763. Fam. II. p. 322: g. Genistar.
= Dalbergia Linn.

Salloa (trinervis) Hasskarl mss.
= Cocculus angustifolius Hassk. (Walp. Rep. V. p. 17.)

Salmacis Bory 1827. Dict. class. XV. p. 75: nov. g. Conjugatar.
Math. 1853. Belg. II. p. 505: sect. Zygnemae.
= Spirogyra Link.

Salmacis Webb & Berth. 1850. Phytogr. Canar. III. p. 320: subg. Danaës. (Ruscus androgynus L.)

Salmalia Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 35: nov. g. Bombacear. (Bombax insigne Wall. et heptaphyllum Roxb.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 28 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5303. p. 989; 1841. Ench. p. 515. — Walp. 1842. Rep. I. p. 330. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361.
Rchb. 1837. Hdb. p. 295 (sph. *Salmasia*): g. Eriodendrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7754: g. Chorisiear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615: g. Adansoniear.

Salmasia*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 201. n. 513: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 500. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1502. n. 575. — Pers. 1805. Ench. I. p. 329. n. 734.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 828; 1825. Syst. I. p. 947. n. 1126: g. Ionidior.?
Spreng. 1830. Gen. I. p. 229. n. 1205: g. Cistear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 999.
= Tachibota Aubl.

Salmasia Rchb. vid. *Salmalia Schott & Endl.*

Salmea DC. 1813. Catal. h. Monsp. p. 140: nov. g. a Bidente L. sejunctum. *Cf.* Bull. soc. philom. 1813. Mai p. 279 et R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. 1. p. 112. (Verm. bot. Schr. II. p. 553.)
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 47. v. 87: g. Helianthear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2637. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19. (verar.)
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 138; 1830. v. 60. p. 576: g. Spilanthear.
Less. 1832. Syn. p. 212: g. Georginear.
DC. 1836. Pr. V. p. 493: g. Ecliptear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2448. p. 397; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 182 (125). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3098. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 43. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 145.
Synon. Hopkirkia Spreng.

Salmea „Cav." Wittst. vid. *seq.*

Salmia**) Cavan. 1794. Icon. III. p. 24. t. 246: nov. g. Hexandr. Monogyn. (S. spicata.) *Cf.* Usteri Neue Ann. XVIII. p. 66 et Wittst. Etym. Handw. p. 781 (*Salmea*).
= Sanseviera Thunb.

Salmia Willd. 1811. Berl. Mag. V. p. 399: g. Aroidar., Potho aff.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 124; 1826. Syst. III. p. 772. n. 3065; 1831. Gen. II. p. 682. n. 3440: g. Aroidear. (Monoec. Androgyn.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 35. 496. n. 602.
= Carludovica Ruiz & Pav.

Salmonea „Lour." Vahl 1805. Enum. I. p. 8. n. 7: g. Monandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 93.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 227: g. Rhinanthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 5. 344. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 5. 37. n. 28.
= Salomonia Lour.

Salmonia Scopoli 1777. Introd. p. 209. n. 919: g. Dumosar.
Neck. 1790. El. II. p. 126. n. 808: g. Plyrontophytor.
= Vochysia Juss.

---

*) Dicat. Claude de Saumaise (lat. Salmasio), prof. Lugdun.
**) Dicat. principi Car. de Salm-Salm.

Salomonia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 14. Ed. Willd. p. 18: nov. g. Monandr. Monogyn. (S. Cantoniensis.)
Juss. 1815. Mém. Mus. I. p. 390: g. Polygaleis aff.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 738; 1817. Syst. I. p. 17. n. 25; 1827. Cur. post. p. 246; 1831. Gen. II. p. 530. n. 2603: g. Polygalear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 333. — D. Don 1825. Nepal. p. 200. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 93. — A. St. Hil. & Moq.-Tand. 1827. Mém. Mus. XVII. p. 352; 1830. ibid. XIX. p. 330. — Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3032; 1841. Nom. p. 175. n. 6778. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 362. — Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 111. (verar.) — Endl. 1840. Gen. n. 5646. p. 1077; 1841. Ench. p. 568; 1850. Spl. V. p. 81 (*Salamonia*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 231. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 239.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378: g. Polygalacear. — Par. Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 123.
Synon. Salmonea Vahl, St. Hil.

Salpianthus**) Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 153. t. 44: nov. g. Nyctaginum. *Cf.* Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 345.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 218: g. Nyctaginear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 380. — Kunth 1823. Syn. II. p. 20. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 124. — Endl. 1837. Gen. n. 2010. p. 312; 1841. Ench. p. 193. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 516.
Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1845: g. Allioniacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 174: g. Pisoniear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230).
Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2605: g. Allioniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 507: g. Nyctaginacear.
Synon. Boldoa Cavan.

Salpichlaena J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 168: nov. g. Pteridear. (Blechnum volubile Kaulf.), a Meisn. (Comm. p. 333) ad Blechnum L. reductum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Aspleniear.
Presl 1850. Epimel. bot. p. 482 (*Salpinchlaena*): g. Blechnopsidear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 78: g. Lomariear.
Synon. Salpiglaena Klotzsch.

Salpichroa***) Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 324: nov. g. Solanear., ab Atropa sejunctum. Sect.: Eusalpichroa, Perizoma. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 612.
Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 149: g. Solanacear.

Salpichroa Miers cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
= seq.

Salpichroma Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 333; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Jaboroscar.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 471: g. Atropinear. Sect.: Eusalpichroma, Perizoma.
Synon. Busbeckia Mart.; Salpichroa Miers; Planchonia Dun.

Salpiglaena Klotzsch in Linnaea XX. p. 348.
= Salpichlaena Smith.

Salpiglosseae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 58: trib. Scrophularinear. Gen.: Brunsfelsia, Franciscea, Browallia, Anthocercis, Salpiglossis, Schizanthus.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 188 (p. 190 *Salpiglossideae*): trib. Salpiglossidear. Gen. §. 1: Duboisia, Anthocercis, Schwenkia. §. 2: Leptoglossis, Browallia, Brunfelsia, Heteranthia, Salpiglossis, Schizanthus. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 458. Gen. ead.

Salpiglossideae Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2: trib. Scrophularinear. Gen.: Collinsia, Schizanthus; Salpiglossis, Browallia, Franciscea, Brunsfelsia?, Anthocercis. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 675. Gen.: Schizanthus, Salpiglossis, Aptosimum, Peliostomum, Anthocercis, Browallia, Franciscea, Brunfelsia; Duboisia, Diplanthera. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1404 et Ench. p. 338) Anthotroche. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. 292. Gen. ead. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218). Gen. ead. (excluso Schizantho) et Schwenkia, Sanchezia?
Rchb. 1841. Nom. p. 121: sect. Nicotianear. Gen.: Schizanthus, Salpiglossis, Nierembergia, Fabiana.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 190; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: subordo Scrophulariacear. Trib.: Salpiglosseae. — Simil. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 458. Trib. ead.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 165: trib. Atropacear. Gen.: Salpiglossis, Pteroglossis, Leptoglossis, Browallia.

Salpiglossis Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 94. t. 19: nov. g. Didynam. Angiosperm. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 125.
Pers. 1807. Ench. II. p. 169. n. 1505: g. Bignoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 413; 1825. Syst. II. p. 836. n. 2230; 1831. Gen. II. p. 503. n. 2473: g. Bignoniear.
Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 408: g. Solanear. primae sect.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3145: g. Antirrhinear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2; 1846 in DC. Pr. X. p. 201; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Salpiglossidear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3899. p. 675; 1841. Ench. p. 338. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 294. —

*) Nomen a primo universali Botanico Salomone, rege Hebraeorum.
**) σάλπιγξ, tuba.
***) σάλπιγξ, buccinum; χρόα, color.

Salpiglossis Ruiz & Pav. cont. Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4734. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 498. — Walp. 1845. Rep. III. p. 233. 960. — Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 165.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 469: g. Nicotianear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 201.
Brongn. 1843. En. genr. p. 58: g. Salpiglossear.
Synon. Salpiglottis, Salpingoglottis C. Koch.

Salpiglottis Hortul. (C. Koch 1853. N. Verh. Berl. Gart. I. p. 400.)
= praeced.

Salpinchlaena Presl vid. *Salpichlaena J. Smith.*

Salpinga „Martius mss." DC. 1828. Prodr. III. p. 112: nov. g. Lavoisierear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 740. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 205. — Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81). — Endl. 1840. Gen. n. 6189. p. 1209; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6697. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4616: g. Merianiear.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 114. t. 256: g. Melastomacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375 (1433 *Salpingea*).
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 316: g. Sonerilear.
Synon. Aulacidium Rich.

Salpingea Dietr. vid. *praeced.*

Salpingia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 501: sect. Oenotherae. (O. lavandulaefolia.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 85.

Salpingoglottis C. Koch 1853. Neue Verh. Berl. Gartenb. I. p. 401: nomen emendat., pro *Salpiglosside Ruiz & Pav.* propositum.

Salpixantha Hook. 1845. Bot. Mag. t. 4158: nov. g. Ruelliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679 (*Salpixanthus*): g. Ruellidar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 289: g. Aphelandrear.

Salpixanthus Lindl. vid. *praeced.*

Salsa Feuillé 1714. Obs. II. p. 716. t. 7.
= Herreria Ruiz & Pav.

Salsina Moquin-Tand. 1840. Chenop. en. p. 121: sect. Suaedae.
= Suaeda Moq.-Tand.

Salsoa Lour. sphalm. pro *Salsola.*

Salsola*) Linn. 1737. Gen. p. 67. n. 193; 1737. Cliff. p. 86; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 56; 1753. Sp. I. p. 222; 1759. Syst. ed. X. p. 949. n. 275; 1762. Sp. ed. II. p. 322; 1764. Gen. ed. VI. p. 122. n. 311; 1767. Syst. ed. XII. p. 196. n. 308: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 217; 1784. Syst. p. 263. — Reich. 1778. Gen. p. 126. n. 339. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 171. n. 437. — Lour. 1790. Coch. I. p. 173 (sph. *Salsoa*). — Gmel. 1791. Syst. p. 451. — Pers. 1797. Syst. p. 276. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1310. n. 500; 1809. En. p. 292. — Hedw. 1806. Gen. p. 185. n. 763. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 48. Ed. Schrank 1819. p. 51. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 175. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 199. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 13. 259. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 60.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 265. n. 1095: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 161.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 87: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 383: g. Pentaphyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 344: g. Seminudar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 359. t. 75. f. 4 (S. Kali).
Juss. 1789. Gen. p. 85: g. Atriplicum. — Par. Schrad. 1809. N. Journ. III. 3. p. 87. Char. emend.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 188. *Cf. Kali Tourn., Med.* et *Lerchea Hall.*
Neck. 1790. El. II. p. 210. n. 940: g. Sysellophytor.
Cavan. 1794. Icon. III. p. 43. Observ. crit.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 257: g. Chenopodear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 394; 1815. V. p. 373. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 411. Ed. Nees p. 267. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 308; 1830. Gen. I. p. 228. n. 1199. Sect. (1830): Kochia, Sclerolaena. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 288. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 536. — Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4323. — Link 1831. Hdb. II. p. 413. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 279. — Kunth 1838. Berol. II. p. 154. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 996. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 313.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
Cram. 1803. Disp. p. 5 in Monandr. Digyn., p. 59 in Pentandr. Monogyn. et p. 67 in Pentandr. Trigyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 199: g. Attriplicear.
Pers. 1805. Ench. I. p. 295. n. 659: g. Atriplicinar. — Par. Link 1821. En. I. p. 246.
Köler 1809 in Römer Collect. bot. p. 45.
Schrad. 1811. Comm. Gotting. I. p. 13.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 874: g. Atriplicear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XXIII. 225. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 511 (*Soude*). — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 923. n. 1093: g. Chenopodicar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 297.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 387: g. Salsolear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 583; 1837. Hdb. p. 239. — Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 213; .... in Webb Canar. III. p. 209. — Koch 1837. Syn. p. 602, Ed. II. p. 692. — Meisn.

*) Salsola nomen a Caesalpino a salso plantae sapore derivatum introductum. (Ht. Cliff.)

Salsola Linn. cont.
1841. Gen. p. 321 (234). — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 637. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 690 (*Soude*). — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1021. Sect. ut Moq.
Endl. 1837. Gen. n. 1944. p. 298; 1841. Ench. p. 182: g. Halimocnemidear. — Par. Moq.-Tand. 1840. Chenop. en. p. 134. Sect.: Salsolaria, Soda. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6397. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 41. Sect. ut Moq.
Brongn. 1843. Èn. genr. p. 102: g. Spirolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 215.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 179: g. Sodear. Sect.: Kali, Soda. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. 2. p. 796. Sect.: Kali, Coccosalsola, Soda, Eusalsola, Caroxylon.
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 31: g. Salicorniear.
Synon. Kali Tourn.; Sarcomorphis Boj.

Salsolaceae Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 41: ordo (157) Monochlamydear. Subord.: Cyclolobeae, Spirolobeae.

Salsolae B. Juss. 1759 in Hort. Trian.: ordo 46 plantar. Gen.: Salicornia, Salsola, Crucita, Anabasis, Ceratocarpus, Blitum, Piper, Chenopodium, Atriplex, Corispermum, Axyris, Acnida, Beta, Spinacia, Petiveria, Rivinia, Phytolacca, Coriaria, Calligonum, Galenia, Datisca.

Salsolaria Moquin-Tand. 1840. Chenop. en. p. 134: sect. Salsolae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 41. n. 1944 *b*.
= Kali Dumort. pt.

Salsoleae C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 370: trib. Spirolobear. Gen.: Halogeton, Halimocnemis, Salsola; Schangina, Schoberia. — Par. Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 209 (gen.: Anabasis, Cornulacca, Halogeton, Halimocnemis, Traganum, Salsola); 1840. Chenop. en. p. 133 (subtrib. ut Endl.); 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 169 (subtrib.: Sodeae, Anabaseae). — Koch 1837. Syn. p. 602. Ed. II. p. 692. Gen.: Schoberia, Salsola. — Endl. 1837. Gen. p. 298; 1841. Ench. p. 182. Subtrib.: Halimocnemideae, Anabaseae. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234). Gen. ut Moq. 1835 et Nanophytum. — A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315. Subtrib. ut Endl.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: trib. Chenopodiacear. Gen.: Suaeda, Chelona, Kochia, Cornulaca, Anabasis, Basella, Salsola, Polycnemum, Hemichroa, Acnida, Camphorosma, Corispermum.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 582: subdiv. Atriplicear. Gen.: Schoberia, Salsola.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: subsect. Chenopodear. genuinar. Sect.: Anabaseae, *genuinae* (gen.: Halogeton, Halimocnemis; Salsola), Schoberieae.
Rchb. 1841. Nom. p. 165: div. Spirolobear. Subdivis. ut Endl.

Saltia*) R. Brown 1814 in Salt Abyssin. p. 376 (Verm. bot. Schr. I. p. 248; V. p. 380): nov. g. Pentandr. (S. abyssinica.)
= Cometes Burm. (Conf. Endl. Gen. p. 959.)

Saltia R. Brown 1830 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 17 (Verm. bot. Schr. V. p. 316): nov. g. Amaranthacear. (Achyranthes papposa Forsk.)
Endl. 1837. Gen. p. 303 (ad calcem nr. 1971); 1841. Ench. p. 185: g. Desmochaetear.? — Par. Meisn. 1841. Comm. p. 231. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6416. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 325.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.
Synon. Seddera Hochstett. & Steud.

Saltzwedelia**) Gärtn., Meyer & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 480. 498: nov. g. Monadelph. Decandr. (Genista sagittalis L.)
Synon. Genistella Mönch; Salzwedelia Rchb.; Syspone Griseb.

Salutiea Colla 1849. Mem. Acc. Torino ser. 2. X. p. 208 (*cf.* Grieseb. Jahresber. f. 1850. p. 367): nov. g. Achimenear. (Achimenes grandiflora DC.) *Conf.* seq.
= Achimenes P. Browne emend.

Saluzzia Colla 1846. Congres. di Genoa, in Flora 1847. p. 551: nov. g. Gesneriacear. (Achimenes longiflora.)
Conf. praeced.

Salvadora***) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 21; 1753. Sp. I. p. 122; 1759. Syst. ed. X. p. 900. n. 151; 1762. Sp. ed. II. p. 178; 1764. Gen. ed. VI. p. 64. n. 163; 1767. Syst. ed. XII. p. 128: g. Tetrandr. Monogyn. (*Cf.* Linn. Trans. 1749. p. 47 ex Reuss Rep. comm. II. p. 187.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 139; 1784. Syst. p. 166. — Reich. 1778. Gen. p. 67. n. 175. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 88. n. 220. — Lour. 1790. Coch. I. p. 87 (sph. *Salvaora*). — Gmel. 1791. Syst. p. 280. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 26. t. 26; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 404; ed. 1832. I. p. 389. — Pers. 1797. Syst. p. 172; 1805. Ench. I. p. 149. n. 324. — Willd. 1797. Sp. I, p. 695. n. 256.
Adans. 1763. Fam. II. p. 442: g. Cistor.
Gled. 1764. Syst. p. 29. n. 115: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 340: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 84: g. Atriplicum.
Neck. 1790. El. II. p. 184. n. 899: g. Aclithrophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 255: g. Chenopodear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 422. n. 437; 1830. Gen. I. p. 85. n. 421. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 443.
Batsch 1802. Tab. p. 172 (*Salbadora*): g. Oleracear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 197: g. Attriplicear.
Hedw. 1806. Gen. p. 76. n. 358: g. Atripli-

*) Dicat. Salt, peregrinatori in Abyssinia.
**) Dicat. P. Saltzwedel, Francofurt.
***) Dicat. J. Salvador, botanico hispano.

Salvadora Linn. cont.
cear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 4. 99. n. 424. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 148.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 326: g. Thymelaear.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4396: g. Rivinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Riviniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 164: g. Ardisiear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 269; 1847. Veg. kd. p. 652: g. Salvadoracear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2177. p. 349; 1841. Ench. p. 225. — Meisn. 1840. Gen. p. 315 (227). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 335. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 190.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4788: g. Salvadorear.

Salvadoraceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 269) 1847. Veg. kingd. p. 652: ordo Echialium. Gen.: Salvadora.
Endl. 1838. Gen. p. 349; 1841. Ench. p. 225: fam. Plumbagineis aff. Gen. id. *Cf.* A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 319.
Meisn. 1840. Gen. p. 315 (227): ordo Plumbaginear. Gen. id.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 334: fam. (238) incertae sedis. Gen. id.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 189: fam. Oleaceis aff. Gen.: Salvadora, Monetia, Dobera. *Cf.* Griseb. 1849. Arch. f. Naturg. II. p. 433.

Salvadoreae Rchb. 1841. Nomencl. p. 123: subdiv. Plumbagear. Gen.: Salvadora.

Salvaora Lour. vid. *Salvadora Linn.*

Salvertia*) A. St. Hilaire 1820. Mém. Mus. VI. p. 266: nov. g. Vochisiear. (S. convallariaeodora.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 17. n. 23; 1830. Gen. I. p. 8. n. 18.
Schult. f. 1822. Mant. I. p. 2; 1827. Mant. III. Add. p. 78: g. Monandr. Monogyn.
Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 152: g. Vochysiacear. — Par. Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 15. t. 110. — Endl. 1840. Gen. n. 6072. p. 1178; 1841. Ench. p. 630. — Walp. 1843. Rep. II. p. 69.
DC. 1828. Pr. III. p. 28: g. Vochysiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4509; 1841. Nom. p. 171. n. 6592. — Bartl. 1830. Ord. p. 321. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 670. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 324. — Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 24.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 380: g. Vochyacear.

Salvia Tourn. 1700. Inst. p. 180. t. 83: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 216. Ed. Hall. 1745. p. 222: g. pl. class. IX.
Mönch 1794. Meth. p. 372: g. Petalostemonis. Distinguuntur Schraderia et Jungia.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 387: g. Labiatar.
= Salviae Linn. pars.

*) Dicat. A. J. E. B. Salverte, Paris.

Salvia Linn. 1737. Gen. p. 6. n. 16; 1737. Cliff. p. 12; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 10; 1753. Sp. I. p. 23; 1759. Syst. ed. X. p. 853. n. 36; 1762. Sp. ed. II. p. 33; 1764. Gen. ed. VI. p. 17. n. 39; 1767. Syst. ed. XII. p. 64: g. Diandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 27. — Murr. 1774. Syst. p. 64; 1784. Syst. p. 68. — Reich. 1778. Gen. p. 18. n. 42. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 23. n. 50. — Gmel. 1791. Syst. p. 44. — Pers. 1797. Syst. p. 69; 1805. Ench. I. p. 24. n. 64. — Willd. 1797. Sp. I. p. 127. n. 63; 1809. En. p. 33. — Vahl 1805. Enum. I. p. 221. n. 56. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 60. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 146; ed. 1832. p. 145. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 348. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 7. 51.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 638: g. Gymnotetraspermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 157. n. 644: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 164. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 16.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 190. — Juss. 1789. Gen. p. 111. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 330. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 256. — DC. 1805. Franç. III. p. 507; 1815. V. p. 394. Sect.: Salvia, Sclarea, Horminum. — Hedw. 1806. Gen. p. 16. 350. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 285. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 58. 215. n. 96. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 17. — Link 1821. En. I. p. 10; 1829. Hdb. I. p. 494. — Kunth 1823. Syn. II. p. 68. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 56. n. 94; 1830. Gen. I. p. 17. n. 64. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 419 (*Sauge*). — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 24. — Pohl 1831. Pl. Brasil. II. p. 132. t. 189—196. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 82.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 226: g. Gymnospermar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 236.
Hill 1769. Ht. kew. p. 241: g. Monopetalar. irregular.
Etlinger 1777. Comm. med. bot. de Salvia. (Erlang.)
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 316. t. 66. f. 4 (hispanica).
Neck. 1790. El. I. p. 298. n. 465: g. Corythophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 15 in Diandr. Digyn. (S. cretica.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 429: g. Salviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2805. Sect. ut DC. 1805. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. (Sejungitur Sclarea.) — Bartl. 1830. Ord. p. 182. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4144. Sect. fere ut Benth. 1833. — Endl. 1838. Gen. n. 3597. p. 614; 1841. Ench. p. 307. Sect. ut Benth. 1833. — Meisn. 1840. Gen.

Salvia Linn. cont.
p. 284 (192). — Walp. 1845. Rep. III. p. 599. 980. Sect. ut Endl. — Nçè .... in Webb Canar. III. p. 88.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXV: g. Melissear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 332: g. Nepetear.
Benth. 1833 in Hook. Misc. III. p. 372; 1833. Labiat. p. 190: g. Monardear. Sect.: Eusphace, Hymenosphace, Drymosphace, Horminum, Aethiopis, Plethiosphace, Microsphace, Calosphace, Echinosphace, Pycnosphace, Heterosphace, Notiosphace, Gymnosphace, Hemisphace. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 722. Sect. eaed. — Koch 1837. Syn. p. 554. Ed. II. p. 637. Sect. similes. — Kunth 1838. Berol. II. p. 93. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 173. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 68. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 107. Sect. ex Benth. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 262. Sect. ut antea, omissis Microsphace et Gymnosphace. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 369 (*Sauge*). — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 358. Sect. ex Benth. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 670. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 970. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 179.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Salvidar.
Synon. Salvia, Horminum, Sclarea et Aethiopis Tourn.; Stiefia et Melinum Med.; Leonura Usteri.

Salviae Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: div. Verticillatar.

Salviariae Rchb. 1837. Handb. p. 188; 1841. Nomencl. p. 106: subdiv. Leioschizocarpicar. Divis.: Melisseae, Ocymoideae, Salvieae.

Salviastrum Scheele 1849. Linnaea XXII. p. 584: nov. g. Monardear., a Salvia vix discrepans. (S. texanum.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 259.

Salviatus Gray 1821. Arrang. brit. pl. I. p. 679. 687: nov. g. Jungermannidear. (Jung. Tamarisci, dilatata.)
= Frullania Raddi.

Salvidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Monardear. Gen.: Salvia, Audibertia.

Salvieae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 429: ordo Labiatar. Gen.: Salvia, Rosmarinus, Monarda, Ziziphora, Cunila, Amethystea, Collinsonia, Morina, Lycopus, Stachytarpheta, Westringia.
Rchb. 1828. Consp. p. 115: div. Labiatar. Gen.: Salvia, Rosmarinus, Hemiandra, Collinsonia; Lumnitzera (serius p. 171 not. Moschosma), Ocimum, Plectranthus, Aeollanthus, Prunella, Dracocephalum, Prasium, Phryma, Cleonia, Trichostemma, Thymus, Acinos, Calamintha, Melissa, Horminum, Gardoquia, Thymbra, Lepechinia, Stenarrhena, Chlinopodium, Melittis, Scutellaria, Chilodia, Prostanthera, Cryphia, Perilomia, Synandra. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182. Gen.: Lycopus, Amethystea, Hoslundia, Cunila, Hedeoma, Ziziphora, Monarda, Collinsonia, Salvia, Rosmarinus.

Salvieae Spreng. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189: div. Salviariar. Gen.: Audibertia, Salvia, Meriandra, Rosmarinus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 107. Gen. ead. exclusa Meriandra.

Salvieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Labiatar. Gen.: Sclarea, Salvia.
Endl. 1838. Gen. p. 614; 1841. Ench. p. 307: subtrib. Monardear. Gen.: Salvia, Audibertia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (192). Gen. ead. — Walp. 1845. Rep. III. p. 599. Gen. ead.

Salvinia*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 107. t. 58: nov. g. class. XVI.
Guett. 1762. Hist. Ac. roy. d. sc. p. 546.
Adans. 1763. Fam. II. p. 15: g. Hepaticar.
Aubl. 1775. Guian. II. p. 969. t. 367: g. Algar. (S. auriculata.)
Scop. 1777. Intr. p. 63: g. Dorsiferar.
Juss. 1789. Gen. p. 16: g. Filicibus aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 48.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 753. n. 1617: g. Miscellanear. — Par. Roth 1800. Germ. III. p. 21.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 1: g. Radicalium.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 70: g. Filicum. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 254.
Bernh. 1800 in Schrad. Journ. II. p. 134: g. Periaedoeatar.?
Willd. 1802. Bem. üb. Farrenkr.; 1810. Sp. V. p. 536. n. 1985: g. Hydropteridum.
Batsch 1802. Tab. p. 261: g. Rhizocarpar. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 112.
DC. 1805. Franç. p. 579: g. Rhizospermar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 113; 1827. Syst. IV. p. 9. n. 3214; 1831. Gen. II. p. 716. n. 3603. — Bisch. 1828. Nov. Act. Leop. XIV. 1. p. 47. t. 4. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 105.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 35: g. Rhizocarpor.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 43: g. Marsileacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 101. — Link 1822. En. II. p. 464. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 272. — Leman 1827. Dict. v. 47. p. 149. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 176. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 73.
Wahlenb. 1815. Nov. Act. Ups. VII. p. 179: g. Tetradidymar.?
Mirb. 1815. Élém. I. p. 384: g. Salviniear. — Par. Leman 1827. Dict. v. 45. p. 397. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 6. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 494.
Duvernoy 1825. Diss. de Salvinia. (Tubing.)
Rchb. 1828. Consp. p. 30. n. 517: g. Salviniaceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Salviniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 15. — Mart. .... Pl. crypt. Bras. p. 129. — Endl. 1836. Gen. n. 689. p. 67; 1841. Ench. p. 44. — Kunth 1838. Berol. II. p. 429. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 7. — Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 979. — Meisn. 1843. Gen. p. 436 (338). — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 968. — Metten. 1856. Fil. h.

*) Dicat. Ant. Mario Salvinio, prof. Florent.

Salvinia Mich. cont.
Lips. p. 126. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 648.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 4: g. Rhizopteridum.
Genth 1836. Nass. I. p. 46: g. Rhizocarpear.
Griff. 1844. On Azolla and Salvinia.
Metten. 1845. De Salvinia.
Synon. Marsilaea Neck.

Salviniacea Rchb. 1828. Consp. p. 30; 1832. Fl. exc. p. L: fam. Gongylobryor. Gen.: Azolla, Salvinia.

Salviniaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: fam. Pilulariear. Gen.: Salvinia.
Bartl. 1830. Ord. p. 15: ordo Rhizocarpar. Gen.: Azolla, Salvinia.
Mart. . . . . Pl. crypt. Bras. p. 123.
Mart. 1835. Consp. p. 4: ordo 11.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 405.
Endl. 1836. Gen. p. 67; 1841. Ench. p. 44: ordo Hydropteridum. Gen. ut Bartl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 138: fam. Thryptopteridum. Divis.: Azolleae, Salviniaceae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 27. Gen. ut Bartl.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 5: ordo Rhizospermar. Gen.: Pilularia, Marsilea, Salvinia, Isoëtes, Azolla.
Meisn. 1843. Gen. p. 436 (338): subordo Rhizocarpear. Gen. ut Bartl. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 16. 126. Gen. ead.
Koch 1845. Syn. ed. II. p. 968: trib. Marsileacear. Gen.: Salvinia.

Salvinieae Brisseau-Mirb. 1815. Élém. I. p. 383: fam. Cryptogamar. Gen.: Pillularia, Marsilea, Salvinia, Isoëtes.
Mass. 1818. Dict. v. 12. p. 94: div. Cryptogamar.
Leman 1827. Dict. v. 45. p. 397: div. Rhizospermar. Gen.: Salvinia, Azolla.
Lindl. 1833. Nix. p. 37: ordo Lycopodalium.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 6: trib. Marsileacear. Gen.: Salvinia.

Salviniella Hübener 1834. Hepat. germ. p. 31: nov. g. Ricciear. (Riccia natans L.).
= Hemiseuma Bisch.

Salwedelia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 327. n. 1736: nov. g. Phryganophytor., a Bryo L. distinctum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 47. p. 151, ubi genus Bridelio adscribitur.
= . . . ?

Salzmannia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 617: nov. g. Rubiacear. minus notum.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 609: g. Cephaëlidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3143. p. 531; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119). — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2793.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Salzwedelia Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4030 *a*: sect. Genistae.
Koch 1839. Deutschl. Fl. V. p. 109; 1843. Syn. ed. II. p. 172: sect. Cytisi.

*) Dicat. peregrinatori Salzmann.

Salzwedelia Rchb. cont.
O. F. Lang 1843. Flora II. p. 770 tamquam genus adoptat.
= Saltzwedelia GMS.

Samadera Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 352. t. 159. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 151.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 516: g. Simarubear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII. — Bartl. 1830. Ord. p. 385. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 811. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 151. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 373. — Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47). — Walp. 1842. Rep. I. p. 525; 1848. Ann. bot. I. p. 161. — Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 562.
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5178; 1841. Nom. p. 197. n. 7537: g. Quassiear.
Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39): g. Malpighiaceis aff.?
Endl. 1840. Gen. n. 5965. p. 1144; 1841. Ench. p. 607: g. Simarubacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 477.
Synon. Samandura Linn. pt.; Locandi Adans.; Vitmannia Vahl; Niota Lam.; Biporeia Pet.-Thouars; Mauduyta Comm.; Manungala Blanco.

Samandura „Herm. zeyl. 5. 11" Linn. 1747. Fl. zeylan. p. 202. n. 433: g. dubium.
= Samadera Gärtn. et Heritiera Dryand.

Samanea DC. 1825. Prodr. II. p. 440: sect. Ingae.
Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 215: sect. Pithecolobii.

Samara Linn. 1771. Mant. II. p. 144. n. 1291: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 134; 1784. Syst. p. 159. — Reich. 1778. Gen. p. 61. n. 156. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 80. n. 195. — Gmel. 1791. Syst. p. 257. — Pers. 1797. Syst. p. 165; 1805. Ench. I. p. 144. n. 299. — Willd. 1797. Sp. I. p. 665. n. 230. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 435; ed. 1832. I. p. 414. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 497.
Scop. 1777. Intr. p. 233: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 379: g. Rhamnor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 70. *Cf.* A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 76.
Neck. 1790. El. II. p. 366. n. 1172: g. Osariphytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 269: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 67. n. 323. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 153. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 98. n. 487. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51). — Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 238.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 502: g. Ophiospermar.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 16. 293. n. 497: g. Sapotacear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 441. n. 463: g. Sapotear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII (sph. *Lamara*): g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3634: g. Mimusopear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: g. Chrysophyllear.

Samara Linn. cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5753. p. 1103; 1841. Ench. p. 582: g. Rhamneis aff. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5611.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear. ?
Walk.-Arn. 1847. Proc. Linn. Soc. March p. . . . : g. Myrsinear.
Wight 1850. Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 13 (*Samaria*). t. 1591: g. Embeliear.
Synon. Cornus (sp.) Burm.; Choripetalum DC.; Izquierdia Ruiz & Pav.; Isquierda Willd.; Isquierdia Poir. (Steud.)

Samaria Wight vid. *praeced.*

Sambuceae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 427: sect. Caprifoliacear. Gen.: Viburnum, Sambucus. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 73. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXX: div. Dipsacear. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 92; 1841. Nom. p. 73: subdiv. Valerianear. Gen.: Sambucus. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 178. Gen. id. et Viburnum.
DC. 1830. Pr. IV. p. 321: trib. Caprifoliacear. Gen. ut Kunth. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 436. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 323. Ed. II. p. 355. Gen. ead. et Adoxa. — Meisn. 1838. Gen. p. 155 (111). Gen. ut Kunth. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 12. Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48. Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767. Gen. ead. et Tripetelus, Valentiana?, Karpaton? — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 141. Gen. ut Kunth.
Endl. 1838. Gen. p. 569; 1841. Ench. p. 282: subordo Lonicerear. Gen. ead. Accedit 1842 (Spl. II. p. 54) Tripetelus.

Sambucidia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: fam. Philisodiae. Subfam.: Disodinia, Allodinia.

Sambucinae Batsch 1802. Tab. affin. p. 238: fam. Polymorphar. Gen.: Sambucus, Viburnum.
Presl 1826. Sicul. I. p. XXVII: ordo plant. Gen. ead. et Hedera.
Link 1829. Hdb. I. p. 662: ordo Epanthar. Gen.: Sambucus.

Sambucineae A. Rich. 1823. Dict. class. III. p. 173.
= Sambuceae Kunth.

Sambucineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 305. 318: sect. Viburnear. Gen.: Sambucus.

Sambucus Tourn. 1700. Inst. p. 606. t. 396: g. pl. class. XX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 42. Ed. Hall. 1745. p. 44: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 86. n. 247; 1737. Cliff. p. 109; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 69; 1753. Sp. I. p. 269; 1759. Syst. ed. X. p. 965. n. 334; 1762. Sp. ed. II. p. 385; 1764. Gen. ed. VI. p. 147. n. 372; 1767. Syst. ed. XII. p. 219. n. 369: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 222. — Murr. 1774. Syst. p. 244; 1784. Syst. p. 295. — Reich. 1778. Gen. p. 150. n. 402. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 198. n. 505. —

Sambucus Tourn. cont.
Lour. 1790. Coch. I. p. 181. — Gmel. 1791. Syst. p. 497. — Pers. 1797. Syst. p. 313; 1805. Ench. I. p. 328. n. 729. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1494. n. 569; 1809. En. p. 328. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 203. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 26. 445. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 100.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 465: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 204. n. 846: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 506.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 188.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 470.
Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 214. — Hedw. 1806. Gen. p. 205. n. 842. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 620; 1825. Syst. I. p. 935. n. 1104; 1830. Gen. I. p. 233. n. 1227. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXI. 639. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 420. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1009.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 147: g. Fructiflorar.
Scop. 1777. Intr. p. 144: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 137. t. 27. f. 7 (nigra).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 301; 1789. Phil. Bot. I. p. 153.
Neck. 1790. El. I. p. 143. n. 248: g. Sphanidophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 604: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 459. — DC. 1805. Franç. IV. p. 276. — Link 1821. En. I. p. 289. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 489. — Lois. 1827. Dict. v. 51. p. 388 (*Sureau*). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 154.
Batsch 1802. Tab. p. 238: g. Sambucinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 662.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 888: g. Caprifoliear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 656.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 429: g. Sambucear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 74; 1838. Berol. I. p. 304. — Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1949; 1837. Hdb. p. 178; 1841. Nom. p. 73. n. 2708. — DC. 1830. Pr. IV. p. 321. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 436. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 387. — Koch 1837. Syn. p. 324. Ed. II. p. 356. — Endl. 1838. Gen. n. 3341. p. 569; 1841. Ench. p. 282. — Meisn. 1838. Gen. p. 155 (111). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 12. — Walp. 1843. Rep. II. p. 453. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48. — Webb . . . . Canar. II. p. 175. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 382. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 97 (*Sureau*). — Miq. 1856. Ind. bot. II. p. 124. Subg.: Scyphidanthe.

Sambucus Tourn. cont.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Allodiniae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Viburnidear.

Bartl. 1830. Ord. p. 215: g. Viburnear.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 200: g. Valerianear.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 318: g. Sambucinear. Sect.: Botryosambucus, Eusambucus, Ebulus. — Par. Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 6.

Bernh. 1846. Allg. Thür. Gartenz. Nr. 3—5. Subgen.: Ebulus, Sambucus, Pygon.

Synon. Phyteuma Lour.

Sambulus Reinsch .... Jahrb. f. pract. Pharm. XVIII. 2 et 3. p. 70: nov. g. Umbelliferar., radicem „*Sambul*" praebens. (Bot. Zeit. 1847. p. 424.)

Sameraria Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 161: nov. g. Cruciferar., ab Isatide sejunctum. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 155.

DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 241; 1821. Syst. II. p. 565; 1824. Pr. I. p. 210: sect. Isatidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4734 *a*; 1841. Nom. p. 179. n. 6896. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 223. — Endl. 1839. Gen. n. 4938 *b*. p. 881; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 210.

Trautv. .... Bull. Ac. Pet. VIII. Nr. 22. p. 342.

Walp. 1846. Rep. V. p. 44: g. Isatidear.

Samideae Decaisne in Nouv. Ann. Mus. III. p. 428: sphalm. pro *Samydeae.*

Samodia Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 350: nov. g. Anagalleidar. (Samolus ebracteatus Kth.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 646: g. Samolidar.

Samoleae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LI: div. Portulacear. Gen.: Montia, Samolus, Sheffieldia, Montinia.

Rchb. 1828. Consp. p. 128: div. Primulacear. Gen.: Samolus, Sheffieldia, Bacopa, Bacobotrys.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 411: div. Lysimachiacear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124: subdiv. Jacquiniear. Gen. (1837 Samolus, Scheffieldia, Bacobotrys) 1841 Samolus, Euparea?

Endl. 1839. Gen. p. 734; 1841. Ench. p. 357: trib. Primulacear. Gen. unicum: Samolus. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). Gen. id. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 69. Gen. id. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 72. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 466. Gen. id. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 265. Gen. id.

Samolia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: fam. Nantiandriae. Gen.: Samolus, Bacopa.

Samolidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 646: trib. Primulacear. Gen.: Samolus, Samodia.

Samolinarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: ordo Gynocoronar. Fam. unica: Samolineae.

Samolineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. 33: fam. Samolinariear. Gen.: Samolus, Bacopa, Sheffieldia.

Samoloides Boerh. 1720. Lugd. Bat. II. p. 65.

= Scoparia Linn. (Walp. Rep. III. p. 331.)

Samoloides Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 350: typus 4 Anagalleidar. Gen.: Samolus, Samodia.

Samolus*) Tourn. 1700. Inst. p. 143. t. 60: g. pl. class. II.

Linn. 1737. Gen. p. 42. n. 119; 1737. Cliff. p. 51; 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 74. n. 172; 1748. Ups. p. 42; 1753. Sp. I. p. 171; 1759. Syst. ed. X. p. 928. n. 205; 1762. Sp. ed. II. p. 243; 1764. Gen. ed. VI. p. 89. n. 222; 1767. Syst. ed. XII. p. 163. n. 221: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 177; 1784. Syst. p. 212. — Reich. 1778. Gen. p. 92. n. 238. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 119. n. 294. — Gmel. 1791. Syst. p. 358. — Pers. 1797. Syst. p. 220; 1805. Ench. I. p. 171. n. 388. — Willd. 1797. Sp. I. p. 927. n. 333; 1809. En. p. 215. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 31. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 121. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 9. 187.

Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 199. n. 825: g. Petalostemonis.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Rotacear. (?) — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 137. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 242: g. Portulacar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347.

Hill 1769. Ht. kew. p. 129: g. Monopetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 187: g. Speciosar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 146. t. 30. f. 1 (Valerandi).

Juss. 1789. Gen. p. 97: g. Lysimachiis aff.

Neck. 1790. El. II. p. 20. n. 638: g. Darinyphytor.

Vent. 1799. Tabl. IV. p. 15: g. ordinis incerti.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 225: g. Primulaceis aff. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 428. Ed. Nees p. 284.

DC. 1805. Franç. III. p. 453: g. Primulacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 135. n. 584. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 223. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 1. 1. n. 852. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 733. — Kunth 1823. Syn. II. p. 23. — Lois. et Leman 1827. Dict. v. 47. p. 156. 157. — Link 1829. Hdb. I. p. 407. — Endl. 1833. Norf. p. 48. — Koch 1837. Syn. p. 592. Ed. II. p. 681. — A. St. Hil. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 97. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 370. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 8. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 207.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 387; 1825. Syst.

*) Nomen ab insula Samos.

Samolus Tourn. cont.
I. p. 702. n. 765; 1830. Gen. I. p. 162. n. 817: g. Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 715.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: g. Samoliae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1828. Consp. p. 128. n. 3363; 1831. Fl. exc. p. 411; 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 128. n. 4850: g. Samolear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4215. p. 734; 1841. Ench. p. 357. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 72. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 337. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 447. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 31. — Webb .... Canar. III. p. 174. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 468. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 265; 1857. Ind. bat. II. p. 1004.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Samolinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 165: g. Ardisiacear. desc isc.
Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 350: g. Anagalleidar. Sejungitur Samodia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 646: g. Samolidar.
Synon. Sheffieldia Forst.; Scheffieldia Scop.

Sampacca Rumph. 1741. Amboin. II. p. 199. t. 67. 68.
= Michelia Linn.

Samudra Endl. 1839. Gen. n. 3810 *a*. p. 655; 1841. Ench. p. 324: sect. Argyreiae. (Rheede Malab. XI. t. 61.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4420. 1. — Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 328.
Synon. Ptyxanthus Don.

Samyda*) Linn. 1737. Coroll. p. 21. n. 993; 1742. Gen. ed. II. p. 520. n. 1004; 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 128: nov. g. pro *Guidonia Plum.* constitutum, incertae sedis. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 439.
Linn. 1753. Sp. I. p. 443: g. Dodecandr. Monogyn.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 17: g. Decandr. Monogyn. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1024. n. 525; 1762. Sp. ed. II. p. 557; 1764. Gen. ed. VI. p. 216. n. 543; 1767. Syst. ed. XII. p. 301. n. 547. — Murr. 1774. Syst. p. 340; 1784. Syst. p. 409. — Reich. 1778. Gen. p. 226. n. 600. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 298. n. 755. — Gmel. 1791. Syst. p. 699. — Pers. 1797. Syst. p. 437; 1805. Ench. I. p. 484. n. 1097. — Willd. 1799. Sp. II. p. 624. n. 876. — Hedw. 1806. Gen. p. 326. n. 1284 (*Samyta*). — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 37.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Gled. 1764. Syst. p. 102. n. 424: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 185: g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 441. n. 1274: g. Comizophytor. Sejungitur Geunzia.

*) σημύδα, betula?

Samyda Linn. cont.
Cram. 1803. Disp. (p. 157 in Monadelph. Octandr., p. 162 in Monadelph. Decandr.) p. 164 in Monadelph. Dodecandr. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 381.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 239: g. Samydear. — Par. Vent. 1807. Mém. Inst. II. p. 142. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 687; 1825. Syst. II. p. 353. n. 1666; 1830. Gen. I. p. 370. n. 1871. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 360. — Kunth 1824. Syn. III. p. 292. — DC. 1825. Pr. II. p. 47. Sect.: Eusamyda, Guidonia. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 158. — Rchb. 1828. Consp. p. 177. n. 4693; 1837. Hdb. p. 273 (genuinar.); 1841. Nom. p. 189. n. 7194. Sect.: Samyda, Guidonia. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18 (sph. *Smyda*). — Bartl. 1830. Ord. p. 269. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 50. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 72 (52). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 288. — Endl. 1839. Gen. n. 5059. p. 916; 1841. Ench. p. 477. Sect. eaed. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1517. — Walp. 1842. Rep. I. p. 446; 1846. V. p. 405. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 109.
Link 1821. En. I. p. 391: g. Guajacanar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Cascarierar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 64; 1847. Veg. kd. p. 331: g. Samydacear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 66. t. 274.
Synon. Guidonia Plum.; Mongezia Fl. Flum.; Bigelovia Spreng.

Samyda Rchb. 1828. Consp. p. 177. n. 4693 *a*; 1841. Nom. p. 189. n. 7194. 1: sect. Samydae.
= Eusamyda DC.

Samydaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16. 18: fam. Samydariear. Trib.: Samydeae, Homalineae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 64) 1847. Veg. kingd. p. 330: ordo Violalium. Gen.: Samyda, Casearia, Euceraea, Candelabria, Periclistia?

Samydarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: ordo Torosepalar. Fam. unica: Samydaceae.

Samydeae Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 238.
Vent. 1807. Mém. Inst. II. p. 149: fam. plant. Gen.: Samyda, Casearia, Aquilaria. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 163 et Link 1831. Hdb. II. p. 122.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 687: fam. Melieis aff. Gen.: Samyda, Casearia, Tontelea, Athenaea, Aquilaria, Melistaurum, Augea, Godoya; Heriteria; Thryallis, Rhaptostylum, Seguieria.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245; 1825. Pr. II. p. 47: ordo (58) Calyciflorar. Gen.: Samyda, Casearia, Chaetocrater. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 49. Gen. ead.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 360. Excluditur Aquilaria (nec non Abatia et Azara). — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 291.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valvisporar.

Samydeae Gärtn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 177 (1832. Fl. exc. p. 642): div. Amygdalacear. Gen. ut DC. et Crinodendron?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Samydacear. Gen.: Samyda, Casearia, Anavinga, Crateria.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (71) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 268: ordo (150) Peponiferar. Gen. ut DC.
Lindl. 1833. Nix. p. 18: ordo Violalium.
Meisn. 1837. Gen. p. 72 (52): ordo 64 plant. (p. 438 Parietalium.) Gen. ut DC.
Rchb. 1837. Hdb. p. 273: div. Bixacear. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Guidonia, Samyda), Casearieae, Patrisieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 189. Gen.: Samyda, Casearia, Euceraea.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 287: fam. (97) Peponiferar. Gen.: Samyda, Casearia.
Endl. 1839. Gen. p. 916: ordo (194) Parietalium. Gen. ut Spach. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1420 et Ench. p. 477) Euceraea.
Brongn. 1843. En. genr. p. 109: fam. Passiflorinear. Gen. ut Endl.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 365: Flacourtianeis inserendas censet.
A. Juss. (?) 1849 in Orb. Dict. XI. p. 320: fam. Dicotyledonear. apetalar. perigynar. Gen. ut Endl. 1841.

Samydeae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LIX: fam. Cistiflorar. Divis.: Pittosporeae, Flacourtianeae, Bixeae, Homalinae, Casearieae.

Samyta Hedwig vid. *Samyda Linn.*

Sanamunda*) Magnol. 1720. Char. pl. lib. l. sect. 1. (Linn. 1747. Class. pl. p. 390.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 285: g. Thymelaear.
= Passerina Linn.

Sanamunda Necker 1790. Elem. bot. II. p. 179. n. 888: nov. g. Aclithrophytor., a Daphne L. sejunctum.
= ... ?

Sanchesia Benth. vid. *seq.*

Sanchezia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 5. t. 32; 1798. Fl. Peruv. I. p. 7. t. 8: nov. g. Diandr. Monogyn. — Par. Vahl 1805. Enum. I. p. 103. n. 39. — Pers. 1805. Ench. I. p. 24. n. 59. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 339. — Hedw. 1806. Gen. p. 11. 347. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 53. 128. n. 66.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 394: g. Rhinanthear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 38. n. 71; 1830. Gen. I. p. 22. n. 91: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 64.
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 166: g. Didynam. Angiosperm.
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3117: g. Acanthear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7 (*Sanchesia*): g. Scrophularinear. minus notum. — Par.

*) Nomen ex vetusto nomine Sanamund factum censet Beckmann. (Lex. bot. p. 189.)
**) Dicat. Jos. Sanchez, prof. bot. Cadix.

Sanchezia Ruiz & Pav. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4021. p. 695; 1841. Ench. p. 340 (dubium). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Walp. 1845. Rep. III. p. 436. 973.
Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218): g. Salpiglossidear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4775: g. Vestiear.?
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 585; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Scrophulariacear. minus notum.

Sanchus Gleditsch vid. *Sonchus.*

Sandersonia Hook. 1853. Bot. Mag. t. 4716: nov. g. Uvulariear. (S. aurantiaca.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 100.

Sandoricum Rumph. 1741. Amboin. I. p. 167. t. 64. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 360.
Cavan. 1789. Diss. VII. p. 359. t. 202. 203: g. Monadelph.
Juss. 1789. Gen. p. 265: g. Meliar.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 802. n. 1751: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 680. — Willd. 1799. Sp. II. p. 556. n. 842. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 57. t. 261; 1832. Ind. II. p. 392.
Gis. 1792. Prael. p. 362: g. Trihilatar.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 162: g. Meliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 43. — Pers. 1805. Ench. I. p. 469. n. 1064. — — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 271 (*Hantol*). — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 519. — Bartl. 1830. Ord. p. 356.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
Cram. 1803. Disp. p. 159 in Monadelph. Decandr.
DC. 1824. Pr. I. p. 621: g. Meliear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 67. n. 2389; 1831. Gen. II. p. 542. n. 2658. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 680.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 163: g. Trichiliear. — Par. A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 332. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 119. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 189. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5537. p. 1050; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8073. — Walp. 1842. Rep. I. p. 431. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 86. 108. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 387.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5506: g. Strigiliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Guareear.

Sanfordia „Drumm." Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 53: nov. g. Diosmear. (S. calycina.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 409.

Sanguinaria*) Dillen. 1737. Hort. Eltham. p. 334. t. 252. f. 325—327.
Linn. 1737. Gen. p. 151. n. 425; 1737. Cliff. p. 202; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 505; 1759. Syst. ed. X. p. 1072. n. 570; 1762. Sp. ed. II. p. 723; 1764. Gen. ed. VI. p. 261. n. 645; 1767. Syst. ed. XII.

*) Nomen ex Columella et Plinio.

Sanguinaria Dillen. cont.
p. 359: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 406; 1784. Syst. p. 489. — Reich. 1778. Gen. p. 266. n. 701. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 349. n. 878. — Gmel. 1791. Syst. p. 808. — Pers. 1797. Syst. p. 532. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1140. n. 1012; 1809. En. p. 561. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 9.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 117. n. 482: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 227.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Rhaeadum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Papaveracear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 236. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 90. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 495. — Pers. 1807. Ench. II. p. 61. n. 1252. — DC. 1821. Syst. II. p. 88; 1824. Pr. I. p. 121. — Link 1822. En. II. p. 68; 1831. Hdb. II. p. 279. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 274. — Bartl. 1830. Ord. p. 261. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 136. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 34. — Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 62. (verar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 261. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Rhoeadear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 383. — Batsch 1802. Tab. p. 87.
Hill 1769. Ht. kew. p. 226: g. Polypetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 272: g. Polyandrar.
Neck. 1790. El. II. p. 267. n. 1020: g. Catizophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 728; 1825. Syst. II. p. 604. n. 1944; 1830. Gen. I. p. 435. n. 2154: g. Papaverear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Chelidoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4845; 1837. Hdb. p. 265; 1841. Nom. p. 185. n. 7084: g. Bocconiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4818. p. 855; 1841. Ench. p. 443. — Walp. 1842. Rep. I. p. 109.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 52: g. Chelidoniear.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 459: g. Sanguinariear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 37.
Synon. Belharnosia Adans.

Sanguinarieae Bernhardi 1833. Linnaea VIII. p. 459: sect. Papaveracear. Gen.: Sanguinaria.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 6. 37: trib. Papaveracear. Gen.: Sanguinaria, Macleaya, Bocconia.

Sanguinella Gleichen ex Steud. Nomencl. I. p. 748; II. p. 510. (S. Thunbergii et tripsacoides.)
= Hemarthria R. Brown.

Sanguisorba*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 58. Ed. Hall. 1745. p. 63: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 30. n. 82; 1737. Cliff. p. 37; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 116; 1759. Syst. ed. X. p. 897. n. 136; 1762. Sp. ed. II. p. 169; 1764. Gen. ed. VI. p. 58. n. 146; 1767. Syst ed. XII. p. 124: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 109. — Murr. 1774. Syst. p. 133; 1784. Syst. p. 158. — Reich. 1778. Gen. p. 59. n. 152. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 78. n. 190. — Gmel. 1791. Syst. p. 255. — Pers. 1797. Syst. p. 164; 1805. Ench. I. p. 141. n. 291. — Willd. 1797. Sp. I. p. 653. n. 225; 1809. En. p. 163. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 815. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 374. 407.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 3: g. pl. class. I.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 167. n. 681: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 519.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 184. — Hedw. 1806. Gen. p. 64. 373. — Link 1821. En. I. p. 144. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 433. n. 455; 1830. Gen. I. p. 83. n. 407. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 278. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 438.
Adans. 1763. Fam. II. p. 293: g. Rosar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Miscellanear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 141: g. Fructiflorar.
Scop. 1777. Intr. p. 222: g. Calycanthemar.
Juss. 1789. Gen. p. 336: g. Sanguisorbar.
Neck. 1790. El. II. p. 133. n. 814: g. Coryphophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 341: g. Agrimoniear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 610.
Batsch 1802. Tab. p. 10: g. Senticosar.
DC. 1805. Franç. IV. p. 450: g. Agrimoniacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 13. 206. n. 476. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 575.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 108: g. Tetrandr. Digyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 861: g. Sanguisorbear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 593. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 141; 1844. Ross. II. p. 27. — Link 1831. Hdb. II. p. 114. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 593. — Koch 1836. Syn. p. 232. Ed. II. p. 257. — Kunth 1838. Berol. I. p. 180. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 428. — Endl. 1840. Gen. n. 6373. p. 1244; 1841. Ench. p. 659. — Walp. 1843. Rep. II. p. 44. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 563. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 339.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 97: g. inter Aggregatas et Senticosas ambiguum.
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4423: g. Rosear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: g. Poteriar.
Bartl. 1830. Ord. p. 403: g. Dryadear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 486. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125.
Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74): g. Alchemillear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 242; 1841. Nom. p. 167. n. 6476: g. Poteriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 562: g. Sanguisorbacear.

*) Nomen quia sententia veterum sanguinem supprimit et quasi absorbet.

Sanguisorbaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 561: ordo Rosalium. Gen.: Alchemilla, Adenostoma, Acaena, Ptilochaeta, Sanguisorba, Poterium, Bencomia, Leucosidea, Tetraglochin, Polylepis, Margyricarpus, Cliffortia.

Sanguisorbae Juss. 1789. Gen. p. 336: sect. Rosacear. Gen.: Poterium, Sanguisorba, Ancistrum, Acaena, Agrimonia, Neurada, Cliffortia, Aphanes, Alchimilla, Sibbaldia.

Sanguisorbarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: ordo Torosepalar. Fam. unica: Sanguisorbeae.

Sanguisorbeae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 861: div. Rosacear. Gen.: Sanguisorba, Poterium, Acaena, Polylepis, Cliffortia, Agrimonia, Spallanzania, Margyricarpus, Alchemilla, Acharia, Sibbaldia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: fam. Thalamitegmiae. Gen.: Poterium, etc.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 223: sect. Rosacear. Gen.: Alchemilla, Polylepis, Margyricarpus, Ancistrum, Acaena, Cercocarpus. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 469. Gen. ead. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII. Gen.: Alchemilla, Margyricarpus, Acaena, Ancistrum, Sanguisorba, Poterium; Cliffortia.
DC. 1825. Pr. II. p. 588: trib. Rosacear. Gen.: Cercocarpus, Alchimilla, Cephalotus, Margyricarpus, Polylepis, Acaena, Sanguisorba, Poterium, Cliffortia. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 341. — Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74). Subtrib.: Alchemilleae, Cephaloteae?
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 592: ordo Calycanthemar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: fam. Sanguisorbariear. Trib.: Cliffortiaceae, Poteriae, Alchemilleae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (72) Apetalar.
Link. 1831. Hdb. II. p. 113: ordo 33 Perigynar. Gen.: Alchemilla, Aphanes, Sanguisorba, Poterium, Cliffortia.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 589: ordo (84) Calyciflorar. Gen. ut DC. — Par. Koch 1836. Syn. p. 231. Ed. II. p. 256. Gen.: Alchemilla, Sanguisorba, Poterium.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo ad Rosaceas accedens.
Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 9: subordo Rosaceae. Gen.: Poterium, Bencomia, Alchimilla.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 428: subtrib. Dryadear. Gen.: Sanguisorba, Acaena, Adenostoma, Agrimonia, Alchemilla. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1243; 1841. Ench. p. 659. Gen. ead. et Aremonia, Poterium, Leucosidea, Tetraglochin, Polylepis, Margyricarpus, Cliffortia. — Walp. 1843. Rep. II. p. 37. Gen. ut Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 209: trib. Dryadear. Gen. ead.

Sanguisorbeae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 609: subdiv. Rosear. Sect.: Alchimilleae, Agrimonieae, Roseae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 242; 1841. Nom. p. 167: div. Rosaceae. Subdivis.: *genuinae* (sect.: Alchemilleae, Poterieae, Fothergilleae), Cynocrambeae, Cliffortieae.

Sanguisorboides Spach 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 41: sect. Poterii. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 285.

Sanhilaria Leandro mss.
= Stifftia Mikan.

Sanicla DC. 1830. Prodr. IV. p. 84: sect. Saniculae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 264. — Endl. 1839. Gen. n. 4382 *a.* p. 767; 1841. Ench. p. 377.
Synon. Triclinium Rafin.

Sanicoria DC. 1830. Prodr. IV. p. 85: sect. Saniculae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 264. — Endl. 1839. Gen. n. 4382 *b.* p. 767; 1841. Ench. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5527. 2.

Sanicula*) Tourn. 1700. Inst. p. 326. t. 173: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 266. Ed. Hall. 1745. p. 279: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 70. n. 201; 1737. Cliff. p. 88; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 57; 1753. Sp. I. p. 235; 1759. Syst. ed. X. p. 953. n. 289; 1762. Sp. ed. II. p. 339; 1764. Gen. ed. VI. p. 128. n. 326; 1767. Syst. ed. XII. p. 202. n. 323: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 225; 1784. Syst. p. 272. — Reich. 1778. Gen. p. 132. n. 356. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 178. n. 458. — Gmel. 1791. Syst. p. 468. — Pers. 1797. Syst. p. 288. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1366. n. 521; 1809. En. p. 299. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 196.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 449: g. Umbelliferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 116. — Juss. 1789. Gen. p. 225. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 479. — DC. 1805. Franç. IV. p. 354. (anomalar.) — Hedw. 1806. Gen. p. 192. n. 789. — Spreng. 1813. Umbell. prodr. p. 24; 1818. Anl. II. 2. p. 644; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXI. 339; 1825. Syst. I. p. 874. n. 1030; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1130. (descisc.) — Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 65. — Link 1821. En. I. p. 263. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 499. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 105. (Divis. 3.) — D. Don 1825. Nepal. p. 183. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 12. p. 881. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 279. — Bartl. 1830. Ord. p. 237. (descisc.) — Molkenb. 1851. Pl. Jungh. I. p. 93.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 52. n. 200: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 104.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 90. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 303. n. 676. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 178. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 165. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 14. 296.
Adans. 1763. Fam. II. p. 97: g. Cicutar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 79. t. 20. f. 3 (marilandica).

*) Nomen officinarum a sanandis vulneribus.

Sanicula Tourn. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 174. n. 290: g. Scadiophytor.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 139; 1836. Syn. p. 279. Ed. II. p. 307: g. Saniculear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 410. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIV; 1828. Consp. p. 144. n. 3755; 1832. Fl. exc. p. 482; 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5527. Sect.: Sanicula, Sanicoria. — DC. 1830. Pr. IV. p. 84. Sect.: Sanicla, Sanicoria. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 264. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 367. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Kunth 1838. Berol. I. p. 261. — Endl. 1839. Gen. n. 4382. p. 767; 1841. Ench. p. 376. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 601. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 337. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 110. — Walp. 1843. Rep. II. p. 387; 1846. V. p. 845. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 235. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 736. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 63.
Link 1829. Hdb. I. p. 317: g. Hydrocotylinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Eryngiear. — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 356. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 757.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 221: g. Apleurospermear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Saniculidar.

Saniculeae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 138: trib. 14 Umbelliferar. Gen.: Astrantia, Sanicula, Eryngium, Dondia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIV: div. Umbelliferar. Gen. ead. et Lagoecia, Alepidea, Eriocalia, Arctopus, Panax, Cussonia.
Rchb. 1828. Consp. p. 144: sect. Panacear. Gen.: Sanicula, Petagnia, Dondisia, Panax; Cussonia.
DC. 1830. Pr. IV. p. 82: trib. Orthospermar. Gen.: Actinotus, Petagnia, Sanicula, Hacquetia, Astrantia, Alepidea, Horsfieldia, Eryngium, Actinanthus. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 263. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 297. Ed. II. p. 307. Gen.: Sanicula, Hacquetia, Astrantia, Eryngium. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). Gen. ut DC. et Hohenackeria, Klotzschia, Strebanthus. — Endl. 1839. Gen. p. 766; 1841. Ench. p. 377. Gen. ut DC. et Holotome, Klotschia, Hohenackeria. Accedunt 1843 (Spl. III. p. 81) Actinolema et 1850 (Spl. V. p. 3) Hemiphyes. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 95. Gen. ut Endl. 1839.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 482: subdiv. Platyspermar. Gen.: Hacquetia, Sanicula, Astrantia, Eryngium. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 221 (gen. ut DC.); 1841. Nom. p. 142. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 110: trib. Orthospermear. Gen. ex DC.
Synon. Umbelliferae desciscentes Spreng.

Saniculidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: trib. Apiacear. Gen. Saniculear. Endl. 1843.

Saniculina Schott 1851. Östr. Prim. p. 11: subsect. Auriculastri. Subsect.: Auricula, Erythrodrosum. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 464. 468.

Sanseveria Dumort. vid. *seq.*

Sanseverina Thunb. 1818 vid. *Sanseviera Thunb.*

Sanseviella Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 782: g. Taccear. (*Sanseviera Andr.*) *Cf. Reineckea Kunth.*
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1840. 1: sect. Sansevierae.

Sanseviera*) Thunb. 1794. Prodr. I. p. 65 (*Sansevieria*); 1798. Nov. gen. IX. p. 127; 1818. Fl. cap. II. p. 322 (*Sanseverina*): g. Hexandr. Monogyn. (Aletris hyacinthoides L.) — Par. Roxb. 1798. Corom. II. p. 93. t. 184; 1832. Ind. II. p. 160. — Willd. 1799. Sp. II. p. 159. n. 648; 1809. En. p. 375. — Pers. 1805. Ench. I. p. 372. n. 816. — Hedw. 1806. Gen. p. 237. n. 960. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 65. Ed. Schrank 1819. p. 70.
Juss. 1804. Dict. v. 3. p. 229: g. Asphodelear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 93. n. 1254; 1830. Gen. I. p. 261. n. 1360. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXVIII (*Sansevieria*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1116.
Juss. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 53: g. Asparaginear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 236: g. Liliacear.
Link 1821. En. I. p. 342: g. Asparaginar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 162: g. Asparagear. (verar.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 282. — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 219.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1400: g. Aletrinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 80 (*Sanseveria*): g. Hyacinthear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Hemerocallidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Endl. 1837. Gen. n. 1113. p. 143; 1841. Ench. p. 83: g. Aloinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1840. Sect.: Sanseviella, Sanseviera. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 20.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 27; 1850. Enum. V. p. 15: g. Dracaenear. Sejungitur Reineckea. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 559.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Hemerocallear.
Synon. Acyntha Comm., Med.; Salmia Cavan.; Pleomeles Salisb. (Steud.)

Sansevieria Thunb. Prodr. I. p. 65 (et in char. gen.); Schult. Syst. VII: vid. *praeced.*

Sansovinia Scopoli 1777. Introd. p. 228. n. 1022: nov. g. Nomadear. (Staphylaea indica Burm.)
= . . . ?

Santalaceae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 350. Ed. Nees p. 206: novus ordo Dicotyledonum apetalar. Gen.: Thesium, Leptomeria, Choretrum, Fusanus, Santalum. *Affinia*: Exocarpos, Anthobolus, Olax. *Cf.*

---

*) Dicat. Raimondo de Sangro, principi Sanseviero, Neapol.

Santalaceae R. Brown cont.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 568 (Verm. bot. Schr. I. p. 85) et Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 284.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 621. Éd. II. p. 716. Gen.: Thesium, Osyris. — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 619. Tribus: Buckleyeae, Santaleae, Anthoboleae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 263: fam. Monochlamydear. Gen.: Thesium.
Agdh. 1825. Aphor. p. 229; 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Epichlamydear. Gen.: Fusanus, Octarillum, Myoschilos, Santalum, Choretrum, Leptomeria, Quinchamalium, Osyris, Thesium. Abnormia: Exocarpos, Anthobolus.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (64) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 112: ordo (78) Proteinar. Gen.: Thesium, Leptomeria, Stemonurus, Choretrum, Pyrularia, Osyris, Grubbia, Ophira, Quinchamalium, Fusanus, Santalum; Myoschilos, Nyssa.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 156: fam. Inconspicuar. Gen.: Osyris, Thesium. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 166 (divis.: Chlorantheae, Nysseae, Santaleae); 1841. Nom. p. 62. Divis.: Ophireae, Gyrocarpeae, Osyrideae.
Lindl. 1833. Nix. p. 23: ordo unicus Santalium.
Mart. 1835. Consp. p. 15: ordo 87.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 193; 1847. Veg. kd. p. 787: ordo Asaralium. Gen. (1847) ut Endl. 1842 et Rhinostegia, Eucarya.
Endl. 1838. Gen. p. 324: ordo (108) Thymelaear. Gen.: Quinchamalium, Arjoona, Thesium, Nanodea, Choretrum, Leptomeria, Comandra, Fusanus, Osyris, Sphaerocarya, Santalum, Mida; Pyrularia?, Octarillum?, Myoschilos? Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1378 et Ench. p. 206) Cervantesia et 1842 (Spl. II. p. 105) Scleropyron. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 228; 1846. Chlor. prot. p. LXXXI. Gen. foss.: Nyssa.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 459: fam. (172) Proteinear. Trib.: Santaleae, Grubbieae, Nysseae, Anthoboleae.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): ordo Daphnoidear. Trib.: Thesieae, Santaleae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 115: fam. Santalinear. Gen.: Santalum, Osyris, Thesium.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 341: g. Dicotyledonear. apetalar. perigynar. Gen. ex Endl. (omissis 2 primis.)
Conf. Santalineae Dumort.; Osyrideae Juss., Rchb., Osyrinae Link.

Santalaria DC. 1825. Prodr. II. p. 419: sect. Pterocarpi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4016 *c*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 377.

Santalarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: ordo Gynosepalar. Fam.: Nyssaceae, Santalineae, Hippurideae, Myrobolaneae.

Santaleae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 320: fam. 29 plant. Gen.: Santalum, Fusanus, Choretrum, Leptomeria, Thesium, Quinchamalium, Osyris, Olax, Nyssa, Hamiltonia.
Rchb. 1828. Consp. p. 79: fam. Inconspicuar. Divis.: Ophireae, Osyrideae, Elaeagneae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: trib. Santalinear. Gen.: Santalum, Fusanus, Leptomeria, Thesium, Comandra, Hamiltonia, Quinchamalium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 167: div. Santalacear. Subdivis.: Exocarpeae, Osyrideae, Penaeariae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 466: trib. Santalacear. Gen. Santalacear. Endl. et Thesiosyris, Frisca, Stemonurus? — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240). Gen.: Mida, Sphaerocarya, Santalum, Arjona, Pyrularia. — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 624. Subtrib.: Thesieae, *Santaleae* (gen.: Santalum).
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 322: fam. Apetalar. Gen.: Thesium, Osyris.

Santales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 23: nixus Tubiferar. Ordo unicus: Santalaceae.

Santalineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: fam. Santalariear. Trib.: Santaleae, Osyrideae.

Santalineae Brongn. 1843. Én. genr. p. XXIX. 115: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Ceratophylleae?, Chloranthaceae, Loranthaceae, Santalaceae, Olacineae.

Santaloides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 192. n. 408: g. Decandr. obscurum. (*Kiridiwael* et *Kalawael Herm.*)
= Rourea Aubl.

Santalum Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 165. n. 383; 1753. Sp. I. p. 349; 1759. Syst. ed. X. p. 1000. n. 431; 1762. Sp. ed. II. p. 497; 1764. Gen. ed. VI. p. 191. n. 480; 1767. Syst. ed. XII. p. 266. n. 475: g. Octandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 226. n. 934: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Bicornium.
Adans. 1763. Fam. II. p. 159: g. Caprifolior.
Murr. 1774. Syst. p. 137. n. 480; 1784. Syst. p. 164: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 64. n. 169. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 86. n. 215. — Lour. 1790. Coch. I. p. 86. — Gmel. 1791. Syst. p. 276. — Pers. 1797. Syst. p. 170; 1805. Ench. I. p. 148. n. 319. — Willd. 1797. Sp. I. p. 691. n. 251. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 19. 328. n. 516. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 462; ed. 1832. I. p. 442. — Schult. 1827. Mant. III. p. 15. 255.
Scop. 1777. Intr. p. 144: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 321: g. Onagrar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77.
Neck. 1790. El. I. p. 140. n. 243: g. Sphanidophytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 156: g. Onagrariar. (Myrteis aff.)
Hedw. 1806. Gen. p. 70. n. 336: g. Onagrear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 355. Ed. Nees p. 211: g. Santalacear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 645. — Agdh. 1825.

Santalum Linn. cont.
Aphor. p. 230. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 286 (*Santalin*). — Bartl. 1830. Ord. p. 112. — Lindl. 1836. Nat. syst. p. 193; 1847. Veg. kd. p. 788. — Endl. 1838. Gen. n. 2080. p. 327; 1841. Ench. p. 207. — Brongn. 1843. En. genr. p. 115. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 615; 1855. Ind. bat. I. p. 776. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 340. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 223.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 321; 1825. Syst. I. p. 489. n. 538; 1830. Gen. I. p. 112. n. 566: g. Santalear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 548. — Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 461. — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 681. Sect.: Eusantalum, Mida.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1703; 1841. Nom. p. 62. n. 2355: g. Osyridear.
Link 1829. Hdb. I. p. 373: g. Osyrinar.
Synon. Sirium Roxb.; Fusanus Linn.?; Mida Cunn.? (A. DC.)

Santia*) Savi 1798. Mem. mat. soc. it. VIII. 2. p. 479.
Parlat. 1845. Fl. palerm. I. p. 72; 1850 in Webb Canar. III. p. 392: g. Agrostidear. = Polypogon Desfont.

Santia Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 422: nov. g. Guettardear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 166 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2849. (genuinar.) — Walp. 1847. Rep. VI. p. 49.
Endl. 1838. Gen. n. 3199. p. 542; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.

Santiria**) Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 14. p. 209: g. Burseracear., Marigniae aff. (S. tomentosa, etc.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 290.

Santolina Tourn. 1700. Inst. p. 460. t. 260: g. pl. class. XII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 186. Ed. Hall. 1745. p. 195: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1719. Act. Ac. Par. p. 311: g. Corymbiferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 185. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 518. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 408. — — DC. 1805. Franç. IV. p. 200; 1815. V. p. 479. — Link. 1822. En. II. p. 311.
Linn. 1737. Gen. p. 248. n. 640; 1737. Cliff. p. 397; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 252; 1753. Sp. II. p. 842; 1759. Syst. ed. X. p. 1206. n. 847; 1763. Sp. ed. II. p. 1179; 1764. Gen. ed. VI. p. 416. n. 942; 1767. Syst. ed. XII. p. 540: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 616; 1784. Syst. p. 740. — Reich. 1778. Gen. p. 415. n. 1022. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 548. n. 1278. — Gmel. 1791. Syst. p. 1205. — Pers. 1797. Syst. p. 781; 1807. Ench. II. p. 406. n. 1833. — Willd. 1803.

*) Dicat. G. Santi, Pisano.
**) Dicat. docto Javano: Bapa Santir.

Santolina Tourn. cont.
Sp. III. 3. p. 1797. n. 1468; 1809. En. p. 857. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 141.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 227. n. 1019: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 580.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 315: g. Syngenes. sect. 1.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 7. 220.
Hill 1769. Ht. kew. p. 32: g. Tubulatar.
Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 885.
Neck. 1790. El. I. p. 79. n. 142: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 398. t. 165: g. Tubulosar.
Spreng. 1818. Anl. II. p. 547; 1826. Syst. III. p. 455. n. 2707; 1831. Gen. II. p. 616. n. 3052: g. Eupatorinar.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 179; 1827. v. 47. p. 289; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 579: g. Santolinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2389. — Less. 1832. Syn. p. 259.
Link 1829. Hdb. I. p. 753: g. Anthemidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 140. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 224. — Koch 1837. Syn. p. 370. Ed. II. p. 407. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 184. (verar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
DC. 1837. Pr. VI. p. 35: g. Euanthemidear. Sect.: Chamaecyparissus, Babounya. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2651. p. 431; 1841. Ench. p. 241. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 209 (134). — Walp. 1843. Rep. II. p. 634.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3063: g. Ptarmicear. Sect.: Santolina, Babounya.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 160: g. Chamomillear.

Santolineae Cassini 1823. Dict. v. 29. p. 179; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 579: subdiv. Anthemidear. Gen.: Hymenolepis, Athanasia, Lonas, Morysia, Diotis, Santolina, Nablonium, Lyonnetia, Lasiospermum, Marcelia.
Rchb. 1828. Consp. p. 104: sect. Anthemidear. genuinar. Gen.: Hymenolepis, Athanasia, Lonas, Diotis, Santolina, Lasiospermum, Anacyclus, Mataxa.
Less. 1832. Syn. p. 258: div. Artemisiear. Gen.: Hiorthia, Cyrtolepis, Lyonnetia, Otanthus, Nablonium, Santolina.

Santolinoides Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 312: g. Corymbiferar.
Micheli 1729. Nov. gen. p. 31. t. 27: g. pl. class. XII.
≐ Cephalophora Cavan.?

Sanvitalia Gualt. 1792 in Lam. journ. hist. nat. II. p. 176. t. 33. (Lam. Illustr. t. 686.)
Cavan. 1797. Icon. IV. p. 30. t. 351: g. Syngenes. Polygam. Superfl. (S. villosa.) — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2190. n. 1518;

Sanvitalia Gualt. cont.
1809. En. p. 912. — Pers. 1807. Ench. II. p. 473. n. 1910 (*Sanvitallia*).
Vent. 1799. Tabl. II. p. 528: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 410. — Link 1822. En. II. p. 346.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 565; 1826. Syst. III. p. 580. n. 2803; 1831. Gen. II. p. 633. n. 3157: g. Radiatar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 47. p. 292: g. Helianthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2638. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 139; 1830. v. 60. p. 576: g. Verbesinear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 232. — DC. 1836. Pr. V. p. 628. — Endl. 1838. Gen. n. 2556. p. 416; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 360. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3159. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Lorentea Ort.

Sanvitallia Pers. vid. *praeced.*

Saouari*) Aublet 1775. Guian. I. p. 599. t. 240: nov. g. Polyandr. Tetragyn. (S. glabra.)
DC. 1824. Pr. I. p. 599: sect. Caryocaris. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 653. — Endl. 1840. Gen. n. 5642 *b*. p. 1076 (*Souari*); 1841. Ench. p. 566. — Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7744. 1 (*Souari*).

Saphenaria**) Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXX. 84: sect. Lecideae. (*Synon. Imbricaria Schreb.*, *Lobaria* et *Squamaria Hoffm.*) = Crocynia Achar. 1810.

Sapindaceae Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476. Gen. Sapindis addenda: Serjania, Akeesia, Kölreuteria, Hypelate, Stadmannia, Thouinia, Dodonaea, Eystathes, Amirola, Alectrion.
R. Brown 1818 in Tuck. Congo App. V. p. 427. (Verm. bot. Schr. I. p. 188.)
DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Pr. I. p. 601: ordo (43) Thalamiflorar. Trib. (1824): Paullinieae, Sapindeae, Dodonaeaceae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 654. Trib.: Sapindeae, Dodonaeaceae.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 99: ordo plant. Sect.: Paulliniaceae, *verae* (gen.: Schmidelia, Thouinia, Cupania, Sapindus, Melicocca), Dodonaeaceae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae. Gen.: Sapindus, Aesculus.
St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 61.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis. p. 589: ordo Trihilatar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: fam. Cyclospermar. Divis.: Tropaeoleae, Hippocastaneae, *Sapindaceae* (subdivis.: Paullinieae, Sapindeae, Dodonaeaceae, Rhizoboleae).

*) Nomen caribaeum *Saouari*.
**) σαφήνεια a σαφής, clarus, distinctus.

Sapindaceae Juss. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 199 (1832. Fl. exc. p. 768); 1837. Hdb. p. 284; 1841. Nom. p. 198: fam. Ranunculiflorar. Divis.: Zygophylleae, Sapindeae, Paullinieae.
Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 376. Trib.: Sapindeae, Dodonaeaceae. Gen. anomalum: Magonia. Gen. non satis nota: Enourea, Matayba, Aphania, Alectryon.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 48: fam. Sapindariear. Trib. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 362: ordo (212) Malpighinar. Divis. ut DC. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 57 (37). Trib. ut Cambess.
Link 1831. Hdb. II. p. 220: ordo 2 Anastemonum. Gen.: Cardiospermum, Paullinia, Sapindus.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Aceralium.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 37: fam. (35) Malpighinear. Trib. ut Cambess.
Mart. 1835. Consp. p. ... : fam. Malpighinar.
Endl. 1840. Gen. p. 1066; 1841. Ench. p. 560: ordo Acerum. Trib. ut Cambess. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 237; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIV. Gen. foss.: Cupanoides.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 87: fam. Aesculinear. Gen. ex Endl. (Appendix: Trigonieae.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 382: ordo Sapindalium. Subord.: Sapindeae, Hippocastaneae, Dodoneae, Meliosmeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 347: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Trib. ut Cambess.
Blume 1849. Rumphia III. p. ... : ordo dilatatus. Sect.: Sapindaceae *propriae* (trib.: Sapindeae, Allophylleae, Melicocceae, Cupanieae, Cossignieae, Paullinieae, Thouinieae), Dodonaeaceae, Acerineae, Hippocastaneae, Meliosmeae. *Cf.* Griseb. 1851. Arch. f. Naturg. II. p. 359.
Conf. Sapindi Juss.; Saponaceae Vent.; Sapindeae Spreng.

Sapindaei Konig 1806. Ann. of bot. II. p. 569. Novum gen.: Blighia.
= Sapindi Juss.

Sapindales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 373: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Tremandraceae, Polygalaceae, Vochyaceae, Staphyleaceae, Sapindaceae, Petiveriaceae, Aceraceae, Malpighiaceae, Erythroxylaceae.

Sapindarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43: ordo Toropetalar. Fam.: Sapindaceae, Acerineae, Malpighiaceae, Hippocrateaceae, Erythroxyleae, Moringaceae.

Sapindeae Spreng. 1818. Anleit. II. p. 695: fam. 73 plant. Gen.: Sapindus, Paullinia, Seriana, Blighia, Ephielis, Enourea, Cardiospermum; Thouinia, Hypelate, Melicocca, Ornitrophe, Euphoria, Molinaea, Aesculus, Rhizobolus.
Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 330: fam. Hypopetalear. Gen. §. 1: Cardiospermum, Urvillea, Serjania, Paullinia, Akeesia, Kölreuteria, Dimeresia, Talisia, Matayba, Aporetica. §. 2: Ornitrophe, Gemella, Cominia, Kabbe, Sapindus, Euphoria, Thouinia, Tou-

Sapindeae Spreng. cont.
licia, Melicocca, Cupania, Tina, Hypelate, Cossignia. §. 3: Dodonaea, Stadmannia, Amirola.
= Sapindaceae Juss.

Sapindeae DC. 1824. Prodr. I. p. 607: trib. Sapindacear. Gen.: Sapindus, Blighia, Talisia, Matayba?, Aporetica, Schmidelia, Euphoria, Thouinia, Toulicia, Cupania, Tina, Cossignia, Hypelate, Melicocca, Stadmannia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. Gen. plurima Candolleana et Molinaea. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 656. Gen. §. 1: Cardiospermum, Urvillea, Serjania, Paullinia, Enourea. §. 2: Toulicia, Schmidelia, Irina, Prostea, Lepisanthes, Sapindus, Erioglossum, Moulinsia, Cupania, Harpulia, Blighia, Talisia, Stadmannia, Matayba, Nephelium, Thouinia, Hypelate, Aphania, Melicocca. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 40. Gen. ut Cambess. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). Gen.: Aphania, Tripterocarpus, Serjania, Urvillea, Cardiospermum, Paullinia, Enourea?, Moulinsia, Pappea?, Erioglossum, Schmidelia, Thouinia, Toulicia, Cupania (Plum., Camb.), Mischocarpus, Blighia, Dimereza, Cupania (Juss., DC.), Harpullia, Tina, Ratonia, Stadmannia, Matayba, Ptaeroxylon?, Talisia?, Irina, Racaria, Nephelium, Sapindus, Lepisanthes, Prostea, Hypelate, Melicocca, Schleichera. — Endl. 1840. Gen. p. 1067. Gen.: Cardiospermum, Urvillea, Serjania, Toulicia, Bridgesia, Paullinia, Enourea, Schmidelia, Valenzuelia, Irina, Prostea, Lepisanthes, Sapindus, Erioglossum, Matayba, Moulinsia, Cupania, Aphania, Talisia, Nephelium, Thouinia, Hypelate, Melicocca, Schleichera. Accedunt 1841 (Ench. p. 561) dubia: Pierardia, Hedycarpus, 1842 (Spl. II. p. 85) Erythrophila, Natalia et 1850 (Spl. V. p. 78) Dicranopetalum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. Gen. ut Endl. 1842. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 348. Gen. ut Endl. 1840. — Blume 1849. Rumphia III. p. ... Gen.: Sapindus, Xerospermum, Cubilia, Nephelium, Stadmannia, Irina.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: subdiv. Sapindacear. Gen.: Sapindus, Schmidelia, Euphoria, Thouinia, Cupania, Cossignia, Melicocca.

Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 13. 18: sect. Sapindacear. Gen.: Cardiospermum, Urvillea, Serjania, Toulicia, Paullinia, Schmidelia, Irina, Prostea, Lepisanthes, Sapindus, Erioglossum, Moulinsia, Cupania, Talisia, Nephelium, Thouinia, Hypelate, Melicocca.

Bartl. 1830. Ord. p. 364: div. Sapindacear. Gen. ut DC. (exclusis Matayba et Aporetica) et Loxostylis, Dimereza, Guioa, Harrisonia.

Sapindeae Rchb. 1828. Consp. p. 200 (1832. Fl. exc. p. 769): div. Sapindacear. Subdivis.: Staphylaceae, Cupanieae, Dodonaeaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. Subdivis.: Hippocastaneae, Dodonaeeae, Cupanieae.

Sapindi Juss. 1789. Gen. p. 246: ordo 5 class. XIII. Gen. §. 1: Cardiospermum, Paullinia, Sapindus, Talisia, Aporetica. §. 2: Schmidelia, Ornitrophe, Euphoria, Melicocca, Toulicia, Trigonis, Molinaea, Cossignia. §. 3. *Affinia:* Matayba, Enourea, Cupania, Pekea.

Sapindus*) Tourn. 1700. Inst. p. 659. t. 440. Append.

Linn. 1737. Cliff. p. 152; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 171. n. 395; 1753. Sp. I. p. 367; 1759. Syst. ed. X. p. 1008. n. 448; 1762. Sp. ed. II. p. 526; 1764. Gen. ed. VI. p. 197. n. 499; 1767. Syst. ed. XII. p. 277. n. 494: g. Octandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 315; 1784. Syst. p. 380. — Reich. 1778. Gen. p. 201. n. 541. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 265. n. 681. — Lour. 1790. Coch. I. p. 238. — Gmel. 1791. Syst. p. 642. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 44. t. 62. — Pers. 1797. Syst. p. 407; 1805. Ench. I. p. 444. n. 983. — Willd. 1799. Sp. II. p. 468. n. 790; 1809. En. p. 432. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 257.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 84. n. 353: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Trihilatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 357. — Batsch 1802. Tab. p. 51.

P. Browne 1756. Jamaic. p. 206: g. Octandr. Monogyn. — Par. Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 36. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 278.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Geranior.

Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.

Scop. 1777. Intr. p. 253: g. Polycarpiar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 341. t. 70. f. 3 (rigida et Mukorossi).

Juss. 1789. Gen. p. 247: g. Sapindor.

Neck. 1790. El. II. p. 328. n. 1116: g. Acascophytor.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 127: g. Saponacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 9. — Hedw. 1806. Gen. p. 285. n. 1142.

Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476: g. Sapindacear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 127. (verar.) — Link 1821. En. I. p. 387; 1831. Hdb. II. p. 221. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62. — Kunth 1824. Syn. III. p. 164. (verar.) — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 389. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1318. — Brongn. 1843. En. genr. p. 87. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 395 (*Savonier*).

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 695; 1825. Syst. II. p. 250. n. 1504; 1830. Gen. I. p. 322. n. 1643: g. Sapindear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 607. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 535 (*Savonier*). — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 56. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 665. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 110. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 52. — Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Torr. & Gray

*) Nomen contractum ex Sapo indicus.

Sapindus Tourn. cont. 1840. North-Am. I. p. 254. — Endl. 1840. Gen. n. 5610. p. 1070; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1842. Rep. I. p. 416; 1846. V. p. 362. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 279. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 378.

Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5222; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7590: g. Cupaniear.

Synon. Electra Nor.; Pappea Eckl. & Zeyh.; Acrophyllum Meyer.

Sapinus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 82; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 6. n. 1803 *A:* subg. Pini. Sect.: Tsuga, Abies, Picea, Larix, Cedrus.

Sapiopsis Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 512: sect. Stillingiae. (S. cremostachys.)

Sapium*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 338: g. Monoec. sect. 1.

Jacq. 1763. Amer. p. 249. t. 158: g. Monoec. Monadelph. (S. aucuparium.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 657. n. 1469. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 572. n. 1726. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 691.

Adans. 1763. Fam. II. p. 357: g. Tithymalor.

Scop. 1777. Intr. p. 239: g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 805. n. 3085; 1831. Gen. II. p. 686. n. 3461.

Juss. 1789. Gen. p. 390: g. Euphorbiar.

Neck. 1790. El. II. p. 344. n. 1138: g. Cyrtosiphytor.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 499: g. Tithymaloidear.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 287: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 589. n. 2150. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 64. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 64 (*Gluttier*). — Kunth 1822. Syn. I. p. 392. — Link 1822. En. II. p. 407. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 49. t. 15.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 370: g. Euphorbiear.

Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5028; 1837. Hdb. p. 281: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Huracear.

Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 187: subg. Stillingiae.

Endl. 1842. Spl. II. p. 88. n. 5780 *b:* sect. Stillingiae. — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 513.

Saponaceae Vent. 1799. Tabl. III. p. 125: ordo 9 class. XIII. Gen. §. 1: Cardiospermum, Paullinia, Sapindus, Kölreuteria. §. 2: Ornitrophe, Euphoria, Melicocca.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 8. t. 72. Gen.

*) Sapium Plinii species pini.

Saponaceae Vent. cont. Sapindor. Juss. 1789 et in §. 2: Thouinia, Guioa.

Saponaria*) Linn. 1737. Gen. p. 130. n. 365; 1737. Cliff. p. 165; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 106; 1753. Sp. I. p. 408; 1759. Syst. ed. X. p. 1029. n. 499; 1762. Sp. ed. II. p. 584; 1764. Gen. ed. VI. p. 224. n. 564; 1767. Syst. ed. XII. p. 307. n. 559: g. Decandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 347; 1784. Syst. p. 416. — Reich. 1778. Gen. p. 229. n. 613. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 302. n. 769. — Gmel. 1791. Syst. p. 709. — Pers. 1797. Syst. p. 446. — Willd. 1799. Sp. II. p. 677. n. 892; 1809. En. p. 464. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 286. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 445.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 378: g. Dicotyledonum Diplostemonum.

Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 117: g. pl. class. V.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 95. n. 390: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 76.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 302. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 245. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 116. — DC. 1805. Franç. IV. p. 737; 1815. V. p. 601. — Hedw. 1806. Gen. p. 329. n. 1295. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 831 (genuinar.); 1825. Syst. II. p. 374. n. 1696; 1830. Gen. I. p. 347. n. 1887. — Link 1821. En. I. p. 414. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 642. (verar.) — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 332. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 62. 140. — Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5360. Sect.: Proteina, Bolanthus, Bootia, Saponaria. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 132. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1551. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 349.

Adans. 1763. Fam. II. p. 506: g. Alsinium.

Hill 1769. Ht. kew. p. 194: g. Pentapetalar.

Scop. 1772. Carn. I. p. 303: sect. Lychnidis.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 200. 250 (*cf. Bootia* et *Saponaria Medic.* Phil. Bot. I. p. 52 et p. 96 *Vaccaria*).

Neck. 1790. El. II. p. 163. n. 864: g. Catotaphytor., disjuncta Bootia restrictum.

Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 365: g. Silenear. Sect.: Vaccaria, Bootia, Proteinia, Bolanthus. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 147. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1832. Fl. exc. p. 800. Sect.: Vaccaria, Saponaria. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 307. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 396. Sect. ut Ser. — Link 1831. Hdb. II. p. 239. — Koch 1836. Syn. p. 99. Ed. II. p. 108. Sect.: Vaccaria, Bootia. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 161. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Kunth 1838. Berol. I. p. 111. (genuinar.) — Torr. & Gray 1838. North-Am. I.

*) Nomen, quod saponis vicem praebeat ad pannos purgandos.

Saponaria Linn. cont.
p. 195. — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 124. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Dianthear. (genuinar.) — Par. A. Braun 1843. Flora p. 377. Sect.: Bootia, Proteinia.
Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5246. p. 972; 1841. Ench. p. 506: g. Lychnidear. Sect.: Smegmanthe, Silenanthe, Melandrium.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7818: g. Saponariear. (restrictissimum.)

Saponaria Fenzl 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. n. 5246. p. 77; 1843. Suppl. III. p. 93: g. Lychnidear. (sejunctis Silenanthe et Melandrio) restrict. Sect.: Bolanthus, Bootia, Cymanthus, Proteinia, Smegmathamnium. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 300. Sect.: Bootia, Proteinia. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 290.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 180: g. Silenear. Sect.: Bootia, Smegmathamnium, Proteinia.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 225: g. Dianthear.
Synon. Smegmanthe Fenzl 1840.

Saponarieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 205: subdiv. Dianthear. genuinar. Gen.: Gypsophila, Heterochroa, Dichoglottis, Bolanthus, Bootia, Proteinia, Smegmathamnium, Saponaria, Vaccaria.

Sapota*) Plumier 1703. Gen. p. 43. t. 4.
Adans. 1763. Fam. II. p. 166: g. Vaccinior.
Gmel. 1791. Syst. p. 750: g. Dodecandr. Monogyn.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 103. t. 104. f. 1. (S. Achras.)
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 136. t. 207.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 172: g. Sapotacear. Sect.: Achras, Oligotheca. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 455. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 351. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1035. Sect. ut A. DC.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 174: g. Sapotear.
Synon. Achras P. Browne.

Sapotaceae Rchb. 1828. Consp. p. 135: fam. Stelliflorar. Divis.: Styraceae, Ardisiaceae, Lucumeae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 431. Divis.: Fraxineae, Oleinae, Aquifoliaceae, Styraceae, Diospyreae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 213; 1841. Nom. p. 135. Divis.: Jasmineae, Ilicinae, Sapoteae.

Sapotaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 27: fam. (restricta) Jasminariear. Gen.: Bumelia, Sersalisia, Sideroxylon, Argania, Chrysophyllum, Inocarpus, Nycterisition, Achras, Lucuma, Mimusops, Imbricaria, Bassia.
Endl. 1833. Fl. Norfolk. p. 48.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 225) 1847. Veg. kd. p. 350: ordo Rhamnalium. Gen. ut A. DC.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 26: ordo Corollaeflorar. Gen.: Sersalisia, Argania, Sideroxylon, Bumelia, Nycterisition, Chrysophyllum, Achras, Lucuma, Inocarpus, Mimusops, Imbricaria, Omphalocarpum, Bassia, Labatia, Pouteria, Phelline; Montabea?
Endl. 1839. Gen. p. 739: ordo (158) Petalanthar. Gen.: Chrysophyllum, Sideroxylon, Labatia, Sersalisia, Bumelia, Argania, Achras, Lucuma, Bassia, Mimusops, Imbricaria, Omphalocarpus. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1410 et Ench. p. 360) Ecclinusa et 1843 (Spl. III. p. 81) Synarrhena, Labourdonnaisia.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 154: ordo (124) Corolliflorar. Gen.: Chrysophyllum, Pouteria, Labatia, Lucuma, Sapota, Hormogyne, Sersalisia, Sideroxylon, Argania, Isonandra, Dipholis, Bumelia, Labourdonnaisia, Delastrea, Azaola, Payena, Bassia, Imbricaria, Mimusops, Omphalocarpum, Rostellaria?
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 350: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Gen. ut A. DC.
Synon. Sapotar. gen. Juss.; Vaccinior. pars Adans.; Hilospermae Vent.; Sapoteae Juss.

Sapotae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 30 plantar. Gen.: Myrsine, Leucoxylon, Achras, Chrysophyllum, Sideroxylum, Carissa, Olax, Rauvolfia, Jacquinia, Ophioxylum, Cerbera.
Juss. 1789. Gen. p. 151: ordo 15 class. VIII. Gen.: Jacquinia, Manglilla, Sideroxylum, Bassia, Mimusops, Imbricaria, Chrysophyllum, Lucuma, Achras. *Affinia:* Myrsine, Inocarpus, Olax, Leea.
Batsch 1802. Tab. p. 204: fam. Nudar. Gen.: Jacquinia, Manglilla, Sideroxylon, Cryptostomum, Bassia, Mimusops, Imbricaria, Lucuma, Achras; Myrsine, Inocarpus, Olax, Leea; Diospyros, Royena, Chaetocarpus, Styrax, Halesia; Alstonia, Symplocos, Ciponima, Paralea, Hopea.

Sapoteae Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 263 (*Sapotilliers* ou *Sapotées*): fam. plant. Gen.: Mimusops, Achras, Chrysophyllum, Omphalocarpum, Bassia.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 341. t. 53. Gen. Sapotar. Juss. et Bumelia.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 528. Ed. Nees p. 384: ordo Dicotyledonum monopetalar. Novum gen.: Sersalisia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 497: fam. 50 plant. Gen.: Achras, Mimusops, Imbricaria, Jacquinia, Römeria, Bumelia, Sideroxylon, Chrysophyllum, Bassia; Ophiospermae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Corolliflorar.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: ordo Aridifoliar.
Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 336: fam. Hypocorollear. Gen.: Sideroxylum, Sersalisia, Bumelia, Bassia, Mimusops, Chrysophyllum, Lucuma, Achras, Omphalocarpum.
Link 1829. Hdb. I. p. 599: ordo (36) Hypanthar. Gen.: Chrysophyllum, Achras, Lucuma.

*) Nomen americanum vulgare.

Sapoteae Juss. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 161: ordo (99) Styracinar. Gen.: Achras, Lucuma, Chrysophyllum, Imbricaria, Binectaria, Mimusops, Bassia, Bumelia, Hunteria, Sersalisia, Sideroxylon, Argania, Omphalocarpus. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 251 (159). Gen. ead. (exclusis Binectaria et Hunteria) et Hornschuchia?, Mouroucoa?, Pouteria.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (169) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 27: ordo Primulalium.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 383: fam. (151) Styracinear. Gen. Sapotacear. Endl. et Binectaria, Mouroucoa?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 73: fam. Diospyroidear. Gen. ex Sapotaceis Endl.
= Sapotaceae Endl.

Sapoteae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLII: fam. Stelliflorar. Divis.: Fraxineae, Oleinae, Styraceae, Myrsineae, Lucumeae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: div. Sapotacear. Subdivis.: Aegicereae, Styraceae, *genuinae* (sect.: Chrysophylleae, Diospyreae, Mimusopeae). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. Subdivis.: Diospyreae, Inocarpeae, Mimusopeae.

Sapotilleae Röm. & Schult. Syst. IV. p. XVIII: vid. *Sapoteae Juss.*

Sappania*) DC. 1825. Prodr. II. p. 482: sect. Caesalpiniae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 430. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 103. — Endl. 1841. Gen. n. 6765 *c*. p. 1313; 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6067. 3. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 108.
Synon. Campecia Adans.

Sapria Griff. .... Proc. Linn. Soc. p. 217; 1842. Linn. Trans. XIX. p. 303; 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 314: nov. g. Rafflesiacear. (S. Himalayana.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 772.
R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. p. 244 (Flora 1848. II. p. 552): g. Rafflesicar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 93: g. Rafflesear.

Saprolegnia**) Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 513: nov. g. Hydronematear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 47. p. 340.
Fries 1825. Pl. homon. p. 345: g. Leptomitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 442; 1841. Nom. p. 18. n. 608.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phyc. gener. p. 157; 1845. Phyc. germ. p. 127; 1849. Sp. Alg. p. 159. n. 113: g. Saprolegniear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 69. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 352. — Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 229. — Math. 1853. Belg. II. p. 530.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 101: g. Confervear. genuinar.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. oligocytidear. bicellularium.
Synon. Hydronema Carus; Achlya Nees.

Saprolegnieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phycol. gener. p. 157; 1845. Phycol. germ. p. 127; 1849. Spec. Alg. p. 159: fam. Mycophycear. Gen.: Saprolegnia, Mycocoelium. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 68. Gen. ead.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 229: fam. Chlorosporear. Gen.: Saprolegnia.
Math. 1853. Belg. II. p. 530: trib. 27 Algar. Gen. id.

Saproma „Moug. & Nestl.“ Brid. 1826. Bryol. I. p. 52: g. Acrocarpor. astomor. (S. vogesiacum.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 47. p. 341.
= Eubruchia Müll.

Saprophilei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: trib. Cystosporeor. Sect.: Mucorinei, Pilobolei, Syzygitei?

Saprosma*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 956: nov. g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 178: g. Coffeacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 446.
DC. 1830. Pr. IV. p. 493: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 576. — Endl. 1838. Gen. n. 3159. p. 534; 1841. Ench. p. 272. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 45. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 110.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2809: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 302: g. Coffeinear.

Saraca Linn. 1767. Mant. p. 13. n. 1267; 1767. Syst. ed. XII. p. 469: g. Diadelph. Hexandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 529; 1784. Syst. p. 636. — Reich. 1778. Gen. p. 362. n. 919. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 480. n. 1153. — Gmel. 1791. Syst. p. 1079. — Pers. 1797. Syst. p. 674; 1807. Ench. II. p. 268. n. 1657. — Willd. 1800. Sp. III. p. 856. n. 1311. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 382. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 158. n. 2482.
Burm. 1768. Fl. ind. p. 85. t. 25.
Scop. 1777. Intr. p. 100: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 422: g. Leguminosis aff.?
Neck. 1790. El. III. p. 113. n. 1447: g. Daphonophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 773; 1831. Gen. II. p. 567. n. 2765: g. Leguminosar. (anomal.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 343.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 85: g. Amherstiear.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 610: g. Caesalpiniear.
= Jonesia Roxb.?

Saracena Hill vid. *Sarracena Tourn.*

Saracenia Spreng., Rchb. vid. *Sarracenia Linn.*

---

*) *Sappan* nomen malabaricum arboris.
**) *σαπρός*, mucidus; *λέγνη*, fimbria.

*) *σαπρός*, mucidus; *ὀσμή*, odor.

Saracha*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 31. t. 34; 1799. Fl. Peruv. II. t. 178—180: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 344 et Poir. ibid. p. 345 (*Saraquier*).
Pers. 1805. Ench. I. p. 219: sect. Atropae.
Hedw. 1806. Gen. p. 124. n. 547: g. Solanear. — Par. Link 1821. En. I. p. 180. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3304. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24 (*Sarachra*). — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 451.
Bartl. 1830. Ord. p. 194: g. Solanacear. — Par. Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 127.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Physalidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179: g. Witheringear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 429: g. Solaninear.
Synon. Bellinia Röm. & Schult.; Jaltomata Schltd.; Cycolis Bernh.; Sarracha Rchb., Endl.; Jaltonia Steud.

Sarachra Dumort. vid. *praeced.*

Saranthe Reg. & Kcke. 1857. Ind. sem. h. bot. Petr. (Müll. Ann. bot. VI. p. 32): subg. Marantae. (Phrynium setosum Rosc.)

Sarcandra**) „Gardner Calcutta journ. VI. p. 348" Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 352: g. Chloranthear. (S. chloranthoides.)
Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 5. t. 1946: g. Chloranthacear.
= Chloranthus Swartz. (Miq.)

Sarcanthemum Cassini 1818. Bull. soc. philom. p. 74: nov. g. Asterear. (Conyza coronopus Lam.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 190.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1827. v. 47. p. 349; 1830. v. 60. p. 581: g. Psiadiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2523: g. Psiadiacear.
DC. 1836. Pr. V. p. 367: g. Solenogynear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2390. p. 387; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3589. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Sarcanthidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: sect. Vandear. Gen.: Eulophia, Galeandra, Cyrtopera, Lissochilus, Doritis, Luisia, Vanda, Renanthera, Phalaenopsis, Diplocentrum, Microsaccus, Camarotis, Chiloschista, Gunnia, Micropera, Saccolabium, Sarcochilus, Taeniophyllum, Cleisostoma, Ceratostylis, Ephippium, Ceratochilus, Echioglossum, Sarcanthus, Pteroceras, Agrostophyllum, Adenoncos, Oeceoclades, Trichoglottis, Aërides, Schoenorchis?, Aëranthus, Cryptopus, Oeonia, Angraecum, Mystacidium, Microcaelia, Appendicula, Podochilus, Cryptoglottis, Glomera, Thelasis,

Sarcanthidae Lindl. cont.
Tetrapeltis, Conchochilus?, Todaroa? *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 170.

Sarcanthus Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 233: nov. g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1506; 1841. Nom. p. 54. n. 2094. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1489. p. 206; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 700.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 665. n. 3357: g. Orchidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Sarcanthus Anderss. .... Om Galap. Oarnes veg. p. 209: nov. g. Borraginear., Cynoglosso aff. (S. asperrimus.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 539.

Sarcidium Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 18: sect. Sclerotii. (S. violaceum.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 317. 5.

Sarcina*) Goodsir: nov. g. Entophytor., Gonio Ehr. aff., naturae ambiguae. *Cf.* Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 273.

Sarcinanthus Örsted 1857. Nat. For. Vid. Medd. p. 195 (10): nov. g. Cyclanthear. (S. utilis.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 861.

Sarcobateae Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 41: trib. Spirolobear. Gen.: Sarcobatus.

Sarcobatus**) Nees 1829 in Neuwied Reise Nord-Am. I. p. 510. II. p. 447: nov. g. Urticear. (S. Maximiliani.)
Seubert 1844. Bot. Zeit. p. 753. t. 7: g. Chenopodiacear.? Char. emend.
Lindl. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 1: g. Chenopodiaceis aff.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 41. n. $1939/_1$: g. Sarcobatear.
Synon. Fremontia Torr.

Sarcobolus Dietr. vid. *Sarcolobus R. Brown.*

Sarcoca Rafin. 1836. Fl. Tell. n. 628.
= Phytolaccae Tourn. pars.

Sarcocalyx Zippel. ex Macklock 1829 in Bijdr. tot nat. Wet. V. p. 142. (Féruss. Bull. XVIII. p. 92.)
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 50: inter genera nondum descripta.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 688: sect. Exocarpi. An genus distinctum?

Sarcocalyx Walpers 1839. Linnaea XIII. p. 479: nov. g. Genistear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6483. p. 1264; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5874. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 350.
= Sarcophyllus Thunb.

Sarcocapnos***) DC. 1821. Syst. II. p. 129; 1824. Prodr. I. p. 129: g. Fumariacear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 36. — Bartl. 1830. Ord. p. 260. — G. Don 1831. Gen.

*) Dicat. Fr. Isid. Saracha.
**) σάρξ, σαρκός, caro.

*) σάρκινος, carneus, carnosus.
**) βάτος, rubus.
***) καπνός, fumus.

Sarcocapnos DC. cont.
syst. I. p. 144. — Link 1831. Hdb. II. p. 276. — Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10).
Spreng. 1826. Syst. III. p. 163. n. 2486; 1831. Gen. II. p. 568. n. 2769: g. Fumariear. (Diadelph. Hexandr.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4829. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 470: g. Monocentrear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7061: g. Corydalear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 61: g. Corydalinear.
Endl. 1838. Gen. n. 4841. p. 860; 1841. Ench. p. 444: g. Corydalidear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 24.
Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 66: sect. Corydalidis.
Conf. Aplectrocapnos Boiss.

Sarcocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46: ordo Engastriocarpor. Gen. *cf. Sarcocarpi Pers.* 1801.

Sarcocarpa G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 727: sect. Scaevolae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 506. n. 3038 *a*.
Synon. Cerbera Lour.; Glypha Lour.; Sarcocarpaea DC.

Sarcocarpaea DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 505: sect. Scaevolae. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 261. n. 3038 *a*. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 390.
= Sarcocarpa G. Don.

Sarcocarpi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIII: ordo Angiocarpor. Gen.: Sclerotium, Tuber, Pilobolus, Thelebolus, Sphaerobolus. — Simil. Leman 1817. Dict. v. 8. p. 106. Gen.: Cyathus, Stictis, Thelebolus, Sphaerobolus, Erysiphe, Tubercularia, Rhizoctonum, Sclerotium, Tuber.
Rebent. 1804. Neom. p. 360: div. Gasteromycor. Gen.: Sclerotium.

Sarcocarpon Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 21: nov. g. inter Anonaceas et Menispermeas intermedium, forsan cum Schizandris novam familiam constituens. *Cf.* Linnaea I. p. 497.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 202: g. Polyandr. Polygyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1898: g. Schizandrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 243: g. Menispermear. desciscens.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 101 (*Sarcocarpum*): g. Schizandriacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7): g. Schizandracear.
= Kadsura Juss.

Sarcocarpum Pers. 1797. Tent. disp. p. 15: ordo Angiothecii. Gen.: Tuber, Sclerotium.
Conf. Sarcocarpi Pers. 1801.

Sarcocarpum G. Don vid. *Sarcocarpon Blume.*

Sarcocaulon DC. 1824. Prodr. I. p. 638: sect. Monsoniae. (An genus?) — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 287. — Endl. 1840. Gen. n. 6047 *c*. p. 1167; 1841. Ench. p. 620.

Sarcocaulon DC. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5282; 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7668: g. Monsoniear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 57 (41).
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 715: g. Geraniacear. — Par. Klotzsch 1835. Linnaea X. p. 428.

Sarcocephaleae DC. 1830. Prodr. IV. p. 367: subtrib. Gardeniacear. Gen.: Sarcocephalus, Zuccarinia, Lucinaea. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 487. Gen. ead. et Canephora. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). Gen. ut Don et Breonia?, Lecananthus?
Endl. 1838. Gen. p. 558; 1841. Ench. p. 274: subtrib. Gardeniear. Gen. ut Don et Breonia.
Rchb. 1841. Nom. p. 78: subsect. Gardeniear. Gen. ut Endl.

Sarcocephali Nees 1816. Syst. p. 87; 1817. Überbl. p. 24: series Mucorum. Gen.: Stilbum, Dacryomyces, Epichysium.
Mart. 1817. Erlang. p. 366: fam. Trichomycetum. Gen.: Stilbum, Dacryomyces.

Sarcocephalus Afzel. in herb. Banks.
Sabine 1824. Hortic. trans. V. p. 442. t. 18.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 291: g. Cinchonear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 367: g. Sarcocephalear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 487. — Endl. 1838. Gen. n. 3281. p. 558; 1841. Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2936.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 401: g. Gardeniear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 132: g. Naucleear.
Synon. Cephalica Thonn.

Sarcochilos Spreng., Bartl. vid. *seq.*

Sarcochilus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 332. Ed. Nees p. 188: nov. g. Orchidear. (S. falcatus.) — Par. Lindl. 1826. Orch. scel. p. 19 (Linnaea II. p. 532) tribus incertae. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 721. n. 2990 (*Sarcochilos*); 1831. Gen. II. p. 665. n. 3358. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 353. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1578. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 241.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Bartl. 1830. Ord. p. 58 (*Sarcochilos*): g. Epidendrear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.
Lindl. 1833. Orchid. p. 142; 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1832: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1405. p. 197; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2007. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 688.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Sarcochlaena Spreng. vid. *Sarcolaena Pet.-Thouars.*

Sarcochlamydeae Weddell 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 175; 1857. ibid. VII. p. 371: subtrib. Böhmeriear. Gen.: Neraudia, Sarcochlamys, Laurea, et 1857 Cypholophus, Touchardia.

Sarcochlamys Gaudich. Voy. Bonite. Bot. t. 80.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 197 (Flora 1855. p. 522); 1857. ibid. VII. p. 379: g. Sarcochlamydear.

Sarcocidia Rafin. 1836. Fl. Tell. n. 626: vid. *Gieseckieae Endl.*

Sarcoclinium Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 24. t. 1887. 1888: nov. g. Crotonear. (S. longifolium.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 309: g. Jatrophidear.

Sarcocnide Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 225: sect. Böhmeriae.

Sarcococca Lindl. 1826. Bot. Regist. XII. t. 1012.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5089; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7443: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 489. — Endl. 1840. Gen. n. 5875. p. 1124; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Brongn. 1843. En. genr. p. 81. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 190.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 690. n. 3481: g. Tricoccar. (Monoec. Tetrandr.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 667: g. Buxacear.

Sarcocolla*) Linn. 1735. Syst. ed. I: g. serius Penaeae insertum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 225: g. Jasminor.
Kunth 1830. Linnaea V. p. 677: g. Penaeacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2117. p. 335; 1841. Ench. p. 213; 1847. Spl. IV. p. 73. Sect. (1847): Eusarcocolla, Glischrocolla. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241). — A. Juss. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 25. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 578. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 321. Sect. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2425: g. Penaecear.
A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 488: g. Penear. restrictum.

Sarcocordylis Wall. ex Steud. Nomencl. I. p. 181; II. p. 513.
= Balanophora gigantea Will.

Sarcocrambe DC. 1821. Syst. II. p. 651; 1824. Prodr. I. p. 225: sect. Crambes. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4724 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 256. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 214. — Endl. 1839. Gen. n. 4967 *a*. p. 886; 1841. Ench. p. 451.

Sarcodactilis Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 39. t. 185. f. 1 (helicteroides).
Steud. 1841. Nom. II. p. 513 (*Sarcodactylis*): g. Malvacear.?
= Citrus Linn. (Lindl. Veg. kingd. p. 458.)

Sarcodactylis Steud. Nom. et Auct.: vid. *praeced.*

*) Nomen ex Dioscoride. (κόλλα, gluten.)

Sarcodendron Nuttall 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 361: sect. Rhododendri. Subsect.: Maddenia.

Sarcoderma Ehrenb. 1830 in Poggend. Ann. d. Phys. p. 504.
= Palmella Lyngb.

Sarcodes Torrey 1853. Pl. Fremont. p. 17. t. 10: nov. g. Pyrolear., Schweinitziae aff. (S. sanguinea.) *Cf.* Flora 1853. p. 706.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 458: g. Hypopitysear.

Sarcodia „J. Agdh. Spec. Alg. II. p. 622" Harv. 1855 in Hook. f. Fl. N. Zeal. II. p. 242: g. Sphaerococcoidear.

*Sarcodiphytum**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 66: gen. 18 plantar. Spec. natur.: Chrysobalanus, Amygdalophora, Trichocarpus, Prunophora, Cerasophora, Pirophorum, Apirophorum, Punica, Mespilophora, Crataegus, Sorbus, Psidium, Burchardia, Robinsonia, Myrthus, Rugenia (*Rugénée*: pro Eugenia), Philadelphus, Spallanzania, Sonneratia, Mesembryanthus, Gynicidia, Abryanthemum, Nycteranthus, Cactus, Cirinosum, Carpophillus, Phyllarthus, Tetragonia, Haloragis, Caryophyllus, Sesuvium, Aizoon, Spiraea, Filipendula, Alipendula, Rubus, Dalibarda, Bossekia, Rhodophora, Fragaria, Potentilla, Tridophyllum, Tormentilla, Comarum, Dryas, Geum, Bernoullia, Calycanthus, Serveria, Cliffortia, Morilandia, Agrimonia, Aremonia, Poterium, Faya, Glinus.

Sarcodium Pers. vid. *seq.*

Sarcodum**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 461. Ed. Willd. p. 564: nov. g. Diadelph. Decandr. (S. scandens.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 352. n. 1752 (*Sarcodium*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 755; 1826. Syst. III. p. 248. n. 2560; 1831. Gen. II. p. 585. n. 2873: g. Leguminosar. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 522 (incertae sedis). — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 355. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 466.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3959: g. Phaseolear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62): g. Clitoriear.?

Sarcogasteres Spreng. 1827. Syst. IV. p. 379: trib. Gastromycetum. Gen. unicum: Tremella.

Sarcoglottis Presl 1827. Reliq. Hänk. I. p. 95. t. 15: nov. g. Epipactear. *Cf.* Flora 1828. I. p. 345.
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1437: g. Neottiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Endl. 1837. Gen. p. 213. n. 1547 *c*; 1841. Ench. p. 113. n. 1559 *c*; 1842. Spl. II. p. 19. n. 1559 *b*: sect. Spiranthis. — Par. Lindl. 1840. Orchid. p. 475. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2114. 4.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Spiranthidar.
Rchb. f. 1849. Linnaea XXII. p. 815: sect. Stenorrhynchidis.

*) σαρκώδης, carnosus; φυτόν, planta.
**) σαρκώδης, carnosus: a legumine carnoso.

Sarcogonella Meisn. 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 147: sect. Mühlenbeckiae.
= Andinia Wedd.

Sarcogonum Don . . . . in Sweet ht. brit. ed. III. p. 577.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 51. n. 1990/$_1$ *a*: sect. Mühlenbeckiae. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 145.

Sarcographa Fée 1824. Crypt. cort. p. 58. t. 16; 1841. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 3 (Monogr.): nov. g. Graphidear. *Cf.* Leman 1823. Dict. v. 47. p. 356.
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 543. 14: sect. Opegraphae?
Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 355: g. Glyphidear.
= Medusula Eschw.

Sarcogyne Flotow 1850. Bot. Zeit. p. 382. (Errore insertum. *Cf. seq.*)

Sarcogyne Flotow 1851. Bot. Zeit. p. 753: nov. g. Graphidear.?
Massal. 1854. Geneacaena Lich.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 315. 337: g. Strepsodinear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 266: g. Lecidinar.
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Euphymatopsidear. (*Synon. Myriosperma Näg.*)
Arnold 1858. Flora p. 507: g. Sarcogynear.

Sarcogyneae Arnold 1858. Flora p. 507: trib. Lecideacear. Gen.: Sarcogyne, Strangospora, Tromera, Sagiolechia.

Sarcoidei Nees 1817. (Syst.) Überbl. p. 39: circulus Fungor. aëreor. Gen. unicum: Tremella.

Sarcolaena Petit-Thouars 1806. Vég. îl. Afr. II. p. 37. 46: nov. g. Chlaenacear. — Par. Juss. 1817. Dict. v. 9. p. 386. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 824; 1825. Syst. II. p. 594. n. 1912 (*Sarcochlaena*); 1830. Gen. I. p. 431. n. 2137. (Polyandr. Monogyn.) — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 356. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 210. n. 5479; 1841. Nom. p. 211. n. 8015. — Endl. 1840. Gen. n. 5398. p. 1015; 1841. Ench. p. 528. — Meisn. 1843. Comm. p. 344. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 487.
Pet.-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 53 in Römer Coll. botan. p. 207: g. Chlenacear. Par. DC. 1824. Pr. I. p. 521. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. — Bartl. 1830. Ord. p. 337. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 562. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 54. — Meisn. 1837. Gen. p. 35. — Rchb. 1837. Hdb. p. 308.
Synon. Tantalus Nor.

Sarcolipes*) Ecklon & Zeyh. 1837. Enum. pl. Afr. III. p. 290: nov. g. Crassulacear., Bulliardae proximum.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): subg. Crassulae.
Endl. 1839. Gen. n. 4610 *a*. p. 809; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6177. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 252.

Sarcolippia Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 595; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 252: sect. Lantanae. (Lippiae sect. 1 Cham. in Linnaea VII. p. 213.)

Sarcolobeae Endl. 1838. Gen. p. 595; 1841. Ench. p. 299: sect. Hoyear. Gen.: Sarcolobus, Gymnema. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (176). Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 130. Gen. ead.

Sarcolobus R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 35 (Verm. bot. Schr. II. p. 372): nov. g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 487; 1825. Syst. I. p. 845. n. 976; 1830. Gen. I. p. 210. n. 1072. (Pentandr. Digyn.) — Schult. 1820. Syst. VI. p. IX. 58. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 47. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580 (*Sarcobolus*); 1840. II. p. 896.
Leman 1827. Dict. v. 47. p. 359: g. Apocynear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 130. n. 3422: g. Pergularinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Pergulariear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 136: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3497. p. 595; 1841. Ench. p. 299: g. Sarcolobear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (176). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5034.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 501.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 625: g. Gymnemar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Sarcomenia Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 56: nov. g. Sphaerococcoidear. (S. delesserioides.)
Sonder 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 194: g. Delesseriear. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 880. n. 585.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Plocariear.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 627: g. Rhodomelear.

Sarcomeris Naudin 1850. Compt. rend. XXX. Avr.: nov. g. Lasiandrear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 340: g. Clidemiear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 889.

Sarcomitrium Corda 1835 in Sturm Jungerm. p. 119: nov. g. Hepaticinor. (Jung. palmata Hedw.)
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 167: g. Hepaticar. frondosar. (ampliat.)
= Aneura Dumort.

Sarcomorphis Bojer mss.
= Salsola Gärtn. (Moq. in DC. Pr. XIII. 1. p. 179.)

Sarcomphaloides DC. 1825. Prodr. II. p. 32: sect. Ceanothi.
= Noltea Rchb.

Sarcomphalus P. Browne 1756. Jamaic. p. 179: nov. g. Pentandr. Monogyn.
= Scutia Comm.

*) σαρκολιπής, macilentus.

Sarcomycetes Link 1824. Spec. I. p. IV: ordo Cryptophytor.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: fam. Mycetum. Divis.: Pezizoidei, Helvellacei, Geoglossei, Thelephorei, Clavariacei.
Sarcomyci Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 95: ordo Fungor. Divis.: Tremelloidei, Thelephorei, Helvelloidei.
Sarconemus Rafin. 1820. Anal. nat. (ex Leman 1827. Dict. v. 47. p. 360): g. Fungor. incertum.
Sarcopetalon „Pappe mss." Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 350: sect. Tulbaghiae.
Sarcopetalum Zolling. vid. *Saccopetalum Benn.*
Sarcophyceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Gigartinear. Gen.: Sarcophycus.
Sarcophycus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 392: nov. g. Chaetangiear. (Fucus potatorum Labill.) *Cf.* Flora 1849. I. p. 168. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54. (?)
Aresch. 1847. Öfvers. k. Vet. Ak. Förh. IV. p. 267 (Bot. Zeit. 1848. p. 502): g. Fucacear. — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 189.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: g. Sarcophycear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 587. n. 398: g. Fucear.
Sarcophylla Stackhouse 1816. Nereis brit. ed. alt. (*cf.* Spreng. 1820. Neue Entd. I. p. 94 et Leman 1827. Dict. v. 47. p. 360): nov. g. Algar.
Sarcophyllis Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 401; 1849. Spec. Alg. p. 747. n. 495: nov. g. Gigartinear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Floridear. dubium.
Sarcophyllum Willd. 1800. Spec. III. p. 968. n. 1337: g. Diadelph. Decandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 281. n. 1687.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 137. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4035; 1841. Nom. p. 150. n. 5855. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 143. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 32. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6498. p. 1266; 1841. Ench. p. 668.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 230. n. 2539: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 360.
= Sarcophyllus Thunb.
Sarcophyllus Thunb. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 323; 1800. Nov. gen. X. p. 135; 1800. Prodr. II. p. 125. 193; 1818. Fl. cap. II. p. 573: nov. g. Diadelph. Decandr.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 580. n. 2840: g. Leguminosar.
Synon. Sarcophyllum Willd. et Auct.; Sarcocalyx Walp.
= Aspalathi spec. (Benth. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 583.)

Sarcophysa Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 166: nov. g. Solandrear. (S. speciosa.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 172: g. Solanear. — Par. Triana 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 42.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 531: sect. Juanulloae.
Synon. Hydrocalyx Triana mss.
Sarcophyte Sparrm. 1776. Kongl. Vet. Ac. Handl. XXVII. p. 300. t. 7: nov. g. plant. *Cf.* Schltd. 1828. Linnaea III. p. 194.
Agdh. 1825. Aphor. p. 203: g. Cynomoriear.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 11: g. Lophophytear.
Endl. 1836. Gen. n. 714. p. 73; 1841. Ench. p. 52: g. Sarcophytear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. — Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2328. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274).
Griff. 1842. Linn. Trans. XIX. p. ... (Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 344.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 90: g. Sarcophytidar.
Synon. Sarcophytum Rchb.; Ichthyosma Schltd.; Ichtyosma Steud.
Sarcophyteae Endl. 1836. Gen. p. 73; 1841. Ench. p. 52: trib. Balanophorear. Gen.: Sarcophyte. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. Gen. id. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274). Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 164; 1841. Nom. p. 60: div. Cytinear. Gen. (1837 Cytinus, Sarcophytum, 1841) id.
Sarcophytidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 90: trib. Balanophoracear. Gen.: Sarcophyte.
Sarcophytum Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1686: g. Cytinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 81.
Rchb. 1837. Hdb. p. 164: g. Sarcophytear.
= Sarcophyte Sparrm.
Sarcoplacuntia Blume 1831. Flora II. p. 510: sect. Medinillae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 776. — Endl. 1840. Gen. n. 6236 *b.* p. 1217; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6744. 2. — — Walp. 1843. Rep. II. p. 142.
Sarcopodia Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 12: cohors Fungor. Divis.: Exosporia, Tuberculariae.
Sarcopodium Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 13. 23: nov. g. Exosporior. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 47. p. 361.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 546: g. Byssinear.
Link 1825. Spec. II. p. 126: g. Gymnomycetum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 556. n. 3568; 1831. Gen. II. p. 783. n. 4055: g. Inomycetum.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 52: g. Cephalotricheor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 229: g. Sporomycetum hyposporor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 471: g. Hymenulaceor.

Sarcopodium Corda 1829 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. II. p. 135. t. 64: nov. g. Fungor. (S. atrum.)
= Helminthosporium Link.

Sarcopodium Lindl. 1850 in Paxt. Fl. gard. I. p. 136; 1853. Fol. Orchid. 10 Jan.: nov. g. Dendrobiear. (S. Lobbii.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 529.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 650: g. Dendrobidar.

Sarcopoterium Spach 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 43: nov. g. a Poterio sejunctum. (Pot. spinosum L.)

Sarcopsidei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: trib. Ectoclinor. Sect.: Tuberculariei, Stilbei, Excipulei, Melanconiei, Myrotheciei.

Sarcopyramis Wallich 1824. Tent. fl. Nepal. I. p. 32. t. 23: nov. g. Melastomacear. *Cf.* Linnaea II. p. 539.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 342: g. Octandr. Monogyn.
DC. 1828. Pr. III. p. 485: g. Miconiear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Endl. 1840. Gen. n. 6262. p. 1221; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6771. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4643: g. Blakeacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 330: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 802. n. 4154.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 730. 761 (*Sarcopyramus*): g. Osbeckiar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 42: g. Sonerilear. — Par. Benn. 1838 in Horsf. pl. jav. rar. p. 214.
Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81): g. Lavoisierear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 687.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 312: g. Dissochaetear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 558.

Sarcopyramus G. Don vid. *praeced.*

Sarcosagieae Massalongo 1856. Flora I. p. 289: trib. Collemacear. Gen.: Sarcosagium.

Sarcosagium*) Massalongo 1856. Flora I. p. 289: nov. g. Sarcosagiear.

Sarcoscyphae Fries: vid. *Sarcoscyphus Endl.*

Sarcoscyphos**) Corda 1829 in Opiz Beitr. I. (Linnaea V. Litt. p. 79); 1830 in Sturm Jungerm. p. 6. 25: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. emarginata Ehrh.)
= seq.

Sarcoscyphus Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 100. 122; 1838. ibid. IV. p. XXI; 1844. Syn. Hepat. p. 6: g. Gymnomitrior. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1344. n. 474/1; 1841. Ench. p. 28. n. 473/3. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 66. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 360. — Bayrh. 1849. Taun. p. 37.
Endl. 1836. Gen. p. 45. n. 473: g. Jungermanniacear.

*) σάγιον, lodix.
**) σκύφος, poculum.

Sarcoscyphus Nees cont.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 89: g. Jungermanniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 806: g. Gymnomitriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Gymnomitridar.
Synon. Sarcoscyphos Corda; Marsupia Dumort.; Nardius Gray pt.

Sarcoscyphus Endl. 1836. Gen. n. 430 *B h.* p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Lachni (praecedente Fries 1823. Syst. myc. II. p. 78: *Sarcoscyphae*, tribus Lachneae). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448.2 *d.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 363.

Sarcosiphon Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 5. p. 65. t. 18: nov. g. Burmanniaceis aff. (an familiae propriae Rhizanthear.?), in Corrigendis ad Cytineas relatum. (S. clandestinum.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 609: g. Burmanniacear. dubium.

Sarcosperma Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 50: div. Dermatocarpor. Gen.: Cyathus.

Sarcospermi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XV: div. Dermatocarpor. Gen.: Cyathus.

Sarcosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: series Mycosporar. Ord.: Nidularieae, Tuberarieae, Lycoperdarieae, Sphaeriarieae, Tubercularieae.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): fam. Gasterosporar. Sect.: Sphaerobolea, Nidulariacea.

Sarcostachya Juss. 1827. Dict. v. 50. p. 379: novum nomen pro *Stachytarpheta* propositum.

Sarcostegia Benth. 1849 in Hook. Niger-Fl. p. 335: sect. Parinarii. (P. polyandrum, Griffithianum et? Jackianum.)
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 355: subg. Parinarii.
= Exitelia Blume.

Sarcostemma R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 50 (Verm. bot. Schr. II. p. 388); 1810. Prodr. I. p. 463. Ed. Nees p. 319: nov. g. Asclepiadear. (Cynanchum viminale L.) — Par. Haw. 1812. Syn. succ. p. 13. Ed. Schrank 1819. p. 13. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 485; 1825. Syst. I. p. 853. n. 992; 1830. Gen. I. p. 212. n. 1088. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 194. t. 229. — Link 1821. En. I. p. 250. — Kunth 1823. Syn. II. p. 278. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Wight & Ann. 1834. Contrib. p. 59. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 220. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 907. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Roth 1821. Nov. spec. p. 177: g. Pentandr. Digyn.
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 364: g. Apocynear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3446: g. Cynanchear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.

Sarcostemma R. Brown cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 156: g. Asclepiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3456. p. 590; 1841. Ench. p. 298: g. Ditassear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5012.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 537: g. Sarcostemmar. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 485.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 482: g. Sarcostemmear.

Sarcostemma (Röm. &) Schult. 1820. Syst. VI. p. XIII. 113: g. Asclepiadear.
= Leptadenia R. Brown. (Meisn. Comm. p. 177.)

Sarcostemmae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 535: div. Asclepiadear. verar. Gen.: Calotropis, Pentatropis, Kanahia, Sarcostemma, Oxystelma, Daemia.

Sarcostemmeae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 480: subtrib. Asclepiadear. verar. Gen. Sarcostemmar. Decne (excepta Kanahia).

Sarcostigma Wight & Arn. 1833. Edinb. n. phil. journ. XIV. p. 299: nov. g. Hernandiacear. (S. Kleinii.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2107/$_1$. p. 1378; 1841. Ench. p. 210.
Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241): g. Hernandiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2453. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 256: g. Phytocrenear. — Par. R. Brown 1852. Pl. jav. rar. IV. p. 244.
Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 223; X. p. 30: g. Sarcostigmear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 794.

Sarcostigmeae Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 223: trib. Icacinear. Gen.: Pennantia, Stemonurus, Sarcostigma, Discophora, Phlebocalymna.

Sarcostoma Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 339: nov. g. Orchidear.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 644: sect. Dendrobii.
= Dendrobium Swartz.

Sarcostyles Presl 1830 in DC. Prodr. IV. p. 15; 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 53. t. 60: nov. g. Hydrangeear. (S. peruviana.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 230.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 5: g. Hydrangear.
= Cornidia Ruiz & Pav.

Sarcothalameae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 507: fam. Lichenum. Divis.: Hysterideae, Spherideae, Thelebolideae, Nemasporideae.

Sarcothalia Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 739. n. 489: nov. g. Gigartinear. (Fucus Burmanni Mert.)

Sarcotheca Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 16. p. 241: nov. g. Hugoniacear. (S. macrophylla.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 137.
= Roucheria Planch.

Sarcotheca Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 474: nov. g. inter Burseram et Marigniam collocatum. (S. Bahiensis.)

Sarcotheceae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 588: fam. Fungor. Divis.: Sclerotideae, Tuberideae, Tremellideae.

Sarcothecium Pers. 1797. Tent. disp. p. 16: ordo Gymnothecii. Gen.: Pilobolus, Thaelaebolus, Sphaerobolus, Cyathus.

Sarcozygium Bunge 1843. Linnaea XVII. p. 7. t. 1; 1847. Reliq. Lehm. I. p. 200: nov. g. Zygophyllear. (Zygophylla flore tetramero, fructu 2—3-loculari indehiscente.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 100. n. 6035/$_1$. — Walp. 1846. Rep. V. p. 385. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479.

Sardinia Flor. Flum. III. t. 163: g. Hexandr. Monogyn. (bella) ex Steud. Nom. II. p. 514.
= Guettardaria DC. (Endl. Spl. I. p. 1393.)

Sarea*) Fries 1825. Pl. homon. p. 86; 1828. Elench. II. p. 14: nov. g. Clavicularium. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 47. p. 369. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 426. p. 37; 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 444.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 312: g. Claviculator.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 768. n. 3929: g. Pezizoideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 154: g. Pezizear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 362: g. Dermateor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Agyrieor.?
Bonord. 1851. Hdb. p. 198: g. Agyriaceor.
Bail 1858. Syst. p. 67. t. 20: g. Helvellaceor.
Synon. Helotium Pers.; Plancina Fries?

Sareacia Rchb. 1828. Consp. p. 177. n. 4695*a*: sect. Caseariae.

Sareta Ledeb. vid. *Sarreta DC.*

Sargasseae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): ordo Aplosporear. Gen.: Coccophora, Halidrys, Blossevillea, Cystoseira, Sargassum, Turbinaria, Phyllospora, Marginaria, Seirococcus, Scytothalia.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: div. Endogymnosporear. Gen.: Sargassum, Cystosira.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 349. 359; 1845. Phyc. germ. p. 281: fam. Angiospermear. Gen.: Pterocaulon, Sargassum, Turbinaria, Carpophyllum, Phycobotrys. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 605 (inclusis Halochlois). Gen. ead. (excepto ultimo) et Anthophycus, Platylobium, Carpacanthus, Stichophora, Blossevillea, Spongocarpus, Halochloa, Myagropsis, Coccophora, Castraltia, Marginaria.

Sargassites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 31; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 61: g. foss. Fucoidar.

---

*) σάρον s. σάρος, scopae. (?)

Sargassites Brongn. cont.
Endl. 1836. Gen. n. 122 *i*. p. 11; 1841. Ench. p. 8: sect. Fucoidae.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 36: g. Fucoiditum.
Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 54. n. $122/_{98}$: g. Algar. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 7; 1846. Chlor. prot. p. XXVI: g. Phycear. foss. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57.

Sargassum*) Agardh 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 1; 1821. Aphor. p. 101: nov. g. Fucoidear. (*Cf.* Flora 1822. II. p. 395; Isis 1823. p. 466 et Leman 1827. Dict. v. 47. p. 370.) — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 43. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 393; 1841. Brit. Alg. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 794. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 70.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXVIII. 293: g. Fucacear. — Par. Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 119. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 355. — Endl. 1836. Gen. n. 121. p. 10; 1841. Nom. p. 8. Sect.: Carpophyllum, Turbinaria, Baccalaria. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 132. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 142. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 53; 1848. Spec. Fuc. p. 268. Sect. (1848): Pterophycus, Arthrophycus, Eusargassum. — Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 56; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 211. — Math. 1853. Belg. II. p. 490.
Fries 1825. Pl. homon. p. 326: subg. Fuci.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 320. n. 3389; 1831. Gen. II. p. 748. n. 3789: g. Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 514: g. Fucear. Sect.: Cystoseira, Sargassum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Fucinear.
Grev. 1830. Syn. p. XXIX.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 100: g. Chondrothamnior.
Miquel 1837 in Hoev. & Vriese Tijdschr. IV. p. 25. *Cf.* Isis 1840. p. 372.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): g. Sargassear. — Par. Zanard. 1843. Classif. p. 10. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 360; 1845. Phyc. germ. p. 282; 1849. Sp. Alg. p. 606. n. 419. (restrict.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 31. n. $122/_7$: g. Cystoseirear. Sect.: Baccalaria, Halochloa, Myagropsis, Spongocarpus, Stichophora, Cystocarpum, Decursaria. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 161. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 192.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57; 1849. ibid. XI. p. 360: g. Cystosirear.
Synon. Acinarius Rouss.; Acinaria Targ.; Sargassus Link.

Sargassus Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 8 (Flora 1821. II. p. 513): g. Algar., a Fuco separatum.
= Sargassum Agdh.

*) *Sargaço* Hispanorum.

Sariava Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 12: nov. g. Malvacear.
= Dicalyx Lour.

Saribus Rumph. 1741. Amboin. I. p. 42. t. 8. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 312.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 65: g. Coryphinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.
= Licuala Rumph.

Sarissus*) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 118. t. 25. f. 4: nov. g. plant. (*Hen-Taccada* Zeylon.)
= Hydrophylax Linn. f.

Sarmentaceae Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: ordo 49 plant. Gen.: Cissus, Vitis, Hedera, Panax, Aralia, Ruscus, Asparagus, Medeola, Uvularia, Convallaria, Gloriosa, Rajania, Dioscorea, Smilax, Tamus, Menispermum, Cissampelos, Asarum, Aristolochia, Hippocratea?
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 11 plant. Gen.: Gloriosa, Erythronium, Alströmeria, Uvularia, Convallaria, Ruscus, Asparagus, Medeola, Trillium, Paris, Smilax, Dioscorea, Tamus, Rajania, Menispermum, Centella, Cissampelos, Aristolochia, Asarum, Cytinus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. Gen. ead. et Dracaena.

Sarmentaceae Vent. 1799. Tabl. III. p. 167: ordo 15 class. XIII. Gen.: Cissus, Vitis.
DC. 1805. Franç. IV. p. 856: fam. (86) Dicotyledonum. Gen.: Vitis.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245: ordo Thalamiflorar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae.
DC. 1824. Pr. I. p. 627: trib. Ampelidear. Gen. ut Vent. et Ampelopsis. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. I. p. 371. Gen. ut Spach.
Bartl. 1830. Ord. p. 353: ordo (204) Ampelidear. Gen. ut DC. 1824.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 208: fam. (43) Ampelidear. Gen. ead. et Pterisanthes.
= Ampelideae HBK.

Sarmentaceae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 219: fam. 18 plant. Ord.: Smilaceae, Ruscinae, Asphodeleae.
Rchb. 1828. Consp. p. 64: fam. Liliacear. Divis.: Xeroteae, Smilaceae, Dioscoreae. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 99. Divis.: Parideae, Convallarinae, Smilaceae, Dioscoreae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 152. Divis.: Acorinae, Dioscorinae, Smilacinae.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 130: ordo Liliflorar. Trib.: Veratreae, Dioscoreae, Medeoleae.

Sarmentaria Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 140: nov. g. Davyear. (S. decora.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 791.

Sarmiaenta Hook. & Arn. vid. *seq.*

Sarmienta*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 4; 1798. Fl. peruv. I. p. 8. t. 7: nov. g.

*) *σάρισσα*, hasta.
**) Dicat. Mart. Sarmiento.

Sarmienta Ruiz & Pav. cont.
Diandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 401. — Par. Vahl 1805. Enum. I. p. 103. n. 38. — Pers. 1805. Ench. I. p. 13. n. 48. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 339 (et iterum p. 352 in Pentandr. Monogyn.) — Hedw. 1806. Gen. p. 11. 347. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 52. 77. n. 57.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 890: g. Primulear.
Eschsch. 1823. Mém. Ac. Pet. X. (1826.) p. 289: g. Scrophularinear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 38. n. 68; 1830. Gen. I. p. 23. n. 94: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 64.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3228: g. Gesnerear. — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 66. (Flora Lit. I. p. 13.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672.
Hook. & Arn. 1831. Bot. Beech. voy. Pt. I. p. 41 (*Sarmiaenta*): g. Gesneriacear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 651: g. Besleriear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 547. — Endl. 1839. Gen. n. 4155. p. 719; 1841. Ench. p. 349. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). — Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4686. — Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360. (?)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257: g. Gesneriear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 207: g. Sarmientear. — Par. Örsted 1858. Gesn. centroam.
Synon. Urceolaria Feuill.

Sarmienteae Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 199: subtrib. Besleriear. Gen.: Sarmienta.
Örsted 1858. Gesn. centroam.: div. Mitrariear. Gen. id. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 432.

Sarna Karst. 1856. Linnaea XXVIII (ex Müll. Ann. bot. VI. p. 16): nov. g. Balanophorear. (S. caulotreti et ingae.)

Sarodonia „G. Don" Steud. Nom. II. p. 514. 547: lege *Scorodonia G. Don.*

Saroma Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 14: sect. Anthyllidis. (A. Hermanniae L.)
Conf. Cytisoides Kunth.

Sarosanthera Korthals .... Verh. nat. Gesch. ned. Bez. p. 103. t. 16.
Endl. 1842. Spl. II. p. 81. n. 5409/$_1$: g. Ternströmiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 130.
Meisn. 1843. Comm. p. 344: g. Ternströmiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.

Sarotes Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. XIX; 1847. Veg. kingd. p. 364: nov. g. Lasiopetalear. (S. ledifolia.) — Par. Arnott 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 381. t. 16. — Endl. 1841. Spl. I. n. 5327/$_1$. p. 1423; 1841. Ench. p. 519. — Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7707. — Meisn. 1843. Comm. p. 344. — Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 345. (verar.)

Sarothamnus*) Wimmer 1828. Fl. v. Schles. p. 278.

*) σάρος, scopae; θάμνος, frutex.

Sarothamnus Wimmer cont.
Koch 1836. Syn. p. 151. Ed. II. p. 165 (1839. Deutschl. Fl. V. p. 81): g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Kunth 1838. Berol. I. p. 216. — Endl. 1840. Gen. n. 6499. p. 1266; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 515. — Walp. 1842. Rep. I. p. 627. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — Webb 1846. Canar. II. p. 58. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 348. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 468.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
Synon. Cytiso-Genista Tourn.; Spartium Adans.

Sarotheca Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 113; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 382: nov. g. Gendarussear.

Sarothra*) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 11; 1753. Sp. I. p. 272; 1759. Syst. ed. X. p. 966. n. 344; 1762. Sp. ed. II. p. 391; 1764. Gen. ed. VI. p. 151. n. 383; 1767. Syst. ed. XII. p. 221. n. 380: g. Pentandr. Trigyn. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 402. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 247; 1784. Syst. p. 299. — Reich. 1778. Gen. p. 154. n. 414. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 203. n. 521. — Lour. 1790. Coch. I. p. 182. — Gmel. 1791. Syst. p. 507. — Pers. 1797. Syst. p. 317; 1805. Ench. I. p. 331. n. 742. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1515. n. 583. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 204. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIII. 679. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 947. n. 1128.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 330. — Juss. 1789. Gen. p. 303. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 120. — Hedw. 1806. Gen. p. 209. n. 858.
Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Rotacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.
Gled. 1764. Syst. p. 37. n. 145: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 190: g. Pentapetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 159. n. 857: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 168. t. 144.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 414: g. Gentianear.
A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 123; 1815. Bull. soc. philom. p. 22: g. Frankeniear.
Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345: g. Hypericear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 612. — Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33).
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 127: g. Hypericinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 292. — Grev. & Hook. 1833. Bot. Misc. III. p. 235. t. 107.
Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5467: g. Ascyrear.

*) σάρωθρον, scopae: ob foliorum subulatorum similitudinem aliquam cum scopis.

Sarothra Linn. cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 802. n. 4151: g. Cistear.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8003: g. Sarothrear. Sect.: Sarothra, Brathydium, Myriandra.
= Brathys Mutis.

Sarothreae Rchb. 1841. Nomencl. p. 211: sect. Hypericear. genuinar. Gen.: Sarothra.

Sarothrostachys Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 185; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 415: nov. g. Hippomanear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 88. n. 5772/7. — Meisn. 1843. Comm. p. 369. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 524: sect. Stillingiae. (*Synon. Clonostachys Kl.*)

Sarpedonia „Adans. Fam. II. p. 460“ Endl. Gen. p. 846 et Ench. p. 434 in synon. Adoniae. Deleatur*)!

Sarracena**) Tourn. 1700. Inst. p. 657. t. 476. Append.
Linn. 1737. Gen. p. 149. n. 420; 1737. Cliff. p. 497; 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 224. n. 492: g. Polyandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 113. n. 463: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Papaveracear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 450: g. Cistor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 205 (*Saracena*): g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 264: g. Polyandrar.
= Sarracenia Linn.

Sarracenia Linn. 1753. Sp. I. p. 510; 1759. Syst. ed. X. p. 1073. n. 578; 1762. Sp. ed. II. p. 728; 1764. Gen. ed. VI. p. 264. n. 652; 1767. Syst. ed. XII. p. 361: g. Polyandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 404. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 408; 1784. Syst. p. 491. — Reich. 1778. Gen. p. 268. n. 708. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 351. n. 885. — Gmel. 1791. Syst. p. 811. — Pers. 1797. Syst. p. 526; 1807. Ench. II. p. 62. n. 1257. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1150. n. 1018; 1809. En. p. 564. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 375. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 10. — Elliott 1821. Sketch II. p. 9. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 600. n. 1932; 1830. Gen. I. p. 433. n. 2148 (*Saracenia*).
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Juss. 1789. Gen. p. 435: g. incertae sedis. — Par. Vent. 1799. Tabl. IV. p. 23. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 433. n. 2148 (*Saracenia*).
Neck. 1790. El. II. p. 268. n. 1022: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 123: g. Hydrocharidum.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 728: g. Papaverear.

*) Adansonius l. c. genus Sarpedoniam non habet, solum „*Sarpedonia Diosc.*“ in indice p. 597 in synonymis Ranunculi citatur.

**) Dicat. Dr. Sarrazin, Quebec.

Sarracenia Linn. cont.
Link 1822. En. II. p. 69: g. Papaveracear.
La Pylaie 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 379: unicum genus novae familiae.
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 789: g. Nepenthear. — Par. Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 787 (*Sarracinia*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: g. Sarraceniacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 404. — Croom 1836 in Ann. Lyc. N.-York IV. p. 98 (p. 95 in not. *Sarrasinia*). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 59. — Endl. 1839. Gen. p. 901. n. 5023. — Walp. 1842. Rep. I. p. 108. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 329. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 429.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 128: g. Sarraceniear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 33. — Rchb. 1837. Hdb. p. 272 (*Saracenia*); 1841. Nom. p. 188. n. 7181. — Endl. 1841. Ench. p. 463. n. 5023. — Meisn. 1841. Gen. p. 334 (247). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 260. — Brongn. 1843. En. genr. p. 98. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 363.
Synon. Sarracena Tourn.; Saracena Hill; Sarrazinia Hoffmsg.; Coilophyllum Moris.; Bucanaphyllum Pluk.

Sarraceniaceae La Pylaie 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 379: fam. absque nomine indicata. Gen.: Sarracenia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: fam. Nymphaeariear. Gen. id.
Link 1831. Hdb. II. p. 403: ordo 34 Allostemonum. Gen. id.
Croom 1836. Ann. Lyc. N. York IV. p. 98. Gen. id.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 58: ordo Dicotyledonum. Gen. id.
Endl. 1839. Gen. p. 901: fam. Nymphaeaceis aff. Gen. id.
Meisn. 1843. Gen. p. 437: ordo Nymphaeoidear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 327: fam. (236) incertae sedis. Gen. id. et Heliamphora.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 429: ordo Ranalium. Gen. ead.

Sarracenieae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (136) Thalamiflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 127. Gen.: Sarracenia. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 33. Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188: div. Cistinear. Gen. id. et 1841 Heliamphora.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1420; 1841. Ench. p. 463: fam. Nymphaeaceis aff. Gen.: Sarracenia, Heliamphora.
Meisn. 1841. Gen. p. 334 (247): ordo 194 plant. Gen. ut Endl. *Cf. Sarraceniaceae.*
Brongn. 1843. Én. genr. p. 98: fam. Ranunculinear.? Gen.: Sarracenia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 364: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.

Sarracha Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXXIX: g. Atropear.
Endl. 1839. Gen. n. 3852. p. 665; 1841. Ench. p. 332: g. Solanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). — Spach 1840. Vég.

Sarracha Rchb. cont.
phan. IX. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4758. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 58. — Walp. 1845. Rep. III. p. 28. 954.
= Saracha Ruiz & Pav.

Sarracinia Wittst. vid. *Sarracenia Linn.*

Sarrasinia Croom vid. *praeced.*

Sarratia*) Moquin-Tandon 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 268: nov. g. Amarantear. (Amarantus urceolatus Benth.)

Sarrazinia Hoffmg. ex Steud. Nom. II. p. 514: vid. *Sarracenia Linn.*

Sarreta DC. 1837. Prodr. VI. p. 667: sect. Serratulae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2897 *a.* p. 480; 1841. Ench. p. 247. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 755 (*Sareta*). — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 268.
Synon. Serratula Cass.

Sartoria**) Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 9. p. 109: nov. g. Hedysarear. (S. hedysaroides.) *Cf.* Flora 1850. p. 44.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 414: g. Euhedysarear.

Sartwellia A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 22. t. 6: nov. g. Flaveriear. anomal. (S. Flaveriae.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 231.

Sasali Adans. 1763. Fam. II. p. 305: g. Zizyphor.
= Microcos Linn.

Sasangua Endl. Rchb. vid. *seq.*

Sasanqua Kämpf. 1712. Amoen. exot. Fasc. V. p. 853.
Nees 1833 in Sieb. Nipp. II. p. 13: nov. g. Theacear. (Camellia Sasanqua (Thunb.) *Cf.* Flora Lit. IV. p. 144.
Meisn. 1837. Gen. p. 41 (31): g. Ternströmiacear.
Endl. 1840. Gen. u. 5424 *a.* p. 1023 (*Sasangua*); 1841. Ench. p. 532: sect. Camelliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 219. n. 7933. 1 (*Sasangua*).

Sassa „Bruce 1790. Trav. in Eg. V. App. p. 28 c. ic.“ Gmel. 1791. Syst. p. 1038: g. Monadelph. Polyandr. (S. gummifera.)
= Acacia Tourn. (DC. Pr. II. p. 455.)

Sassafras***) (Pison. 1648. Brasil. p. 98) Nees 1833. Progr. p. 17; 1836. Syst. Laurin. p. 487: g. Flaviflorar. (Laurus Sassafras L.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2056. p. 322; 1841. Ench. p. 198. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1357. — Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 503.
Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2653: g. Benzoinear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 120: g. Laurinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
= Lindera Thunb. (Blume Mus. bot. Lugd. I. p. 324.)

Sassea†) Klotzsch 1855. Begon. p. 252: nov. g. Isopterygear. (Begonia Urticae L.)

*) Dicat. A. Sarrat, Revellensi.
**) Dicat. D. Sartori, de flora graeca bene merito.
***) Nomen vernaculum.
†) Dicat. Sasse, Berolin.

Sassia*) Molina 1782. Saggio p. 145: nov. g. plant. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 412.
Juss. 1789. Gen. p. 429: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 268. n. 1079.
Gmel. 1791. Syst. p. 615: g. Octandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 353. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 213. n. 1427.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5579: inter genera vix cognita. — Simil. Endl. 1841. Gen. n. 6893. p. 1333; 1841. Ench. p. 685. — Meisn. 1843. Comm. p. 373.
= Oxalidis Linn. sp.

Satirium Linn. 1767 vid. *Satyrium Linn.*

Satureae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: subordo Lamiacear. Trib.: Origanidae, Hyssopidae, Cunilidae.

Satureia**) Tourn. 1700. Inst. p. 197: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 228; ed. Hall. 1745. p. 233: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Coroll. p. 9. n. 961; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 266. n. 561; 1748. Ups. p. 161; 1753. Sp. II. p. 567; 1759. Syst. ed. X. p. 1095. n. 626; 1763. Sp. ed. II. p. 793; 1764. Gen. ed. VI. p. 288. n. 707; 1767. Syst. ed. XII. p. 389: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 427. — Murr. 1774. Syst. p. 441; 1784. Syst. p. 528. — Reich. 1778. Gen. p. 293. n. 765. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 385. n. 961. — Gmel. 1791. Syst. p. 897. — Pers. 1797. Syst. p. 563. — — Willd. 1800. Sp. III. p. 41. n. 1094 (*Satureja*); 1809. En. p. 599.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 186. n. 768: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 385. Sejungitur Sabbatia.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 163. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 193. — Juss. 1789. Gen. p. 112. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 332. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 258. — DC. 1805. Franç. III. p. 522. Sect.: Satureia, Sabattia. — Pers. 1807. Ench. II. p. 113. n. 1373. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 385. — Link 1822. En. II. p. 101; 1829. Hdb. I. p. 459. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 719. n. 2085; 1831. Gen. II. p. 472. n. 2328. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 406 (*Sarriette*). — Bunge 1830 in Ledeb. II. p. 397.
Hill 1769. Ht. kew. p. 257: g. Monopetalar. irregular.
Neck 1790. El. I. p. 321. n. 506: g. Corythophytor.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 346: g. Pericarpiferar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 433: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2862. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.

*) Dicat. Sassi.
**) Nomen ex Columella.

Satureia Tourn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 311: g. Satureinar.
Benth. 1834. Labiat. p. 351: g. Satureinear. Sect.: Satureia, Tragoriganum, Pycnothymus. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 771. Sect. eaed. — Koch 1837. Syn. p. 558. Ed. II. p. 641. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 193. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 411. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Origanear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3611. p. 617; 1841. Ench. p. 307. Sect. ut Benth. (1841 Eusatureia.) — Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4055. Sect. ut Benth. et Oreosma. — Walp. 1845. Rep. III. p. 707. 982. Sect. ut Benth.
C. Koch 1843. Linnaea XVII. p. 295: g. Saturejinar.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 120: g. Thymear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Origanidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 208: g. Melissear. Gen. ut antea. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 349. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 660.
Synon. Furera Adans.

Satureia Benth. 1834. Labiat. p. 352; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 209: sect. Satureiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 771. — Endl. 1838. Gen. p. 617. n. 3611 *a*. — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4055. 1.
= Eusatureia Endl.

Satureieae Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 148: trib. 2 Labiatar. Divis.: Elsholtzieae, Menthoideae, Thymeae, Melisseae, *anomalae* (gen.: Glechon, Hyssopus, Collinsonia, Sphacele, Cuminia, Dekinia, Lepechinia, Horminum).
Synon. Menthoideae, Satureineae et Melissineae Benth. Labiat.

Satureinae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 311: div. Schizogynar. Gen.: Satureia, Micromeria, Pulegium, Thymus, Origanum.

Satureineae Benth. 1834. Labiat. p. 324: trib. Labiatar. Gen.: Bystropogon, Pycnanthemum, Monardella, Amaracus, Origanum, Majorana, Thymus, Satureia, Hyssopus, Collinsonia, Cunila. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 761. Gen. ead. — Koch 1837. Syn. p. 556. Ed. II. p. 639. Gen.: Origanum, Thymus, Satureia, Micromeria, Calamintha, Clinopodium. — Endl. 1838. Gen. p. 616; 1841. Ench. p. 307. Subtrib.: Origaneae, Hyssopeae, Cunileae. — Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). Subtrib. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. 188. Gen. ut Benth. et Mintostachys, Brachystemon. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. Gen. ex Benth. — Walp. 1845. Rep. III. p. 687. Subtrib. ut Endl. et Hormineae. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 163. Gen. bras.: Cunila, Micromeria, Hedeoma, Eriothymus, Keithia, Glechon.

Satureja Auct.: vid. *Satureia Tourn.*

Satureja Scheele 1843. Flora II. p. 569: g. Satureinear. ampliat. Sect.: Satureja, Micromeria, Saturejoides, Acinos, Calamintha.

Saturejeae Meyer 1849. Fl. hanov. p. 409: div. Labiatar. Gen.: Elsholtzia, Mentha, Lycopus, Origanum, Thymus, Satureja, Calamintha, Hyssopus.

Saturejinae C. Koch 1843. Linnaea XVII. p. 294: trib. Labiatar. Gen.: Origanum, Thymus, Satureja.

Saturejoides Scheele 1843. Flora II. p. 569: sect. Saturejae.

Saturnia Maratti 1772. Romuleae et Saturniae sp. not. p. 18: nov. g. ex typo Allii chamaemoly. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 415.
= Moly Rupp.

Satyria Scopoli 1777. Introd. p. 90: gens 1 tribus V plantar. Gen.: Limodorum, Disa, Thelymitra, Arethusa, Epidendrum, Cypripedium, Orchis, Serapias, Ophrys, Corallorhiza.
= Orchideae Hall.

Satyria*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 21: nov. g. Vacciniear. (S. Warszewiczii et elonantha.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1081.

Satyriadae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ophrear. Gen.: Pachites, Satyrium, Satyridium, Aviceps. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 171.

Satyridium Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 345: nov. g. Ophrydear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1536/1. p. 1365; 1841. Ench. p. 312. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1880. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Satyriadar.

Satyrinus Fries vid. *Satyrus Bosc.*

Satyrium „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 283: g. pl. class. XIII. (Ed. Hall. 1745. p. 299 in class. XIV.)
= Listera R. Brown?

Satyrium**) Linn. 1737. Gen. p. 270. n. 682; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 944; 1759. Syst. ed. X. p. 1243. n. 901; 1763. Sp. ed. II. p. 1337; 1764. Gen. ed. VI. p. 461. n. 1010; 1767. Syst. ed. XII. p. 591: g. Gynandr. Diandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 676; 1784. Syst. p. 811. — Reich. 1778. Gen. p. 456. n. 1095. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 602. n. 1368. — Pers. 1797. Syst. p. 853. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 240. 255.
Linn. 1740. Act. Upsal. p. 18: g. ordinis quarti naturalis.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Orchidear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 65. — Gis. 1792. Prael. p. 179. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 208. — Batsch 1802. Tab. p. 101. — Pers. 1807. Ench. II. p. 506. n. 1977. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 555.
Adans. 1763. Fam. II. p. 70: g. Orchidum.
Gled. 1764. Syst. p. 282. n. 1158: g. Stylostemonum.

*) Satyrus, comes Bacchi.
**) *σατύριον* Dioscoridis.

Satyrium Linn. cont.
Hill 1769. Ht. kew. p. 347: g. Pentapetalar.
Neck. 1790. El. III. p. 136. n. 1479: g. Synarmophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 55: g. Diandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. p. 4; 1807. Fl. cap. I. p. 88.
= Satyrium Swartz, Epipogium, Himantoglossum, etc.

Satyrium Swartz 1800. Act. Ac. Holm. p. 214; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 31. t. 1 C: g. Orchidear. restrict. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 160. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 196. (Verm. bot. Schr. II. p. 15.) — D. Don 1825. Nepal. p. 26. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 695. n. 2934; 1831. Gen. II. p. 654. n. 3294. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 416.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 157: g. Gynandr. Monandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 54. n. 1591.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 286: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 126.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
La Llave & Lex. 1825. Nov. veg. II. Orch. p. 7: g. Rinemospermar. hypogear.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 13 (Linnaea II. p. 529); 1838. Orchid. p. 335: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1483; 1841. Nom. p. 50. n. 1879. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1536. p. 211; 1841. Ench. p. 112. — A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 76. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (285). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Satyriadar.
Synon. Diplectrum Salisb.; Diplecthrum Pet. Th.?, Pers.

Satyrus Bosc 1811. Berl. Mag. V. p. 86. t. 6. f. 8: nov. g. Fungor. (S. rubicundus.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 434 (*Satyrinus*): g. Phalleor.
= Leiophallus Fries.

Saubinetia Rémy 1849 in Gay Fl. Chil. IV. p. 282: nov. g. Helianthear. (S. helianthoides.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 857: g. Rudbeckiear.

Saueria*) Klotzsch 1855. Begon. p. 160: nov. g. Begoniacear. (Begonia sulcata Scheidw.)

Saul Roxb. Mus. ind. ex Steud. Nomencl. II. p. 516. 745.
= Vatica Linn.

Sauloma**) Hook. & Wils. 1855. Fl. New-Zeal. II. p. 122: sect. Hookeriae. (H. tenella H. & W.)

Saurauia Wittstein vid. *seq.*

Saurauja***) Willd. 1801. Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 406. t. 4: nov. g. Polyandr. Pentagyn. (Tiliacear.) *Cf.* Schrad. Journ. 1800. II. p. 274 et Wittst. Etym. Handw. p. 787 (*Saurauia*).
DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 419; 1824. Pr. I. p. 525: g. Saurauujear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 336. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 567. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 67. — Endl. 1840. Gen. n. 5414. p. 1019; 1841. Ench. p. 531. (Injungitur Apatelia.) — Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7919. — Walp. 1842. Rep. I. p. 370; 1843. II. p. 801; 1846. V. p. 131. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 349.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 125 (Linnaea I. p. 661): g. Ternströmiacear. — Par. Leman 1827. Dict. v. 47. p. 453. — Camb. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 405. — Meisn. 1837. Gen. p. 40 (30). — Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 170. t. 36.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208. n. 5414: g. Ternströmiear. Sect.: Saurauja, Apatelia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Ternstromiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424: g. Dillenear.
Synon. Sauravia Spreng.; Scapha Nor.; Vanalphimia (Vanalphena?) Lesch.; Marumia Reinw.; Reinwardtia Nees; Reinwardta Rchb.; Blumia Spreng.; Blumea G. Don; Davya et Leucothea Moç. & Sess.; Overstratia Desch.; Obelanthera Turcz.?

Saurauјeae DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 419; 1824. Prodr. I. p. 525: trib. Ternströmiacear. Gen.: Saurauja, Apatelia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 567. Gen. ead. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 67. Gen. unicum: Saurauja. — Endl. 1840. Gen. p. 1019; 1841. Ench. p. 531. Gen.: Saurauja; Microsemma. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 476. Gen. ead.
Bartl. 1830. Ord. p. 336: div. Ternströmiacear. Gen.: Saurauja.
Rchb. 1841. Nom. p. 218: sect. Ternströmiear. genuinar. Gen. ut Endl.

Sauravia Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 818: g. Tiliacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 613. n. 1982; 1830. Gen. I. p. 446. n. 2208: g. Ternströmiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 302. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 272.
= Saurauja Willd.

Sauroglossum*) Lindl. 1833. Bot. Regist. t. 1618: nov. g. Neottiear. (S. elatum.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 117 et Linnaea X. Litt. p. 18. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 213. n. 1555. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2122. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 480; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Spiranthidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1561. p. 113; 1842. Spl. II. p. 20.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Spiranthidear.

---

*) Dicat. F. W. H. Sauer, Berolin.
**) σαυλός (soft), levis, mollis.
***) Dicat. comiti de Saurau, non botanico lusitan. Sauraujo, ut habet G. Don.

*) σαῦρα, lacerta.

Sauromatium Walp. vid. *seq.*

Sauromatum Schott 1832. Melet. bot. p. 17: nov. g. Euaroidear. (Arum pedatum Link.) — Par. Blume 1835. Rumphia I. p. 125. — Endl. 1837. Gen. n. 1678. p. 235; 1841. Spl. I. p. 1379; 1841. Ench. p. 128 (sphalm. *Stauromatum*). — Kunth 1841. Enum. III. p. 28. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 38. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 757 (*Sauromatium*).

Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1089: g. Aroidear. genuinar.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 14: g. Colocasiear.

Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 24: g. Dracunculinar. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 196.

Synon. Theriophonum Blume?

Sauropus Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 595: nov. g. Phyllanthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5842. p. 1119; 1841. Ench. p. 588. — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7404. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 49.

Baill. 1858. Euphorb. p. 634: g. Phyllanthidear.

Saururaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 184) 1847. Veg. kingd. p. 521: ordo Piperalium. Gen.: Saururus, Houttuynia, Anemiopsis, Gymnotheca?

Saurureae Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. 45: nov. ordo Monocotyledonear. Gen.: Saururus, Aponogeton.

E. Meyer 1827. De Houtt. et Saurureis (Regiom.): ordo Piperaceis aff. Gen.: Houttuynia, Saururus, Spathium, Aponogeton. *Cf.* Flora 1828. II. Erg. Bl. p. 39.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65. 66: fam. Piperariear. Trib.: *Saurureae* (gen.: Saururus, Aponogeton), Ouviandreae.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (159) Achlamydear.

Bartl. 1830. Ord. p. 84: ordo (57) Piperinar. Gen. ut Meyer. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248). Gen. ead. et Anemopsis.

Lindl. 1833. Nix. p. 26: ordo Piperalium.

Endl. 1837. Gen. p. 266; ordo Piperitar. Gen. ut Meyer. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1374 et Ench. p. 152) Anemiopsis. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. Gen.: Saururus, Gymnotheca, Houttuynia, Anemiopsis.

Rchb. 1841. Nom. p. 68: subdiv. Piperear. Gen. ut Endl. 1841.

Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 3: fam. Piperinear. Gen. ut Meyer et Ouvirandra. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 98. Gen.: Houttuynia, Saururus.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 387: fam. Dicotyledonear. Trib.: *verae* (gen.: Saururus), Houttuynieae.

Saurureae Rchb. 1828. Consp. p. 45: div. Alismacear. Gen.: Sparganium, Saururus, Aponogeton, Houttuynia.

Saururopsis Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 589: nov. g. Saururear. anomalum. (S. chinensis.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 715.

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 353: g. Saururacear.

Saururus Plumier*) 1693. Amer. p. 58. t. 77; 1703. Gen. p. 51. t. 12.

Linn. 1737. Gen. p. 108. n. 307; 1737. Cliff. p. 7. 139; 1740. Syst. p. 22; 1748. Ups. p. 91; 1753. Sp. I. p. 341; 1759. Syst. ed. X. p. 992. n. 414: g. Hexandr. Trigyn.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 81. n. 334: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Piperitar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 123. — Link 1821. En. I. p. 355.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Aroidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 123.

Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 489: g. Heptandr. Trigyn.

Adans. 1763. Fam. II. p. 468: g. Arorum.

Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 184. n. 464; 1767. Syst. ed. XII. p. 259. n. 459: g. Heptandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 291; 1784. Syst. p. 353. — Reich. 1778. Gen. p. 186. n. 500. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 246. n. 632. — Gmel. 1791. Syst. p. 597. — Pers. 1797. Syst. p. 377; 1805. Ench. I. p. 403. n. 911. — Willd. 1799. Sp. II. p. 292. n. 725; 1809. En. p. 407.

Hill 1769. Ht. kew. p. 373: g. Monophyllar.

Scop. 1777. Intr. p. 249: g. Polycarpiar.

Juss. 1789. Gen. p. 19: g. Naiadum.

Neck. 1790. El. III. p. 296. n. 1694: g. Emproophytor.

Mönch 1794. Meth. p. 693: g. Calycostemonis.

Batsch 1802. Tab. p. 176: g. Vaginalium.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 51: g. Fluvialium. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 260. n. 1051.

Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 45: g. Saururear. — Par. Poir. 1823. Dict. v. 26. p. 201 (*Lézardelle*). — Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 494. — E. Meyer 1827. De Houtt. p. 13. — Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 792; 1841. Nom. p. 68. n. 2556. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66. — Bartl. 1830. Ord. p. 84. — Endl. 1837. Gen. n. 1824. p. 266; 1841. Ench. p. 152. — Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 4. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 98.

Elliott 1817. Sketch I. p. 432: g. Hexandr. Tetragyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 240.

Agdh. 1825. Aphor. p. 201: g. Piperacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 169. n. 1406.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 293. n. 1517: g. Polygonear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 134: g. Acoroidear.

Lindl. 1836. Nat. syst. p. 184; 1847. Veg. kd. p. 521: g. Saururacear.

*) σαῦρος, lacerta; οὐρά, cauda.

Saururus Plum. cont.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1222: g. Piperear.
Synon. Spathium Lour.; Mattuschkia Gmel.

Saussurea*) Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 11.
= Funkia Spreng.

Saussurea DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 156. 196; 1815. Fl. franç. V. p. 466: nov. g. Carduacear. (Serratula alpina L.) — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 289.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 110; 1827. v. 47. p. 494: g. Carlinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2304. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Bartl. 1830. Ord. p. 145. — Less. 1832. Syn. p. 11. — DC. 1837. Pr. VI. p. 531. Sect.: Lagurostemon, Benedictia, Theodorea. — Endl. 1838. Gen. n. 2853. p. 468; 1841. Ench. p. 246. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 452. — Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 18; 1847. Veg. kd. p. 713. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37. — Walp. 1843. Rep. II. p. 668; 1847. VI. p. 282. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 660. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 272.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 534; 1826. Syst. III. p. 380. n. 2642; 1831. Gen. II. p. 606. n. 2979: g. Cynarear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 13.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 500; 1830. v. 60. p. 570: g. Stähelinear. (restrict.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1422: sect. Serratulae.
Gaud. 1829. Helv. V. p. 6. 158: g. Capitatar.
Link 1829. Hdb. I. p. 698: g. Acarnacear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 87: g. Carduinear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 303.
Koch 1837. Syn. p. 406. Ed. II. p. 465: g. Serratulear.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3893: g. Saussureear. Sect.: Lagurostemon, Saussurea, Theodorea.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 330: g. Saussurear., injuncta Aplotaxide ampliat.
Stschegl. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 241. Nova sect.: Amphilaena.
Synon. Heterotrichum Bieb.; Bennettia Gray.

Saussureae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 330: sect. Leuzear. Gen.: Saussurea. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 430.

Saussureeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 99: sect. Serratulear. Gen.: Saussurea, Haplotaxis.

Saussuria Mönch 1794. Meth. p. 388: nov. g. Petalostemonis. (Nepeta multifida L.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 513.
= Schizonepeta Benth.

*) Dicat. Hor. Ben. de Saussure, prof. Genevensi.

Sauteria*) Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXX. 139; 1846. Syn. Hepat. p. 541: g. Jecorariar. (Lunularia alpina.)
Mont. 1839 in Orb. voy. Amér. Bot. p. 54; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549; 1849. ibid. XI. p. 392: g. Marchantiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 843. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 10.
Endl. 1841. Spl. I. n. 468/1. p. 1338; 1841. Ench. p. 27: g. Marchantiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.
Synon. Hampea Nees.

Sautiera**) Decaisne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 383: nov. g. Acanthacear. (Ruellia bilabiata Reinw.)
Endl. 1838. Gen. n. 4096. p. 707; 1841. Ench. p. 344: g. Diclipterear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4289.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 595: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Dicliptcridar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 98: g. Hygrophilear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 781: g. Ruelliear.

Sauvagea Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 241. n. 526: g. Polyandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 449: g. Cistor.
Scop. 1777. Intr. p. 227: g. Nomadear.
Neck. 1790. El. II. p. 378. n. 1188: g. Ypsoophytor.
= Sauvagesia Linn.

Sauvageae „Gingins mss." DC. 1824. Prodr. I. p. 315: trib. Violariear. Gen.: Sauvagesia. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 21 (19). Gen. ut Don.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 377: sect. Frankeniacear. Gen.: Luxemburgia, Sauvagesia, Lavradia.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 64.

Sauvageseae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LIX: div. Violear. Gen.: Sauvagesia.
Rchb. 1828. Consp. p. 189: div. Violacear. Subdivis.: Frankenieae, *genuinae* (gen.: Sauvagesia, Lavradia, Luxemburgia), Erythroxyleae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187: subdiv. Alsodinear. Sect.: Pipareanae, Luxemburgieae, Lavradieae.

Sauvagesia***) Linn. 1753. Sp. I. p. 203; 1759. Syst. ed. X. p. 942. n. 252; 1762. Sp. ed. II. p. 294; 1764. Gen. ed. VI. p. 112. n. 286; 1767. Syst. ed. XII. p. 185. n. 283: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 77. t. 51. f. 3. — Murr. 1774. Syst. p. 203; 1784. Syst. p. 244. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 251. t. 100. — Reich. 1778. Gen. p. 116. n. 308.

*) Dicat. Eleuth. Sauter, botanico Vindobon.
**) Dicat. dom. Sautier, hortulano peregrinatori.
***) Dicat. Franç. Boissier de Sauvages, prof. Monspeliensi.

Sauvagesia Linn. cont.
— Schreb. 1789. Gen. I. p. 157. n. 401. — Gmel. 1791. Syst. p. 422. — Pers. 1797. Syst. p. 256; 1805. Ench. I. p. 253. n. 581. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1185. n. 458. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 353.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.
Gled. 1764. Syst. p. 39. n. 152: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 426: g. incertae sedis. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXV. 436. n. 994.
Batsch 1802. Tab. p. 63: g. Hyperioneor.
Hedw. 1806. Gen. p. 166. n. 700: g. Cistear.?
A. St. Hil. 1817. Mém. Mus. III. p. 215: g. Frankeniear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 778: g. Capparidum.
Spreng. 1820. Neue Entd. I. p. 297; 1825. Syst. I. p. 796. n. 892; 1830. Gen. I. p. 192. n. 971: g. Droserear. — Par. Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 34. t. 24. 25. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 847.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 388: g. Frankeniacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 306. — St. Hil. 1824. Pl. rem. Brés. p. 58. t. 1—4 (*cf.* Zucc. in Flora 1825. I. p. 35); 1829. Fl. Bras. II. p. 151. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 111.
Ging. 1824 in DC. Pr. I. p. 315: g. Sauvagear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 377. — Meisn. 1837. Gen. p. 21 (19).
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 524: g. Violacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX; 1828. Consp. p. 189. n. 4904: g. Sauvagesear. (genuinar.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: g. Sauvagesiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 343.
Bartl. 1830. Ord. p. 290: g. Sauvagesiar. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 393.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 470: g. Sauvagesiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5050. p. 913; 1841. Ench. p. 473. — Walp. 1842. Rep. I. p. 225; 1843. II. p. 767. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 236.
Rchb. 1837. Hdb. p. 270; 1841. Nom. p. 187. n. 7162: g. Lavradiear.
Synon. Sauvagea Linn. 1742; Iron P. Browne.

Sauvagesiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Resedariear. Gen.: Sauvagesia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 343: ordo Violalium. Gen. Sauvagesiear. Endl.

Sauvagesiae Bartling 1830. Ord. p. 289: ordo (165) Guttiferar. Gen.: Sauvagesia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 88: fam. Violinear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 393: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen.: Sauvagesia, Lavradia.

Sauvagesieae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 704 div. Violacear. Subdivis.: Frankenieae, *genuinae*, Erythroxyleae.

Sauvagesieae Spach 1836. Vég. phan. V. p. 469: fam. (82) Guttiferar. Gen.: Sauvagesia, Lavradia.
Ench. 1839. Gen. p. 912; 1841. Ench. p. 472: ordo Parietalium. Gen. ead. et Luxemburgia.

Sava Adans. 1763. Fam. II. p. (21): g. Borraginum.
= Onosma Linn.

Savastana*) Schrank 1789. Bair. Fl. I. p. 337: nov. g. ex typo Holci odorati L. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 529.
Gmel. 1791. Syst. p. 177: g. Triandr. Digyn.
= Hierochloë Gmel.

Savastania Scopoli 1777. Introd. p. 213. n. 942: g. Dumosar.
Neck. 1790. El. II. p. 119. n. 795: g. Plyrontophytor.
= Tibouchina Aubl.

Savia**) Willd. 1805. Spec. IV. p. 771. n. 1798: g. Dioec. Pentandr. (Croton sessiliflorum Sw.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 617. n. 2223.
Agdh. 1823. Aphor. p. 194: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 15. t. 2.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 903. n. 3181; 1831. Gen. II. p. 706. n. 3562: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5095; 1841. Nom. p. 195. n. 7432: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5866. p. 1122; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 343 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282: g. Cluytiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 569: g. Wielandiidear. Sect.: Eusavia, Actephila, Petalodiscus, Charidia.

Savia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 171: nov. genus pro Glycine monoica L. indicatum.
= Amphicarpaea DC.

Savignia Rchb., Spreng., Dietr. vid. *seq.*

Savignya***) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 231; 1821. Syst. II. p. 283; 1824. Prodr. I. p. 157: nov. g. Alyssinear. (Lunaria parviflora Del.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4772 (*Savignia*).
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 210 (Verm. bot. Schr. IV. p. 7): g. Brassicear.
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 532: g. Crucifera r.
Bartl. 1830. Ord. p. 265: g. Siliquosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 517. n. 2540 (*Savignia*): g. Siliculosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 675.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 254: g. Vellear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 15 (14)?

*) Dicat. Fr. Eulal. Savastano, botanico Neapol.
**) Dicat. Gaetano Savi, prof. Pisano.
***) Dicat. Savigny, entomologo et botanico.

Savignya DC. cont.
— Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6983. — Endl. 1839. Gen. n. 4961. p. 884; 1841. Ench. p. 451.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Vellidar.

Saviniona*) Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 30: nov. g. Malvacear. (Lavatera acerifolia Cav.)
= Olbia DC.

Saxales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 22: nixus Apocarpar. Ordines: Baueraceae, Cunoniaceae, Saxifrageae.

Saxe-Gothaea (Lindl.?) Auct. vid. *Saxo-Gothaea.*

Saxifraga**) Tourn. 1700. Inst. p. 252. t. 129: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 110. Ed. Hall. 1745. p. 122: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 131. n. 368; 1737. Cliff. p. 167; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 107; 1753. Sp. I. p. 398; 1759. Syst. ed. X. p. 1025. n. 494; 1762. Sp. ed. II. p. 570; 1764. Gen. ed. VI. p. 223. n. 559; 1767. Syst. ed. XII. p. 303. n. 554: g. Decandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 290. — Murr. 1774. Syst. p. 342; 1784. Syst. p. 411. — Reich. 1778. Gen. p. 228. n. 608. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 301. n. 764. — Lour. 1790. Coch. I. p. 281. — Gmel. 1791. Syst. p. 704. — Pers. 1797. Syst. p. 439; 1805. Ench. I. p. 487. n. 1111. — Willd. 1799. Sp. II. p. 638. n. 887; 1809. En. p. 458. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 285.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 399: g. Dicotyledonum Diplostemonum. Sect.: Geum, Saxifraga.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 94. n. 388: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 106.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Pnr. Gis. 1792. Prael. p. 315.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Adans. 1763. Fam. p. 243: g. Portulacar.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 161: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 189: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 224: g. Nomadear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 177. t. 36. f. 3 (S. Colyledon).
Juss. 1789. Gen. p. 309: g. Saxifragar. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 258.
Neck. 1790. El. II. p. 387. n. 1204: g. Ypsoophytor. Sejungitur Hydatica.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 280: g. Saxifragear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 29. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 130. — Hedw. 1806. Gen. p. 327. n. 1290. — Mirb. 1815. Elém. II. p. 896. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 646; 1825. Syst. II. p. 361. n. 1694; 1830. Gen. I. p. 375. n. 1891. Sect.: Bergenia, Gymnopera, Leiogyne, Micranthes, Saxifraga. — Link 1821. En. I. p. 411; 1831. Hdb. II. p. 32. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 48. — Tausch 1823. Ht. Canal. Fasc. I. Sect.: Porphyrion, Aizonia, Dactylites, Micranthes, Hydatica, Arabisa, Hirculus, Cotylea, Eropheron. *Cf.* Flora 1824. I. p. 25. — Kunth 1824. Syn. III. p. 358; 1838. Berol. I. p. 155. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 525. Sect.: Gymnopera, Leiogyne, verae. — D. Don 1825. Nepal. p. 209. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 552. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L. 667. 694. (sect.: Tridactylites, Aizoides, Robertsonia, Micranthes, Bergenia); 1828. Consp. p. 159. n. 4203. Sect.: Tridactylites, Saxifragaria, Leiogyne, Robertsonia, Diptera, Micranthes. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Seringe 1830 in DC. Pr. IV. p. 17. Sect.: Porphyrion, Aizoonia, Dactyloides, Bergenia, Micranthes, Arabidia, Hydatica, Micropetalum, Hirculus. — Bartl. 1830. Ord. p. 312. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 116. — Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 111. — Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 54. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 552. Sect.: Saxifraga, Robertsonia. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 242. Sect. ex Ser. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 206. Sect.: Bergenia, Gynopera, Leiogyne, Hirculus, Porphyreon, Aizoonia, Micranthes, Saxifraga. — Koch 1836. Syn. p. 266. Ed. II. p. 293. Sect.: Aizoonia, Porphyrion, Trachyphyllum, Hirculus, Arabida, Hydatica, Dactyloides, Nephrophyllum, Micranthes. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 40. — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100). — Endl. 1839. Gen. n. 4634. p. 814; 1841. Ench. p. 408. Sect. ut Seringe. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1526. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 563. Sect.: Porphyrion, Hirculus, Dactyloides, Aizoonia, Hydatica, Arabidia, Micranthes, Nephrophyllum, Isomeria. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 331. Sect.: Aizoonia, Xanthizoon, Dactyloides, Tridactylites, Arabidia, Cotylea, Cymbalaria. — Walp. 1843. Rep. II. p. 362. 936; 1846. V. p. 824. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 204. Sect. fere ut Koch. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 637. Sect.: Arabidia, Hydatica, Micropetalum, Hirculus, Neurophyllum, Dactyloides, Aizoonia, Porphyrion. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 24.
DC. 1805. Franç. IV. p. 359; 1815. V. p. 516: g. Saxifragacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 398. Sect. ut Ser.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: g. Dicerocarpear.
D. Don 1823. Linn. Trans. XIII. p. 341. (Monogr.)
Gaud. 1821. Helv. III. p. 61. 83. Sect.: Cotyledon, Trigonophyllum, Porophyllum, Calliphyllum, Gomphophyllum, Hirculus, Nephrophyllum, Trachyphyllum, Sedoides, Triplinervium.
Sternb. 1831. Rev. Saxifr. p. . . . Sect.: Ro-

*) Dicat. Dominico Savinon.
**) Dicta ab effectu, cum ejus stillatio, ut et decoctum, lapides renales frangere et pellere dicatur. (Bauhin.)

Saxifraga Tourn. cont.
bertsonia, Diptera, Gymnopera, Miscopetalum, Hirculus, Mesogyne, Astasianthes, Leptarrhena, Micranthes, Chondrosea, Rupifragia, Discogyne, Aretiaria, Antiphylla. *Cf.* Flora Lit. II. p. 34.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 11. t. 18. (Sect.: Triplinervium.)
Synon. Geum Tourn.; Hydatica Neck.; Sekika Medic.; Micranthes, Robertsonia et Miscopetalum Haw. (*cf. Saxifrageae Haw.* Saxifr. en. p. 3); Kingstonia Gray. (Alia sub sectionibus.)

Saxifraga Haworth 1812. Syn. succul. p. 324. Ed. Schrank 1819. p. 357: g. Succulentar., emissis Micranthe, Robertsonia et Miscopetalo restrict.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 531: g. Saxifragear. Sejungitur Kingstonia. — Par. Haw. 1821. Saxifr. en. p. 22. (ulterius restrict.) — Rchb. 1837. Hdb. p. 230 (genuinar.); 1841. Nom. p. 157. n. 6155. Sect.: Tridactylites, Trachyphyllum, Porphyrion, Saxifraga.

Saxifragaceae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 358: fam. (63) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Saxifraga, Chrysosplenium, Adoxa.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 38: fam. Saxifragariear. Trib.: Saxifrageae, Adoxeae, Chrysosplenieae.
DC. 1830. Pr. IV. p. 1: ordo (91) Calyciflorar. Trib.: Escallonieae, Cunonieae, Bauereae, Hydrangeeae, Saxifrageae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 204. Trib.: Saxifrageae, Hydrangeae.
Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 47. Trib.: Escallonieae, Cunoniaceae, Hydrangeae, Saxifrageae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 163) 1847. Veg. kd. p. 567: ordo restrictus Saxifragalium. Gen. Saxifragear. Endl.
Meisn. 1838. Gen. p. 136 (99): ordo (99) plant. (p. 440 Corniculatar.) Trib.: Saxifrageae, Hydrangeaceae, Escallonieae, Bauereae, Geissoideae, Cunoniaceae.
Endl. 1839. Gen. p. 813; 1841. Ench. p. 407: ordo Corniculatar. Subord.: Saxifrageae, Cunonieae, Hydrangeae, Escallonieae. (*Synon.: Baueraceae, Cunoniaceae, Saxifragaceae et Escalloniaceae Lindl.*)
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 397: fam. Dicotyledonear. polypetalar. perigynar. Trib.: Saxifrageae, Cunoniaceae, Hydrangeae.

Saxifragae Juss. 1789. Gen. p. 308: ordo 2 class. XIV. Gen. §. 1: Heuchera, Saxifraga, Tiarella, Mitella. §. 2: *Affinia*: Weinmannia, Cunonia, Hydrangea.

Saxifragales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 566: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Saxifragaceae, Hydrangeaceae, Cunoniaceae, Lythraceae.

Saxifragaria Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4203 *b*: sect. Saxifragae.

Saxifragariae Rchb. 1837. Handb. p. 229; 1841. Nomencl. p. 157: div. Corniculatar. Subdivis.: Saxifrageae, Philadelpheae, Hydrangeeae.

Saxifragarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: ordo Calypetalar. Fam.: Escalloniaceae, Cunoniaceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, Hydrangeaceae, Philadelphineae.

Saxifrageae Vent. 1799. Tabl. III. p. 277: ordo 4 class. XIV. Gen. §. 1: Tiarella, Mitella, Heuchera, Saxifraga. §. 2: Hydrangea, Hortensia, Weinmannia, Cunonia. §. 3. *Affinia:* Chrysosplenium, Adoxa. §. 4: Cercodia, Ribes.
Batsch 1802. Tab. p. 29: fam. Difformariar. Gen.: Saxifraga, Heuchera, Mitella, Tiarella, Forgesia, Chrysosplenium, Hydrangea, Cunonia, Weinmannia, Vahlia, Visnea, Cercodia, Adoxa.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 129. t. 94. Gen. Saxifragar. Juss. Affinibus accedunt: Cornidia, Hortensia.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 896: fam. Dicotyledonum polypetalar. Typi sectionum: Saxifraga, Chrysosplenium, Adoxa.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 646: fam. 62 plant. Gen.: Saxifraga, Tiarella, Mitella, Heuchera, Oldenlandia, Bauera, Donatia, Bumalda, Chrysosplenium, Adoxa; Hydrangea.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Calyciflorar. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — Koch 1836. Syn. p. 266. Ed. II. p. 293. Gen.: Saxifraga, Zahlbrucknera, Chrysosplenium.
Haw. 1821. Saxifr. en. p. 3. Gen.: Megasea, Dermasea, Chondrosea, Miscopetalum, Lobaria, Tridactylites, Saxifraga, Muscaria, Leptasea, Hirculus, Ciliaria, Antiphylla; Micranthes, Aulaxis, Spatularia, Ligularia, Robertsonia; Mitella, Tiarella; Chrysosplenium, Adoxa; Heuchera.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 528: fam. Calyciflorar. Gen.: Robertsonia, Hydatica, Miscopetalum, Kingstonia, Saxifraga, Chrysosplenium.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 560: fam. Peripetalear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: div. Corniculatar. Gen.: Adoxa, Chrysosplenium, Heuchera, Tiarella, Mitella, Saxifraga. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 159; 1832. Fl. exc. p. 551. (ampliat.) Subdivis.: *genuinae* (gen.: Adoxa; Donatia; Chrysosplenium, Heuchera, Astilbe, Tiarella, Mitella, Tellima, Saxifraga, Bergenia), Cunoniaceae, Philadelpheae.
Bartl. 1830. Ord. p. 311: ordo (179) Succulentar. Divis.: *legitimae* (gen.: Saxifraga, Leptarrhena, Bergenia; Astilbe; Donatia), Heuchereae.
DC. 1830. Pr. IV. p. 17: trib. Saxifragacear. Gen. §. 1: Saxifraga, Leptarrhena, Chrysosplenium, Mitella, Tellima, Drummondia, Tiarella, Astilbe. §. 2: Heuchera, Donatia, Lepuropetalum, Vahlia. — Par. Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 54. (Gen.: Saxifraga, Tiarella, Heuchera.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 206. Gen. ut DC. et in §. 1 Eriogynia, in §. 2 Cryptopetalum. — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (99). Gen.: Vahlia, Parnassia?, Donatia?, Ere-

Saxifrageae Vent. cont.
mosyne, Lepuropetalum, Heuchera, Mitellopsis, Mitella, Tellima, Tiarella, Saxifraga, Leptarrhena, Lütkea?, Acrotrema?, Chrysosplenium, Oresitrophe, Astilbe. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 398. Gen. ut Endl.
Link 1831. Hdb. II. p. 32: ordo 10 Perigynar. Gen.: Saxifraga, Robertsonia, Hydrangea, Tiarella, Mitella, Chrysosplenium, Adoxa.
Lindl. 1833. Nix. p. 22: ordo Saxalium.
Mart. 1835. Consp. p. 48: ordo 224.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 37: fam. (68) Succulentar. Trib.: *verae* (gen. ut DC. et Bergenia, Hoteia), Francoaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 229: subdiv. Saxifragariar. Sect.: Heuchereae, Galacineae, *genuinae* (gen.: Donatia, Zahlbrucknera, Saxifraga, Micranthes, Robertsonia, Bergenia, Eriogynia). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 157. Sect.: Heuchereae, Francoaceae, *genuinae* (gen.: Eremosyne, Donatia, Boikinia; Zahlbrucknera, Saxifraga, Robertsonia, Bergenia, Leptarrhena, Lütkea, Nimmoia).
Endl. 1839. Gen. p. 813: subordo Saxifragacear. Gen.: Eremosyne, Donatia, Vahlia, Nimmoia, Zahlbrucknera, Saxifraga, Leptarrhena, Lütkea, Lepuropetalum, Chrysosplenium, Heuchera, Mitellopsis, Mitella, Tellima, Tiarella, Hoteia, Astilbe; Oresitrophe. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1415 et Ench. p. 408) Boykinia, Tolmiea, Neillia et 1842 (Spl. II. p. 107) Sullivantia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 107: fam. Saxifraginear. Trib.: Hydrangeae, Saxifrageae (gen. ex Endl.), Cunoniaceae.

Saxifrageae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Saxifragacear. restricta. Gen.: Saxifraga, Mitella, Tiarella, Heuchera.

Saxifragia Herm. 1687. Hort. Lugd. Batav. cat. p. 537.
= Tragoselinum Tourn.

Saxifragineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXVIII. 107: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Francoaceae, Philadelpheae, Saxifrageae, Ribesiaceae.

Saxo-Fridericia*) Schomburgk 1843. Rapat. Frid. Aug.: nov. g. Rapateacear. (S. regalis.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 880: g. Rapatear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 313.

Saxo-Gothaea**) (an *Saxe-Gothaea?*) Lindl. 1852 in Paxt. Fl. gard. II. Glean. 380: nov. g. Coniferar. monoicar. (S. conspicua.) *Cf.* Bot. Zeit. 1852. p. 789 et Müll. Ann. bot. V. p. 800 inter Taxineas (*Saxe-Gothaea*).

Scabeira Menegh., Rchb. vid. *seq.*

Scaberia Greville 1830. Alg. synops. p. XXXVI.
Endl. 1836. Gen. n. 116. p. 10; 1841. Ench. p. 8: g. Fucacear. — Par. J. Agdh. 1848. Linnaea XV. p. 1; 1848. Sp. Fuc. p. 251.
Menegh. 1838. Cenni p. 44 (*Scabeira*): g. Fucoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 780 (*Scabeira*). — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 159.

*) Dicat. regi Friderico Augusto.
**) Dicat. principi Alberto.

Scaberia Greville cont.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Polyphacear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phyc. gener. p. 369: g. Halochloar.?
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: g. Fucear. — Par. Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 331.
Synon. Castraltia A. Rich.

Scabiosa*) Tourn. 1700. Inst. p. 463. t. 263. 264: g. pl. class. XII, ab auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 210. Ed. Hall. 1745. p. 215: g. pl. class. IX.
Vaill. 1722. Act. Ac. Par. p. 176: g. Dipsacear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 669. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 469. — Juss. 1789. Gen. p. 194; 1819. Dict. v. 13. p. 316. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 559. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 424. — DC. 1805. Franç. IV. p. 223; 1815. V. p. 487. — Hedw. 1806. Gen. p. 54. 366. — Link. 1821. En. I. p. 126; 1829. Hdb. I. p. 680. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 739. Sect.: Lepicephalus, Cerionanthus, Succisa, Trichera, Sclerostemma, Cyrtostemma, Trochocephalus, Callistemma, Pterocephalus, Knautia. — Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 1. Sect.: Scabiosa, Succisa, Asterocephalus, Pterocephalus. — Bartl. 1830. Ord. p. 130. — Kunth 1838. Berol. I. p. 317. Sect.: Succisa, Trichera, Sclerostemma.
Linn. 1737. Gen. p. 23. n. 61; 1737. Cliff. p. 30; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 26; 1753. Sp. I. p. 98; 1759. Syst. ed. X. p. 888. n. 108; 1762. Sp. ed. II. p. 141; 1764. Gen. ed. VI. p. 48. n. 115; 1767. Syst. ed. XII. p. 112: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 93. — Murr. 1774. Syst. p. 120; 1784. Syst. p. 143. — Reich. 1778. Gen. p. 49. n. 121. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 64. n. 149. — Lour. 1790. Coch. I. p. 68. — Gmel. 1791. Syst. p. 228. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 28; 1818. Fl. cap. I. p. 524. — Pers. 1797. Syst. p. 147; 1805. Ench. I. p. 119. n. 226. — Willd. 1797. Sp. I. p. 545. n. 172; 1809. En. p. 143.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 210: g. Aggregatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat. — Hill 1769. Ht. kew. p. 79. — Gis. 1792. Prael. p. 528. — Batsch 1802. Tabl. p. 228. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 585; 1825. Syst. I. p. 377. n. 375; 1830. Gen. I. p. 88. n. 243. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 84. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 374. 385. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 127. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 446. Sect.: Cephalaria, Knautia, Pterocephalus, verae (subsect.: Asterocephalus, Vidua, Succisa).
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 161. n. 657: g. Petalostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 151: g. Scabiosar.

*) Nomen officinarum ab scabro herbae habitu. (Ruell.)

Scabiosa Tourn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 120: g. Compositar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 175. 322; 1789. Phil. Bot. I. p. 23. (Structura seminis S. variegatae.)
Neck. 1790. El. I. p. 108. n. 188: g. Psydomorphytor. Disjunguntur Chetastrum, Pteropogon, Succisa.

Scabiosa Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 210. t. 95.
= Vernoniae Linn. sp.

Scabiosa Mönch 1794. Meth. p. 490: g. Petalostemonis, sejunctis Knautia, Succisa et Pterocephalo restrict.
Koch 1836. Syn. p. 345. Ed. II. p. 377: g. Dipsacear. Sect.: Sclerostemma, Cyrtostemma, Asterocephalus et (1843) Callistemma. — Par. Webb.... Canar. II. p. 198. Sect.: Cherocosmos. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 446. Sect.: Sclerostemma, Cyrtostemma, Trochocephalus.
Rchb. 1841. Nom. p. 72. n. 2689: g. Scabiosear. Sect.: Tricheropsis, Scabiosa.

Scabiosa Lagasca 1816. Gen. et spec. p. 8: g. restrict. Dipsacear. (Sc. arvensis, sylvatica, etc.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 477. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 47. *Cf.* Schult. Mant. III. p. 2 sub Trichera. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 192.
Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 2: sect. Scabiosae. — Par. Rchb. 1844. Fl. sax. p. 126.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1935: g. Scabiosear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 323.
= Trichera Schrad.

Scabiosa Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 2. 59. n. 408: g. Dipsacear. emend. — Par. Coult. 1823. Dipsac. p. 33. Sect.: Asterocephalus, Vidua, Succisa. — Schult. 1827. Mant. III. p. 2. 30. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 181. Sect.: Sclerostemma, Vidua, Trochocephalus. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 75. Sect.: Asterocephalus, Vidua, Sclerostemma.
DC. 1830. Pr. IV. p. 654: g. Scabiosear. Sect. ut Coult. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 689. Sect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 2195. p. 354; 1841. Ench. p. 229. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121). — Walp. 1843. Rep. II. p. 534; 1847. VI. p. 86. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 452. Sect. ex DC. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 141.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 700: g. Dipsacacear.

Scabiosae Adans. 1763. Fam. II. p. 148: fam. 20 plant. Gen. §. 1: Allionia, Knautia, Scabiosa, Dipsacus, Asterocephalus, Pterocephalus, Morina. §. 2: Fedia, Polypremum, Valeriana.

Scabioseae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXX; 1828. Consp. p. 92; 1837. Hdb. p. 178: div. Dipsacear. Gen.: Knautia, Pterocephalus, Asterocephalus, Succisa, Scabiosa, Dipsacus et 1828 Triosteum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 72. Gen. ut 1827 et Spongostemma.

Scabioseae Rchb. cont.
DC. 1830. Pr. IV. p. 645: trib. Dipsacear. Gen.: Dipsacus, Cephalaria, Knautia, Pterocephalus, Scabiosa. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 682. Gen. ead. — Endl. 1838. Gen. p. 354; 1841. Ench. p. 229. Gen. ead, — Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121). Gen. ead. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 316. Gen. ead. et Cerionanthus, Succisa, Sclerostemma, Cyrtostemma, Asterocephalus.
Synon. Dipsaceae DC. 1805.

Scabridae Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: ordo 20 plant. Gen.: Ficus, Dorstenia, Parietaria, Urtica, Cannabis, Acnida, Humulus, Morus.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 53 plant. Gen.: Cecropia, Ficus, Dorstenia, Parietaria, Theligonum, Urtica, Morus, Ulmus, Celtis, Bosea, Acnida, Cannabis, Humulus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593. Gen. ead. et Böhmeria, Forskohlea.
Batsch 1802. Tab. p. 178: fam. Seminiferar. Gen.: Cecropia, Artocarpus, Gunnera, Misandra, Gnetum, Thoa; Humulus, Cannabis; Datisca; Urtica, Forskohlea, Parietaria, Elatostema, Morus, Böhmeria; Procris, Ficus, Mithridatea, Dorstenia, Perebea.

Scabrita Linn. 1767. Mant. p. 3. n. 1242; 1767. Syst. ed. XII. p. 115: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 124; 1784. Syst. p. 147. — Reich. 1778. Gen. p. 51. n. 125. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 66. n. 154. — Gmel. 1791. Syst. p. 233. — Pers. 1797. Syst. p. 152.
Scop. 1777. Intr. p. 166: g. Personatar.
= Nyctanthes Linn.

*Scadiophytum**) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 162: gen. 7 plantar. Spec. natur.: Ammi, Bunium, Crithmum, Sison, Alacospermum, Cachrys, Arpitium, Laserpitium, Bradlaeia, Cuminum, Ferula, Bupleurum, Cussonia, Sium, Mauchartia, Gohoria, Daucus, Caucalis, Sanicula, Athamantha, Galbanophora, Ligusticum, Conium, Dasyspermum, Hasselquistia, Tordylium, Hydrocotile, Selinum, Allinum, Pastinaca, Heracleum, Artedia, Tapsia, Astrantia, Hacquetia, Eryngium, Oenanthe, Phelandrium, Seseli, Aethusa, Meum, Myrrhis, Scandix, Chaerophyllum, Imperatoria, Angelica, Coriandrum, Anidrum, Smyrnium, Foeniculum, Anethum, Aegopodium, Pimpinella, Apinella, Apium, Carum, Peucedanum.

Scaevola Linn. 1771. Mant. II. p. 145. n. 1294: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 178; 1784. Syst. p. 213. — Reich. 1778. Gen. p. 93. n. 244. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 121. n. 300. — Gmel. 1791. Syst. p. 361. — Pers. 1797. Syst. p. 221; 1805. Ench. I. p. 195. n. 435. — Willd. 1797. Sp. I. p. 955. n. 345. — Labill. 1804. Nov. Holl. t. 78. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 52. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 146; ed. 1832. I. p. 527.
Scop. 1777. Intr. p. 147: g. Caprifolior.
Juss. 1789. Gen. p. 165: g. Campanulacear. —

*) *σκιάδιον*, umbella; *φυτόν*, planta.

Scaevola Linn. cont.
Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 472. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 63 (*Sévole*).
Neck. 1790. El. I. p. 134. n. 230: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 212: g. Campanulatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 369: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 141. n. 609.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 582. Ed. Nees p. 438: g. Scaevolear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 727. Sect.: Sarcocarpa, Xerocarpa, Pogonanthera, Crossotoma. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186. — Endl. 1838. Gen. n. 3038. p. 506; 1841. Ench. p. 261. Sect. ut Don. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 505. Sect.: Sarcocarpaea, Gymnostegia, Xerocarpaea, Pogonandra, Crossotoma?, Scaevolaria? — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4008. Sect. fere ut DC. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32. — Walp. 1843. Rep. II. p. 712; 1847. VI. p. 390. — De Vriese 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 404; 1847. II. p. 242. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 579.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 2; 1823. Dict. v. 27. p. 98: g. Lobeliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 221. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 729.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 527; 1825. Syst. I. p. 752. n. 798: g. Lobeliear.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. VIII. 160. n. 882: g. Goodenoviar.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2782: g. Goodenoviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 173. n. 873: g. Goodeniear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 785.
Synon. Lobelia Plum.

Scaevola Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 583: g. Scaevolear. valde restrictum. — Par. De Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 16. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 371.

Scaevolaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 242.
= Scaevoleae R. Brown.

Scaevolaria DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 512: sect. Scaevolae? — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1391. n. 3038 *e*. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4008. 5.

Scaevoleae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 582. Ed. Nees p. 438: trib. Goodenoviar. Gen.: Scaevola, Diaspasis, Dampiera. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 727. Gen. ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: trib. Goodeniacear. Gen. ead. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 506; 1841. Ench. p. 261. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695. Gen. ead. et Pogonetes. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 278. Gen. ut R. Brown.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (178) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Goodenalium.

Scaevoleae R. Brown cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102: subdiv. Stylidiariar. Gen. ut R. Brown.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 502: trib. Goodenoviear. Gen. ead. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 583. Gen. ead. et Xerocarpa, Pogonanthera, Crossotoma. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32. Gen.: Scaevola. — De Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 5. Gen.: Temminckia, Camphusia, Scaevola, Crossotoma, Molkenboeria, Merkusia, Aillya, Dampiera, Linschotenia. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 369.

Scalesia Arnott 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 443; 1841. Hook. journ. bot. III. p. 312: nov. g. Helianthear. *Cf.* Endl. Gen. p. 409.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 308: g. Compositar. incertae sedis.
Meisn. 1839. Gen. p. 200 (131): g. Heliopsidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3195. — Endl. 1842. Spl. II. p. 42. n. $2512/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Scalia Sims .... Bot. Mag. t. 956.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Helichrysear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 162: sect. Podolepidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2736 *a*. p. 445; 1841. Ench. p. 242. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 462.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Scaligera Adans. 1763. Fam. II. p. 323: g. Genistar.
= Aspalathus Linn.

Scaligeria*) DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 70; 1830. Prodr. IV. p. 248: nov. g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 381. — Endl. 1839. Gen. n. 4544. p. 792; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 989. — Boiss. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 69. Char. reform. — Walp. 1846. Rep. V. p. 923. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 81.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 790. n. 4099: g. Smyrniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5367.
Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.
Meisn. 1838. Gen. p. 150 (108): g. Cachrydear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 16: g. Eusmyrnear.

Scaliopsis**) Walp. 1840. Linnaea XIV. p. 318: nov. g. Helichrysear. (S. Lucaeana.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 47. n. $2735/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 363.
Steud. 1841. Nom. II. p. 528 (*Scalpiopsis*): g. Senecionidear.
= Podolepis Labill.

Scalius Gray 1821. Arrang. brit. pl. I. p. 678. 704: nov. g. Jungermannidear. (Jung. Hookeri E. B.)
= Haplomitrium Nees.

*) Dicat. J. C. Scaligerio, Theophrasti commentatori.
**) Scalia; ὄψις: ob affinitatem specierum.

Scalopodora*) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 80; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Lichen velleus L.)
= Umbilicaria Hoffm.

Scalpellorchis Blume 1848. Rumphia IV. p. 43: sect. Podochili.

Scalpiopsis Steud. vid. *Scaliopsis Walp.*

Scammonea Koch 1844. Synops. ed. II. p. 555: sect. Cynanchi. (C. acutum L.)
= Eucynanchum Griseb.

Scammonia Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 97: subg. Convolvuli. (C. Scammonia L.)

Scamone Dumort. vid. *Secamone R. Brown.*

Scandalida Adans. 1763. Fam. II. p. 326: g. Phaseolor.
Scop. 1777. Intr. p. 308. n. 1414: g. Leguminosar.
Medic. (Vorles. II. p. 384) 1789. Phil. Bot. I. p. 205. (Lotus tetragonolobus L.)
Neck. 1790. El. III. p. 10. n. 1306: g. Cyteophytor.
= Tetragonolobus Scop.

Scandiceae C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363: trib. Umbelliferar. Gen.: Scandix, Anthriscus, Chaerophyllum.

Scandicidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 779: trib. Apiacear. Gen. Scandicinar. Endl. 1842.

Scandicinae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 639: ordo Umbelliferar. Gen.: Scandix, Myrrhis, Anthriscus, Chaerophyllum, Schulzia.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIII; 1825. Syst. I. p. 531; 1830. Gen. I. p. 225: trib. Umbelliferar. Gen. ead. excepto ultimo (1830 Amminis adnumerato).
Endl. 1839. Gen. p. 786: trib. Campylospermar. Gen.: Scandix, Anthriscus, Chaerophyllum, Butinia, Oreomyrrhis, Sphallerocarpus, Molopospermum, Velaea, Tauschia, Myrrhis, Freyera, Osmorrhiza, Grammosciadium, Ozodia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1414 et Ench. p. 380) Glycosma, 1842 (Spl. II. p. 69) Heterotaenia et 1850 (Spl. V. p. 13) Rhabdosciadium.
Rchb. 1841. Nom. p. 138: subdiv. Solenospermar. Gen. ut Endl. 1841 et Physocaulis, Heterotaenia.

Scandicineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 130: trib. 12 Umbelliferar. Gen.: Chaerophyllum, Anthriscus, Scandix, Myrrhis.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIV: div. Umbelliferar. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 141: subdiv. Umbelliferar. genuinar. armatar. Gen. ead. et Schultzia, Spermatura.
Dumort. Anal. fam. p. 35: trib. Rhynchospermar. Gen. ut Koch.
DC. 1830. Pr. IV. p. 120: trib. Campylospermar. Gen.: Scandix, Anthriscus, Chaerophyllum, Caldasia, Sphallerocarpus, Molopospermum, Velaea, Myrrhis, Osmorhiza, Grammosciadium. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 362. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 314. Ed. II. p. 345. Gen.:

*) σκάλοψ, talpa.

Scandicineae Koch cont.
Scandix, Anthriscus, (1843 Physocaulus,) Chaerophyllum, Biasolettia, Myrrhis, Molopospermum. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). Gen. ut DC. et Ozodia, Freyera, Tauschia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. Scandicinar. Endl.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 442: subdiv. Solenospermar. Gen. ut Koch 1824 et Molopospermum. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 219. Gen. ut DC. et Biasolettia.
Tausch 1834. Flora I. p. 342: subtrib. Rhynchospermar. Gen.: Scandix, Anthriscus, Caldasia, Physocaulis, Lecokia, Myrrhis, Rhynchostylis, Chaerophyllum, Cryptotaenia, Osmorhiza, Grammosciadium, Schulzia?, Turbith.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133. 143: sect. Rhynchospermear. Gen.: Scandix, Anthriscus, Oreomyrrhis, Physocaulis, Lecockia, Freyera, Myrrhis, Rhynchostylis, Chaerophyllum, Cryptotaenia, Osmorhiza, Grammosciadium, Turbith, Ozodia.
Brongn. 1843. En. genr. p. 113: trib. Campylospermear. Gen. ut DC.

Scandicium C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363.
Walp. 1843. Rep. II. p. 421: sect. Scandicis.

Scandix Tourn. 1700. Inst. p. 326. t. 173: g. pl. class. VII, ab auctoribus varia latitudine adoptatum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 264. Ed. Hall. 1745. p. 277: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 79. n. 226; 1737. Cliff. p. 101; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 64; 1753. Sp. I. p. 256; 1759. Syst. ed. X. p. 961. n. 319; 1762. Sp. ed. II. p. 368; 1764. Gen. ed. VI. p. 142. n. 357; 1767. Syst. ed. XII. p. 213. n. 354: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 237; 1784. Syst. p. 287. — Reich. 1778. Gen. p. 145. n. 387. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 192. n. 489. — Gmel. 1791. Syst. p. 486. — Pers. 1797. Syst. p. 304. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1449. n. 553; 1809. En. p. 317.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 455: g. Umbelliferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Hill. 1769. Ht. kew. p. 99. — Scop. 1772. Carn. I. p. 210. — Juss. 1789. Gen. p. 220. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 15. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 469. — Hedw. 1806. Gen. p. 201. n. 827. — Spreng. 1813. Comm. Gott. II. p. 6. (emend.) — Link 1821. En. I. p. 281.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 56. n. 228: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 100.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 319. n. 711.
Adans. 1763. Fam. II. p. 96: g. Chaerophyllor.
Neck. 1790. El. I. p. 186. n. 314: g. Scadiophytor.
= Scandix Gärtn., Anthriscus Hoffm., etc.

Scandix Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 33. t. 85: g. emendat.

DC. 1805. Franç. IV. p. 291: g. Umbelliferar. — Par. Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 98. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 639; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIII. 501; 1825. Syst. I. p. 901. n. 1071; 1830. Gen. I. p. 225. n. 1172: g. Scandicinar. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4504. p. 786; 1841. Ench. p. 380. Sect. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5319. Sect. ut 1832.

Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 180: g. Umbellatar. (Injungitur Chaerophyllum temulum L.)

Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 132: g. Scandicinear. — Par Rchb. 1828. Consp. p. 141. n. 3660; 1832. Fl. exc. p. 442 (sect.: Scandix, Wylia); 1837. Hdb. p. 219. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — DC. 1830. Pr. IV. p. 220. Sect.: Pecten, Wylia. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 363. Sect. eaed. — Tausch 1834. Flora I. p. 342. — Koch 1836. Syn. p. 314. Ed. II. p. 345. Sect. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Kunth 1838. Berol. I. p. 284. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 980. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 113. — Walp. 1843. Rep. II. p. 421; 1846. V. p. 903. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 344. Sect. ut DC. — Parlat. . . . . in Webb Canar. II. p. 167. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 740. Sect. ut DC.

Link 1829. Hdb. I. p. 353. g. Chaerophyllear.

C. Koch 1842. Linnaea XXI. p. 363: g. Scandicear.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 369: g. Pleurospermar. Sect. ut DC.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Synon. Scandix et Wylia Hoffm.

Scandix Gärtn., Mey. & Scherb. 1799. Fl. Wett. I. p. 414: g. dilatatum Pentandr. Digyn.

= Scandix Gärtn. et Chaerophyllum Linn.

Scandix Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 23: g. Umbelliferar., sejuncta Wylia restrict. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 503.

Gaud. 1828. Helv. II. p. 19. 369: g. Umbellatar.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 442; 1841. Nom. p. 138. n. 5319. 1: sect. Scandicis.

= Pecten Duby.

Scapania*) Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 38: sect. Radulae. (Jung. resupinata, aequiloba, undulata, etc.)

Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 14: g. Radulear.

Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 518: sect. Plagiochilae.

Lindenb. 1844 in Nees Syn. Hepat. p. 61: g. Jungermannidear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 59. — Mont. 1849 in Orb.

*) σκαπάνη, pala, rutrum.

Scapania Dumort. cont.
Dict. XI. p. 405. — Bayrh. 1849. Taun. p. 38.

Synon. Patarola Leman; Candollea Raddi pt.; Martinellius Gray pt.; Diplophyllum Dumort. pt.

Scapha Noronh. mss.

= Saurauja Willd.

Scaphespermum*) Edgeworth 1846. Linn. Trans. XX. 1. p. 58: nov. g. Umbelliferar. (S. trilobum.) *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 133.

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 357: g. Coriandrear.

Scaphis**) Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 14. f. 6: nov. g. Graphidear. (Opegraphae alyxorinae Ach.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 28.

Fries 1825. Pl. homon. p. 273: sect. Opegraphae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 386 *b*; 1841. Nom. p. 16. n. 543. 3. — Endl. 1836. Gen. n. 135 *c*. p. 12; 1841. Ench. p. 10.

Scaphium Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 33: nov. g. Sterculiear. (Sterculia scaphigera Wall.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 31 (25). — R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. Pt. 3. p. 236. — Walp. 1846. Rep. V. p. 104.

Spach 1834. Vég. phan. III. p. 502: g. Sterculiacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. $5321/_3$.

Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Brachychitonear.

Endl. 1840. Gen. n. 5320 *i*. p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 9.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.

Scaphophorum Ehrenb. 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 94. 101: nov. g. Hysterior. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 30.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 743: g. Hymenomycetum gymnosporor.

= Schizophyllum Fries.

Scaphularia Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 73; 1849. Spec. Alg. p. 40: sect. Synedrae.

Scaphyglottis Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 58. t. 97—100: nov. g. Orchidear. (S. parviflora, etc.)

Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1901: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1413. p. 197; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2018 (sphalm. *Siaphyglottis*). — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Synon. Cladobium Lindl.

Scaredederis „Pet.-Th.“ Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 183: inter genera Orchidear. minus cognita.

*) σκάφη, scapha.
**) σκαφίς, scaphula.

Scariola*) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 133: sect. Lactucae. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 802.
= Lactuca Endl.

Scariola Endl. 1838. Gen. n. 3008 *a*. p. 499; 1841. Ench. p. 250: sect. Lactucae arctius definita.

Scelochilus**) Klotzsch 1841 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 33. p. 261; 1842. Ic. pl. rar. h. Berol. II. t. 31: nov. g. Dendrobiear. (Sc. Ottonis.)
Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. Misc. p. 24: g. Vandear.
Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 60. n. 1316/1. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Ionopsidar.

Scenedesmus***) Meyen 1829. Nov. Act. Leop. XIV. 2. p. 774. t. 43: nov. g. Algar. *Cf.* Flora Lit. I. p. 317 et Linnaea VI. Litt. p. 62.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 606: g. Desmidiacear. liberar.
Endl. 1836. Gen. n. 20. p. 3; 1841. Ench. p. 2: g. Desmidiear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 34; 1840. Linnaea XIV. p. 206. — Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 653. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 412.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467); 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Pediastrear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. ambiguar. coenobiar.
Synon. Tessarthronia Turp.; Tessarthra Ehrenb. pt.; Scenodesmus Kütz.

Scenidion Endl., Rchb. vid. *seq.*

Scenidium†) Klotzsch 1832. Linnaea VII. p. 200. t. 10: nova tribus Polypori, Cyclomyci analoga.
Endl. 1836. Gen. n. 447 *g*. p. 39 (*Scenidion*); 1841. Ench. p. 21: sect. Polypori. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 482. 7.

Scenodesmus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phycol. gener. p. 164; 1845. Phycol. germ. p. 139; 1849. Spec. Alg. p. 185. n. 135: g. Desmidiear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 528.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 89: g. Pediastrear.
= Scenedesmus Meyen.

Scepa††) Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 172. 441; 1847. Veg. kingd. p. 283: nov. g. Scepacear. (Lepidostachys villosa Wall.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1897. p. 288; 1841. Ench. p. 174. — Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258). — Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 254.
Wight 1840. Ic. pl. Ind. II. 1. p. 5. t. 361: g. Antidesmear.

Scepa Lindl. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2512: g. Scepear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Urticeis aff.
= Aporosa Blume? (Planch. in Ann. sc. nat. 1854. II. p. 265.)

Scepaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 171) 1847. Veg. kingd. p. 283: ordo Euphorbialium. Gen.: Scepa, Lepidostachys, Hymenocardia, Forestiera.
Endl. 1837. Gen. p. 288; 1841. Ench. p. 174: fam. Juliflorar., Antidesmeis aff. Gen. ead. excepto ultimo. — Simil. Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258). Gen. ead.
Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 253: ad Euphorbiaceas refert.

Scepanium*) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 55; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Pedicularis sceptrum carolinum L.)
= Prosopia Rchb.

Scepasma Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 582: nov. g. Phyllanthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5857. p. 1121; 1841. Ench. p. 589. — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7420 (sph. *Siepasma*). — Meisn. 1841. Gen. p. 343 (254). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 648: g. Phyllanthidear.

Scepeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 67: subdiv. Urticear. Gen. Scepacear. Endl.

Scepinia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 78. n. 140: nov. g. Siphoniphytor., a Pteronia L. disjunctum.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 460; 1827. v. 48. p. 44; 1830. v. 60. p. 581. 596: g. Chrysocomear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2534.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Asterear.
DC. 1836. Pr. V. p. 356: sect. Pteroniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2386 *a*. p. 386; 1841. Ench. p. 235.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Baccharidear.
Synon. Pteronia et Henanthus Less.

Scepseothamnus**) Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 248: nov. g. Gardeniacear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 528 (*Scepsothamnus*).
Endl. 1838. Gen. n. 3317. p. 564; 1841. Ench. p. 275: g. Rubiacear. dubiae tribus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2976. — Walp. 1843. Rep. II. p. 523.
Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115): g. Gardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Scepsothamnus Steud. vid. *praeced.*

Sceptranthus Graham 1838. Edinb. n. phil. journ. p. 413. (*Sceptranthes* ex Steud. Nom. II. p. 528.)
= Cooperia Herb.

---

*) Nomen arabicum.
**) *σκέλος*, crus.
***) *σκηνή*, scena; *δεσμός*, vinculum.
†) *σκηνίδιον*, scena.
††) *σκέπη*, tegumentum.

*) *σκηπάνιον*, baculus.
**) *σκέψις*, intuitus, consideratio.

Sceptromyces *) Corda 1837 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 7. t. 4: nov. g. Fungor. (S. Opizi.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 166: g. Polyactideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 14; 1842. Mycol. p. 54: g. Polyactidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
= Stachylidium Link pt.

Sceptroneis Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 264: nov. g. Echinellear.?
= . . . ?

Sceptrum Ledeb. 1848. Fl. Ross. III. 1. p. 302: subg. Pedicularis.
= seq.

Sceptrum Carolinum Linn. 1737. Fl. lapp. p. 197. Ed. Smith p. 206: g. Didynam. Angiosperm.
= Prosopia Rchb.

Sceura**) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 37: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 260.
Scop. 1777. Intr. p. 198: g. Speciosar.
= Avicennia Linn.

Schäffera Schreb. 1791. Gen. II. p. 681. n. 1507: g. Dioec. Tetrandr.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 491. n. 548; 1830. Gen. I. p. 114. p. 576: g. Rhamnear.? (Tetrandr. Digyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 550.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 404: g. Celastrinear.?
Endl. 1850. Spl. V. p. 83. n. $5690/_1$: g. Elaeodendrear.
= seq.

Schäfferia***) Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 259: nov. g. Dioec. Tetrandr. (Sch. frutescens.) — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 741. n. 1775. — Pers. 1807. Ench. II. p. 614. n. 2205.
Scop. 1777. Intr. p. 231: g. Nomadear.
Swartz 1788. Prodr. p. 2 (*Schefferia*). 38; 1797. Ind. occ. I. p. 325. t. 7: g. Tetrandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 284.
Juss. 1789. Gen. p. 426: inter genera incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 365. n. 1170 (*Scheferia*): g. Osariphytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 267: g. Rhamnear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 56. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51)? — Endl. 1840. Gen. n. 5750. p. 1103; 1841. Ench. p. 582 (dubium).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 671: g. Berberidear.
DC. 1825. Pr. II. p. 40: g. ad Rhamneas accedens. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 45.
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Celastrinear.? — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 428.
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5597: g. Frangulear. genuinar.

*) σκῆπτρον, sceptrum; μύκης, fungus.
**) *Schura* Arabum.
***) Dicat. Jac. Chr. Schäffer, Ratisb.

Schäfferia Jacq. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.?
Synon. Schäffera Schreb.

Schäfflera Hook. vid. *Schefflera Forst.*

Schaenocaulon Benth. vid. *Schoenocaulon A. Gray.*

Schaenolaena Lindl. vid. *Schoenolaena Bunge.*

Schaenus Hill, A. Rich., Math. vid. *Schoenus Linn.* et *Vahl.*

Schäreria Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 232: nov. g. Lecidinar. (Lecideae sp. Fr.)

Schätzellia*) Klotzsch 1849 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 11. p. 81: nov. g. Nassauviacear., Trixidi et Microchaetae aff.
= Isotypus Kunth.

Schätzellia C. H. Schultz Bip. 1850. Flora p. 419: nov. g. Oocliniear. (Sch. mexicana.)
Synon. Dichaeta Schultz.

Schaffnera C. H. Schultz Bip. 1842. Flora I. Beibl. p. 134.
= Eudicoma DC.

Schalideae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: fam. Aciniae. Gen.: Claudea. *Cf. Anomalophylleae Dcne.*

Schamsia**) Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. I.

Schanginia***) C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 394: nov. g. Salsolear. (Suaeda linifolia Pall.)
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4340 (err. *Schauginia*): g. Chenopodear. — Par. Moq.-Tand. 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 319. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 218; 1840. Chenop. en. p. 118: g. Suaedinear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1940. p. 298; 1841. Ench. p. 182. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Schoberiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6393: g. Suaedear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Spirolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 153: g. Schanginiear. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 774.

Schanginia Sievers mss. *Cf.* Meyer in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 222.
= Hololachna Ehrenb.

Schanginieae Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 153: subtrib. Suaedear. Gen.: Schanginia, Sevada, Suaeda.

Schasmaria†) Achar. 1814. Syn. Lich. p. 271: sect. Cenomyces. (C. cenotea, parecha, crispata, sparassa.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v.

*) Dicat. memoriae Paulinae, Deckeri typographi aulici uxoris, e gente de Schätzell.
**) Franc. Schams, scriptor de viniculture Hungariae.
***) Dicat. P. Schangin, collectori plantarum sibiricarum.
†) σχάζω, aperio, hio. (?)

Schasmaria Achar. cont.
48. p. 49. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 521. 3.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 416: g. Cenomycidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 414 *c:* sect. Cladoniae.
= Cenomyce Ach. pt.

Schauera*) Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 202 in adnot.
= Göppertia Nees.

Schaueria Nees 1838. Del. sem. h. Vratisl. (Linnaea Litt. 1839. p. 119); 1842. Linnaea XVI. p. 301; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 102; 1847 in DC. Pr. XI. p. 314: nov. g. Gendarussear. (Justicia calycotricha Hook.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $4082/_1$. p. 1406; 1841. Ench. p. 343; 1842. Spl. II. p. 63. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4275.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.

Schaueria Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 25: nov. g. pro *Bystropogone Blume* (nec L'Herit.) propositum.
= (Mesosphaeria Benth.?) Hyptidis Jacq. pars.

Schauginia Rchb. vid. *Schanginia Meyer.*

Schawia Schreb., Bartl. vid. *Shawia Forst.*

Scheadendron Bertol. .... Ill. pl. Mozamb. I. p. 12. t. 4. A. B.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 860: g. Combretear.

Schedonnardus Steud. 1850. Flora I. p. 228: nov. g. Agrostidear. (Nomen.)
Steud. 1854. Glum. I. p. 146: g. Vilfear. (Sch. Texanus.)

Schedonorus**) Palis. 1812. Agrost. p. 99. t. 19. f. 11: nov. g. Graminear. (Bromus elatior L.) — Par. Hook. f. 1853. Fl. N. Zeal. I. p. 309.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 163: g. Festucacear.
Trin. 1820. Fund. p. 150: g. Triandr. Digyn. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 388.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 114: g. Bromear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1414.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 151: sect. Festucae.
Gaud. 1828. Helv. I. p. 308: sect. Bromi. — Par. Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 355.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 76. 274: g. Festucear.
Conf. Schenodorus et Schoenodorus Auct.

Scheelea***) Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 264: nov. g. Palmar. (Attalea princeps Mart., etc.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 854.

*) Dicat. J. C. Schauer, prof. Wratislaw., tum Gryphico.
**) „σχεδόν, prope, fere: ὅρος, terminus."
***) Dicat. chemico Scheele.

Scheeria*) Seemann 1853. Bot. Mag. t. 4743: nov. g. Gesneriacear. (Achimenes Scheerii Hort.)
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. ibid. XXVII. p. 700. 755: g. Achimenear.
Regel 1853. Gartenflora II. p. 354: g. Gesneriear. *Cf.* Bot. Zeit. 1854. p. 289.
Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Euachimenear.

Schefferia Swartz, Neck. vid. *Schäfferia Jacq.*

Scheffieldia Scopoli 1777. Introd. p. 183: g. Luridar.
Murr. 1784. Syst. p. 198: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1797. Syst. p. 204. n. 1367.
Gis. 1792. Prael. p. 349: g. Caryophylleor.
Hedw. 1806. Gen. p. 98. n. 442: g. Primulacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 70.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204: g. Samolear.
= Sheffieldia Forst.

Schefflera**) Forst. 1776. Char. gen. p. 45. t. 23: nov. g. Pentandr. Polygyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 520. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 356.
Scop. 1777. Intr. p. 104: g. Strictar.
Juss. 1789. Gen. p. 429: g. incertae sedis.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 209. n. 537: g. Pentandr. Decagyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1568. n. 598. — Pers. 1805. Ench. I. p. 341. n. 757 (*Scheflera*). — Hedw. 1806. Gen. p. 215. n. 882.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3784: g. Araliacear. — Par. Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 92. Char. emend.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 95 (*Schäfflera*): sect. Araliae.
= Aralia Linn.?

Scheflera Pers. vid. *praeced.*

Scheidweileria***) Klotzsch 1855. Begon. p. 178: nov. g. Begoniacear. (Begonia digitata Raddi.) — Par. Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 325.

Schelhamera Juss. vid. *seq.*

Schelhammera R. Brown 1810. Prodr. I. p. 273. Ed. Nees p. 129: nov. g. Melanthacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 57. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIX. 364. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 270. n. 1408. (Hexandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1157.
Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 6 (*Schelhamera*): g. Colchicear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 131. — Endl. 1837. Gen. n. 1078. p. 136; 1841. Ench. p. 79. — Brongn. 1843. En. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 251.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 98. n. 1263: g. Sarmentacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1347: g. Methonicear.

*) Dicat. Fr. Scheer, Esq.
**) Dicat. Jac. Chr. Scheffler, Gedanensi.
***) Dicat. prof. Scheidweiler, Belg.

Schelhammera R. Brown cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Colchicaceis aff.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1710: g. Uvulariear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 210.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.
Schelhammeria Heist. .... Helmst. p. 36.
= Cheiranthus R. Brown.
Schelhammeria*) Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 119: nov. g. Thalamostemonis. (Carex cyperoides L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1083: g. Cyperear.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 72; 1841. Nom. p. 40. n. 1435: g. Caricear.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Heuff. 1844. Flora II. p. 529: g. Caricinear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 46: g. Cyperoidear.
= Caricis Mich. pars.
Schellingia Steud. 1850. Flora I. p. 231; 1854. Glum. I. p. 214: nov. g. Chloridear., Opiziae Presl proximum. (*Cf.* Hochstett. in Flora 1857. p. 324.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 765.
= Aegopogon Willd.
Schellolepis J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 56: sect. Goniophlebii.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 393: subsect. Goniophlebii.
= Marginaria Bory pt.
Schelveria Nees & Mart. 1821. Flora I. p. 299: nov. g. Personatar., Calceolariae aff.
= Angelonia Humb. & Bonpl.
Schenkia Griseb. 1853. Bonplandia I. p. 226: nov. g. Gentianear., Erythraeae aff. (Sch. sebaeoides.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 508.
Schenodorus Palis. 1812. Agrost. p. 177 in Ind. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 59 et Wittst. Etym. Handw. p. 796 (*Schoenodoros*).
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 698. n. 341: g. Graminear.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1024: g. Poacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.
Koch 1837. Syn. p. 813. Ed. II. p. 939: sect. Festucae.
= Schedonorus Palis.
Schepperia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 67. n. 1392: nov. g. Amorphophytor., a Cleome L. separatum. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 59.
DC. 1824. Pr. I. p. 245: g. Capparear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4871. — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 278. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296. — Endl. 1839. Gen. n. 4991. p. 891; 1841. Ench. p. 456. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7120: g. Cadabear.
Synon. Macromerum Burch.

*) Dicat. Günth. Chr. Schelhammer, prof. Helmstad.

Scherardia Murray 1770. Stirp. Gotting. p. 43; 1774. Syst. p. 125. n. 120; 1784. Syst. p. 148: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 98. — Roth 1788. Germ. I. p. 68. — Hoffm. 1791. Bot. Taschenb. p. 47. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 182.
Neck. 1790. El. I. p. 197. n. 329: g. Phyllastrophytor.
= Sherardia Dill.
Schetti Adans. 1763. Fam. II. p. 146: g. Aparinium.
= Ixora Linn.
Scheuchzeria*) Linn. 1737. Gen. p. 106. n. 301; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 338; 1759. Syst. ed. X. p. 991. n. 408; 1762. Sp. ed. II. p. 482; 1764. Gen. ed. VI. p. 178. n. 452; 1767. Syst. ed. XII. p. 255. n. 447: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 263. — Murr. 1774. Syst. p. 286; 1784. Syst. p. 348. — Reich. 1778. Gen. p. 181. n. 487. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 239. n. 615. — Gmel. 1791. Syst. p. 586. — Pers. 1797. Syst. p. 370; 1805. Ench. I. p. 396. n. 878. — Willd. 1799. Sp. II. p. 263. n. 701; 1809. En. p. 400. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 236. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 470. 597.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 258: g. Graminibus adfine.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 73: g. Lilior.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 75. n. 315: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 47 (*Scheuzeria*). — Juss. 1789. Gen. p. 46.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tripetaloidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 167. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 226.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462 (*Scheuczeria*): g. Liliatar.
Scop. 1777. Intr. p. 81: g. Liliacear. — Par. Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 17.
Neck. 1790. El. III. p. 192. n. 1556: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 159: g. Alismoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 152: g. Juncear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 191; 1825. Syst. II. p. 143. n. 1360. — Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 60.
Cram. 1803. Disp. p. 81: in Hexandr. Hexagyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 114: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 254. n. 1029.
DC. 1805. Franç. III. p. 191: g. Alismacear.
Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365: g. Juncaginear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 218. — Schult. 1830. Syst. VII. p. CIV. 1581. — Bartl. 1830. Ord. p. 73. — Koch 1837. Syn. p. 671. Ed. II. p. 773. — Endl. 1837. Gen. n. 1040. p. 128; 1841. Ench. p. 72. — Kunth 1838. Berol. II. p. 292;

*) Dicat. nobili fratrum Scheuchzer pari. (Linn. in Beckmann Lex. bot. p. 192.)

Scheuchzeria Linn. cont. 1841. Enum. III. p. 146. — Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272). — Brongn. 1843. En. genr. p. 29. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 10. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 37. — Gren. (& Godr.) 1856. France I. p. 310. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 243.

Link 1821. En. I. p. 347: g. Alisminar.

Agdh. 1822. Aphor. p. 126: g. Juncaginum. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 113.

Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1290; 1830. Fl. exc. p. 96: g. Veratrear.

Link 1829. Hdb. I. p. 146: g. Melanthacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Triglochinear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 289. n. 1496: g. Asphodeleis et Junceis aff. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1210.

Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1140: g. Scheuchzeriear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 210: g. Juncaginacear.

Synon. Juncoidi affinis Scheuchz.; Telmatophila Ehrh.

Scheuchzerieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 33: div. Alismacear. Gen.: Triglochin, Scheuchzeria, Lilaea, Tetroncium.

Scheuczeria Neck. vid. *Scheuchzeria Linn.*

Scheuzeria Adans. vid. *praeced.*

Schidiomyrtus*) Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 237: nov. g. Bäckear.

Walp. 1843. Rep. II. p. 920; 1846. V. p. 734: g. Bäckear.

Synon. Jungia Gärtn.; Mollia Gmel.; Imbricaria Smith.

Schieckea Walp. vid. *seq.*

Schieckia**) Karsten 1848. Bot. Zeit. p. 398: nov. g. Sapindacear.

Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 214 (*Schieckea*): g. Sapindear.

Schieda A. Juss. vid. *seq.*

Schiedea***) Chamisso & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 46: nov. g. Alsinear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 427. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21).

Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5363: g. Schiedeear.

Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352; 1838. ibid. II. p. 272: g. Molluginear. (*Cf.* Meisn. 1838. Gen. p. 130 (95).) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5192. p. 954; 1841. Ench. p. 502. — Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6302. (genuinar.) — Walp. 1846. Rep. V. p. 788. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 441 (*Schieda*).

Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.

Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1583: g. Caryophyllear.

Synon. Portulacea generis incerti Hook. & Arn. in Beech. voy. Bot. p. 188.

*) *σχίδη*, scindula, assula. (?)
**) Dicat. Schieck.
***) Dicat. Dr. Schiede, botanico.

Schiedea A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 186: nov. g. Coffeacear. (Sch. martinicensis.)

= Tertrea DC.

Schiedea Bartl. 1830. Ord. nat. p. 210: g. Spermacocear.

= Richardsonia HBK.

Schiedeeae Rchb. 1828. Consp. p. 207: subdiv. Malpighiear.? Gen.: Schiedea.

Schiekia*) Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 397 (300): nov. g. Xiphidiear., jam ab Endlicher (Gen. p. 171) indicatum. (Wachendorfia Orinocensis Kunth.)

Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109: g. Haemodoracear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Wachendorfear.

Schillera**) Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5290: g. Götheacear.

Endl. 1841. Spl. I. n. 5355. p. 1423 (*Schilleria*); 1841. Ench. p. 520: g. Eriolaenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 617.

Synon. Microchlaena Wall., Wight & Arn.; Microlaena Endl.; Wallichia DC.; Jackia Spreng.

Schilleria Kunth 1839. Linnaea XIII. p. 676: nov. g. Piperacear. (Piper obovatum Rz. & P., etc.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 11.

Miq. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 288: g. Piperear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248).

= Artanthe Miq.

Schilleria Endl. vid. *Schillera Rchb.*

Schima Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Polyandr.

Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 14: g. Malvacear.

Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 129: g. Ternströmiacear. (*Cf.* Linnaea I. p. 662.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 41 (31). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.

Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5409: g. Ternströmiear.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 573: g. Gordoniear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 94. n. 5424/1. — Walp. 1846. Rep. V. p. 135.

Rchb. 1837. Hdb. p. 302: g. Camelliear.

Korth. .... Verh. nat. Gesch. ned. Bez. p. 142. t. 29.

Schimatothallae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 98: subordo Ulvacear. Tribus: Micrastericae, Pediastreae, Desmidieae, Didymopricae.

Schimmelmannia „Schousb." Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 24; 1849. Spec. Alg. p. 722. n. 480: g. Halymeniear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Euhalymeniear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XI. p. 414: g. Delesseriear.

Schimpera***) Steud. & Hochst. 1835 in Schimp. herb. Arab. petr. n. 224.

*) Dicat. Schiek, microscopiorum opifici Berol.
**) Dicat. Frid. de Schiller, poëtae.
***) Dicat. Guil. Schimper, peregrinatori.

Schimpera Steud. & Hochst. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4982. p. 889; 1841. Ench. p. 451: g. dubium Cruciferar. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 58.
Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6984: g. Vellear.?
Meisn. 1843. Comm. p. 341: g. Isatidear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 729: g. Siliquosar.

Schinnongia*) Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. (Flora 1822. II. p. 495 et Isis 1823. p. 863): nov. g. Iridear. adscitar.

Schinus**) Linn. 1737. Gen. p. 358. n. 897; 1737. Ht. Cliff. p. 483; 1742. Gen. ed. II. p. 551. n. 991: g. incertae sedis.
Linn. 1753. Sp. I. p. 388: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 683.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1034. n. 479: g. Decandr. Trigyn.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1467; 1764. Gen. ed. VI. p. 529. n. 1130; 1767. Syst. ed. XII. p. 658: g. Dioec. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 747; 1784. Syst. p. 891. — Reich. 1778. Gen. p. 524. n. 1234. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 697. n. 1539. — Pers. 1797. Syst. p. 933; 1807. Ench. II. p. 626. n. 2260. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 817. n. 1820; 1809. En. p. 1020.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Dumosar.? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.
Gled. 1764. Syst. p. 229. n. 944: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 327: g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 371: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 446. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 253.
Neck. 1790. El. II. p. 236. n. 982: g. Eredophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 651; 1825. Syst. II. p. 391. n. 1711: g. Terebinthacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 430. — Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 339; 1825 in HBK. Nov. gen. VII. p. 14; 1825. Syn. IV. p. 152. — Poir. 1824. Dict. v. 31. p. 571 (*Molle*).
DC. 1825. Pr. II. p. 74: g. Sumachinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 396. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 76. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 224.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3853: g. Sumachinar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 126.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 378. n. 1907: g. Terebinthear.
Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54): g. Cassuviear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 146. n. 5664: g. Pistaciear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 84.
Endl. 1840. Gen. n. 5901. p. 1129; 1841.

*) Nomen a Schinnongio, qui proximus a Fohio in China regnasse dicitur.
**) *Schinus* est nomen Dioscoridis lentisco impositum. (Ht. Cliff.)

Schinus Linn. cont.
Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Walp. 1842. Rep. I. p. 550: g. Anacardiear.
Synon. Molle Tourn.; Mulli Feuill.

Schinza „Dennst.“ Endl. in synon. Caperoniae: vid. *seq.*

Schinzia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Katou-Patsjotti Rheede* V. t. 7.)
= Caperonia St. Hil.?

Schinzia Nägeli 1842. Linnaea XVI. p. 278: nov. g. Fungor., Achlyae aff. (Sch. cellulicola et penicillata.)
Corda 1842. Mycol. p. 189: g. Caeomacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 85: g. Sporotricheor. restrict. Sejungitur Nägelia.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.?

Schisandra*) Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 218. t. 47: nov. g. Monoec. Syngenes., Menispermo aff.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 372. n. 1666: g. Monoec. Pentandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 558. n. 2063. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 209.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 677: g. Menispermear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 64.
Link 1822. En. II. p. 391: g. Menispermeis aff.
Synon. Schizandra DC.

Schisanthes Haworth 1819. Suppl. pl. succ. p. 128: nov. g. Narcissor. (Narcissus orientalis L.)
Schult. 1830. Syst. VII. p. 951: sect. Narcissi. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1289 *e*. p. 179 (*Schizanthes*); 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1611. 5 (*Schizanthes*).
Haw. 1831. Mon. Narciss. p. 6: g. Narcissinear. *Cf.* Kunth Enum. V. p. 721. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 208.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 440: subg. Narcissi.
= Queltiae Herb. pars.

Schisma**) Dumort. 1822. Comment. bot. p. 114: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. juniperina, adunca, concinnata.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Jungermanniear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 89.
Dumort. 1831. Syll. Jung. p. 76; 1835. Obs. Jung. p. 23: g. Acolear. restrict. (Jung. adunca.)
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 100. 107: g. Gymnomitrior.
Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 573: sect. Mastigophorae.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXV: g. Mastigophorear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $472/_{17}$. p. 1342; 1841. Ench. p. 28. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 820.
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 239: sect. Sendtnerae.

*) σχίσις, fissura; ἀνήρ, vir.
**) σχίσμα, fissum, fissura.

Schisma Dumort. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Mastigophoridar.
Synon. Herbertus Gray; Lepicolea Dumort.

Schismatoglottis Moritzi & Zoll. 1854. Syst. Verz. p. 77: nov. g. Aroidear. (Sch. calyptrata.) *Cf.* Mor. & Zoll. Verz. 1846. p. 83.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 120: g. Anaporinar. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 214.

Schismatomma „Flotow & Körb. mss." Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 271: nov. g. Lecidinar. (Lecidea abietina Schär.)
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 337: sect. Biatorae.
Arnold 1858. Flora II. p. 696: g. Pachnolepiear.

Schismatopera*) Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 178; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 43: nov. g. Prosopidoclinear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 86. n. 5768/₁. — Meisn. 1843. Comm. p. 369. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 433: sect. Perae.

Schismatopterides Willd. 1810. Spec. pl. V. p. 69: ordo 4 Cryptogamiae. Gen.: Angiopteris, Gleichenia, Mertensia, Todea, Mohria, Hydroglossum, Schizaea, Anemia, Osmunda. — Par. Willd. Grundr. ed. Link 1831. p. 235.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 104: div. Pteroidum. Gen.: Mertensia, Gleichenia, Todea, Angiopteris, Osmunda; Mohria, Lygodium, Schizaea.

Schismaturus Corda 1854. Icon. Fung. VI. p. 22. t. 4. f. 3—8: subg. Lysuri. (L. aseroëformis.)

Schismoceras Presl 1827. Reliq. Hänk. I. p. 96. t. 13: nov. g. Epidendrear. *Cf.* Flora 1828. I. p. 345 et Steud. Nom. II. p. 530 (*Schismocerus*). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1551. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
= Aporum Blume.

Schismocerus Steud. vid. *praeced.*

Schismus**) Palis. 1812. Agrost. p. 73: nov. g. Graminear. (Festuca calycina L.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 65. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 33. 584. n. 300. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 351. n. 349. — Link 1829. Hdb. I. p. 52.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 890. p. 100; 1841. Ench. p. 59. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Trin. 1820. Fund. p. 148: g. Triandr. Digyn. Sect.: Schismus, Electra.
Link 1821. En. I. p. 89: g. Graminum. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 76. n. 370.
Link 1827. Hort. I. p. 133: g. Avenacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1013: g. Meliacear.
Kunth 1830. Gram. p. 124; 1833. Agrost.

Schismus Palis. cont.
p. 384: g. Festucacear. — Par. Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 40. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 370. — Parlat. 1850 in Webb Canar. III. p. 405. — Steud. 1854. Glum. I. p. 295. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 537.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1399: g. Sesleriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 397: g. Sesleriacear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 403: g. Poëar.
Synon. Electra Panz.; Hemisacris Steud.

Schisolaena Pet.-Thouars vid. *Schizolaena.*

Schistanthe*) Kunze 1841. Ind. sem. h. Lips. (Linnaea XVI. Litt. p. 109): nov. g. Verbascear., Alonsoae proximum. (Sch. peduncularis.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 106. n. 3880/₁. — Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Walp. 1845. Rep. III. p. 151. 958.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 251; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Hemimeridear.

Schistheceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: fam. Urnuliniae. Gen.: Andraea.

Schistidium*) Brid. (Spec. Musc. Suppl. IV. p. 21) 1822. Meth. musc. p. 20: nov. g. Gymnostomor. Acrocarpor. (Gymnostomum Hedwigia Hoffm.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 77. — Par. Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 88. — Hüb. 1833. Musc. germ. p. 30.
Leman 1821. Dict. v. 20. p. 150: sect. Gymnostomi.
Agdh. 1822. Aphor. p. 107: g. Gymnostomar.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 113: g. Acrocarpor. gymnostomor. (1827. ibid. II. p. XLIII g. Grimmioideor.)
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 774: g. Bryoideor. (ciliatum.) — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 152 (ciliatum et pulvinatum).
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Grimmioidear.
Endl. 1836. Gen. n. 489. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 5.
Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 116: g. Grimmiacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Grimmiear.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 74: g. Grimmiar.
= Hedwigia Ehrh.

Schistidium Bruch, Schimp. & Gümb. 1845. Bryol. eur. Fasc. 25—28: g. Grimmiacear. (Grimmia pulvinata, apocarpa, etc.) — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 154. — Bayrh. 1849. Taun. p. 12.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 93: g. Racomitriear.
= Grimmiae Ehrh. sp.

*) πήρα, pera.
**) σχίσμη, fissura.

*) σχιστός, fissus.
**) σχίζω, findo.

Schistidium C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 565: g. Pottiacear. (Gymnostomum subsessile Schwägr.)
= Fiedleria Rabenh.

Schistocalyx Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 508: sect. Lycii.

Schistocarpae (Plantae calyptratae *schist.*) Brid. 1822. Meth. musc. p. XVIII. 206: appendix Muscor. frondosor. Gen. unicum: Andraea.

Schistocarpha Lessing 1831. Linnaea VI. p. 409: nov. g. Anthemidear. (Sch. bicolor.)
Less. 1832. Syn. p. 387: g. Neurochlaenear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 250: g. Neurolaenear.
= Perymenium Schrad.

Schistocarpi Brid. 1827. Bryol. II. p. XLI. 725: sect. 2 Muscor. calyptrator. operculator. Gen. unicum: Andreaea. — Par. Brid. 1827. ibid. p. XLVI. Fam. unica: Andreoidei.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 5: class. I Muscor. frondosor. Tribus unica: Andreaeaceae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403: ordo 4 Muscor. Trib. unica: Andraeeae.

Schistochila Dumort. 1835. Rec. obs. Jung. p. 15: nov. g. Aploziear. (Jung. appendiculata, Thouarsii, etc.)
Synon. Gottschea Nees.

Schistocodon Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 362: nov. g. Apocynear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 75. n. 3430/$_1$: g. Apocynacear. dubium. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 677. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 479.

Schistogyne Hook. & Arn. 1834. Journ. bot. I. p. 292: nov. g. Asclepiadear. (Sch. sylvestris.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3476. p. 593; 1841. Ench. p. 299: g. Calotropidear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4990.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 588: g. Oxypetalar.

Schistomitrium Dozy & Molkenb. 1844. Musc. Archip. Ind. p. 67. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 415.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 80: g. Leucobryacear.
Synon. Syrrhopodon Doz. & Molk. olim; Spirula D. & M.

Schistophragma „Benth." Endl. 1839. Gen. n. 3927. p. 679; 1841. Ench. p. 339: g. Gratiolear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4621. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 513. — Walp. 1845. Rep. III. p. 270. 963.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 392; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear.

Schistophylleae Bayrh. 1849. Taunus p. 17: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Schistostega.

Schistophyllum Palis. mss.
= Fissidens Hedw.

Schistostega*) Weber & Mohr 1803. Taschenb. p. 92. t. 6: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 78. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 713. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 147. n. 3292; 1831. Gen. II. p. 728. n. 3688. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 107. (anoplostomor.)
Röhl. 1810. Ann. Wett. Ges. II. 1. p. 133: g. Gymnoperistomator.
Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 105: g. Vaginulator. acrocarpor. gymnostomor.
Grev. & Arn. 1824. Mem. Wern. Soc. V. 1. p. 55: g. Gymnostomoidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 225.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 109: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLVI: g. Filicoideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 539: g. Entophyllocarpior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69 (*Schistotega*): g. Gymnostomear.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Entophyllocarpor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 64: g. Gymnostomor.
Endl. 1836. Gen. n. 595. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Genth 1836. Nass. I. p. 158: g. Bryoideor.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80: g. Drepanophyllear.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 973: g. Calyptrobryor.
Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII: g. Schistostegear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 97. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 38. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 306. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XI. p. 415.
Bayrh. 1849. Taun. p. 17: g. Schistophyllear.
Bruch, Schimp. .... Bryol. eur. III. p. IV: g. Schistostegacear.
Synon. Dicksonia Ehrh.

Schistostegaceae Bruch & Schimp. .... Bryol. eur. III. p. IV: fam. Muscor. Gen.: Schistostega.

Schistostegeae Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII: fam. Muscor. Gen.: Schistostega.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 97: div. Bryacear. Gen. id.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 306: subdiv. Entophyllocarpor. Gen. id.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 37: trib. Acrocarpor. Gen. id. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402. Gen. id.

Schistostephium „Krebs" Lessing 1832. Syn. Compos. p. 251: nov. g. Chrysanthemear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 74. — Endl. 1838. Gen. n. 2676. p. 436; 1841. Ench.

*) σχιστός, fissus; στέγη, tectum.

Schistostephium Krebs cont.
p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3089. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 245: g. Euchrysanthemear.

Schistotega Dumort. vid. *Schistostega Web. & Mohr.*

Schivereckia*) „Andrz. mss.“ DC. 1821. Syst. II. p. 300; 1824. Prodr. I. p. 160: nov. g. Alyssinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 136.
Link 1822. En. II. p. 157: g. Tetradynam. Siliculos.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 80: g. Cruciferar.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 639.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259 (*Schiverekia*); 1841. Nom. p. 180. n. 6959: g. Alyssear. (genuinar.)
Conf. Schiwereckia Andrz.

Schiverekia Rchb. vid. *praeced.*

Schiwereckia „Andrz. mss.“ DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 232; 1821. Syst. II. p. 147: nov. g. Alyssinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4767. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 177. — Endl. 1839. Gen. n. 4871. p. 868; 1841. Ench. p. 449.
Brongn. 1843. En. genr. p. 90: g. Allyssinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.
Conf. Schivereckia DC.; Schiverekia Rchb.

Schizachne Trinius & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6 e sér. V. (1849) p. 53: sect. Stipae. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 732. — Steud. 1854. Glum. I. p. 129.

Schizachyrium**) Nees 1829. Agrost. Bras. p. 331: nov. g. Saccharinear. (Andropogon condensatus Kth.)
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6 e sér. II. p. 263: sect. Andropogonis. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 365.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 494: g. Andropogonear.
= Trachypogon Nees.

Schizaea Smith 1791. Mem. Ac. Torin. V. p. 419. t. 19. f. 9; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 106: nov. g. Filicum. (dorsiferar.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 80. — Par. Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 7. 102 (annulatar.); 1806. Syn. p. 150. (spurie gyratar.) — Willd. 1802. Bemerk. üb. Farrenkr.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 40: g. Acrogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 32: g. Agyrator.
Willd. 1810. Sp. V. p. 85. n. 1950: g. Schismatopteridum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 106.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 161. Ed. Nees p. 17: g. Osmundacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 30. — Kunth 1822. Syn. I. p. 92. — Agdh. 1822. Aphor. p. 116. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 49. — Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 296. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 202. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 254. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. — J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 420.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 30. n. 3231; 1831. Gen. II. p. 719. n. 3623: g. Gleichenicar.
Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 736: g. Schizaeacear. — Par. Kunze 1834. Linnaea IX. p. 19. — Endl. 1836. Gen. n. 662. p. 65; 1841. Ench. p. 41. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (336). — J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 384. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694 (*Schizea*). — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 114.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 105: g. Rhachiospermar.
Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1054: g. Schizaeear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 81. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 47.
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 333: g. Euschizaeacear. Sect.: Euschizaea, Ripidium.
Synon. Ripidium Bernh.

Schizaeaceae Martius . . . . Pl. crypt. Bras. p. 112. *Cf.* Gardn. 1842. Lond. journ. bot. I. p. 134.
Rchb. 1828. Consp. p. 39: div. Osmundacear. Gen.: Aneimia, Schizaea, Lygodium, Mohria.
Endl. 1836. Gen. p. 64; 1841. Ench. p. 41: ordo Filicum. Gen. ead. — Par. Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 332. Subord.: Euschizaeaceae, Aneimiaceae, Mohriaceae. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 15. 113. Gen. ut Rchb.
Meisn. 1843. Gen. p. 435 (336): trib. Polypodiacear. Gen. ead.
J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 382: div. Filicum. Gen.: Lygodium, Lygodictyon, Schizaea, Actinostachys, Anemia, Anemidictyon, Mohria, Trochopteris.
Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 91: fam. Filicum. Gen. foss.: Senftenbergia.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: trib. Filicum. Gen.: Anemia, Mohria, Lygodium, Schizea, Actinostachys.

Schizaeeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 30: div. Osmundacear. Gen.: Schizaea, Lygodium, Mohria, Aneimia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: subordo Polypodiacear. Gen. ead. et Anemidictyon, Actinostachys, Lygodictyon.
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 46: trib. Filicum. Gen.: Lygodium, Schizaea.

Schizandra DC. 1818. Syst. I. p. 544: g. Menispermear. (spuriar.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 972. n. 1155. — Bartl. 1830. Ord. p. 243 (desciscens). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1037. (?)
DC. 1824. Pr. I. p. 104: g. Schizandrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1896; 1841. Nom. p. 193. n. 7312. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Blume 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e

---

*) Dicat. A. Schivereck (an Schiwereck?), botanico polono.
**) *σχίζω*, findo; *ἄχυρον*, palea.

Schizandra DC. cont.
sér. II. p. 91. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 10. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 95.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 239. n. 1259: g. Menispermeis aff.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 101: g. Schizandriacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7): g. Schizandracear. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 46. — Endl. 1839. Gen. n. 4733. p. 836; 1841. Ench. p. 426. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 306.
= Schisandra Rich.

Schizandraceae Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 5 (7): trib. Menispermacear. Gen.: Sarcocarpon, Sphaerostemma, Kadsura, Schizandra.
Endl. 1839. Gen. p. 835; 1841. Ench. p. 425: ordo Polycarpicar. Gen.: Kadsura, Sphaerostemma, Schizandra; Mayna? Accedit 1842 (Spl. II. p. 107) Hortonia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 305: ordo Menispermalium. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 416: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl. 1839.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 82. Gen.: Kadsura, Sphaerostema.
Conf. Schizandreae DC.; Menispermeae spuriae DC.; Schizandriaceae G. Don.

Schizandreae DC. 1824. Prodr. I. p. 104: trib. Menispermacear. Gen. unicum: Schizandra. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 6. 8. Gen. id. et Kadsura, Sphaerostemma.
Rchb. 1828. Consp. p. 86: subdiv. Menispermear. Gen.: Schizandra, Sphaerostemma, Sarcocarpon.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: trib. Menispermidear. Gen.: Schizandra.
Blume 1830. Fl. jav. Schizandr. p. 3; 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 91: fam. Menispermeis et Anonaceis proxima (jam in Blume Bijdr. p. 21 sub Sarcocarpo indicata). Gen.: Kadsura, Schizandra, Sphaerostemma.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo ad Anonaceas accedens.
Rchb. 1841. Nom. p. 193: subsect. Anonariar. Gen. ut Blume et Mayna.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 95: fam. Magnolinear. Gen. ut Rchb.

Schizandriaceae G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 101: ordo Thalamiflorar. Gen.: Schizandra, Sarcocarpum, Sphaerostemma, Kadsura, Mayna.

Schizangium Bartl. mss.
= Mitracarpum Zucc.

Schizantheae Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 165: sect. Atropacear. Gen.: Schizanthus.

Schizanthes Endl., Rchb. vid. *Schisanthes Haw.*

Schizanthus Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 5. t. 1; 1798. Fl. peruv. I. p. 11. t. 17: nov. g. Diandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 340. — Vahl 1805. Enum. I. p. 171. n. 43. — Hedw. 1806. Gen. p. 13. 349.

Schizanthus Ruiz & Pav. cont.
Pers. 1807. Ench. II. p. 161. n. 1471: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3144. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 54. 137. n. 73: g. Pedicularium.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 401: g. Scrofularinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 544.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 38. n. 72; 1830. Gen. I. p. 23. n. 93: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 54.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 82: g. Rhinanthear.
Bartl. 1830. Ord. p. 172: g. Veronicear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2; 1846 in DC. Pr. X. p. 202: 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Salpiglossidear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3898. p. 675; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 292. — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4733. — Walp. 1845. Rep. III. p. 232. 960.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 469: g. Nicotianear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 201.
Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216): g. Collinsiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 58: g. Salpiglossear.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 165: g. unicum Schizanthear.

Schizanthus G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 256: sect. Argyreiae.
= Euargyreia Endl.

Schizea Brongn. vid. *Schizaea Smith.*

Schizeilema Hook. f. 1845. Fl. antarct. I. p. 15.
Walp. 1846. Rep. V. p. 844: sect. Pozoae. — Par. Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 3. n. 4377 *b*.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778 (*Schizilema*): g. Mulinidar.

Schizhymenium Harvey .... in Hook. Ic. pl. rar. III. t. 102.
Schwägr. 1842. Suppl. IV. t. 317: g. Muscor. frondosor.
Bruch & Schimp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 24: g. Mielichhoferiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401 (*Schizymenium*); 1849. ibid. XI. p. 420: g. Bryear.
= Mielichhoferia Hornsch.

Schizhymenium Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 665: sect. Statices. — Par. (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 750.

Schizilema Lindl. vid. *Schizeilema Hook.*

Schizocaena J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 419 (*Schizocaenea*); 1842. Lond. journ. bot. I. p. 661 (Bauer Gen. Fil. t. 2): g. Cyathear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80. (*Cf. Schizochlaena Sm.*)
Endl. 1841. Spl. I. n. 653 *a*. p. 1351; 1841. Ench. p. 37: sect. Cyatheae.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Cyatheacear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 353: g. Eucyathear.
Synon. Eucyathea Presl.

Schizocaenea Smith vid. *praeced.*

Schizocalyx Scheele 1843. Flora II. p. 568. 576: nov. g. Satureinear., ab Origano sejunctum.
= Majorana Mönch.

Schizocalyx Hochstett. 1844. Flora I. Bes. Beil. p. 1: nov. g. Meliacear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 75. n. 5445/1 (dubium).
Walp. 1846. Rep. V. p. 375: g. Trichiliear.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 89. 125: g. Aitoniear.
= Doberia Juss. (Planch.)

Schizocalyx Weddell 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 73: nov. g. Rondeletiear. (Sch. bracteosus.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 120.

Schizocalyx Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 319; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 357: nov. g. Eugenioidear. (Sch. Pohlianus.)

Schizocarpeae Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 17. 102: trib. Cucurbitear. Gen.: Schizocarpum.

Schizocarpeum Wight vid. *Schizocarpum Schrad.*

Schizocarpicae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LV: ordo Thalamanthar. Series: Cyclospermae, Columniferae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 191; 1832. Fl. exc. p. 651. 717; 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 190. Formationes: Ranunculiflorae, Geraniiflorae (1841 Malviflorae).

Schizocarpicae Rchb. 1837. Handb. p. 192; 1841. Nomencl. p. 111: div. Asperifoliacear. Subdivis.: Echieae, Borragineae, Cynoglosseae.

Schizocarpum Schrad. 1830. Ind. sem. h. Gotting. (Linnaea Litt. VI. p. 73); 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 407: nov. g. Cucurbitear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 187. — Endl. 1839. Gen. n. 5144. p. 939; 1841. Ench. p. 491 (minus notum). — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 279. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 270 (*Schizocarpeum*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315 (parum notum).
Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3944: g. Bryoniear.?
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 18. 102: g. Schizocarpear.

Schizocarya Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 170. 283: nov. g. Gaurinear. (Sch. micrantha et Drummondii.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6131 c. p. 1195; 1841. Ench. p. 638: sect. Gaurae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 97.
Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6585: g. Gaurear.

Schizocentron Meisn. 1843. Gen. pl. vasc. Comm. p. 355: g. Osbeckiear.
Synon. Heeria Schltd. (non Meisn.)

Schizocephalum Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 77: nov. g. Aspergillinor. (S. atrofuscum.)

Schizochilus Sonder 1846. Linnaea XIX. 1. p. 78: nov. g. Ophrydear. (Sch. Zeyheri.) — Par. Rchb. f. 1849 in Walp. Ann. bot. I. p. 796.

Schizochiton Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 246; 1831. Gen. II. p. 539. n. 2643: g. Meliear.
Endl. 1840. Gen. n. 5530. p. 1049; 1841. Ench. p. 551: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8066. — Walp. 1842. Rep. I. p. 429. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 83. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 220: g. Meliacear.
Conf. Chisocheton Blume, Meisn.

Schizochlaena Spreng. vid. *Schizolaena Pet.-Th.*

Schizochlaena „J. Smith“ Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 80: g. Cyathear. (Nomen. *Cf. Schizocaena Smith.*)

Schizochlamys „A. Braun“ Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 891: nov. g. Palmellear.

Schizocodon Sieb. & Zucc. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 723: nov. g. Polemoniacear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 78. n. 3824/1. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636.

Schizoderma Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 15. 27: nov. g. Sclerotior.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Sclerotiacear.
Leman 1827. Dict. v. 48. p. 83: g. Hypoxylear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Stegilleor.
= Leptostroma Fries.

Schizoderma (Kunze?) Fries 1825. Pl. homon. p. 194: g. Naemasporeor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 83.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 21: g. Hypodermior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 476: g. Tuberculariinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 201. p. 18; 1841. Ench. p. 13. — Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 62. — Rabenh. 1844. Krypt. 1. p. 49.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 190: g. Sporomycetum hyposporor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 7: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 482: g. Illosporiaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 429: g. Nemasporear.
Synon. Hypodermium Link; Hypoderma Nestl.; Uredinaria Chev.; Sorosporium Rud.

Schizoderma Chevall. 1826. Fl. Paris. p. 438. t. 11. f. 21.
= Dichaena Fries.

Schizodictyon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 230: nov. g. Calotrichear. — Par. Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 417.

Schizodictyon Kütz. cont.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Zoospermear. dubium.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 320. n. 219: g. Scytonemear.
Schizodium Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 358: nov. g. Ophrydear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1537/2. p. 1365; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1884. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Holotrichidar.
Schizodon Swartz 1829. Adnot. bot. p. 91. = Schlotheimia Brid.
Schizodon Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5241 *b.* p. 970; 1841. Ench. p. 505; 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 402: sect. Cerastii.
Schizoglossum E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. austr. II. p. 218: nov. g. Asclepiadear. verar. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Endl. 1838. Gen. n. 3463. p. 591; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4959. (genuinar.)
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 553: g. Asclepiadar.
Schizoglossum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 443; 1849. Spec. Alg. p. 869. n. 570: g. Delesseriear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Floridear. dubium.
Schizogonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 245; 1845. Phycol. germ. p. 194: nov. g. Hormidiear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 25.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 97: g. Myxonemear.
Jessen 1848. Prasiolae mon.: g. Blastosporear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Bangiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Zoospermear. dubium.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 350. n. 238: g. Ulothrichear.
Synon. Cirronema Flot.; Tetranema Aresch.
Schizogramma Link 1841. Fil. h. Berol. p. 136: nov. g. Grammariar. (Gymnogramma palmata Kaulf.) = Gymnogramme Desv.
Schizogynae (s. *Labiatae genuinae*) Rchb. 1831. Fl. exc. p. 306: trib. Labiatar. Divis.: Mentheae, Satureinae, Buguleae, Hyssopeae, Monardeae, Nepeteae, Prasieae.
Schizogyne Cassini 1828. Dict. v. 56. p. 23: nov. g. Inulear. (Archetypar. verar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3395. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Less. 1832. Syn. p. 123: g. Facelidear.
DC. 1836. Pr. V. p. 473: g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2427. p. 394; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128). — Walp. 1847. Rep. VI. p. 141.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953; .... in Webb Canar. II. p. 217: g. Conyzear. legitimar.
Schizolaena*) Petit-Thouars 1807. Vég. il. Afr. III. p. 43. 46. t. 12 (*Schisolaena*): nov. g. Chlaenacear. — Par. Juss. 1817. Dict. v. 9. p. 386. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 825; 1825. Syst. II. p. 595. n. 1930 (*Schizochlaena*); 1830. Gen. I. p. 431. n. 2138. (Polyandr. Monogyn.) — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 210. n. 5477; 1841. Nom. p. 211. n. 8017. — Endl. 1840. Gen. 5400. p. 1015; 1841. Ench. p. 528. — Meisn. 1843. Comm. p. 344. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 487.
Pet.-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 55 in Römer Collect. bot. p. 208: g. Chlenacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 521. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 84. — Bartl. 1830. Ord. p. 337. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 562. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 56. — Meisn. 1837. Gen. p. 35. — Rchb. 1837. Hdb. p. 308.
Schizolepis „Schrad." Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 186: nov. g. Scleriear. *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 172.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Sclerear. = Scleriae Berg. pars.
Schizolepis F. Braun 1847. Flora I. p. 186: g. Abietinar. foss.
Schizolepton Fée 1852. Gen. Fil. p. 89: nov. g. Vittariear. (Schizoloma cordatum Gaud.)
Schizolobium**) Vogel 1837. Linnaea XI. p. 399: nov. g. Cassiear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 353.
Benth. 1840. Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 557. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Endl. 1841. Gen. n. 6760. p. 1312; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6062. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 157.
Schizoloma Gaudich. 1824. Ann. sc. nat. III. p. 507: nov. g. Filicum. (Lindsaea lanceolata Labill.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 85.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 378. t. 16—18: g. Schizolomear.
Presl 1836. Pterid. p. 132: g. Lindsaeacear.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 414; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 422: g. Lindsaear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 642 *b.* p. 1349; 1841. Ench. p. 37 (*Schizolomia*): sect. Lindsaeae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1031. 2.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 219: subg. Lindsaeae.

---

*) σχίζος, lacerus; λαῖνα, integumentum.
**) λόβιον, legumen parvum.

Schizoloma Gaudich. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80 (*Schizolomia*): g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Dicksoniear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 108: g. Lindsayear. reduct.
Synon. Hymenotomia Gaudich.

Schizolomeae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262. 378: subtrib. Hymenophyllacear. Gen.: Lindsaea, Schizoloma, Vittaria, Leptochilus.

Schizolomia Endl., Lindl. vid. *Schizoloma Gaudich.*

Schizomeria D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 94: nov. g. Cunoniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 202. — Endl. 1839. Gen. n. 4652. p. 818; 1841. Ench. p. 409. — Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6224.
Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101): g. Cunoniacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 572: g. Weinmannear.

Schizomeris Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 247; 1845. Phycol. germ. p. 195: nov. g. Hormidiear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 25.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Bangiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Zoospermear. dubium.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 362. n. 244: g. Ulothrichear.

Schizomitrium Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 104: sect. Gymnostomi.
= Physcomitrium Brid. emend.

Schizonema Agardh 1824. Syst. Alg. p. XV. 9: nov. g. Diatomear. — Par. Duj. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418.
Fries 1825. Pl. homon. p. 349: g. Undinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 425.
? Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: g. Ulvacear. (Nomen.)
Agdh. 1830. Consp. Diat. p. 11: g. Cymbellear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407; 1841. Brit. Alg. p. 209. Sect. (1841): Schizonema, Monema.
Spreng. 1831. Gen. syst. II. p. 756. n. 3846: g. Tremellacear.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 590: g. Diatomacear. inclusar.
Kütz. 1844. Bacill. p. 111; 1845. Phyc. germ. p. 100; 1849. Sp. Alg. p. 98. n. 56: g. Naviculear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 35. — Math. 1853. Belg. II. p. 537.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418: g. Schizonemear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. homococytidear. schizocytidear. synoecobiar.

Schizonema Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Schizonemear.
= Micromega Agdh.

Schizonemeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: sect. Eunaviculear. Gen.: Frustulia, Monnema, Schizonema, Dickiea.

Schizonemeae Trevisan cont.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418: sect. Diatomear. Gen.: Frustulia, Dickiea, Berkeleya, Rhaphidogloea, Homoeocladia, Schizonema, Micromega, Colletonema, Endosigma; Encyonema?, Syncyclia?

Schizonepeta Benth. 1834. Labiat. p. 468; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 370: sect. Nepetae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 803. — Endl. 1838. Gen. n. 3636 *a*. p. 622; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4084. 1. — Walp. 1845. Rep. III. p. 774. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 372.
Synon. Saussuria Mönch.

Schizoneura Schimp. & Moug. 1844. Pl. foss. Vosg. p. 48.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 171; 1846. Chlor. prot. p. LXVII: g. Smilacear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 103: g. Asterophyllitar.
Synon. Convallarites Brongn.

Schizonia Pers. 1828. Mycol. eur. III. p. 14: nov. g. Agaricinor.
= Schizophyllum Fries.

Schizonotus Lindl. 1830 in Wallich Catal. p. 703.
Meisn. 1837. Gen. p. 103 (73): sect. Spiraeae.
= Sorbaria Seringe.

Schizopepon Maxim. 1858. Mém. sav. étr. Ac. Pet. IX. p. 110: nov. g. Melothriear. (Sch. bryoniaefolius.)

Schizopetaleae Endl. 1839. Gen. p. 888; 1841. Ench. p. 451: fam. Cruciferar. Gen.: Schizopetalon.
Rchb. 1841. Nom. p. 181: subsect. Matthiolear. Gen. id.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 93: trib. Cruciferar. Gen. id. — Par. Barnéoud 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 165. Gen. id. et Perreymondia.

Schizopetalidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Diplecolobear. Gen.: Schizopetalon, Perreymondia.

Schizopetalieae G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 151. 268: subordo Cruciferar. Gen.: Schizopetalon.

Schizopetalon Hook. 1823. Exot. Fl. I. p. 74; 1823. Bot. Mag. t. 2379 (*cf.* Ann. sc. nat. I. p. 91): nov. g. Cruciferar. (Sch. Walcheri.) — Par. R. Brown .... Bot. Regist. n. 752. (Verm. bot. Schr. 1834. V. p. 349.) — DC. 1824. Pr. I. p. 236 (*Schizopetalum*). — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 85.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 916. n. 2329; 1831. Gen. II. p. 523. n. 2580: g. Siliquosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 386 (*Schizopetalum*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 729 (*Schizopetalum*).
Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4822: g. Heliophilear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 264.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 151. 268: g. Schizopetaliear.
Meisn. 1837. Gen. p. 16 [*Schizopetalum*] (14): g. Erucariear.?

Schizopetalon Hook. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4980. p. 888; 1841. Ench. p. 451: g. Schizopetalear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6989. — Brongn. 1843. En. genr. p. 93. — Barn. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 367. *Cf.* ibid. 1846. V. p. 77. t. 3. (Evolutio.) — Walp. 1846. Rep. V. p. 836.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Schizopetalidar.

Schizopetalum DC., Meisn., Spach vid. *praeced.*

Schizophragma Sieb. & Zucc. 1835. Fl. japon. I. p. 58. t. 26: nov. g. Hydrangiear. (Sch. hydrangeoides.)
Endl. 1839. Gen. n. 4670. p. 821; 1841. Ench. p. 409: g. Hydrangear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6167. — Walp. 1846. Rep. V. p. 836.
Meisn. 1843. Comm. p. 358: g. Hydrangeacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 570.

Schizophyceae Rabenh. 1847. Krypt. II. 1. p. 1: subordo Algar. Fam.: Diatomaceae, Desmidieae.

Schizophylla J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 286: tribus Arthrophyci.

Schizophyllum Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 330: g. Pileator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 948. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 465. n. 3470; 1831. Gen. II. p. 762. n. 3892.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Hymenacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 579: g. Agaricear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73 (*Schyzophyllum*).
Fries 1825. Pl. homon. p. 79 (*Scizophyllum*); 1838. Epicr. p. 402; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 133; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 315: g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 340; 1841. Nom. p. 12. n. 485. (genuinar.) — Endl. 1836. Gen. n. 450. p. 40; 1841. Ench. p. 21. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 74; 1842. Pl. cell. Cub. p. 413. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43; 1842. Mycol. p. 184. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 444. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 196. — Bail 1858. Syst. p. 31. t. 32.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: g. Agaricineor.
Math. 1853. Belg. II. p. 345: g. Agaricinear.
Synon. Kuema Adans.?; Schizophyllus Fries; Scaphophorum Ehrenb.; Schizonia Pers.

Schizophyllum Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 452: nov. g. Heliopsidear. (Sch. micranthum.)
= Aphanopappus Endl.

Schizophyllum Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 104: grex Philodendri. (Ph. panduraeforme Kth.)

Schizophyllus Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 103: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 86.
= Schizophyllum Fries.

Schizopleura Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. IX (in tab. 3. f. A *Manglesia*): sect. Beaufortiae. — Par. Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 149.
Endl. 1840. Gen. n. 6296. p. 1228; 1841. Ench. p. 650: g. Leptospermear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 162. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737.
Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6813: g. Melaleucear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 354.
Synon. Dammara Damp.; Manglesia Lindl.

Schizopogon Rchb. (1827 ex Spreng.) 1828. Consp. p. 52. n. 970: g. Saccharinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 55. n. 268: g. Graminum.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 34: sect. Polliniae. (Andropogon distachyos L.)

Schizopsera (an sphalm. pro *Schizoptera?*) Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXII. p. 181: nov. g. Silphiear. (Sch. trichotoma.)
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 210 (*Schizoptera*): g. Melampodinear.

Schizoptera Müll. vid. *praeced.*

Schizopteris Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 71; 1828. Hist. vég. foss. I. p. 383; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 83: g. foss. Filicum.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 111: g. Hymenophyllaceitum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 58; 1846. Chlor. prot. p. XXXIX: g. Neuropteridum.

Schizopteris Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 87: sect. Tetrapteridis.

Schizosiphon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 88; 1843. Phycol. gener. p. 233; 1845. Phycol. germ. p. 184; 1849. Spec. Alg. p. 327. n. 224: nov. g, Mastichotrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 31.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 86: g. Lyngbyear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 419: g. Scytonemear.

Schizostachyum Nees 1829. Agrost. Bras. p. 535; 1834. Linnaea IX. p. 477: nov. g. Bambusear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXXIII. 1355. — Endl. 1841. Spl. I. n. $908/_1$. p. 1354; 1841. Ench. p. 59. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 424.
Kunth 1833. Agrost. p. 435: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 387.
Rupr. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 133: g. Bambusar. (verar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1426. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bambusidar.
Steud. 1854. Glum. I. p. 332: g. Bambusacear.

Schizostemma Decaisne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 344; 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: nov. g. Oxypetalar. (S. longifolium et parviflorum.)
Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175): g. Calotropidear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n.

Schizostemma Decaisne cont. 3475/₁. p. 1398; 1841. Ench. p. 299. — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4989.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 586: sect. Oxypetali.

Schizostephanium Rchb. 1830. Fl. exc. p. 89; 1841. Nomencl. p. 44. n. 1612. 3: sect. Pancratii. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1288 *b*. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297).
= Pancratium Herb.

Schizostigma „Arnott in litt. 1838" Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116): nov. g. Hameliear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3224/₁. p. 1393; 1841. Ench. p. 273. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 50.
Arnott 1839. Ann. nat. hist. III. March p. 20: g. Rubiacear., Sabiceae aff. (Sch. hirsutum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.

Schizostigma Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 275: nov. g. Cucurbitear. — Par. Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 267.
Endl. 1842. Spl. II. p. 77: g. Cucurbitacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Walp. 1843. Rep. II. p. 199: g. Bryoniear.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 11. 47: g. Eubryoniear.
= Cucurbitella Walp.

Schizostigma C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 630: sect. Echii. (E. altissimum, italicum, vulgare, plantagineum, violaceum, creticum.)

Schizostoma „Ehrenb. mss." Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 165: g. Lycoperdeor. (Tulostoma exasperatum Mont., etc.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. (VII. p. 505: g. Tulostomeor.) VIII. p. 88: g. Tylostomeor.
= Tulostoma Pers.?

Schizostoma Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 441: sect. Geastri. (G. hygrometricus.)
= Actinodermium Nees.

Schizotechium Fenzl 1833. Verbr. d. Alsin. p. 13: sect. Stellariae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5240 *a*. p. 969; 1841. Ench. p. 505.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7797: g. Arenariear.

Schizotheca Ehrenb. 1832. Abh. Berl. Ak. I. p. 429: nov. g. Najadear. (Sch. Hemprichii) indescriptum. *Cf.* Rupr. in Mém. Ac. Pet. 6e sér. IX. 2. Bot.

Schizotheca C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 306: sect. Atriplicis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1912 *b*. p. 293; 1841. Ench. p. 181; 1842. Spl. II. p. 32. — Koch 1837. Syn. p. 610. Ed. II. p. 701. — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6362 2; 1844. Fl. sax. p. 319. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 308.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
= Teutliopsis Dumort.

Schizothecium Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 29. t. 13. f. 105: nov. g. Pyrenomycetum. (Sch. fimicolum.)
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 290: g. Dothideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 35; 1842. Mycol. p. 147: g. Labrellulinor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 168: g. Dothidinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phragmotrichaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 418: g. Sphaeropsideor. (Nomen proponitur *Pleurage*.) — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 228: g. Podosporiaceor.

Schizothrix Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 88; 1843. Phycol. gener. p. 230; 1845. Phycol. germ. p. 182: g. Calotrichear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 84: g. Lyngbyear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Zoospermear. dubium.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 320. n. 218: g. Scytonemear.

Schizothyrium Desmaz. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 360: nov. g. Hysteriacear. (Labrella Ptarmicae Desm.)

Schizoxylon Fries 1825. Pl. homon. p. 121: g. Xylomaceor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 87. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 240.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 35; 1842. Mycol. p. 147: g. Labrellulinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phragmotrichaceor.
= Schizoxylum Pers.

Schizoxylum Pers. 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 11. t. 10. f. 9: nov. g. inter Fungos et Lichenes ambigens. (Sch. sepincola.)
Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 55: g. Hypoxyleor. lichenoideor.
Synon. Schizoxylon Fries.

Schizymenium Mont. vid. *Schizhymenium Harv.*

Schkuhria*) Mönch 1794. Meth. p. 566: nov. g. Petalostemonis. (Siegesbeckia flosculosa L'Herit.)
= Trimeranthes Cass.

Schkuhria Roth 1797. Catal. bot. I. p. 116.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2130. n. 1504: g. Syngenes. Superfl. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 459. n. 1876.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 564; 1826. Syst. III. p. 572. n. 2784; 1831. Gen. II. p. 631. n. 3140: g. Radiatar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 261: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 495. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 17; 1827. v. 48. p. 87; 1828. v. 55. p. 263; 1830. v. 60. p. 575: g. Heleniear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2597; 1841. Nom. p. 83. n. 3180. — Spach

*) Dicat. Christ. Schkuhr, botanico Wittenberg.

Schkuhria Roth cont.
1841. Vég. phan. X. p. 17. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Link 1822. En. II. p. 339: g. Corymbiferar.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 520; 1832. Syn. p. 239: g. Galardiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 654: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2588. p. 421; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133). — Walp. 1843. Rep. II. p. 625; 1847. VI. p. 175.
Synon. Tetracarpum Mönch; Mieria La Llave & Lex.

Schlagintweitia Griseb. 1853. Abh. Gött. Ges. f. 1852. V. p. 156 (Hierac. p. 76): nov. g. Hieraciear. (Hieracium intybaceum Wulf.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 329.

Schlechtendalia Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2125. n. 1500: g. Syngenes. Superfl.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 563: g. Radiatar.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: g. Dyssodiear.
= Adenophyllum Pers.

Schlechtendalia Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 295; 1831. Gen. II. p. 601. n. 2963: g. Tiliacear.
= Mollia Mart. & Zucc.

Schlechtendalia*) Lessing 1830. Linnaea V. p. 242; 1832. Syn. Compos. p. 93: nov. g. Mutisiear. (Schl. luzulaefolia.)
Endl. 1838. Gen. p. 481. n. 2899: g. Gerberear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 2: g. Barnadesiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141). — Endl. 1841. Ench. p. 247. n. 2899. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3803. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Schlegelia Miquel 1844. Bot. Zeit. p. 785: nov. g. Crescentiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674: g. Crescentiacear.

Schleichera**) Willd. 1805. Spec. IV. p. 1096. n. 1906: nov. g. Polygam. Dioec.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 654: g. Terebinthacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 615: sect. Melicoccae. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 53.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5207: g. Cupaniear.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 275: g. Octandr. Monogyn.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 114: g. Sapindear. — Par. Meisn. 1837. Comm. p. 38. — Endl. 1840. Gen. n. 5621. p. 1072; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1846. Rep. V. p. 366. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 349 (*Sleichera*).
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7570: g. Cardiospermear.

*) Dicat. D. F. L. de Schlechtendal.
**) Dicat. J. C. Schleicher, botanico helveto.

Schleichera Willd. cont.
Blume 1847. Rumphia III. p. ... : g. Melicoccear.
Synon. Cussambium Rumph.; Koon Gärtn.; Scytalia Roxb.

Schleidenia*) Endl. 1839. Gen. n. 3750. p. 646; 1841. Ench. p. 320: g. Heliotropear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). — DC. 1845. Pr. IX. p. 557. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32: g. Heliotropiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4359. — Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 33.
Synon. Preslaea Mart.; Preslea St. Hil.

Schleidenites Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 107. n. 17: g. lignor. foss. dubiae affinitatis.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 266; 1846. Chlor. prot. p. XC: g. Leguminosar.?

Schleiteimia Desvaux vid. *Schlotheimia Brid.*

Schlerochloa Parlat. vid. *Sclerochloa Palis.*

Schlerodontium Rchb. vid. *Sclerodontium Schwägr.*

Schlimia Planch., Lind. 1852 in Paxt. fl. gard. II. Glean. n. 587: nov. g. Vandear. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 614.
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 110: g. Catasetear.

Schlosseria Mill. ex Steud. Nomencl. I. p. 390; II. p. 531.
= Coccoloba Linn.

Schlotheimia**) Brid. 1812. Muscol. rec. Suppl. II. p. 16: nov. g. Diploperistomator.
Schwägr. 1816. Suppl. I. vol. I. 2. p. 39; 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 150; 1826. vol. II. 1. p. 49: g. Muscor. (frondosor.) — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 227 (*Schleiteimia*). — Leman 1827. Dict. v. 48. p. 89. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 195. n. 3338; 1831. Gen. II. p. 736. n. 3733. (frondosor.)
Brid. 1822. Meth. musc. p. 114: g. Peristomor. acrocarpor.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 320: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII: g. Orthotrichoideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 625: g. Orthotricheor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Orthotrichoidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Endl. 1836. Gen. n. 512. p. 50; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 27.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 890: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1845. Bot. Zeit. p. 541: sect. Macromitrii.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 751: g. Orthotrichear. Sect.: Gracilaria, Acuminella,

*) Dicat. M. J. Schleiden, prof. Jenensi.
**) Dicat. E. Fr. de Schlotheim, palaeologo.

Schlotheimia Brid. cont.
Ligularia. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401; 1849. ibid. XI. p. 421. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 76.
Synon. Schizodon Swartz.

Schlotheimia Sternb. 1821. Vers. I. 2. p. 32: g. plantar. primordialium.
= Asterophyllites Brongn.

Schmalzia Desvaux Journ. bot. II. p. 170.
= Lobadium Rafin.

Schmidelea Wight vid. *Schmidelia Linn.*

Schmidelia*) Linn. 1767. Mant. p. 10. n. 1259; 1767. Syst. ed. XII. p. 274: g. Octandr. Digyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 198. n. 533. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 262. n. 672. — Pers. 1797. Syst. p. 401.
Juss. 1789. Gen. p. 247: g. Sapindor.
Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 663: g. Octandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 10: g. Saponacear.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 121: g. Sapindacear. (verar.) — Par. St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 161. 373. — Kunth 1824. Syn. III. p. 160. — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 379. — Wight 1840. Ic. pl. Ind. II. 1. p. 8 (*Schmidelea*). t. 401. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 87.
DC. 1824. Pr. I. p. 610: g. Sapindear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 222. n. 1459; 1830. Gen. I. p. 306. n. 1562. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 23. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 663. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 109. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 50. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). — Endl. 1840. Gen. n. 5605. p. 1069; 1841. Ench. p. 561. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 281. — Walp. 1842. Rep. I. p. 414; 1843. II. p. 814; 1846. V. p. 361; 1851. Ann. bot. II. p. 208. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 378.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5217; 1837. Hdb. p. 285: g. Cupaniear.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 37. t. 244.
Blume 1847. Rumphia III. p. ... : g. Allophylear. Excluditur Allophylus.
Synon. Ornitrophe Comm.; Ornithrophe Poir.; Toxicodendrum Gärtn.; Usubis Burm.; Schmiedelia Murr.; Pometia Willd.; Nassavia Fl. Flum.; Azamaza Hochst.; Kabbe Herm.

Schmidia**) Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 16. t. 1848: nov. g. Thunbergiear., Meyeniae et Hexacentridi aff. (S. bicolor.)

Schmidtia Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 217: nov. g. Petalostemonis. (Schm. fruticosa.)
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 63; 1827. v. 48. p. 91. 422. 433; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.

*) Dicat. Casim. Chr. Schmidel, prof. Erlang.
**) Dicat. Rev. Dr. Bernard Schmid.

Schmidtia Mönch cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2151 b: g. Crepidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
Less. 1832. Syn. p. 129: g. Hyoseridear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2980. p. 495; 1841. Ench. p. 249. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 86: sect. Tolpidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3681. 2. — Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 398. 403.
Synon. Aethonia D. Don; Polychaetia Tausch.

Schmidtia*) Trattinick 1811. Fl. Austr. I. p. 12. t. 451.
Sternb. 1819. Flora I. p. 1: g. Diandr. Digyn. (Char. emend.) — Par. Trin. 1820. Fund. p. 94. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 361. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 40.
Link 1821. En. I. p. 68: g. Graminum. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 123. n. 134; 1830. Gen. I. p. 33. n. 147.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 239: g. Juncear.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 673): g. Sparteor. dubiae sedis.
Link 1827. Hort. I. p. 90: g. Agrostidear.
Link 1829. Hdb. I. p. 34: g. Graminear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 125.
= Coleanthus Seid.

Schmidtia Steud. 1852 in Schmidt's Fl. Cap. Verd. Ins. p. 144; 1854. Syn. pl. glum. I. p. 199: nov. g. Pappophorear.
= Anthoschmidtia Steud.

Schmiedelia Murray 1774. Syst. p. 310; 1784. Syst. p. 375: g. Octandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 635. — Willd. 1799. Sp. II. p. 435. n. 780.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
Hedw. 1806. Gen. p. 282. n. 1134: g. Saponacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7569: g. Cardiospermear.
= Schmidelia Linn.

Schmitzomia**) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 363: g. Dermateor. (Stictis chrysophaea.) — Par. Strauss 1850. Flora Bes. Beil. p. 55 (*Schmizomeia*).

Schmizomeia Strauss vid. *praeced.*

Schnella Raddi .... Pl. bras. add. p. 32. f. 4: novum genus ab Endl. ad Caulotretum Rich. relatum.
DC. 1825. Pr. II. p. 512: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 459. — Meisn. 1837. Gen. p. 99 (71).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4127: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 133.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Bauhiniear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 572. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

*) Dicat. Willb. Schmidt, prof. Prag.
**) Dicat. mycologo Schmitz, cum terminatione *μεια*: in memoriam.

Schnittspahnia Rchb. 1841. Nomencl. p. 236: nomen pro *Kentia Bl.* (Polyalthiae sect.) propositum.

Schnittspahnia Schultz Bip. 1842. Flora II. p. 436: nov. g. Arctotear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 276.

Schnizleinia „Steud. 1824. Fl. g. mss." (Steud. Nom. II. p. 532. 720.)
= Trochiscanthes Koch.

Schnizleinia Steud. in sched. pl. Schimp. abyss. nr. 1365. *Cf.* Hochstett. in Flora 1844. p. 31.
= Hypoxis Linn.

Schobera**) Scopoli 1777. Introd. p. 158. n. 606: nov. g. Asperifoliar. (Heliotropium angiospermum Murr.)
Neck. 1790. El. I. p. 278. n. 439 (*Schöbera*): g. Trachytophytor.
= Heliophytum DC.

Schoberia C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 395 (Ic. I. t. 44): nov. g. Salsolear. (Suaeda physophora Pall.) — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 582. — Koch 1837. Syn. p. 602. Ed. II. p. 692.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4341: g. Chenopodear. — Par. Moq.-Tand. 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 321. (restrict. — Sch. corniculata.)
Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 216; 1840. Chenop. en. p. 132: g. Suaedinear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1942. p. 298; 1841. Ench. p. 182. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Schoberiear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 165.
Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6395: g. Suaedear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Spirolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 790: g. Schanginiear.

Schoberia Nees jun. . . . . Gen. Fasc. VII. t. 11.
= Chenopodina Moq.

Schoberieae Rchb. 1837. Handb. p. 239: sect. Salsolear. Gen.: Schoberia, Schanginia.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 159: subtrib. Suaedear. Gen.: Chenopodina, Schoberia, Brezia, Calvelia.

Schöbera Necker vid. *Schobera Scop.*

Schoenanthum Micheli 1729. Nov. gen. p. 35: g. pl. class. XIVa (non descriptum).

Schoenanthus „Scheuchz. p. 118" Adans. 1763. Fam. II. p. 38: g. Sorgor. (= Ischaemum Linn.)
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 279: sect. Andropogonis.

Schoenaxyphium Endl. Ench. p. 63: vid. *Schoenoxiphium Nees.*

Schoeneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: trib. Cyperidear. Gen.: Cladium, Schoenus, Rhynchospora, Nomochloa.
Rchb. 1837. Hdb. p. 147: subdiv. Cyperinear.

*) Dicat. Gottl. Schober, medico, peregrinatori.

Schoeneae Dumort. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 12: trib. Cyperacear. Gen.: Cladium, Schoenus, Chaetospora, Rhynchospora. — Par. Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271.

Schönefeldia Kunth 1830. Gram. p. 86. t. 53; 1833. Agrost. p. 258: nov. g. Chloridear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 795 (*Schönfeldia*). — Par. Endl. 1837. Gen. n. 835. p. 92; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 329. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1310. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Steud. 1854. Glum. I. p. 202.
Trin. 1841. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV (1845.) Bot. p. 268: g. Agrosteor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.

Schönfeldia Wittst. vid. *praeced.*

Schönia*) Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 480: nov. g. Helichrysear. (Helipterum Cassinianum DC.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 243.
F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 415: sect. Pteropogonis.

Schoenidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 119: trib. Rhynchosporear. Gen. Schoenoidear. Endl. et Psilocarya, Astroschoenus, Ptilochaeta, Zosterospermum, Chapelliera.

Schoenidium Nees 1834. Linnaea IX. p. 291; 1835. ibid. X. p. 166: nov. g. Scirpear. (Schoenus lateralis Vahl.)
= Ficinia Schrad.

Schönleinia Klotzsch . . . (ubi?)
= Ponthieva R. Brown. (Lindl.)

Schönleinia „Klotzsch 1846 in Hayne Arzneigew. XIV. adnot. ad tab. 15" Walp. 1847. Rep. VI. p. 70: nov. g. Eucinchonear.

Schoenobiblos Endl. 1838. Gen. p. 330; 1841. Ench. p. 208; 1847. Spl. IV. p. 69. n. $2106/_{12}$: g. dubium Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2434.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436: g. Thymelear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
= seq.

Schoenobiblus**) Martius 1824. Nov. gen. I. p. 65: nov. g. Thymelaear. (Sch. daphnoides.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 115.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1782: g. Daphnear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242). — C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 355. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 519. (isostemonear.)
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 65: g. Thymelaeacear.
Synon. Schoenobiblos Endl.

Schoenocaulon Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1147 *b*: sect. Eriocaulonis.

Schoenocaulon***) A. Gray 1837. Ann. Lyc. New-York IV. p. 127: nov. g. Me-

*) Dicat. Dr. Joh. Matth. Albr. Schön, Hamburg.
**) βίβλος, cortex, liber.
***) σχοῖνος, funis, juncus; καυλός, scapus.

Schoenocaulon A. Gray cont.
lanthear. (Sch. gracile.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1690.
Benth. 1840. Pl. Hartw. p. 29. 96 (*Schaenocaulon*): g. Melanthacear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1066/$_1$. p. 1357; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 185. Distinguitur Asagraea. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.
Synon. Asagraea Lindl.? *Conf.* Sabadilla Brandt & Ratz.

Schoenocephalium Seubert 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 130: nov. g. Rapateacear.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 880: g. Rapatear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 313 (*Schoenocephalum*).

Schoenocephalum Steud. vid. *praeced.*

Schoenodon Steud. vid. *Schoenodum Labill.*

Schoenodoros „Palis." Wittstein vid. *Schenodorus Palis.*

Schoenodorus Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 42. n. 341: g. Graminear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 79. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 371.
Link 1827. Hort. I. p. 171: g. Glycerinar.
= Schedonorus Palis.

Schoenodorus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 447: sect. Bromi. (B. asper, erectus, inermis.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 419.
Parlat. 1845. Palerm. I. p. 201: sect. Festucae.
Synon. Bromi sect. 3 Koch.

Schoenodum Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 80. t. 229. (excl. pl. masc.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 631. n. 2284: g. Dioec. Monadelph.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 271; 1827. v. 48. p. 94: g. Restiacear. — Par. Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. — Kunth 1841. Enum. III. p. 445. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Endl. 1842. Spl. II. p. 10. n. 1008/$_1$. — Steud. 1855. Glum. II. p. 256 (*Schoenodon*).
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Restionear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139.
Synon. Leptocarpi sp. R. Brown.

Schoenoideae Endl. 1837. Gen. p. 114; 1841. Ench. p. 64: subdiv. Rhynchosporear. Gen.: Spermodon, Dichromena, Elynanthus, Schoenus, Remirea. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 10) Gymnoschoenus, Isoschoenus. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 40. Gen. ead.

Schoenolaena Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 289: nov. g. Hydrocotylear., Xanthosiae proximum. (Sch. juncea.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 841. — Endl. 1850. Spl. V. p. 1. n. 4363/$_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778 (*Schaenolaena*): g. Hydrocotylidar.

Schoenoprasum HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 277: nov. g. Asphodelear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 283.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 1025: sect. Allii. — Par. Koch 1837. Syn. p. 720. Ed. II. p. 832. — Endl. 1837. Gen. n. 1137 *d.* p. 147; 1841. Ench. p. 84. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 391. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 245. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 166. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 201.
= Cepa Tourn. pt.

Schoenopsis Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 22 et Schult. 1824. Mant. II. p. 5): nov. g. Cyperear. (Cladii sp. R. Br.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1098.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 298: g. Cladiear. (1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 81 Schoeno injunctum.)
= Schoenus Linn.

Schoenorchis Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1823. I. p. 102: nov. g. Gynandr.
Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 4: g. Orchidear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 361.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1575.
Lindl. 1833. Orchid. p. 243: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1494. p. 206; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2099. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Blume 1848. Rumphia IV. p. 51. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 571. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 694.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.?

Schoenoxiphium Nees 1832. Linnaea VII. p. 531: nov. g. Scleriear. (Schoenus lanceus Thunb.)
Nees 1834. Linnaea IX. p. 305 (*Schoenoxyphium*): g. Caricear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 959. p. 111 (*Schoenoxyphium*); 1841. Ench. p. 63 (*Schoenaxyphium*). — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1438 (*Schoenoxyph.*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147 (*Schoenoxyph.*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119 (*Schoenoxyphium*).
Kunth 1837. Cyper. p. 528 (Wiegm. Arch. II. p. 352. t. 6): g. Caricinear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). — Steud. 1855. Glum. II. p. 245.

Schoenoxyphium Nees 1834, Endl., Rchb., Spach, Lindl. vid. *praeced.*

Schoenus*) Linn. 1737. Coroll. p. 2. n. 940; 1737. Cliff. p. 22; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 24. n. 52; 1753. Sp. I. p. 42; 1759. Syst. ed. X. p. 865. n. 60; 1762. Sp. ed. II. p. 62; 1764. Gen. ed. VI. p. 29. n. 65; 1767. Syst. ed. XII. p. 80: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 81; 1784. Syst. p. 95. — Reich. 1778. Gen. p. 30. n. 71. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 41. n. 92. — Lour. 1790. Coch. I. p. 41. — Gmel. 1791. Syst. p. 135. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 16; 1818. Fl.

*) σχοῖνος Veterum.

Schoenus Linn. cont.
cap. I. p. 345. — Pers. 1797. Syst. p. 96; 1805. Ench. I. p. 58. n. 121. — Willd. 1797. Sp. I. p. 259. n. 111. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 19; III. 2. t. 1 (compressus). — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 110. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 448. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 189; ed. 1832. I. p. 184.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 251: g. Graminibus adfine.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 12. n. 42: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Calamariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 129. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 21.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 396 (*Schaenus*).
Scop. 1777. Intr. p. 79: g. Graminum. (spurior.) — Par. Host 1805. Gram. Austr. III. p. 37. t. 53. 54.
Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 91.
Neck. 1790. El. III. p. 243. n. 1631: g. Chortodiphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear.
Cram. 1803. Disp. p. 13 in Diandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 65: g. Cyperacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 142. — Hedw. 1806. Gen. p. 33. 360. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 64. 100. Sect.: Schoenus, Rhynchospora.
= Schoenus et Rynchospora Vahl.

Schoenus Scopoli 1772. Fl. Carn. I. p. 40: g. Triandr. Monogyn. (Sch. albus.)
= Rynchospora Vahl.

Schoenus Vahl 1806. Enum. II. p. 207. n. 112: g. sejuncta Rynchospora restrictum Triandr. Monogyn. — Par. Willd. 1809. En. p. 71. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 33.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 231. Ed. Nees p. 87: g. Cyperacear. (Disjungitur Chaetospora.) — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153. (verar.) — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 1. 59. n. 169. — Lois. 1817. Dict. v. 9. p. 55 (*Choin*). — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 72. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 188. n. 215. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 62. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 108 (*Schaenus*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 184. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 419.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 227: g. Scirpear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 156.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 35: g. Scirpinar.
Link 1821. En. I. p. 41; 1827. Hort. I. p. 277; 1829. Hdb. I. p. 98: g. Cyperoidear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Cyperear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 74. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 48. n. 224. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 119. — Schrad. 1832. Comm. Gott. VII. p. 124. — Koch 1837. Syn. p. 737. Ed. II. p. 850. — Math. 1853. Belg. I. p. 581 (*Schaenus*). — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 363.
Gaud. 1828. Helv. I. p. 100: sect. Schoeni.

Schoenus Vahl cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: g. Schoenear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 12.
Endl. 1837. Gen. n. 978. p. 114; 1841. Ench. p. 64: g. Schoenoidear. Sect.: Schoenus, Gussonea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1460. Sect. eaed.
Kunth 1837. Cyper. p. 334: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Steud. 1855. Glum. II. p. 165. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 341.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.
Nees 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 81: g. Cladiear. Injungitur Schoenopsis.

Schoenus Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 22 et Schult. 1824. Mant. II. p. 5): g. Cyperear. restrict. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1097.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 298: g. Cladiear.
Endl. 1837. Gen. n. 978 *b*. p. 114; 1841. Ench. p. 64: sect. Schoeni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1460. 1.
Synon. Torulinium Desv.; Schoenopsis Lestib.?

Schöpfia*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 129. n. 323: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 376. — Willd. 1797. Sp. I. p. 996. n. 367. — Hedw. 1806. Gen. p. 142. n. 612. (*Cf.* A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 245.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 620; 1825. Syst. I. p. 738. n. 790; 1830. Gen. I. p. 170. n. 857: g. Caprifolior. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 760.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. VIII. 160. n. 881: g. Loranthear., ad Caprifolia accedens.
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1979: g. Lonicerear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Loranthidear.
DC. .... Mém. Loranth. VI. p. 23; 1830. Pr. IV. p. 319: g. Loranthacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 432. (terrestrium.) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 444. (?)
Bartl. 1830. Ord. p. 160: g. Styracear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 417.
Meisn. 1839. Comm. p. 157: g. Styracinar.?
Endl. 1839. Gen. p. 744. n. 4260: g. Symplocear. Sect.: Codonium, Schöpfia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5284. Sect. eaed.
Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 678; 1841. Ann. and Mag. VII. p. 215: g. Olacear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 83. n. 5492/1.
Endl. 1841. Ench. p. 399. n. 4587/1: g. Loranthaceis aff. Sect.: Codonium, Schöpfia.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 175: g. Schöpfiacear.

*) Dicat. Joh. Dav. Schöpf, peregrinatori.

Schöpfia Schreb. cont.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 622: g. Olacacear. Char. emend.
Synon. Codonium Vahl; Hänkea Ruiz & Pav. Fl. peruv. III. t. 281; Diplocalyx A. Rich.? (Planch. in Ann. sc. nat. 1854. II. p. 261.)
Schöpfia Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 188: g. Pentandr. Monogyn. restrict. (Sch. fragrans.)
D. Don 1825. Nepal. p. 145: g. Symplocinear.
Endl. 1839. Gen. p. 745. n. 4260 *b;* 1841. Ench. p. 399. n. 4587/1 *b*: sect. Schöpfiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5284. 2.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 11. 21: g. Olacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444.
Schöpfiaceae Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 11. p. 175: fam. (ab Arnott teste Meisner jam indicata) Santalaceis et Olacineis aff. Gen.: Schöpfia. *Cf.* Griseb. 1851. Arch. f. Naturg. II. p. 378.
Schollera*) Roth 1788. Fl. germ. I. p. 170; 1789. II. p. 442: nov. g. Octandr. Monogyn. (Vaccinium Oxycoccos.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 622.
= Oxycoccus Tourn.
Schollera Schreb. 1791. Gen. II. p. 785. n. 1711: g. Triandr. Monogyn. *Cf.* Willd. in Berl. Verh. III. p. 438.
= Leptanthus Rich.
Schollera Rohr & Vahl 1792. Danske Nat. Selsk. Skrivt. II. 1. p. 210: nov. g. plant.
= Microtea Swartz.
Schollia Jacq. f. 1811. Eclog. p. 2.
= Hoya R. Brown.
Schollia Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5038. 1: sect. Hoyae. (*Wattahaka Endl.*)
= Wattakaka Hassk.
Scholtzia**) Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 241: nov. g. Bäckear. (Bäckea obovata DC.)
Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 109: g. Bäckeear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 736.
Synon. Pritzelia Schauer.
Schomburghia DC., Spach vid. *Schomburgkia DC.*
Schomburgkia Lindl. 1838. Sert. Orchid. t. 10. 13. (Bot. Mag. t. 3729.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 1371/1. p. 1362; 1841. Ench. p. 110: g. Epidendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1965. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.
Schomburgkia***) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 293 (*Schomburghia*): nov. g. Euhelenicar. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18 (*Schomburghia*): g. Helenicar.
= Geissopappus Benth.
Schootia Batsch vid. *Schotia Jacq.*

*) Dicat. F. A. Scholler, botanico Barbyensi.
**) Dicat. Dr. Henr. Scholtz, Wratislaw.
***) Dicat. peregrinatori guianensi Schomburgk.

Schorigeram Adans. 1763. Fam. II. p. 355: g. Tithymalor.
= Tragia Plum.
Schotia*) Jacq. 1786. Collect. I. p. 93.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 279. n. 705: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 673. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 79; 1798. Nov. gen. IX. p. 129 (*Scotia*). — Willd. 1799. Sp. II. p. 537. n. 818; 1809. En. p. 445.
Juss. 1789. Gen. p. 347: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 370. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 204. — Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1033. — Hedw. 1806. Gen. p. 304. n. 1207. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 768 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 326. n. 1593; 1831. Gen. II. p. 546. n. 2674. — Link 1821. En. I. p. 409. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 97.
Gis. 1792. Prael. p. 429: g. Lomentacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 97 (*Schootia*).
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 507. Sect.: Schotia, Schotiaria, Omphalobioides. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 454. Sect. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70).
Spreng. 1827. Cur. post. p. 247: g. Monadelph. Decandr.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4132: g. Caesalpinicar. Sect. ut DC. (Schottiaria.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6785. p. 1316; 1841. Ench. p. 674. Sect.: Theodorea, Omphalobioides. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6087. Sect.: Schotia, Omphalolobia. — Brongn. 1843. En. genr. p. 132 (*Schottia*).
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 539.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 844. Sect.: Theodora, Omphalobium. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Schotia DC. 1825. Prodr. II. p. 508: sect. Schotiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4132 *a*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 455.
= Theodora Medic.
Schotia Ecklon & Zeyh. 1836. Enum. pl. Afr. austr. II. p. 261: g. Cassiear. restrict. (Omphalobium Schotia Jacq. f.) — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 92.
= Omphalobioides DC.
Schotiaria DC. 1825. Prodr. II. p. 508: sect. Schotiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4132 *b* (*Schottiaria*). — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 455.
Schottia Brongn. vid. *Schotia Jacq.*
Schottiaria Rchb. vid. *Schotiaria DC.*
Schousboa Spreng., Dietr. vid. *seq.*
Schousboea**) Willd. 1799. Spec. II. p. 578. n. 857: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 705 (*Schousboa*): g. Onagrar. desciscent.

*) Dicat. Rich. van der Schot, Jacquini itinerum socio.
**) Dicat. P. K. A. Schousboe, botanico danico.

Schousboea Willd. cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 332. n. 1621 (*Schousboa*); 1830. Gen. I. p. 357. n. 1805: g. Combretear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1472 (*Schousboa*): g. Combretacear.
= Cacoucia Aubl.

Schousboea Schumacher 1827. Beskriv. Guin. pl. p. 449; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 223: nov. g. plant. (Sch. cordifolia.)
Endl. 1841. Gen. n. 6855. p. 1329; 1841. Ench. p. 685: inter genera apetala minus nota.
Meisn. 1842. Comm. p. 256: g. Juliflorar.?

Schoutenia Korthals 1848 in De Vriese Nederl. kruidk. Arch. I. p. 313; 1855. Retzia I. p. 135: nov. g. Dombeyacear. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 168. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 327. — Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 113.
= Actinophora Wall.? (Planch. in Ann. sc. nat. 1854. II. p. 260.)

Schoutensia Endl. 1833. Fl. Norfolk. p. 79 in adnot. ad Hartighseam: nov. g. Meliacear., pro Trichilia monophylla A. Rich. indicatum.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 104: sect. Macrochitonis?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 441: g. Pittosporacear.
= Synoum A. Juss.

Schouwia*) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 643; 1824. Prodr. I. p. 224: nov. g. Psychinear. (Subularia purpurea Forsk.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 183. n. 4755; 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6943. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 255. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4962. p. 885; 1841. Ench. p. 451. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 101: g. Cruciferar.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Psychidar.
Jaub. & Spach 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 364. (Monogr.)

Schouwia Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. p. 717: nov. g. Malvacear., Achaniae et Urenae aff. (S. semiserrata.)
= Göthea Nees & Mart.

Schradera**) Vahl 1796. Eclog. I. p. 35. t. 5.
Willd. 1799. Sp. II. p. 238. n. 685: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 103. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XVII. 164.
Cram. 1803. Disp. p. 55 in Pentandr. Monogyn. (capitata et p. 88 in Octandr. Monogyn.) — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 117. n. 514 (et p. 171. n. 720).
Pers. 1805. Ench. I. p. 201. n. 448: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 403.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 619; 1825. Syst. II. p. 127. n. 1314; 1830. Gen. I. p. 244.

*) Dicat. Joach. Fr. Schouw, prof. Hafniensi.
**) Dicat. Henr. Ad. Schrader, prof. Gotting.

Schradera Vahl cont.
n. 1275: g. Caprifolior. Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1052.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Allodiniae.
Tratt. 1825. Gen. nov. pl. I. n. 4: g. Caprifoliacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 214.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI; 1828. Consp. p. 92. n. 1943: g. Schraderear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 229: g. Hameliacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 443: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 542. — Endl. 1838. Gen. n. 3230. p. 547; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2927. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 51.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.
Synon. Fuchsia Swartz; Urceolaria Willd.

Schradera Willd. 1797 in Gött. Journ. Wiss. I. 1: g. Euphorbiar. (S. scandens.) *Cf.* Römer Arch. I. 3. p. 131 et Steud. Nomencl. I. p. 447; II. p. 535.
= Croton trilobatum W.

Schradereae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXXI: div. Rubiacear. Gen.: Morinda, Cephalanthus, Nauclea, Adina, Schradera.
Rchb. 1828. Consp. p. 92: subdiv. Dipsacear. Gen. ead. et Acrodryon; Cornus.

Schraderia „Heist." Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 40: nov. g. ex typo Salviae coloratae L.
Mönch 1794. Meth. p. 378: g. Petalostemonis. (Salvia canariensis L.)
= Hymenosphace Benth.

Schranckia „Scop. Introd. g. 1334" Gmel. 1791. Syst. p. 515: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXVIII. 736.
= Goupia Aubl.? (Steud.)

Schranckia Spach 1834. Hist. vég. phan. I. p. 49: g. Mimosear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 133.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 413: g. Gymnantherar. Sect.: Rhodostachya, Euschranckia. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 883. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.
= Schrankia Willd.

Schrankia Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 42; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 39: nov. g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen* — Myagrum rugosum L.)
Mönch 1794. Meth. p. 263: g. Thalamostemonis.
= Rapistrum Boerh.

Schrankia*) Willd. 1805. Spec. IV. p. 1041. n. 1900: g. Polygam. Monoec.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 81: g. Monadelph. Decandr. — Par. Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 158.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 771; 1825. Syst. II. p. 207. n. 1416: g. Leguminosar. (ano-

*) Dicat. Franc. de Paula Schrank, botan. tandem Monacensi.

Schrankia Willd. cont.
mal.) — Par. Link 1822. En. II. p. 441. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 104.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Mimosear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 260. — Kunth 1825. Syst. IV. p. 8. — DC. 1825. Pr. II. p. 443. — Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4165. (genuinar.) — Spreng. 1830. Gen. I. p. 301. n. 1543. (Octandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 397. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 400.
Endl. 1841. Gen. n. 6829. p. 1325; 1841. Ench. p. 682: g. Acaciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6126.
Walp. 1846. Rep. V. p. 585: g. Gymnantherear.
Synon. Schranckia Spach, Benth.; Phyllodoce Link?

Schrebera*) Linn. 1763. Spec. ed. II. p. 1662; 1764. Gen. ed. VI. p. 124. n. 319; 1767. Syst. ed. XII. p. 198. n. 316: g. Pentandr. Digyn.**) — Par. Schreb. 1770. Nov. Act. Ups. I. p. 91. t. 5. f. 1; 1789. Gen. I. p. 174. n. 446. — Murr. 1774. Syst. p. 220; 1784. Syst. p. 265. — Reich. 1778. Gen. p. 129. n. 348. — Gmel. 1791. Syst. p. 458. — Pers. 1797. Syst. p. 279. (Schr. schinoides.)
Gled. 1764. Syst. p. 211. n. 880: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 379: g. Rhamnor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 70.
Neck. 1790. El. II. p. 35. n. 665: g. Darinyphytor.
= Cuscutina Pfeiff.?

Schrebera Retz. 1791. Observ. bot. VI. p. 25. t. 3: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Schr. albens.) — Par. Pers. 1797. Syst. p. 279 adnot. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1092. n. 404.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 268: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 156. n. 667. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 662.
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Evonymear. (*Synon. Elaeodendron Wight & Arn.*, non *Jacq.*), serius (Comm. p. 348) ad Elaeodendron Jacq. reductum.
= Elaeodendron Jacq.

Schrebera Thunb. 1794. Prodr. fl. cap. p. 28. t. 2; 1818. Fl. cap. I. p. 519: g. Tetrandr. Monogyn. (Schreb. schinoides.)
= Hartogia Linn. f.

Schrebera Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 1. t. 101; 1820. Fl. Ind. ed. Wall. I. p. 109; ed. 1832. I. p. 108: nov. g. Diandr. Monogyn. (Sch. swietenioides.) *Cf.* Schrad. Journ. I. 1800. p. 346. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 7. n. 31. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 52. 76. n. 54. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 38. n. 67.

*) Dicat. Joh. Chr. Dan. de Schreber, Erlang.
**) Ex observatione cel. Vahlii ex herbario Linnaeano petita hocce genus ex flore Cuscutae cujusdam africanae et fructu Myricae conflatum esset: Retz. Observ. bot. VI. p. 15. *Cf.* Pers. Syst. p. 279 adnot.

Schrebera Roxb. cont.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 200: g. Oleinear.
Tratt. 1825. Gen. nov. pl. I. p. 21. t. 39: g. Jasminear. *Cf.* Flora 1825. II. p. 761. — Par. Fenzl 1841. Regensb. Denkschr. III. p. 246. — Endl. 1842. Spl. II. p. 54. n. 3343. — Meisn. 1843. Comm. p. 365. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 674.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3254: g. Bignoniear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 25. n. 104. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 231. — DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123 (minus notum). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 139. (?)
Bartl. 1830. Ord. p. 186: g. Bignoniacear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 714. n. 4130 (dubium). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 100. — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4569.
Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207): g. Eubignoniear.?
Endl. 1841. Ench. p. 287. n. $3356/_1$: g. Fraxinear.

Schreiberia Steud. Nom. II. p. 535: vid. *seq.*

Schreibersia*) Pohl 1825. Flora I. p. 183: nov. g. plant.
Endl. 1838. Gen. n. 3259. p. 553; 1841. Ench. p. 274: g. Rondeletiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2895.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Augusta Pohl; Augustea DC.; Bonifacia Manso. (ex Steud.)

Schrenkia**) Fisch. & Meyer 1841 in Schrenk En. pl. nov. p. 64: nov. g. Coriandrear. (Cachrys vaginata Ledeb.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 381. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 106. n. $4546/_1$ (sph. *Sckrenkia*). — Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Walp. 1843. Rep. II. p. 427. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 366.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Coriandridar.

Schubertia Mirbel 1812. Bull. soc. philom. Août p. 121: nov. g. Coniferar. (Cupressus disticha L.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 106. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 890. n. 3152; 1831. Gen. II. p. 700. n. 3534. (Monoec. Monadelph.)
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1723: g. Cupressinar.
Rchb. 1829 ap. Mössl. III. p. 1715: sect. Cupressi.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 347: g. Cupressinear.
= Taxodium Rich.

Schubertia***) Mart. & Zuccar. 1824. Nov. gen. I. p. 55. t. 33: nov. g. Asclepiadear. (Cynanchum longiflorum Jacq. et Sch. multiflora.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3440 *b*: sect. Cynanchi.

*) Dicat. Car. N. J. de Schreibers, Vindobonensi.
**) Dicat. Alex. Schrenk, botanico Petropolit.
***) Dicat. H. G. Schubert, prof. Erlangensi.

Schubertia Mart. & Zuccar. cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 148: g. Asclepiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3450. p. 590; 1841. Ench. p. 298: g. Metastelmear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5002.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.
Dcne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear.
Dcne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 534: g. Cynoctonar.
Synon. Pentaphragma Zucc.?

Schubertia Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 884: nov. g. Umbelliferar., Eryngio aff.
= Horsfieldia Blume.

Schubleria G. Don, Griseb. vid. *Schübleria Mart.*

Schüblera Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3478: g. Chironiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 200: g. Gentianear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 210: g. Sebaeariar.
= Schübleria Mart.

Schübleria*) Martius 1827. Nov. gen. II. p. 113. t. 186—188: nov. g. Gentianear. *Cf.* Flora 1827. I. p. 375. — Par. Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 37. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 201 (*Schubleria*): g. Coutoubear.
Endl. 1838. Gen. n. 3560. p. 605; 1841. Ench. p. 303: g. Sebaeear.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 160; 1845 in DC. Pr. IX. p. 55 (*Schubleria*): g. Erythraeacear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5127: g. Sebaeariar.
Synon. Schüblera Rchb.; Curtia Cham. & Schltd.; Thurnheissera Pohl; Thurnhausera Steud.; Apophragma Griseb.?

Schüchia Endl. 1840. Gen. n. 6070. p. 1178; 1841. Ench. p. 630: nov. g. Vochysiacear. (Qualea ecalcarata Mart. & Zucc.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 663.
Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6590: g. Vochysiear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 355.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 380: g. Vochyacear.

Schuermannia**) F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 386: nov. g. Myrtacear., Homorantho proximum. (Sch. homoranthoides.)

Schufia***) Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 411: nov. g. Fuchsiear. (Fuchsia arborescens Sims.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6577.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 177: g. Fuchsinear.
Endl. 1840. Gen. n. 6125 *b* ε. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: subsect. Fuchsiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 95.

*) Dicat. Gust. Schübler, prof. botan. Tubing.
**) Dicat. C. W. Schuermann.
***) Anagramma nominis Fuchsia.

Schultesia*) Spreng. 1815. Pugill. II. p. 17; 1817. Anleit. II. 1. p. 169: g. Chloridear. (*Eustachys Desv.*)
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 107 (*Schultezia*): g. Graminear.
= Eustachys Desv.

Schultesia Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. p. 708: nov. g. Amarantacear. (Sch. capitata.)
= Gomphrenae sect. Wadapus.

Schultesia Roth 1827. Enum. p. 1.
= Aikinia Salisb.

Schultesia Martius 1827. Nov. gen. II. p. 103. t. 180—182: nov. g. Gentianear. *Cf.* Flora 1827. I. p. 374. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 35. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 196. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3481: g. Chironiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3549. p. 603; 1841. Ench. p. 302.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5098: g. Erythraeariar.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 126: g. Chlorear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 4.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 67: g. Erythraeacear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 502.

Schultezia Juss. vid. *Schultesia Spreng.*

Schulthesia Raddi 1823. Mem. di Modena XIX. p. 34; 1827. ibid. XX. t. 2. f. 2: nov. g. Hepaticar.
= Porella Dill.

Schultzia Rafin. 1808. N. York med. repos. II. Hexad. V. p. 350: nov. g. Didynam. Angiosperm. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 107. (*Vid. Shultzia Rafin.*)
Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3052: g. Orobanchear.
= Obolaria Linn.

Schultzia**) Spreng. 1813. Prodr. Umbell. p. 30 (*Schulzia?*); 1818. Umbell. sp. p. 102: nov. g. Umbelliferar. (Sison crinitum Pall.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 108. — Par. Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 99. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 639 (*Schulzia*); 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIV. 527; 1825. Syst. I. p. 531. 904. n. 1075: g. Scandicinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 141. n. 3661: g. Scandicinear. — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 343 (*Schulzia*).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 225. n. 1176: g. Amminar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 112: g. Amminear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 286. — Rchb. 1837. Hdb. p. 219 (genuinar.); 1841. Nom. p. 140. n. 5388. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4403. p. 770; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 257. — Walp. 1846. Rep. V. p. 850.

*) Dicat. Jos. Aug. Schultes, prof. tandem Landishut.
**) Dicat. Car. Fr. Schultz, flor. Stargard. auctori.

Schultzia Spreng. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Schultzia Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 63: nov. g. Acanthear.
= Herpetacanthus Nees.

Schulzia Spreng., Tausch vid. *Schultzia Spreng.*

Schumacheria*) Vahl 1810 in Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 122: nov. g. plant. (Sch. castaneifolia.)
Arnott 1834. Edinb. n. phil. journ. XVI. p. 315: g. Dilleniacear. Char. reform.
Endl. 1839. Gen. p. 841. n. 4751: g. Dillenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Endl. 1841. Ench. p. 431: g. Dilleniear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 64. — Meisn. 1843. Comm. p. 339. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 65. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 35.
Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7277: g. Hibbertiear. genuinar.
Synon. Pleurodesmia Arn.

Schumacheria Spreng. 1830. Gen. I. p. 232. n. 1221: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1008.
= Wormskioldia Schum.

Schunda-Pana Rheede 1678. Hort. Malab. p. 15. t. 11.
Adans. 1763. Fam. II. p. 24: g. Palmar.
= Caryota Linn.

Schuurmansia**) Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 12. p. 177: nov. g. Sauvagesiear., Luxemburgiae aff. (Sch. elegans.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 68.

Schwabea***) Endl. 1839. Nov. stirp. Mus. Vindob. dec. I. p. 80; 1841. Gen. Suppl. I. n. 4072/2. p. 1405; 1841. Ench. p. 343: nov. g. Acanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4230. (genuinar.)
Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202): g. Russeggerear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 596: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Acanthidar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 383: g. Gendarussear.
Synon. Pogonospermum Hochst.

Schwägerichenia Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 108 (= Argolasia): vid. *seq.*

Schwägrichenia†) Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 240; 1825. Syst. II. p. 26. n. 1175; 1830. Gen. I. p. 279. n. 1446: g. Haemodorear. (Anigozanthos rufa Labill.) — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 171.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Dilatridear.
= Anigosanthus Labill.

Schwägrichenia Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3846; 1841. Nom. p. 145. n. 5644: g. Burserear.
= Hedwigia Swartz.

Schwalbea††) Linn. 1737. Gen. p. 188. n. 522; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 291. n. 608; 1753. Sp. II. p. 606; 1759. Syst. ed. X. p. 1108. n. 662; 1763. Sp. ed. II. p. 844; 1764. Gen. ed. VI. p. 306. n. 744; 1767. Syst. ed. XII. p. 406: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 461; 1784. Syst. p. 551. — Reich. 1778. Gen. p. 308. n. 802. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 402. n. 1001. — Gmel. 1791. Syst. p. 925. — Pers. 1797. Syst. p. 587; 1807. Ench. II. p. 167. n. 1495. — Willd. 1800. Sp. III. p. 201. n. 1135. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 54.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 175. n. 714: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat. (*Swalbea*): g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 177. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 359. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 282. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 99 (*Schoualbée*).
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 220: g. Verbenar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 259. t. 55. f. 3 (americana).
Juss. 1789. Gen. p. 123: g. Scrophulariis aff.
Neck. 1790. El. I. p. 350. n. 547: g. Chasmatophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 397; 1825. Syst. II. p. 808. n. 2184; 1831. Gen. II. p. 493. n. 2429: g. Scrofularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3169: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6: g. Rhinanthear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4007. p. 692; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 312 (222). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 543. — Walp. 1845. Rep. III. p. 397. 971.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 616: g. Castillejiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4467: g. Pedicularinar.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 537: g. Schwalbear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.

Schwalbeae Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 526: sect. Euphrasiear. Gen.: Schwalbea, Siphonostegia, Synnema.

Schwannia*) Endl. 1840. Gen. n. 5563. p. 1058; 1841. Ench. p. 557; 1842. Spl. II. p. 83: g. Meiostemonum.
Rchb. 1841. Nom. p. 266. n. 7841: g. Gaudichaudiear. — Par. A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 605. t. 22. Sect.: Wannschia, Schwannia. — Walp. 1846. Rep. V. p. 353. Sect. eaed. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 101.
Meisn. 1843. Comm. p. 346: g. Hiptagear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Gaudichaudear.
Synon. Fimbriaria A. Juss.

---

*) Dicat. Christ. Fr. Schumacher, prof. Hafn.
**) Dicat. Jac. Schuurmans Stekhoven, hortul. botan. Lugd.
***) Dicat. S. H. Schwabe, botanico Dessauensi.
†) Dicat. Chr. Fr. Schwägrichen, prof. Lipsiensi.
††) Dicat. Chr. G. Schwalbe, medico, scriptori de cortice Chinae.

*) Dicat. Theod. Schwann, medico Bonnensi.

Schwannia A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 611: sect. Schwanniae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 353.

Schwarzia Flor. Flum. V. t. 84.
= Norantea Aubl.

Schweickerta Gmel. vid. *Schweyckerta Gmel.*

Schweiggera Martius 1829. Nov. gen. III. p. 166. t. 297: nov. g. Guttiferar. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 799 (*Schweiggeria*).
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 316: g. Garciniear.
= Renggeria Meisn.

Schweiggera Spach vid. *seq.*

Schweiggeria*) Spreng. 1821. Neue Entdeck. II. p. 167: nov. g. Ionidior.
Schult. f. 1822. Mant. II. p. 23: g. Monandr. Monogyn.
St. Hil. 1824. Pl. remarq. Bras. I. p. 281. t. 126. f. 6; 1829. Fl. Bras. II. p. 137: g. Violacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 89.
DC. 1828. Pr. III. p. 30: g. Vochysiear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4516. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 672. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 320 (*Schweiggera*).
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 319: g. Violear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18). — Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 186. n. 7140. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 5044. p. 910; 1841. Ench. p. 471. — Walp. 1842. Rep. I. p. 223. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339.
Synon. Glossarrhen Mart.

Schweiggeria Wittst. vid. *Schweiggera Mart.*

Schweinitzia**) „Elliott" Nuttall 1818. Gen. Am. II. Add. p. 270: nov. g. Monotropear. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 109. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 867. — Rchb. 1837. Hdb. p. 206; 1841. Nom. p. 125. n. 4874. — Meisn. 1839. Gen. p. 248 (156). — DC. 1839. Pr. VII. p. 780. — Endl. 1839. Gen. n. 4354. p. 761; 1841. Ench. p. 375. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 445. — A. Gray 1848. Mem. Am. Ac. n. ser. III. t. 2 (Flora 1849. p. 693); Chlor. Bor. Am. I. p. 15. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1125 (*Schweinizia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3368: g. Pyrolear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 452: g. Monotropacear.
Synon. Monotropsis Schwein.

Schweinitzia Greville .... Edinb. n. phil. journ. XVI. p. 258. t. 6.
= Podaxon Fries.

Schweinizia Walp. vid. *Schweinitzia Ell.*

Schwenchia Necker vid. *Schwenkia Linn.*

Schwenckia Vahl Enum., Röm. & Schult., Spreng. Syst. et Rchb. Consp.: vid. *Schwenkia Linn.*

Schwenkfelda***) Schreb. 1789. Gen. I. p. 123. n. 306: g. Pentandr. Monogyn. —

*) Dicat. Aug. Frid. Schweigger, prof. Regiomont.
**) Dicat. L. Dav. de Schweinitz, missionario, botanico.
***) Dicat. Casp. Schwenkfeld, Gryphimontano.

Schwenkfelda Schreb. cont.
Par. Swartz 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 448. t. 10. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 55. t. 200. (reform.)
= Sabicea Aubl.

Schwenkfeldia Willd. 1797. Spec. I. p. 982. n. 360: g. Pentandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 235: g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 615.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 764. n. 829; 1830. Gen. I. p. 175. n. 884: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 793.
= Sabicea Aubl.

Schwenkia*) Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 567. n. 1233; 1767. Syst. ed. XII. p. 61: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 60; 1784. Syst. p. 64. — Reich. 1778. Gen. p. 14. n. 31. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 18. n. 38. — Gmel. 1791. Syst. p. 38. — Pers. 1797. Syst. p. 65. — Willd. 1797. Sp. I. p. 106. n. 50. — Vahl 1805. Enum. I. p. 102. n. 37 (*Schwenckia*). — Schult. 1824. Mant. II. Add. p. 196.
Scop. 1777. Intr. p. 168: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 192. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 282. — Hedw. 1806. Gen. p. 12. 347 (*Swenkia*). — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 54. 128. n. 168 (*Schwenckia*). — Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 47. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 38. n. 69 (*Schwenckia*); 1830. Gen. I. p. 22. n. 92. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 100 (*Schouinque*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 41.
Juss. 1789. Gen. p. 123: g. Scrophulariis aff.
Neck. 1790. El. I. p. 367. n. 567 (*Schwenchia*): g. Plasyrgophytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 182. t. 14.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 374. t. 178—181: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 130.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 401: g. Scrofularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3146 (*Schwenckia*): g. Antirrhinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24.
Endl. 1839. Gen. n. 4216. p. 734; 1841. Ench. p. 357: g. Primulaceis aff. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343. — Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4847.
Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218): g. Salpiglossidear.? — Par. Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 192: g. Salpiglossear. Sect.: Cestranthus, Chaetochilus, Euschwenkia, Brachyhelus, Cardiomeria.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Fabianear.?
Miers 1853. Ann. and Mag. 2d. ser. XI. p. ... : g. Solanear.
Synon. Chaetochilus Vahl; Mathea Vell.?

Schwerinia Karsten 1848. Auswahl I. p. 12. t. 4; 1858. Fl. Columb. I. p. 35. t. 18: nov. g. Lavoisierear. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 695 et 1848. p. 65. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 295.

*) Dicat. Joh. Theod. Schwenk, prof. Jenensi.

Schwerinia Karsten cont.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 128: sect. Merianiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 786.

Schweycherta „Gmel." Juss. vid. *seq.*

Schweyckerta*) Gmel. 1805. Fl. Badens. I. p. 447 (p. 398 *Schweickerta* et p. 448 *Schweyckherta*): novum g. Pentandr. Monogyn. (Menyanthes Nymphoides L.)
= Limnanthemum Gmel.

Schweyckherta Gmel., Endl. et Meisn. vid. *praeced.*

Schweykerta „Gmel." Auct. vid. *praeced.*

Schychowkya Spach vid. *seq.*

Schychowskya**) Endl. 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 187: nov. g. Urticear. (Urtica ruderalis Forst.)
Endl. 1837. Gen. n. 1881. p. 284; 1841. Ench. p. 170: g. Urticacear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2489: g. Elatostemmear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24 (*Schychowkya*): g. Elatostemear.
= Fleurya Gaudich.

Schythymenia Agardh vid. *Scythymenia Agdh.*

Schyzimenium Harvey vid. *Schizhymenium Harv.*

Schyzophyllum Dumort. vid. *Schizophyllum Fries.*

Sciadanthus***) Coss. & Dur. .... Bull. bot. France II. p. 367: sect. Fraxini. (F. dimorpha.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 485.

Sciadendron Nuttall 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 364: sect. Rhododendri. (Rh. eximium.)

Sciadianemia Rchb. 1841. Nomencl. p. 236: nomen pro *Omalocarpo DC.* propositum.

Sciadicarpus Hassk. vid. *Sciadocarpus Hassk.*

Sciadiodaphne Rchb. 1841. Nomencl. p. 70. n. 2657: g. Oreodaphnear.
= Umbellularia Nees.

Sciadioseris†) Kunze 1851. Bot. Zeit. p. 349: nov. g. Euvernoniear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 143 (*Sciadoseris*).

Sciadiphyllum Hassk. vid. *Sciadophyllum Rchb.*

Sciadipteris††) Sternb. 1838. Vers. II. p. 117: g. Aspleniacitum.
= Asplenites Göpp.

Sciadium „A. Braun" Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 490. n. 307: nov. g. Vaucheriear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. gen. p. 10. 48: g. Algar. monocytidear. genuinar. synoicobiar. (*cf.* Flora 1855. p. 572), serius (ibid. p. 53) sect. Ophiocytii?

Sciadocalyx Regel 1850. Gartenflora II. p. 257: nov. g. Gesneriacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1854. p. 288.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203; 1858. XXIX. p. 504. 555: g. Brachylomatear.

*) „In memoriam sempiternam Botanici acutissimi J. N. Schweyckerti."
**) Dicat. Dr. Schychowsky, Kalugensi.
***) *σκιά*, umbra, umbraculum.
†) *σέρις*, cichorium s. composita.
††) *σκιάδιον*, flabellum.

Sciadocarpus Hasskarl 1842. Flora Beibl. II. p. 20. (Cat. h. Buitenz. 86.)
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 86; 1848. Pl. jav. rar. p. 209 (*Sciadicarpus*): g. Monimiacear.
= Kibara Endl.

Sciadodendron Griseb. 1858. Bonplandia p. 7: nov. g. Araliacear.

Sciadonardus Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Agrostidear. (Nomen.)

Sciadophila Philippi 1856. Linnaea XXVIII. p. 618: nov. g. Colletiae aff. (Colletia maytenoides Gris.)

Sciadophyllum Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3782; 1837. Handb. p. 221: g. Araliacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — Walp. 1843. Rep. II. p. 431. 939; 1846. V. p. 926. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 165 (*Sciadiphyllum*).
Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5550: g. Araliear.
= Sciodaphyllum P. Browne.

Sciadophysium Endl. 1836. Gen. n. 503 *d.* p. 49; 1841. Ench. p. 31: sect. Splachni.
Conf. Umbracularia Müll.

Sciadopitys Sieb. & Zucc. .... Fl. japon. II. 1. t. 1. 2: nov. g. ex typo Taxi verticillatae Thunb.
Endl. 1842. Spl. II. p. 25. n. 1797; 1847. Syn. Conif. p. 198; 1847. Spl. IV. p. 7. n. 1809: g. Cunninghamiear.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Abietinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Abietear.

Sciadoseris Müll. vid. *Sciadioseris Kunze.*

Sciadotenia Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 37. 43: nov. g. Pachygonear. Typus novus.

Sciaphila Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 514: nov. g. Coenosanthear. (S. tenella.)
Endl. 1837. Gen. n. 1878. p. 282; 1841. Ench. p. 168: g. Artocarpear. vix notum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2549. — Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpaceear.
Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 21. p. 321: g. Triuridacear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 231.
Miers (Linn. Trans. XXI. p. 47) 1851. Ann. and Mag. 2d. ser. VII. p. 327: g. Sciaphilear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 917.
Benth. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 10: g. Triuridear.
Synon. Aphylleia Champ.

Sciaphileae Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 327: trib. Triuriacear. Gen.: Soridium, Sciaphila, Hyalisma. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 916.

Sciarodium C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 526: sect. Conomitrii. (Fissidens osmundioides Hedw. etc.)

Scilla*) Linn. 1737. Gen. p. 95. n. 270; 1737. Cliff. p. 123; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 84; 1753. Sp. I. p. 308; 1759. Syst. ed. X. p. 981. n. 378; 1762. Sp. ed. II. p. 442; 1764. Gen. ed. VI. p. 466. n. 419; 1767.

*) *σκίλλη* Graecorum.

Scilla Linn. cont.
Syst. ed. XII. p. 243. n. 415: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 271; 1784. Syst. p. 328. — Reich. 1778. Gen. p. 169. n. 452. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 222. n. 567. — Gmel. 1791. Syst. p. 552. — Pers. 1797. Syst. p. 350; 1805. Ench. I. p. 365. n. 804. — Willd. 1799. Sp. II. p. 125. n. 640; 1809. En. p. 369. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 468. 514. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 147.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 49: g. Scillar.
Gled. 1764. Syst. p. 72. n. 299: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 356: g. Hexapetalar. incompletar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 249.
Juss. 1789. Gen. p. 53: g. Asphodelor. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 211.
Neck. 1790. El. III. p. 180. n. 1534: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 165: g. Asphodeloidear.
Batsch 1802. Tab. p. 123: g. Alliacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 131: g. Asphodelear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 241. n. 978. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 177. — Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 118. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXVII. 556. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 265. n. 1382. — Koch 1837. Syn. p. 714. Ed. II. p. 825. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1139. — Webb 1850. Canar. III. p. 336. Sect.: Autonoe, Icarus. — Math. 1853. Belg. I. p. 539.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 234; 1825. Syst. II. p. 66. n. 1217: g. Liliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 327. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 426.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1364; 1830. Fl. exc. p. 106; 1841. Nom. p. 49. n. 1785: g. Scillear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Meisn. 1842. Gen. p. 400 (304). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Link 1829. Hdb. I. p. 164: g. Hyacinthinar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Endl. 1837. Gen. n. 1130. p. 146; 1841. Ench. p. 84: g. Hyacinthear. restrict. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 314. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 310. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 156. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 185. Disjungitur Adenoscilla.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 389: g. Tulipacear.
Regel 1857. Bull. Ac. Pet. XV. p. 17. (Revisio specierum Rossiae.)
Synon. Liliohyacinthus Tourn.; Squilla Gled.; Usteria Medic.

Scillae Adans. 1763. Fam. II. p. 49: sect. 3 Liliacear. Gen.: Yuca, Phalangium, Anthericum, Scilla.

Scilleae Rchb. 1828. Consp. p. 65; 1830. Fl. exc. p. 104; 1837. Hdb. p. 154: subdiv. Asphodelear. Gen.: Massonia, Eucomis, Muscari, Hyacinthus, Bellevalia, Scilla, Drimia, Barnardia, Ornithogalum, Albuca, Lachenalia, Uropetalum, Puschkinia.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: div. Asphodelear. Gen.: Allium, Codonoprasum, Millea, Puschkinia, Massonia, Eucomis, Scilla, Bellevalia, Hyacinthus, Muscari, Drimia, Lachenalia, Uropetalum, Albuca, Ornithogalum, Barnardia.
Rchb. 1841. Nom. p. 48: subdiv. Anthericear. Gen. ut 1828 et Veltheimia, Agraphis, Daubenya, Cyanotris, Urginea, Albucea.
Meisn. 1842. Gen. p. 400 (303): trib. Asphodelear. Gen.: Nectaroscordum, Allium, Gagea, Eucomis, Puschkinia, Myogalum, Albuca, Barnardia, Ornithogalum, Camassia, Scilla, Urginea, Nolina?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: trib. Liliacear. Gen.: Allium, Nectaroscordum, Caloscordum, Milla, Hesperoscordum, Pseudoscordum, Calliprora, Camassia, Scilla, Urginea, Ornithogalum, Chlorogalum, Albuca, Myogalum, Nolina, Uropetalum, Litanthes, Muscari, Bellevalia, Hyacinthus, Eratobotrys, Puschkinia, Barnardia, Ledebouria, Bessera, Leucocoryne, Brodiaea, Triteleja, Tristagma, Agraphis, Lachenalia, Coelanthus, Peribaea, Polyxena, Drimia, Idothea, Massonia, Daubenya, Eucomis.

Scinaia*) Bivona-Bern. 1822. Scinaia (Palerm.); 1824. Syll. Ratisb. I. p. 135: nov. g. Algar. marinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 477: g. Ulvear.?
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Scinaiear. (*Syn. Ginannia Mont., Myelomium Kütz.*) — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 135.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 245: g. Helminthocladiear.
= Halymenia Agdh.?

Scinaieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 105: subdiv. Dudresnayear. Gen.: Scinaia.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 133: subordo Helminthocladear. Gen. id.

Scindapsus Schott 1832. Melet. bot. p. 21: nov. g. Callacear. (Pothos glaucus Wall., etc.)
Endl. 1837. Gen. n. 1699. p. 239; 1841. Ench. p. 129: g. Callear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 61. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1111. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 41. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 194.
Hassk. 1842. Flora Beibl. II. p. 11.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 88.
Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 182: g. Orontiear. Subgen.: veri, Rhaphidophora, Marantophyllum, Pothopsis, Nothopothos.

Sciniatosporium Rchb., Rabenh. vid. *Seimatosporium Corda.*

Sciobia Rchb. 1841. Nomencl. p. 66. n. 2488: g. Elatostemmear. (*Sciophila Gaudich.*, non Zool.)

*) Dicat. Domenico Sciná.

Sciobia Rchb. cont.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 37. n. 1880 *a*: sect. Elatostemmatis.
= Procris Comm., Wedd.

Sciodaphyllum P. Browne 1756. Jamaic. p. 190. t. 19. f. 1: nov. g. Pentandr. Pentagyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 243: g. Portulacar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 627; 1825. Syst. I. p. 953. n. 1139; 1830. Gen. I. p. 238. n. 1254: g. Araliear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1036.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 874: g. Araliacear. Sect.: Dactylophyllum. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 127. — DC. 1830. Pr. IV. p. 259. — Bartl. 1830. Ord. p. 238. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 390. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — Endl. 1839. Gen. n. 4559. p. 795; 1841. Ench. p. 393; 1842. Spl. II. p. 70. Sect. ut Miq. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781.
Miq. 1840. Comm. bot. p. 102. Sect.: Actinophyllum, Calyptrophore, Actinanthe, Actinomorphe.
Synon. Actinophyllum Rz. & Pav.; Sciadophyllum Rchb.; Sciadiphyllum Hassk.

Sciophila Heller 1810. Fl. Wirceb. p. 185.
= Maianthemum Wigg.

Sciophila Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 493. t. 120: nov. g. Elatostemear. (S. Torresiana.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24.
Endl. 1837. Gen. n. 1880 *a*. p. 283; 1841. Ench. p. 170: sect. Elatostemmatis.
= Sciobia Rchb.

Sciothamnus Endl. 1839. Gen. n. 4463. p. 780; 1841. Ench. p. 379: g. Peucedanear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5462. — Walp. 1843. Rep. II. p. 412.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Dregea Eckl. & Zeyh.; Ifdregea Steud.

Sciridium Ritgen vid. *Seiridium Nees.*

Scirpeae Batsch 1802. Tab. affin. p. 157: fam. Agrostalium. Gen.: Carex, Fuirena, Schoenus, Gahnia, Eriophorum, Scirpus, Cyperus, Thryocephalum, Kyllingia, Mapania, Chysitrix.
= Cyperaceae DC.

Scirpeae Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: div. Cyperacear. Gen.: Eriophorum, Trichophorum, Scirpus, Isolepis, Fimbristylis, Hypaelyptum, Fuirena, Vaginaria, etc. — Par. Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1823. I. p. 25 et Schult. Mant. II. p. 1.) Gen.: Fimbristylis, Dichostylis, Dichromena, Trichelostylis, Isolepis, Heleocharis, Heleophila, Limnochloa, Scirpus, Trichophorum, Eriophorum, Hymenochaeta; Beera, Diplasia, Fuirena, Lepidosperma, Oreobolus.
Agdh. 1823. Aphor. p. 142: trib. Cyperacear. Gen.: Fimbristylis, Dichromena, Isolepis, Eleocharis, Scirpus, Eriophorum, Diplasia, Fuirena, Lepidosperma, Oreobolus. — Par. Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. (genuinar.) Gen.: Isolepis, Fimbristylis, Scirpus, Eleocharis, Dichromena, Rhynchospora. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. Gen. ut Agdh. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 289 (1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 91). Gen. §. 1: Dichostylis, Abildgaardia, Chaetocyperus. §. 2: Echinolytrum, Fimbristylis, Trichelostylis, Isolepis, Dichromena, Eleogiton; Schoenidium, Ficinia, Sickmannia; Malacochaete, Hymenochaete, Blysmus, Trichophorum, Eriophorum, Scirpus, Scirpidium, Eleogenus, Eleocharis, Limnochloa. — Kunth 1837. Cyper. p. 139. Gen.: Eleocharis, Scirpus, Eriophorum, Fuirena, Isolepis, Nemum, Fimbristylis, Abildgaardia, Androtrichum, Ficinia, Melancranis. — Endl. 1837. Gen. p. 118; 1841. Ench. p. 64. (restrict.) Gen.: Isolepis, Scirpus, Eriophorum. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 10) Helothrix, Androcoma. — Koch 1837. Syn. p. 737. Ed. II. p. 851. Gen.: Cladium, Rhynchospora, Heleocharis, Scirpus, Fimbristylis, Eriophorum. — Meisn. 1842. Gen. p. 410 (314). Gen. ut Kunth 1837 et Androcoma, Vauthiera. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12. Gen. ex Kunth. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. Gen. ut Meisn. et Trichophorum. — Steud. 1855. Glum. II. p. 72. Gen.: Abildgaardia, Chaetocyperus, Eleocharis, Scirpus, Hellmuthia, Isolepis, Ascolepis, Helothrix, Androcoma, Androtrichum, Oxycaryum, Nemum, Blepharolepis, Fimbristylis, Pogonostylis, Ficinia, Melancranis, Fuirena, Eriophorum.
Rchb. 1828. Consp. p. 57; 1830. Fl. exc. p. 77; 1837. Hdb. p. 147: subdiv. Scirpinar. Gen.: Heleocharis, Heleogiton; Limnochloa, Scirpus, Trichophorum, Eriophorum, Hymenochaete. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. Gen. ut Endl. et Holoschoenus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: subordo Cyperacear. Gen.: Isolepis, Trichelostylis, Nemum, Helothrix, Scirpus, Pterolepis, Blysmus, Baeothryon, Eleocharis, Androtrichum, Androcoma, Eriophorum.

Scirpideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 73: div. Cyperacear. Gen.: Scirpus, Eleocharis, Isolepis, Trichophorum, Eriophorum.

Scirpidium Nees 1834. Linnaea IX. p. 293; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 97: nov. g. Scirpear. (Scirpus acicularis L.)
Synon. Trichophyllum Ehrh.; Mariscus Mönch.

Scirpinae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 134: div. Cyperoidar. Gen.: Scirpus, Lepidosperma, Fuirena, Chaetospora; Schoenus, Isolepis, Kyllinga, Hypaelyptum, Mariscus, Eriophorum.
Rchb. 1828. Consp. p. 57; 1830. Fl. exc. p. 75; 1837. Hdb. p. 147: div. Cyperoidear. Subdivis.: Fimbristyleae, Scirpeae, Fuireneae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. Subdivis.: Scirpeae, Hypolytreae, Fuireneae.

Scirpineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: trib. Cyperidear. Gen.: Eriophorum, Scirpus, Clavula.

Scirpo-Cyperus Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 46. t. 31: g. pl. class. XV.
= Pogonostylis Bert.

Scirpoideae Pers. 1805. Ench. I. p. 56: ordo plant. Gen. (*triandra*): Kyllinga, Mapania, Remirea, Dichroma, Schoenus, Cyperus,

Scirpoideae Pers. cont.
Dulichium, Scirpus, Trichophorum, Eriophorum, Fuirena, Hypolytrum, Diplasia, Lepironia, Chrysitrix et (1807. ibid. II. p. 534 *monoica*) Cobresia, Uncinia, Carex.
= Cyperaceae DC.

Scirpoides Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 52. t. 31: g. pl. class. XV.
= . . . ?

Scirpus Tourn. 1700. Inst. p. 528. t. 300: g. pl. class. XV. (varia latitudine ab Auctoribus adoptatum.) — Par. Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 49. t. 31. (anguste circumscript.) — Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 319.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 302: g. pl. class. XIV.

Linn. 1737. Gen. p. 12. n. 33; 1737. Cliff. p. 21; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 47; 1759. Syst. ed. X. p. 867. n. 62; 1762. Sp. ed. II. p. 70; 1764. Gen. ed. VI. p. 30. n. 67; 1767. Syst. ed. XII. p. 82: g. Triandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 43. — Murr. 1774. Syst. p. 84; 1784. Syst. p. 98. — Reich. 1778. Gen. p. 31. n. 73. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 41. n. 94. — Lour. 1790. Coch. I. p. 43. — Gmel. 1791. Syst. p. 124. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 17; 1818. Fl. cap. I. p. 361. — Pers. 1797. Syst. p. 100. — Willd. 1797. Sp. I. p. 290. n. 113; 1809. En. p. 75. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 21. t. 2. — Vahl 1806. Enum. II. p. 242. n. 117. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 123. — Elliott 1817. Sketch I. p. 75. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 32. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 25. t. 231; 1830. Ind. ed. Wall. I. p. 213; ed. 1832. I. p. 210. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 425.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 247: g. Cyperor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 41.

Gmel. 1747. Sibir. I. p. 79: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 79. (spurior.) — Host 1805. Gram. Austr. III. p. 38. t. 55—69.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 13. n. 44: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 349. Sejungitur Mariscus.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Calamariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 129. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 24.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 397.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 10. t. 2. f. 3 (setaceus).

Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 92. — Link 1821. En. I. p. 42 (sect.: Fimbristylis, Isolepis, Eleocharis); 1827. Hort. I. p. 295; 1829. Hdb. I. p. 103.

Neck. 1790. El. III. p. 242. n. 1629: g. Chortodiphytor.

Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 224; 1822. Syn. I. p. 154; 1837. Cyper. p. 157; 1838. Berol. II. p. 320. — Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 26 et Schult. Mant. II. p. 2) restrict. — Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1121 (restrict.); 1830. Fl. exc. p. 78. Sect.: Actaeogeton, Scirpus (lacustris et minimus), Taphrogeton. — Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 293; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 105; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 92; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 75. — Endl. 1837. Gen. n. 1000. p. 118; 1841. Ench. p. 64. Sect.: Pterolepis, Scirpus, Eleocharis. — Koch 1837. Syn. p. 739. Ed. II. p. 853. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1477. Sect.: Scirpus, Heleocharis, Pterygolepis. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 151. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. (restrict.) — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 616. Sect.: Scirpus (sylvaticus), Euscirpus, Holoschoenus, Isolepis, Heleocharis. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 435. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 246. — Math. 1853. Belg. I. p. 575. Sect. ut Spreng. 1825. — Steud. 1855. Glum. II. p. 83. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 369. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 303.

Cram. 1803. Disp. p. 4 in Monandr. Monogyn., et p. 14 in Diandr. Monogyn.

Pers. 1805. Ench. I. p. 65. n. 123: g. Scirpoidear.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 66: g. Cyperacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 133; 1815. V. p. 299. — Hedw. 1806. Gen. p. 33. 360. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 223. Ed. Nees p. 79. Disjunguntur Isolepis et Eleocharis. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 3. 122. n. 177. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 203. n. 223. Sect.: Eleocharis, Scirpus, Isolepis. — D. Don 1825. Nepal. p. 40. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 14. — Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 131. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 64. 105. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 65 (sphalm. *Scripus*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 203. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 417. Sect.: Isolepis, Euscirpus, Eleocharis. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 268.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 134: g. Scirpinar.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 73: g. Scirpidear. Sect.: Boeotherion, Scirpus.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: g. Scirpinear.

Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 49. n. 232: g. Cyperear. — Par. Schrad. 1832. Comm. Gott. VII. p. 129.

Synon. Adenotrix Rafin.; Heleophila Palis.; Heleogiton Schult.

Scirpus Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 83): g. modificat. Cyperacear. Sect.: Hippotrix, Hexotrix, Adenotrix, Fimbristylis, Thryonachis.

Scirpus Endl. 1837. Gen. n. 1000 *b*. p. 118; 1841. Ench. p. 64: sect. Scirpi. Subsect.: Scirpus, Blysmus, Baeothryon. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1477. 1. Subsect.: Limnochloa, Blysmus, Scirpus. — Math. 1853. Belg. I. p. 577 (excluso Blysmo).

Scirrhoglyphis Rchb. vid. *Skirroglyphis DC.*

Scirrophorus Rchb. vid. *Skirrhophorus DC.*

Scitamina Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: ordo 3 plant. Gen.: Musa, Thalia, Alpinia, Costus, Canna, Maranta, Amomum, Curcuma, Kämpferia.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 270: fam. 22 plant. Ord.: Canneae, *vera* (gen.: Hedychium, Kämpferia, Curcuma, Amomum, Zingiber, Costus, Helenia, Alpinia, Globba).

Scitamineae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 8 plant. Gen. Scitaminum 1751. (*Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 137.) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 118. Gen. ead. et Heliconia, Globba, Renealmia, Myrosma?, Strelitzia, Jägera, Hedychium, Buekia, Planera, Meisteria, Greenwaya, Wurfbainia, Paludana, Albina, Martensia, Stissera, Dietrichia, Manitia, Etlingera, Erndlia, Ravenala.

Scop. 1777. Intr. p. 92: gens 2 tribus V. plant. Gen.: Amomum, Curcuma, Maranta, Qualea, Thalia, Costus, Canna.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 196: ordo 1 class. IV. Gen.: Musa, Strelitzia.

Batsch 1802. Tab. p. 104: fam. Glorialium. Gen.: Globba, Canna, Myrosma; Amomum, Costus, Alpinia, Maranta, Thalia, Curcuma, Kämpferia, Hornstedtia, Hellenia, Renealmia, Phrynium, Hedychium.

Pers. 1805. Ench. I. p. 1. Gen. ut Batsch et Phylidrum.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 305. Ed. Nees p. 161: ordo Monocotyledonum. (Gen.: Hellenia.)

Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 2. Gen.: Hedychium, Roscoea, Alpinia, Elettaria, Hellenia, Zingiber, Costus, Kämpferia, Amomum, Curcuma, Globba, Ceratanthera, Hornstedtia.

Link 1821. En. I. p. 1; 1829. Hdb. I. p. 223: ordo 10 Endogenear. Subord.: Cannaceae, Alpiniaceae.

Agdh. 1823. Aphor. p. 182; 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: ordo Gynandrar. Gen. Scitaminum veror. Spreng. et Roscoea, Hornstedtia. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. Gen. ead.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXV: div. Bananear. Gen.: Mantisia, Globba, Hedychium, Alpinia, Hellenia, Costus, Zingiber, Amomum, Curcuma, Kämpfera.

Rchb. 1828. Consp. p. 70: fam. Palmacear. Divis.: Amomeae, Cannaceae, Musaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 156. Divis.: Canneae, Amomeae, Museae.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (241) Tripetaloidear.

Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 41. Divis.: Zingibera, Amomae, Alpiniae, Costae, Globbae.

Bartl. 1830. Ord. p. 59: class. (XIV.) Monocotyledoneor. Ord.: Amomeae, Cannaceae, Musaceae. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 387. 442 (290). Ord. ut Endl. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 132. Fam. ut Bartl.

Lindl. 1833. Nix. p. 33: ordo Amomalium.

Mart. 1835. Consp. p. 10.

Endl. 1837. Gen. p. 221; 1841. Ench. p. 117: class. (XIX.) Amphibryor. Ord.: Zingiberaceae, Cannaceae, Musaceae. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 172; 1846. Chlor. prot. p. LXVII. Gen. foss.: Cannophyllites, Amomocarpum, Trigonocarpum, Musacites, Musocarpum.

Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 306. 341. Divis.: Kämpferieae, Hedychieae, Curcumeae, Alpinieae, Costoideae, Mantisieae.

Rchb. 1841. Nom. p. 56: fam. Orchidiflorar. Divis. ut 1837.

Brongn. 1843. En. genr. p. XV. 24: class. Monocotyledonear. Fam.: Musaceae, Canneae, Zingiberaceae.

Scitamineae „Roscoe" HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 329 (Kunth 1822. Syn. I. p. 321): sect. Amomear. Gen.: Alpinia, Zingiber.

Scitaminites Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXVI: g. Palmar. foss.
= Cromyodendron Sternb.

Scitaminites Sternb. 1838. Vers. II. p. 191: ordo plant. foss. Gen.: Musaeites.

Sciuris*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 24. n. 53: g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 49. — Willd. 1797. Sp. I. p. 153. n. 66. — Pers. 1805. Ench. I. p. 30. n. 67. — Vahl 1805. Enum. I. p. 101. n. 35.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 38. n. 73: g. Viticear. *Cf.* Cur. post. p. 11. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 100 (*Sciurus*).
= Galipea Aubl.

Sciuris Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 153: g. Fraxinellar. *Cf.* Schult. 1824. Mant. II. Add. p. 194 in adnot.
= Ticorea Aubl.

Sciurodei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: div. Hypnoideor. Gen.: Regmatodon, Sclerodontium, Leucodon, Dienemon, Astrodontium, Antitrichia.

Sciurus Dietr. vid. *Sciuris Schreb.*

Scizanthus Pers. vid. *Schizanthus.*

Scizophyllum Fries vid. *Schizophyllum.*

Sckrenkia Endl. vid. *Schrenkia.*

Sclaraea Tourn. Inst. in Ind. p. 684: vid. *Sclarea.*

Sclarea**) Tourn. 1700. Inst. p. 179. t. 82: g. pl. class. IV.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 215. Ed. Hall. 1745. p. 222: g. pl. class. IX.

Mönch 1794. Meth. p. 374: g. Petalostemonis.

DC. 1805. Franç. III. p. 508: sect. Salviae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2805 *b*.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 387: g. Labiatar. (Salvia pratensis L.)

*) σκίουρος, sciurus.
**) Nomen Italicum, teste Ruellio.

Sclarea Tourn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Salviear.
= Salviae Linn. pars.

Sclepsion Rafin. mss. in sched. pl. exsicc.
= Laportea Gaudich. (Wedd. 1857.)

Sclerachne*) R. Brown & Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 15. t. 4: nov. g. Paniceár.
Endl. 1841. Spl. I. n. 743/2. p. 1353; 1841. Ench. p. 56: g. Phalaridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1243. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 9.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.

Sclerachne „Torr." Trinius 1841. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 273: g. Agrosteor. (S. arkansana et pilosa.)
Steud. 1854. Glum. I. p. 186: g. Agrostear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 475: g. Eupanicear.
= Limnas Trin.

Sclerales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 24: nixus Curvembryar. Ord.: Sclerantheae, Nyctagineae.

Sclerangium Léveillé 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 130: nov. g. Basidiosporear. entobasidum coniogastrum. (Scleroderma Geaster Fries.)
= Diploderma Link?

Scleranthaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 213) 1847. Veg. kingd. p. 528: ordo Ficoidalium. Gen.: Mniarum, Scleranthus, Guilleminia, Habrozia.

Sclerantharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: ordo Torosepalar. Fam.: Scleranthideae.

Sclerantheae A. St. Hilaire 1815. Bull. soc. philom. p. 38: nova fam. Gen. §. 1: Minuartia, Löflingia. §. 2: Scleranthus, Mniarum, Queria. *Cf.* A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 284.
Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 386; 1825. Dict. v. 38. p. 9: div. Paronychiear. Gen. ead.
Link 1821. En. I. p. 417; 1831. Hdb. II. p. 424: ordo Apetalar. Gen.: Scleranthus.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 125 (et in Mart. Amaranth. p. 67): fam. Caryophyllinar. Gen.: Scleranthus, Mniarum; Guilleminea?
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Caryophyllear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: div. Portulacear. Gen. ut St. Hil. et Ortegia, Pollichia.
DC. 1828. Pr. III. p. 377: trib. Paronychiear. Gen.: Mniarum, Scleranthus, Guilleminea.
Rchb. 1828. Consp. p. 161; 1832. Fl. exc. p. 565: subdiv. Paronychiear. Gen. ut St. Hil. et Lithophila?, Guilleminia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 161. Gen. ut DC. et Pollichia.

*) σκληρός, durus, siccus.

Sclerantheae A. St. Hilaire cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: trib. Scleranthidear. Gen. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 300: ordo (172) Caryophyllinar. Gen. ut DC.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (152) Apetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 24: ordo Scleralium.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 94: ordo (112) Calyciflorar. Trib.: *Sclerantheae* (gen. ut DC.), Queriaceae, Minuartieae. — Par. Koch 1836. Syn. p. 255. Ed. II. p. 281. Gen.: Scleranthus.
Mart. 1835. Consp. p. 16: ordo 94.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 239: fam. (75) Caryophyllinear. Gen. ut DC.
Meisn. 1838. Gen. p. 133 (97): subordo Paronychiacear. (p. 438 ordo Caryophyllinar.) Gen. ead.
Kunth 1838. Berol. I. p. 144: div. Illecebrear. Gen.: Scleranthus.
Endl. 1840. Gen. p. 962; 1841. Ench. p. 505: subordo Caryophyllear. Gen. ut DC. — Par. Fenzl 1843. Bot. Zeit. p. 326. Subtrib.: Euscleranthеae, Habrosieae. — Endl. 1843. Spl. III. p. 91. Subtrib. eaed.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 217: trib. Caryophyllear. Gen.: Scleranthus.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 437: fam. Dicotyledonear. Gen. ut DC.

Scleranthideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 545: sect. Paronychidear. Gen.: Scleranthus, Adenarium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: fam. unica Sclerranthariear. Trib.: Pollichieae, Sclerantheae, Querieae.

Scleranthineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: fam. Fructitegmiae.

Scleranthus*) Linn. 1737. Gen. p. 130. n. 366; 1737. Cliff. p. 166; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 406; 1759. Syst. ed. X. p. 1028. n. 497; 1762. Sp. ed. II. p. 580; 1764. Gen. ed. VI. p. 224. n. 562; 1767. Syst. ed. XII. p. 306. n. 557: g. Decandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 346; 1784. Syst. p. 415. — Reich. 1778. Gen. p. 229. n. 611. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 302. n. 767. — Gmel. 1791. Syst. p. 708. — Pers. 1797. Syst. p. 444; 1805. Ench. I. p. 491. n. 1114. — Willd. 1799. Sp. II. p. 660. n. 890; 1809. En. p. 643. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 286. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 61. 134.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 272. n. 1119: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 691.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 39: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 372: g. Monophyllar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 487: g. Polygonatar.
Scop. 1777. Intr. p. 336: g. Defloratar.

*) Nomen flos cinereus vel incanus, a colore florum singulari. (Ht. Cliff.) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 193.

Scleranthus Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 314: g. Portulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 262. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 140. — DC. 1805. Franç. IV. p. 403. — Hedw. 1806. Gen. p. 326. n. 1285. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 123 (*Gnavelle*).
Neck. 1790. El. II. p. 209. n. 938: g. Sysellophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 192: g. Oleracear.
Cram. 1803. Disp. p. 63 in Pentandr. Digyn. (S. annuus.)
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 412. Ed. Nees p. 268: g. Chenopodeis aff.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 37; 1815. Mém. Mus. II. p. 284: g. Scleranthear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 387; 1825. Dict. v. 38. p. 9. — Link 1821. En. I. p. 413; 1831. Hdb. II. p. 424. — Bartl. 1825. Beitr. II. p. 154; 1830. Ord. p. 300. — DC. 1828. Pr. III. p. 378. — Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4256; 1832. Fl. exc. p. 565; 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 161. n. 6274. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 95. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 239. — Koch 1836. Syn. p. 255. Ed. II. p. 281. — Meisn. 1838. Gen. p. 133 (97). — Kunth 1838. Berol. I. p. 145. — Endl. 1840. Gen. n. 5222. p. 963; 1841. Ench. p. 505. — Walp. 1842. Rep. I. p. 266. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 207. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 614. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 74.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 312; 1825. Syst. II. p. 382. n. 1699: g. Chenopodear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 545: g. Scleranthidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: g. Scleranthinear.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 265: g. Holoracear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 376. n. 1896: g. Paronychiear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1540.
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 213; 1847. Veg. kd. p. 528: g. Scleranthacear.
Fenzl 1843. Bot. Zeit. p. 326: g. Euscleranthear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 91. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 156.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 104: g. Illecebrear.
Synon. Knavel Trag., Rupp.; Knawel Dill.

Sclereae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 119: subordo Cyperacear. Gen. Sclericar. Nees.

Sclerella Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1078 *a*: sect. Scleriae.

Scleria*) Berg. 1765. Vet. Ac. Handl. p. 149. t. 4. 5.
Swartz 1788. Prodr. p. 1. 18; 1797. Ind. occ. I. p. 86. t. 3: g. Triandr. Monogyn.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 13. t. 2. f. 7. (Carex lithosperma L.)

Scleria Berg. cont.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 626. n. 1408: g. Monoec. Triandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 312. n. 1643. — Pers. 1807. Ench. II. p. 547. n. 2039. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 205. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 573.
Gis. 1792. Prael. p. 129: g. Calamariar.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 240. Ed. Nees p. 96: g. Cyperacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 141.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 231; 1822. Syn. I. p. 160: g. Sclerinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 132.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 18): g. Scleriar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Caricear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 120.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 830. n. 3089; 1831. Gen. II. p. 687. n. 3465: g. Cyperear.
Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I: g. Sclerinear. — Par. Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 164. — Kunth 1837. Cyper. p. 339. — Steud. 1855. Glum. II. p. 167. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 341.
Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1078: g. Scleriacear. Sect.: Sclerella, Lithocarpella.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Scleriear. — Par. Nees 1834. Linnaea IX. p. 302; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 178; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 119. (restrict.) — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Caricinar.
Raf. 1830 in Seringe Bull. bot. p. 219. Sect.: Foveolidia, Rugunia, Margaleia. *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 83.
Endl. 1837. Gen. n. 964 *a*. p. 112; 1841. Ench. p. 63: sect. Scleriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1443. 1.
Schltd. 1845. Bot. Zeit. p. 457.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Sclerear. (sensu Neesiano.)
Conf. Adamantogeton Schrad.; Cylindropus?, Omoscleria, Mastigoscleria, Ophryoscleria, Macrolomia, Hymenolytrum, Schizolepis, Trachylomia, Chondrolomia, Hypoporum, Pteroscleria, Lagenocarpus, Cryptangium, Acrocarpus Nees; Cladotheca Steud.

Scleria Endl. 1837. Gen. n. 964. p. 112; 1841. Ench. p. 63: g. Scleriear. ampliat. Sect.: Scleria, Bequerela, Hypoporum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1443. Sect. eaed.

Scleriaceae Rchb. 1828. Consp. p. 56: subdiv. Caricinar. Gen.: Opetiola, Diplacrum, Scleria.

Scleriae Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 18): div. Cyperacear. Gen.: Diplacrum, Scleria.

Sclerieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Caricear. Gen.: Scleria, Diplacrum.
Nees 1832. Linnaea VII. p. 531; 1834. ibid. IX. p. 302: trib. Cyperacear. Gen.: Scleria, Cylindropus, Hypoporum, Becquerela,

*) *σκληρός*, durus: ob duritiem seminis et ipsius plantae.

Sclerieae Dumort. cont.
Lagenocarpus, Diplacrum, Calyptrocarya. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 111; 1841. Ench. p. 63. Gen.: Diplacrum, Scleria, Aulacorhynchus. Accedit 1842 (Spl. II. p. 9) Anogyna. — Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 155 (1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 119). Gen.: Acrocarpus, Cephalocarpus, Cryptangium, Lagenocarpus, Hypoporum, Chondrolomia, Trachyloma, Hymenolytrum, Mastigoscleria, Scleria, Omoscleria, Macrolomia, Ophryoscleria, Schizolepis, Becquerelia, Calyptrocarya, Pteroscleria. — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). Gen. Sclerinear. Kunth. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12. Gen.: Scleria. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. Gen. ut Meisn.
Rchb. 1841. Nom. p. 40: subdiv. Caricinar. Gen. ut Endl.

Sclerinae Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 231; 1822. Syn. I. p. 160: div. Cyperacear. Gen.: Scleria, Diplacrum, Gahnia, etc.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 132: div. Cyperoidar. Gen.: Scleria, Diplacrum; Cladium, Miegia, Gahnia, Lampocarpya, Evandra, Caustis.

Sclerineae Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. fasc. III: trib. Cyperacear. (diclinar.) Gen.: Scleria. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 338. Gen.: Scleria, Diplacrum, Cylindropus, Becquerelia, Fintelmannia, Calyptrocarya, Chrysitrix, Chorizandra, Lepironia, Evandra, Oreobolus. — Steud. 1855. Glum. II. p. 167. Gen. ut Kunth (excepta Fintelmannia) et Cephalocarpus, Diploscyphus, Anogyna.
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 159: div. Cyperacear. Gen.: Diplacrum, Becquerelia, Scleria, Lampocarya, Baumea, Carpha, Gussonea.

Sclernax Rafin. . . . . : g. Rivuliniar. (ignotum.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 45. p. 490; 1827. v. 48. p. 145.

Sclerobasis Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mai p. 73; 1827. Dict. v. 48. p. 145. 448; 1830. v. 60. p. 583: g. Senecionear. (Archetypar. — Senecio rigidus L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2498. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.)
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. 7: sect. Senecionis.
= Senecionis pars DC.

Sclerocalyx Nees 1844 in Voy. Sulph. Bot. p. 145; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 219: nov. g. Ruelliear.
Synon. Gymnacanthus Nees.

Sclerocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45: ordo Engastriocarpor. Gen.: Sphaeria, Stilbospora, Nemaspora, Xyloma, Hysterium.

Sclerocarpa Walp. vid. *Sclerocarya Hochst.*

Sclerocarpi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XII: ordo Angiocarpor. Gen.: Sphaeria, Stilbospora, Naemaspora, Tubercularia, Hysterium, Xyloma.

Sclerocarpi Pers. cont.
Rebent. 1804. Neom. p. 322: div. Gasteromycor.

Sclerocarpum Pers. 1797. Tent. disp. p. 1: ordo Angiothecii. Gen.: Sphaeria, Xyloma, Hysterium.
= praeced.

Sclerocarpum „Jacq.“ Reuss Rep. comm. II. p. 9: vid. *seq.*

Sclerocarpus Jacq. 1782. Ic. pl. rar. t. 176; 1787. Nov. Act. Helv. I. p. 34. t. 2 (communic. 1780): nov. g. pl. (Scl. africanus.) *Cf.* Thonn. in Schumach. Pl. Guin. p. 394.
Murr. 1784. Syst. p. 783: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 575. n. 1327. — Gmel. 1791. Syst. p. 1262. — Pers. 1797. Syst. p. 824; 1807. Ench. II. p. 479. n. 1923. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2261. n. 1542; 1809. En. p. 923.
Juss. 1789. Gen. p. 186: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 411.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Compositar. quartae sectionis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 571; 1826. Syst. III. p. 610. n. 2840; 1831. Gen. II. p. 639. n. 3198: g. Radiatar.
Link 1822. En. II. p. 354: g. Oppositifoliar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18; 1827. v. 48. p. 148: g. Millerlear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2722. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 236; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 42 *(Scleropappus Jacq.).*
DC. 1836. Pr. V. p. 566: g. Rudbeckiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2523. p. 410; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3614. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Sclerocarya Hochstett. 1844. Flora I. Bes. Beil. p. 1: nov. g. Spondiacear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 418. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 469.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 287 *(Sclerocarpa)*: g. Anacardiear.

Sclerocaryum A. DC. 1846. Prodr. X. p. 142: sect. Echinospermi.

Scleroccum Leman vid. *Sclerococcum Fries.*

Sclerocephalus Boissier 1843. Diagn. pl. or. I. Nr. 3. p. 12: nov. g. Paronychiear. tribus novae. (Paronychia sclerocarpa Decne.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 75: g. Euparonychiear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 54. n. $5202/_1$.

Sclerochaetei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: subdiv. Trichosporeor. Trib.: Helicosporei, Gyrocerei, Helminthosporei.

Sclerochaetium Nees 1832. Linnaea VII. p. 511: nov. g. Scirpear. (Schoenus involucratus Thunb.)
Nees 1834. Linnaea IX. p. 301: g. Cladiear.
Kunth 1837. Cyper. p. 320: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). —

Sclerochaetium Nees cont.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Steud. 1855. Glum. II. p. 158.
Endl. 1837. Gen. n. 973 *b*. p. 113; 1841. Ench. p. 64: sect. Lepidospermae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1455. 2. Subsect.: Pterothecia, Calyptrostylis, Cephaloschoenus, Diplochaete.
Synon. Lepidosperma Schrad.

Sclerochiton Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 27: nov. g. Acanthear. — Par. Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 279.
Meisn. 1843. Comm. p. 367: g. Ruelliear.

Sclerochlaena Spreng., Rchb. vid. *Sclerolaena R. Brown.*

Sclerochloa Palis. 1812. Agrost. p. 97: nov. g. Graminear. (Poa dura L.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 151. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 42. 697. n. 340. — Link 1829. Hdb. I. p. 59.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Chloridear.
Link 1821. En. I. p. 89: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 68. 225.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 101: g. Bromear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 29.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 592: sect. Poae. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 133. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 391.
Link 1827. Hort. I. p. 149: g. Festucacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 998; 1830. Fl. exc. p. 36. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 41. — Scheele 1844. Flora I. p. 59. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 211 (*Schlerochloa*); 1850 in Webb Canar. III. p. 418. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 538.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Eleusinear.
Kunth 1833. Agrost. p. 392; 1838. Berol. II. p. 395: sect. Festucae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 899 *a*. p. 101; 1841. Ench. p. 59. — Koch 1837. Syn. p. 810. Ed. II. p. 936. — Steud. 1854. Glum. I. p. 302.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1384; 1844. Fl. sax. p. 31: g. Poariar.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 444: g. Festucear.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 408: g. Poacear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 367: g. Poëar.
Synon. Sphenopus Trin.

Sclerococcum Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 79: nov. g. Fungor. (Spiloma sphaerale Achar.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 151 (*Sclerorcum*).
Agdh. 1821. Aphor. p. 79: g. Coniomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 525: g. Bactridiear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 172: g. Dermosporior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 40.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 257: g. Apiosporiar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 773. n. 3970: g. Atrichor.

Sclerococcum Fries cont.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 261: g. Sporomycetum entosporor.?
Endl. 1836. Gen. n. 272. p. 23; 1841. Ench. p. 16: g. Apiosporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 303 (err.? *Solenococcum*). — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 226.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 480: g. Sclerotiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor.
Synon. Ostracococcum Wallr.?

Sclerococcus Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Hedyotidear.
= Metabolus Blume.

Sclerocroton Hochstett. 1845. Flora p. 85.
Endl. 1850. Spl. V. p. 91. n. 5836/1: g. Crotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 522: sect. Stillingiae.

Scleroderma Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIV. 150: nov. g. Trichospermor. *Cf.* Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 18 et Leman 1827. Dict. v. 48. p. 151. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 345. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 47.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 31: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 132; 1817. Überbl. p. 34: g. Dermatogasterum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 383. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 519. n. 3498; 1831. Gen. II. p. 771. n. 3952.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Lycoperdor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 581: g. Lycoperdonidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum. — Par. Fries 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 139.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Geoperdinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 560: g. Lycoperdinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 380.
Fries 1825. Pl. homon. p. 136; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 44; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 444: g. Sclerodermeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 208; 1841. Nom. p. 10. n. 392. — Endl. 1836. Gen. n. 331. p. 28; 1841. Ench. p. 17. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 295. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Lycoperdeor.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 1025: g. Trichogastrum. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Sclerodermear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 403: g. Naucogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 96: g. Sclerodermacear.

Scleroderma Pers. cont.
L. R. & Ch. Tulasne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 5. (De fructificatione.)
Lév. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 131. Char. emend.
Bonord. 1851. Hdb. p. 244: g. Sclerodermaceor.
Sclerodermaceae Corda (1828 in Opiz Beitr. p. 637) 1842. Icon. Fung. V. p. 23; 1842. Anl. Mycol. p. LXXVII. 94: fam. Dermatogasterum. Gen.: Hyperrhiza, Melanogaster, Phlyctospora, Ceratogaster, Elaphomyces, Pompholyx, Scleroderma, Calostoma, Diploderma, Mylitta?, Anixia?
Sclerodermacei Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 243: fam. Trichogastrum. Gen.: Ptychogaster, Ceratogaster, Scleroderma.
Sclerodermeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: trib. Lycoperdinear. Gen.: Scleroderma, Polysaccum, Elaphomices.
Sclerodermei Fries 1825. Pl. homon. p. 134: subordo Trichospermor. Gen.: Elaphomyces, Uperrhiza, Polysaccum, Scleroderma, Diploderma, Cauloglossum, Calostoma? — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 9. Gen.: Mitremyces, Cauloglossum, Diploderma, Scleroderma, Pisocarpium, Uperrhiza, Elaphomyces.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 5: div. Trichogastrum. Gen.: Scleroderma, Polysaccum, Hyperrhiza, Elaphomyces.
Endl. 1836. Gen. p. 28; 1841. Ench. p. 17: trib. Trichogasterum. Gen. ut Fries 1829. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 10. Gen. ead. et Ceratogaster, Melanogaster, Ciliciocarpus, Pompholyx, Phlyctospora. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 290.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen.: Scleroderma, Goupilia.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 443: div. Lycoperdaceor. Gen.: Sterrebeckia, Polygaster, Polysaccum, Scleroderma, Phellorina, Favillea, Pachyma, Elaphomyces.
Sclerodermis „Fries“ Lindl. vid. *seq.*
Scleroderris*) Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 324: sect. Pezizae. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 154.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 178: trib. Cenangii.
Fries 1825. Pl. homon. p. 115: subg. Cenangii.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 260 *a*; 1841. Nom. p. 7. n. 280. 2: sect. Cenangii. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 378 *b*. p. 32; 1841. Ench. p. 9. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 335. — Math. 1853. Belg. II. p. 270.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43 (*Sclerodermis*): g. Phacidiaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 201: g. Cenangiaceor. (*Synon. Phlyctidium Wallr.*)
Synon. Ceratospermum Mich.; Ceratospermon Adans.; Ceratostoma Fries.
Sclerodictyon C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 315: sect. Bryi. (B. julaceum Sm.)
Sclerodontium Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 124. t. 145: nov. g. Muscor. frondosor. (Scl. pallidum.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 154.

*) δέῤῥις, tegumentum, pallium.

Sclerodontium Schwägr. cont.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 289: g. Hypnoidear — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 205: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV g. Sciurodeor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 559 (*Schlerodontium*): g. Leucodontinor.
Endl. 1836. Gen. n. 579. p. 56; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 52.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 957: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypnear.
Synon. Neckerae C. Müll. pars.
Sclerogasteres Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 29; 1842. Anl. Mycol. p. LXXXVI. 120: subordo Myelomycetum. Fam.: Alphitomorpheae, Sphaeronemeae, Sphaeriacei, Melanconiaceae, Sporocadeae, Hysteriaceae, Phragmotrichiaceae.
Sclerogastres Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 919: subdiv. Gasteromycor. Gen.: Sphaeria, Lophium, Sphaeronaema, Cytispora, Phoma, Dothidea, Rhytisma, Phacidium, Leptostroma, Hysterium, Actidium.
Scleroglossum „Pers.“ Moug. & Nestl. Exsicc. n. 67.
= Acrospermi Tode pars.
Sclerographium Berkeley 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 209: nov. g. Fungor., Mystrosporio et Graphio aff. (S. aterrimum.)
Sclerolaena R. Brown 1810. Prodr. I. p. 410. Ed. Nees p. 266: nov. g. Chenopodear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4330. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLVII. 568. n. 1049: g. Atriplicear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 154.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 228 (*Sclerochlaena*): sect. Salsolae.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1918. p. 294; 1841. Ench. p. 181.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239 (*Sclerochlaena*): g. Kochiear.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 84: g. Camphorosmear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6371.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 123: g. Panderiear.
Scleroleima Hook. f. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 444. t. 15: nov. g. Compositar., Abrotanellae aff. (S. forsteroides.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 277: g. Hippiear.
Sclerolepis Cassini 1816. Bull. soc. philom. p. 198; 1820. Dict. v. 16. p. 10: nov. g. Eupatoriear. (Sparganophorus verticillatus Michx.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31.
Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 227; 1827. v. 48. p. 155; 1830. v. 60. p. 585: g. Agera-

Sclerolepis Cassini cont.
tear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 156. — DC. 1836. Pr. V. p. 114. — Endl. 1838. Gen. n. 2262. p. 367; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (124). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 65. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2236: g. Eupatorinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3818: g. Steviear.
Synon. Sparganophorus Michx.

Sclerolepis Monnier 1829. Hierac. p. 81: nov. g. ex typo Hieracii Kalmii L. *Cf.* Flora Lit. I. p. 76.
= Pachylepis Less.

Sclerolobium*) Vogel 1837. Linnaea XI. p. 395: nov. g. Sebipirear. (S. denudatum, macrophyllum, paniculatum?)
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 72: g. Leptolobiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 809; 1846. V. p. 551. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Endl. 1841. Gen. n. 6755. p. 1311; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6055. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 123.
Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Cassiear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 60. t. 266.

Scleroma Fries 1838. Epicr. p. 387: g. Agaricinor., inter Lentinos et Panos intermedium.
Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. III. 1. p. 35: trib. Lentini.

Scleromitra Corda 1829 in Sturm Flora Fung. II. p. 59. t. 27: nov. g. Sclerotiacear. (S. coccinea.) *Cf.* Flora Lit. II. p. 44.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 431: g. Mitrulinor.
Corda 1842. Mycol. p. 193: g. Clavariacear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 141: g. Stilbinor.

Scleromitrion Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 412: sect. Hedyotidis. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 801 (*Scleromitrum*). — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3240 *f.* p. 549; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 160 (115). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 6. — Walp. 1843. Rep. II. p. 497.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 185.
Synon. Hedyotis Roxb.
= Ereicotis DC.? (Lindl.)

Scleromitrum Wittst. vid. *praeced.*

Scleromycetes Link 1824. Spec. I. p. IV: ordo Cryptophytor.
Fries 1823 in Kunze & Schmidt Mykol. Heft. II. p. 31. (Synops.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. XII. 2: ordo Fungor. Fam.: Hypoxyleae.

*) σκληρός, λόβιον: ob lignosam leguminis consistentiam.

Scleroneuron Hampe 1847. Linnaea XX. p. 96: sect. Hookeriae. (H. bipinnata Spr.)
= Eupilotrichum C. Müll.

Scleroon Benth. .... Bot. Regist. n. ser. Nr. 15. Pl. misc. p. 65.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 692: g. Symphoremear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 697: g. Viticear.?

Scleropappus „Jacq." Brongn. Énum. genr. p. 42: vid. *Sclerocarpus Jacq.*

Sclerophora Chevall. 1826. Paris. p. 315. t. 9. f. 19.
= Coniocybe Achar.

Sclerophoreae Körber 1846. Lich. germ. sp. p. 4: fam. Lichenum heteromericor. acramphiblastor. Gen.: Calycium, Trachylia, Coniocybe.

Sclerophylaceae Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 57: fam. Nolaneis proxime aff. Gen.: Sclerophylax. *Cf.* Griseb. 1849. Arch. f. Nat. II. p. 428.

Sclerophylax Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 18: nov. g. Sclerophylacear. (S. spinescens, Arnottii et Gilliesii.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 147: g. dubiae affinitatis, ad Ehretiaceas, Nolanaceas et Myoporaceas accedens.

Sclerophyllum Gaudin 1829. Fl. Helv. V. p. 4. 47: nov. g. Cichoracear. (Prenanthes pulchra DC.)
= Berinia Brign.

Sclerophyton Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 14. f. 8: nov. g. Graphidear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 156. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 274. — Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 384; 1841. Nom. p. 15. n. 541. — Endl. 1836. Gen. n. 133. p. 12; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XI. p. 438; 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 61.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Graphidar.
Synon. Emblemia Pers. (Mont.)

Scleropoa Dumort. ex Steud. Nomencl. II. p. 544: subg. Poae. (Poa rigida L.)
Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 431: g. Festucear.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 409: g. Festucacear. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 555.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 347: g. Eubromear.

Scleropodium Bruch & Schimp. 1853. Bryol. eur. VI: nov. g. Hypnacear. (Hypnum caespitosum, illecebrum.)

Scleropteris Scheidweiler 1839 in Otto's Gartenz. VII. Nr. 51. p. 407: nov. g. Orchidear. (S. flava.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 1429/1. p. 1364; 1841. Ench. p. 111: g. Vandear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 374 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 183: g. Orchidacear. minus notum.
= Cirrhaea Lindl.? (Rchb. Xen. Orchid. p. 110.)

Scleropteris Endl. vid. *Scolecopteris Zenk.*

Scleropus Schrad. 1835. Ind. sem. h. Gotting.: nov. g. ex typo Amaranti crassipedis Schl. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 102 et Linnaea 1837. Litt. p. 89.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1971/2. p. 1377; 1841. Ench. p. 185: g. Amarantear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231).
Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6414: g. Desmochaetear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 271: g. Aërvear.

Scleropyron „Arnott in Mag. zool. and bot. II. p. 550" Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 105. n. 2079/1: g. Santalacear. (Wight Icon. I. t. 241.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788.
Meisn. 1843. Comm. p. 368: g. Santalear.
= Pyrularia Michx. (A. DC. Pr. XIV. p. 628.)

Scleropyrum „Arnott in Journ. zool. and bot. Nr. 12" Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 12. t. 241: g. Santalacear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 778.
Conf. *Scleropyron.*

Sclerosarcus Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 138: sect. Davyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 790.

Sclerosciadium „Koch mss." DC. 1829. Mém. V. p. 43; 1830. Prodr. IV. p. 140: nov. g. Seselinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 305. — Tausch 1834. Flora I. p. 356. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5413. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4421. p. 773; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 791. n. 4102: g. Smyrniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Sclerosporangiae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): ordo Homorganor. rhizosporor. Fam.: Tuberaceae, Xylomaceae.

Sclerostemma „Schott mss." Mertens & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 749: sect. Scabiosae. — Par. Koch 1836. Syn. p. 345. Ed. II. p. 378. — Kunth 1838. Berol. I. p. 319. — Walp. 1843. Rep. II. p. 534. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 181. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 78. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 416. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 141.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1933*a*; 1831. Fl. exc. p. 194; 1841. Nom. p. 72. n. 2691. 2: sect. Asterocephali.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 314: g. Scabiosear.
= Scabiosae Röm. & Schult. pars.

Sclerostomum Wilson 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 93: sect. Hedwigiae. (H. Humboldtii Hook.)

Sclerostylis Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 133; 1828. Fl. jav. Praef. p. VIII: nov. g. Aurantiacear. (Glycosmidis et Limoniae sp.) *Cf.* Linnaea I. p. 664. — Par. G. Don

Sclerostylis Blume cont.
1831. Gen. syst. I. p. 584. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 458.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 93: g. Limonear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 46 (34). — Endl. 1840. Gen. n. 5503. p. 1044; 1841. Ench. p. 548. — Walp. 1842. Rep. I. p. 380; 1843. II. p. 804. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 355.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314: g. Bergerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8101: g. Limoniear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 32. 43. (restrict.)

Sclerotaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 79: fam. Tectigraniae. Gen.: Xyloma, Sclerotium, Melanconium, Aegerita, Coryneum, Fusarium, Tubercularia, Onygena.

Sclerotamnus Poir. vid. *seq.*

Sclerothamnus R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 16 (Verm. bot. Schr. II. p. 468): nov. g. Leguminosar. (S. microphyllus.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 351. n. 1655; 1830. Gen. I. p. 367. n. 1852. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 158 (*Sclerotamnus*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1509.
Bronn 1822. Diss. p. 131: g. Sophorear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 109. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4064. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 121. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 83: g. Pultenaear.
Endl. 1840. Gen. n. 6447. p. 1259; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5941: g. Pultenaeear.

Sclerotheca A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 356: nov. g. Lobeliear. (Lobelia arborea Sparm.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1392. n. 3061/1; 1841. Ench. p. 263. n. 3057/1. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3986. — Meisn. 1843. Comm. p. 364. — Walp. 1843. Rep. II. p. 708 (sph. *Solerotheca*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.

Sclerothrix Presl 1833. Symb. bot. II. p. 3. t. 53: nov. g. Loasacear. (S. fasciculata.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 232; 1841. Nom. p. 160. n. 6245: g. Mentzeliear.
Meisn. 1838. Gen. p. 125 (90): g. Loasear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5114. p. 931; 1841. Ench. p. 486. — Walp. 1846. Rep. V. p. 777. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745.

Sclerothrix Kütz. 1833. Alg. aq. dulc. Germ. Dec. II: nov. g. Algar. (Flora 1833. II. p. 695), serius Hypheothrici insertum, tandem restitutum.
Menegh. 1838. Cenn. p. 26: g. Nostochinear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. (Flora 1843. p. 92.)
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 583: g. Nostochinar. genuinar. (p. 236 *Sclerotrichia Rchb.*)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 319. n. 217: g. Scytonomear. (Hypheothrix Callitrichae Kütz.)

Sclerotia Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 15: cohors Fungor. Gen.: Sclerotium, Erysibe, Dothidea, Stegia, Depazea, Leptostroma, Actidium, Xyloma, Schizoderma.

Sclerotiaceae Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 239: ordo Hymenomycetum. Gen.: Pachyma, Pyrenium; Acrospermum, Sclerotium, Rhizoctonia, Periola, Acinula, Spermoedia.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: fam. Mycetum. Gen.: Sphaeriomorphium, Coccopleum, Spermomorphium, Elpidophora, Sclerotium, Excipula, Schizoderma, Rhytisma, Leptostroma.

Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 17: fam. Myelomycetum. Gen.: Cenococcum, Sclerotium.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 225: subfam. Lycoperdaceor. (ampliata.) Sect.: Perisporiacei, Sclerotiacei, Tuberacei.

Math. 1853. Belg. II. p. 401: trib. 4 Gasteromycetum. Sect.: Scleroticeae, Apiosporeae.

Sclerotiacei Fries 1821. Syst. myc. I. p. LV: ordo Hymenomycetum. Gen.: Erysiphe, Rhizoctonia, Sclerotium, Tuber.

Fries 1825. Pl. homon. p. 153: ordo Gasteromycetum. Trib.: Rhizogonei, Apiosporii, Sclerotii, Perisporii.

Rchb. 1828. Consp. p. 8 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Gasteromycetum. Divis. ut Fries 1825.

Endl. 1836. Gen. p. 23; 1841. Ench. p. 16: subordo Gasteromycetum. Trib.: Sclerotiei, Rhizogonei.

Rchb. 1841. Nom. p. 8: div. Lycoperdaceor. Subdivis.: Apiosporei, *genuini* (sect.: Spermoediei, Sclerotiei, Rhizoctonei), Tuberacei.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 238: sect. Sclerotiacear. Subsect.: Sclerotiei, Rhizoctonei.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 476: ordo Gymnomycetum. Gen.: Nematelia, Dermosporium, Xylochoeras, Epicoccum, Acinula, Aegerita, Sclerotium, Rhizoctonia?, Spermodermia, Sclerococcum.

Sclerotideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 588: div. Sarcothecear. Gen.: Erysibe, Thanatophytum, Sclerotium.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Tuberariear. Gen.: Rhizoctonia, Mylitta, Anixia, Acrospermum, Sclerotium, Periola, Acinula, Erysiphe, Lasiobotrys, Perisporium, Apiosporium, Chaetomium, Coniosporium, Onygena.

Scleroticae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 565: div. Lycoperdacear. Gen.: Rhizoctonia, Pachyma, Sclerotium, Spermoedia, Xyloma, Periola, Acinula, Pyrenium.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 776: div. Gastromycetum. Gen.: Sclerotium, Rhizoctonia, Pachyma, Melanostroma, Spermoedia.

Math. 1853. Belg. II. p. 401: sect. Sclerotiacear. Gen.: Rhizoctonia, Rhizomorpha, Erysiphe, Perisporium, Coniosporium, Sclerotium.

Sclerotici Endl. 1836. Gen. p. 24; 1841. Ench. p. 16: trib. Sclerotiaceor. Gen.: Sclerotium, Dryophilum, Acrospermum, Pistillaria, Periola, Acinula.

Sclerotiei Endl. cont.

Rchb. 1841. Nom. p. 8: sect. Sclerotiaceor. Gen.: Sclerotium, Dryophilum, Acrosporium, Periola, Acinula. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 238. Gen.: Sclerotium, Acrospermum.

Sclerotii Fries 1825. Pl. homon. p. 157: trib. Sclerotiaceor. Gen.: Periola, Acinula, Acrospermum, Sclerotium, Phylloedia?, Spermodermia? — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 8. Gen. ead. et Neuroedium.

Sclerotium Tode 1790. Fung. meckl. I. p. 2: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 158. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1481. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 20. 252. — Mart. 1817. Erlang. p. 390. (in sect. aëreor. et hypogaeor.)

Pers. 1797. Tent. p. 15: g. Sarcocarpi.

Pers. 1801. Syn. p. XIII. 119: g. Sarcocarpor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 360. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46.

DC. 1805. Franç. II. p. 276: g. Angiocarpor. *Cf.* DC. 1815 Mém. Mus. II. p. 401.

Link 1809. Berl. Mag. III. p. 34: g. Gastromycor.

Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 203.

Nees 1816. Syst. p. 148; 1817. Überbl. p. 38: stirps Sclerotii.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Sclerotior. — Simil. Fries 1825. Pl. homon. p. 158. — Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 150 b.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. LV; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 477: g. Sclerotiaceor. Sect. (1849): Alytum.

Agdh. 1821. Aphor. p. 85: g. Gasteromycetum abnormium.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 590: g. Sclerotidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Sclerotacear.

Fries 1823. Syst. myc. II. p. 246; 1828. Elench. II. p. 40: g. Sclerotiacear. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180. — Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 18. Sect.: Coccocystis, Sarcidium, xylomacea, vera.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 566: g. Scleroticar. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 776. n. 3996. — Math. 1853. Belg. II. p. 409.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 995: g. Hymenomycor. anomalor.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 520. n. 3499: g. Dermatogasterum.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 137: g. Asporomycetum gongromorphor.

Endl. 1836. Gen. n. 281. p. 24; 1841. Ench. p. 16: g. Scleroticor. Sect.: Pompholyx, Phlyctene, Coccopleum, Spermomorphia, Rhizogonia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 317. Sect. fere eaed. et Sarcidium. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 238. Sect.: Spermoedia, Sclerotium.

Sclerotium Tode cont.
Lév. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 218.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 80: g. Isariear. *Synon.* Astoma Gray.

Sclerotium Nees 1816. Syst. p. 147; 1817. Überbl. p. 38: g. prototypum Vegetabilium fungosor. Stirpes: Erysibe, Thanatophytum, Sclerotium.
= Sclerotideae Gray.

Sclerotrichia Rchb. 1841. Nomencl. in E-mend. p. 236: nomen pro *Sclerothrice Kütz.* (non Presl) propositum.

Scleroxylon Steud. vid. *seq.*

Scleroxylum Willd. 1809. Berl. Mag. III. p. 57; 1809. Enum. p. 249: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Sideroxylon mite W.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 544 (*Scleroxylon*).
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 504: sect. Manglillae.
= Myrsine A. DC.

Scobedia Labill. ex Steud. Nomencl. II. p. 544: g. Labiatar. (Sc. asperifolia.) Quid? *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 802.

Scobiflorae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: series Graminear. Trib.: Triticeae, Bambusaceae, Bromaceae, Cynosureae, Poaceae, Avenaceae, Arundinaceae.

Scodellina „Mich." Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 598. 668: nov. g. Pezizadear. (Peziza leporina, onotica, aurantia, umbrina, alutacea Pers., etc.)
= Helvellopsis Endl.

Scoleciocarpus*) Berkeley 1843. Lond. journ. bot. II. p. 420 (Bot. Zeit. 1844. p. 269): nov. g. Lycoperdaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505 (*Scoleiocarpus*); 1849. ibid. VIII. p. 488: g. Polysacceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 443: g. Lycoperdineor.

Scolecopteris**) Zenker 1837. Linnaea XI. p. 509 (t. 10 err. *Smolecopteris*): nov. g. Marattiacear.? foss. (Sc. elegans.)
Endl. 1841. Spl. I. n. $687/_1$. p. 1351; 1841. Ench. p. 43 (err. *Scleropteris*): g. Filicum foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 76.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 39; 1846. Chlor. prot. p. XXXIV: g. Danaeacear.
Presl 1845 in Corda Fl. Vorw. p. 93; 1847. Suppl. Pterid. p. 288: g. Angiopteridear.

Scolecotrichum Spreng. 1827. Syst. IV. p. 554. n. 3559; 1831. Gen. II. p. 781. n. 4039: g. Byssoideor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 285: g. Hyphomycetum episporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 179: g. Dematieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.
= Scolicotrichum Kunze.

Scoleiocarpus Lév. vid. *Scoleciocarpus Berk.*

Scoliciosporum Massalongo 1853. Mem. lich. p. 104: nov. g. Lichenum. (Lecidea holomelaena.)

*) σκωλήκιον, vermiculus.
**) σκώληξ, vermiculus.

Scoliciosporum Massalongo cont.
Körb. 1855. Syst. Lich. germ. p. 268: g. Lecidinar.
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Eulecideinar. (*Synon. Toninia Mass.*)
Arnold 1858. Flora p. 474: g. Lecidear.

Scolicotrichum Kunze 1817. Mykol. Heft. I. p. 10. t. 1. f. 6: nov. g. Fungor. (Sc. virescens.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 164.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Sporotrichor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 80: g. Mucedinum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 538: g. Sporotrichear.
Link 1824. Spec. I. p. 35: g. Hyphomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 182: g. Trichothecior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 123.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Conopleacear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 449: g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 212. p. 18; 1841. Ench. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 9; 1842. Mycol. p. 33: g. Bactridiacear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 503: g. Myxothriceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Myrothecieor.?
Bonord. 1851. Hdb. p. 81: g. Acmosporiaceor. (*Synon. Amphitrichum Nees.*)
Conf. Scolecotrichum Spreng.

Scoliostoma Klotzsch 1835. Linnaea X. p. 315: trib. Ericae. (E. ciliaris L., etc.)

Scolobus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 259: nov. g. pro Cytiso rhombifolio Pursh indicatum.
= Thermopsis R. Brown.

Scolochloa*) Mertens & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 374. 528: nov. g. Avenacear. (Arundo Donax L.) — Par. Link 1827. Hort. I. p. 136.
Gaud. 1828. Helv. I. p. 67. 201: g. Graminum.
Link 1829. Hdb. I. p. 53: g. Graminear.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 41: g. Melicacear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 393: g. Poëar.
= Arundo Linn. (emend.)

Scolopacium**) Ecklon & Zeyh. 1835. Enum. pl. Afr. austr. p. 59: nov. g. Geraniear. (Geranium incarnatum L.)
= Erodium L'Herit.

Scolopendria Magnol. 1720. Char. pl. lib. 3. p. 4. (Linn. 1747. Class. pl. p. 400.)
= Biserrula Linn.

Scolopendria Rumph. 1750. Amboin. VI. p. 86. t. 37. f. 3.
= Ophioderma Blume.

Scolopendriae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 2. 14: div. Filicum. Gen.: Scolopendrium.

*) σκῶλος, aculeus.
**) σκολόπαξ, scolopax.

Scolopendrieae Presl 1836. Pterid. p. 118: sect. Aspleniacear. Gen.: Scolopendrium, Antigramma, Camptosorus.

Fée 1852. Gen. Fil. p. 37. 209: trib. Cathetogyratar. Gen.: Scolopendrium, Antigramme, Camptosurus.

Scolopendrites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 174. 276: g Pecopteridum.
= Crematopteris Schimp.

Scolopendrium*) Adans. 1763. Fam. II. p. 20: g. Filicum.
= Lingua cervina Tourn.

Scolopendrium Smith 1791. Mem. Ac. Torin. V. p. 410; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 99: nov. g. Filicum. (dorsiferar.) — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 301. — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 4. 61 (annulatar.); 1806. Syn. p. 89. (gyratar.) — DC. 1805. Franç. II. p. 551; 1815. V. p. 238. — Willd. 1809. En. p. 1073; 1810. Sp. V. p. 348. n. 1968. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 51. — Leman 1827. Dict. v. 48. p. 169. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 69. n. 3255; 1831. Gen. II. p. 722. n. 3648. (verar.) — Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 282.

Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 28: sect. Aspleni.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 14: g. Scolopendriar.

Link 1822. En. II. p. 461: g. Polypodear.

Agdh. 1822. Aphor. p. 117: g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. Enum. p. 182. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 48. — D. Don 1825. Nepal. p. 9. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Meyer 1836. Chlor. hannov. p. 675. — Genth 1836. Nass. I. p. 39. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 4. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 984. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 318. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 522. (indusiatar.) — Math. 1853. Belg. II. p. 16.

Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 261: g. Asplenicar. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. — J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 406. — Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.

Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 702: g. Asplenioidear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.

Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 25: g. Phyllopteridum.

Endl. 1836. Gen. n. 634. p. 62; 1841. Spl. I. p. 1348; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodicar. Sect. (1841): Euscolopendrium, Antigramma, Camptosorus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1021. Sect. fere eaed. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 638. (indusiatar.)

Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 67: g. Aspleniacear.

Synon. Phyllitis Rupp.; Glossopteris Rafin.

*) σκολοπένδριον Theophrasto idem ac ασπλήνιον.

Scolopendrium Roth 1800. Tent. fl. germ. III. p. 47: g. Filicum (annulatar.) ampliat. Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 7. 49.
= Scolopendrium Smith, Ceterach Willd. et Asplenii sp.

Scolopendrium Presl 1836. Pterid. p. 118: g. restrict. Scolopendriear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 209.

Link 1841. Fil. h. Berol. p. 86: g. Aspleniacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1021. 1: sect. Scolopendrii.

J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 172: g. Asplenicar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
= Euscolopendrium Endl.

Scolopia*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 335. n. 846: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 981. n. 979. — Pers. 1807. Ench. II. p. 33. n. 1216. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 172.

Gmel. 1791. Syst. p. 793: g. Polyandr. Monogyn.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 792: g. Aurantior.

Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 244: g. Laeticear.
= Phoberos Lour.

Scolosanthus**) Vahl 1796. Eclog. I. p. 11. t. 10.

Willd. 1797. Sp. I. p. 607. n. 192: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 130. n. 249. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 18.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 436: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 60. 371. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 9. 173. n. 450. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 377. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 173. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 91. n. 452. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 600: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2024. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Lentaginiae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Pavettear.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 205: g. Guettardacear.

Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Guettardear.

DC. 1830. Pr. IV. p. 484: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 569. — Endl. 1838. Gen. n. 3164. p. 535; 1841. Ench. p. 272.

Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2814: g. Psychotriear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Synon. Antacanthus Rich.

Scolospermum Lessing 1830. Linnaea V. p. 152: nov. g. Ambrosiear. (Sc. baltimoroides.)

*) σκόλοψ, aculeus, hasta.
**) σκῶλος, spina, aculeus.

Scolospermum Lessing cont.
Less. 1832. Syn. p. 219: g. Baltimorear.
DC. 1836. Pr. V. p. 509: g. Millericar. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2469. p. 401; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3010. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Scolymanthus „Willd. herb." Endl. 1838. Gen. n. 2962 *b* ε. p. 493; 1841. Ench. p. 249: subsect. Homoianthi.
Synon. Homoeanthus Spreng.; Isanthus DC.

Scolymeae Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: subdiv. Lactucear. Archetypar. Gen.: Scolymus, Myscolus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen. ead.
Less. 1832. Syn. p. 126: subtrib. Cichoracear. Gen. ead. — Par. Koch 1837. Syn. p. 415. Ed. II. p. 476. Gen.: Scolymus. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 75. Gen. id. — Endl. 1838. Gen. p. 493; 1841. Spl. I. p. 1387; 1841. Ench. p. 249. Gen. ut Cass. et 1841 Diplostemma. — Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). Gen. ut Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. Gen. ead.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5: sect. Lactucear. Gen. ut Endl. 1841.
Rchb. 1841. Nom. p. 96: subdiv. Hypochaeridear. Gen.: Diplostemma, Scolymus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 34: subtrib. Chicoracear. Gen.: Scolymus.

Scolymocephalus Herm. Dendr. t. 9.
= Protea L. et Mimetes Salisb.

Scolymus*) Tourn. 1700. Inst. p. 480. t. 273: g. pl. class. XIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 204. Ed. Hall. 1745. p. 210: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 218: g. Cichoracear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 171. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 493. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 379. — DC. 1805. Franç. IV. p. 68; 1815. V. p. 455. — Link 1829. Hdb. I. p. 813.
Linn. 1737. Gen. p. 237. n. 613; 1737. Cliff. p. 388; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 244; 1753. Sp. II. p. 813; 1759. Syst. ed. X. p. 1198. n. 826; 1763. Sp. ed. II. p. 1143; 1764. Gen. ed. VI. p. 407. n. 922; 1767. Syst. ed. XII. p. 527: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 602; 1784. Syst. p. 722. — Reich. 1778. Gen. p. 405. n. 1001. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 536. n. 1252. — Gmel. 1791. Syst. p. 1184. — Pers. 1797. Syst. p. 762; 1807. Ench. II. p. 380. n. 1789. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1630. n. 1428; 1809. En. p. 834. — Link 1822. En. II. p. 295.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 244. n. 1005: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 550.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.
Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 120; 1777. Intr. p. 123. — Batsch 1802. Tab. p. 250. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 173.
Hill 1769. Ht. kew. p. 44: g. Ligulatar.
Neck. 1790. El. I. p. 52. n. 93: g. Glossariphytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 583; 1826. Syst. III. p. 672. n. 2909; 1831. Gen. II. p. 648. n. 3268: g. Cichorear. — Par. D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307.
Cass. 1818. Bull. soc. philom. Mars p. 33. Subgen.: Scolymus, Myscolus.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 280: g. Carduacear.
Koch 1837. Syn. p. 415. Ed. II. p. 476: g. Scolymear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 75. Sect.: Euscolymus, Myscolus. — Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3754. Sect. ut Cass. 1818. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 770. — Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 386. Subgen. ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 390.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 257: g. Liguliflorar.

Scolymus Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mars p. 33: subg. Scolymi. (S. maculatus L.)
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 60; 1825. v. 34. p. 56: g. restrict. Lactucear. (Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Scolymear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Less. 1832. Syn. p. 126. — Endl. 1838. Gen. n. 2965. p. 493; 1841. Ench. p. 249. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2181: g. Scorzonerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3754. 1: sect. Scolymi.
= Euscolymus DC.

Scoparia*) Linn. 1753. Sp. I. p. 116; 1759. Syst. ed. X. p. 896. n. 134; 1762. Sp. ed. II. p. 168; 1764. Gen. ed. VI. p. 58. n. 143; 1767. Syst. ed. XII. p. 123: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 132; 1784. Syst. p. 157. — Reich. 1778. Gen. p. 58. n. 149. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 77. n. 187. — Lour. 1790. Coch. I. p. 71. — Gmel. 1791. Syst. p. 254. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 29; 1818. Fl. cap. I. p. 538. — Pers. 1797. Syst. p. 163; 1805. Ench. I. p. 141. n. 289. — Willd. 1797. Sp. I. p. 652. n. 223; 1809. En. p. 162.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 118.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 357. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 273. — Hedw. 1806. Gen. p. 57. n. 266. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 5. 106. n.

*) σκόλυμος Veterum Cardui edulis species.

*) Nomen ab usu oeconomico ad scopas. (Linn. Phil. bot. p. 168.)

Scoparia Linn. cont.
431. — Link 1821. En. I. p. 124. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 188. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 82. n. 404. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 433.
Gled. 1764. Syst. p. 168. n. 687: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 780.
Scop. 1777. Intr. p. 188: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 251. t. 53. f. 10 (dulcis).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 267; 1789. Phil. Bot. I. p. 113.
Neck. 1790. El. II. p. 7. n. 613: g. Darinyphytor.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 443. Ed. Nees p. 299: g. Scrophularinar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 354. — Kunth 1823. Syn. II. p. 116.
Schrank 1814. Denkschr. Ak. Münch. f. 1813. p. 72. Char. emend.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 478; 1825. Syst. I. p. 423. n. 439: g. Gentianear.
Cham. & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 602: g. Scrofularinar. Char. emend.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3139: g. Linderniacear.
Link 1829. Hdb. I. p. 822: g. Scopariacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Antirrhinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 172: g. Buddlejear.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 114: g. Sibthorpiacear.? — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 642.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5: g. Veronicear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3973. p. 687; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Walp. 1845. Rep. III. p. 331. 968.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204: g. Scoparinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4485: g. Sibthorpicar. — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 431. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 699.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.
Synon. Samoloides Boerh.; Tupeicava Pis.; Kreidek Adans.

Scopariaceae Link 1829. Handb. I. p. 822: subordo Personatar. Gen.: Scoparia.

Scoparinae Rchb. 1837. Handb. p. 204: subdiv. Lysimachiear. Gen.: Scoparia, Sphaerotheca.

Scopinella Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor., antea *Scopulina Lév.*, non Dumort.

Scopola Medic. vid. *Scopolia Jacq.*

Scopolia Adans. 1763. Fam. II. p. 419: g. Lunariar.
= Ricotia Linn.

Scopolia*) Jacq. 1764. Observ. I. p. 32. t. 20.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 72 (*Scopola*).

*) Dicat. Joh. Ant. Scopoli, prof. tandem Paviensi.

Scopolia Jacq. cont.
Mönch 1794. Meth. p. 462: g. Petalostemonis.
Willd. 1797. Sp. I. p. 1115. n. 413: g. Pentandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 178; 1829. Hdb. I. p. 559: g. Solanear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 509. Ed. II. p. 585. — Brongn. 1843. En. genr. p. 58.
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3280: g. Daturear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Nicotianear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 470.
Endl. 1839. Gen. n. 3849. p. 664; 1841. Ench. p. 331: g. Hyoscyamear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4732. — Walp. 1845. Rep. III. p. 22. 954. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 185. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 552. Sect.: Datora, Physochlaina, Anisodus, Scopolia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Synon. Scopolina Schult.; Anisodus Link; Physochlaina Don; Whitleya Sweet; Belenia Decne.

Scopolia Forst. 1776. Char. gen. p. 139. t. 70: nov. g. Polygam. Dioec. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 742. n. 1607.
Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.
= Griselinia Forst.

Scopolia Linn. f. 1781. Suppl. p. 60. n. 1425: g. Gynandr. Octandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 825. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 609. n. 1385. — Pers. 1797. Syst. p. 870.
Juss. 1789. Gen. p. 438: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 279. n. 1121.
Gmel. 1791. Syst. p. 630: g. Octandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 364.
C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 355: g. Daphnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
= Eriosolena Blume.

Scopolia Smith 1790. Ic. II. 34. (Rees Cyclop.)
Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 379; ed. 1832. I. p. 616: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 779. n. 849: g. Terebinthacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1167.
= Toddalia Juss.

Scopolina Schultes 1794. Fl. Östr. II. p. 335. n. 844: nov. g. ex typo Hyoscyami Scopoliae L.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXIII. 312. n. 699: g. Solanear. — Par. Mert. & Koch 1827. Deutschl. Fl. II. p. 9. 226. — Koch 1837. Syn. p. 509. Ed. II. p. 585.
Bartl. 1830. Ord. p. 194: g. Solanacear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 388: g. Daturear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Hyoscyamear.
= Scopolia Jacq.

Scopolina „Dumort.“ Nees Syn. Hepat. p. 488 in synon. Pelliae: vid. *Scopulina Dumort.*

Scopularia Chauvin 1842. Rech. p. 122.
= Chamaedoris Mont.

Scopularia Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. (n. ser. VII.) n. 1701; 1835. Orchid. gen. p. 303: nov. g. Ophrydear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1522. p. 209; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1864. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Holotrichidar.

Scopularia Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 133: nov. g. Stilbinor. (S. venusta.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 160.

Scopulina Dumort. 1822. Comm. bot. p. 115: nov. g. Jungermanniacear. Lemniscear. (Jung. epiphylla, endiviaefolia.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Blasiear.
Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 87: g. Scopulinear.
= Pellia Raddi.

Scopulina Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 287: nov. g. Sphaeropsideor. (Sphaeria barbata Pers.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 396: subg. Ceratostomatis.
Synon. Scopinella Lév.

Scopulineae Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 83: subtrib. Blasiacear. Gen.: Echinogyna, Aneura, Scopulina.

Scoras Rchb. vid. *Scorias Fries.*

Scordium „C. Bauh.“ Rupp. 1718. Fl. jen. p. 214. Ed. Hall. 1745. p. 220: g. pl. class. IX.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 314; 1841. Nom. p. 107. n. 4160. 1: sect. Teucrii. — Par. Benth. 1835. Labiat. p. 678; 1848 in DC. Pr. XII. p. 585. — Koch 1837. Syn. p. 576. Ed. II. p. 662. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 866. — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *g.* p. 632; 1841. Ench. p. 309. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 148. — Walp. 1845. Rep. III. p. 913. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 443. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 709.

Scoria Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 350): nov. g. pro Juglandis speciebus indicatum. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 803 (*Scorias*).
= Carya Nutt.

Scoriadei Fries 1825. Pl. homon. p. 171: trib. Tubercularinor. Gen.: Scorias, Ceratium, Epichysium, Dacrina.
Rchb. 1828. Consp. p. 4: div. Tubercularinor. Gen. ead.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: trib. Aleurineor. Gen.: Ceratium, Dacrina, Epichysium?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 465: div. Isariaceor. Gen.: Scorias, Gliotrichum, Glutinium, Dacrina.

Scorias*) Fries 1825. Pl. homon. p. 171; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: nov. g. Scoriadeor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 194. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 46 (*Scoras*). — Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 132 (ex emend. Montagnei).
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 290: g. Cephalotrichcor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 265. p. 22; 1841. Ench. p. 15 (sphalm. *Secrias*). — Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 222.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 170: g. Isariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Isariaceor.
Mont. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 303. Char. emend.

Scorias „Raf.“ Wittst. vid. *Scoria Rafin.*

Scorodenia Rchb. vid. *Scorodonia Ray.*

Scorododendron Blume 1847. Rumphia III. p. 149: nov. g. Melicoccear. (Erioglossum alliaceum Span.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 211: g. Sapindear.

Scorodon Koch 1837. Syn. p. 716. Ed. II. p. 828: sect. Allii. (A. moschatum, strictum, sativum, Ophioscorodon, etc.) — Simil. C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 237. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 210.
= Moly Rupp.

Scorodonia**) Ray 1686. Hist. pl. I. p. 5.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 220: g. pl. class. IX.
Adans. 1763. Fam. II. p. 188: g. Labiatar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 370. — — Link 1829. Handb. I. p. 458. — Pfeiff. 1847. Fl. Niederh. I. p. 365.
Schreb. 1774. Vertic. gen. p. 20: sect. Teucrii. — Par. Benth. 1835. Labiat. p. 674; 1848 in DC. Pr. XII. p. 582. — Koch 1837. Syn. p. 576. Ed. II. p. 662. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 865. — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *f.* p. 631; 1841. Ench. p. 309. — Walp. 1845. Rep. III. p. 911. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 710.
Mönch 1794. Meth. p. 384: g. Petalostemonis. *Cf.* Tausch 1828. Flora I. p. 323.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2850: g. Nepetear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Ajugear.
Seringe 1830. Bull. bot. I. p. 311. Monogr. *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 87.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 315: g. Bugulear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 221: g. Ajugoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 4163 (*Scorodenia*): g. Teucriear.
Synon. Scrotalaria Ser.

Scorodonia***) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 507: sect. Scrophulariae. (Steud. Nom. II. p. 514. 547: *Sarodonia.*) — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 165. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 304. — Ledeb. 1849. Ross.

*) *σκόρδιον* Graecorum.

*) *σκωρία*, retrimentum, scoria.
**) adjectivum ex *σκόροδον*, allium.
***) Nomen ab odore alliaceo.

Scorodonia G. Don cont.
III. p. 215. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 707.

Scorodoprasum*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 24. t. 24: g. pl. class. IX.
= Porrum Tourn.

Scorodosma Bunge 1846. Del. sem. h. Dorp. p. III; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 309: nov. g. Peucedanear. (Asa foetida Kämpferi?) *Cf.* Linnaea 1851. p. 157. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 351.

Scorodoxylum Nees 1846 in Benth. Pl. Hartweg. II. p. 236: nov. g. Acanthacear. (S. Hartwegianum.) Char. generis desideratur!
= Arrhostoxylum Mart.

Scorpioides Tourn. 1700. Inst. p. 402. t. 226: g. pl. class. X.
Adans. 1763. Fam. II. p. 328: g. Coronillar.
Medic. (Vorles. II. p. 370) 1789. Vorles. IV. 1. p. 352; 1789. Phil. Bot. I. p. 209.
Mönch 1794. Meth. p. 119: g. Thalamostemonis.
= Scorpiurus Linn.

Scorpioides Roussel 1796. Fl. Calvad.: nov. g. Algar. (Fucus scorpioides Auct.)
= Bostrychia Mont.

Scorpioides Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 106: sect. Stenocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 481.

Scorpiris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 16; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 91: subg. Iridis. (I. scorpioides Desf.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 817.
= Thelysia Salisb.

Scorpiura Stackhouse 1816. Nereis brit. ed. alt.: nov. g. Algar. (Fucus amphibius Turn.) *Cf.* Spreng. 1820. N. Entd. I. p. 97 et Leman 1827. Dict. v. 48. p. 203.
= Bostrychia Mont.

Scorpiurus**) Linn. 1737. Gen. p. 226. n. 597; 1737. Cliff. p. 364; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 233; 1753. Sp. II. p. 744; 1759. Syst. ed. X. p. 1169. n. 792; 1763. Sp. ed. II. p. 1050; 1764. Gen. ed. VI. p. 382. n. 886; 1767. Syst. ed. XII. p. 492: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 75. — Murr. 1774. Syst. p. 558; 1784. Syst. p. 671. — Reich. 1778. Gen. p. 380. n. 959. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 504. n. 1201. — Gmel. 1791. Syst. p. 1120. — Pers. 1797. Syst. p. 709; 1807. Ench. II. p. 315. n. 1732. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1159. n. 1370; 1809. En. p. 776.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 136. n. 574: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Pracl. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 308. — Juss. 1789. Gen. p. 361. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 421. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 236. — DC. 1805. Franç. IV. p. 600. — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 121. — Lois. 1817. Dict. v. 8. p. 434 (*Chenillette*). — Link 1822. En. II. p. 245. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 326. n. 2604; 1831. Gen. II. p. 595. n. 2940.
Hill 1769. Ht. kew. p. 306: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 21. n. 1324: g. Cyteophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 345. t. 155.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 759: g. Coronillear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 134. — DC. 1825. Pr. II. p. 308. — Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3977; 1832. Fl. exc. p. 541; 1841. Nom. p. 152. n. 5946. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 273. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 279. — Koch 1836. Syn. p. 187. Ed. II. p. 207. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Endl. 1840. Gen. n. 6584. p. 1280; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 694. — Webb & Berth. 1846. Canar. II. p. 414. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Link 1831. Hdb. II. p. 209: g. Hedysarear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 492.
Synon. Scorpioides Tourn.; Campoides Riv., Rupp.; Scorpius Lois.

Scorpiurus „Moris." Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 519: g. Asperifoliar.
= Myosotis Dill.

Scorpiurus Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 224: sect. Desmodii. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 249. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 538.

Scorpius Medic. (Vorles. II. p. 369) 1789. Phil. Bot. I. p. 209: nov. g. ex typo Ornithopodis scorpioidis L.
= Artrolobium Desv.

Scorpius „Clus." Mönch 1794. Meth. p. 134: g. Thalamostemonis. (Genista germanica L.)
= Genista Lam.

Scorpius Loiseleur-Desl. 1806. Fl. gall. p. 468.
= Scorpiurus Linn.

Scorpius Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 122: sect. Amygdali. (A. scorpius, eburnea et furcata Sp.)
Römer 1847. Fam. nat. III. p. 4. 15: sect. Amygdalopsidis.

Scorzonella Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 426: nov. g. Hyoseridear. (Hymenonema laciniatum Hook.?) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 470. — Endl. 1842. Spl. II. p. 49. n. 2978/2. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Walp. 1843. Rep. II. p. 684. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Hook. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 253. Subgen.: Ptilophora.

Scorzonera*) Tourn. 1700. Inst. p. 476. t. 269: g. pl. class. XIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 201. Ed. Hall. 1745. p. 207: g. pl. class. VIII.

*) σκόροδον, Allium; πράσον, Porrum.
**) Nomen ex Plinio.

*) Nomen hispanicum.

Scorzonera Tourn. cont.

Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 207: g. Cichoracear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 757. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 270. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 489. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 377. — DC. 1805. Franç. IV. p. 59; 1815. V. p. 455. — D. Don 1825. Nepal. p. 162. — Link 1829. Hdb. I. p. 780. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 3. 18. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 453. — Math. 1853. Belg. I. p. 322.

Linn. 1737. Gen. p. 241. n. 624; 1737. Cliff. p. 382; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 242; 1753. Sp. II. p. 790; 1759. Syst. ed. X. p. 1191. n. 811; 1763. Sp. ed. II. p. 1112; 1764. Gen. ed. VI. p. 399. n. 906; 1767. Syst. ed. XII. p. 519: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 593; 1784. Syst. p. 710. — Reich. 1778. Gen. p. 398. n. 985. — Lour. 1790. Coch. II. p. 479. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 526. n. 1230. — Gmel. 1791. Syst. p. 1169. — Pers. 1797. Syst. p. 749; 1807. Ench. II. p. 360. n. 1761. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1498. n. 1402; 1809. En. p. 813. — Link 1822. En. II. p. 278.

Gmel. 1749. Sibir. II. p. 2: g. Semiflosculosar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Scop. 1772. Carn. II. p. 95; 1777. Intr. p. 121. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 141. — Batsch 1802. Tab. p. 250. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 481. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 204.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 241. n. 989: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 548.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.

Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 45: g. Ligulatar.

Neck. 1790. El. I. p. 48. n. 85: g. Glossariphytor.

Rebent. 1804. Neom. p. 90: g. Pentandr. Monogyn.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 582; 1826. Syst. III. p. 666. n. 2896; 1831. Gen. II. p. 646. n. 3254: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 160.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 442.

Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1344. 1356: g. Cichoriacear. Sect.: Scorzonera, Podospermum.

D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Scorzonerear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 275. Sect. ut antea. — Less. 1832. Syn. p. 134. Subgen.: Scorzonera, Galasia, Lasiospora. — Koch 1837. Syn. p. 423. Ed. II. p. 487. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 117. Sect.: Euscorzonera, Gelasia, Lasiospora, Pentachlamys, Polyclada. — Endl. 1838. Gen. n. 2997. p. 497; 1841. Ench. p. 250. Sect.: Scorzonera, Lasiospora. — Kunth 1838. Berol. I. p. 380. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3695. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Walp. 1843. Rep. II. p. 689; 1847. VI. p. 349.

Scorzonera Tourn. cont.

733. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 790. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 305. Sect. ut Endl. — Bunge 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 375. Nova sect.: Epilasia.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 262: g. Liguliflorar.

Hook. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 124. Subgen.: Moniermos.

Synon. Scorzonera, Gelasia et Lasiospora Cass.; Lasiospermum Fisch.

Scorzonera Cassini 1822. Dict. v. 25. p. 65; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. restrict. Scorzonerear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2175. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6. 53. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 94. Sect.: Euscorzonera, Piptopogon.

Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.

Less. 1832. Syn. p. 134: subg. Scorzonerae.

Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 476: g. Tragopogonear.

Endl. 1838. Gen. n. 2997 *a*. p. 497; 1841. Ench. p. 250: sect. Scorzonerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3695. 1. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 306. = Euscorzonera DC.

Scorzonereae Cassini 1822. Dict. v. 25. p. 59. 64: div. Lactucear. Subdivis.: *verae* (gen. §. 1: Robertia, Seriola, Porcellites, Hypochaeris, Geropogon. §. 2: Tragopogon, Thrincia, Leontodon, Podospermum, Scorzonera, Lasiospora. §. 3: Gelasia, Agoseris?, Troximon?, Hyoseris, Hedypnois), *anomalae* (gen.: Hymenonema, Catanance, Cichorium). — Par. Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569. Subdivis.: Hypochaerideae, *verae* (gen.: Geropogon, Tragopogon, Millina, Thrincia, Leontodon, Asterothrix, Podospermum, Scorzonera, Lasiospora, Gelasia), Hyoserideae, Catananceae. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. Gen.: Robertia, Metabasis, Phalacroderis, Seriola, Oreophila, Achyrophorus, Porcellites, Hypochaeris, Thrincia, Streckera, Kalbfussia, Leontodon, Apargia, Oporinia, Millina, Asterothrix, Podospermum, Geropogon, Tragopogon, Scorzonera, Gelasia, Pentachlamys, Polyclada, Hyoseris, Hedypnois, Hymenonema, Catanance, Hänselera, Cichorium, Acanthophyton, Calais.

Rchb. 1828. Consp. p. 98: subdiv. Lactucear. Gen.: Willemetia, Taraxacum, Aetheorrhiza, Ixeris, Lomatolepis, Rhabdotheca, Chondrilla, Phoenixopus, Lactuca, Mycelis, Prenanthes, Nabalus, Mulgedium, Picridium, Sonchus, Launaya; Podospermum, Scorzonera, Lasiospora, Asterothrix; Gelasia, Urospermum, Tragopogon, Geropogon, Scolymus, Myscolus.

D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307; 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 183: trib. Cichoracear. Gen.: Scorzonera, Picridium, Arnopogon, Tragopogon, Geropogon. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 139. — Par. Koch 1837. Syn. p. 422. Gen.: Tragopogon, Scorzonera, Podospermum, Galasia.

Scorzonereae Cassini cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen. Sc. verar. Cass. 1822 exceptis paucis.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 269: subdiv. Cichoracear.
Less. 1832. Syn. p. 131: subtrib. Cichoracear. Gen.: Thrincia, Leontodon, Apargia, Oporina, Millina, Geropogon, Podosperma, Tragopogon, Urospermum, Hymenonema, Scorzonera, Picris, Helmintia. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 99. Gen.: Thrincia, Kalbfussia, Leontodon, Apargia, Oporinia, Millina, Podospermum, Geropogon, Tragopogon, Urospermum, Hymenonema, Scorzonera, Asterothrix, Microderis, Picris, Helminthia. — Endl. 1838. Gen. p. 496. Gen.: Thrincia, Leontodon, Millina, Geropogon, Podospermum, Urospermum, Tragopogon, Hymenonema, Scorzonera, Galasia, Picris, Helminthia, Kalbfussia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1387 et Ench. p. 520) Microderis et 1842 (Spl. II. p. 49) Phyllopappus, Rafinesquia. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). Gen. ut DC. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 485. Gen. ut 1837. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. Gen. ut Endl. 1842 et Anisocoma.
Rchb. 1841. Nom. p. 94: subdiv. Cichoriear. Gen. ut DC. (exceptis Apargia et Oporinia.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 33: subtrib. Chicoracear. Gen. fere ut DC.

Scorzonereae Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 470: div. Tragopogonear. Gen.: Podospermum.

Scorzoneroides Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 209: g. Cichoracear.
Mönch 1794. Meth. p. 549: g. Petalostemonis. (Leontodon autumnale L.)
= Oporinia Don.

Scotanum Adans. 1763. Fam. II. p. 459: g. Ranunculor.
= Ficaria Dill.

Scotia Thunb. vid. *Schotia Jacq.*

Scotophylla*) Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 271: sect. Pyrolae. (P. aphylla.)

Scottea DC., G. Don vid. *seq.*

Scottia**) R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 268 (Verm. bot. Schr. II. p. 477): nov. g. Leguminosar. (S. dentata.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 186. n. 2503; 1831. Gen. II. p. 572. n. 2788. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 211.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 749: g. Sparticar.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 118 (*Scottea*). — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4052; 1841. Nom. p. 151. n. 5900. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 129 (*Scottea*). — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59); 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I.

*) σκότος, tenebrae.
**) Dicat. Dr. Rob. Scott, Dublin.

Scottia R. Brown cont.
p. 87. — Endl. 1840. Gen. n. 6458. p. 1260; 1841. Ench. p. 667.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Hovear.

Scouleria*) Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 33. t. 18: nov. g. Muscor. (S. aquatica.) — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 731. n. 3711. (frondosor.) — Schwägr. 1842. Suppl. IV. t. 315.
Endl. 1836. Gen. n. 505. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 880: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 654: sect. Gümbeliae.

Scovitsia Walp., A. Juss. vid. *Szovitsia Fisch. & Mey.*

Scribaea Gärtn., Mey. & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 69. 96: nov. g. Decandr. Trigyn. (Cucubalus baccifer L.)
= Cucubalus Tourn.

Scriphidium Schultz Bip. vid. *Seriphidium Bess.*

Scripus Ledeb. vid. *Scirpus.*

Scrobicaria Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 448. 456; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Senecionear. (Archetypar.? — Stähelina ilicifolia Linn. f.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2501. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.)
= Senecionis DC. pars.

Scrofulareae Rchb. 1837. Handb. p. 198: subsect. Verbascariar. Gen.: Pinguicula, Brandonia; Ceramanthe, Scrofularia.

Scrofularia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 394; 1825. Syst. II. p. 783. n. 2162; 1831. Gen. II. p. 487. n. 2404: g. Scrofularinar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 319. — Link 1829. Hdb. I. p. 531. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 439.
Link 1822. En. II. p. 138: g. Personatar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Scrofularear.
Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4584: g. Scrofulariear.
Webb .... Canar. III. p. 130: g. Verbascear.
Webb 1849 in Hook. Niger Fl. p. 166: g. Scrofularinear.
= Scrophularia Tourn.

Scrofularieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 118: sect. Verbascear. Gen.: Ceramanthe, Scrofularia, Alonsoa, Adenostoma?

Scrofularinae Spreng. 1817. Anleit. II. p. 394: ordo Personatar. Gen.: Scrofularia, Digitalis, Linaria, Antirrhinum, Anarrhinum, Mimulus, Hornemannia, Torenia, Vandellia, Columnea, Conobea, Gerardia, Schwalbea, Dichroma, Castilleia, Herpestis, Stemodia, Dodartia, Cymbaria, Mazus, Achimenes, Centranthera, Chelone, Pentastemon, Trevirania; Gratiola, Schwenkia, Schizanthus, Curanga, Elytraria, Henckelia, Calceolaria.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 318: fam. Corolliflorar. Gen.: Limosella, Scrofularia, Elatine, Cymbalaria, Antirrhinum, Orontium, Digitalis.

*) Dicat. Dr. Scouler.

Scrofularinae Spreng. cont.
Link (1821. En. I. p. 27) 1829. Hdb. I. p. 531: subordo Personatar. Gen.: Scrofularia, Digitalis, Linaria, Antirrhinum, Anarrhinum, Nemesia, Mimulus, Gratiola, Paederota, Wulfenia, Schizanthus, Calceolaria, Capraria, Maurandia, Chelone, Trevirana, Browallia, Sesamum, Gloxinia, Hemimeris, Angelonia, Russelia, Verbascum, Celsia, Ramondia.
Spreng. 1825. Syst. IV. p. 681; 1831. Gen. II. p. 487: div. Personatar. Gen.: Scrofularia, Digitalis, Linaria, Nemesia, Antirrhinum, Anarrhinum, Mimulus, Torenia, Vandellia, Lindenbergia, Hemimeris, Herpestis, Tittmannia, Limnophila, Morgania, Mazus, Ourisia, Loxonia, Franciscea, Browallia, Physocalyx, Collinsia, Centranthera, Büchnera, Gerardia, Schwalbea, Escobedia, Russelia, Angelonia, Celsia, Seymeria, Sopubia, Stemodia, Achimenes, Trevirania, Chelone, Capraria, Maurandia, Lophospermum. *Descisc.*: Sesamum, Dodartia, Cymbaria, Calytriplex.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (211) Monopetalar.
Scrofularinae Rchb. 1837. Handb. p. 197; 1841. Nomencl. p. 115: div. Personatar. Subdivis.: Antirrhinariae (1841 Antirrhineae), Bignoniariae, (1841 Bignonieae), Caprarieae.
Scrofularineae Webb 1849 in Hook. Niger Fl. p. 163. Char. trib. reformatus.
Scropha Nor.? vid. *Stropha Nor.*
Scrophulales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 30: nixus Personatar. Ord.: Scrophularinae, Orobancheae, Gesnereae.
Scrophularia*) Tourn. 1700. Inst. p. 166. t. 74: g. pl. class. III.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 236. Ed. Hall. 1745. p. 241: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 178. n. 494; 1737. Cliff. p. 322; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 177; 1753. Sp. II. p. 619; 1759. Syst. ed. X. p. 1113. n. 674; 1763. Sp. ed. II. p. 863; 1764. Gen. ed. VI. p. 312. n. 756; 1767. Syst. ed. XII. p. 413: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 445. — Murr. 1774. Syst. p. 468; 1784. Syst. p. 559. — Reich. 1778. Gen. p. 313. n. 814. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 408. n. 1014. — Gmel. 1791. Syst. p. 937. — Pers. 1797. Syst. p. 596. — Willd. 1800. Sp. III. p. 269. n. 1152; 1809. En. p. 643. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 44. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 47.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 618: g. Dymeizonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 176. n. 720: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 444.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 213. — Scop. 1777. Intr. p. 175. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 358. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 274. —

*) Rectius *Scrofularia*, a radice scrofulis sanandis usitata. (Etymologia graeca non innotuit.)

Scrophularia Tourn. cont.
DC. 1805. Franç. III. p. 578; 1815. V. p. 406. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 393. — Gaud. 1828. Helv. IV. p. 8. 160.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 119.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 193: g. Ringentium.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 325: g. Angiospermar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 268: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 249. t. 53. f. 8 (aquatica).
Neck. 1790. El. I. p. 343. n. 535: g. Chasmatophytor.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 399: g. Capsuliferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 69: g. Tetrandr. Monogyn.
Pers. 1807. Ench. II. p. 160. n. 1470: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3187.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 879: g. Scrophularinear. — Par. Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 213. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 456.
Wydl. 1828. Mém. soc. Genèv. IV. p. 121. (Monogr.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Scrophulariear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 110. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 507. Sect.: Venilia, Scorodonia, Canina.
Bartl. 1830. Ord. p. 170: g. Verbascear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 1; 1835. Scroph. ind. p. 17. — Koch 1837. Syn. p. 515. Ed. II. p. 592. — Kunth 1838. Berol. II. p. 59. — Endl. 1839. Gen. n. 3883. p. 671; 1841. Ench. p. 338. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 94. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 280. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 479. Sect. ut Don. — Walp. 1845. Rep. III. p. 164 (sect. ut Don). 447. 958.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 376: g. Scrophularinar. Sect.: Ceramanthe, Scrophularia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 59: g. Verbascinear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 35: g. Euscrophularinear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 302; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear. Sect.: Venilia, Scorodonia, Tomiophyllum. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 214. Sect. eaed. — C. Koch 1849. Linnaea. XXII. p. 706. Sect. eaed.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 563: g. Scrophulariacear.
Synon. Scrofularia Spreng., etc.
Scrophulariaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 288; 1847. Veg. kingd. p. 681: ordo Bignonialium. (Auct. Bentham.) Subord.: Salpiglossideae, Antirrhinideae, Rhinanthideae.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 186: ordo (142) Corollifloror. Subord.: Salpiglossideae, Antirrhinideae, Rhinanthideae.

Scrophulariaceae Lindl. cont.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 457: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Divis. eaed.

Scrophulariae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 23 plant. Gen.: Russelia, Besleria, Halleria, Chelone, Calceolaria, Scrophularia, Polypremum, Digitalis, Buddleia, Antirrhinum, Celsia, Verbascum, Cortusa, Spigelia, Scoparia, Schwenckia.
Juss. 1789. Gen. p. 117: ordo 7 class. VIII. Gen. §. 1: Buddleia, Scoparia, Russelia, Capraria, Stemodia, Halleria, Galvezia, Achimenes, Scrophularia, Matourea, Dodartia, Gerardia, Cymbaria, Linaria, Antirrhinum, Hemimeris, Digitalis. §. 2: Paederota, Calceolaria, Baea. §. 3. *Affinia:* Columnea, Besleria, Cyrtandra, Gratiola, Torenia, Vandellia, Lindernia, Mimulus, Polypremum, Montira; Schwalbea, Schwenkia, Browallia.

Scrophularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Rhinanthidear. Gen.: Hemimeris, Alonsoa, Diascia, Calceolaria, Scrophularia.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 110: trib. Scrophularinear. Gen.: Digitalis, Scrophularia, Alonsoa. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 504. Gen. ead. et Isoplexis, Russelia.

Scrophularinae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 433. Ed. Nees p. 289: ordo Dicotyledonum monopetalar. Gen. nova: Microcarpaea, Centranthera, Uvedalia, Morgania, Limnophila, Adenosma.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Personatar. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII; 1828. Consp. p. 123; 1831. Fl. exc. p. 365. Subdivis. (1828): Linderniaceae, Antirrhineae, Caprariaceae.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 134 (char.); 1829. ibid. III. p. 1. (Flora Lit. I. p. 2.) Gen.: Physocalyx, Virgularia, Gerardia, Mecardonia, Herpestes, Bramia.
Bartl. 1830. Ord. p. 169: ordo (103) Labiatiflorar. Divis.: Verbasceae, Antirrhineae, Buddlejeae, Rhinantheae. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 304 (214). Trib.: Antirrhineae, Collinsieae, Calceolarieae, Hemimerideae, Verbasceae, Veroniceae, Salpiglossideae, Digitaleae, Gerardieae, Buddleieae, Gratioleae, Rhinantheae, Buchnereae.
Lindl. 1833. Nix. p. 30: ordo Scrophulalium.
Endl. 1839. Gen. p. 670; 1841. Ench. p. 337 (*Scrophularineae*): ordo (149) Personatar. Trib.: Verbasceae, Hemimerideae, Antirrhineae, Salpiglossideae, Digitaleae, Gratioleae, Buchnereae, Buddleieae, Veroniceae, Gerardieae, Rhinantheae.

Scrophularineae Mirbel 1815. Élém. II. p. 879: fam. Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Veronica, Scrophularia, Antirrhinum, etc. etc.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 216: ordo class. VIII. Gen. §. 1: Nuxia, Buddleia, Gomara, Russelia, Scoparia, Leucophyllum, Capraria, Borkhausenia, Xuarezia, Stemodia, Conobea, Mecardonia, Virgularia, Halleria, Diceros, Scrophularia, Dodartia, Gerardia, Cymbaria, Sopulina, Chirita, Maurandia, Mitrasacme, Anarrhinum, Simbuleta, Linaria, Antirrhinum, Collinsia, Nemesia, Digitalis, Pentstemon, Hemimeris, Angelonia, Adenosma, Limnophila, Herpestis (Morgania ?), Torenia, Vandellia, Lindernia, Limosella, Hateranthia, Browallia, Schwenckia. §. 2: Paederota, Curanga, Calceolaria, Baea, Schizanthus, Jovellana, Uluxia. §. 3. *Affinia:* Rottlera, Diplanthera, Schwalbea, Cybanthera, Gratiola.
Benth. 1835. Scroph. revis. in Botan. Regist. XXI. (n. ser. VIII); 1835. Scroph. ind. (*cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IV. 1835. p. 178.) Trib.: Verbasceae, Hemimerideae, Antirrhineae, Salpiglossideae, Digitaleae, Gratioleae, Buchnereae, Buddleieae, Teedieae, Veroniceae, Gerardieae, Rhinantheae.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 110: fam. Personatar. (*cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. 1836. p. 76.) Trib.: Scrophularieae, Antirrhineae, Gratioleae, Gerardieae, Veroniceae, Buchnereae, Buddlejeae, Calceolarieae, Euphrasieae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 500: ordo Corollaeflorar. Trib. ut D. Don et Teedieae, Hallerieae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 264: fam. (147) Labiatiflorar. Trib. ut Benth.
Endl. 1841. Ench. p. 337: vid. *Scrophularinae.*
Brongn. 1843. Én. genr. p. 58: fam. Perispermear. Trib.: Salpiglosseae, Verbascineae, Antirrhineae, Digitaleae, Gratioleae, Buchnereae, Buddleieae, Veroniceae, Gerardieae, Rhinantheae.
= Scrophulariaceae Lindl.

Scrotalaria Seringe mss. olim.: nov. g. ex typo Teucrii Arduini L. conditum.
= Scorodonia Mönch.

Scuria Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: subg. Caricis, an genus? (Utriculus integer, stylus bifidus, stigm. 2.)
= Caricis Linn. pars.

Scurrula Linn. 1753. Spec. I. p. 110; 1759. Syst. ed. X. p. 894. n. 123: g. Tetrandr. Monogyn., serius Lorantho insertum.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 197: g. Hexandr. Monogyn.
DC. 1830. Pr. IV. p. 301: sect. Loranthi.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 421: g. Loranthacear.
= Loranthi Linn. pars.

Scutea Wight vid. *Scutia Comm.*

Scutellareae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: subordo Lamiacear. Gen. Scutellarinear. Benth.

Scutellaria Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. catal. p. 546: nov. g. pl., vulgo *Tertianaria* dictum.
Linn. 1737. Gen. p. 177. n. 493; 1737. Cliff. p. 316; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 172; 1753. Sp. II. p. 598; 1759. Syst. ed. X. p. 1106. n. 653; 1763. Sp. ed. II. p. 834; 1764. Gen. ed. VI. p. 301. n. 734; 1767. Syst. ed. XII. p. 403: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 456; 1784. Syst. p. 546. — Reich. 1778. Gen. p. 304. n. 792. — Schreb. 1791. Gen.

Scutellaria Linn. cont.
II. p. 397. n. 989. — Gmel. 1791. Syst. p. 919. — Pers. 1797. Syst. p. 583. — Willd. 1800. Sp. III. p. 171. n. 1124; 1809. En. p. 631. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 37. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 24.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 223: g. pl. class. IX.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 188. n. 781: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 162. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 379.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 117. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 349. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 269. — DC. 1805. Franç. III. p. 571; 1815. V. p. 403. — Pers. 1807. Ench. II. p. 136. n. 1418. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 324. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 389. — Link 1822. En. II. p. 120; 1829. Hdb. I. p. 488. — Kunth 1823. Syn. II. p. 96. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 701. n. 2064; 1831. Gen. II. p. 467. n. 2300. — D. Don 1825. Nepal. p. 109. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 839. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 523 (*Toque*). — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 392. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 205.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 227: g. Gymnospermar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 275.
Hill 1769. Ht. kew. p. 242: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1790. El. I. p. 303. n. 475: g. Corythophytor.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 380: g. Pericarpiferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 65: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 442: g. Melissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVI.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2830: g. Salviear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Scutellariear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4167. Sect. ut Benth. (Scutellaria loco Galericulariae.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 412. Sect. ut antea. (excepta quinta). — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 394. Sect. ex Benth.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 4. 98: g. Bilabiatar.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 331: g. Nepetear.
A. Hamilt. 1832 in Mém. soc. Linn. Lyon I. (Seringe Bull. bot. I. p. 271. — Linnaea VIII. Litt. p. 86.) Monogr. Sect.: Lupulinaria, Stachymacris, Galericularia.
Benth. 1834. Labiat. p. 419: g. Scutellarinear. Sect.: Lupulinaria, Heteranthesia, Stachymacris, Galericularia, Maschalostachys. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 791. Sect. fere eaed. — Koch 1837. Syn. p. 573. Ed. II. p. 658. Sect.: Lupulinaria, Galericularia. — Endl. 1838. Gen. n. 3626. p. 620; 1841. Ench. p. 307. Sect. ut Benth. — Kunth 1838. Berol. II. p. 101. — Meisn. 1840. Gen. p. 285 (194). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 198. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 421. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 128. Sect. 3 ex Benth. — Walp. 1845. Rep. III. p. 747. 984 (sect. ut Benth.); 1847. VI. p. 673. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 701. Sect.: Lupularia, Stachymacris, Galericularia. — J. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 460.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Scutellarear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 700: g. Stachydear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 972. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 201.
Synon. Cassida Tourn.; Hastifolia Ehrh.

Scutellaria Hoffmann . . . . . : nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 221.
= Stereocaulonis, Urceolariae, Verrucariae etc. sp.

Scutellaria Baumgarten . . . . : nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 221.
= Lecanora Achar.

Scutellaria (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 384: sect. Medicaginis. (M. scutellata All., etc.)

Scutellariae Gmel. 1791. Syst. p. 1362: sect. Lichenis. (L. pannosus, scruposus, aerugineus, flaveolus, etc.)

Scutellarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Melittidear. Gen.: Scutellaria.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nomencl. p. 107: subdiv. Trachyschizocarpicar. Gen.: Scutellaria, Hymenocrater, Perilomia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 67: trib. Labiatar. Gen.: Perilomia, Scutellaria, Cleonia, Prunella.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 407: div. Stachydear. Gen.: Brunella, Cleonia, Scutellaria, Perilomia.

Scutellarineae Benth. 1834. Labiat. p. 416: trib. Labiatar. Gen.: Prunella, Cleonia, Scutellaria, Perilomia. — Par. Koch 1837. Syn. p. 573. Ed. II. p. 658. Gen.: Scutellaria, Prunella. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 789. Gen. ut Benth. — Endl. 1838. Gen. p. 620; 1841. Ench. p. 307. Gen. ead. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. 198. Gen. ead. — Meisn. 1840. Gen. p. 285 (194). Gen. ead. — Walp. 1845. Rep. III. p. 745. Gen. ead.

Scutellata Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. p. 98: ordo 7 Cryptogamiae. (Lichenes.) Gen.: Collema, Peltigera, Umbilicaria, Cladonia, Stereocaulon, Usnea, Lobaria, Psora, Verrucaria.

Scutellata G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 576: sect. Veronicae. (V. scutellata, parmularia, Caroliniana.)

Scutellatae Agardh 1821. Aphor. p. 92; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: sub-

Scutellatae Agardh cont.
div. Crustacear. Gen.: Sagedia, Urceolaria, Gyalecta, Lecidea, Lecanora.

Scutellati Achar. 1810. Lich. univ. p. 19: div. Homothalamor. Gen.: Alectoria, Ramalina.
Achar. 1814. Syn. p. XIII: ordo Homothalamor. Gen. ead. et Collema.

Scutellinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: ordo Viresciniae. Fam.: Phialicarpeae, Globigereae, Peltigereae, Leprariae, Graphineae.

Scutellularia Schreb. 1791. Gen. II. p. 767: sect. Lichenis.
= Patellaria Hoffm.

Scutia „Comm. mss." DC. 1825. Prodr. II. p. 29: sect. Ceanothi.
Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 362: g. Rhamnear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 33. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 165. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 129. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 116.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3806: g. Ceanothear.
Endl. 1840. Gen. n. 5724. p. 1097; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5594. (genuinar.) — Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 5 (*Scutea*). t. 1071. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 647.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
Synon. Sarcomphalus P. Browne; Adolia Lam.; Sentis Comm.

Scuticaria Lindl. 1843. Bot. Regist. XXIX. p. 14: nov. g. Orchidear. (Sc. Steelii.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Scutiger Paulet . . . . : nov. g. Fungor., Boletos, Polyporos etc. complectens. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 232.

Scutinanthe Thwaites 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 266. t. 8 B: nov. g. Burseracear. (S. brunnea.)

Scutisporium Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 112: nov. g. Bactridiacear. (S. soredosporum et sphaerospermum.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 283: g. Dendrinor. (An Ulocladio injungendum?)

Scutoidae (*Scutoïdes*) Beauv. ex Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: sect. Algar. Gen.: Ulva, Ceramium, Fucus, Chorda, Sphaerococcus, Chondrus, Ceramopsis, Penicillum, Padina, Dawsonia, Lombricaria, Adenophorus.

Scutula*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 235. Ed. Willd. p. 290: nov. g. Octandr. Monogyn. (S. scutellata et umbellata.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 219. n. 1449.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 155: g. Onagrariar., Myrteis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 264. n. 1065: g. Onagrear.

*) Nomen a figura baccae, parvum scutum designante.

Scutula Lour. cont.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 233: g. Myrtear.
DC. 1828. Pr. III. p. 7: g. Memecylear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1965. — Bartl. 1830. Ord. p. 327. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 655. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 275. — Meisn. 1838. Gen. p. 111 (79).
= Memecylon Linn.

Scutula L. & C. Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 93: sect. Nidulariae. (Cyathus farctus Roth.)

Scutula Tulasne 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 118: nov. g. Lichenum athallior. (Peziza miliaris Wallr.)
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 236): g. Lecidinear.
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Euphymatopsidear.

Scybala Rchb. vid. *Scytala E. Meyer.*

Scybalium*) Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 3. 12: nov. g. Helosiear. (S. fungiforme t. 2.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 720. p. 74; 1841. Ench. p. 52. — Rchb. 1837. Hdb. p. 164; 1841. Nom. p. 60. n. 2323. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 90: g. Helosidar.

Scynopsole Rchb. vid. *Cynopsole Endl.*

Scypha Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 357: nov. g. Spongidiar. (Spongiae sp. Auct.)

Scyphaea**) Presl 1830. Flora II. p. 630; 1830. Symb. I. p. 7. t. 4: nov. g. Hypericinear. (Monoporina oenotheroides Presl.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 52 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 358.
= Marila Swartz.

Scyphanthus Don . . . . in Sweet Fl. gard. t. 238.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 65: g. Loasear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 125 (90). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 85.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 247: g. Loasinear.
= Grammatocarpus Presl?

Scypharia Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 469: sect. Calotidis. (C. erinacea Steetz.)

Scyphidanthe Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 124: subg. Sambuci. (S. javanica.)

Scyphiphora Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 91. t. 196. f. 2. (hydrophylacea. — *Hydrophylax* coll. Banks.)
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 955: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 420 (*Scyphyphora*). 483.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 159: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 577. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 634. — Endl. 1838. Gen. n. 3112. p. 525; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (120). — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2760.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear.

*) *σκύβαλον*, ejectamentum, residuum.
**) *σκύφος*, poculus.

Scyphiphora Gärtn. f. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 238: g. inter Cinchonaceas et Coffeaceas medium.

Scyphiphorus Vent. 1799. Tabl. II. p. 35: g. Algar. (Lichen pyxidatus L.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 21.
= Scyphophorus Achar.

Scyphocoronis A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 225: nov. g. Asteroidear.? (S. viscosa.)
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 190: g. Chrysocomear.
Synon. Toxanthes Turcz. pt. (Sond.)

Scyphofilix Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. Nr. 2 in Römer Collect. bot. p. 195: nov. g. Filicum. („An Davallia Smith"?) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 240.
= Pachypleuria Presl? (Fée.)

Scyphogyne Brongn. in Duperr. voy. t. 54.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 709: g. Salaxidear. Sect.: Tristemon, Omphalocaryon, Blepharophyllum.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4296. p. 1411; 1841. Ench. p. 369: g. Coilostigmear. Sect. eaed. (Codonostigma loco Blepharophylli.)
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4902: g. Ericear. (genuinar.) Sect. eaed. (Scyphogyne loco Omphalocaryi.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 364. (Eleutherostemonum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.

Scyphophora „Achar." Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 409. 417: g. Cenomycidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 414*b*: sect. Cladoniae.
Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 521. 2: sect. Cenomyces.
= Scyphophorus Achar.

Scyphophoron Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXVI: sect. Baeomycetis.

Scyphophorum Neck. 1790. Elem. bot. III. p. 350. n. 1775: nov. g. Athrosophytor., a Lichene L. sejunctum.
Achar. 1814. Syn. Lich. p. 249: sect. Cenomyces. (Cladonia fusca Hoffm.)
= seq.

Scyphophorus Achar. 1798. Lich. suec. p. 183: g. Lichenum. (foliaceor.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 240 et Dufour in Ann. gén. sc. phys. VIII. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 337; 1815. V. p. 180.
Michx. 1803. Fl. Am. II. p. 328: g. Lichenacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Cenomycear.
Schär. 1850. En. Lich. Eur. p. 186: sect. Cladoniae.
= Cenomyce Achar.

Scyphorus Rafin. teste Leman 1827. Dict. v. 48. p. 245.
= Scyphophorus Achar.

Scyphostigma*) Römer 1846. Fam. nat. synops. I. p. 80. 94: nov. g. Meliear. (Turraea tetramera Benn.)
Endl. 1850. Spl. V. p. 74. n. 5519: sect. Turraeae?

*) Nomen ex forma stigmatis desumtum.

Scyphularia Fée 1852. Gen. Filic. p. 324: nov. g. Davalliear. (Davallia pentaphylla et triphylla.)

Scyphyphora Dietr. vid. *Scyphiphora Gärtn. f.*

Scyrtostachys Rchb. vid. *Cyrtostachys Blume.*

Scytala*) „E. Meyer mss." DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 12: sect. Oldenburgiae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2927 *b*. p. 1385; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3797. 2 (*Scybala*).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9: g. Barnadesiear.

Scytalanthus Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 361: g. Apocynear.
= Skytanthus Meyen.

Scytalia Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 197. t. 42. f. 3: nov. g. pro *Li-tchi Comm.* institutum.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 262. n. 671: g. Octandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 612. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 269.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
= Nephelium Linn.

Scytalia (trijuga) Roxb. .... (non 1832.)
= Schleichera Willd. (DC. Pr. I. p. 615.)

Scytalis E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 144: nov. g. Phaseolear. Sect.: Catjang, Helicopus. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67). — Vogel 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 31. Sect. eaed.
= Vigna Savi?

Scytanthemum**) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 60: subg. Vaccinii. (V. Imrayi Hook.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1099.

Scytanthus Hook. 1844. Icon. plant.
= Hoodia Sweet.

Scytenium Gray vid. *Scytinium Achar.*

Scythymenia Agardh 1822. Syst. Alg. p. XX (*Schythymenia*). 30: nov. g. in appendice Nostochinar. (Ulva rupestris E. B.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 36. p. 4; 1841. Ench. p. 3.
Leman 1827. Dict. v. 48. p. 248: g. Zoocarpear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 369. n. 3437: g. Ulvacear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 429: g. Undinear.?
Menegh. 1838. Cenni p. 27: g. Rivulariear.?
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 194: g. Byssoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 576: g. Protococcinar.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326 (Flora 1843. p. 92): g. Nostochinear.
= Hypheothrix Kütz.?

Scytinium Achar. 1810. Lich. univ. p. 642; 1814. Syn. Lich. p. 319: sect. Collematis. — Par. Leman 1818. Dict. v. 10. p. 69.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 395. 398 (*Scytenium*): g. Collematidear.

Scytochloria Harvey 1841. Man. brit. Alg. p. 152: sect. Rivulariae. (R. nitida Ag.)
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 593: g. Rivulariear.
Vid. Rivularia Trevis.

*) σκυτάλη, baculus.
**) σκύτος, corium, cutis.

Scytodephyllum Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. (Nomen.)

Scytodium*) Vogel 1837. Linnaea XI. p. 414: sect. Macrolobii. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6803 c. p. 1320; 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6105. 3.

Scytonema Agardh 1817. Syn. Alg. p. XXXIV. 112; 1821. Aphor. p. 98: nov. g. Confervoidear. (Conferva mirabilis, comosa, etc. E. B.) — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 912.

Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 96: g. Soleniator.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 285: g. Oscillatoridear.

Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXII. 38: g. Lichenoidear.

Fries 1825. Pl. homon. p. 352: g. Oscillatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 456. — Endl. 1836. Gen. n. 45. p. 4; 1841. Ench. p. 3; 1843. Spl. III. p. 14. n. 24. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 9.

Bory (1825. Dict. class. IV. p. 393) 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 225: g. Confervear.

Leman 1827. Dict. v. 48. p. 249: g. Algar. articulatar.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 363. n. 3427; 1831. Gen. II. p. 754. n. 3834: g. Solenatar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 87.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78: g. Oscillariear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 55: g. Trichonematum.

Menegh. 1838. Cenni p. 29: g. Lyngbyear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 626. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467.) — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 84.

Mont. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 45: g. Byssacear.

Harv. 1841. Brit. Alg. p. 154: g. Oscillatoriear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. (Flora 1843. p. 92.) — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 133.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phyc. gener. p. 214; 1845. Phyc. germ. p. 175; 1849. Sp. Alg. p. 303. n. 210: g. Scytonemear. Sect. (1843): genuina, Synchaeta. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 38. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 472.

Hass. 1845. Brit. freshw. Alg.: g. Stigonemear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Oscillatoridar.

Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 100: g. Oscillatoriacear.

Scytonemeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 213: fam. Gloeosiphear. Gen.: Drilosiphon, Scytonema, Symphyosiphon, Sirosiphon. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 36. (mesospermear.) Gen.: Sirosiphon, Symphyosiphon, Scytonema.

Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 174; 1849. Sp. Alg. p. 302: fam. Oscillarinar. Gen. (1849): Drilosiphon, Scytonema, Arthronema, Arthrosiphon, Calothrix, Tolypothrix, Sirosiphon, Stigonema, Sclerothrix, Schizothrix, Schizodictyon, Dictyonema, Symphyosiphon.

Hass. 1845. Brit. freshw. Alg.: fam. Algar. filiformium. Sect.: Stigonemeae, Calothriceae. — Par. Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 472. Gen.: Scytonema, Symphyosiphon, Sirosiphon, Petalonema.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: trib. Oscillarinar.

Scytophyllum Ecklon & Zeyh. 1835. Enum. pl. Afr. austr. p. 124: nov. g. Celastrinear. (Celastrus obtusus Thunb.)

Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Evonymear.

= Elaeodendri Jacq. pars.

Scytopteris Presl 1836. Pterid. p. 202: sect. Niphoboli. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 617 c. p. 1347; 1841. Ench. p. 36. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1003. 3. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 262.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.

Presl 1850. Epimel. bot. p. 493: g. Polypodiear. (Niphobolus acrostichoides Presl.)

Scytosiphon Agardh 1811. Disp. p. 24: nov. g. ex typo Fuci fili L.

Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 61: g. Soleniator.

Agdh. 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 160; 1821. Aphor. p. 100: g. Fucoidear. — Par. Leman 1827. Dict. v. 48. p. 250.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 345: g. Ulvoidear.

Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXVI. 257: g. Chordariear. — Par. Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 133.

Fries 1825. Pl. homon. p. 329: g. Fucacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 112. p. 10; 1841. Ench. p. 8.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 328. n. 3394: g. Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.

Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 505: g. Sporochnear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: g. Ulvacear.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 754. n. 3829: g. Solenotar.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 63: g. Trichonematum.

Endl. 1843. Spl. III. p. 25. n. 95: g. Dictyotear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124. (?)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.

Nägeli 1847. Alg. Syst.: g. Stilophorear.

J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 125: g. Laminariear.

Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 429: g. Scytosiphonear. (ampliat.) Subgen.: Haloglossum, Euscytosiphon, Cladocoelium, Colpo-

*) σκυτώδης, coriaceus: propter calycis consistentiam.

Scytosiphon Agardh cont.
coelium. — Par. Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 239.
Synon. Chorda Stackh.; Filum Stackh.; Chordaria Link.

Scytosiphoneae Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 429: subtrib. Dictyotear. Gen.: Scytosiphon, Halodictyon, Stilophora, Wyattia, Haplosiphon, Chorda, Adenocystis, Phacochorda, Dictyosiphon, Stereothalia?
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 239: fam. Phaeosporear. Gen.: Scytosiphon.

Scytothalia*) Greville 1830. Alg. synops. p. XXXIV: nov. g. Algar. ex typo Fuci dorycarpi Turn.
Endl. 1836. Gen. n. 120 c. p. 10; 1841. Ench. p. 8: sect. Cystoseirae.
Menegh. 1838. Cenni p. 44: g. Fucoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 787.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93: *Sytothalia*): g. Sargassear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 352; 1849. Sp. Alg. p. 592. n. 405: g. Fucear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 33. n. $122/_{13}$: g. Cystoseirear. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 166.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 257: g. Fucacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57; 1849. ibid. XI. p. 473: g. Cystosirear.
Synon. Stackhousia Lamx.; Seirococcus Grev.?

Scytothamnus Hook. f. & Harv. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 531: nov. g. Chordariear., Mesogloeae et Chordariae aff. (Chordaria australis J. Agdh.), a Montagne Florideis adnumeratum. — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 63. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XI. p. 473.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 546. n. 356: g. Mesogloeacear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 219: g. Chordariacear.

Sczegleewia**) Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 233: nov. g. Omphacarpo aff. (S. involucrata.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VII. p. 419 (*Szeglewia*).

Sczuckinia Turczan. 1840. Bull. Mosc. p. 166: nov. g. Gentianear. (Flora 1842. II. Lit. p. 41.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 805 (*Sczukinia*).
Meisn. 1843. Comm. p. 365 (*Szukinia*): g. Swertiear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 78.
Endl. 1843. Spl. III. p. 76. n. $3529/_1$: g. Chironiear.
= Ophelia Don. (Griseb. in DC. Pr. IX. p. 123.)

Sczukinia Wittst. vid. *praeced.*

*) ϑαλλα s. ϑαλλός, ramus.
**) Dicat. amico Sergio Sczegleew.

Seafforthia Steud. vid *seq.*

Seaforthia*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 267. Ed. Nees p. 123: nov. g. Palmar. (S. elegans.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 623. n. 1990; 1830. Gen. I. p. 448. n. 2216. (in Polyandr. Trigyn.) — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 252. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Steud. 1841. Nom. II. p. 550 (*Seafforthia*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 201: g. Phoenicear.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 17; .... Palm. t. 105. etc.: g. Arecinar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1730. p. 247; 1841. Ench. p. 135. — Kunth 1841. Enum. III. p. 189. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2261. — Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266).
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1645: g. Arecacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Arecinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 15. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 71.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 20: sect. Ptychospermae.
Synon. Ptychosperma Labill.?

Seala Adans. 1763. Fam. II. p. 131: g. Bidentum.
= Pectis Linn.

Sebaea**) „Soland. mss.“ R. Brown 1810. Prodr. I. p. 451. Ed. Nees p. 307: nov. g. Gentianear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 475; 1825. Syst. I. p. 426. n. 443; 1830. Gen. I. p. 85. n. 416. (Tetrandr. Monogyn.) — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 6. 161. n. 438. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 254. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 37. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 184. Sejunguntur Belmontia et Lagenias. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 441. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 179.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3479: g. Chironiear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 211: g. Exaciear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 210; 1841. Nom. p. 133. n. 5125: g. Sebaeariar.
Endl. 1838. Gen. n. 3558. p. 605; 1841. Ench. p. 303: g. Sebaeear.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 164: g. Erythraeacear. Sect.: Macranthosebaea, Eusebaea, Phyllocalyx. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169) restrict. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 52: g. Sabbatiear. Sect.: Eusebaea, Phyllocalyx.
Synon. Exaci sp. Linn.

Sebaeariae Rchb. 1837. Handb. p. 210: sect. Chironiear. Gen.: Schüblera, Sebaea, Exa-

*) „Dixi in honorem viri nobilis Franc. domini de Seaforth, botanices periti cultoris et fautoris.“
**) Dicat. Alb. Seba, Amstelodam.

Sebaeariae Rchb. cont.
denus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. Gen.: Belmontia, Sebaea, Lagenias, Schübleria, Exadenus.

Sebaeeae Endl. 1838. Gen. p. 604; 1841. Ench. p. 303: trib. Gentianear. verar. Gen.: Belmontia, Sebaea, Lagenias, Schübleria, Exadenus, Henicostemma?, Tripterospermum?, Micraea?

Sebastiania*) Spreng. 1821. Neue Entd. II. p. 118: nov. g. Tricoccar., ab auctore serius ad Excoecariam L. revocatum.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5022: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. — Klotzsch 1841. Arch. f. Nat. I. p. 182. — Meisn. 1841. Gen. p. 338 (251). — Endl. 1842. Spl. II. p. 87. n. 5772/2. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 519: sect. Stillingiae.

Sebastiania Bertero 1822. Opusc. p. 37.
= Chrysanthellum Rich.

Sebastiano-Schaueria Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 158: nov. g. Eranthemear.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 313: g. Gendarussear.

Sebeokia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 13. n. 624: nov. g. Darinyphytor., a Gentiana L. separatum.

Sebesten Adans. 1763. Fam. II. p. 177: g. Borraginum.
= Cordia R. Brown.

Sebestena**) Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 340. t. 255. f. 331.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 136: g. pl. class. V.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 364. t. 76. f. 1 (officinalis).
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 68: sect. Cordiae. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 191. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 374. — Endl. 1839. Gen. n. 3738 *b*. p. 644; 1841. Ench. p. 319. Subsect.: Myxa, Varronia. — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4371. 2 (*Sebestenea*). Subsect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629: g. Cordiacear.

Sebestenae Vent. 1799. Tabl. II. p. 380: ordo 11 class. VIII. Gen. §. 1: Hydrophyllum, Ellisia. §. 2: Cordia, Ehretia, Varronia, Tournefortia, Messerschmidia.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15: div. Boraginear.

Sebestenea Rchb. vid. *Sebestena Dill.*

Sebestenoides DC. 1845. Prodr. IX. p. 476: sect. Cordiae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 914.

Sebifera***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 637. Ed. Willd. p. 783: nov. g. Dioec.

Sebifera Lour. cont.
Polyadelph. (S. glutinosa.) — Par. Blanco 1837. Filipin. p. 819.
Willd. 1793 in Lour. Coch. II. p. 784 adnot.: g. Taxo proximum. An Taxus macrophylla Thunb. jap. 276?
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Laurinear.
Nees 1836. Laurin. p. 511 in adnot.: g. Tetrantherear.?
= Tetrantherae Jacq. pars.

Sebipira Martius 1828. Reise II. p. 787: nov. g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 468. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70).
Vogel 1837. Linnaea XI. p. 385: g. Sebipirear. *Cf.* Vogel 1838. Linnaea Litt. p. 6.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1496: g. Leguminosar.
= Bowdichia HBK.

Sebipireae Vogel 1837. Linnaea XI. p. 382: trib. Caesalpiniear. Gen.: Sebipira, Leptolobium.

Sebizia Martius 1837. Cat. herb. Bras. n. 1050: g. Ampelidear., Lasiantherae aff., indescriptum. (Meisn. Comm. p. 373.)

Sebophora Necker 1790. Elem. bot. II. p. 188. n. 907: g. Aclithrophytor. (*Virola Aubl.*)
= Myristica Linn.

Secale Tourn. 1700. Inst. p. 513. t. 294: g. pl. class. XV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 286: g. pl. class. XIV.
Linn. 1737. Gen. p. 17. n. 46; 1737. Cliff. p. 25; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 22; 1753. Sp. I. p. 84; 1759. Syst. ed. X. p. 879. n. 92; 1762. Sp. ed. II. p. 124; 1764. Gen. ed. VI. p. 39. n. 97; 1767. Syst. ed. XII. p. 101: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 107; 1784. Syst. p. 125. — Reich. 1778. Gen. p. 41. n. 103. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 53. n. 127. — Gmel. 1791. Syst. p. 198. — Pers. 1797. Syst. p. 130; 1805. Ench. I. p. 108. n. 197. — Willd. 1797. Sp. I. p. 471. n. 150; 1809. En. p. 132. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 388. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 88. — Trin. 1820. Fund. p. 151. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 710.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 18. n. 72: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 174.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 73. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1802. Gram. Austr. II. p. 35. t. 47. 48. — Link 1821. En. I. p. 99. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 71. 348. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 69. n. 337.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 32. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 107. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 84. — DC. 1805. Franç. III. p. 87. — Hedw. 1806. Gen. p. 47. 364. — Palis. 1812. Agrost. p. 105. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 44. 773. n. 350. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 323. n. 326. —

*) Dicat. Ant. Sebastiani, prof. Romano.
**) Nomen arabicum testibus Ruellio et Bauhino.
***) Nomen ab oleo sebiformi baccarum.

Secale Tourn. cont.
Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 309 (*Seigle*). — Link 1829. Hdb. I. p. 9.
Adans. 1763. Fam. II. p. 36: g. Triticor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 395: g. Glumosar.
Neck. 1790. El. III. p. 226. n. 1608: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1830. Gram. p. 145; 1833. Agrost. p. 449; 1838. Berol. II. p. 408: g. Hordeacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 173. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 91. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 451. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 914. p. 103; 1841. Ench. p. 59. — Koch 1837. Syn. p. 826. Ed. II. p. 954. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 46. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 391. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1376. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 242. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 527 (*Seigle*). — Steud. 1854. Glum. I. p. 347.
Link 1827. Hort. I. p. 22: g. Triticear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 22. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 334. — Math. 1853. Belg. I. p. 634. (verar.) — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 598.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 856: g. Secalinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Frumentacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Hordear.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 427: g. Bromacear.

Secalinae Rchb. 1828. Consp. p. 48: div. Graminear. Gen.: Oreochloa, Wangenheimia, Catapodium, Brizopyrum, Gaudinia, Trachynia, Brachypodium, Agropyrum, Triticum, Aegilops, Secale.

Secamonae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 500: trib. Asclepiadear. Gen.: Secamone, Goniostemma, Toxocarpus.
Conf. Secamoneae.

Secamone R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 55 (Verm. bot. Schr. II. p. 392); 1810. Prodr. I. p. 464. Ed. Nees p. 320: nov. g. Asclepiadear. (Periploca Secamone L.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 489; 1825. Syst. I. p. 837. n. 966; 1830. Gen. I. p. 208. n. 1061. (Pentandr. Digyn.) — Schult. 1820. Syst. VI. p. XIII. 124. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1049. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 60. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. p. 224. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 884.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 257: g. Apocynear.
Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3455; 1841. Nom. p. 132. n. 5053: g. Secamonear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 159. — Endl. 1838. Gen. n. 3441. p. 589; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 543. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 53. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 471.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26 (*Scamone*): g. Periplocear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 501: g. Secamonar.

Secamoneae R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 55 (Verm. bot. Schr. II. p. 392): div. Asclepiadear., absque nomine indicata. Gen.: Secamone.
Rchb. 1828. Consp. p. 131: subdiv. Periplocear. Gen. id.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 109. 159: trib. Asclepiadear. Gen.: Secamone, Toxocarpus, Goniostemma. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. 543. Gen. ead. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 53. Gen.: Secamone.
Endl. 1838. Gen. p. 589; 1841. Ench. p. 298: subordo Asclepiadear. Gen. ut Don. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 130: sect. Pergulariear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: trib. Asclepiadacear. Gen. ead.

Sechineae Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 407: trib. Cucurbitacear. Gen.: Sechium. — Par. Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 279. Gen. id.

Sechium P. Browne 1756. Jamaic. p. 355: nov. g. Monoec. sect. 4.
Juss. 1789. Gen. p. 391: g. Euphorbiar.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 664. n. 1482: g. Monoec. Syngenes.
Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1150: g. Monadelph. Pentandr.
Batsch 1802. Tab. p. 221: g. Cucurbitacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 592; 1826. Syst. III. p. 47. n. 2367; 1831. Gen. II. p. 532. n. 2611. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 293. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. — Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 117.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 627. n. 1744: g. Monoec. Monadelph. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 595. n. 2164.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 288: g. Euphorbiacear.
Lam. 1806. Dict. VII. p. 50.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. p. 25; 1828 in DC. Pr. III. p. 313: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2746. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 37. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (92). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 228.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 407: g. Sechinear. — Par. Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 279.
Pöpp. 1838. Nov. gen. II. p. 56. t. 176.
Endl. 1839. Gen. n. 5147. p. 940; 1841. Ench. p. 491: g. Sicyoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3939. — Walp. 1843. Rep. II. p. 204. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 612. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 19. 106. Sect.: Eusechium, Chayota.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Sicear.
Synon. Chocho Adans.; Chayota Jacq.

Secoliga Massalongo 1857. Descr. alc. Lich. nuov. (Flora 1857. p. 492): nov g. Lichenum. (Thelotrema leucaspis Kremp.)
Arnold 1858. Flora p. 333: g. Gyalectear.
Secondatia*) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 445: nov. g. Echitear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 475.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 71. t. 281.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.
Secotiaceae Corda 1854. Icon. Fung. VI. p. 28: fam. Myelomycetum. Gen.: Polyplocium, Secotium.
Secotieae L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 176: subdiv. Podaxinear. Gen.: Secotium, Gyrophragmium, Polyplocium.
Secotinium Zobel 1854 in Corda Icon. Fung. VI. p. 30. t. 6. f. 19—30: sect. Secotii. (S. melanosporum et coarctatum Berk.)
Secotium Kunze 1840. Flora p. 321: nov. g. Trichogastrum.
Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 399: g. Lycoperdeor.
Berk. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 201: g. Lycoperdacear.
Mont. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 80: g. Podaxinear.
L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 171. 176: g. Secotiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Podaxineor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 440.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Polyporeor.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 29. t. 6: g. Secotiacear. Sect.: Secotium, Secotinium.
Secrias Endl. vid. *Scorias Fries.*
Securidaca Tourn. 1700. Inst. p. 399. t. 244: g. pl. class. X.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 576: g. Leguminosar.
= Bonaveria Scop.
Securidaca Rupp. 1718. Fl. jen. p. 256. Ed. Hall. 1745. p. 266: g. pl. class. XI.
Adans. 1763. Fam. II. p. 327: g. Phaseolor.
= Coronilla Linn.
Securidaca**) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 347. n. 698; 1753. Sp. II. p. 707: g. Diadelph. Decandr.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 130. n. 534: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 115.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Papilionacear.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 287: g. Diadelph. sect. 1.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1155. n. 763; 1763. Sp. ed. II. p. 992; 1764. Gen. ed. VI. p. 365. n. 852; 1767. Syst. ed. XII. p. 472: g. Diadelph. Octandr. — Par. Jacq.

*) Dicat. cl. Secondat, fillo Montesquieui.
**) Nomen ex Plinio. Ita nominata, quod fructus bipennis effigiem aemuletur. (Beckmann Lex. bot. p. 195.)

Securidaca Linn. cont.
1763. Amer. p. 197. t. 183. — Murr. 1774. Syst. p. 533; 1784. Syst. p. 640. — Reich. 1778. Gen. p. 364. n. 922. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 482. n. 1156. — Gmel. 1791. Syst. p. 1083. — Pers. 1797. Syst. p. 678; 1807. Ench. II. p. 275. n. 1664. — Willd. 1800. Sp. III. p. 898. n. 1315. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 219.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 290: g. Tetrapetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 302: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 432. — Link 1822. En. II. p. 220.
Juss. 1789. Gen. p. 366: g. Leguminosis aff. — Par. St. Hil. Expos. II. p. 245.
Neck. 1790. El. III. p. 52. n. 1374: g. Cyteophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 87: g. Rhoeadear.
Cram. 1803. Disp. p. 158: in Monadelph. Octandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 738; 1826. Syst. III. p. 175. n. 2495; 1831. Gen. II. p. 570. n. 2777: g. Polygalear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 420. — Kunth 1824. Syn. III. p. 322. — DC. 1824. Pr. I. p. 340. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 299. — A. St. Hil. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 354; 1829. Fl. Bras. II. p. 67; 1830. Mém. Mus. XIX. p. 335. — Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3040; 1841. Nom. p. 175. n. 6786. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 369. — Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 48. (verar.) — Endl. 1840. Gen. n. 5653. p. 1079; 1841. Ench. p. 568. — Walp. 1842. Rep. I. p. 246; 1846. V. p. 67. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 108. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 81. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 240.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Polygalacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378. — Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 295.
Link 1831. Hdb. II. p. 212: g. Hedysarear.
Synon. Elsota Adans.
Securigena Dumort. vid. *Securinega Comm.*
Securigera DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 609.
DC. 1825. Pr. II. p. 313: g. Coronillear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 277. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155. — Koch 1836. Syn. p. 189. Ed. II. p. 210. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 532.
Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 302: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 589. n. 2901.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 502: g. Hedysarear.
= Bonaveria Scop.
Securilla Pers. 1807. Ench. II. p. 314: sect. Coronillae.
= Bonaveria Scop.
Securina Medic. (Vorles. II. p. 368) 1789. Vorles. IV. 1. p. 355; 1789. Phil. Bot. I. p. 210: nov. g. ex typo Coronillae Securidacae L.
= Bonaveria Scop.

Securinega „Comm. mss.“ Juss. 1789. Gen. p. 388: nov. g. Euphorbiar.
Gmel. 1791. Syst. p. 1008: g. Monadelph. Pentandr.
Batsch 1802. Tab. p. 168: g. Tricoccar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 940. n. 1112; 1830. Gen. I. p. 234. n. 1236. (in Pentandr. Trigyn.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1016.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 761. n. 1788: g. Diocc. Pentandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 617. n. 2222.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 282: g. Euphorbiaccar. — Par. Link 1822. En. II. p. 424. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 14. t. 2. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 303.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5094; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7434: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5864. p. 1122; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 343 (255). — Brongn. 1843. En. genr. p. 81. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45 (*Securigena*): g. Buxinear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 588: g. Wielandiidear.

Seda Adans. 1763. Fam. II. p. 246: fam. 33 plant. Gen.: Cotyledon, Kalanchoë, Crassula, Gomara, Rhodia, Anacampseros, Sedum, Tillaea, Jorena, Suriana, Tetracera.

Sedaceae Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 487: ordo plant. Gen.: Cuscuta, Chrysosplenium, Drosera, Parnassia, Sedum.

Seddera Hochst. & Steud. in Schimp. it. Arab. n. 977.
= Saltia R. Brown.

Seddera *) Hochstett. 1844. Flora I. Bes. Beil. p. 7. t. 5: nov. g. Convolvulacear.
Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 440: g. Convolvulear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.

Sedeae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 854: fam. 98 plant. Gen.: Sedum, Sempervivum, Cotyledon, Calanchoë, Crassula, Tillaea, Septas.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: div. Corniculatar. Gen.: Tillaea, Bulliarda, Crassula, Calosanthos, Diamorpha, Verea, Cotyledon, Sedum, Penthorum, Sempervivum, Cephalotus.
Rchb. 1828. Consp. p. 158: subdiv. Crassulacear. Gen.: Tillaea, Bulliarda, Dasystemon, Septas, Crassula, Globulea, Cyrtogyne, Grammanthes, Rochea, Dietrichia, Calanchoë, Bryophyllum, Cotyledon, Pistorinia, Umbilicus, Echeveria, Sedum, Sempervivum; Goodallia?, Cephalotus?, Frankoa?
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: subdiv. Crassulariar. Gen. ut 1828 exclusis 3 ultimis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. Sect.: Crassuleae, *genuinae* (gen.: Sedum, Aithales, Rhodiola, Monanthes, Sempervivum, Aichryson, Aeonium, Greenovia. Subsect.: Cotyledoneae).
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): trib. Crassulear. Gen.: Sedum, Sempervivum, Dasystemon, Septas, Globulea, Crassula, Tillaea.
Endl. 1839. Gen. p. 811; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulear. diplostemonum. Gen.: Sedum, Sempervivum et 1841 Aithales.

Sedeites (Sternb.?) 1823. Flora I. p. 327: vid. *Variolaria Sternb.*

Sedgwickia Bowdich 1825. Excurs. in Madeira p. 35: g. Hepaticar. *Cf.* Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. 11 not.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 521: g. Epiphyllinor.
Endl. 1836. Gen. n. 458. p. 43; 1841. Ench. p. 25: g. Ricciacear.
= Lunularia Mich.

Sedgwickia Bischoff 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 1081: g. Hepaticar.
= Plagiochasma Lehm. & Lindenb.

Sedgwickia Griffith 1836. Asiat. research. XIX. 1. p. 98. t. 15. 16: nov. g. Hamamelidear. (S. cerasifolia.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 179. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 77. — Meisn. 1843. Comm. p. 359.
Endl. 1839. Gen. n. 4595. p. 805; 1841. Ench. p. 401: g. Bucklandiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 930.
Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6486: g. Fothergillear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784: g. Bucklandear.
Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 322: g. Altingiear.
= Liquidambar Linn. (Endl. Spl. IV. p. 38.)

Sediflorae Rchb. 1828. Consp. p. 158; 1832. Fl. exc. p. 437. 545; 1837. Hdb. p. 217; 1841. Nomencl. p. 157: formatio Confinium. Fam.: Corniculatae, Loasaceae, Ribesiaceae (1837 Cacteae).

Sedites Geinitz .... Charact. III. p. 97.
= Geinitzia Endl.

Sedoidea Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 57. 83: nov. g. Fucor. (S. purpurea, olivacea.)
= Lomentaria Lyngb.

Sedoides Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 111: sect. Saxifragae. (S. sedoides, Seguieri, planifolia et androsacea.)

Sedum Tourn. 1700. Inst. p. 262. t. 140: g. pl. class. VI, ab Auctoribus varie circumscriptum. (*Cf. Anacampseros Tourn., Fabaria Mönch* et *Rhodiola Linn.*)
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 114. Ed. Hall. 1745. p. 128: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 136. n. 383; 1737. Cliff. p. 176; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 116; 1753. Sp. I. p. 430; 1759. Syst. ed. X. p. 1036. n. 513; 1762. Sp. ed. II. p. 616; 1764. Gen. ed. VI. p. 230. n. 579; 1767. Syst. ed. XII. p. 316. n. 575: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 358; 1784. Syst. p. 429. — Reich. 1778. Gen. p. 235. n. 629. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 309. n. 789. — Lour. 1790. Coch. I.

*) Nomen a monte *Sedder*.

Sedum Tourn. cont.
p. 287. — Gmel. 1791. Syst. p. 730. — Pers. 1797. Syst. p. 460; 1805. Ench. I. p. 511. n. 1139. — Willd. 1799. Sp. II. p. 760. n. 913; 1809. En. p. 483. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 292.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 392: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 100. n. 416: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 274. — Batsch 1802. Tab. p. 27. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 293.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 307. — Link 1821. En. I. p. 436.
Adans. 1763. Fam. II. p. 248: g. Sedorum. (= Sempervivum L. ex Steud.)
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 171: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 209: g. Pentapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 487: g. Sedacear.
Scop. 1777. Intr. p. 254: sect. Sedi.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 313. t. 65. f. 7 (Telephium et Aizoon).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 220.
Neck. 1790. El. II. p. 297. n. 1068: g. Synathrophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 701: g. Allagostemonis.
DC. 1801. Bull. soc. philom. Nr. 49; 1805. Franç. IV. p. 386; 1815. V. p. 523: g. (emend.) Crassulacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 539. Sect.: Rhodiola, Telephium, Sedum, Aizoon. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 44. — Kunth 1824. Syn. III. p. 356; 1838. Berol. I. p. 149. — D. Don 1825. Nepal. p. 212. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 63. 212. — Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Link 1831. Hdb. II. p. 24. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 547. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 227. — Koch 1836. Syn. p. 257. Ed. II. p. 283. Sect.: Telephium, Cepaea, Sedum. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 90. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 323. Sect.: Cepaea, Eusedum, Telephium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 176. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 617. Sect. ut Koch. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 210 (*Orpin*).
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 125: g. Crassulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 335. n. 1317. — Lois. 1825. Dict. v. 36. p. 473 (*Orpin*). — DC. 1828. Pr. III. p. 401. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 113. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 558. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 115 (ed. Schrank 1819. p. 124); 1821. Rev. succ. p. 26: g. Pentandr. Pentagyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 855; 1825. Syst. II. p. 433. n. 1730; 1830. Gen. I. p. 384. n. 1936: g. Sedear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L (sphalm. *Ledum*); 1828.

Sedum Tourn. cont.
Consp. p. 159. n. 4189 (sect.: Rhodiola, Sedum); 1841. Nom. p. 158. n. 6184. (restrict.) — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 189. — — Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98). — Endl. 1839. Gen. n. 4622. p. 811; 1841. Ench. p. 405; 1850. Spl. V. p. 21. Sect. (1850): Rhodiola, Telephioides. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1618. — Walp. 1843. Rep. II. p. 260. 935; 1846. V. p. 795. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 13.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Sempervivear.
Sedum Scopoli 1772. Fl. Carn. I. p. 323: g. Decandr. Pentagyn., includens Sempervivum et Rhodiolam.
Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar. Sect.: Cotyledon, Crassula, Rhodiola, Sempervivum, Sedum.
Seemannia Regel .... Gartenfl. IV. p. 183.
Hanst. 1858. Linnaea XXIX. p. 506. 586: g. Brachylomatear.
Seetzenia Decaisne 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 280: g. Zygophyllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479.
Endl. 1840. Gen. n. 6042. p. 1165; 1841. Ench. p. 616: g. Zygophylleis aff. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 498.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7559: g. Guajacear.
= seq.
Seezenia*) R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 231 (Verm. bot. Schr. IV. p. 46): nov. g. Zygophyllear. (S. africana.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 392. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 306. (genuinar.) — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43).
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5195: g. Guaiacear.
Conf. praeced.
Segeretia G. Don vid. *Sageretia*.
Segestrella Fries 1831. Lich. eur. p. 8. 460': vid. *Segestria Fries*.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 120: g. Endocarpear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 331: g. Verrucariear.
Segestria Fries 1825. Pl. homon. p. 263: nov. g. Trypetheliacear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 306.
Fries 1831. Lich. eur. p. 429 (p. 8 et 460 emend. *Segestrella*): g. Verrucariear.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 207: g. Verrucarior.
= Sphaeromphale Rchb.
Segetella „Hoffm." Hedw. 1806. Gen. p. 209. n. 860: g. Pentandr. Trigyn.
Pers. . . . . sect. Alsines. (A. segetalis, etc.) teste Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 307.
= Spergularia Pers.
Segmaria „Pers." Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 407: vid. *Seymeria Pursh*.
Segregatae Rchb. 1837. Handb. p. 182: div. Synanthercar. Subdivis.: Elephantopeae, Corymbieae, Echinopeae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 100. Subdivis.: Seriphieae, Echinopsideae, Rolandreae.

*) Dicat. peregrinatori meritissimo.

Seguaster major „Rumph." Hamilt. in Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 316: vid. *Saguaster major Rumph.*

Seguaster minor „Rumph." Hamilt. in Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 316: vid. *Saguaster minor Rumph.*

Segueria Endl. vid. *Seguieria Löfl.*

Seguiera Adans. 1763. Fam. II. p. 443: g. Cistor.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 607. n. 1959: g. Polyandr. Monogyn.
Agdh. 1825. Aphor. p. 221: g. Petiverear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 299.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5580: inter genera vix cognita.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Petiveriear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 270: g. Phytolaccear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 386: g. Petiveriacear.
= seq.

Seguieria*) Löfling 1758. It. p. 191.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1074. 1373. n. 1150; 1762. Sp. ed. II. p. 747; 1764. Gen. ed. VI. p. 272. n. 676; 1767. Syst. ed. XII. p. 369: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 170. — Murr. 1774. Syst. p. 417; 1784. Syst. p. 501. — Reich. 1778. Gen. p. 276. n. 731. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 364. n. 918. — Lour. 1790. Coch. I. p. 341. — Gmel. 1791. Syst. p. 827. — Pers. 1797. Syst. p. 538; 1807. Ench. II. p. 80. n. 1316. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1219. n. 1053. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 375. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 307. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 443. n. 2192.
Gled. 1764. Syst. p. 123. n. 509: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 263: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 440: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 274. n. 1035: g. Catizophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 690: g. Samydear.
R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. p. 455 (Verm. bot. Schr. I. p. 267): g. Phytolaccear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 241. (sect. 2.)
Benth. 1839. Linn. Trans. XVIII. 2. p. 234. t. 19.
Endl. 1840. Gen. n. 5254. p. 975; 1841. Ench. p. 508 (*Segueria*): g. Petiveriear. (verar.) — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 316 (227). — Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6441. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 101.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 6: g. Seguieriear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 526: g. Phytolaccacear.
Synon. Seguiera Adans., etc.

Seguierieae Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 6: trib. Petiveriear. Gen.: Seguieria, Gallesia, Petiveria.

*) Dicat. Jean Franç. Seguier.

Sehima*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 178: nov. g. Polygam. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 309.
Scop. 1777. Intr. p. 76: g. Graminum legitimor.
Juss. 1789. Gen. p. 447: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 79. — Hedw. 1806. Gen. p. 44. 363. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 49. 803. n. 369.
Gmel. 1791. Syst. p. 178: g. Triandr. Digyn.
= Ischaemum Linn.

Seidelia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 465: nov. g. Dysopsidear. (Mercurialis triandra E. M.)

Seidlia**) Kostel. .... Med. pharm. Bot. p. 1945.
Rchb. 1837. Hdb. p. 304: g. Dipterocarpear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 308.
= Vateriae sect. Isauxis Arn.

Seimatosporium Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 79. t. 40: nov. g. Fungor. (S. Rosae.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 59 (*Sciniatosposporium*): g. Stilbosporeor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 47. (*Sciniat.*)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 15: g. Phragmidiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.

Seiridium***) Nees 1816. Syst. p. 22; 1817. Überbl. p. 5: g. Coniomycor. liberor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 314.
Mart. 1817. Erlang. p. 324: g. Coniomycetum (elementarium). — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 79.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Phragmidior.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 528: g. Stilbosporear.
Link 1825. Sp. II. p. 126: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 192: g. Stilbosporeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 29.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Exosporeor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92 (sphalm. *Sciridium*): g. Leptomycetum.
Endl. 1836. Gen. n. 203 *b.* p. 18; 1841. Ench. p. 13: sect. Corynei.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 29: g. Phragmidiaceor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 34: g. Torulaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phragmotrichaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Pestalozzieor.
Synon. Siridium Spreng.

*) *Saehim* Arabum.
**) Dicat. Mich. Seidl, botanophilo bohemico.
***) σειρίς, funiculus, linea.

Seirococcus Greville 1830. Synops. p. XXXIV: nov. g. ex typo Fuci axillaris Turn.
Endl. 1836. Gen. n. 120 *d*. p. 10; 1841. Ench. p. 8: sect. Cystoseirae.
Menegh. 1838. Cenni p. 44: g. Fucoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 788.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): g. Sargassear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 33. n. $122/_{14}$: g. Cystoseirear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 353 (*Sirococcus*): g. Fucear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 260: g. Fucacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57 (*Sirococcus*): g. Cystosirear.
= Scytothalia Grev.?

Seirogonimicae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130: series Ulvacear. Divis.: Conferveae, Zygnemeae, Oscillatorieae.

Seirospora „Harv. Phyt. brit." Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 896: g. Callithamniear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53 (*Sirospora*): g. Ceramiear.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 37: g. Rhodophycear.

Sekika Kämpf. 1712. Amoen. exot. Fasc. V. p. 870.
Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 49. (Saxifraga sarmentosa L.)
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 77: g. Thalamostemonis.
= Hydatica Neck.

Sekra Adans. 1763. Fam. II. p. 492: g. Muscor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 315.
= Cinclidotus Brid.

Selaginaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 279) 1847. Veg. kingd. p. 666: ordo Echialium. Gen. Selaginear. Endl. et Macria, Gymnandra, Globularia.
Choisy 1848 in DC. Pr. XII. p. 1: ordo (149) Corolliflorar. Gen.: Polycenia, Hebenstreitia, Dischisma, Selago, Walafridia, Gosela, Microdon, Agathelpis; Gymnandra.
Synon. Selagineae Juss., Choisy.

Selaginea Batsch 1802. Tab. affin. p. 263: fam. Chlorophyllor. Gen.: Marattia, Lunularia, Ophioglossum, Lycopodium.

Selagineae Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 71; 1827. Dict. v. 48. p. 322: ordo plant. (1806 modo pro Selagine indicatus). Gen.: Polycenia, Dischisma, Hebenstreitia, Selago, Microdon, Agathelpis.
Choisy 1823. Mém. soc. Genèv. II. 2. p. 71.
Rchb. 1828. Consp. p. 122: sect. Acanthacear. Gen.: Globularia; Selago, Hebenstreitia, Microdon, Polycenia, Dischimia, Agathelepis; Campylanthus, Caldasia; Coris.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. 22: fam. Labiariear. Gen. ut Juss. 1827.
Bartl. 1830. Orb. p. 177: ordo (108) Labiatiflorar. Gen. ead. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 281. 292 (201.) Gen. ut Endl.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (219) Monopetalar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 364: subdiv. Rhinanthear. (Gen.: Globularia.)
Lindl. 1833. Nix. p. 30: ordo Labialium.
Endl. 1838. Gen. p. 640; 1841. Ench. p. 316:

Selagineae Juss. cont.
ordo (140) Nuculiferar. Gen. ut Juss. et Walafridia.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 244: fam. (142) Labiatiflorar. Gen. ut Endl. et Macria. *Affinia*: Stilbe, Campylostachys.
Rchb. 1841. Nom. p. 114: subdiv. Globulariear. Gen.: Selago, Walafridia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: fam. Selaginoidear. Gen.: Hebenstretia, Selago.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 533: g. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.
= Selaginaceae Lindl.

Selaginella Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 101: nov. g. Lycopodior. (Lycopodium selaginoides L.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 323.
Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1676 *f*; 1831. Fl. exc. p. 153: sect. Lycopodii. — Par. Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 34. — Kunze 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 109.
Spring 1838. Flora I. p. 148: g. Lycopodiacear. (emend). — Par. Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 191. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 158. — Meisn. 1843. Gen. p. 436 (337). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 6. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 971. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 83. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 70. — Webb 1850. Canar. III. p. 433. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 500. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 655.
Spring 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 117; 1843. Bull. Ac. Brux. X. 1. p. 135. 225; 1854. Pl. Jungh. III. p. 275: g. Lycopodinear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 330.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 122: g. Selaginellear.
Synon. Selaginoides et Lycopodioides Dill.; Gymnogynum, Diplostachyum et Stachygynandrum Palis.

Selaginelleae Rchb. 1837. Handb. p. 163: div. Lycopodiacear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 16. 122: fam. Cryptogamar. vascular. Gen.: Selaginella, Isoëtes.

Selagines Endl. 1836. Gen. p. 68; 1841. Ench. p. 45: class. (IX.) Acrobryer. protophytor. Ord.: Isoëteae, Stigmarieae, Lycopodiaceae, Lepidodendreae. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 114; 1846. Chlor. prot. p. LIII. Ord. iid. et Sigillarieae, Psaronieae.

Selaginites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 90; 1828. Prodr. p. 84: g. foss. Lycopodiacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 698. p. 70; 1841. Ench. p. 47. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 140; 1846. Chlor. prot. p. LIX.
Unger 1842 in Endl. Spl. II. p. 5. n. 698: g. Lepidodendrear.?

Selaginoideae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XIX. 64: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Jasmineae, Globularieae, Selagineae, Myoporineae.

Selaginoides Dillen. 1741. Hist. Musc. p. 460. t. 68. f. 1: nov. g. Muscor. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 94.
= Selaginella Palis.

Selago Rupp. 1718. Fl. jen. p. 330: g. pl. class. XVI.
Dill. 1741. Hist. Musc. p. 435. t. 56. 57: g. Muscor. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 94.
Leman 1823. Dict. v. 27. p. 426: sect. Lycopodii. — Par. Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 32. — Endl. 1836. Gen. n. 696 *a*. p. 69; 1841. Ench. p. 47. — Kunze 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 108.
= Lycopodii Linn. pars.

Selago*) Linn. 1737. Gen. p. 187. n. 519; 1737. Cliff. p. 321; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 629; 1759. Syst. ed. X. p. 1117. n. 687; 1762. Sp. ed. II. p. 876; 1764. Gen. ed. VI. p. 317. n. 769; 1767. Syst. ed. XII. p. 419: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 475; 1784. Syst. p. 568. — Reich. 1778. Gen. p. 319. n. 829. — Gmel. 1791. Syst. p. 948. — Pers. 1797. Syst. p. 604; 1807. Ench. II. p. 145. n. 1447.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 179. n. 733: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 184.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 528.
Hill 1769. Ht. kew. p. 263: g. Monopetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 171: g. Personatar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 238. t. 51. f. 6 (fasciculata).
Juss. 1789. Gen. p. 110: g. Viticibus aff.
Neck. 1790. El. I. p. 364. n. 562: g. Plasyrgophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 399. n. 955: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 181. n. 1129; 1809. En. p. 635. — Cram. 1803. Disp. p. 143.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 323: g. Pyrenacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 252: g. Verbenacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 123; 1829. Hdb. I. p. 451.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 71: g. novae familiae.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 420: g. Myoporear.
Choisy 1823. Mém. Genèv. II. 2. p. 98: g. Selaginear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 319. — Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3093; 1841. Nom. p. 114. n. 4444. Sect. (1841): Selago, Macria. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 178. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 254. Sect.: genuinae, Macria. — Endl. 1839. Gen. n. 3731. p. 641; 1841. Ench. p. 317. Sect.: Euselago, Macria. — Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 245. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 475. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 150. Sect. ut Endl. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 532.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 745. n. 2108; 1831. Gen. II. p. 476. n. 2351: g. Labiatar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII: g. Buchnerear.

*) Nomen ex Plinio.

Selago Linn. cont.
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 279; 1847. Veg. kd. p. 667: g. Selaginacear. — Par. Choisy 1848 in DC. Pr. XII. p. 8. Sect. ut Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 196: g. Globulariear.
Synon. Vormia Adans.; Noltea Eckl. (Noltia? Eckl. ex Steud.)

Selago Adans. 1763. Fam. II. p. 268: g. Amaranthor.
= Polycnemum Linn. pt.

Selago Burm. Prodr. fl. cap. 17 ex DC. Prodr. VI. p. 260.
= Stoebes Less. spec.

Selas Spreng. 1825. Syst. II. p. 216. n. 1443: g. Octandr. Monogyn., fam. incertae.
= Gela Lour.

Selatium*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 174. 196: nov. g. Gentianear. verar. (Gentiana thyrsoidea Hook.)

Selbya Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 89. 126: nov. g. Meliacear. dubium. (Milnea montana Jacq.)

Selenaca Lindl. vid. *seq.*

Selenaea Nitzsch mss.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13 (*Selenaca*): g. Desmidiear.
= Pediastrum Meyen.

Selenia**) Nuttall 1825. Journ. Ac. Philad. V. p. 132. t. 6: nov. g. Seleniear. (S. aurea.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 62. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 99. — Endl. 1839. Gen. n. 4884. p. 870; 1841. Ench. p. 449. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 534.
Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4775: g. Alyssinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11).
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 654.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 269: g. Cruciferar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259: g. Alyssear.
Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6965: g. Lunariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Selenidar.

Selenidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: trib. Pleurorhizear. Gen.: Selenia.

Selenidium Kunze (Fée Gen. Fil. p. 358): Davalliae sp. Auct.

Selenieae Nuttall 1825. Journ. Ac. Philad. V. p. 132.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 99: trib. Siliculosar. Gen.: Selenia.
Endl. 1839. Gen. p. 870; 1841. Ench. p. 449: fam. Alyssineis aff. Gen. id.

Selenipedium Rchb. f. 1854. Xen. Orchid. p. 3: nov. g. Orchidear., Cypripedio aff.

Selenocarpaea DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 247; 1821. Syst. II. p. 684; 1824. Prodr. I. p. 232: sect. Heliophilae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4821 *d;* 1841. Nom. p. 182. n. 7020. 4. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 265. — Endl. 1839. Gen. n. 4978 *d.* p. 888; 1841. Ench. p. 451. — Walp. 1842. Rep. I. p. 191; 1848. Ann.

*) σέλας, nitor, lumen.
**) σελήνη, luna.

Selenocarpaea DC. cont. bot. I. p. 53. — Sond. 1846. Abh. Geb. Nat. I. p. 220.
Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. I. p. 10: g. Heliophilear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324: g. Siliculosar.

Selenocarpium „Corda" Rchb. 1841. Nomencl. p. 3. n. 70: g. Tubercularinor.

Selenocera „Zippel. Linnaea XV. p. 316" Walp. 1847. Rep. VI. p. 57: g. Rondeletiear.

Selenochlaena Corda 1845. Beitr. Fl. Vorw. p. 81: nov. g. Phthoropteridum. (Tubicaulis dubius et Solenites.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 85: g. Rachiopteridear.

Selenocoele DC. 1830. Prodr. IV. p. 629: sect. Valerianellae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 72. n. 2701. 4 (*Selenocoela*).

Selenogyne „Cass." DC. Prodr. VI. p. 147 in synon. Cryptogynes: vid. *Solenogyne Cass.* 1827.

Selenolobium Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 256: sect. Dalbergiae. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 132. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 577.

Selenophora Meisn. vid. *Solenophora Benth.*

Selenopteris Corda 1845. Beitr. Fl. Vorw. p. 84. t. 52: nov. g. Rhachiopteridear. (S. radnicensis et involuta.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 86: g. Rachiopteridear.

Selenosporium Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 7; 1838. II. p. 6: nov. g. Phragmidiacear. (*Fusarium Nees* pt., *Volutella Fries*, non Tode.)
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 34: g. Tubercularinor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 135.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 21: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 28.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 164: g. Coryneacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 150.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor. [p. 495 (*Solenosporium*): g. Septonemeor.]
Math. 1853. Belg. II. p. 428: g. Nemasporear.

Selenostylis Blume 1848. Rumphia IV. p. 44: sect. Podochili.

Seleranthus Hill Hort. Kew. p. 372: sphalm. pro *Scleranthus*.

Seligeria Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: nov. g. Seligeriacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 132. — Bayrh. 1849. Taunus p. 3.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 418: g. Leptotrichacear. Sect.: Euseligeria, Leptotrichella.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
Synon. Anodus Br., Sch. & Gümb.

Seligeriaceae Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: fam. Muscor. Gen.: Anodus, Seligeria, Blindia, Stylostegium, Brachyodus, Campylostelium.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 130: subsect. Dicranoidear. Gen. fere ead.
Bayrh. 1849. Taunus p. 3: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Seligeria.

Selineae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 640: ordo Umbelliferar. Gen.: Selinum, Peucedanum, Heracleum, Ferula, Pastinaca, Angelica, Imperatoria.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLVI; 1825. Syst. I. p. 531; 1830. Gen. I. p. 226: trib. Umbelliferar. Gen. ead. et Cogswellia (serius omissa), Thapsia, Laserpitium, Artedia.
Link 1829. Hdb. I. p. 354: subordo Umbellatar. Gen.: Tordylium, Hasselquistia, Zosimia, Heracleum, Opopanax, Peucedanum, Selinum, Melanoselinum, Bubon, Ostruthium, Imperatoria, Ferula, Ferulago, Archangelica, Angelica, Ostericum, Carvifolia, Levisticum, Crithmum.

Selineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 88: trib. 8 Umbelliferar. Gen.: Zosimia, Heracleum, Pastinaca, Anethum, Peucedanum, Imperatoria, Bubon, Opopanax, Ferula, Ferulago.
= Peucedaneae Koch.

Selinocarpus A. Gray 1853. Amer. journ. sc. 2d. ser. XV. (Bot. Zeit. 1854. p. 99): nov. g. Nyctaginear.

Selinoides DC. 1830. Prodr. IV. p. 180: sect. Peucedani. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 333. — Koch 1836. Syn. p. 305. Ed. II. p. 335. — Endl. 1839. Gen. n. 4462 e. p. 780; 1841. Ench. p. 379. — Walp. 1843. Rep. II. p. 410. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 313.
Tausch 1834. Flora I. p. 347: sect. Imperatoriae.
Synon. Oreoselinum Duby; Selinum Gaud.; Pteroselinum Rchb. pt.

Selinon Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 259: nomen emendat. (??) pro „*Selinum*".

Selinum Linn. 1737. Gen. p. 73. n. 210; 1737. Cliff. p. 92; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 59; 1753. Sp. I. p. 244; 1759. Syst. ed. X. p. 956. n. 300; 1762. Sp. ed. II. p. 350; 1764. Gen. ed. VI. p. 133. n. 337; 1767. Syst. ed. XII. p. 207. n. 334: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 229; 1784. Syst. p. 278. — Reich. 1778. Gen. p. 137. n. 368. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 184. n. 470. — Gmel. 1791. Syst. p. 475. — Pers. 1797. Syst. p. 294. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1396. n. 534; 1809. En. p. 305. — Cavan. 1799. Icon. V. p. 58. t. 486. 487. (reform.)
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 443: g. Umbelliferar. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 204. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 59; 1769. Stirp. Austr. p. 159. — Scop. 1772. Carn. I. p. 200; 1777. Introd. p. 112. — Juss. 1789. Gen. p. 223. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 28. — St. Hil. 1805. Expos. I.

Selinum Linn. cont.
p. 475. — DC. 1805. Franç. IV. p. 318; 1815. V. p. 511. — Hedw. 1806. Gen. p. 198. n. 811.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 54. n. 218: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 79.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 97. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 308. n. 686.
Neck. 1790. El. I. p. 178. n. 299: g. Scadiophytor. Sejungitur Allinum.
= Selinum Gärtn., Peucedani, Angelicae, Ligustici etc. spec.

Selinum Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 89. t. 21. f. 8. (S. Carvifolia.)
Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 150: g. Umbelliferar. (restrict. Distinguuntur Thysselinum, Oreoselinum, Melanoselinum.) — Par. Link 1821. En. I. p. 268. — D. Don 1825. Nepal. p. 185. — Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 353. — Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 641; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLVI. 557; 1825. Syst. I. p. 909. n. 1081; 1830. Gen. I. p. 226. n. 1182: g. Selinear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 358.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 168: g. Umbellatar.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 100; 1836. Syn. p. 300. Ed. II. p. 330: g. Angelicear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 377. — Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3695; 1832. Fl. exc. p. 461 (sect.: Selinum, Conioselinum); 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5483. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 318; 1845. Ross. II. p. 292. — DC. 1830. Pr. IV. p. 165. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 322. — Tausch 1834. Flora I. p. 345. — Meisn. 1838. Gen. p. 146 (105). — Kunth 1838. Berol. I. p. 274. — Endl. 1839. Gen. n. 4454. p. 778; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 962. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Walp. 1843. Rep. II. p. 406. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 686. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 742.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Angelicidar.
Synon. Carvifolia Vaill.; Thysselinum Adans.; Mylinum Gaud.; Selinon Rafin.

Selinum Lagasca 1821. Amen. nat. II. p. 91: g. Umbelliferar. divis. primae. (S. Monnieri L.)
= Cnidium Cuss.

Selinum Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 17. 333: g. Umbellatar. restrict. (S. nigricans et Rablense.)
= Selinoides DC.

Selliera*) Cavan. 1799. Anal. cienz. nat. I. p. 41. t. 5; 1799. Icon. V. p. 49. t. 474: nov. g. Pentandr. Monogyn. (S. radicans.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 802.
Hedw. 1806. Gen. p. 141. n. 610: g. Campanulear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 579. Ed. Nees p. 435: sect. Goodeniae. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 31. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 725. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 516. (?)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 722. n. 783: g. Lobeliear.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2775: g. Goodenoviear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 177. n. 895: g. Goodeniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4010. — Endl. 1838. Gen. n. 3042. p. 507; 1841. Ench. p. 261. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695. — Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 162. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 384.

Selliguea*) Bory 1824. Dict. class. VII. p. 587: nov. g. Filicum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 356. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 720. n. 3630. (verar.)
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 261: g. Polypodiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 609. p. 60; 1841. Spl. I. p. 1346; 1841. Ench. p. 36. Sect. (1841): Diagramme, Microgramme. — J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 399; 1842. ibid. IV. p. 64. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 993. Sect.: Selliguea, Microgramma.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 727: g. Gymnopteridum.
Blume 1829. Fl. jav. fasc. III. IV. p. 122. t. 151—153: g. Polypodiacear. genuinar.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 136: g. Grammariar.
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (331): g. Grammitidear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 76: g. Antrophyear. Subgen.: Euselliguea, Loxogramme.

Selliguea Presl 1836. Pterid. p. 215: g. restrict. Grammitidear. *Cf.* Presl 1850. Epimel. bot. p. 505. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Endl. 1841. Spl. I. 1346. n. 609 *a*: sect. Selligueae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
= Diagramme Blume.

Selloa Spreng. 1813. Pl. pugill. p. 36; 1826. Syst. III. p. 358. 496. n. 2731; 1831. Gen. II. p. 621. n. 3085: nov. g. Eupatorinar. (Denekia capensis Thunb.)
= Denekia Thunb. et Gymnosperma Less.

Selloa**) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 265. t. 395: nov. g. Helianthear. (S. plantaginea.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 498. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Link 1822. En. II. p. 340: g. Corymbiferar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 203: g. Tagetinear. ?

*) Dicat. Natali Sellier, chalcographo Parisiensi.

*) Dicat. Selligue, optico.
**) Dicat. peregrinatori C. Sello.

Selloa HBK. cont.
Poir. 1827. Dict v. 48. p. 356: g. Radiatar.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 264; 1830. v. 60. p. 575: g. Galinsogear.
Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2652: g. Rudbeckiear.
Less. 1832. Syn. p. 231: g. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 612. — Endl. 1838. Gen. n. 2549. p. 415; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3152. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17: g. Heleniear.
Synon. Feaea Spreng.

Sellowia „Roth mss." Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXI. 407. n. 979: nov. g. Pentandr. Monogyn. (S. uliginosa.) — Par. Roth 1821. Nov. spec. p. 162. *Cf. Winterlia Spreng.*
DC. 1828. Pr. III. p. 380: g. Paronychiear. minus notum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 94.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4270: g. Polycarpear.?
Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 134: sect. Ammanniae.
= Euammannia Endl.? (*Cf.* Endl. Gen. p. 1200.)

Semarillaria*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 54. t. 9; 1798. Syst. p. 92: nov. g. Octandr. Trigyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 283. n. 1138.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 417: g. Sapindear.
= Paullinia Linn.

Semecarpus**) Linn. f. 1781. Suppl. p. 25. n. 1379: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 292. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 196. n. 501. — Gmel. 1791. Syst. p. 493. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 13. t. 12. — Pers. 1797. Syst. p. 309; 1805. Ench. I. p. 324. n. 725. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1476. n. 565. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXII. 642.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
R. Brown 1818 in Tuckey Cong. p. 431 (Verm. bot. Schr. I. p. 199): g. Cassuviar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 656; 1825. Syst. I. p. 935. n. 1107; 1830. Gen. I. p. 231. n. 1213: g. Terebinthacear. — Par. Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 337. (Gen. Tereb. p. 5.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1155. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1002.
DC. 1825. Pr. II. p. 62: g. Anacardiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3866; 1841. Nom. p. 146. n. 5690. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 396. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 63. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 189. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 168.

*) Nomen a singulo semine semicincto.
**) σῆμα, signum. (?)

Semecarpus Linn. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVI: g. Cassuviear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 75 (55).
Link 1831. Hdb. II. p. 124: g. Anacardiacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5917. p. 1133; 1841. Ench. p. 599. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 457. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 540. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 12. p. 186.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 83: g. Pentandr. Digyn.
Synon. Anacardium Lam.

Semeiandra*) Hook. & Arn. 1839. Beech. voy. Bot. p. 291. t. 59.
Endl. 1840. Gen. n. 6126. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: g. Lopeziear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6582. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 355. — Walp. 1846. Rep. V. p. 669. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 105.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Circear.

Semeionitis Steud. vid. *seq.*

Semeionotis Schott 1829. Wien. Zeitschr. III. p. 804: nov. g. Leguminosar., Dalbergiae et Nissoliae aff. (S. floribunda.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 55. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 556 (*Semeionitis*).
Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68. 352): g. Dalbergiear.
Synon. Triptolemea Mart.; Trioptolemea Benth.; Triptolemaea Walp.; Dalbergiae sect. B. Vogel.

Semele Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 49; 1850. Enum. V. p. 277: nov. g. Ruscear. (Ruscus androgynus L.)

Semiflosculosae Gmel. 1749. Fl. Sibir. II. p. 1: ordo Compositar. Gen.: Tragopogon, Scorzonera, Chondrilla, Sonchus, Leontodon, Hieracium, Hypochoeris, Picris, Lapsana.
Linn. 1764. Ord. nat.: div. Compositar. Gen.: Scolymus, Cichorium, Catananche, Lapsana, Hypochoeris, Seriola, Hyoseris, Andryala, Crepis, Hieracium, Leontodon, Prenanthes, Chondrilla, Lactuca, Sonchus, Picris, Scorzonera, Tragopogon, Geropogon.
Scop. 1772. Carn. II. p. 94: div. Syngenes. Polygam. Gen.: Tragopogon, Scorzonera, Picris, Crepis, Hedypnois, Lactuca, Prenanthes, Hieracium, Leontodon, Apargia, Andryala, Achyrophorus, Lampsana, Cichorium, Scolymus.
Scop. 1777. Intr. p. 121: div. gentis II. Compositar. Gen. §. 1: Tragopogon, Scorzonera, Leontodon, Lactuca, Prenanthes, Crepis, Hieracium, Picris, Lapsana, Rhagadiolus. §. 2: Virea, Chondrilla, Apargia, Andryala, Hyoseris, Urospermum. §. 3: Cichorium, Catananche, Seriola, Geropogon, Scolymus, Hypochoeris.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 93: ordo Syngenesiae. Gen.: Lapsana, Arnoseris, Crepis, Sonchus, Hieracium, Chondrilla, Leontodon, Lactuca, Picris, Scorzonera, Tragopogon, Wibelia, Apargia, Cichorium, Hypochaeris.

*) σημεῖον, vexillum.

Semiflosculosae Gmel. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 250: fam. unica Lepidocephalar. Gen.: Geropogon, Tragopogon; Lactuca, Prenanthes, Lapsana, Chondrilla, Hedypnois, Sonchus, Leontodon, Apargia, Scorzonera, Virea, Cichorium, Catananche, Picris; Seriola, Andryala, Rothia, Arnoseris, Hyoseris, Crepis, Hieracium, Hypochaeris; Scolymus.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 885: sect. Synantherar. Typi subsectionum: Lampsana, Leontodon, Catananche.

Semiflosculosi Linn. 1747. Class. plant. p. 355: nomen class. XIII. Tournefortianae. Gen.: Leontodon, Hieracium, etc.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: div. Compositor. Gen.: Prenanthes, Lactuca, Chondrilla, Hieracium, Crepis, Andryala, Hypochaeris, Picris, Hyoseris, Leontodon, Scorzonera, Tragopogon, Scolymus, Sonchus, Lapsana, Cichorium, Catananche, Elephantopus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538. Gen. ead. (emisso Elephantopode) et Rhagadiolus, Zacintha, Seriola, Krigia, Hedypnois, Rothia, Apargia, Geropogon.

Seminiferae Batsch 1802. Tab. affin. p. 171: ordo Incompletar. Fam.: Oleraceae, Amaranthinae, Vaginales, Scabridae.

Seminiflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 1: class. I. Corolliflorar. Fam.: Synanthereae, Dipsaceae, Ambrosiaceae, Valerianeae, Rubiaceae, Loranthaceae, Caprifoliaceae.

Seminudae Scopoli 1777. Introd. p. 342: trib. 32 plant. Gentes. 1. *Staminibus ex involucro florali prodeuntibus.* Gen.: Coccoloba, Ceodes, Dirca, Daphne, Gnidia, Lachnaea, Stellera, Passerina, Nectandra, Gymnocarpus, Triplaris, Rumex, Rheum, Polygonum, Atraphax, Persicana, Salsola, Thesium, Bohemeria, Königia, Banksia, Struthiola, Leinkeria. 2. *Staminibus ex receptaculo prodeuntibus, basi coalitis.* Gen.: Pteranthus, Krameria, Crucita, Polycnemum, Alternanthera, Gomphrena, Iresine, Achyranthes, Amaranthus.

Semiramisia*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 25: nov. g. Vacciniear. (Thibaudia speciosa Benth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1083.

Semonvillea Gay 1829. Journ. Vaud; Bull. sc. nat. XVIII. p. 412 (Linnaea V. Litt. p. 206): nov. g. Phytolaccear. (S. punctata.)
Fenzl . . . . Nov. stirp. Decad. I. p. 42.
Endl. 1840. Gen. n. 5259. p. 977; 1841. Ench. p. 508: g. Limear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235). — Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6448. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 19.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 509: g. Phytolaccacear.

Sempervirentes Batsch 1802. Tab. affin. p. 167: fam. Juliferar. Gen.: Ephedra, Taxus, Juniperus.

Sempervivae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 49 plant. Gen.: Montia, Claytonia, Portulaca, Cuscuta, Sauvagesia, Saxifraga, Tiarella, Mitella, Ribes, Hydrangea, Heuchera, Samolus, Adoxa, Chrysosplenium, Penthorum, Aldrovanda, Drosera, Parnassia, Tillaea, Crassula, Cotyledon, Sesuvium, Aizoon, Forskalea, Sedum, Sempervivum, Rhodiola; Mesembryanthemum, Cactus, Tetragonia, Itea.
Juss. 1789. Gen. p. 307: ordo 1 class. XIV. Gen.: Tillaea, Crassula, Cotyledon, Rhodiola, Sedum, Sempervivum, Septas. *Affine*: Penthorum.
Link 1821. En. I. p. 299. 388. 435.
Conf. Crassulaceae DC., etc.

Semperviveae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Crassulacear. Gen.: Crassula, Curtogyne, Globulea, Dasystemon, Septas, Buliarda, Tillaea, Diamorpha, Sedum, Sempervivum.

Sempervivum Rupp. 1718. Fl. jen. p. 151. Ed. Hall. 1745. p. 165: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 138. n. 389; 1737. Cliff. p. 179; 1740. Syst. ed. II. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 209. n. 465; 1748. Ups. p. 118; 1764. Gen. ed. VI. p. 244. n. 612: g. Dodecandr. Polygyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 250. n. 667.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 107. n. 440: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 275. — Batsch 1802. Tab. p. 27. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 303.
Linn. 1753. Sp. I. p. 464; 1759. Syst. ed. X. p. 1051. n. 538; 1762. Sp. ed. II. p. 664; 1767. Gen. ed. XII. p. 335. n. 612: g. Dodecandr. Dodecagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 378; 1784. Syst. p. 455. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 329. n. 837. — Gmel. 1791. Syst. p. 768. — Pers. 1797. Syst. p. 488; 1807. Ench. II. p. 20. n. 1197. — Willd. 1799. Sp. II. p. 930. n. 965; 1809. En. p. 507. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 164 (ed. Schrank 1819. p. 181); 1821. Revis. p. 62. — Link 1822. En. II. p. 19. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 468. n. 1809.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 307.
Hill 1769. Ht. kew. p. 228: g. Polypetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 255: sect. Sedi.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 314. t. 65. f. 8 (montanum).
Neck. 1790. El. II. p. 297. n. 1067: g. Synathrophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 624: g. Petalostemonis.
Rebent. 1804. Neom. p. 228: g. Polyandr. Dodecagyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 126: g. Crassulear. — Par. Lois. 1821. Dict. v. 24. p. 249 (*Joubarbe*). — DC. 1828. Pr. III. p. 411. Sect.: Chronobium, Jovibarba, Monanthes. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 122. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.
DC. 1805. France IV. p. 396: g. Crassulacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 543. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 261. 289. — Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Link 1831.

*) Semiramis, regina Assyriae.

Sempervivum Rupp. cont.
Hdb. II. p. 30. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 550. — Koch 1836. Syn. p. 261. Ed. II. p. 288. Sect.: Sempervivum, Jovibarba. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 99. — Kunth 1838. Berol. I. p. 152. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 329. Sect.: Stegozoon, Jovibarba. — Brongn. 1843. En. genr. p. 106. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 188. — Gren. (& Godr.) 1840. France I. p. 628. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 156 (*Joubarbe*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 855; 1830. Gen. I. p. 401. n. 2011: g. Sedear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4190. Sect. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98). — Endl. 1839. Gen. n. 4623. p. 811; 1841. Ench. p. 405. Sect. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6188. (genuinar. restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 4. 33. — Walp. 1843. Rep. II. p. 263. 935. — Endl. 1850. Spl. V. p. 21. Sect.: Jovibarba, Monanthes, Aichryson, Chronobium, Greenovia. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 14.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Sempervivear.
Synon. Sedum Adans. (Steud.)

Senacia*) („Comm." Petit-Thouars .... Obs. pl. Isle de France p. 27) Lam. Illustr. II. p. 95. n. 2709—2711.
Pers. 1805. Ench. I. p. 241. n. 537: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXIII. 428. n. 987.
Hedw. 1806. Gen. p. 153. n. 652: g. Rhamnear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 442.
DC. 1824. Pr. I. p. 347: g. Pittosporear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 378. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 374. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 414. — Meisn. 1837. Gen. p. 66 (48). — Rchb. 1837. Hdb. p. 270; 1841. Nom. p. 187. n. 7170. (genuinar.)
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 159: sect. Pittospori.
= Pittospori Banks pars.

Senacia Lamarck Illustr. II. n. 2712. 2713.
= Maytenus Juss.

Senapea Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 22. t. 381: nov. g. imperfecte cognitum. (S. guianensis.)

Senckenbergia**) Gärtn., Meyer & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 413. 432: nov. g. Tetradynam. Siliculos. (Lepidium ruderale L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4751 e (*Senkenbergia*); 1832. Fl. exc. p. 662: sect. Lepidii.
= Dileptium DC.

Sendtnera***) Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 472/16. p. 1342; 1841. Ench. p. 28: g. Mastigophorear.
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 238: g. Ptilidiear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 24.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Mastigophoridar.

*) Dicat. Jean Bapt. Senac, medico.
**) Dicat. Joh. Christ. Senckenberg, Francofurt.
***) Dicat. O. Sendtner, prof. Monacensi.

Sendtnera Endl. cont.
Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 548: g. Jungermannidear. Sect.: Schisma, Mastigophora.
Metten. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 153: g. Hepaticar. foliosar.
Synon. Schisma Dumort.; Mastigophora Nees.

Senebiera*) DC. 1799. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 140 (Bull. soc. philom. 1799. p. 172): nov. g. Siliculosar. (Lepidium didymum L.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 185. n. 1550. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 76. — Kunth 1824. Syn. III. p. 136. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 664.
DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 703: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 474 (*Sennebiera*). — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 125.
Poir. 1806. Dict. VII. p. 75. (emend.)
Willd. 1809. En. p. 668 (*Sennebiera*): g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Link 1822. En. II. p. 154.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 690: sect. Coronopodis.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 240; 1821. Syst. II. p. 521; 1824. Pr. I. p. 202: g. Lepidinear. Sect.: Nasturtiolum, Carara, Cotyliscus. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 81. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 216. Sect. ut DC. — Link 1831. Hdb. II. p. 286. — Kunth 1838. Berol. I. p. 55. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 114.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 183. n. 4749; 1832. Fl. exc. p. 661; 1837. Hdb. p. 259: g. Lepidiear. Sect.: Nasturtiolum, Coronopus, Cotyliscus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Biscutellear.
Koch 1836. Syn. p. 75. Ed. II. p. 80: g. Brachycarpear.
Webb 1836. Canar. I. p. 94: g. Iberidear.
Meisn. 1837. Gen. p. 16 (15): g. Senebierear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4975. p. 887; 1841. Ench. p. 451. Sect. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 180. n. 6941. Sect. similes. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 226. — Walp. 1842. Rep. I. p. 190; 1843. II. p. 764; 1846. V. p. 50. — Brongn. 1843. En. genr. p. 93. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 153. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 222.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 326: g. Carcerulosar. (Distinguitur Coronopus.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Senebieridar.
Synon. Coronopus Smith.

Senebiereae Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 16 (15): trib. Diplecolobear. Gen.: Senebiera, Brachycarpaea. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 887; 1841. Ench. p. 451. Gen. ead. et 1842 (Spl. II. p. 74) Cycloptychis.
Rchb. 1841. Nom. p. 180: sect. Lepidiear. Gen. ut Meisn.
Brongn. 1843. En. genr. p. 93: trib. Cruci-

*) Dicat. Joh. Senebier, Genevensi.

Senebiereae Meisn. cont.
ferar. Gen.: Senebiera. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 153.
Conf. Brachycarpeae DC.

Senebieridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Diplecolobear. Gen.: Senebiera, Monoploca, Cycloptychis, Brachycarpaea.

Senecillis Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 453. t. 173: nov. g. Radiatar. ex typo Cinerariae glaucae L. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 562; 1826. Syst. III. p. 570. n. 2780; 1831. Gen. II. p. 629. n. 3129. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 444. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 113. (= Ligulariae sp. DC.)
Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 226; 1830. v. 60. p. 585: g. Adenostylear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
DC. 1837. Pr. VI. p. 313: g. Eusenecionear. Par. Endl. 1838. Gen. n. 2798. p. 456; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 619. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 251.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33: g. Othonnear.
Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3351: g. Senecionear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Senecio*) Tourn. 1700. Inst. p. 456. t. 260: g. pl. class. XII, ab auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 181. Ed. Hall. 1745. p. 191: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1719. Act. Ac. Paris. p. 306: g. Corymbiferar. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 730. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 162. — Juss. 1789. Gen. p. 181. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 540. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 400. DC. 1805. Franç. IV. p. 160; 1815. V. p. 472. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 469. — Link 1822. En. II. p. 325. — Math. 1853. Belg. I. p. 268.
Linn. 1737. Gen. p. 251. n. 647; 1737. Cliff. p. 406; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 260; 1753. Sp. II. p. 866; 1759. Syst. ed. X. p. 1214. n. 857; 1763. Sp. ed. II. p. 1215; 1764. Gen. ed. VI. p. 424. n. 953; 1767. Syst. ed. XII. p. 550: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 629; 1784. Syst. p. 756. — Reich. 1778. Gen. p. 420. n. 1033. — Lour. 1790. Coch. II. p. 502. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 555. n. 1290. — Gmel. 1791. Syst. p. 1225. — Pers. 1797. Syst. p. 796; 1807. Ench. II. p. 432. n. 1853. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1973. n. 1484; 1809. En. p. 875. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 165. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 433.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 211. t. 96.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 135: g. Compositar. (ord. 3.) — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 143.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 254. n. 1051: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 567. Sejungitur Jacobaea.

*) Nomen ex Plinio, quia vere canescit.

Senecio Linn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 122: g. Conysar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 187. Distinguitur Jacobaea.
Hill 1769. Ht. kew. p. 25: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 561; 1826. Syst. III. p. 552. n. 2768; 1831. Gen. II. p. 628. n. 3122. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 520. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 466 *(Seneçon)*. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1350. 1473. Sect.: Senecio, Jacobaea. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 11. 280. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 109.
Hill 1769. Ht. kew. p. 36: g. Tubulatar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 468: g. Solidaginear.
Scop. 1777. Intr. p. 129: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 96. n. 174: g. Siphoniphytor.
Cram. 1803. Disp. p. 168 in Syngenes. Polygam. Aequal.
Rebent. 1804. Neom. p. 109: g. Pentandr. Monogyn.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 173: g. Jacobear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 451. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 909.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 475.
D. Don 1825. Nepal. p. 178: g. Carduacear.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 447; 1830. v. 60. p. 583: g. Senecionear. (Archetypar. Distinguitur Obaejaca.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2495. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 391. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 331. — Koch 1837. Syn. p. 385. Ed. II. p. 425. — Kunth 1838. Berol. I. p. 357. (legitimar.) — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. Sect.: Obaejaca, Senecio, Jacobaea, Farobaea, Crociseris, Hubertia, Sclerobasis, Carderina, Bethencourtia, Danaa, Dorobaea, Roldana. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 220. Sect.: Crociseris, Jacobaea, Obaejacoides, Obaejaca. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 550. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 110. Sect.: Eusenecio, Jacobaea, Doria, Cineraria. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 103.
Link 1829. Hdb. I. p. 746: g. Asteroidear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 242: g. Asterear. Sect.: Senecio, Jacobaea, Doria.
Endl. 1833. Norf. p. 51: g. Synantherar.
DC. 1837. Pr. VI. p. 340: g. Eusenecionear. Series: Caucasici (sect.: Obaejacae, Obaejacoideae, ecalyculati, Jacobaeae, sarracenici, fruticulosi, incani, Crociserides, Tephroserides, Heloserides), Chinenses s. Japonici, Indici, Australasici, Sandwicenses, Mauritiani, Madagascarienses, Capenses, Canarienses, Caribaei, Patagonici, Chilenses, Brasilienses, Peruviani, Mexicani, Boreali-Americani. — Par. Endl. 1838. Gen. n.

Senecio Tourn. cont.
2811. p. 458; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 436. — Walp. 1843. Rep. II. p. 653; 1847. VI. p. 257. 727. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 483. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 627. — Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 316.

A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 130: g. Senecionidear.

Synon. Jacobaea Tourn.; Solidago Vaill.; Doria Thunb.; Anecio Neck.; Delairea Lemaire; Obaejaca, Eudorus, Aetheolaena, Carderina, Dorobaea, Synarthrum, Sclerobasis, Pithosillum, Aspelina, Scrobicaria, Cineraria Cass.; Roldana Llav. & Lex.; Pericallis D. Don; Seneciotypus et Eriopappus Dumort.; Herbichia Zaw.; Farobaea Schrank; Tephroseris et Heloseris Rchb.; Hubertia Bory; Bethencourtia Choisy; Danaa Colla; Heterolepis Bert.; Adenotrichia Lindl.

Senecioideae Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 337: trib. Compositar. Divis.: Ambrosieae, Heliantheae, Helenieae, Chrysanthemeae, Artemisieae, Gnaphalieae, Senecioneae.

Senecioides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 197. n. 419: g. Syngenes. obscurum. (Senecio indicus, atriplicis folio Moris. hist. III. p. 106. f. 7. t. 17. f. 7.)
= . . . ?

Senecioneae Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 173: trib. 14 Synantherear. — Par. Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 377; 1827. v. 48. p. 446; 1830. v. 60. p. 582. Divis. (1827): Doroniceae, *Archetypae* (gen.: Aetheolaena, Carderina, Senecio, Obaejaca, Jacobaea, Sclerobasis, Synarthrum, Gynoxys, Scrobicaria, Hubertia, Faujasia, Neoceis, Cremocephalum, Gynura, Eudorus, Pericalia, Cacalia, Pentacalia et [1830] Xenocarpus), Othonneae. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. Gen.: Doronicum, Arnica, Grammarthron, Culcitium, Eriothrix, Aspelina, Dorobaea, Atheolaena, Carderina, Senecio, Obaejaca, Jacobaea, Sclerobasis, Synarthrum, Gynoxis, Scrobicaria, Hubertia, Faujasia, Neoceis, Cremocephalum, Gynura, Eudorus, Pericalia, Cacalia, Pentacalia, Erechtites, Emilia, Pithosillum, Euryops, Othonna, Doria, Cineraria, Brachyglottis? — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 254. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31. 268. Sect. ut Cass.

Rchb. 1828. Consp. p. 106: subdiv. Inulear. Sect.: Doroniceae, *genuinae* (gen. Senecionear. Archetypar. Cass. 1827), Othonneae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Jacobaeear. Gen.: Senecio, Cacalia, Doronicum, Arnica.

Less. (1830. Linnaea V. p. 159) 1832. Syn. p. 387: subtrib. Senecionidear. Divis.: Neurochlaeneae, *Senecioneae* (gen.: Lessingia, Dyssodia, Brachystephium, Charieis, Asterosperma, Cineraria, Ligularia, Gynoxys, Arnica, Doronicum, Senecio, Brachyrhynchos, Werneria, Culcitium, Euryops), Cacalieae. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 292. Divis.: Neurolaeneae, Erechthiteae, Eusenecioneae, Balbisieae. — Endl. 1838. Gen. p. 454; 1841. Ench. p. 244. Divis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (135). Divis. eaed. (Rhetinodendreae loco Balbisiear.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. Gen. ex Endl. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 419. (1837. Syn. p. 380 trib. Corymbiferar.) Gen.: Doronicum, Aronicum, Arnica, Cineraria, Ligularia, Senecio. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. Gen. Eusenecionear. Endl. 1842 et Delairea, Cissampelopsis, Balbisia, Robinsonia.

Kunth 1838. Berol. I. p. 356: div. Senecioidear. (Gen.: Cineraria, Senecio.)

Rchb. 1841. Nom. p. 86: div. Asterinar. Subdivis.: Tussilagineae, *genuinae* (gen. Eusenecionear. DC. et Hoppea, Tephroseris, Crocidium), Balbisieae.

Senecioneae Lessing 1830. Linnaea V. p. 150: trib. Synantherear. Subtrib.: Ambrosieae, Coreopsideae, Anthemideae, Senecioneae, Artemisieae, Gnaphalieae.
Conf. seq.

Senecionideae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 218: trib. 7 Synantherear. Subtrib.: Ambrosieae, Heliantheae, Flavericae, Tagetineae, Helenieae, Chrysanthemeae, Artemisieae, Gnaphalieae, Leysserieae, Relhanieae, Senecioneae.

DC. 1836. Pr. V. p. 497: trib. Tubuliflorar. Subtrib.: Melampodineae, Heliantheae, Flaverieae, Tagetineae, Helenieae, Anthemideae, Gnaphalieae, Senecioneae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 398; 1841. Ench. p. 237. Subtrib. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 194 (129). Subtrib. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. Subtrib. 35, divisionibus Candolleanis adaptatae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 38: trib. Compositar. Subtrib. ut DC.

Koch 1843. Syn. ed. II. p. 395: trib. Corymbiferar. Subtrib.: Helenieae, Heliantheae, Gnaphalieae, Anthemideae, Senecioneae.

Senecionoideae Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 244: trib. 4 Compositar. Subtrib.: Anthemideae, etc.

Seneciotypus Dumort. 1827. Fl. belg. p. 65. = Senecionis sect. Obaejacarum pars. DC.

Senefeldera*) Martius 1841. Beibl. z. Flora II. p. 29. (S. multiflora.)

Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 184: g. Hippomanear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 369.
Conf. Sennefeldera Endl.

Senega DC. 1824. Prodr. I. p. 330: sect. Polygalae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3029 *b*; 1841. Nom. p. 175. n. 6779. 6. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 359. — Endl. 1840. Gen. n. 5647 *f*. p. 1078; 1841. Ench. p. 568.

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 128: g. Polygalear.

Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 382: subg. Polygalae.

Seneico Hill Hort. kew. p. 25. 36: err. pro *Senecio*.

*) Dicat. Aloysio Senefelder, lithographiae inventori.

Senftenbergia Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 91. t. 57. f. 1—6: nov. g. Schizaeacear. foss. (S. elegans.)
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 357: g. Mohriacear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 77: g. Filicum foss.

Senftenbergia Klotzsch & Karst. . . . . . . : nov. g. Balanophorear.
= Langsdorffia Mart.?

Senites Adans. 1763. Fam. II. p. 39: g. Maïdum.
= Zeugites P. Browne.

Senkebergia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 366. n. 566: nov. g. Plasyrgophytor., a Besleria L. sejunctum.

Senkenbergia Rchb. vid. *Senckenbergia GMS.*

Senkenbergia Schauer 1847. Linnaea XIX. 6. p. 711: nov. g. Nyctaginear., Salpiantho aff. (S. annulata.) — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 56. n. 2010/$_1$. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 560.
= Tinantia Mart. & Gal.

Senna*) Tourn. 1700. Inst. p. 618. t. 390: g. pl. class. XXI.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 212. t. 97.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 537: sect. Cassiae. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 492. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 57. — Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4135 *e*; 1841. Nom. p. 155. n. 6083. 3. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 438. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 287. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 114. — Vogel 1837. Linnaea XI. p. 678. — Endl. 1841. Gen. n. 6781 *e*. p. 1316; 1841. Ench. p. 674. — Walp. 1842. Rep. I. p. 822.
Neck. 1790. El. II. p. 448. n. 1280: g. Chorisophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 312. t. 146.
Link 1831. Hdb. II. p. 139: g. Cassiacear.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 339: g. Decandr. Monogyn.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 548 *(Séné)*: subg. Cassiae.
Batka 1854. Bot. Zeit. XII. p. 112: g. Cassiear. *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 600.

Senneberia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 120. n. 796: g. Plyrontophytor.
= Ocotea Aubl.

Sennebiera Willd., Juss. vid. *Senebiera DC.*

Sennefeldera Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 88. n. 5772/$_5$; 1850. Suppl. V. p. 87: g. Hippomanear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 535: g. Stillingiidear.
= Senefeldera Mart.

Senodictyon C. Müll. vid. *Stenodyction Müll.*

Senophyllum C. Müll. vid. *Stenophyllum Müll.*

Senra Cavan. 1786. Diss. II. p. 83. t. 35. f. 3 *(Serra,* correctum p. 104): nov. g. Monadelph. (S. incana.)

*) Nomen arabicum.

Senra Cavan. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 274: g. Malvacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 65. — Pers. 1807. Ench. II. p. 237. n. 1609. — DC. 1824. Pr. I. p. 457. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 479. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 488 (*Serra*).
Gmel. 1791. Syst. p. 1026 (*Serra*): g. Monadelph. Decandr.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Hibiscear.
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5260: g. Lavaterear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 346: g. Malvear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 343.
Rchb. 1837. Hdb. p. 287: g. Ketmiear. genuinar.
Synon. Senraea Willd.; Serraea Spreng.; Dumreichera Steud. & Hochst.

Senraea Willd. 1800. Spec. III. p. 695. n. 1270: g. Monadelph. Decandr.
Batsch 1802. Tab. p. 18: g. Malvacear.
= Senra Cavan.

Sensitivae Batsch 1802. Tab. affin. p. 23: fam. Columnariarum. Gen.: Averrhoa, Oxalis, Linum.

Sentera Endl. vid. *Seutera Rchb.*

Senticosae Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 35 plant. Gen.: Rosa, Rubus, Fragaria, Potentilla, Tormentilla, Sibbaldia, Dryas, Geum, Comarum, Aphanes, Alchemilla.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 35 plant. Gen.: Alchimilla, Aphanes, Agrimonia, Dryas, Geum, Sibbaldia, Tormentilla, Potentilla, Comarum, Fragaria, Rubus, Rosa. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. Gen. ead.
Batsch 1802. Tab. p. 10: fam. Frugariar. Gen.: Cliffortia, Sanguisorba, Poterium, Ancistrum, Acaena, Agrimonia, Rosa, Rubus, Dryas, Waldsteinia, Sibbaldia, Geum, Potentilla, Fragaria, Comarum, Tormentilla, Alchemilla.

Sentis Comm. Herb. vid. *Scutia Comm.*

Sepalanthae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 9. 11: subdiv. Actinanthar. Class.: Julosepalae, Gynosepalae, Torosepalae.

Sepedoniacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494: ordo Hyphomycetum. Gen.: Sphaeromyces, Oidium, Sporendonema, Lanosa, Physospora, Psilonia, Leptotrichum, Sporotrichum, Collarium, Epochnium, Sepedonium, Artotrogus, Tuburcinia, Aleurisma, Miainomyces, Dendrina.

Sepedoniei Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 436: ordo Hyphomycetum. Gen.: Sepedonium, Tuburcinia, Collarium, Fusisporium, Epochnium, Scolicotrichum, Psilonia, Aleurisma, Dendrina, Sporisorium.
Endl. 1836. Gen. p. 18; 1841. Ench. p. 14: subordo Hyphomycetum. Gen. ut Fries. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. Gen. fere ead. et Asterophora, Amphiblistrum, Myxothecium, Tricholeconium.
Rchb. 1841. Nom. p. 3: sect. Mucedineor. Gen.: Sporisorium, Dendrina, Aleurisma, Miainomyces, Chromelosporium, Epochnium,

Sepedoniei Fries cont.
Collarium, Coccotrichum, Tuburcinia, Mycogone, Sepedonium, Asterophora. Subsect.: Psiloniacei. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 68. Gen. fere ead.

Sepedonium*) Link 1809. Berl. Mag. III. p. 18: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 482. — Par. Nees 1816. Syst. p. 44; 1817. Überbl. p. 10. (entophytar.) — Mart. 1817. Erlang. p. 334. — Agdh. 1821. Aphor. p. 79.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: g. Sporotrichor.
Link 1824. Spec. I. p. 28: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 539: g. Sporotrichear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 185: g. Trichomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 111.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 438: g. Sepedonieor. (emend.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 217. p. 19; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 102. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 70. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 7; 1842. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 9: g. Caeomacear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 497: g. Sepedoniaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Sporotrichecor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 100: g. Dendrinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 461: g. Botrydear.
Synon. Mycogone Link; Mycobanche Pers.

Sepiariae Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: ordo 25 plant. Gen.: Nyctanthes, Jasminum, Ligustrum, Brunsfelsia, Olea, Chionanthus, Fraxinus, Syringa.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 44 plant. Gen. ead. et Phillyrea loco Brunsfelsiae. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 506. Gen. ead.

Sepincola Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 90; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Lichen Sepincola Ehrh.)
= . . . ?

Sepocosmus Hook. vid. *Cepocosmus Benth.*

Septaria Fries 1819. Novit. fl. succ. V. p. 78: nov. g. a Fusidio distinctum. (S. Ulmi = Stilbospora Uredo DC.)
Kunze 1823. Mykol. Hefte II. p. 105. Char. emend.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 526: g. Stilbosporear.
Link 1825. Sp. II. p. 87: g. Gymnomycetum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Uredineor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 536. n. 3531: g. Gastromycetum obscuror. desciscent.
Leman 1827. Dict. v. 48. p. 486: g. Hypoxylear.

Septaria Fries cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 774. n. 3984: g. Cytisporear.
= Septoria Fries.

Septas*) Linn. 1760. Pl. Afr. rar. (Amoen. ac. VI. p. 87): nov. g. Heptandr.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 489; 1764. Gen. ed. VI. p. 184. n. 465; 1767. Syst. ed. XII. p. 259. n. 460: g. Heptandr. Heptagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 291; 1784. Syst. p. 353. — Reich. 1778. Gen. p. 187. n. 501. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 246. n. 633. — Gmel. 1791. Syst. p. 597. — Pers. 1797. Syst. p. 377; 1805. Ench. I. p. 403. n. 912. — Willd. 1799. Sp. II. p. 292. n. 726; 1809. En. p. 407. — Link 1821. En. I. p. 356.
Adans. 1763. Fam. II. p. (21): g. Anagallidum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 275. — Batsch 1802. Tab. p. 27.
Gled. 1764. Syst. p. 80. n. 333: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 258: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 308: g. Sempervivar.
Neck. 1790. El. II. p. 295. n. 1064: g. Synathrophytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 127: g. Crassulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 260. n. 1052. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 488. — DC. 1828. Pr. III. p. 383. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 99. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6176. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 61. Ed. Schrank 1819. p. 66: g. Pentandr. Pentagyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 856: g. Sedear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4176. — Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98).
Dumort. 1829. Anal. fam. 38: g. Sempervivear.
Bartl. 1830. Ord. p. 310: g. Crassulacear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 73. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107.
Endl. 1839. Gen. n. 4609. p. 809; 1841. Ench. p. 405: g. Eucrassulear.

Septas**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 392. Ed. Willd. p. 476: nov. g. Didynam. Angiosperm. (S. reptans. — „Thunbergiae aff." Willd.)
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3132: g. Acanthear.?
= Herpestis Gärtn.

Septatae Rchb. 1828. Consp. p. 182; 1832. Fl. exc. p. 657: div. Tetradynamar. Subdivis.: Siliculosae, Siliquosae.

Septocolla***) Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 152: nov. g. Hymeniophoror. dubium. (S. adpressa.)

Septonema Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 9. t. 2. f. 147; 1838. II. p. 9: nov. g. Phragmotrichiacear. (S. secedens.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 40: g. Torula-

*) σηπεδών, putedo, sanies.

*) Dicta a numero septenario partium.
**) Nomen a numero septenario laciniarum calycis.
***) σηπτός, putris.

Septonema Corda cont. ceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 5; 1842. Mycol. p. 21: g. Septonemear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 107. — Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 6.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 71: g. Arthrosporor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 504: g. Toruleor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Septonemeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 37: g. Protomycetum.

Septonemeae Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 5; 1842. V. p. 5 (*Septonemaeae*); 1842. Anl. Mycol. p. LVI. 20: fam. Coniomycetum. Gen.: Bispora, Septonema, Trimmatostroma, Alternaria. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 107. Gen.: Septonema, Alternaria.

Septonemei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: trib. Hormiscineor. Gen.: Dendryphium, Solenosporium, Cladotrichum, Trimmatospora, Septonema, Bispora.

Septoria Fries 1825. Pl. homon. p. 195: g. Naemasporeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 18. — Bonord. 1851. Hdb. p. 58.
Fries 1828. Elench. II. p. 117: g. Cytisporeor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 480: g. Stilbosporeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 199. p. 18; 1841. Ench. p. 13. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 50. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 43.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 127: g. Sphaeronemear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 730.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 426: g. Ascosporeor.
Math. 1853. Belg. II. p. 216: g. Sphaeriacear.
Westend. 1857. Bull. Ac. Brux. 2e sér. II. p. 573: g. Cytisporear. Subgen.: Rhabdospora, Ascochyta, Septoria.
Synon. Septaria Fries olim, Kunze etc. (non Zoolog.); Phloeospora Wallr.

Septosporium Corda 1837 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 33. t. 17: nov. g. Fungor., Helminthosporio proximum. (S. atrum.)
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 12; 1842. V. p. 10; 1842. Mycol. p. 38: g. Helminthosporiacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 23. t. 12; 1851. Linnaea XXIV. p. 115.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 193: g. Dematieor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 107: g. Rhacodieor. *Cf.* A. Braun 1853. N. Verh. Berl. Gartenbauv. I. p. 174.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Helminthosporeor.
= Macrosporium Fries?

Septotes Meisn. sphalm. pro *Leptotes Endl.*

Septotrichum Corda 1840. Icon. Fung. IV. p. 6. t. 2. f. 13—22: nov. g. Byssinor.
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 91: g. Phylleriaceor. — Par. Cordà 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 6. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 68.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 519: g. Phylleriacear.

Sequoia Endl. 1847. Syn. Conif. p. 197; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 7. n. 1808: nov. g. Cunninghamiear. (Taxodium sempervirens Lamb.) *Cf.* Seemann 1858. Bonplandia VI. p. 343.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 447: g. Abietacear.
Synon. Condylocarpus Salisb.; Wellingtonia Lindl.; Washingtonia Winsl.

Sequoites Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 117: nov. g. Abietinear. foss. (Cupressites taxiformis Ung.)

Seranxia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 348. n. 1769: nov. g. Athrosophytor., a Lichene L. sejunctum.

Seraphyta Fisch. & Meyer . . . . Bull. Ac. Pet. VII. Nr. 1. p. 25: nov. g. Orchidear., a Lindl. (1847. Veg. kingd. p. 181) Epidendro insertum.
Endl. 1843. Spl. III. p. 61. n. $1401/_1$: g. Vandear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.

Serapiadae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ophrear. Gen.: Orchis, Anacamptis, Nigritella, Aceras, Serapias, Ophrys, Hemipilia, Glossaspis, Perularia, Bartholina. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 171.

Serapias Linn. 1737. Gen. p. 271. n. 683; 1737. Cliff. p. 429; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 949; 1759. Syst. ed. X. p. 1245. n. 903; 1763. Sp. ed. II. p. 1344; 1764. Gen. ed. VI. p. 462. n. 1012; 1767. Syst. ed. XII. p. 593: g. Gynandr. Diandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 201. — Murr. 1774. Syst. p. 678; 1784. Syst. p. 814. — Reich. 1778. Gen. p. 457. n. 1097. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 603. n. 1371. — Pers. 1797. Syst. p. 858.
Linn. 1740. Act. Upsal. p. 21: g. ordinis quarti naturalis.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 7: g. Palmar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 133; 1764. Syst. p. 282. n. 1160: g. Stylostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Orchidear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 65. — Gis. 1792. Prael. p. 179. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 209. — Batsch 1802. Tab. p. 101.
Hill 1769. Ht. kew. p. 348: g. Pentapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 92: g. Satyrior.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 27; 1794. Prodr. I. p. 3: g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 59.
Neck. 1790. El. III. p. 128. n. 1466: g. Synarmophytor.
= Serapias Swartz, Epipactis Hall., etc

Serapias Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 46. t. 14. f. 5 (latifolia L.)
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 264: g. Gynandr. Diandr.
Pers. 1807. Ench. II. p. 512. n. 1990: g. Orchidear. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 567.
= Epipactis Hall.

Serapias Swartz 1800. Act. Ac. Holm. p. 214; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 47. t. 1 H: g. emendat. Orchidear. (S. cordigera L.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 162. — DC. 1805. Franç. III. p. 256; 1815. V. p. 333. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. V. p. 194. (Verm. bot. Schr. II. p. 13.) — Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 41. 47; 1818. Orch. eur. p. 25. — Lois. 1819. Dict. v. 14. p. 351 (*Elleborine*). — Link 1822. En. II. p. 369; 1829. Hdb. I. p. 245. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 700. n. 2944; 1831. Gen. II. p. 656. n. 3306. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1551. 1568. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 421. 463.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 70. n. 1596: g. Gynandr. Monandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 287: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1839. Orchid. p. 377: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1468; 1830. Fl. exc. p. 29; 1841. Nom. p. 51. n. 1890. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1538. p. 211; 1841. Ench. p. 112. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (286). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 367. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 591. Sect.: Isias, Euserapias. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 76. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 276.
Koch 1837. Syn. p. 693. Ed. II. p. 798: g. Ophrydinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Serapiadar.
Synon. Helleborine Pers.

Serda Adans. 1763. Fam. II. p. 11: g. Fungor. (Agaricus sulcatus Vaill.)
= Daedalea Pers.

Sergilus Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 409. t. 174: nov. g. Radiatar. (S. scoparius.)
Cass. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 65: g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 543; 1831. Gen. II. p. 610. n. 3009: g. Eupatorinar.
Cass. 1825. Dict. v. 37. v. 461; 1830. v. 60. p. 582: g. Baccharidear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2539: g. Baccharear.
= Baccharidis Linn. pars.

Serialidia Fée 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 5 (Isis 1834. p. 1055): sect. Chiodecti.

Seriana Willd. 1799. Sp. II. p. 464. n. 768: g. Octandr. Trigyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 444. n. 981.

Seriana Willd. cont.
Cram. 1803. Disp. p. 93 in Octandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 283. n. 1136: g. Saponacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 696; 1825. Syst. II. p. 247. n. 1502: g. Sapindear.
Kunth 1824. Syn. III. p. 154: g. Paullinacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: g. Paullíniear.
Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 214: g. Sapindacear.
= Serjania Plum.

Seriania „Plum." Schumacher 1794. N. danske Selsk. Skrift. III. 2. p. 125.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 107: g. Paulliniacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 322. n. 1640: g. Sapindear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1316: g. Sapindacear.
= Serjania Plum.

Serianthes Benth. mss. olim.
= Albizzia Durazz.

Serianthes Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 225: nov. g. Acaciear. (Inga grandiflora Wall.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 622. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 40. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 639.

Sericocarpus*) Nees 1833. Aster. p. 148: nov. g. Asterum genuinor. (Aster solidagineus, conyzoides et tortifolius.)
Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 14 (*Seriocarpus*): g. Asterear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3297. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
DC. 1836. Pr. V. p. 261: g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2310. p. 375; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125) [*Sericopappus*]. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 101. — Walp. 1843. Rep. II. p. 576. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952.
Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 302: g. Asterinear.

Sericocoma „Fenzl in Drege pl. cap." Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 33. n. $1964/_1$: nov. g. Aërvear. Sect.: Hypocarpha, Euchroa. — Par. Fenzl 1843. Linnaea XVII. p. 323. Sect.: Kyphocarpa, Euchnoa. — Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 306. Sect. ut Fenzl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.

Sericodes A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 28: nov. g. Zygophylleis aff.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 403: g. Zygophyllear.

Sericodon Endl. 1838. Gen. n. 3089 *b*. p. 518; 1841. Ench. p. 267: sect. Symphyandrae.
Synon. Otocalyx A. DC.

---

*) σηρικός, bombycinus, sericus.

Sericographis Nees 1847 in Mart. fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 107; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 360: nov. g. Gendarussear. — Par. Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 36. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 662.

Sericopappus Meisn. vid. *Sericocarpus Nees.*

Sericophorum DC. 1837. Prodr. VI. p. 216: sect. Helipteri. (*Sericophysum* Steud. Nom. I. p. 745; II. p. 568.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2742 *f.* p. 447; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3489. 5.

Synon. Helichrysum Gaudich.

Sericophyllum Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 318: subg. Pityopsidis. (Chrysopsis graminifolia et argentea Ell.)

Sericophysum Steud. vid. *Sericophorum DC.*

Sericospora Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 444: nov. g. Eranthemear.?

Sericostoma „Stocks mss.“ Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 14. t. 1377: nov. g. Lithospermear. (S. pauciflorum.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 135. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 551.

Sericrostis Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. p. 220: nov. g. Graminear. (Stipa sericea Michx. — *Serigrostis* ex Steud. Nom. II. p. 164. 568.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 84 et Steud. Glum. I. p. 179.

= Mühlenbergia Trin.

Sericura Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 2: nov. g. Graminear. (*Synon. Calamagrostis Adans.*) *Cf.* Endl. 1843. Spl. III. p. 57. n. 817.

Steud. 1846. Flora I. p. 20; 1854. Glum. I. p. 404: g. Andropogonear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Arundinear.

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 929: g. Arundinacear.

Serida Rchb. in Mössl. Handb. II. p. 1544: vid. *seq.*

Seridia Juss. 1789. Gen. p. 173: g. Cinarocephalar. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 501. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 385.

DC. 1805. Franç. IV. p. 98: sect. Centaureae. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 487. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1544 (*Serida*); 1831. Fl. exc. p. 217.

Cass. 1817. Dict. v. 8. p. 252: subg. Calcitrapae. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2688 *b.*

Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 48. p. 498; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Seridiear.

Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.

Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 5 *b*: subsect. Seridiae.

= Seridiae DC. pars.

Seridia DC. 1837. Prodr. VI. p. 598: sect. Centaureae. (Seridiae Cass. sp.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *V cc.* p. 474; 1841. Ench. p. 247. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 302. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 258. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 436.

Seridia Rchb. 1841. Nomencl. p. 93. n. 3655. 5: sect. Centaureae. Subsect.: Philostizus, Seridia (Cass.), Pectinastrum, Seridiopsis, Alophium.

Seridieae Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: sect. Calcitrapear. Gen.: Philostizus, Seridia, Pectinastrum.

Seridioides DC. 1837. Prodr. VI. p. 600: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *Vee.* p. 474; 1841. Ench. p. 247.

Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 5 *d* (*Seridiopsis*): subsect. Seridiae.

Seridiopsis Rchb. vid. *praeced.*

Seriella Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 373: nov. g. Sticteor., Orbiliae aff.

Serigrostis Steud. vid. *Sericrostis Rafin.*

Seringia*) Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 694; 1825. Syst. I. p. 361. 441. n. 460; 1830. Gen. I. p. 97. n. 484: nov. g. (Tetrandr. Monogyn.) Acerum. (Ptelidium ovatum Pet.-Th.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 497.

= Ptelidium Pet.-Thouars.

Seringia**) Gay 1821. Mém. Mus. VII. p. 442: nov. g. Lasiopetalear. (Lasiopetalum arborescens Ait.) — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 312. — DC. 1824. Pr. I. p. 488. — Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5304; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7713. — Bartl. 1830. Ord. p. 342. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 526. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 495. — Meisn. 1837. Gen. p. 32 (26). — Endl. 1840. Gen. n. 5322. p. 996; 1841. Ench. p. 519. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364. — Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 349. (pleiocarpar.)

Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 285: g. Büttneriacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Lasiopetalar.

Synon. Gaya Spreng.

Serinia Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 149.

DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 261: g. Compositar. incertae sedis. — Par. Meisn. 1839. Comm. p. 122. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1391. n. 19; 1841. Ench. p. 251.

= Apogon Ell.? (Walp. Rep. II. p. 683.)

Seriocarpus Hook. vid. *Sericocarpus Nees.*

Seriola Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1139; 1764. Gen. ed. VI. p. 404. n. 917; 1767. Syst. ed. XII. p. 526: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 601; 1784. Syst. p. 721. — Reich. 1778. Gen. p. 402. n. 996. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 533. n. 1245. — Gmel. 1791. Syst. p. 1182. — Pers. 1797. Syst. p. 760; 1807. Ench. II. p. 378. n. 1778. — Willd. 1803.

---

*) Dicat. Seringe, Bernensi.
**) Dicat. Nic. Carolo Seringe, nunc Genev.

Seriola Linn. cont. Sp. III. 3. p. 1619. n. 1420; 1809. En. p. 831. — Link 1822. En. II. p. 293.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 123. — Gis. 1792. Prael. p. 538. — Batsch 1802. Tab. p. 250.

Gled. 1764. Syst. p. 243. n. 1001: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 543.

Juss. 1789. Gen. p. 271: g. Cichoracear. (praecedente B. Juss. in Ht. Trian.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 491. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 378. — DC. 1805. Franç. IV. p. 922. — Link 1829. Hdb. I. p. 793.

Neck. 1790. El. I. p. 52. n. 94: g. Glossariphytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 370. t. 159: g. Ligulatar.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 581; 1826. Syst. III. p. 661. n. 2888; 1831. Gen. II. p. 645. n. 3247: g. Cichorear.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 64: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.

D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 310: g. Hypochoeridear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 143. — Par. Less. 1832. Syn. p. 130. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 343. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 295.

DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 95. 307: g. Hypochaeridear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2987. p. 496; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3748. — Brongn. 1843. En. genr. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 260: g. Liguliflorar.

Synon. Achyrophorus Vaill.; Piptopogon Cass.; Agenora Don; Porcellites Cass. pt.

Seriola Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 422. 504; 1830. v. 60. p. 569: g. restrict. Hypochaeridear. (S. aetnensis L.)

Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2160 [b]; 1831. Fl. exc. p. 269: g. Andryalear.

Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.

Schultz Bip. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 167: g. Piptopogonear.

Conf. Metabasis DC.

Seriphida Lessing 1832. Syn. Compos. p. 264: subg. Artemisiae. — Simil. Koch 1837. Syn. p. 369. Ed. II. p. 406.

= Seriphidium Besser.

Seriphidium Besser 1829. Bull. soc. Mosc. I. p. 222 (1833. De Seriphidiis diss.): sect. Artemisiae. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 325. — DC. 1837. Pr. VI. p. 100. — Endl. 1838. Gen. n. 2694 *b*. p. 439; 1841. Ench. p. 242. — Torr. & Gray 1841. North-Am. I. p. 418. — Walp. 1843. Rep. II. p. 640. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 199. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 569. — Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 298. 299 (*Scriphidium*). — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 135.

Synon. Seriphida Less.

Seriphieae Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: subdiv. Gnaphaliear. Sect.: *verae* (gen.: Endoleuca, Anaxeton, Perotriche, Seriphium, Stoebe, Leucophyta, Disparago, Oedera, Elytropappus), Leontopodieae.

Seriphieae DC. 1837. Prodr. VI. p. 259: div. Gnaphaliear. restricta. Gen.: Stoebe, Seriphium, Perotriche. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 450; 1841. Ench. p. 243. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). Gen. ead.

Fenzl 1839. Flora II. p. 727: subdiv. Helichrysear. Gen. ead.

Rchb. 1841. Nom. p. 100: subdiv. Segregatar. Gen. ead.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: subtrib. Senecionidear. Gen. ead.

Seriphium*) Linn. 1753. Sp. II. p. 928; 1759. Syst. ed. X. p. 1236. n. 894; 1763. Sp. ed. II. p. 1316; 1764. Gen. ed. VI. p. 454. n. 1003; 1767. Syst. ed. XII. p. 582: g. Syngenes. Monogam. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 665; 1784. Syst. p. 798. — Pers. 1797. Syst. p. 840.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 180. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — Desportes 1804. Dict. v. 3. p. 131 (*Armoselle*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 396.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.

Gled. 1764. Syst. p. 239. n. 981: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 136: g. Flosculosar.

Reich. 1778. Gen. p. 450. n. 1087: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 594. n. 1358. — Pers. 1807. Ench. II. p. 500. n. 1973.

Neck. 1790. El. I. p. 95. n. 173: g. Siphoniphytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 374: g. Pentandr. Monogyn.

Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2438. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.

Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 508; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Seriphiear. (verar.) Sect.: Acrocephalum, Pleurocephalum. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 261. Sect.: Eremanthis, Euseriphium. — Endl. 1838. Gen. n. 2761. p. 450; 1841. Ench. p. 243. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). — Fenzl 1839. Flora II. p. 728. — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3924. Sect. fere eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 249.

Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.

Less. 1832. Syn. p. 349: g. Helichrysear. Subgen. ut Cass.

Synon. Eremanthis Cass.; Stoebes sp. Auct.

*) Nomen ex Plinio. (*σερίφιον*, absinthii species.)

Seris*) Willd. 1807. Berl. Mag. I. p. 139: nov. g. Syngenes. Aequal., Cacaliae et Stähelinae simile.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 899; 1826. Syst. III. p. 426. n. 2672; 1831. Gen. II. p. 611. n. 3020: g. Eupatorinar.
= Isotypus Kunth.

Seris Lessing 1830. Linnaea V. p. 253; 1832. Syn. Compos. p. 99: g. Mutisiear. (S. polymorpha et discoidea.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3429.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 19: g. Eumutisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2909. p. 482; 1841. Ench. p. 247. Sect.: Actinoseris, Discoseris. — Meisn. 1839. Gen. p. 229 (141).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.

Serissa**) „Commers." Juss. 1789. Gen. p. 209; 1820. Mém. Mus. VI. p. 395: nov. g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 591. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 451. — Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 461. — Hedw. 1806. Gen. p. 143. n. 620. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XII. 203. n. 896. — Link 1821. En. I. p. 225. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 756. n. 808; 1830. Gen. I. p. 172. n. 865. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 969. — Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 514. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 778.
Willd. 1797. Sp. I. p. 1061. n. 389; 1809. En. p. 246: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1798. Nov. gen. IX. p. 131; 1800. Prodr. II. p. 184; 1818. Fl. cap. II. p. 66. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 268; ed. 1832. I. p. 579.
Cram. 1803. Disp. p. 191 in Dioec. Pentandr. (S. foetida.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 599: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 468. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 565.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae?, p. 86 Coffeariae?
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2096: g. Cinchonear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Psychotriear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 161: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 575. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 633. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 440. — Endl. 1838. Gen. n. 3117. p. 526; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (120). — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2765. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 328: g. inter Coffeineas et Spermacoceas ambiguum.
Synon. Dysoda Lour.; Buchozia L'Herit.; Bucholzia Wittst.

*) σέρις, endivia, composita.
**) Nomen mutuatum ex Dioscoride.

Serjania*) Plumier 1703. Gen. p. 34 et in Ind. (*Seriania* t. 35.)
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476: g. Sapindacear. — Par. Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 355. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 87. — Schltd. 1844. Linnaea XVIII. p. 55. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 565.
DC. 1824. Pr. I. p. 602: g. Paulliniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 363.
Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 515: g. Sapindear. — Par. Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 20. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 658. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 43. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). — Endl. 1840. Gen. n. 5600. p. 1068; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1842. Rep. I. p. 411; 1843. II. p. 813; 1846. V. p. 359. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 277. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 376.
Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5237; 1841. Nom. p. 198. n. 7566: g. Cardiospermear.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 35. t. 142.
Synon. Seriania Schum.; Seriana Willd.

Serjania Flor. Flum. I. p. 35: g. Diandr. non descriptum. (Endl. Gen. p. 1334. n. 51.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 568. (*Serjana Arrab.*)

Serophyton Benth. 1844. Bot. voy. Sulph. p. 52.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281: g. Crotonear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 90. n. $5824/_1$.
Baill. 1858. Euphorb. p. 320: g. Jatrophidear.
Synon. Aphora Nutt.

Serpaea**) Gardner 1846. Proc. Amer. Ac. Dec.; 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 296: nov. g. Helianthear., Oyedaeae aff. (S. ovata.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 859: g. Coreopsidear.

Serpentaria „Rafin." Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1856 *a*: sect. Aristolochiae.
= Clematitis Endl. pt.

Serpentariae Endl. 1838. Gen. p. 343; 1841. Ench. p. 217: class. (29) Acramphibryor. Apetalor. Ord.: Aristolochieae, Nepentheae.
Meisn. 1841. Gen. p. 333. 442 (246): class. 34 Monochlamydear. Ord.: Aristolochiaceae, Nepentheae.

Serpentinaria Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 299: nov. g. Conjugatidear. (Conferva genuflexa Roth.)
Endl. 1836. Gen. n. 54 *a*. p. 5; 1841. Ench. p. 4: sect. Zygnemae.
= Mougeotia Agdh.

Serpicula Linn. 1767. Mant. p. 16. n. 1274; 1767. Syst. ed. XII. p. 620: g. Monoec. Tetrandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 708. 1784. Syst. p. 848. — Reich. 1778. Gen. p. 481. n. 1144. — Schreb. 1791. Gen. II.

*) Dicat. Rev. Patri Philippo Sergeant, Caietano.
**) Dicat. Dr. Serpa.

Serpicula Linn. cont.
p. 628. n. 1413. — Pers. 1797. Syst. p. 892; 1807. Ench. II. p. 55. n. 2047. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 33. t. 164; 1832. Ind. III. p. 578. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 329. n. 1650.
Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.
Juss. 1789. Gen. p. 318: g. Onagrar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77.
Neck. 1790. El. III. p. 360. n. 1791: g. Coryphophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 276: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 28; 1818. Fl. cap. I. p. 520.
Gis. 1792. Prael. p. 326: g. Inundatar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 150: g. Onagrariar. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 48. p. 546.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 550 (Verm. bot. Schr. I. p. 44): g. Haloragear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — Link. 1831. Hdb. II. p. 52. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 690. n. 3483. — Endl. 1840. Gen. n. 6136. p. 1197; 1841. Ench. p. 640. — Walp. 1843. Rep. II. p. 98. — — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 110. — Miq. 1856. Ind. bat. I. p. 632.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 902. n. 3173: g. Dioec. Tetrandr.
DC. 1828. Pr. III. p. 65: g. Cercodianar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 701. — Meisn. 1838. Gen. p. 122 (87).
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4481: g. Cercodear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Haloragidear.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 250: g. Hygrobiear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 443.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 337: g. Cercodear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. n. 6546: g. Myriophyllear.
Synon. Laurembergia Berg.; Epilithes Blume; Epilethes Rchb.

Serpicula Rostk. & Schmidt 1824. Fl. Sedin. p. 370.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 266: g. Hydrocharidum.
= Elodea Rich.

Serpillum Tourn. 1700. Inst. p. 196: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 288. Ed. Hall. 1745. p. 234: g. pl. class. IX.
= Thymi Linn. pars.

Serpobypnum Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 72: sect. Hypni.

Serpula Pers. 1801. Syn. p. XVII. 496: sect. Merulii. (M. retirugis, tremellosus.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 548. — Par. Fries 1815. Obs. myc. I. p. 100.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 637: g. Merulidear.
= Merulius Hall.

Serpularia Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 197: trib. Liceae.

Serpularia Fries cont.
Endl. 1836. Gen. n. 306 *b*. p. 26; 1841. Ench. p. 16: sect. Liceae. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 264.

Serpyllifolia G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 568: sect. Veronicae. (V. bellidioides, alpina, etc.)

Serpyllum Pers 1807. Ench. II. p. 130: sect. Thymi. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. I. p. 1043; 1828. Consp. p. 115. n. 2819 *b*; 1841. Nom. p. 106. n. 4114. 2. — Benth. 1834. Labiat. p. 342; 1848 in DC. Pr. XII. p. 197. (includens 1848 Mastichinam.) — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 767. — Endl. 1838. Gen. n. 3610 *b*. p. 617; 1841. Ench. p. 307. — Walp. 1845. Rep. III. p. 697. — Math. 1853. Belg. I. p. 418.
Conf. Serpillum Tourn.

Serra Cavan., Gmel., G. Don vide *Senra Cavan.*

Serraea*) Spreng. 1826. Syst. III. p. 78. n. 2409: g. Monadelph. Decandr.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 548. n. 2685: g. Malvacear. (?) — Par. Desne 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 70. Char. reform.
Meisn. 1837. Gen. p. 27 (24): g. Sidear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5280. p. 983; 1841. Ench. p. 512: g. Hibiscear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 343. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Wight 1850. Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 14. t. 1592. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 308.
Rchb. 1841. Nom. p. 200. n. 7543: g. Ketmiear.
= Senra Cavan.

Serrafalcus Parlat. .... Rar. pl. sic. fasc. II. p. 14; 1842. Pl. nov. p. 75 (Bot. Zeit. 1843. p. 452): nov. g. ex typo Bromi racemosi.
Koch 1844. Syn. ed. II. p. 945: sect. Bromi.
Parlat. 1845. Palerm. I. p. 165; 1850 in Webb Canar. III. p. 411: g. Festucacear. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 587.
Schltd. 1850. Linnaea XXIII. p. 336: g. Bromear.
Synon. Zeobromus Griseb.; Bromi secalini Bertol.

Serraria Burm. 1738. Afr. p. 264. t. 99. f. 1. 2.
Adans. 1763. Fam. II. p. 284: g. Thymelaear.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 22. 363. n. 529: g. Proteacear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 383.
= Serruria Salisb.

Serratia Bergam. . . . . . . g. Fungor. incognitum.

Serratula**) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 178. Ed. Hall. 1745. p. 188: g. pl. class. VIII.
Dillen. 1719. Nov. gen. p. 138. t. 8: g. herbae Capitatae.
Linn. 1737. Gen. p. 243. n. 628; 1737. Cliff. p. 391; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 248; 1753. Sp. II. p. 816; 1759. Syst. ed. X. p. 1198. n. 831; 1763. Sp. ed. II. p. 1144; 1764. Gen. ed. VI. p. 408. n. 924;

*) Dicat. Hispano Serra.
**) Nomen ex Plinio.

Serratula Rupp. cont.
1767. Syst. ed. XII. p. 528: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 603; 1784. Syst. p. 723. — Reich. 1778. Gen. p. 406. n. 1003. — Lour. 1790. Coch. II. p. 483. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 542. n. 1264. — Gmel. 1791. Syst. p. 1184. — Pers. 1797. Syst. p. 763; 1807. Ench. II. p. 390. n. 1803. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1638. n. 1432; 1809. En. p. 835. — Cram. 1803. Disp. p. 166. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 405.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 82: g. Capitatar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 538. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 155. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 499. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 6. 156. (restrict.)
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 246. n. 1013: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 553.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Capitator.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cinarocephalar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 174. (verar.) — Vent. 1799. Tabl. II. p. 505. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 387.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 68: g. Associatar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 465: g. Carduacear. (includens Cirsium.) — Par. DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 155. 184. — Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 94. — Bartl. 1830. Ord. p. 144. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 299. Sect.: Serratula, Klasea.
Neck. 1790. El. I. p. 68. n. 119: g. Siphoniphytor. Sejungitur Psilosanthus.
Rebent. 1804. Neom. p. 101: g. Pentandr. Monogyn.
DC. 1805. Franç. IV. p. 84; 1815. V. p. 458: g. Cynarocephalar. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 255.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 535; 1826. Syst. III. p. 388. n. 2652; 1831. Gen. II. p. 607. n. 2988: g. Cynarear. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1347. 1420. Sect.: Serratula, Saussurea. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 37. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 573.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 435: g. Cynarocephalear.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 451.
Link 1822. En. II. p. 296; 1829. Hdb. I. p. 699: g. Acarnacear.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 5: g. Flosculosar.
Koch 1837. Syn. p. 407: g. Serratulear. Sect.: Serratula, Rhaponticum, Jurinea.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 327; .... in Webb Canar. II. p. 369: g. Euserratulear. Subgen.: Euserratula, Rhaponticum.
= Serratula DC., Rhaponticum, Saussurea, etc.

Serratula*) (amara) Rumph. 1747. Amboin. V. p. 459. t. 170. f. 1.
= Curanga Juss.

*) Nomen ex Plinio.

Serratula D. Don 1825. Fl. Nepal. p. 168: g. Carduacear. (S. gossipiphora.)
= Aplotaxidis sect. Eriocoryne DC.

Serratula Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 310. 322; 1830. v. 60. p. 572: g. Serratulear. restrict. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2317. — Less. 1832. Syn. p. 4. — Kunth 1838. Berol. I. p. 360. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 466.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Carduinear. — Par. Spach 1841. Vèg. phan. X. p. 12. 82.
Dufour 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 154.
Math. 1853. Belg. I. p. 297: g. Cynarocephalar.
= Sarreta DC.

Serratula DC. 1837. Prodr. VI. p. 667: g. Serratulear. emend. Sect.: Sarreta, Mastrucium, Klasea, Oligochaeta. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2897. p. 480; 1841. Ench. p. 247. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3886. Sect.: Serratula, Mastrucium, Klasea, Oligotricha. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 35. — Walp. 1843. Rep. II. p. 677; 1847. VI. p. 308. — C. Koch 1843. Linnaea XVII. p. 43. Sejungitur Oligochaeta. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 755. Sect. ut DC. exclusa quarta. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Koch 1837. Syn. p. 407: sect. Serratulae.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 268: g. Crupinear. Sect.: Sarreta, Klasea.
Synon. Behen Hill; Klasea, Mastrucium et Serratula Cass.; Serratula et Rhapontici sect. 2 Less.

Serratuleae Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 308: subtrib. Carduinear. Divis.: Carthameae, *verae* (subdivis.: Rhaponticeae, *genuinae* [gen.: Jurinea, Klasea, Serratula, Mastrucium, Lappa]).
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 339; 1827. v. 50. p. 463; 1830. v. 60. p. 572: div. Carduinear. Gen. Serratulear. genuinar. antea.
Rchb. 1828. Consp. p. 101: sect. Carduacear. Subsect.: Carthameae, Rhaponticeae, *genuinae* (gen. ut Cass.).
Less. 1832. Syn. p. 4: sect. Centauriear. Gen.: Serratula, Jurinea, Ptilostemon, Stähelina, Carduncellus, Rhaponticum, Chryseis.
Koch 1837. Syn. p. 406: trib. Cynarocephalar. Gen.: Saussurea, Serratula.
DC. 1837. Pr. VI. p. 662: subtrib. Cynarear. Gen.: Acroptilon, Rhaponticum, Leuzea, Alfredia, Serratula, Jurinea. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 479; 1841. Ench. p. 247. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. Gen. ut DC. et Stengelia; sect.: Saussureeae. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 35. Gen. ex DC. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 465. Gen.: Saussurea, Serratula, Jurinea. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. Gen. ut DC.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 336: div. Characopappear. Subdivis.: Euserratuleae, Stähelineae, Lappeae, Onopordeae, Leuzeae. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 429.

Serronia „Gaudich. mss." Guillem. 1837 in Deless. Ic. sel. III. p. 54. t. 90: nov. g. Piperacear. (S. Jaborandi.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 11.
Miq. 1839. Bull. Néerl.; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 172; 1840. Comm. phyt. II. p. 41. t. 4. f. 1: g. Zippeliear.
Miq. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 288: g. Zippeliar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar. = Ottonia Spreng.

Serrularia Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 139: subg. Chauviniae. (Caulerpa Freycineti Ag.)

Serruria „Salisb. Parad. p. 67" R. Brown 1809 in Linn. Trans. X. (1811) p. 112 (Verm. bot. Schr. II. p. 187): g. Proteacear. (Protea cyanoides L., etc.) — Par. Link 1821. En. I. p. 113. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 466. n. 503; 1830. Gen. I. p. 102. n. 513. (Tetrandr. Monogyn.) — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 13. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 518.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 330: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1739; 1841. Nom. p. 63. n. 2383: g. Proteear. (genuinar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 416. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 283.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Protear.
Endl. 1838. Gen. n. 2126. p. 338; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 78: g. Proteinar.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (244): g. Proteinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Proteidar.
Synon. Serraria Burm.; Holderlinia Neck.

Sersalisia*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 529. Ed. Nees p. 385: nov. g. Sapotear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLVI. 504. n. 795. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 20. — Bartl. 1830. Ord. p. 162. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 84. t. 32. — Meisn. 1839. Gen. p. 251 (160). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 384.
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 2639; 1841. Nom. p. 137. n. 5300: g. Mimusopear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Sapotacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 27. — Endl. 1839. Gen. n. 4237. p. 740; 1841. Ench. p. 361. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 177. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: g. Chrysophyllear.

Sertiflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 23: class. Thalamiflorar. Fam.: Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Berberideae, Papaveraceae, Fumariaceae, Cruciferae, Polygaleae, Balsamineae.

Sertolara „Imperato" Nardo 1834 in Oken Isis p. 674: nov. g. Algar. (Fucus Sertolara Bertol.)
= Halimeda Lamx.

*) Dicat. Joh. Bapt. Sersalis, Neapolitano.

Sertularia Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. 1751. p. 135: g. Lithophytor.

Sertürnera*) Martius 1826. Nov. gen. II. p. 36. t. 136—138; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 310: nov. g. Amarantacear. (Gomphrena stenophylla Spr.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 106. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 266.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4383: g. Achyranthear.
Endl. 1837. Gen. n. 1958 *a*. p. 301; 1841. Ench. p. 185: sect. Gomphrenae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6425. 1. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 383.
Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230): g. Gomphrenear.

Serturnera Auct. vid. *praeced.*

Serveria Necker 1790. Elem. bot. II. p. 98. n. 764: g. Sarcodiphytor.
= Tigarea Aubl.

Sesamastrum Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 36: g. pl. class. XIV a (non descriptum).

Sesameae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 152: sect. Bignoniacear. Gen.: Martynia, Craniolaria, Sesamum. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 251.
DC. 1819. Théor. élém. ed. II. p. 247: ordo Corolliflorar. — Par. A. DC. 1845. Pr. IX. p. 249. Trib.: Eusesameae, Pedalineae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX: div. Personatar. Gen.: Sesamum, Pedalium, Avicennia.
Rchb. 1828. Consp. p. 125: subdiv. Bignoniacear. Gen.: Sessea, Sesamum, Rogeria, Pretrea, Pedalium, Josephinia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Pedalinear. Gen. ut Kunth et Tourretia.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: ordo Labiatiflorar. Gen. ut Rchb. (Martynia loco Sesseae.)
Endl. 1832. Linnaea VII. p. 1. Nov. gen.: Ceratotheca.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 248: fam. (144) Labiatiflorar. Gen.: Craniolaria, Martynia, Carpoceras, Pedalium, Uncaria, Rogeria, Dicerocaryum, Pretrea, Josephinia, Sesamum, Ceratotheca.

Sesameae Rchb. 1837. Handb. p. 198: sect. Bignoniariar. restricta. Gen.: Sesamum.
Endl. 1839. Gen. p. 709: subordo Bignoniacear. Gen.: Ceratotheca, Sesamum. Accedunt 1841 (Ench. p. 345) Sesamopteris et 1843 (Spl. III. p. 79) Sporledera.
Meisn. 1840. Gen. p. 298 (206): trib. Pedaliacear. Gen. ut Endl. 1839. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670. Gen. ut Endl. 1843.
Rchb. 1841. Nom. p. 116: sect. Bignoniear. Gen. ut Endl. 1839.
Bernh. 1842. Linnaea XVI. p. 41. Gen.: Ceratotheca, Sporledera, Gangila, Simsimum, Sesamum.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: trib. Bignoniacear. Gen.: Sesamum.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 579: fam.

*) Dicat. in memoriam F. Sertürner, doctoris.

Sesameae Rchb. cont.
Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Gen. ut Endl. 1839.
= Eusesameae DC.

Sesamella Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4823: g. Resedear. (*Sesamoides Tourn.*)
Bartl. 1830. Ord. p. 259: g. Resedacear.
= Astrocarpus Neck.

Sesamoides Tourn. 1700. Inst. p. 424. t. 238: g. pl. class. XI.
Tristan 1811. Ann. Mus. XVIII. t. 21. f. 1—4.
= Astrocarpus Neck.

Sesamopteris Endl. 1839. Gen. n. 4105 *b*. p. 709; 1843. Suppl. III. p. 79: sect. Sesami. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4529. 2. — Bernh. 1842. Linnaea XVI. p. 34.
Meisn. 1840. Gen. p. 298 (206): g. Sesamear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 345. n. $4104/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670.
DC. 1845. Pr. IX. p. 251: g. Eusesamear. Sect.: Simsimum, Gongyla.

Sesamum Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 36: g. pl. class. XIV a (non descriptum).

Sesamum*) Linn. 1737. Cliff. p. 318; 1737. Coroll. p. 11. n. 966; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 293. n. 613; 1753. Sp. II. p. 634; 1759. Syst. ed. X. p. 1120. n. 700; 1763. Sp. ed. II. p. 883; 1764. Gen. ed. VI. p. 323. n. 782; 1767. Syst. ed. XII. p. 423: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 481; 1784. Syst. p. 574. — Reich. 1778. Gen. p. 325. n. 845. — Lour. 1790. Coch. II. p. 382. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 422. n. 1048. — Gmel. 1791. Syst. p. 956. — Pers. 1797. Syst. p. 611. — Willd. 1800. Sp. III. p. 358. n. 1191; 1809. En. p. 655. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 100 (*Sesasmum*).
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 177. n. 724: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 173.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 175. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 384.
Hill 1769. Ht. kew. p. 273: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 138: g. Bignoniar.
Neck. 1790. El. I. p. 372. n. 577: g. Plasyrgophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 132.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 404: g. Bignonear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 316.
Pers. 1807. Ench. II. p. 169. n. 1508: g. Bignoniacear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 68.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 415: g. Bignoniear. anomalar.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 153: g. Sesamear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 253. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 778. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX; 1828. Consp. p. 125. n. 3249; 1837. Hdb. p. 198; 1841. Nom. p. 116. n. 4529. Sect. (1841): Sesamum, Sesamopteris. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 176. — Endl. 1839. Gen. n. 4105. p. 709; 1843. Spl. III. p. 79. Sect. 1839: Eusesamum, Sesamopteris et 1843 Simsimum. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 253. — Brongn. 1843. En. genr. p. 63. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 760.
Link 1822. En. II. p. 131: g. Bignoniaceis aff.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 234: g. Pedalinear.
= Sesamum DC. et Sesamopteris Endl.

Sesamum Adans. 1763. Fam. II. p. 213: g. Personatar.
= Craniolaria Linn.

Sesamum DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 296 (206): g. restrict. Sesamear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 345. n. 4105. — — Bernh. 1842. Linnaea XVI. p. 42. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 578.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4529. 1: sect. Sesami.
DC. 1845. Pr. IX. p. 249: g. Eusesamear.
Synon. Eusesamum Endl.; Dysosmon Rafin.?

Sesasmum Roxb. 1832. Fl. Ind. III. p. 100 (*Sesasum* in Ind.): vid. *Sesamum Linn.*

Sesban*) Adans. 1763. Fam. II. p. 327: g. Phaseolor.
Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. Am. II. p. 74: g. Diadelph. Decandr., ab Aeschynomene separandum.
Poir. 1806. Dict. VII. p. 127.
= Sesbania Scop.

Sesbana R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 330 (Verm. bot. Schr. II. p. 482): g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 755; 1826. Syst. III. p. 272. n. 2577; 1831. Gen. II. p. 589. n. 2898. — Link 1822. En. II. p. 244.
= seq.

Sesbania Scopoli 1777. Introd. p. 308: g. Leguminosar. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 120. t. 4. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 42.
Pers. 1807. Ench. II. p. 316. n. 1734: g. Diadelph. Decandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 111. — Blanco 1837. Filipin. p. 599 (*Sesvania*).
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Coronillear.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 533: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 141. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 580.
DC. 1825. Pr. II. p. 264: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3902; 1841. Nom. p. 148. n. 5740. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 240. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 262. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 214. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p.

*) Nomen ex Plinio.

*) Nomen ex Aegypto.

Sesbania Scopoli cont.
293. — Endl. 1840. Gen. n. 6551. p. 1274; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 680; 1843. II. p. 858. — Brongn. 1843. En. genr. p. 129. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 420. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 285. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 492.
Link 1831. Hdb. II. p. 199: g. Galegoidear.
Synon. Emerus Burm.; Sesban Adans.; Sesbana R. Brown.

Seseleae C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 357: trib. Umbelliferar. Gen.: Aethusa, Silaus, Libanotis, Hippomarathrum.

Seseli*) Riv., Rupp. 1718. Fl. jen. p. 267. Ed. Hall. 1745. p. 280: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 80. n. 228; 1737. Cliff. p. 102; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 259; 1759. Syst. ed. X. p. 961. n. 322; 1762. Sp. ed. II. p. 372; 1764. Gen. ed. VI. p. 143. n. 360; 1767. Syst. ed. XII. p. 215. n. 357: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 239; 1784. Syst. p. 289. — Reich. 1778. Gen. p. 146. n. 390. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 193. n. 492. — Gmel. 1791. Syst. p. 488. — Pers. 1797. Syst. p. 306. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1458. n. 556; 1809. En. p. 319. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 205. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 241. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 94.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 430: g. Umbelliferar. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 212. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 91; 1769. Stirp. Austr. p. 204. — Scop. 1777. Intr. p. 115. — Juss. 1789. Gen. p. 220. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 13. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 468. — DC. 1805. Franç. IV. p. 283; 1815. V. p. 502. — Hedw. 1806. Gen. p. 202. n. 831. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 103. — Link 1821. En. I. p. 282. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 57. n. 233: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 87.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 100. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 321. n. 716. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 194. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 23. 415.
Adans. 1763. Fam. II. p. 96: g. Chaerophyllor.
Neck. 1790. El. I. p. 184. n. 310: g. Scadiophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 632; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXV. 395; 1825. Syst. I. p. 884. n. 1044; 1830. Gen. I. p. 221. n. 1145: g. Pimpinellear.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 109; 1836. Syn. p. 294. Ed. II. p. 323: g. Selinear. Sect. (1836): Hippomarathrum, Euseseli. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 333; 1845. Ross. II. p. 272. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — DC. 1830. Pr. IV. p. 444. Sect.: Hippomarathrum, Hippomarathroides, Euseseli. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 308. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 371. — Tausch 1834. Flora I. p. 355. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5422. Sect.: Hippomarathrum, Statomarathrum, Seseli. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4430. p. 774; 1841. Ench. p. 378. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 955. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Brongn. 1843. En. genr. p. 111. — Walp. 1843. Rep. II. p. 401. 938; 1846. V. p. 864. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 707. Sect.: Euseseli, Libanotis. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 580. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 69.
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 382: g. Seselinar. Sect.: Seseli, Libanotis. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 446. Sect.: Hippomarathrum, Seseli.
Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3715 *a:* sect. Seselios.
Link 1829. Hdb. I. p. 327: g. Amminear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 358: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

*) Nomen ex Dioscoride.

Seseli Scopoli 1772. Fl. Carn. I. p. 212: g. Umbelliferar. ampliat., includens Meum, Falcariam, Hippomarathrum, Aegopodium, Apium, Carum et Helosciadii sp.

Seseli Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3715: g. ampliat. Seselinear. Sect.: Seseli, Bubon, Libanotis.
= Seseli Koch, Bubon Koch & Libanotis Crantz.

Seselinae Bluff & Fingerh. 1825. Comp. I. p. 378: div. Umbelliferar. Gen.: Meum, Silaus, Athamanta, Cnidium, Seseli, Aethusa, Foeniculum, Oenanthe, Bupleurum, Sium, Pimpinella, Carum, Aegopodium, Drepanophyllum, Ptychotis, Heliosciadium, Trinia, Petroselinum, Apium, Cicuta.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 463: div. Platyspermar. Gen.: Oenanthe, Aethusa, Foeniculum, Kundmannia, Seseli, Libanotis, Cnidium, Trochiscanthes, Athamanta, Ligusticum, Silaus, Meum, Pachypleurum, Crithmum.
Conf. seq.

Selineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 102: trib. 10 Umbelliferar. Gen.: Crithmum, Meum, Trochiscanthes, Ligusticum, Silaus, Athamanta, Brignolia, Molopospermum, Cnidium, Seseli, Aethusa, Foeniculum, Oenanthe.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIII: div. Umbelliferar. Gen. ead. et Coenolophium.
Rchb. 1828. Consp. p. 143: sect. Amminear. Gen. ut Koch (exclusis Aethusa et Oenanthe) et Pachypleurum, Soranthus, Coenolophium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 140. Gen. ut Endl. 1841 et Coristospermum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: trib. Pleurospermar. Gen.: Crithmum, Meum, Foeniculum, Seseli, Bubon, Athamantha, Cachrys,

Seselineae Koch cont.
Libanotis, Aenanthe, Phellandrium, Aethusa, Cnidium, Silaus.
DC. 1830. Pr. IV. p. 135: trib. Orthospermar. Gen.: Lichtensteinia, Ottoa, Oenanthe, Annesorhiza, Sclerosciadium, Dasyloma, Cynosciadium, Aethusa, Foeniculum, Kundmannia, Deverra, Soranthus, Seseli, Libanotis, Cenolophium, Cnidium, Thaspium, Trochiscanthes, Athamanta, Ligusticum, Silaus, Wallrothia, Meum, Gaya, Conioselinum, Crithmum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 301. Gen. ead. et Petitia, Endressia. — Koch 1836. Syn. p. 291. Ed. II. p. 321. Gen.: Oenanthe, Aethusa, Foeniculum, Seseli, Libanotis, Cnidium, Trochiscanthes, Athamanta, Ligusticum, Silaus, Meum, Gaya, Crithmum, Conioselinum. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). Gen. ut DC. (Neogaya loco Gayae) et Petrocarvi, Turbith, Trachydium, Eriocycla, Hymenidium, Chamarea, Polemannia, Endressia? — Endl. 1839. Gen. p. 773; 1841. Ench. p. 379. Gen. ut Meisn. et Xatardia, Dethawia. Accedunt 1843 (Spl. III. p. 82) Anisopleura, Elaeochytris et 1850 (Spl. V. p. 6) Todaroa, Lithosciadium, Physolophium, Tinguarra, Aciphylla, Calosciadium. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 96. Gen. ut Endl.
Tausch 1834. Flora I. p. 355: subtrib. Pleurospermar. Gen.: Foeniculum, Discopleura, Cachrys, Seseli, Libanotis, Athamanta, Magydaris, Kundmannia, Cynosciadium, Oenanthe, Phellandrium, Dasyloma, Sclerosciadium, Ottoa, Oliveria, Aethusa, Ligusticum, Crithmum, Cenolophium, Malabaila, Pleurospermum, Lichtensteinia?, Astrantia.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. 203: sect. Pleurospermear. Gen. ut Tausch et Chamarea, Pycnocycla, Xatardia, Klotschia.
Brongn. 1843. Én. genr. p 111: trib. Orthospermear. Gen. ex DC.

Seselinidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: trib. Apiacear. Gen. Seselinear. Endl. 1843 et Haplosciadium, Platysace, Eremocarpus, Todaroa, Tinguarra, Anisopleura, Aciphylla, Anisotôme.

Sesia Adans 1763. Fam. II. p. 10: g. Fungor.
Cf. Leman 1827. Dict. v. 49. p. 50.
= Daedalea Pers.

Sesleria*) Scopoli 1760. Fl. Carn. p. 63. Ed. II. 1772. p. 63: nov. g. Triandr. Digyn. — Par. Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 271. — Willd. 1809. En. p. 111. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 64. — MBieb. 1819. Taur. III. p. 64.
Adans. 1763. Fam. II. p. 496: g. Poarum.
Arduin. 1764. Animadv. bot. spec. II. p. 18.
Juss. 1789. Gen. p. 31: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 82. — DC. 1805. Franç. III. p. 75; 1815. V. p. 279. — Hedw. 1806. Gen. p. 49. n. 232. — Palis. 1812. Agrost. p. 78. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 35. 602. n. 309. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 53. — Link 1829. Hdb. I. p. 80.

*) Dicat. Leonardo Sesler, botanico veneto.

Sesleria Scopoli cont.
Host 1802. Gram. Austr. II. p. 69. t. 97—100; 1805. III. p. 6. t. 8: g. Graminum. — Par. Link 1821. En. I. p. 83. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 75. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 69. 268.
Pers. 1805. Ench. I. p. 72. n. 136: g. Triandr. Monogyn.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 127. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Endl. 1837. Gen. n. 875. p. 98; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Oreochloa, Sesleria, Psilathera. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 373. 624: g. Festucacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Kunth 1830. Gram. p. 110; 1833. Agrost. p. 321. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Steud. 1854. Glum. I. p. 295.
Koch 1837. Syn. p. 788. Ed. II. p. 910: g. Sesleriacear. Sect.: genuinae, Oreochloa. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 399. Sect.: Eusesleria.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1397 (1844. Fl. sax. p. 34): g. Sesleriear. Sect. ut Endl. — Par. Parlat. 1845. Palerm. I. p. 128. — Math. 1853. Belg. I. p. 603.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 442: g. Festucear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 405: g. Pappophorear.
Synon. Sessleria Spreng.

Sesleria Link 1827. Hort. Berol. I. p. 200: g. Cynosuroidear., sejunctis Oreochloa et Psilathera restrict.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 996; 1830. Fl. exc. p. 35: g. Festucacear. — Par. Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 41.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Endl. 1837. Gen. n. 875 *b*. p. 98; 1841. Ench. p. 59: sect. Sesleriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1397. 2.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 453: g. Sesleriacear. — Par. Schur 1856. Verh. zool. bot. Ver. Wien p. 191.
= Eusesleria C. Koch.

Sesleriaceae Koch 1837. Synops. p. 788; 1844. Ed. II. p. 910: trib. Graminear. Gen.: Echinaria, Sesleria. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 434. 452. Gen. ead. et Oreochloa.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80 (*Sessleriaceae*): div. Clisanthear. Gen.: Sessleria.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 397: div. Loxanthar. Gen.: Anthoxanthum, Schismus, Sesleria, Echinaria, Wilhelmsia.
Schur 1856. Verh. zool. bot. Ver. Wien p. 191. (Müll. Ann. bot. VI. p. 1007.)
Conf. seq.

Seslerieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 39: sect. Festucear. Gen.: Sesleria, Köleria, Schismus, Harpachne, Wangenheimia.
Parlat. 1845. Palerm. I. p. 127: subtrib. Pappophoreacear. Gen.: Sesleria.

Seslerieae Rchb. cont.
Math. 1853. Belg. I. p. 603: sect. Avenear. Gen. id.

Sessaea Endl. 1839. Gen. n. 3869. p. 668; 1841. Ench. p. 332: g. Vestiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4771.
= Sessea Ruiz & Pav.

Sessea*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 21. t. 33; 1799. Fl. Peruv. II. p. 9. t. 115. 116: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 231. n. 509. — Hedw. 1806. Gen. p. 126. n. 552. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 583. n. 630.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 416: g. Bignoniear. anomalar.
Röm. & Schult. 1819. IV. p. XVII: 186. n. 671: g. Sesamear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3248.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 54: g. Bignoniacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 143. n. 712: g. Personatar.? — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 646.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 487: g. Cestrinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Martyniear.?
Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 152; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Metternichiear. (Char. emend.) — Par. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 595.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 630: g. Vestiear.
Synon. Sessaea Endl.

Sessleria Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 165: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 348.
Trin. 1820. Agrost. p. 154: g. Triandr. Digyn.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 329. n. 334: g. Graminear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 72. n. 351: g. Graminum.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80: g. Sessleriacear.
= Sesleria Scop.

Sessleriaceae Fries vid. *Sesleriaceae.*

Sestinia Boiss. & Hohenack. Pl. exsicc. Kurd. n. 571.
= Wendlandia Bartl.

Sestinia**) Boissier 1844. Diagn. pl. or. I. Nr. 5. p. 40: nov. g. Stachydear. (S. calycina.)
Walp. 1845. Rep. III. p. 894. 990: g. Ballotear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
= Hymenocrater Fisch. & Mey.

Sestochilus***) Kuhl & Hass. 1827. Orchid. ed. Breda t. 3.
= Cirrhopetalum Lindl.?

Sesurium Endl. Gen. Suppl. V. p. 53: sphalm. pro *Sesuvium.*

Sesuveae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 527: subordo Tetragoniacear. Gen. Sesuviear. Fenzl excepta Portulaca.

Sesuvieae Rchb. 1837. Handb. p. 237: subdiv. Portulacear. Gen.: Cypselea, Trianthema, Sesuvium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 163. Gen. ead. et Zaleya, Diplochonium, Pyxipoma, Ancistrostigma.
Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 289: trib. Portulacear. Gen.: Trianthema, Diplochonium, Sesuvium, Pyxipoma, Ancistrostigma, Cypselea, Portulaca. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 948; 1841. Ench. p. 500. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 440. Gen. ead.

Sesuvium Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1058. 1371. n. 1143; 1762. Sp. ed. II. p. 684; 1764. Gen. ed. VI. p. 250. n. 624; 1767. Syst. ed. XII. p. 343: g. Icosandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 388; 1784. Syst. p. 465. — Reich. 1778. Gen. p. 256. n. 680. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 338. n. 856. — Pers. 1797. Syst. p. 499; 1807. Ench. II. p. 39. n. 1228. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1009. n. 990; 1809. En. p. 521. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 199. Ed. Schrank 1819. p. 218. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 306.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Gled. 1764. Syst. p. 279. n. 1147: g. Calycostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 220: g. Calycanthemar.
Juss. 1789. Gen. p. 316: g. Ficoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 268. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 144. — Link 1822. En. II. p. 35. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 86. — Kunth 1824. Syn. III. p. 382. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 56. — DC. 1828. Pr. III. p. 453. (genuinar.) — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 199. — Bartl. 1830. Ord. p. 309. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 152. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 109.
Neck. 1790. El. II. p. 87. n. 746: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 834: g. Polyandr. Trigyn.
Batsch 1802. Tab. p. 36: g. Portulacear. — Par. A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 621.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 843: g. Aizoidar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 504. n. 1852; 1830. Gen. I. p. 413. n. 2060: g. Aizoidear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 361. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 128.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Tetragoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4406: g. Mesembryanthemear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Mesembrynear.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 509: g. Icosandr. Digyn.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: g.

*) Dict. Mart. [illegible], Mexicano.
**) Dict. B. [illegible], peregrinatori in Oriente.
***) [illegible]

Sesuvium Linn. cont.
Portulacellar. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94).
Rchb. 1837. Hdb. p. 237; 1841. Nom. p. 163. n. 6340: g. Sesuviear. — Par. Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 292. — Endl. 1840. Gen. n. 5170. p. 949; 1841. Ench. p. 501. — Walp. 1843. Rep. II. p. 233; 1846. V. p. 784. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1059.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 105: g. Tetrageniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Sesuvear.
Synon. Remè Adans.; Halimus Löfl.; Aizoon Andr.

Sesvania Blanco vid. *Sesbania Scop.*

Setaria Achar. 1798. Lich. suec. p. 219: g. Lichenum caulescentium. (Lichen jubatus L.)
Michx. 1803. Fl. bor. Am. II. p. 331: g. Lichenacear.
= Evernia Achar.

Setaria Palis. 1812. Agrost. p. 51. t. 13. f. 3: nov. g. Graminear. (Panicum viride L., etc.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 27. 488. n. 272. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 304. n. 321. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 58. — Link 1829. Hdb. I. p. 86. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 108.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 109; 1822. Syn. I. p. 183; 1830. Gram. p. 46; 1833. Agrost. p. 149; 1838. Berol. II. p. 367: g. Panicear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 152. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 156. — Agdh. 1823. Aphor. p. 148. — Link 1827. Hort. I. p. 216. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 29; 1841. Nom. p. 37. n. 1287. — Koch 1837. Syn. p. 772. Ed. II. p. 893. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 21. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 133. 291. — Meisn. 1843. Gen. p. 416 (319). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 35; 1850 in Webb Canar. III. p. 381. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 187. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 437. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 584. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 456.
Trin. 1820. Fund. p. 171: g. Triandr. Digyn.
Link 1821. En. I. p. 75: sect. Panici. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 80. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 150. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 237. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 217. — Steud. 1854. Glum. I. p. 49.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 925: g. Pennisetear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Setariear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 63. n. 309: g. Graminum.
Endl. 1837. Gen. n. 781 *a*. p. 85; 1841. Ench. p. 57: sect. Penniseti.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 469; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 470; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265: g. Paspalear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 465: g. Eupanicear.
Synon. Panicum Gärtn.

Setarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Panicear. Gen.: Setaria, Urochloa, Penicillaria, Pennisetum, Gymnothrix.

Sethia*) HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 175 in adnot.: nov. g. Erythroxylear. (Erythr. monogynum Roxb.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 190. — DC. 1824. Pr. I. p. 576. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4906 c; 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 206. n. 7839. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 362. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 633. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 106. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 74. — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40).
Endl. 1840. Gen. n. 5597 *b*. p. 1066; 1841. Ench. p. 559: sect. Erythroxyli. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 407.

Setipenna Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 472: sect. Penniseti. (P. orientale.)

Seubertia Watson in Hook. journ. bot. III. p. 602.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: g. Bellidear.
= Bellis Linn. (Walp. Rep. VI. p. 125.)

Seubertia**) Kunth 1843. Enum. pl. IV. p. 475: nov. g. Alliear. (Triteleia laxa Benth.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255.

Seutera Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3438: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
Bartl. 1830. Ord. p. 202: g. Asclepiadear. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3473. p. 592; 1841. Ench. p. 299 (sphalm. *Sentera*): g. Calotropidear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4986.
Decne 1844. Pr. VIII. p. 590: g. Oxypetalar.
Synon. Lyonia Ell.

Sevada***) Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 154: nov. g. Schanginiear.

Severinia†) Tenore 1840. Ind. sem. h. Neap. (S. buxifolia.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 83: g. Aurantiacear. vix notum. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 345. — Walp. 1843. Rep. II. p. 805. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 35. 74. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 458.

Seymeria††) Pursh 1814. Fl. bor. Am. II. p. 737.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 48: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 21.

---

*) Dicat. Simeon Seth.
**) Dicat. Dr. Maur. Seubert.
***) Nomen a voce *Suaeda* depromptum.
†) Dicat. M. A. Severino, Neapolitano.
††) Dicat. Henry Seymer, botan. Anglo.

Seymeria Pursh cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 810. n. 2189; 1831. Gen. II. p. 494. n. 2434: g. Scrofularinar.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 67: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3166: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6; 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 203: g. Gerardiear. (?) — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 560. — Endl. 1839. Gen. n. 3995. p. 691; 1841. Ench. p. 340. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (220). — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4521. — Walp. 1845. Rep. III. p. 381. 970. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 511; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685. Sect.: Cassioides, Cyrtocodon, Brachygyne.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Digitalear.
Synon. Afzelia Gmel.; Chytra Gärtn. f.?

Seymouria Sweet 1830. Geran. III. t. 206: g. Geraniacear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 731: sect. Pelargonii. (P. asarifolium Don et Geranium dipetalum L'Her.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 322.

Shakua Bojer 1837. Hort. Maurit. p. 82: g. inter Spondiam et Poupartiam nominatum. Quid? (Endl. Spl. I. p. 1425. n. 5921; Meisn. Comm. p. 349.)
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5674: g. Spondiear.

Shallonium Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260: nov. g. ex typo Gaultheriae Shallon Pursh.
Endl. 1839. Gen. n. 4323 *c*. p. 756; 1841. Ench. p. 370: sect. Gautierae (Gaulthierae).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443: g. Andromedear.
Synon. Acosta Lour.?

Shawia*) Forst. 1776. Char. gen. p. 95. t. 48: nov. g. Syngenes. Monogam. *Cf.* Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 69.
Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 180: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 396.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 595. n. 1359 (*Schawia*): g. Syngenes. Polygam. Segregat.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 554: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2223. (?)
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2436.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 673. n. 2910; 1831. Gen. II. p. 648. n. 3269: g. Compositar. descisc.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 343; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40.
Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Vernoniear.? (ibid. p. 140 Inulear.: *Schawia.*)

*) Dicat. Th. Shaw, Oxoniensi.

Shawia Forst. cont.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 243: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 156: g. Eupatoriear.?
DC. 1836. Pr. V. p. 78: g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2221. p. 360; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 702. (Char. amplific.)
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3885: g. Pacourinear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 119: sect. Eurybiae.

Sheffieldia*) Forst. 1776. Char. gen. p. 17. t. 9: nov. g. Pentandr. Monogyn. (*Conf. Scheffieldia Scop.*, etc.) — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 18. n. 1367. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 113. n. 278. — Gmel. 1791. Syst. p. 336. — Willd. 1797. Sp. I. p. 833. n. 313.
Juss. 1789. Gen. p. 96: g. Lysimachiar.
Batsch 1802. Tab. p. 208: g. Anagallidear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 220: g. Primulacear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1828. Consp. p. 128. n. 3364: g. Samolear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Samolinear.
= Samolus Tourn.

Shepherdia**) Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 240: nov. g. Dioec. Octandr. (Hippophaë argentea Pursh.)
A. Rich. 1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 389. t. 24: g. Elaeagnear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 231. — Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1717; 1841. Nom. p. 64. n. 2421. — Bartl. 1830. Ord. p. 114. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 319. n. 1629. — Hook..... Fl. bor. am. II. p. 138. — Endl. 1838. Gen. n. 2113. p. 334; 1841. Ench. p. 212. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (242). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 454.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 243. n. 1488: g. Octandr. Monogyn.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 71: g. Osyridear.?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Eleagnidear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 121: g. Eleagnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 257: g. Elaeagnacear. — Par. Schltd. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 607.
Synon. Lepargyrcia Rafin.

Sherardia***) Dillen. 1719. Nov. pl. gen. p. 96. t. 3: nov. g. herbae Stellatae.
Linn. 1737. Gen. p. 25. n. 67; 1737. Cliff. p. 33; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 102; 1759. Syst. ed. X. p. 890. n. 112; 1762. Sp. ed. II. p. 149; 1764. Gen. ed. VI. p. 50. n. 120; 1767. Syst. ed. XII. p. 116: g. Tetrandr. Monogyn. — Par.

*) Dicat. Sheffield, botanico Oxoniensi.
**) Dicat. John Shepherd.
***) Dicat. botanico incomparabili Gull. Sherardo.

Sherardia Dillen. cont.
Reich. 1778. Gen. p. 52. n. 127. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 67. n. 156. — Gmel. 1791. Syst. p. 234. — Pers. 1797. Syst. p. 153; 1805. Ench. I. p. 124. n. 234. — Willd. 1797. Sp. I. p. 574. n. 178; 1809. En. p. 150. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 758. — Schult. 1827. Mant. III. p. 13.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 214.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 457: g. Stellatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 520. — Batsch 1802. Tab. p. 231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 598. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 86. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 375. 408. — Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1991. — Link 1829. Hdb. I. p. 644. — Bartl. 1830. Ord. p. 209. — DC. 1830. Pr. IV. p. 581. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 637. — Koch 1836. Syn. p. 326. Ed. II. p. 358. — Endl. 1838. Gen. n. 3104. p. 524; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 396. — Webb .... Canar. II. p. 189.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127 (*Sherhardia*); 1764. Syst. p. 164. n. 667: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 483.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 196; 1820. Mém. Mus. VI. p. 369. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 565. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 428. — DC. 1805. Franç. IV. p. 243. — Hedw. 1806. Gen. p. 65. n. 311. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 274. n. 485. — Link 1821. En. I. p. 133. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 480. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 398. n. 390; 1830. Gen. I. p. 93. n. 461. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 72. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 474. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 169. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 49.
Hill 1769. Ht. kew. p. 120: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 138: g. Aparinium.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 110. t. 24. f. 2 (arvensis).
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Galiear. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 302.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 129: g. Asperulear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 48.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 210; 1841. Nom. p. 74. n. 2766: g. Spermacocear. (genuinar.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 771: g. Galiacear.
Synon. Dillenia Heist.; Scherardia Murr.

Sherardia Adans. 1763. Fam. II. p. 198: g. Verbenar. („*Vaill.* Ehret. t. 5. *Verbena Pluk.* t. 228. f. 4, etc.")
= Stachytarpheta Vahl.

Sherardiastrum Boissier 1843. Diagn. pl. nov. Or. III. p. 35: sect. Galii. (G.ceratocarpon n. sp. et G. Boryanum Walp.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 12.

Sherhardia Gled. vid. *Sherardia Dill.*

Shicola Römer 1847. Fam. nat. syn. III. p. 112: subg. Photiniae? An genus? (Photinia dubia Lindl. — Crataegus Shicola Buch.)

Shorea*) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 9. t. 212; 1832. Fl. Ind. II. p. 615: nov. g. Polyandr. Monogyn. (Sh. robusta et camphorifera.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 74. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 577. n. 1896.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 47. t. 186.
Agdh. 1825. Aphor. p. 209: g. Dipterocarpear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 813. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 246. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 337.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1917 *b*: sect. Pterigii.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 427. n. 2120: g. Tiliacear.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 32: g. Shorear.
= Vatica Linn.?

Shoreaceae „Roxb. mss." Wallich 1832. Catal. n. 4405.
= Dipterocarpeae Blume.

Shoreae Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 32: subordo Dipterocarpear. Gen.: Shorea, Hopea.

Shortia**) A. Gray .... in Sillim. journ. XLII. p. 48; 1844. Lond. journ. bot. III. p. 241: nov. g. Pyrolae aff.
Endl. 1842. Spl. II. p. 106. n. 4349/1: g. Pyrolacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 450. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 437.
Meisn. 1843. Comm. p. 364: g. Pyrolear.

Shringata Jones .... Asiat. research. II. p. 350; 1794. IV. p. 253.
= Trapa Linn.

Shultzia Rafin. (1808. New-York med. repos. V. p. 356?) 1808 in Desv. Journ. bot. I. p. 219: nov. g. Orobanchear. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 75 (*Shulzia*) et Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 592.
= Obolaria Linn.

Shutera Wight vid. *Shuteria Wight & Arn.*

Shutereia***) Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 485; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 435: nov. g. Convolvulear. *Cf.* Flora Lit. V. p. 135. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 297.
Synon. Hewittia Wight; Palmia Endl. pt.

Shuteria Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 207: nov. g. Clitoriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 86 (62). — Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 232 adnot.
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 126: g. Glycinear.? — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6652. p. 1292; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5808. — Walp. 1842. Rep. I. p. 761. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 220. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 553.
Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 9. t. 165 (*Shutera* in explic. tab.): g. Leguminosar.

Shuttelworthia Steud. vid. *seq.*

---

*) Dicat. Lord Teignmouth.
**) Dicat. prof. Short, Kentucky.
***) Dicat. D. Shuter, botanico Madras.

Shuttleworthia*) Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 290 (198. 366): nov. g. Lippiear. (Verbena diceras Bert.) — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 575 (*Shuttelworthia*). — Walp. 1845. Rep. IV. p. 12.

Clos 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 380: ad Verbenam reducit.

= Uwarowia Bunge.

Siagonanthus**) Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 40. t. 69: nov. g. Orchidear. (S. multicaulis.)

Endl. 1837. Gen. n. 1409. p. 197; 1841. Ench. p. 110: g. Vandear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2014. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Siagonarrhen „Martius mss." Benth. 1833. Labiat. p. 133; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 132: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 705. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *s.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 18. — Walp. 1845. Rep. III. p. 564.

Sialodes***) Ecklon & Zeyh. 1837. Enum. pl. Afr. III. p. 329: nov. g. Ficoidear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93). — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 122.

= Eugalenia Fenzl.

Siaphyglottis Rchb. vid. *Scaphyglottis Pöpp. & Endl.*

Sibaldia†) Linn. 1737. Fl. lappon. p. 77; 1737. Gen. p. 90. n. 256; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 134. n. 310: g. Pentandr. Pentagyn.

Gled. 1749. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonum.

Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.

= Sibbaldia Hall.

Sibbaldia „Linn. emend." Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 342: g. Gymnopolyspermar.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 194.

Linn. 1753. Sp. I. p. 284; 1759. Syst. ed. X. p. 970. n. 354; 1762. Sp. ed. II. p. 406; 1764. Gen. ed. VI. p. 155. n. 393; 1767. Syst. ed. XII. p. 227. n. 389: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 254; 1784. Syst. p. 308. — Reich. 1778. Gen. p. 158. n. 425. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 208. n. 536. — Gmel. 1791. Syst. p. 520. — Pers. 1797. Syst. p. 327; 1805. Ench. I. p. 340. n. 756. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1567. n. 597. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 207. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 26. 461.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 186. — Hedw. 1806. Gen. p. 214. n. 879. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 900. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIX. 768. — Link 1821. En. I. p. 303. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 956. n. 1145. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 78. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 428. Sejungitur Chamaerhodos.

Gled. 1764. Syst. p. 264. n. 1093: g. Calycostemonum.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 186: g. Calyciflorar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 184: g. Pentapetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 221: g. Calycanthemar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 348. t. 73. f. 5 (procumbens).

Juss. 1789. Gen. p. 337: g. Sanguisorbar.

Neck. 1790. El. II. p. 113. n. 783: g. Plyrontophytor.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 345: g. Agrimoniear.

DC. 1805. Franç. IV. p. 453: g. Agrimoniacear.

Nestl. 1816. Mon. Potent. p. 17: g. Fragariacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 863: g. Sanguisorbear.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 579: g. Dryadear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 587. — Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Link 1831. Hdb. II. p. 100. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 562. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 196. (restrict.) — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Koch 1836. Syn. p. 220. Ed. II. p. 244. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 521.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4433; 1832. Fl. exc. p. 588: g. Potentillear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 236. n. 1246. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1019.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 433: g. Chaemaerhodear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6367. p. 1243; 1841. Ench. p. 659. — Walp. 1843. Rep. II. p. 37. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 32.

Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6490: g. Sibbaldiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.

Synon. Sibaldia Linn.; Dactylophylli Spenn. pars.

Sibbaldieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 167: sect. Dryadear. Gen.: Sibbaldia, Dryadanthe, Chamaerhodos, Horkelia, Biebersteinia.

Sibi Kämpf. 1712. Amoen. exot. Fasc. V. p. 855.

= Sibia DC.

Sibia DC. 1826. Mém. soc. Genèv. III. 2. p. 72; 1828. Prodr. III. p. 93: sect. Lagerströmiae. (*Sibi Kämpf.*) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4577 *a.* — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 439. — Endl. 1840. Gen. n. 6164 *a.* p. 1204; 1841. Ench. p. 643.

Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 125: subg. Lagerströmiae.

Sibouratia Juss. vid. *Siburatia Pet.-Thouars.*

Sibthorbia Reich. vid. *Sibthorpia Linn.*

*) Dicat. R. J. Shuttleworth, botanico Bernensi.

**) σιαγών, maxilla.

***) σιαλώδης, pinguis.

†) Dicat. Rob. Sibbaldo, prof. Edinensi.

Sibthorpeae Benth. 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 685: trib. Rhinanthidear. Gen. Sibthorpiear. Benth.

Sibthorpia*) Linn. 1751. Amoen. acad. III. Ed. 1787. p. 21: g. Pentandr. Monogyn.
Linn. 1753. Sp. II. p. 631; 1759. Syst. ed. X. p. 1118. n. 693; 1763. Sp. ed. II. p. 880; 1764. Gen. ed. VI. p. 320. n. 770; 1767. Syst. ed. XII. p. 421: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 478; 1784. Syst. p. 572. — Reich. 1778. Gen. p. 321. n. 836 (*Sibthorbia*). — Schreb. 1791. Gen. II. p. 418. n. 1038. — Gmel. 1791. Syst. p. 953. — Pers. 1797. Syst. p. 609. — Willd. 1800. Sp. III. p. 340. n. 1177; 1809. En. p. 655.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 211: g. Personatar. Par. Scop. 1777. Intr. p. 178 (*Sibtorpia*). — Batsch 1802. Tab. p. 192. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 405; 1830. Gen. I. p. 149. n. 746. (anomal.) — Link 1822. En. II. p. 145. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 658.
Gled. 1764. Syst. p. 176. n. 718: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 268: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 261. t. 55. f. 6 (europaea).
Juss. 1789. Gen. p. 99: g. Pedicularium.
Neck. 1790. El. I. p. 386. n. 602: g. Plasyrgophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 298: g. Rhinanthoidear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 147. n. 1449.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 229: g. Rhinanthacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 471. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 309.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 390: g. Scrophularinar. (Injungitur Disandra L.)
Kunth 1823. Syn. II. p. 109: g. Rhinanthear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 80.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 815. n. 2204; 1827. Cur. post. p. 49: g. Scrofularinar.
Duvau 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 176: g. Veronicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3068; 1837. Hdb. p. 198. — Bartl. 1830. Ord. p. 171. — Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5. — Endl. 1839. Gen. n. 3975. p. 687; 1841. Ench. p. 340. Sect.: Sibthorpia, Disandra. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (218). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Walp. 1845. Rep. III. p. 333. 968. Sect. ut Endl.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Antirrhinear.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 114: g. Sibthorpiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 641.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4487: g. Sibthorpiear. — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 427. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 644.

Sibthorpia Linn. cont.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 600: g. Scrophulariacear.

Sibthorpiaceae D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 114: fam. Personatar. Gen.: Sibthorpia, Disandra, Romanzovia?, Capraria?, Scoparia?
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 641: ordo Corollaeflorar. Gen.: Sibthorpia, Disandra, Capraria, Xuarezia, Leucospora, Scoparia, Romanzoffia.

Sibthorpieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 115: subsect. Veronicear. Gen.: Scoparia, Geochorda, Sibthorpia, Disandra.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 424: trib. Rhinanthidear. Gen. §. 1: Amphianthus, Hydranthelium, Glossostigma, Tricholoma, Limosella, Sibthorpia, Hornemannia, Hemiphragma. §. 2: Capraria, Pogostoma, Camptoloma, Scoparia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459 (sph. *Stipthorpieae*). Gen. ead.

Sibtorpia Scopoli vid. *Sibthorpia Linn.*

Siburatia*) Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 38 in Römer Collect. bot. p. 204: nov. g. Ericar. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 80 (*Sibouratia*).
= Maesa Forsk.

Siceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 315: trib. Cucurbitacear. Gen.: Sicyos, Sechium, Gynostemma.

Sicelium P. Browne 1756. Jamaic. p. 144: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
= Coccocypseli Swartz pars.

Sicelium „P. Browne" Poir. 1817. Suppl. V. p. 146.
= Tontelea Aubl.

Sichlera Miers vid. *Sicklera Sendtn.*

Sickingia**) Willd. 1801. N. Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 445: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 234. n. 519. — Hedw. 1806. Gen. p. 120. n. 526. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXV. 355. n. 711. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 81.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 895: g. Convolvulear.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 387: g. Rubiacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 166. n. 837. — DC. 1830. Pr. IV. p. 621. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 664. — Endl. 1838. Gen. p. 566; 1841. Ench. p. 275. (vix not.) — Meisn. 1838. Comm. p. 112. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2989.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 622. n. 657: g. Bignoniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3256.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Cinchonear. — Par. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 280. (?)

---

*) Dicat. Dr. Humphrey Sibthorp, Oxon.

*) *Sibourat* nomen Madagascariense.
**) Dicat. comiti de Sickingen, Vindobon.

Sickingia Willd. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 186: g. Bignoniacear.
Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207): g. Eubignoniear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.

Sicklera Sendtn. 1846. Flora I. p. 194 (sphalm. 178): nov. g. Solanacear. Typus novus.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 616: g. Solanear.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179 (*Sichlera*): g. Witheringear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 501: g. Lycinear.

Sicklera Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 34. 49: nov. g. Clausenear. (Murraya longifolia Bl.)
Endl. 1850. Spl. V. p. 73. n. 5506: sect. Murrayae.

Sickleria Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. II.

Sickmannia*) Nees 1834. Linnaea IX. p. 292; 1835. X. p. 183: nov. g. Scirpear. (Schoenus radiatus Thunb.)
Endl. 1837. Gen. n. 991. p. 117; 1841. Ench. p. 64: g. Melancranidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1485.
Meisn. 1843. Comm. p. 313 Cypero L. injungit.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Melanocranidar.

Sickorea Corda 1829 in Opiz Beitr. p. 655 (ex Endl.): vid. *Syckorea*.

Sicydium**) Schlechtend. 1832. Linnaea VII. p. 388: nov. g. Cucurbitacear. (S. Schiedeanum.)
Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91): g. Cucurbitear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 183. — Arnott 1841. Hook. journ. bot. III. p. 274. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 267. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. p. 936; 1841. Ench. p. 491: g. Melothriear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3954. — Walp. 1846. Rep. V. p. 759. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 9. 29.

Sicyocarpus***) Bojer 1837. Hort. Maurit. = Marsdenia R. Brown.

Sicyocarya A. Gray 1853. Proc. Amer. Ac. III. p. ... : subg. Sicyos. (S. pachycarpus Hook. & Arn.) *Cf.* Flora 1855. p. 399.

Sicyoideae Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 407: trib. Cucurbitacear. Gen.: Sicyos. — Par. Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 279. Gen. id.
Endl. 1839. Gen. p. 940; 1841. Ench. p. 491: subordo Cucurbitacear. Gen.: Sicyos, Sechium; Erythropalum?, Zucca?, Allasia?, Thladiantha et 1841 Gynostemma. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 108) Pentaclathra, Mackaya? — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 18. 102. Gen.: Sicyos, Sechium.
Rchb. 1841. Nom. p. 101: subdiv. Cucurbitear. Gen.: Sicyos, Sechium.

*) Dicat. J. R. Sickmann, botanico Hamburg.
**) *σικύδιον*, cucurbita parva.
***) *σίκυος*, cucumis.

Sicyoides Tourn. 1700. Inst. p. 103. t. 28: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 40. Ed. Hall. 1745. p. 42 (*Sycioides*).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 36. (Sicyos angulata L.)
Mönch 1794. Meth. p. 513: g. Petalostemonis.
= Sicyos Linn.

Sicyopsis A. Gray 1853. Proc. Amer. Ac. III. p. ... : subg. Sicyos. (S. montanus Pöpp. & Endl.) *Cf.* Flora 1855. p. 400.

Sicyos*) Linn. 1737. Gen. p. 297. n. 739; 1737. Cliff. p. 452; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 291; 1753. Sp. II. p. 1013; 1759. Syst. ed. X. p. 1280. n. 971; 1763. Sp. ed. II. p. 1439; 1764. Gen. ed. VI. p. 509. n. 1094; 1767. Syst. ed. XII. p. 641: g. Monoec. Syngenes. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 727; 1784. Syst. p. 870. — Reich. 1778. Gen. p. 505. n. 1195. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 664. n. 1481. — Pers. 1797. Syst. p. 914. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 217.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 281. n. 1155: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 150. — Juss. 1789. Gen. p. 394. — Gis. 1792. Prael. p. 439. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 510. — Batsch 1802. Tab. p. 221. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 293. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 118. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 592; 1826. Syst. III. p. 47. n. 2366; 1831. Gen. II. p. 532. n. 2610. — Kunth 1822. Syn. I. p. 425. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 82. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. — Link 1829. Hdb. I. p. 639. — Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Endl. 1833. Norf. p. 67. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 541. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 117. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 142. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 72.
Adans. 1763. Fam. II. p. 138: g. Bryoniar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 143: g. Monopetalar.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 325: g. Syngenes. Monogam.
Neck. 1790. El. I. p. 242. n. 393: g. Sygolliphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 104: g. Triandr. Monogyn.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 45. t. 88.
Cram. 1803. Disp. p. 184: g. Monoec. Monadelph. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 625. n. 1743; 1809. En. p. 1000. — Pers. 1807. Ench. II. p. 595. n. 2163.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25; 1828 in DC. Pr. III. p. 309: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2747; 1831. Fl. exc. p. 294. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 33. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 229.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 407: g. Sicyoidear. — Par. Endl. 1839. Gen. n.

*) Nomen Tournefortianum contractum.

Sicyos Linn. cont.
5146. p. 940; 1841. Ench. p. 491. — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 280. — Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3940. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 18. 102. Sect.: Eusicyos, Badaroa. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 681.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 53. t. 172.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Sicear.
Synon. Sicyoides Tourn.; Bryonioides Dill.; Sycioides Hall.; Sycios Med.; Badaroa Bert.

Sicyosperma A. Gray 1853. Pl. Wright. II. p. 62: nov. g. Sicyoidear.

Sida*) Linn. 1737. Gen. p. 205. n. 556; 1737. Cliff. p. 346; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 198; 1753. Sp. II. p. 683; 1759. Syst. ed. X. p. 1145. n. 747; 1763. Sp. ed. II. p. 960; 1764. Gen. ed. VI. p. 352. n. 837; 1767. Syst. ed. XII. p. 457: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 517; 1784. Syst. p. 621. — Reich. 1778. Gen. p. 352. n. 902. — Lour. 1790. Coch. II. p. 413. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 463. n. 1129. — Gmel. 1791. Syst. p. 1041. — Pers. 1797. Syst. p. 659. — Willd. 1800. Sp. III. p. 734. n. 1286; 1809. En. p. 720. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 81. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 159. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 170.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 234. n. 965: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Malvar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 288. — Gis. 1792. Prael. p. 451.
Hill 1769. Ht. kew. p. 211: g. Pentapetalar.
Cavan. 1785. Diss. I. p. 6. Distinguuntur Anoda, Palaua et Triguera.
Juss. 1789. Gen. p. 273: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 185. — Batsch 1802. Tab. p. 19. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 61. — DC. 1805. Franç. IV. p. 836. — Pers. 1807. Ench. II. p. 242. n. 1624. — HRK. 1821. Nov. gen. V. p. 256. (Injungitur Napaea et separantur varia.) — Link 1822. En. II. p. 202; 1831. Hdb. II. p. 362. — Kunth 1824. Syn. III. p. 238. — DC. 1824. Pr. I. p. 459. Sect.: Malvinda, Abutiloides, Abutilon. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 109. n. 2447; 1831. Gen. II. p. 557. n. 2725. Sect.: Periptera, Nuttallia, Napaea, Abutilon, Cristaria, Anoda, Gaya, Bastardia. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 85. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 392. 417. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 490. Sect.: Malvinda, Abutiloides, Malacroidae. Disjungitur Abutilon. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 57. — Webb 1836. Canar. I. p. 35. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 231. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 159. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. — Miq. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 241; 1854. Pl. Jungh. III. p. 286. — A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV) p. 22. Sect.: Pseudo-Malvastrum, Malvinda, Pseudo-Napaea. Sejungitur Sidalcea. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 153.
Neck. 1790. El. II. p. 412. n. 1233: g. Omoplephytor.
Cram. 1803. Disp. p. 164 in Monadelph. Dodecandr. (S. periplocifolia) et p. 203 in Dioec. Monadelph.
Spreng. 1818. Anl. II. p. 801: g. Sidear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII; 1828. Consp. p. 202. n. 5248; 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. n. 7633. Sect.: Napaea, Sida et 1841 Periptera. — Meisn. 1837. Gen. p. 27 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5289. p. 985; 1841. Ench. p. 512 (sensu Kunthiano). — Walp. 1842. Rep. I. p. 313; 1843. II. p. 792; 1846. V. p. 93. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 596. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 310.
A. Juss. 1825 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 173: g. Malvear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 397.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Sidacear.
A. Gray 1852. Pl. Wright. p. 20. Nova sect.: Physalodes.
Synon. Napaea Linn.; Stevartia Forsk.; Malvinda Med.; Lamarkia Med.; Periptera DC.; Dictyocarpus Wight.

Sida Medic. 1787. Malv. p. 20: g. Malvar. restrict. Segregantur Anoda, Cavanillea, Malvinda, Wissadula, Napaea, Abutilon. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 238.
Mönch 1794. Meth. p. 618: g. Petalostemonum. Distinguuntur Malvinda, Modiola, Abutilon, Anoda.
= Laguna Cavan.

Sidaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Malvacear. Gen.: Palavia, Cristaria, Anoda, Sida, Lagunea, Abutilon.

Sidalcea A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV.) p. 18: nov. g. Malvacear., a Sida L. disjunctum. *Cf.* A. Gray 1849. Gen. bor. am. II. p. 44 et Flora 1850. p. 694.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 150: g. Sidear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 309.

Sidariae Rchb. 1837. Handb. p. 287: sect. Sidear. Subsect.: Anodieae, Bastardieae, Abutileae.

Sideae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 801: div. Malvacear. Gen.: Sida; Palava; Lagunaea, Cristaria, Stewartia, Gordonia, Bombax, Adansonia, Thea, Camellia; Carolinea, Cavanillesia. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII. Gen.: Urena, Cristaria, Anoda, Periptera, Sida, Ingenhoussia; Malva, Althaea, Lavatera, Malachra, Pavonia, Levretonia, Achania.
Rchb. 1828. Consp. p. 202 (1832. Fl. exc. p. 771): subdiv. Malvear. Gen.: Gyrostemon; Cristaria, Anoda, Sida, Gaya, Bastardia, Abutilon, Periptera. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 287. Sect.: *genuinae* (gen.:

*) Nomen ex Theophrasto.

Sideae Spreng. cont.
Sida, Gaya, Periptera), Malachreae, Sidariae. — Rchb. 1841. Nom. p. 200. Gen.: Anoda, Cristaria, Nuttalia, Sida, Gaya, Bastardia, Bogenhardia, Abutilon.
Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23): trib. Malvacear. Gen: Lagunea, Bastardia, Abutilon, Cristaria, Anoda, Periptera, Sida, Gaya, Malachra, Nuttallia; Ingenhouzia?, Serraea? — Par. Endl. 1840. Gen. p. 984; 1841. Ench. p. 512. Gen. ead. et Wissadula et (1841) Lawrencia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 614. Gen. ead. et Hoheria, Plagianthus.

Sideranthus „Fras." Nees 1841 in Neuwied Reise Nord-Amer. II. p. 440: g. Synantherear.
= Blepharodon DC.? (Pr. V. p. 347.)

Sideranthus*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 301: subg. Dieteriae.
Endl. 1842. Spl. II. p. 39. n. $2365/_1$ *b:* sect. Dieteriae.

Sideritideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Melittidear. Gen.: Hesiodia, Sideritis.

Sideritis**) Tourn. 1700. Inst. p. 191. t. 90: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 225. Ed. Hall. 1745. p. 231: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 171. n. 475; 1737. Cliff. p. 313; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 169; 1753. Sp. II. p. 574; 1759. Syst. ed. X. p. 1098. n. 632; 1763. Sp. ed. II. p. 801; 1764. Gen. ed. VI. p. 290. n. 712; 1767. Syst. ed. XII. p. 391: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 413. — Murr. 1774. Syst. p. 443; 1784. Syst. p. 531. — Reich. 1778. Gen. p. 294. n. 770. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 387. n. 966. — Gmel. 1791. Syst. p. 901. — Pers. 1797. Syst. p. 568. — Willd. 1800. Sp. III. p. 63. n. 1100; 1809. En. p. 605.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 647: g. Gymnotetraspermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 183. n. 755: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 390. Sejunguntur Marrubiastrum, Hesiodia et Burgsdorfia.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 163. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 187. — Juss. 1789. Gen. p. 113. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 336. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 260. — DC. 1805. Franç. III. p. 529; 1815. V. p. 399. Sect.: Burgsdorfia, Hesiodia, Sideritis. — Pers. 1807. Ench. II. p. 116. n. 1380. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 306. — Lois. 1818. Dict. v. 11. p. 351 (*Crapaudine*). — Link 1822. En. II. p. 104; 1829. Hdb. I. p. 465. — Kunth 1823. Syn. II. p. 84. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 713. n. 2080; 1831. Gen. II. p. 470. n. 2316. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 396. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 597.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 248: g. Gymnospermar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 251: g. Monopetalar. irregular.
Allion. 1773. Misc. Taur. V. p. 59 (*Syderitis*): g. Tetrastemonum gymnotetraspermar.
Neck. 1790. El. I. p. 317. n. 498: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 435: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2857; 1831. Fl. exc. p. 326. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Sideritidear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 2. 27: g. Bilabiatar.
Benth. 1834. Labiat. p. 570: g. Stachydear. Sect.: Marrubiastrum, Empedoclea, Eusideritis, Hesiodia. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 836. Sect. eaed. — Koch 1837. Syn. p. 570. Ed. II. p. 655. Sect.: Eusideritis, Hesiodia. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. (restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 450. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 143. Sect.: Empedoclea, Hesiodia. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 697.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 105. n. 4092: g. Marrubiear. (genuinar.) Sect.: Sideritis, Empedoclea, Marrubiastrum. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3655. p. 627; 1841. Ench. p. 308. Sect. ut Benth. — Meisn. 1840. Gen. p. 288 (196). — Walp. 1845. Rep. III. p. 847. 988. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 436. Sect. ut antea. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 694. Sect. ut Griseb. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 400. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Marrubidar.
Synon. Marrubiastrum Tourn.; Sphacelus Riv., Rupp.?; Leria Adans.; Fracastoria Adans.; Hesiodia et Empedoclea Mönch; Empedoclia Rafin.

Siderodendron Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 10. 185. n. 462: g. Rubiacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 410. n. 403; 1830. Gen. I. p. 91. n. 449. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae.
Schult. 1827. Mant. III. p. 9. 129: g. Tetrandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2007: g. Coffeacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 436.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Pavettear.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2821.
DC. 1830. Pr. IV. p. 478: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 565. —

*) σιδήρος, ferrum.
**) Nomen ex Plinio.

Siderodendron Röm. & Schult. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3171. p. 536; 1841. Ench. p. 272. — Walp. 1843. Rep. II. p. 484.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
= Siderodendrum Schreb.

Siderodendrum Schreb. 1789. Gen. I. p. 71. n. 169: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 242. — Willd. 1797. Sp. I. p. 612. n. 197. — Pers. 1805. Ench. I. p. 131. n. 254.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 432: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 61. 372. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 374. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 97.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 183: g. Coffeacear.
Synon. Sideroxyloides Jacq.; Siderodendron Röm. & Schult.

Siderophyllum Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 138: sect. Davyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 789.

Sideroxyloides Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 19. t. 175. f. 9: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Sideroxylum americanum Pluk.)
= Siderodendrum Schreb.

Sideroxylon*) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 69; 1753. Sp. I. p. 192; 1759. Syst. ed. X. p. 937. n. 234; 1762. Sp. ed. II. p. 278; 1767. Syst. ed. XII. p. 178. n. 263: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 193; 1784. Syst. p. 232. — Reich. 1778. Gen. p. 108. n. 283. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 141. n. 357. — Lour. 1790. Coch. I. p. 122. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 91. — Gmel. 1791. Syst. p. 396. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 28. t. 28; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 347; ed. 1832. I. p. 602. — Pers. 1797. Syst. p. 242. n. 264; 1805. Ench. I. p. 236. n. 528. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1089. n. 403. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 622.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.
Gled. 1764. Syst. p. 215. n. 902: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 154: g. Monocarpiar.
Neck. 1790. El. I. p. 266. n. 426: g. Campylophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
Cram. 1803. Disp. p. 104 (*Syderoxylon*): in Decandr. Monogyn.
Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 393. t. 5. f. 1 (spinosum).
Hedw. 1806. Gen. p. 114. n. 506: g. Sapotear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 499; 1825. Syst. I. p. 665. n. 721; 1830. Gen. I. p. 129. n. 644. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLV. 500. n. 793. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 675. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 99. — Bartl. 1830. Ord. p. 162. — Meisn. 1839. Gen. p. 251 (160). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 384. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 73.

*) σιδήρος, ferrum; ξύλον, lignum.

Sideroxylon Linn. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3638; 1841. Nom. p. 137. n. 5298: g. Mimusopear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Sapotacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 28. — Endl. 1839. Gen. n. 4235. p. 739; 1841. Ench. p. 361. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 177. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 455. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1036.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: g. Chrysophyllear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 71. t. 282.
Synon. Sideroxylum Linn.; Robertia Scop.

Sideroxylon Burm. 1737. Pl. cap. p. 235. t. 82. („*Hassagay Boom*" Colon.)
= Curtisia Ait.

Sideroxylum Linn. 1737. Gen. p. 58. n. 167; 1740. Syst. p. 19; 1764. Gen. ed. VI. p. 104. n. 264: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 55.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Veprecular.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sapotar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 151.
Adans. 1763. Fam. II. p. 171: g. Apocynor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 435: g. Hilospermar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 342: g. Sapotear. — Par. Link 1821. En. I. p. 195.
Willd. 1809. Berl. Mag. III. p. 51.
= Sideroxylon Linn.

Siebera*) Gay 1827. Mém. soc. h. n. Par. III. p. 343.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 125: g. Xeranthemear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 531. — Endl. 1838. Gen. n. 2852. p. 468; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9. — Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 323. (An Xeranthemi subgen.?) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Synon. Fleurotia Rchb.

Siebera Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3774: g. Hydrocotylear. (*Fischera* et *Trachymene Spreng.*, non Rudge.)
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar. desciscens.
= Azorella Lam.

Siebera Schrad. mss. in Sieb. Herb. Alp.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 783: g. Stellarinar.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205: g. Alsinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7764: g. Cherleriear.
= Alsines sect. Aretioideae Fenzl.

Siebera Presl 1828 in Oken Isis XXI. p. 275: nov. g. pro Dioscorea sativa Sieb. (non Linn.) indicatum. (S. baselloides.) *Cf. Beriesa Steud.*
= Anredera Juss.

*) Dicat. F. W. Sieber, peregrinatori.

Sieberia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 282: g. Ceropagar. (Orchis bifolia, nigra, viridis, albida, etc.) — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 126.
= Gymnadenia R. Brown, etc.

Sieboldia*) Hoffmannsegg 1842. Nachtr. Verz. p. 28 (ex Linnaea XVI. Litt. p. 281): nov. g. ex typo Clematidis floridae.

Siegesbeckia „Gron. virg. 128" ex DC. Prodr. V. p. 616 et Endl. Gen. p. 415 ad Verbesinae sect. Verbesinariam citata. (An in ed. II. 1762? In Gronov. Fl. virg. 1743 neque in parte prima, neque in altera nomen Siegesbeckiae s. Sigesbeckiae reperitur!)

Siegesbeckia Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. V. 1751. p. 131: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 583.
Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 59 (*Siegesbekia*): g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 568; 1826. Syst. III. p. 591. n. 2820; 1831. Gen. II. p. 636. n. 3176 (*Siegesbekia*).
Lour. 1790. Coch. II. p. 504: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2219. n. 1527; 1809. En. p. 917. — MBieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 339. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 170. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 439.
Batsch 1802. Tab. p. 253: g. Corymbiferar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 283: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 506. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 915. — Bartl. 1830. Ord. p. 411.
Link 1822. En. II. p. 349: g. Oppositifoliar.
Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2723: g. Milleriear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 153: g. Ecliptar.
Less. 1832. Syn. p. 211: g. Siegesbeckiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 495: g. Ecliptear. Sect.: Pentameranthes, Trimeranthes. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2451. p. 397; 1841. Ench. p. 237. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3101. Sect.: Trimeranthes, Siegesbeckia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 43. — Walp. 1843. Rep. II. p. 603; 1847. VI. p. 145. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 512. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 66.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 45. t. 256.
Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 243: g. Verbesinear.
= Sigesbeckia Linn.

Siegesbeckieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 211: div. Ecliptear. Gen.: Cryphiospermum, Sabazia, Siegesbeckia.

Siegesbekia Allion., Spreng. vid. *Siegesbeckia Gled.*

Sieglingia**) Bernhardi 1799. Erfurt. p. 44. Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1017 *b*: sect. Triodiae.

*) Dicat. Phil. Frid. de Siebold.
**) Dicat. Siegling, prof. Erford.

Sieglingia Bernhardi cont.
Endl. 1837. Gen. n. 871 *a*. p. 97; 1841. Ench. p. 59: sect. Danthoniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1222. 1.
Synon. Triodia Palis.; Danthonia Kunth; Triodon G. F. W. Meyer.

Siemssenia Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 467: nov. g. Helichrysear. (S. capillaris.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 236.

Siepasma Rchb. Nomencl. p. 195: vid. *Scepasma Blume.*

Sieversia*) Willd. 1811. Berl. Mag. V. p. 397: nov. g. Icosandr. Polygyn. (Dryas anemonoides Pall.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 864; 1825. Syst. II. p. 543. n. 1866: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4443; 1832. Fl. exc. p. 599.
R. Brown 1824. Suppl. App. of Parry's voy. p. CCLXXVI (Verm. bot. Schr. I. p. 392): g. Rosacear. emend. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 417. n. 2079. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 192.
Cham. & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 4.
Bartl. 1830. Ord. p. 402: g. Dryadear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 527. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 176. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6502. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 423: sect. Gei. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 96.
Endl. 1840. Gen. n. 6384. p. 1246; 1841. Ench. p. 659: g. Eudryadear. — Par. Ledeb. 1844. Ross. II. p. 24. — Walp. 1846. Rep. V. p. 656.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.
Synon. Adamsia Fisch.; Buchavea Rchb.; Oreogeum Seringe.

Sigesbeckia**) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 412; 1737. Gen. p. 352. n. 882; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 267; 1753. Sp. II. p. 900; 1759. Syst. ed. X. p. 1225. n. 873; 1763. Sp. ed. II. p. 1269; 1764. Gen. ed. VI. p. 436. n. 973; 1767. Syst. ed. XII. p. 567: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 648; 1784. Syst. p. 779. — Reich. 1778. Gen. p. 433. n. 1057. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 571. n. 1320. — Gmel. 1791. Syst. p. 1255. — Pers. 1797. Syst. p. 820; 1807. Ench. II. p. 471. n. 1898.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 187. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 523. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 412.
Adans. 1763. Fam. II. p. 130: g. Bidentum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.

*) Dicat. Sievers, Petropolitano.
**) Dicat. Joh. Georgio Siegesbeck, in horto medico Petropolitano botanices professor.

Sigesbeckia Linn. cont.
Gled. 1764. Syst. p. 255. n. 1058 (*Sigesbekia*): g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 7: g. Radiatar. (et p. 81 in Aggregatis.) — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 424. t. 168. f. 11.
Scop. 1777. Intr. p. 135: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. 1. p. 40. n. 78: g. Actinophytor. Sejungitur Locheria.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18; 1827. v. 49. p. 114: g. Milleriear. Subgen. (1827): Sigesbeckia, Trimeranthes. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31 (*Sigisbeckia*).
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 237; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear. (restrict.)
Synon. Siegesbeckia Gled.; Siegesbekia All.

Sigesbeckieae Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 235; 1830. v. 60. p. 577: subdiv. Milleriear. Gen.: Villanova, Madia, Biotia, Sclerocarpus, Enydra, Brotera, Flaveria, Monactis?, Eriocarpha; Ogiera, Trimeranthes, Sigesbeckia, Jägeria, Guizotia, Zaluzania, Hybridella.

Sigesbekia Gled. vid. *Sigesbeckia Linn.*

Sigillaria Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 102. 261: novum nomen propositum pro *Smilacina Desf.*

Sigillaria Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 222: g. Vegetabilium foss. class. II.
Brongn. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 25; 1828. Dict. v. 57. p. 71: g. foss. Filicum, complectens Rhytidolepidem, Alveolariam, Syringodendron, Catenariam et Lepidodendri sp. Sternb.
Brongn. 1839. Arch. Mus. I. p. 405. t. 25—28 (S. elegans). Structura interna comparata cum Lepidodendro, Stigmaria, etc.
Unger 1842 in Endl. Spl. II. p. 6. n. 703/$_1$; 1845. Syn. pl. foss. p. 118; 1846. Chlor. prot. p. LIV: g. Sigillariear. — Par. Corda 1845. Fl. Vorw. p. 24. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 105.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 602: g. Cycadeis aff.
Synon. Euphorbites Artis.

Sigillarieae Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 6: ordo Selaginum. Gen.: Sigillaria. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 118; 1846. Chlor. prot. p. LIV. Gen.: Sigillaria, Syringodendron, Diploxylon.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 23: fam. plant. foss. Gen.: Sigillaria, Rhytidofloyos, Myelopithys, Stigmaria.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 104: fam. Dicotyledonum gymnospermor. Gen. ut Unger et Stigmaria, Myelopithys, Ancistrophyllum, Didymophyllon.

Sigisbeckia Dumort. vid. *Sigesbeckia Linn.*

Sigmatella Kütz. 1833. Alg. aq. dulc. Germ. dec. I: nov. g. Algar. (Bacillaria sigmoides Nitzsch.) *Cf.* Flora 1833. II. p. 693.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 554: subg. Frustuliae.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 18. n. 11: g. Fragilariear.
Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: g. Synedrear.

Sigmatella Kütz. cont.
Math. 1853. Belg. II. p. 545: g. Fragilariear.
Synon. Nitzschia Hass. *Cf. Sigmella Endl.*

Sigmatella C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 263: subsect. Omaliae. (*Synon. Helicodontium Schw.*)

Sigmatophyllum Dietr. vid. *Stigmaphyllon A. Juss.*

Sigmatostalix Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 769: nov. g. Orchidear., tribus incertae. (Specklinia graminea Pöpp.)
Rchb. f. 1854. Xen. Orchid. p. 19: g. Rodrigueziae aff. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 858.

Sigmella „Kütz." Endl. Gen. p. 2 (genus animalibus adnumerandum): vid. *Sigmatella Kütz.*

Sigmodostyles*) Meisn. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 93: nov. g. Phaseolear. (S. villosa.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 836.
Walp. 1846. Rep. V. p. 540: g. Rhynchosiear.
Synon. Walpersia Krauss.

Silans Link sphalm. pro *Silaus.*

Silaum Magnol. 1720. Char. plant. lib. 1. sect. 2. (Linn. 1747. Cl. plant. p. 391.)
= seq.

Silaus Besser 1820 in (Röm. &) Schult. Syst. VI. p. XXXVI adnot.: nov. g. ex typis Peucedani Silai et alpestris.
„Plin." Gray 1821. Brit. pl. II. p. 523: g. Umbelliferar. (Peucedanum Silaus L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 105; 1836. Syn. p. 298. Ed. II. p. 328: g. Selinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3709; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5437. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 322; 1845. Ross. II. p. 287. — DC. 1830. Pr. IV. p. 161. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 319. — Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Kunth 1838. Berol. I. p. 273. — Endl. 1839. Gen. n. 4444. p. 776; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 7. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 961. — Brongn. 1843. En. genr. p. 112. — Walp. 1846. Rep. V. p. 869. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 701. — Math. 1853. Belg. I. p. 226. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 72.
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 379: g. Seselinar. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 471.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 20. 391: g. Umbellatar.
Link 1829. Hdb. I. p. 238 (*Silans*): g. Amminear.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 357: g. Seselear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 361: g. Pleurospermar. Sect.: Gasparrinia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 773: g. Seselinidar.
Synon. Silaum Magnol.; Chryseum DC.; Gasparrinia Bertol.

---

*) σιγμώδης, falciformis.

Silenaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 124.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 35: fam. Columniflorar. Divis.: Lychnideae, Diantheae.

Silenales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 21: nixus Syncarpar. Ord.: Portulaceae, Sileneae, Alsineae, Tamariscineae, Illecebreae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 495: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Caryophyllaceae, Illecebraceae, Portulacaceae, Polygonaceae.

Silenanthe Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5246 *b*. p. 972; 1841. Ench. p. 506: sect. Saponariae. Subsect.: Heliosperma, Nanosilene, Elisanthe.
= Heliosperma Rchb.

Silene*) Linn. 1737. Gen. p. 132. n. 372; 1737. Cliff. p. 171; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 110; 1753. Sp. I. p. 416; 1759. Syst. ed. X. p. 1031. n. 503; 1762. Sp. ed. II. p. 594; 1764. Gen. ed. VI. p. 226. n. 567; 1767. Syst. ed. XII. p. 309. n. 562: g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 350; 1784. Syst. p. 420. — Reich. 1778. Gen. p. 231. n. 616. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 307. n. 772. — Gmel. 1791. Syst. p. 713. — Pers. 1797. Syst. p. 450. — Willd. 1799. Sp. II. p. 691. n. 895; 1809. En. p. 472. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 288. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 446.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 375: g. Dicotyledonum Diplostemonum. (restrict.)
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 95. n. 393: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 302. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 246. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 117. — Pers. 1805. Ench. I. p. 496. n. 1118. — DC. 1805. Franç. IV. p. 746; 1815. V. p. 604. — Hedw. 1806. Gen. p. 330. n. 1302. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 831 (genuin.); 1825. Syst. II. p. 404. n. 1715; 1830. Gen. I. p. 379. n. 1910. — Link 1821. En. I. p. 425. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 646. (verar). — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 272. — D. Don 1825. Nepal. p. 216. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 122. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 62. 163. — Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5363. Sect.: Ocymastrum, Viscago, Otites. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 162. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 138. Sect.: Behen, Silene. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1565.
Adans. 1763. Fam. II. p. 254: g. Alsinium.
Hill 1769. Ht. kew. p. 195: g. Pentapetalar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 306: sect. Lychnidis.
Neck. 1790. El. II. p. 165. n. 869: g. Catotaphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 705: g. Allagostemon.

*) Nomen antiquum Theophrasti (Linn.), negante B[illegible].

Silene Linn. cont.
Otth 1824 in DC. Pr. I. p. 367: g. Silenear. Sect.: Nanosilene, Behenantha, Otites, Conoimorpha, Stachymorpha, Rupifraga, Siphonomorpha, Atocion. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 148. Sect.: Behenantha, Stachymorpha, Stachyphylla, Siphonomorpha, Atocion. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1832. Fl. exc. p. 812 (sect.; Corone, Conoimorpha, Atocion, Heliosperma, Silene, Pumilio, Viscago); 1837. Hdb. p. 298. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 307; 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 245. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 398. Sect. ut Otth. — Link 1831. Hdb. II. p. 240. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 178. — Koch 1836. Syn. p. 100. Ed. II. p. 109. Sect.: Viscago, Otites, Atocion. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Kunth 1838. Berol. I. p. 111. (genuinar.) — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 189. Sect. ut Otth. — Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7828. Sect.: Stachyomorpha, Conoimorpha, Atocion, Rupifraga, Silene, Otites, Viscago. — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 123. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 103. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 167. Sect.: Atocion, Behen, Conoimorpha, Siphonomorpha, Stachyomorpha, Linicola, Rupifraga. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 604.
Webb 1836. Canar. I. p. 135: g. Caryophyllacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5248. p. 973; 1841. Ench. p. 506: g. Lychnidear. Sect. ut Otth (excepta Nanosilene). — Par. Fenzl 1842 in Endl. Spl. II. p. 77. Sect.: Nanosilene, Behenantha, Otites, Coniomorpha, Elisanthe, Stachymorpha, Rupifraga, Heliosperma, Siphonomorpha, Atocion. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 303. Sect. eaed. — Walp. 1842. Rep. I. p. 272; 1843. II. p. 776; 1846. V. p. 81. — A. Braun 1843. Flora p. 373. Sect.: Eudyanthe, Silene. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 35. Sect.: Behen, Otites, Viscago, Atocion. — Willk ..... Ic. pl. hisp. p. 74. Subgen.: Physalocalyx, Conocalyx, Eusilene. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 202. Sect.: Behen, Conoimorpha, Eusilene, Lychnioides. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 277. Subgen. ut Willk.
Synon. Muscipula Rupp.; Viscago Dill.; Kaleria et Oberna Adans.; Acubalus Neck.?

Sileneae DC. 1824. Prodr. I. p. 351: trib. Caryophyllear. Gen.: Gypsophila, Banffya, Dianthus, Saponaria, Cucubalus, Silene, Lychnis, Velezia, Drypis. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 381. Gen. ead. et Viscaria, Agrostemma, Githago, Viviania. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (20). Gen. ut DC. et Tunica, Acanthophyllum, Heterochroa. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 200. Gen. Endlicheriana.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 160: fam. Caryophyllinar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV: div. Caryophyllear. Gen. ut DC. et Agrostemma. —

Sileneae DC. cont.
Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 105. Subdivis.: Diantheae, *genuinae* (gen.: Gypsophila, Saponaria, Silene, Lychnis).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: trib. Stellariacear. Gen. ut Rchb. 1827 (exceptis Diantho et Banffya).
Bartl. 1830. Ord. p. 305: ordo (176) Caryophyllinar. Gen.: Brachystemma?, Drypis, Velezia, Dianthus, Gypsophila, Saponaria, Cucubalus, Silene, Lychnis, Agrostemma.
Link 1831. Hdb. II. p. 234: sect. Caryophyllear. Gen.: Gypsophila, Petrorhagia, Banffya, Dianthus, Saponaria, Vaccaria, Silene, Behen, Lychnanthus, Cucubalus, Lychnis, Agrostemma, Githago, Velezia, Drypis.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 800: div. Caryophyllacear. Gen.: Saponaria, Gypsophila, Velezia, Dianthus, Drypis, Silene, Lychnis, Agrostemma.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo Silenalium.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 145: fam. (71) Caryophyllinear. Gen.: Dianthus, Tunica, Velezia, Saponaria, Lychnis, Lychnanthus, Cucubalus, Silene, Gypsophila, Banfya, Heterochroa, Drypis. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 103. Gen.: Drypis, Velezia, Dianthus, Tunica, Gypsophila, Saponaria, Vaccaria, Silene, Cucubalus, Viscaria, Lychnis.
Koch 1836. Syn. p. 92. Ed. II. p. 101: ordo Thalamiflorar. Gen.: Gypsophila, Tunica, Dianthus, Saponaria, Cucubalus, Silene, Lychnis. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 200. Trib. ut Braun.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 206: sect. Dianthear. Gen.: Silene, Cucubalus, et 1841 Heliosperma, Nanosilene, Elisanthe.
Endl. 1840. Gen. p. 970; 1841. Ench. p. 505: subordo Caryophyllear. Trib.: Diantheae, Lychnideae, Drypideae.
Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 121. Gen.: Cucubalus, Agrostemma, Coronaria, Lychnis, Viscaria, Melandrium, Silene, Vaccaria, Saponaria, Gypsophila, Tunica, Dianthus, Velezia.
Braun 1843. Flora p. 349. 365. Trib.: Lychnideae, Diantheae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498: subordo Caryophyllacear. Gen. Silenear. Endl. et Tunica, Heliosperma, Melandrium, Eudianthe, Ankyropetalum, Coronaria, Agrostemma, Übelinia, Petrocoptis.

Silenophyllum Griseb. 1839. Gen. et spec. Gentian. p. 99: sect. Chironiae. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 9.
= Hippochiron Endl.

Silenopsis Willkomm 1847. Bot. Zeit. p. 237: nov. g. Silenear. (S. Lagascae.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 92: g. Lychnidear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 56. n. $5245/_1$.

Siler „Moris." Crantz 1767. Class. Umbell. p. 68; 1769. Stirp. Austr. p. 185: g. Umbelliferar. (S. montanum, trilobum et Chironium.) — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 217. (emend. — Laserpitium trilobum L.) — Link 1821. En. I. p. 277. — Lag. 1821.

Siler Crantz cont.
Amen. nat. II. p. 101. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 92. t. 22. f. 1 (aquilegifolium).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 635; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXVIII. 449; 1825. Syst. I. p. 893. n. 1055; 1830. Gen. I. p. 223. n. 1156: g. Smyrniear.
MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 221: g. Pentandr. Digyn.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 84; 1836. Syn. p. 309. Ed. II. p. 340: g. Silerinear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 365. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35 (*Silex*). — DC. 1830. Pr. IV. p. 200. — Tausch 1834. Flora I. p. 348. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 347. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (106). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 974. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 333. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 683.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3689: g. Thapsiear.
Link 1829. Hdb. I. p. 341: g. Silerinar. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 452; 1841. Nom. p. 142. n. 5491. — Endl. 1839. Gen. n. 4485. p. 783; 1841. Ench. p. 379.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 380: g. Pterygospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Sileridar.
Synon. Bradlaeia Neck.; Bradleia Wittst.; Laser Borckh.

Siler Mönch 1794. Meth. p. 85: g. Thalamostemonis.
= Laserpitium Tourn.

Sileraceae Presl 1822. Delic. Prag. I. p....: div. Umbelliferar. Gen.: Smyrnium, Physospermum.

Sileridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: trib. Apiacear. Gen. Silerinar. Endl.

Silerinae Link 1829. Handb. I. p. 340: subordo Umbellatar. Gen.: Laserpitium, Siler, Coriandrum.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 452: sect. Platyspermar. Gen.: Siler. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 142. Gen. ut Endl.
Endl. 1839. Gen. p. 783; 1841. Ench. p. 379: trib. Orthospermar. Gen.: Agasyllis, Siler, Galbanum, Ormosolenia.

Silerineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 84: trib. Umbelliferar. Gen.: Siler.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: trib. Homalospermar. Gen.: Silex, Agasyllis, Krubera.
DC. 1830. Pr. IV. p. 199: trib. Orthospermar. Gen.: Krubera, Agasyllis, Siler. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 347. Gen. ead. et Pachypleurum, Stenocoelium, Galbanum. — Koch 1836. Syn. p. 309. Ed. II. p. 340. Gen.: Siler. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (106). Gen.: Agasyllis, Siler, Galbanum. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 96. Gen. ead. et Ormosolenia.

Silerineae Koch cont.
Tausch 1834. Flora I. p. 348: subtrib. Diclidospermar. Gen.: Siler, Agasyllis, Ormosolenia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 220: subdiv. Platyspermar. Gen. Candolleana et Galbanum.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: sect. Diclidospermear. Gen.: Siler, Agasyllis, Galbanum, Ormoselinum.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 112: trib. Orthospermear. Gen.: Krubera, Siler.

Silex Dumort. vid. *Siler Moris.*

Siliculosa Linn. 1737, etc., sequentibus multis: ordo prior Tetradynamiae.

Siliculosae Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 5: ordo Antiscorbuticar. Gen.: Isatis, Bohadschia, Myagrum, Anastatica, Lepidium, Draba, Nasturtium, Alysson, Lunaria, Camelina; Cochlearia, Clypeola, Iberis, Thlaspi.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[10]: pars familiae tertiae ordinis secundi tribus quartae Tetrapetalar. Gen.: Myagrum, Vella, Draba, Lunaria, Subularia, Anastatica, Lepidium, Thlaspi, Cochlearia, Iberis, Alyssum, Peltaria, Clypeola, Biscutella, Bunias, Crambe, Isatis, Heliophila, Dentaria.
Scop. 1777. Intr. p. 318: gens Antiscorbuticar. Gen.: Lunaria, Bohatschia, Fosselinia, Biscutella, Farsetia, Clypeola, Thlaspi, Nasturtium, Subularia, Anastatica, Bunias, Laelia, Alyssum, Vella, Cochlearia, Lepidium, Isatis, Crambe, Zilla.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 474: div. Cruciformium. Gen.: Vella, Subularia, Myagrum, Rapistrum, Cakile, Bunias, Pugionium, Crambe, Peltaria, Mönchia, Draba, Lunaria; Biscutella, Anastatica, Coronopus, Cochlearia, Clypeola, Isatis, Lepidium, Thlaspi, Nasturtium, Alyssum, Iberis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 717: ordo Cruciferar. Gen.: Farsetia, Lunaria, Draba, Camelina, Vesicaria, Subularia, Cochlearia, Thlaspi, Aethionema; Alyssum, Teesdalia, Lepidium, Iberis, Petrocallis, Anastatica, Vella, Succovia; Isatis, Clypeola, Peltaria, Biscutella, Pugionium, Coronopus, Myagrum, Bunias, Rapistrum, Euclidium, Cakile, Crambe.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 333: div. Siliquosar. Gen.: Cardiolepis, Iberis, Lepidium, etc.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 846; 1831. Gen. II. p. 515: div. Cruciferar. Gen.: Lunaria, Ricotia, Alyssum, Petrocallis, Hutchinsia, Iberis, Teesdalia, Menonvillea, Anastatica; Lepidium, Bivonaea, Aethionema; Vella; Subularia; Farsetia, Savignia, Aubrietia, Myopteron, Vesicaria, Draba, Cochlearia, Thlaspi; Oreas, Stenopetalum, Camelina, Eutrema, Morisia; Psychine. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI. Subdivis.: Anastaticeae, Velleae, Isatideae; Thlaspidieae, Lepidieae, Psychineae, Brachycarpaeae; Subularieae, Camelineae, Alyssineae. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. Gen.: Anastatica, Morettia, Brachycarpaea, Psychine, Schouwia, Aethionema, Eunomia, Bivonaea, Lepidium, Senebiera, Menonvillea, Cremolobus, Megacarpaea, Biscutella, Iberis, Teesdalia, Hutchinsia, Capsella, Thlaspi, Succowia, Carrichtera, Boleum, Vella, Neslia, Kernera, Eudema, Camelina, Stenopetalum, Cochlearia, Erophila, Draba, Petrocallis, Peltaria, Clypeola, Alyssum, Koniga, Schivereckia, Vesicaria, Aubrietia, Berteroa, Farsetia, Ricotia, Lunaria, Selenia; Discovium.
Rchb. 1828. Consp. p. 182 (1832. Fl. exc. p. 657): subdiv. Septatar. Sect.: Anastaticeae, Isatideae, Velleae; Thlaspideae, Lepidieae, Psychineae; Alyssineae, Camelineae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: series Cruciferar. Trib.: Lunarieae, Biscutelleae.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. 455: trib. Cruciferar. Gen.: Selenocarpaea, Selenia, Lunaria, Ricotia, Farsetia, Berteroa, Aubrietia, Schivereckia, Cistocarpium, Vesicaria, Alyssum, Psilonema, Koniga, Petrocalis, Mathewsia, Draba, Erophila, Eudema, Subularia, Cochlearia, Kernera, Roripa, Tetrapoma, Armoracia, Camelina, Stenopetalum, Morettia, Anastatica, Vella, Boleum, Carrichtera, Succowia, Psychine, Schouwia, Brachycarpaea, Capsella, Hutchinsia, Cardaria, Lepidium, Lepidinella, Lepia, Thlaspidium, Aethionema, Eunomia, Bivonaea, Thlaspi, Pterolobium, Teesdalia, Iberis, Biscutella, Jondraba, Cremolobus, Menonvillea, Hexaptera.

Siligo „Duby" Mathieu 1853. Fl. Belg. I. p. 630: sect. Tritici.
= Triticum Palis.

Siliqua Tourn. 1700. Inst. p. 578. t. 344: g. pl. class. XVIII.
= Ceratonia Linn.

Siliquaria Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 71: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 566.
Scop. 1777. Intr. p. 313: g. Anomalar.
DC. 1824. Pr. I. p. 239: sect. Cleomes. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4861 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 273. — Endl. 1839. Gen. n. 4985 *b.* p. 890; 1841. Ench. p. 456.
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. App. p. 222 (Verm. bot. Schr. IV. p. 29): subg. Cleomes.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 306: g. Cleomear.
Synon. Roridula Forsk.; Rorida Röm. & Schult.

Siliquaria Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 54. 67: g. Fucor. (S. rostrata, siliculosa.)
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 320. 394: g. Fucoidear. (Fucus siliquosus L.)
Lamx. 1825. Dict. class. VI. p. 71.
Bory 1827. Dict. class. XV. p. 340.
= Halidrys Lyngb.

Siliquastrae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: series Cruciferar. Trib.: Raphanistreae, Buniadeae, Isatideae.

Siliquastrum Tourn. 1700. Inst. p. 646. t. 414: g. pl. class. XXII.

Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 288: g. pl. class. XII.

Adans. 1763. Fam. II. p. 317: g. Cassiar.

Medic. (Vorles. II. p. 339) 1789. Vorles. IV. 1. p. 351; 1789. Phil. Bot. I. p. 209.

Mönch 1794. Meth. p. 54: g, Thalamostemonis.

= Cercis Linn.

Siliquosa Linn. 1737 etc. in omnibus editionibus Generum, Systematis et Specierum, sequentibus Editoribus: ordo alter Tetradynamiae.

Siliquosae Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: ordo 57 plant. Gen.: Myagrum, Anastatica, Subularia, Lepidium, Cochlearia, Iberis, Thlaspi, Biscutella, Clypeola, Alyssum, Lunaria, Draba, Vella, Bunias, Cheiranthus, Hesperis, Raphanus, Dentaria, Cardamine, Brassica, Sinapis, Arabis, Turritis, Erysimum, Sisymbrium, Crambe, Isatis.

Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 39 plant. Gen. ead. et Peltaria, Ricotia, Heliophila. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 481. Gen. ead. et Chamira.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 249: class. XIII. plant. Gen.: Myagrum, Isatis, Alyssum, Clypeola, Draba, Thlaspi, Lepidium, Cochlearia, Bunias, Hesperis, Turritis, Arabis, Eruca, Raphanus, Brassica, Sisymbrium, Cardamine.

Batsch 1802. Tab. p. 82: fam. unica Cheiranthemar. Gen. ut Linn. 1764.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 321. Divis.: Nauciferae, Siliculosae, Siliquosae.

= Cruciferae Juss.

Siliquosae Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 26: ordo Antiscorbuticar. Gen.: Dentaria, Erysimum, Hesperis, Turritis, Raphanus, Brassica, Arabis, Cardamine, Cheiranthus, Sinapis, Sisymbrium.

Hill 1769. Ht. kew. p. 172[17]: pars fam. tertiae ordinis secundi tribus quartae Tetrapetalar. Gen.: Ricotia, Erysimum, Cheiranthus, Hesperis, Arabis, Turritis, Brassica, Raphanus, Cardamine, Sisymbrium, Sinapis, Cleome.

Scop. 1777. Intr. p. 316: gens Antiscorbuticar. Gen.: Dondisia, Raphanus, Brassica, Wilckia, Hesperis, Turritis, Cheiranthus, Dentaria, Cardamine, Heliophylla, Sisymbrium, Erysimum.

Smel. 1805. Nov. Act. Ac. Petrop. XIV. p. 489: div. Cruciformium. Gen. §. 1: Raphanus, Raphanistrum, Cordylocarpus, Hypecoum; Ricotia, Erysimum, Cheiranthus, Hesperis, Arabis, Brassica, Turritis, Dentaria, Chelidonium, Glaucium, Epimedium. §. 2: Cardamine, Sisymbrium, Sinapis, Heliophila. §. 3: Cleome.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 713: ordo Cruciferar. Gen.: Arabis, Turritis, Nasturtium, Braya, Barbarea, Notoceras, Cheiranthus, Matthiola, Brassica, Sinapis, Raphanus, Chorispermum, Cardamine; Heliophila, Sisymbrium, Erysimum, Malcolmia, Hesperis, Erucaria.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 333: div. Siliquosar. Gen.: Cardamine, Arabis, Chamaeplium, etc.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 848; 1831. Gen. II. p. 519: div. Cruciferar. Gen.: Stevenia, Nasturtium, Morettia; Braya, Taphrospermum, Smelowskia; Dentaria, Pteronevron, Cardamine, Nevroloma, Arabis, Macropodium, Oudneya, Turritis, Barbarea, Notoceras, Cheiranthus, Matthiola; Malcolmia, Hesperis, Sisymbrium, Erysimum, Stanleia; Brassica, Sinapis, Moricandia, Diplotaxis; Erucaria, Schizopetalon; Chamira, Heliophila. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII. Subdivis.: Heliophileae, Arabideae, Sisymbreae, Brassiceae. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. Gen.: Savignya, Eruca, Ramphospermum, Diplotaxis, Moricandia, Sinapis, Brassica, Orobium, Eutrema, Platypetalum, Stanleya, Leptaleum, Erysimum, Alliaria, Sisymbrium, Redowskia, Andreoskia, Hesperis, Malcolmia, Oudneya, Neuroloma, Dentaria, Pteroneurum, Cardamine, Macropodium, Parrya, Arabis, Turritis, Braya, Stevenia, Streptanthus, Barbarea, Notoceras, Leptocarpaea, Nasturtium, Cheiranthus, Triceras, Matthiola.

Rchb. 1828. Consp. p. 184 (1832. Fl. exc. p. 674): subdiv. Septatar. Sect.: Arabideae, Sisymbreae, Brassiceae, Heliophileae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: series Cruciferar. Trib.: Cardamineae, Erysimeae, Brassiceae.

Link 1831. Hdb. II. p. 301: sect. Cruciferar. Gen.: Matthiola, Cheiranthus, Malcolmia, Hesperis, Alliaria, Moricandia, Turritis, Arabis, Dentaria, Pteroneurum, Cardamine, Couringia, Nasturtium, Brachylobus, Leptocarpaea, Sisymbrium, Erysimum, Barbaraea, Notoceras, Cheirinia, Cuspidaria, Brassica, Erucastrum, Brassicastrum, Sinapis, Euzomum, Diplotaxis.

Koch 1836. Syn. p. 33. Ed. II. p. 36: subordo Cruciferar. Trib.: Arabideae, Sisymbreae, Brassiceae.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323. 343: trib. Cruciferar. Gen.: Morisia, Erucaria, Hirschfeldia, Sinapistrum, Leucosinapis, Eruca, Brassica, Sinapis, Euzomum, Erucastrum, Diplotaxis, Orychmophragmus, Moricandia, Streptanthus, Schizopetalum, Hesperis, Malcolmia, Deilosma, Matthiola, Cheiranthus, Erysimum, Syrenia, Alliaria, Conringia, Barbarea, Sisymbrella, Clandestinaria, Nasturtium, Hugueninia, Notoceras, Andreoskia, Chamaeplium, Sisymbrium, Redowskia, Dontostemon, Leptaleum, Braya, Stevenia, Orobium, Eutrema, Platypetalum, Platyspermum, Taphrospermum, Arabis, Arabidium, Abasicarpon, Turritis, Macropodium, Parrya, Neuroloma, Cardamine, Pteroneuron, Dentaria, Oudneya, Savignya, Chamira, Heliophila, Ormiscus, Orthoselis.

Sillybum Hassk. vid. *Silybum Vaill.*

Siloxerus*) Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 57: nov. g. Syngenes. Segregat. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 499. n. 1962.
  Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2443. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25.
  Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 221: g. Leontopodiear.
  Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
  Less. 1832. Syn. p. 269: g. Craspediear.
    = Styloncerus Spreng.

Silphiastrum Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 342: sect. Berlandierae. (Silphium reticulatum Pursh?)

Silphidium Torrey & Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 341: subsect. Eucoreopsidis. (Coreopsis latifolia Michx.)

Silphieae Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 319; 1830. v. 60. p. 575: subdiv. Coreopsidear. Gen.: Oswalda, Baillieria, Parthenium, Guardiola?, Espeletia, Silphium et 1830 Clibadium?
  Less. 1832. Syn. p. 213: div. Melampodiear. Gen.: Hidalgoa, Silphium, Polymnia.
  DC. 1838. Pr. V. p. 510: div. Melampodinear. Gen. ut Less. et Guardiola, Espeletia, Berlandiera. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 401; 1841. Ench. p. 237. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 69) Angelandra. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). Gen. ut DC.
  Rchb. 1841. Nom. p. 79: div. Calendulariar. Gen. ut DC.
  Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. 1843.

Silphiosperma Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 433; 1852. Linnaea XXV. p. 483: nov. g. Madiear. (S. glandulosum.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 185.
  Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Sphenogynear.
    Synon. Ctenosperma F. Müll.

Silphium**) Linn. 1737. Cliff. p. 494; 1737. Coroll. p. 16. n. 981; 1740. Syst. p. 29; 1742. Gen. ed. II. p. 423. n. 812; 1753. Sp. II. p. 919; 1759. Syst. ed. X. p. 1232. n. 882; 1763. Sp. ed. II. p. 1301; 1764. Gen. ed. VI. p. 444. n. 986; 1767. Syst. ed. XII. p. 576: g. Syngenes. Polygam. Necessar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 657; 1784. Syst. p. 790. — Reich. 1778. Gen. p. 440. n. 1069. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 580. n. 1334. — Gmel. 1791. Syst. p. 1269. — Pers. 1797. Syst. p. 831; 1807. Ench. II. p. 489. n. 1936. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2330. n. 1552; 1809. En. p. 532. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 183.
  Gled. 1749. Berl. p. 131; 1764. Syst. p. 260. n. 1077: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 606.
  Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.
  B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 188. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 530. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 416.
  Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540. — Link 1822. En. II. p. 361.
  Hill 1769. Ht. kew. p. 11: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 574; 1826. Syst. III. p. 629. n. 2872; 1831. Gen. II. p. 643. n. 3230. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 226.
  Scop. 1777. Intr. p. 133: g. Flosculosar.
  Neck. 1790. El. I. p. 13. n. 20: g. Actinophytor.
  Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Coreopsidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2620. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 124.
  Link 1829. Hdb. I. p. 778: g. Calendulaceear.
  Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 319. 324; 1830. v. 60. p. 575: g. Silphiear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 213. — DC. 1836. Pr. V. p. 511. — Endl. 1838. Gen. n. 2474. p. 401; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Nutt. 1841. Am. phil. trans. n. ser. VII. p. 341. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 274. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3022. Sect.: Silphium, Gonosilphium. — Walp. 1843. Rep. II. p. 604. 975; 1847. VI. p. 721. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
  Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
  Brongn. 1843. Én. genr. p. 43: g. Melampodiear.
  Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 610: g. Senecionear.

Silvaea Hook. & Arn. 1836. Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 211: nov. g. Euphorbiacear. (Cluytia semperflorens Roxb.)
  Baill. 1858. Euphorb. p. 341: g. Jatrophidear.

Silvaea*) Philippi 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Portulacear. (*Conf.* Phil. 1860. Fl. Atacam. p. 21. t. 1. f. 9: S. pachyphylla.)

Silvia Flor. Flum. I. t. 149 (curialis).
    = Escobedia Ruiz & Pav.

Silvia Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 513: nov. g. Gerardiear. verar. (Gerardia serpyllifolia Kunth.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. 685 (*Sylvia*).

Silvia Allemao 1848. Diss. (Bot. Zeit. 1854. p. 454): nov. g. Laurinear.

Silybeae Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 310. 338; 1827. v. 50. p. 463; 1830. v. 60. p. 572: div. Carduinear. Gen.: Alfredia, Echenais, Silybum.
  Rchb. 1828. Consp. p. 102: subsect. Carduinar. Gen. ead.
  Less. 1832. Syn. p. 10: sect. Carduinear. Gen.: Silybum, Tyrimnus, Galactites.
  DC. 1837. Pr. VI. p. 615: subtrib. Cynarear. Gen. ut Less. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 476; 1841. Ench. p. 247. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 227 (141). Gen. ead. —

*) *στύλος; ὀγκηρός*, tumidus (ex ipso Auctore.)
**) *Σίλφιον* Veterum est Umbellifera.

*) Dicat. dom. Waldi Silva.

Silybeae Cassini cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. Gen. ex Less. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. Gen. ut Less.
Rchb. 1841. Nom. p. 96: div. Homoianthar. Gen. ead.

Silybum*) Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 172: g. Cynarocephalar. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 244. — Math. 1853. Belg. I. p. 295.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 684: g. Capitatar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 160. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 5. 176.
Adans. 1763. Fam. II. p. 116: g. Carduor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 378. t. 162: g. Tubulosar.
Mönch 1794. Meth. p. 555: g. Petalostemonis.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 155: g. Carduacear. — Par. Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 94. — Bartl. 1830. Ord. p. 144. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 288.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 536; 1826. Syst. III. p. 393. n. 2656; 1831. Gen. II. p. 608. n. 2995: g. Cynarear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 43.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 436: g. Cynarocephalear.
Link 1822. En. II. p. 303; 1829. Hdb. I. p. 686: g. Acarnacear.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 311. 326; 1830. v. 60. p. 572: g. Silybear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2322; 1841. Nom. p. 96. n. 3756. — Less. 1832. Syn. p. 10. — DC. 1837. Pr. VI. p. 616. — Endl. 1838. Gen. n. 2878. p. 476; 1841. Ench. p. 247. — Kunth 1838. Berol. I. p. 369. — Meisn. 1839. Gen. p. 227 (141). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 104 (*Sillybum*). — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 715. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 203.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 238: g. Flosculosar.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1426: sect. Cardui.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32 (*Sylibum*): g. Carduinear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 400. Ed. II. p. 458. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12. 85.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 336; .... in Webb & Berth. Canar. II. p. 382: g. Eucynarear.
Synon. Mariana Hill. (Carduus Marianus L.)

Simaba Aublet 1775. Guian. I. p. 400. t. 153: nov. g. Decandr. Monogyn. (S. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 700. — Pers. 1805. Ench. I. p. 465. n. 1045.
Scop. 1777. Intr. p. 251: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 373: g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 256. — Hedw. 1806. Gen. p. 309. n. 1221.

*) Nomen a voce aegyptiaca.

Simaba Aublet cont.
Neck. 1790. El. II. p. 321. n. 1104: g. Acascophytor.
= Simabae St. Hil. pars.

Simaba A. St. Hilaire 1823. Bull. soc. philom. p. 129; 1823. Mém. Mus. X. p. 276; 1825. Fl. Bras. I. p. 74: g. injuncta Aruba emend. Simarubear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 17. — Kunth 1824. Syn. III. p. 335. — DC. 1824. Pr. I. p. 733. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 515. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 240. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 385. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 810. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 376. — Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47). — Walp. 1842. Rep. I. p. 524; 1843. II. p. 826; 1846. V. p. 397; 1848. Ann. bot. I. p. 162; 1851. II. p. 259. — Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 563. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 420.
D. Don 1825. Nepal. p. 248: g. Terebintacear. (Nima quassioides Ham. mss.)
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5176; 1841. Nom. p. 197. n. 7536: g. Quassiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5964. p. 1144; 1841. Ench. p. 607: g. Simarubacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 477.
Synon. Simaba et Aruba Aubl.; Phyllostema Neck.; Zwingera Schreb.; Homalolepis Turcz.

Simarouba Aublet 1775. Guian. II. p. 859. t. 331. 332: nov. g. Monoec. Decandr. (S. amara.)
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 616: g. Simaroubacear.
= Simaruba DC.

Simaruba DC. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 423; 1824. Pr. I. p. 733: g. Simarubear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 16. — Kunth 1824. Syn. III. p. 334. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 70. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 514. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 385. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 809. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 374. — Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 334. — Walp. 1842. Rep. I. p. 524; 1848. Ann. bot. I. p. 163. — Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 567. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 679: sect. Quassiae.
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5175; 1841. Nom. p. 197. n. 7535: g. Quassiear.
Link 1831. Hdb. II. p. 227: g. Rutacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5963. p. 1143; 1841. Ench. p. 607: g. Simarubacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 477.
Synon. Simarouba Aubl.; Quassia Cram.

Simarubaceae Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 21. (*Simarubeae?* ex DC.)
Lindl. 1833. Nix. p. 16; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 120; 1847. Veg. kd. p. 476: ordo

Simarubaceae Rich. cont.
Rutalium. Gen. ut Endl. et Picraena, Lasiolepis, Picrasma?, Brucea?
Endl. 1840. Gen. p. 1143; 1841. Ench. p. 606: ordo (249) Terebinthinear. Gen.: Quassia, Simaruba, Simaba, Samadera. *Affinia*: Nima, Harrisonia. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 99. Trib. ut Planch.
Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 560. Trib.: Simarubeae, Harrisonieae, Ailantheae, Spathelieae. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 685. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 160. Trib. eaed.

Simarubeae DC. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 323; 1819. Théor. élém. p. 245; 1824. Prodr. I. p. 733: ordo (52) Thalamiflorar. Gen.: Quassia, Simaruba, Simaba, Raputia? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 808. Gen. ut A. Juss.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamunguliae.
St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 184; 1824. Pl. rem. Brés. I. p. 94; 1825. Fl. Bras. I. p. 72.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 512: trib. Rutacear. Gen.: Quassia, Simaruba, Simaba, Samadera. *Affinia*: Nima, Harrisonia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. Gen. ut DC. (excepta Raputia.)
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 589: ordo Gynobasear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: div. Rutacear. Gen. ut A. Juss. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 199; 1832. Fl. exc. p. 767; 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. Subdivis.: Quassieae, Coriarieae, Ochneae.
Bartl. 1830. Ord. p. 384: ordo (227) Terebinthinar. Gen. ut A. Juss.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 372: fam. (20) Terebinthinear. Gen. ead.
Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47): ordo Rutacear. Gen. ead.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 84: fam. Therebinthinear. Gen.: Quassia.
Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 561: trib. Simarubacear. Gen.: Quassia, Samadera, Simaba, Hannoa, Simaruba, Castela. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 161. Gen. ead. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 277: fam. Rutacear. Gen. Simarubacear. Endl. et Hannoa.

Simblocline*) DC. 1836. Prodr. V. p. 297: nov. g. Heteropappear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2335. p. 379; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. genuinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3253: g. Boltoniear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.

Simblum**) Klotzsch 1831 in Hook. Bot. Misc. II. p. 164. t. 86: nov. g. Phalloidear.

*) *σίμβλος*, alveus apum; *κλίνη*, receptaculum.
**) *σίμβλον*, favus.

Simblum Klotzsch cont.
(S. periphragmoides.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 188. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 29; 1842. Mycol. p. 119.
Endl. 1836. Gen. n. 358 *b*. p. 31; 1841. Ench. p. 18: sect. Phalli. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 413. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phalloideor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 259. — Bail 1858. Syst. p. 15. t. 23.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 434: g. Phalleor.

Simbuleta*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 115: nov. g. Didynam. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 84; II. p. 688 (*Timbuleta*).
Juss. 1789. Gen. p. 418: g. incertae sedis.
Gmel. 1791. Syst. p. 242: g. Tetrandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 378: g. Didynam. Angiosperm. (Veronicis aff.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 243 (imperfecte cognitum).
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
= Anarrhinum Desfont.?

Simethis**) Kunth 1843. Enum. IV. p. 618: nov. g. Anthericear. (Anthericum planifolium Vand.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 384. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 222.

Similax Nuttall vid. *Smilax Tourn.*

Simira***) Aublet 1775. Guian. I. p. 170. t. 65: nov. g. Pentandr. Monogyn. (S. tinctoria.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 371.
Scop. 1777. Intr. p. 142: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 205: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 445. — Hedw. 1806. Gen. p. 183. n. 753. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 245.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2031 *b*: sect. Psychotriae.
= Mapouriae A. Rich. pars.

Simmondsia†) Nuttall 1844. Lond. journ. bot. III. p. 400. t. 16: nov. g. Garryacear. (S. Californica.) — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 38. n. 1900/1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281: g. Acalyphear.

Simocheilus††) Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 236: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.
Endl. 1839. Gen. p. 752. n. 4302 *c*: sect. Simochili.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4896. 3: sect. Simocheili.
= Eusimocheilus Benth.

Simocheilus Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 702: g. ampliat. Salaxidear. Sect.:

*) Arabice *Symbulet*.
**) „Simethis, Acidis amica."
***) *Simira* Galibiensium.
†) Dicat. Th. W. Simmonds.
††) *σιμός*, nasus obtusus; *χεῖλος*, labium.

Simocheilus Benth. cont.
Plagiostemon, Thamnus, Eusimocheilus, Octogonia, Pachycalyx.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4302. p. 1411; 1841. Ench. p. 369: g. Sympiezear. Sect. ut Benth.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4896: g. Ericear. genuinar. Sect. fere caed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.
Synon. Simochilus Endl.

Simochilus Endl. 1839. Gen. p. 752. n. 4302: g. Sympiezear. Sect.: Plagiostemon, Thamnus, Simocheilus, Octogonia, Pachycalyx.
= Simocheilus Benth.

Simonisia*) Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 144; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 412: nov. g. Gendarussear.

Simplocarpus Ledeb. vid. *Symplocarpus Salisb.*

Simploceae Dumort. vid. *Symploceae Desfont.*

Simplocos La Llave & Lex. vid. *Symplocos L'Herit.*

Simsia**) Pers. 1807. Ench. II. p. 478. n. 1919: nov. g. Syngenes. Frustran. (Coreopsis foetida Cav.)
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 135. 139; 1830. v. 60. p. 576: g. Helianthear. (Archetypar. verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2639. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. (verar.)
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 251: g. Radiatar.
DC. 1836. Pr. V. p. 577: g. Coreopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2533. p. 412; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3607. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Triana 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 39. Char. emend.

Simsia***) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811.) p. 152 (Verm. bot. Schr. II. p. 242); 1810. Prodr. I. p. 367. Ed. Nees p. 223: nov. g. Proteacear. (S. tenuifolia et anethifolia.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 24. 406. n. 544. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 474. n. 516; 1830. Gen. I. p. 105. n. 526. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 523. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 525.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 334: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1734: g. Synapheear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Protear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565: g. Conospermear.
= Stirlingia Endl.

Simsimum†) Bernhardi 1842. Linnaea XVI. p. 38. 42: nov. g. Sesamear. (Sesamum rostratum Hochst.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 367.

*) Simonis hortulanus, Maximiliani principis comes.
**) Dicat. Dr. Jacobo Sims, Anglo.
***) Dicat. Dr. John Sims.
†) Nomen a denominatione arabica speciei typicae.

Simsimum Bernhardi cont.
Endl. 1843. Spl. III. p. 79. n. 4105 *b*: sect. Sesami.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 251: sect. Sesamopteridis.

Sinapi Tourn. 1700. Inst. p. 227. t. 112: g. pl. class. V.
Rupp. 1718: Fl. jen. p. 75. Ed. Hall. 1745. p. 82: g. pl. class. IV.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 553: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 334.
Neck. 1790. El. III. p. 80. n. 1406: g. Styridophytor.
= Sinapis Linn.

Sinapidendron Lowe 1831. Madeir. p. 36: nov. g. ex typo Sinapeos frutescentis Ait.
Endl. 1839. Gen. n. 4948. p. 882; 1841. Ench. p. 450: g. Brassicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 183. n. 7048. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 184. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Brassicidar.
Synon. Disaccium DC.

Sinapieae Rchb. 1837. Handb. p. 260; 1841. Nomencl. p. 183: sect. Brassicear. Gen.: Eruca, Sinapis, Erucastrum et 1841 Hirschfeldia, Douepea.

Sinapis*) Linn. 1737. Gen. p. 197. n. 543; 1737. Cliff. p. 338; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 191; 1753. Sp. II. p. 668; 1759. Syst. ed. X. p. 1136. n. 735; 1763. Sp. ed. II. p. 933; 1764. Gen. ed. VI. p. 342. n. 821; 1767. Syst. ed. XII. p. 444: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 503; 1784. Syst. p. 602. — Reich. 1778. Gen. p. 342. n. 885. — Lour. 1790. Coch. II. p. 399. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 445. n. 1097. — Gmel. 1791. Syst. p. 989. — Pers. 1797. Syst. p. 639. — Willd. 1800. Sp. III. p. 554. n. 1246; 1809. En. p. 687. — Link 1822. En. II. p. 173. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 117.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 66. n. 275: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 252.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 45. — Scop. 1772. Carn. II. p. 34. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 500. — Pers. 1807. Ench. II. p. 207. n. 1576. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 715; 1825. Syst. II. p. 912. n. 2325; 1831. Gen. II. p. 523. n. 2576. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 424. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 191. 383. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 318. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 723. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 263.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 238. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 500. — DC. 1805. Franç. IV. p. 643. — R. Brown 1812 in

*) *Sinapis* et *Sinapi* Veterum.

Sinapis Linn. cont.
Ait. h. kew. IV. p. 125. (Verm. bot. Schr. V. p. 70.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 685. — Lois. 1824. Dict. v. 33. p. 198 (*Moutarde*).
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[23]: g. Tetrapetalar.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 299. t. 143.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 100: g. Erucacear.
Rebent. 1804. Neom. p. 156: g. Hexandr. Monogyn.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 243; 1821. Syst. II. p. 607; 1824. Pr. I. p. 217: g. Brassicear. Sect. (in Syst. & Prodr.): Melanosinapis, Ceratosinapis, Hirschfeldia, Leucosinapis, Disaccium? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4818 (sect.: Hirschfeldia, Kabera, Melanosinapion); 1832. Fl. exc. p. 693 (sect.: Hirschfeldia, Ramphospermum, Sinapistrum, Sinapis). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 248. Sect. ut DC. — Koch 1836. Syn. p. 55. Ed. II. p. 60. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (13). — Kunth 1838. Berol. I. p. 61. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 99. — Endl. 1839. Gen. n. 4950. p. 883; 1841. Ench. p. 451. Sect. ut DC. excluso Disaccio. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 218. — Walp. 1842. Rep. I. p. 186. — Brongn. 1843. En. genr. p. 92. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403 (*Moutarde*).
Webb 1836. Canar. I. p. 77: g. Anarthrocarpear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 183. n. 7041: g. Sinapiear. Sect. ut 1832 exclusa Hirschfeldia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Brassicidar.
Synon. Sinapi Tourn.

Sinapis Presl 1826. Fl. sicul. I. p. 95: g. Brassicear., sejunctis Hirschfeldia et Bonannia restrictum. Sect.: Melanosinapis, Ceratosinapis. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 73. Sect.: Ceratosinapis, Leucosinapis.

Sinapis Rchb. 1832. Fl. exc. p. 693; 1841. Nom. p. 183. n. 7041. 2: sect. Sinapeos.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 375: g. Siliquosar.
= Melanosinapis DC.

Sinapistrum Tourn. 1700. Inst. p. 231. t. 116: g. pl. class. V.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 215. t. 99. 100.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 269: g. pl. class. XI.
Mönch 1794. Meth. p. 250: g. Thalamostemonis.
= Cleome Linn.

Sinapistrum Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 108. (Cleome pentaphylla L. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 263.)
= Gynandropsis DC.

Sinapistrum Rchb. 1832. Fl. exc. p. 693; 1841. Nom. p. 183. n. 7041. 1: sect. Sinapeos.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 343: g. Siliquosar.
= Ceratosinapis DC.

Sinclairea Schultz Bip. vid. *seq.*

Sinclairia Hook. & Arn. 1841 in Beech. voy. Bot. p. 433. (Hook. Icon. pl. t. 451. 452.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 105. n. 2242/1: g. Liabear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 34 (*Sinclairea*): g. Euliabear.

Sindonysce Corda 1830 in Sturm. Jungerm. p. 5: g. Marchantiacear. *Cf. Syndonisce* et *Sindonisce* ex Linnaea V. Litt. p. 76.
= Grimaldia Raddi.

Singana*) Aublet 1775. Guian. I. p. 574. t. 230: nov. g. Polyandr. Monogyn. (S. guianensis.)
Scop. 1777. Intr. p. 265: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 257; 1821. Dict. v. 20. p. 104: g. Guttiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 30. — Pers. 1807. Ench. II. p. 69. n. 1284. — DC. 1824. Pr. I. p. 564 (dubium). — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 255. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 623. — Meisn. 1837. Gen. p. 43 (32).
Batsch 1802. Tab. p. 89: g. Guttaeferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4825: g. Resedear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 432. n. 2141: g. Dilleniear.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 308: g. Garciniear. minus notum et 1838. ibid. VI. p. 296: g. Capparear.?
Endl. 1839. Gen. n. 5007. p. 894; 1841. Ench. p. 456: g. (dubium) Capparidear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 258.
Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7128: g. Capparear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. (?)
Synon. Sterbeckia Schreb.; Mylosphora Neck.

Sinistrophorum Schrank mss.
= Myagrum Tourn. (Endl. Gen. p. 882.)

Sinningia**) Nees 1825. Ann. sc. nat. VI. p. 297: nov. g. Gesneriear. *Cf.* Linnaea I. p. 305. — Par. Schauer 1834. Flora I. p. 641. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258. — Brongn. 1843. En. genr. p. 61.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 223: g. Didynam. Angiosperm.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3241: g. Gesnerear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 505. n. 2481.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 65: sect. Gloxiniae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 649. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 534. — Endl. 1839. Gen. n. 4167 *b.* p. 722; 1841. Ench. p. 349. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 574. — Regel 1848. Flora I. p. 248.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Besleriear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4673: g. Gloxiniear.

*) Nomen caribaeum *Singan Singa.*
**) Dicat. Guil. Sinning, hortulano univers. Bonn.

Sinningia Nees cont.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 9: subg. Gloxiniae.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 205: g. Ligeriear.

Sinostrophum Schrank 1792. Prim. fl. Salisb. p. 163.
= Camelina Crantz. (Mönch Meth. p. 265.)

Sioja Hamilt. vid. *Cardiopteris Wall.*

Sion Adans. vid. *Sium Tourn.*

Sipanea Aublet 1775. Guian. I. p. 147. t. 56: nov. g. Pentandr. Monogyn. (S. pratensis.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. V. p. II. 5. n. 856.
Scop. 1777. Intr. p. 140: g. Opulinar.
Neck. 1790. El. I. p. 149. n. 259: g. Sphanidophytor.
Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 462: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 136. n. 586. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 289. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 164. n. 824. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 719.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 397: g. Cinchonear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 49. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2058. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 275.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 166: g. Hedyotidear. — Par. Cham. 1834. Linnaea IX. p. 242. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50.
DC. 1830. Pr. IV. p. 414: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 520. — Endl. 1838. Gen. n. 3248. p. 551; 1841. Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2883 (*Siparea*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 503; 1847. VI. p. 58.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Virecta Linn. f.; Ptychodea Willd.

Siparea Rchb. vid. *praeced.*

Siparuna Aublet 1775. Guian. II. p. 864. t. 333: nov. g. Monoec. Decandr. (S. guianensis.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 386. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 290.
Juss. 1789. Gen. p. 443: g. incertae sedis.
Gmel. 1791. Syst. p. 701: g. Decandr. Monogyn.
Vahl 1807. Eclog. III. p. 43.
Schult. 1827. Mant. III. p. 16. 318: g. Tetrandr. Monogyn.
Crüger 1847. Linnaea XX. p. 113: g. Monimiacear., Citrosmae aff. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 573.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 56. n. $2017/_1$: g. Monimiear.

Siphanthera*) Pohl 1827. Pl. Bras. I. p. 102. t. 84. 85: nov. g. Melastomar.
DC. 1828. Pr. III. p. 121 („Pohl ined."): g. Rhexiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4585. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 746. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 225. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82).
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 120 in not. t. 158.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 99. n. 498. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 503.
Endl. 1840. Gen. n. 6188. p. 1209; 1841. Ench. p. 646: g. Lavoisierear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6696. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 205: g. Microlicialium.

*) σίφων, tubus.

Siphidia Rchb. vid. *Siphisia Rafin.*

Siphisia Rafin. 1828. Med. Flora I. nr. 10: g. ab Aristolochia sejunctum. *Cf.* Linnaea 1834. Litt. p. 98.
Rchb. 1837. Hdb. p. 173 (*Siphidia*): g. Pistolochiear.
Duchartre 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 29: sect. Aristolochiae. (A. sipho L'Herit. etc.)
= Sipho Endl.

Sipho Endl. 1838. Gen. n. 2162 c. p. 345; 1841. Ench. p. 218: sect. Aristolochiae.
Synon. Siphisia Rafin.; Hocquartia Dumort.; Siphonolochia Rchb.; Siphidia Rchb.

Siphocalyx Endl. 1839. Gen. n. 4682 c. p. 824; 1841. Ench. p. 413: sect. Ribis. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 552. — Rchb. 1841. Nom. p. 160. n. 6248. 4 (*Siphonocalyx*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 361.
Synon. Symphocalyx Bert.; Chrysobotrya Spach.

Siphocampylos Wittst. vid. *seq.*

Siphocampylus*) Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 104. t. 168—177: nov. g. Campanulacear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 191 et Wittst. Etym. Handw. p. 816 (*Siphocampylos*).
Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 201: sect. Lobeliae.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 700: g. Lobeliacear. — Par. Curt. 1843. Bot. Mag. t. 4015 (*Siphocampylos?* ex Bot. Zeit. 1843. p. 438). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 31.
Endl. 1838. Gen. n. 3059. p. 511; 1841. Ench. p. 264: g. Lobeliear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 396. Sect.: Hemisiphocampylus, Eusiphocampylus. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3990. Sect. ut DC. — Walp. 1843. Rep. II. p. 708; 1847. VI. p. 378.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 763: g. Campanulear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.
Synon. Lobelia Presl; Canonanthus Don?

Siphocodon Turczan. 1852. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 175: nov. g. Campanulacear. anomalum. *Cf.* Flora 1853. p. 742 et Griseb. 1853. Arch. f. Nat. II. p. 394.

Siphoderma Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 220; 1849. Sp. Alg. p. 273. n. 195: nov. g. Lyngbyear. *Cf.* Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 194.

*) σίφων, tubus; καμπύλος, curvus.

Siphoderma Kütz. cont.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Siphogyne „Cass.“ DC. Prodr. VI. p. 147 in synon. Cryptogynes: vid. *Siphonogyne Cass.*

Siphomeris Bojer ex Hook. Bot. Misc. III. p. 313. *Cf. Syphomeris Boj., Steud.*
= Grewiae Juss. pars.

Siphonacanthus Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 45; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 199: nov. g. Ruelliear.

Siphonaceae Harvey 1858. Ner. bor. am. III. p. 9: ordo Chlorospermear. Subord.: Caulerpeae, Codieae.

Siphonandra Turczan. 1848. Bull. Mosc. XXI. 1. p. 581: nov. g. Coffeacear. (S. mexicana. — *cf.* Flora 1848. II. p. 712), dubitante Griseb. (Jahresber.) ob stamina monadelpha. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 758.

Siphonandra Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 24: nov. g. Vacciniear. (Thibaudia elliptica R. Br.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1082.

Siphonandraceae Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 2. 13: ordo Bicornium. Trib.: Vaccinieae, Arbuteae, Andromedeae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 436.

Siphonantha G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 621: sect. Pedicularis. — Par. Bunge 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 383. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 276.

Siphonantha Boiss. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 668: sect. Statices.

Siphonanthe Benth. 1835. Scroph. ind. p. 53; 1846 in DC. Prodr. X. p. 564: sect. Pedicularis.

Siphonanthemum Amman 1736. Comm. Ac. Petr. VIII. p. 213. t. 15: nov. g. plant.

Siphonanthera Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant.

Siphonanthus*) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 526. n. 1020; 1753. Sp. I. p. 109; 1759. Syst. ed. X. p. 893. n. 120; 1762. Sp. ed. II. p. 159; 1764. Gen. ed. VI. p. 53. n. 129; 1767. Syst. ed. XII. p. 119: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 129; 1784. Syst. p. 152. — Reich. 1778. Gen. p. 54. n. 135. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 70. n. 165. — Gmel. 1791. Syst. p. 243. — Pers. 1797. Syst. p. 157; 1805. Ench. I. p. 130. n. 246. — Willd. 1797. Sp. I. p. 606. n. 189.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 165. n. 674: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 66. 373.
Adans. 1763. Fam. II. p. 177: g. Borraginum.
Scop. 1777. Intr. p. 158: g. Asperifoliar.
Juss. 1789. Gen. p. 132: g. Borragineis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 304 (*Siphonantus*).
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 15. 290. n. 489: g. Verbenacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 296.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Viticear.

*) σίφων, sipho; ergo flos tubulosus.

Siphonanthus Linn. cont.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 66: g. Didynam. Angiosperm.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 670: sect. Clerodendri. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 883.
= Clerodendri R. Brown pars.

Siphonanthus Schreb. in herb. Juss. (S. elasticus.)
= Siphonia Rich. (Baill.)

Siphonantus St. Hil. vid. *Siphonanthus Linn.*

Siphoneae Greville 1830. Alg. brit. p. 183.
Endl. 1836. Gen. p. 7; 1841. Ench. p. 5: subordo Ulvacear. Gen.: Hydrogastrum, Vaucheria, Bryopsis, Codium, Nemalion.
Menegh. 1838. Cenni p. 34: fam. Algar. Gen.: Botrydium, Vaucheria, Bryopsis, Alysium, Coccoderma?, Valonia, Codium, Flabellaria, Anadyomene, Acetabularia, Polyphysa?, Udotea, Halimeda, Nesea?
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 403: trib. Chlorospermear. Gen.: Codium, Bryopsis, Vaucheria, Caulerpa, Amphibolis? — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 11. 145. Gen. fere ead. et Botrydium.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 182: trib. Phycear. Gen.: Codium, Dasycladus, Bryopsis.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 125; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328 (Flora 1843. p. 93): trib. Zoosporear. Gen.: Bryopsis, Penicillus, Valonia, Dictyosphaeria, Anadyomene.
Zanard. 1841. Mem. Acc. Tor. ser. 2. IV. p. 105.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 17: trib. Zoospermear. Gen.: Bryopsis, Codium, Dasycladus, Valonia, Anadyomene, Caulerpa.
Endl. 1843. Spl. III. p. 16: subordo Confervacear. Trib.: Caulerpeae, Acetabularieae, Halymedeae. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18. Trib.: Caulerpidae, Acetabularidae, Halymedidae.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . . : trib. Algar. filiformium. Gen.: Vaucheria.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 123: sect. Ulvacear. Subsect.: Vauchericae, Codiaceae, Anadyomeneae.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 444: ordo Ulvacear. Fam.: Vauchericae.

Siphonella Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 50: sect. Fediae. (F. longiflora et Nuttallii.)
Walp. 1843. Rep. II. p. 527: sect. Valerianellae.

Siphonella Webb . . . . Phyt. Canar. III. p. 86: sect. Cedronellae. (C. mexicana Benth.)

Siphoneranthemum Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 54: subg. Eranthemi. (E. leuconeurum, fasciculatum.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 664.

Siphoneugena Berg 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 378: nov. g. Eugenioidear.

Siphonia Rich. 1791 in Schreb. Gen. II. p. 656. n. 1466: g. Monoec. Monadelph. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 567. n. 1721.

Siphonia Rich. cont.
Gis. 1792. Prael. p. 474: g. Tricoccar. (?). — Par. Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 78. n. 2405; 1831. Gen. II. p. 546. n. 2676.
Pers. 1807. Ench. II. p. 588. n. 2142: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 39. t. 12. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 170. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 205. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 297. — Link 1831. Hdb. II. p. 436. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 634.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5065; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 194. n. 7379: g. Ricinear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 516.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Crotoniear.
Endl. 1840. Gen. n. 5799. p. 1113; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 339 (252): g. Rottlerear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 324: g. Jatrophidear. Sect.: Hevea, Bisiphonia.
Synon. Hevea Aubl.; Caoutchoua Gmel.; Siphonanthus Schreb.; Micrandra R. Brown.

Siphonia Achar. . . . .
= Pycnothelia Duf. (Rabenh. Lich.)

Siphonia Benth. 1841. Pl. Hartweg. p. 84: nov. g. Rondeletiear. (S. rivalis.)
= Lindenia Benth.

Siphonigonata *) Lyngbye 1819. Tent. hydr. dan. p. XXXI. 123: sect. 4 Hydrophytor. Gen.: Callithamnion, Ectocarpus, Bulbochaete, Conferva, Hydrodictyon, Zygnema.

Siphoniphytum **) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 63: gen. 3 plant. Spec. natur.: Cynara, Carduus, Xylanthema, Arctium, Cephalanoplos, Serratula, Psilosanthus, Cnicus, Hookia, Onopordum, Antaurea, Jacea, Lupsia, Podia, Calcitrapa, Cyanus, Lepteranthus, Stähelina, Roccardia, Gnaphalium, Argyranthus, Filago, Conyza, Baccharis, Chrysocoma, Pterophora, Scepinia, Calea, Santolina, Athanasia, Tarchonanthus, Eupatorium, Kyrstenia, Willughbaeya, Carlina, Arelina, Xeranthemum, Harrisonia, Trichandrum, Carthamus, Athamus, Kentrophyllum, Pluridens, Edwarsia, Spilanthus, Baldingeria, Cotula, Tanacetum, Psanacetum, Ambrosia, Xanthium, Clibadium, Iva, Echinanthus, Elephantopus, Sphaeranthus, Gundelia, Jungia, Stoebe, Wigandia, Seriphium, Ethulia, Senecio, Cacalia, Hiorthia, Arthemisia, Abrotanum, Ageratum, Micropus, Carpesium.

Siphonisma DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 23: sect. Moquiniae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2914 *b*. p. 1385; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3784. 2.

Siphonium Wallich 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 375: sect. Hedychii. (H. scaposum.)

Siphonocalyx Rchb. vid. *Siphocalyx Endl.*

*) σίφων, tubulus; γόνυ, articulus.
**) σιφώνιον, tubulus; φυτόν, planta.

Siphonocaulae Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 214: ordo (58) Cryptogamar. cellular. Fam.: Characeae.

Siphonodon Griffith 1843. Calc. journ. IV. Nr. 13. p. 150: nov. g. Ilicinear. *Cf.* Flora 1844. II. p. 438. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 404. — Endl. 1850. Spl. V. p. 84. n. 5708/₁. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 431.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598: g. Aquifoliacear.
Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 157: g. Celastrinear.

Siphonoglossa Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 47: nov. g. Acanthacear. (Rhytiglossae Nees sp.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 641.

Siphonogyne Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 493: aliud nomen pro *Cryptogyne Cass.* propositum.

Siphonoideae Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): subordo Ulvacear. Trib.: Vaucherieae, Codieae.

Siphonolochia Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1856 *b*; 1841. Nom. p. 68. n. 2577. 3: sect. Aristolochiae.
= Sipho Endl.

Siphonomorpha Otth 1824 in DC. Prodr. I. p. 377: sect. Silenes. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 152. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 408. — Endl. 1840. Gen. n. 5248 *f*. p. 973; 1841. Ench. p. 506; 1843. Spl. III. p. 93. n. 5248 *i*. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 317. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 172.

Siphonostegia Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6; 1835. Scroph. ind. p. 51: nov. g. Rhinanthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 4012. p. 693; 1841. Ench. p. 340; 1842. Spl. II. p. 61. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Meisn. 1840. Gen. p. 313 (223). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 546. — Walp. 1845. Rep. III. p. 407. 972.
Hook. & Arn. 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 203. t. 44: g. Scrophularinear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 613: g. Bartsiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 197; 1841. Nom. p. 115. n. 4458: g. Pedicularinar.
Bunge 1840. Bull. Ac. Pet. VII. p. 278.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 538: g. Schwalbear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.
Synon. Prismatanthus Hook. & Arn.; Uwarowia Bunge.

Siphonothallae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: subordo Ulvacear. Ord.: Hydronemeae, Olivieae, Myrsidreae, Caulerpeae, Halimedeae, Anadyomeneae.

Siphonothallae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: div. Gymnothalamar. Trib.: Bryopsideae, Cymopolieae, Lamarckieae.

Siphonychia Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 173: nov. g. Illecebrear. (Herniaria americana Nutt.)

Siphonychia Torrey & A. Gray cont.
Endl. 1839. Gen. n. 5202 *e.* p. 958; 1841. Ench. p. 504: sect. Paronychiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6282. 5.

Siphosphaera Dumort. vid. *Syphosphaera Dumort.*

Siphotoxys Bojer mss.
= Achyrospermum Blume.

Siphula Fries 1824. Pl. homon. p. 238: nov. g. Usneacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 406.
Fries 1831. Lich. eur. p. 7. 406; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 119: g. Sphaerophorear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 158. p. 14; 1841. Ench. p. 10. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 76. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 3; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 53. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XI. p. 637.
Rchb. 1837. Hdb. p. 132: g. Siphulear.
Rchb. 1841. Nom. p. 14. n. 517: g. Isidiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Sphaerophoridar.
Synon. Dufourea Achar.

Siphuleae Rchb. 1837. Handb. p. 132: fam. Cephalopsorar. Gen.: Siphula.

Siradium „Liebm." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 133: g. Oscillatoriear. (S. intricatum.)

Siriboa Rumph. 1747. Amboin. V. p. 34. t. 117.
= Euchavica Miq.

Siridium*) Spreng. 1827. Syst. IV. p. 569. n. 3588; 1831. Gen. II. p. 785. n. 4075: g. Coniomycetum.
Corda 1829 in Sturm Fl. Fung. II. p. 71; 1842. Ic. Fung. V. p. 5; 1842. Mycol. p. 18: g. Torulacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 187: g. Sporomycetum episporor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 72: g. Torulaceor.
= Seiridium Nees.

Sirium Linn. 1771. Mant. II. p. 145. n. 1292: g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 322. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 135; 1784. Syst. p. 160. — Reich. 1778. Gen. p. 62. n. 160. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 82. n. 203. — Gmel. 1791. Syst. p. 260. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 2. t. 2. — Pers. 1797. Syst. p. 166. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 19. n. 516. *Cf. Santalum Linn.*
Scop. 1777. Intr. p. 208: g. Dumosar.
Juss. 1789. Gen. p. 321: g. Onagrar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77.
Neck. 1790. El. II. p. 144. n. 835: g. Coryphophytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 155: g. Onagrariar.
= Santalum Linn.

Sirococcus Kütz. vid. *Scirococcus Grev.*

Sirococcus Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 716: nov. g. Hormococcacear. (S. strobilinus.)

*) σειρά, funis.

Sirocoleum*) Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 295. n. 185: nov. g. Oscillariear.

Sirocrocis**) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phycol. gener. p. 154; 1845. Phycol. germ. p. 123; 1849. Sp. Alg. p. 153. n. 106: nov. g. Leptomitear. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 640.

Sirodesmium De Notaris 1850. Mem. Torin. X. p. 348: nov. g. Torulaceor., Septonemati aff.

Sirogonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 278: nov. g. Zygnemear. — Par. Röm. 1845. Alg. Deutschl. p. 16. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. — Bréb. 1849. ibid. XI. p. 640.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 222; 1849. Sp. Alg. p. 434. n. 272: g. Zygnemacear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 119: sect. Mougeotiae.
Synon. Choaspis Gray.

Sirophysalis Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phycol. gener. p. 368: nov. g. Halochloar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 602. n. 411: g. Cystosirear.

Sirosiphon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 219; 1845. Phycol. germ. p. 177; 1849. Sp. Alg. p. 315. n. 215: nov. g. Scytonemear. — Par. Röm. 1845. Alg. Deutschl. p. 37. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 472. 640.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 88: g. Lyngbyear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Oscillariear.
Synon. Hassallia Berk.

Sirospora Montagne vid. *Seirospora Harv.*

Sisarum***) Tourn. 1700. Inst. p. 308. t. 163: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 270. Ed. Hall. 1745. p. 283: g. pl. class. XII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 97: g. Cicutar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 124: sect. Sii. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 478; 1841. Nom. p. 140. n. 5400. 2. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 294. — Koch 1836. Syn. p. 288. Ed. II. p. 318. — Endl. 1839. Gen. n. 4413 *b.* p. 772; 1841. Ench. p. 378. — Fisch. 1843. Suppl. ind. non. sem. Petr.; 1844. Linnaea XVIII. p. 216. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 261.
Tausch 1834. Flora I. p. 355: g. Amminear.

Siser Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 376: sect. Pastinacae. (P. sativa.)
Synon. Pastinaca Hoffm.; Eupastinaca Fenzl.

Sison†) Linn. 1737. Cliff. p. 98; 1737. Coroll. p. 5. n. 949; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 115. n. 265; 1748. Ups. p. 63; 1753. Sp. I. p. 252; 1759. Syst. ed. X. p. 959. n. 311; 1762. Sp. ed. II. p. 362; 1764. Gen. ed. VI. p. 139. n. 349; 1767.

*) *κολεός*, vagina, culeus.
**) *κροκίς*, flocci, tomentum.
***) Veteribus idem ac Siser.
†) Nomen ex Plinio aliisque.

Sison Linn. cont.
Syst. ed. XII. p. 212. n. 346: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 235; 1784. Syst. p. 285. — Reich. 1778. Gen. p. 142. n. 379. — Schreb. 1789. Gen. II. p. 188. n. 481. — Gmel. 1791. Syst. p. 483. — Pers. 1797. Syst. p. 301. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1436. n. 545; 1809. En. p. 314.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 56. n. 226: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 97.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 91. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — MBieb. 1808. Taur. cauc. I. p. 226. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 187.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 221. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 471. — Hedw. 1806. Gen. p. 197. n. 809. — Link 1821. En. I. p. 277. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 325.
Adans. 1763. Fam. II. p. 97: g. Cicutar.
Neck. 1790. El. I. p. 166. n. 275: g. Scadiophytor.
DC. 1805. Franç. IV. p. 302: sect. Sii.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 632; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXV. 407; 1825. Syst. I. p. 886. n. 1045; 1830. Gen. I. p. 222. n. 1146: g. Pimpinellear.
= Sison Lag., Petroselinum, Cryptotaenia, Carum, etc.

Sison Lagasca 1821. Amen. nat. II. p. 103: g. restrict. Umbelliferar. (Sison Amomum L.) — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 184. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 123; 1836. Syn. p. 285. Ed. II. p. 314: g. Amminear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3722; 1832. Fl. exc. p. 474; 1837. Hdb. p. 219 (genuinar.); 1841. Nom. p. 140. n. 5387. — Link 1829. Hdb. I. p. 334. — DC. 1830. Pr. IV. p. 110. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 286. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4402. p. 770; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 191. — Dietr. 1839. Syst. I. p. 583; II. p. 943. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 111. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 732.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 24. 428: g. Umbellatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Pimpinellear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 342: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Sison Wahlenb. 1824. Fl. suec. I. p. 177: g. Umbellatar. (S. inundatum L.)
= Helosciadium Koch.

Sissoa Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 254: sect. Dalbergiae. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 128. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 575.

Sissolia Rupp. vid. *Nissolia Tourn.*

Sistotrema*) Pers. 1797. Tent. p. 28: g. Hymenothecii. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 49. p. 327.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 550: g. Hydnoideor. (Xylodontem includens.) — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 376.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 39: g. Fungor. primae seriei.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 51 (*Sistrema*): g. Hymenothecior.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 130; 1818. II. p. 266.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 19: g. Boletor.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 426; 1828. Elench. I. p. 141: g. emend. Pileator. (S. confluens Pers.) — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 966. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 763. n. 3901.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 648: g. Sistotremidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 578: g. Agaricear.
Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 191: g. Odontodermeor. Sect.: Xylodon, Sistotrema, Heteroporus.
Fries 1825. Pl. homon. p. 81; 1838. Epicr. p. 520: g. Hydneor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 441. p. 39; 1841. Ench. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 471. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 403. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 168. — Bail 1858. Syst. p. 23. t. 29.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 331: g. Radularior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Hydnear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 321.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 621: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 328: g. Hydnaceor.
Synon. Systotrema DC.; Cerrena Gray?

Sistotremadeae Gray vid. *seq.*

Sistotremideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 648 (p. 597 *Sistotremadeae*): div. Hymenothecear. Gen.: Sistotrema, Cerrena, Xylodon.

Sistrema Lühnem. vid. *Sistotrema Pers.*

Sisymbreae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 237; 1821. Syst. II. p. 150. 438; 1824. Prodr. I. p. 186: trib. Notorhizear. Gen.: Malcomia, Hesperis, Sisymbrium, Alliaria, Erysimum, Leptaleum, Stanleya et (1824) Andreoskia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 201. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12). Gen. ead. et Smelowskia, Braya, Taphrospermum, Huguenínia, Syrenia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII: subdiv. Siliquosar. Gen.: Klukia, Sisymbrium, Erysimum, Leptaleum, Stanleya; Coringia, Alliaria, Hesperis, Malcolmia. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 185 (1832. Fl. exc. p. 684). Gen.: Orobium, Eutrema, Platypetalum, Braya, Leptaleum, Stanleya, Andreoskia, Hesperis,

---

*) σειστός, tremens; τρῆμα, foramen. (?)

Sisymbreae DC. cont.
Malcolmia; Velarum, Redowskia?, Sisymbrium, Leptocarpaea; Conringia, Erysimum.
Koch 1836. Syn. p. 46. Ed. II. p. 49: trib. Siliquosar. Gen.: Hesperis, Malcolmia, Sisymbrium, Hugueninia, Braya, Erysimum, Syrenia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: subdiv. Amphischistar. Sect.: Hesperinae, Erysimeae, *genuinae* (gen.: Halimolobos, Sisymbrium, Hugueninia).
Sisymbrella Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 422: nov. g. Siliquosar. (Sisymbrium sylvestre et asperum L.)
= Brachylobos DC.
Sisymbriastrum (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 80: sect. Diplotaxidis. (D. tenuifolia DC.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 218.
Sisymbridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: trib. Notorhizear. Gen. Sisymbriear. Endl. 1843 et Citharelma.
Sisymbrieae A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 310: trib. Cruciferar. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 91. Gen. ex Endl.
Kunth 1838. Berol. I. p. 50: fam. Notorrhizear. Gen.: Sisymbrium, Alliaria, Erysimum.
Endl. 1839. Gen. p. 873; 1841. Ench. p. 449: trib. Notorhizear. Gen.: Malcolmia, Hesperis, Dontostemon, Pachypodium (1841 Tonguea), Sisymbrium, Tropidocarpum, Erysimum, Tetracme, Smelowskia, Taphrospermum, Braya; Leptaleum; Christolea; Thelypodium, Stanleya, Warea. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 74) Drabopsis, 1843 (Spl. III. p. 87) Syrenopsis et 1850 (Spl. V. p. 36) Cithareloma, Strophades, Zerdana.
Rchb. 1841. Nom. p. 182: subdiv. Amphischistar. Sect.: Hesperinae, Erysimeae, *genuinae* (gen.: Tropidocarpum, Sisymbrium, Tonguea, Sophia, Hugueninia, Agonolobus; Christolea).
Conf. Sisymbreae DC.
Sisymbrium*) Tourn. 1700. Inst. p. 225. t. 109: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 73. Ed. Hall. 1745. p. 80: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 199. n. 547; 1737. Cliff. p. 336; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 192; 1753. Sp. II. p. 657; 1759. Syst. ed. X. p. 1132. n. 728; 1763. Sp. ed. II. p. 916; 1764. Gen. ed. VI. p. 338. n. 813; 1767. Syst. ed. XII. p. 439: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 497; 1784. Syst. p. 594. — Reich. 1778. Gen. p. 339. n. 877. — Lour. 1790. Coch. II. p. 400. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 441. n. 1089. — Gmel. 1791. Syst. p. 980. — Pers. 1797. Syst. p. 631. — Willd. 1800. Sp. III. p. 489. n. 1238; 1809. En. p. 676. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 67.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 547: g. Tetrapetalar. (cruciatar.) — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 172.

*) Nomen apud Veteres frequens plantae nobis ignotae. (Menthae?)

Sisymbrium Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 65. n. 267: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 250.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir. III. p. 267. — Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 46. — Scop. 1772. Carn. II. p. 23; 1777. Intr. p. 318. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 498. — Pers. 1807. Ench. II. p. 196. n. 1568.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 239. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 503. — DC. 1805. Franç. IV. p. 661; 1815. V. p. 590. Sect.: Brachyolobus, Sisymbrium. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 330. Sect.: Sisymbrium, Nasturtium.
Adans. 1763. Fam. II. p. 417: g. Erucar.
Neck. 1790. El. III. p. 73. n. 1395: g. Styridophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 104: g. Cheiranthoidear.
Rebent. 1804. Neom. p. 157: g. Hexandr. Monogyn.
= Sisymbrium All. et Nasturtium R. Brown.
Sisymbrium Boerh. 1710. Lugd. Bat. p. 430.
= Nasturtium R. Brown.
Sisymbrium Magnol. 1720. Nov. car. p. 251.
= Cardaminum Mönch.
Sisymbrium Allioni 1785. Fl. Pedem. I. p. 274: g. Tetradynam. Siliquos., disjuncto Brachyolobo restrict. — Par. Link 1822. En. II. p. 168.
DC. 1805. Franç. IV. p. 664: sect. Sisymbrii. — Par. Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 330.
R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 111 (Verm. bot. Schr. V. p. 53): g. Cruciferar. Distinguitur Nasturtium. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 679. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 124.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 716; 1825. Syst. II. p. 900. n. 2321; 1831. Gen. II. p. 522. n. 2572: g. Siliquosar. — Par. Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 374. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 420. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 190. 334. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 312. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 706. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 255. Sect. ut Meyer et Alliaria, Kibera, Velarum.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 458; 1824. Pr. I. p. 190: g. Sisymbrear. Sect.: Velarum, Norta, Psilostylum, Irio, Kibera, Arabidopsis et (1821) Hesperidopsis. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 72. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1103. 1174 (sect.: Arabidopsis, Sisymbrium); 1828. Consp. p. 185. n. 4810 (sect.: Arabidopsis, Norta, Psilostylium, Irio); 1832. Fl. exc. p. 689 (sect.: Velarum, Kibera, Arabidopsis, Sisymbrium, Norta); 1837. Hdb. p. 260. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 204. Sect. ut DC. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 122. Sect.: Norta, Irio, Descurea, Arabidopsis. —

Sisymbrium Allioni cont.
Koch 1836. Syn. p. 49. Ed. II. p. 50. Sect.: Velarum, Irio, Norta, Alliaria, Arabidopsis. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 91. — Walp. 1842. Rep. I. p. 163; 1843. II. p. 760; 1846. V. p. 39. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 209.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51 (*Sisymbryum*): g. Cardaminear.
Kunth 1838. Berol. I. p. 50: g. Sisymbriear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4906. p. 874; 1841. Ench. p. 449. Sect.: Velarum, Norta, Psilostylum?, Irio, Descurea, Kibera, Alliaria, Arabidopsis. — Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7033. Sect.: Velarum, Kibera, Norta, Pleuroneurum, Sisymbrium, Arabidopsis. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 176. Sect. ex Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 91. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 641.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 92: g. Cheiranthear. Sect.: Chamaeplium, Pachypodium, Alliaria, Eusisymbrium, Sophia.
Synon. Erysimum Tourn.; Accipitrina Rupp.

Sisymbrium Rchb. 1832. Fl. exc. p. 689: sect. Sisymbrii. Subsect.: Sophia, Irio.
= Irio DC.

Sisymbrium Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar. restrict.
= Leptocarpaea DC.

Sisymbryum Dumort. vid. *Sisymbrium All.*

Sisynrichium Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. cat. p. 567.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 217.
= Sisyrinchium Tourn.?

Sisyranthus*) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 197: nov. g. Asclepiadear. verar.
Endl. 1838. Gen. n. 3518. p. 597; 1841. Ench. p. 299: g. Ceropegiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 271 (178). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5028. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 211.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 649: g. Ceropegiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Sisyrinchium**) Tourn. 1700. Inst. p. 365: g. pl. class. IX.
= Iridis Linn. pars.

Sisyrinchium Linn. 1737. Gen. p. 273. n. 689; 1737. Cliff. p. 430; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 278; 1753. Sp. II. p. 954; 1759. Syst. ed. X. p. 1247. n. 908; 1763. Sp. ed. II. p. 1353; 1764. Gen. ed. VI. p. 597. n. 1017; 1767. Syst. ed. XII. p. 465: g. Gynandr. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 682; 1784. Syst. p. 820. — Reich. 1778. Gen. p. 459. n. 1103. — Pers. 1797. Syst. p. 864.
Gled. 1749. Berl. V. p. 133; 1764. Syst. p. 284. n. 1165 (*Sisyrrhynchium*): g. Stylostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. 175 (*Sisyrrhinchium*). — Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 246.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Iridum. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 60. — Juss. 1789. Gen. p. 57.
Hill 1769. Ht. kew. p. 358: g. Hexapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 88: g. Liliacear.
Walt. 1788. Carol. p. 44. 219. n. 345: g. Syngenes. Monogam.
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 344. t. 191. Char. emend. *Cf.* Römer & Usteri 1790. Mag. Bot. XI. p. 154.
Neck. 1790. El. III. p. 167. n. 1517: g. Ymnodiphytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 450. n. 1101: g. Monadelph. Triandr. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 577. n. 1251; 1809. En. p. 690. — Cram. 1803. Disp. p. 148. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 33. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 151.
Gmel. 1791. Syst. p. 118: g. Triandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 49. n. 104. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 24.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 189: g. Iridear. — Par. Mass. 1804. Dict. v. 4. p. 328 (*Bermudiène*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 144. — Hedw. 1806. Gen. p. 27. 354. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 344. 491. n. 143. — Link 1822. En. II. p. 177; 1829. Hdb. I. p. 215. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 166. n. 170; 1831. Gen. II. p. 528. n. 2593. — Eckl. 1827. Verz. p. 16. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Hook. & Arn. 1831 in Beech. voy. Bot. Pt. I. p. 46 (*Sisyrrhynchium*). — Endl. 1837. Gen. n. 1220. p. 165; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 148. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 1549. (genuinar.) — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 550 (*Bermudienne*). — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 122. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 92.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 309: g. Witsenear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 323. — Kunth 1822. Syn. I. p. 315.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 250: g. Spathacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1177: g. Ferrariear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 11.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Bermudiana Tourn.; Galathea Salisb.; Orthrosanthus Sweet (Orthosanthus Steud.); Souza Fl. Flum.; Syorhynchium Hoffmsg.

*) *σισυρα*, pellis.
**) Nomen ex Plinio.

Sisyrinchium R. Brown 1810. Prodr. I. p. 304. Ed. Nees p. 160: g. Iridear. (S. paniculatum et pulchellum „genus forte proprium constituentia"), serius *Renealmia R. Brown.*
= Libertia Spreng.

Sisyrocarpum Klotzsch mss. (Walp. 1847. Rep. VI. p. 401): nov. g. pro Gloxinia tigridia Ohl. propositum.

Sisyrrhinchium Giseke vid. *Sisyrinchium Linn.*

Sisyrrhynchium Gled., Hook. vid. *praeced.*

Sitanion Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 103: nov. g. Graminear., Elymo aff.
Steud. 1854. Glum. I. p. 351: g. Hordeacear.
= Elymus Linn.?

Sitobolium*) Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 174. 262: nov. g. Filicum. (Nephrodium punctilobum Michx.) *Cf.* Kunze 1845. Bot. Zeit. p. 813.
Synon. Sitolobium Auct.; Adectum Link; Dicksonia Presl.

Sitodium „Banks" Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 344. t. 71. 72: nov. g. plant. (Artocarpus integrifolia L.)
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2533. 3: sect. Artocarpi.
= Artocarpus Linn.

Sitolobium J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 418; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 434: g. Dicksoniar.
Endl. 1841. Spl. I. n. 644 c. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: sect. Dicksoniae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 335: subg. Dicksoniae.
= Sitobolium Desv.

Sitopsis Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 532: subg. Aegilopis. (Triticum bicorne Forsk.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 788.

Sitospelos Adans. 1763. Fam. II. p. 36: g. Triticor.
= Elymus Linn.

Sium**) Tourn. 1700. Inst. p. 308. t. 162: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 271. Ed. Hall. 1745. p. 285: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 76. n. 219; 1737. Cliff. p. 98; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 62; 1753. Sp. I. p. 251; 1759. Syst. ed. X. p. 959. n. 310; 1762. Sp. ed. II. p. 361; 1764. Gen. ed. VI. p. 138. n. 348; 1767. Syst. ed. XII. p. 211. n. 345: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 334; 1784. Syst. p. 284. — Reich. 1778. Gen. p. 141. n. 378. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 188. n. 480. — Gmel. 1791. Syst. p. 482. — Pers. 1797. Syst. p. 300. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1431. n. 544; 1809. En. p. 313. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 207. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 230.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 435: g. Umbelliferar. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 200. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. —

*) σῖτος, frumentum, panis, cibus.
**) σίον Graecorum.

Sium Tourn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 114. — Juss. 1789. Gen. p. 222. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 20. — Poir. 1804. Dict. v. 4. p. 326 (*Berle*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 472. — DC. 1805. Franç. IV. p. 299; 1815. V. p. 507. Sect.: Sium, Sison. — Hedw. 1806. Gen. p. 197. n. 808. — Link 1821. En. I. p. 277. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 505. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 99. (Divis. 1.)
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 54. n. 217: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 89.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 96. — Lour. 1790. Coch. I. p. 178. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 316. n. 699. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 186. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 175. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 24. 430. Sect.: Drepanophyllum, Helosciadium, Sium.
Adans. 1763. Fam. II. p. 498 (*Sion*): g. Chaerophyllor.
Neck. 1790. El. I. p. 171. n. 285: g. Scadiophytor. Sejungitur Mauchartia.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 640; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIV. 531; 1825. Syst. I. p. 905. n. 1078; 1830. Gen. I. p. 226. n. 1179: g. Amminar.
= Sium, Helosciadium, Berula Koch, etc.

Sium Adans. 1763. Fam. II. p. 97 (*cf.* p. 498. 499): g. Cicutar.
= Helosciadium Koch.

Sium Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 117; 1836. Syn. p. 288. Ed. II. p. 317: g. Amminear. (restrict.) Sect. (1836): Sia genuina, Sisarum. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 391. — Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3736; 1832. Fl. exc. p. 478 (sect. ut DC.); 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 140. n. 5400 (sect.: Sium, Sisarum). — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 351; 1845. Ross. II. p. 259. Sect. (1845) ut Endl. — Link 1829. Hdb. I. p. 331. — DC. 1830. Pr. IV. p. 124. Sect.: Sisarum, Berula. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 294. Sect. eaed. — Tausch 1834. Flora I. p. 355. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). — Kunth 1838. Berol. I. p. 269. — Endl. 1839. Gen. n. 4413. p. 772; 1841. Ench. p. 378. Sect.: Eusium, Sisarum. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 948. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 200. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 610. — Brongn. 1843. En. genr. p. 111. — Walp. 1843. Rep. II. p. 396. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 726.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 430: sect. Sii.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Pimpinellear.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 346: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Sium Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 881: g. Umbelliferar. Sect.: Drepanophyllum. (S. javanicum et laciniatum.)
= Falcaria Riv.

Sizygium Duchart. vid. *Syzygium Gärtn.*

Sjuro Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 898. (*Sjuro* et *Sodio.*)
= Rhapis Linn. f.

Skalnika Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. pl. (Nomen.)

Skimmi Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 779. (*Mijama Skimmi.*)
Adans. 1763. Fam. II. p. 364: g. Anonar.
= Skimmia Thunb.

Skimmia Thunb. 1783. Nov. gen. III. p. 57; 1784. Fl. jap. p. 4: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 157. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 81. n. 200. — Gmel. 1791. Syst. p. 254. — Pers. 1797. Syst. p. 163; 1805. Ench. I. p. 145. n. 306. — Willd. 1797. Sp. I. p. 671. n. 236. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 344. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 16. 293. n. 495. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 358. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 98. n. 491. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 498.
Juss. 1789. Gen. p. 425: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 67. 374.
DC. 1825. Pr. II. p. 18: g. Aquifoliacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3628. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 422. (?) — Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598. (?)
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 14: g. Cassiniear.
Sieb. & Zucc. 1835. Fl. japon. I. p. 125. t. 68: g. Aurantiacear.?, Rutaceis aff. — Simil. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 36. 74.
Endl. 1840. Gen. n. 5712. p. 1093; 1841. Ench. p. 578: g. Ilicineis aff. (*Cf.* Endl. 1841. Spl. I. p. 1424 [Gärtn. f. Fr. III. p. 242. t. 225] et 1842. Spl. II. p. 86.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 404.
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5256: g. Aquifoliaceis aff.
Synon. Skimmi Kämpf., Adans.

Skinnera*) Forst. 1776. Char. gen. p. 57. t. 29: nov. g. Octandr. Monogyn.
Scop. 1777. Intr. p. 104: g. Strictar.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 270: g. Petalostemonis.
DC. 1828. Pr. III. p. 39: sect. Fuchsiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4494 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 679. — Endl. 1840. Gen. n. 6125 *c*. p. 1193; 1841. Ench. p. 638.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 331: g. Oenotherear.
Spach 1835. Vég. phan. X. p. 339: g. Fuchsiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6578. — Lilja 1841. Linnaea XV. p. 262.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 178: g. Fuchsinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Fuchsear.

*) Dicat. Skinnero, Oxoniensi.

Skinneria*) Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 487. t. 6 (*cf.* Flora Lit. V. p. 135); 1845 in DC. Prodr. IX. p. 435: nov. g. Convolvulear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 297. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 621: g. Convolvulinar.
Synon. Palmia Endl. pt.

Skiophila Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 207: nov. g. Drymoniear. (Besleria melittifolia L., pulchella Don.)

Skirhoglyphis Endl. vid. *Skirroglyphis DC.*

Skirrhoglyphis Wittst. vid. *praeced.*

Skirrhophorus**) DC. 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 26; 1837. Prodr. VI. p. 150: nov. g. Angianthear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2715. p. 442; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3521 (*Scirrophorus*). — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 438. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 229.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
Conf. Skirrophorus A. Gray.

Skirroglyphis DC. 1836. Prodr. V. p. 533: sect. Tragoceratis. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 817 (*Skirrhoglyphis*). — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2491 *b*. p. 405 (*Skirhoglyphis*); 1841. Ench. p. 237. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3043. 2 (*Scirrhoglyphis*).

Skirrophorus A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 147: g. Angianthear. Char. reform. (*Cf. Skirrhophorus DC.*) Sect.: Skirrophorus, Pogonolepis, Pseudopappus. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 263.

Skitophyllum La Pylaie 1813 in Desv. Journ. bot. III. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 817 (*Skytophyllum*).
= Rhizodium Brid. et Fissidens Hedw.

Skolemora Arrud. ex Steud. Nomencl. II. p. 597. (S. pernambucensis.) Quid?

Skytalanthus***) Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 75. n. $3416/_1$: g. Echitear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 478: g. dubium Apocynacear.
= Skytanthus Meyen.

Skytanthus†) Meyen 1834. Reise I. p. 376: nov. g. Apocynear, Alstoniae proximum.
Meisn. 1840. Gen. p. 264 (172): g. Alstoniear.?
Endl. 1841. Spl. I. n. $3416/_1$. p. 1396; 1841. Ench. p. 295: g. Echitear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5155.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 488: g. Apocynacear. dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601.
Synon. Scytalanthus Schauer; Skytalanthus Endl.

Skytophyllum Wittst. vid. *Skitophyllum La Pyl.*

*) Dicat. Thom. Skinner.
**) σκιῤῥος, durus, firmus, tumor.
***) σκυτάλη, baculus.
†) σκύτος, cutis, corium.

Slackia Griff. . . . . Itin. not. p. 187. n. 977.
= Decaisnea Hook. f. & Thoms.

Slateria Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 243: g. pro *Flüggea Rich.* propositum.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 362: g. Asparaginear.
Synon. Flüggea Rich.; Polygonastrum Mönch pt.

Sleichera A. Juss. vid. *Schleichera Willd.*

Slevogtia*) Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3492: g. Chironiear. (*Hippion Spr.*, non Schm.)
Bartl. 1830. Ord. p. 200: g. Gentianear. — Par. D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 532.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5113: g. Erythraeariar.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 4: g. Chlorear.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 65: g. Erythraeacear.
Synon. Hippion Spreng.; Adenema Don.

Sloana Plumier 1703. Gen. p. 48. t. 15.
Linn. 1737. Gen. p. 153. n. 433: g. Polyandr. Monogyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 382: g. Tiliar.
Neck. 1790. El. II. p. 251. n. 999: g. Dapsilophytor.
= Sloanea Linn.

Sloana Endl. 1840. Gen. n. 5363 *a*. p. 1006; 1841. Ench. p. 522: sect. Sloaneae.
= Sloanea DC.

Sloanea**) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 210; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 242. n. 527; 1753. Sp. I. p. 512; 1759. Syst. ed. X. p. 1074. n. 582; 1762. Sp. ed. II. p. 730; 1764. Gen. ed. VI. p. 265. n. 655; 1767. Syst. ed. XII. p. 362: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 409; 1784. Syst. p. 491. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 533. t. 212. — Reich. 1778. Gen. p. 269. n. 711. — Swartz 1788. Prodr. p. 82; 1791. Obs. bot. p. 212. (Char. emend.) — Schreb. 1789. Gen. I. p. 353. n. 888. — Gmel. 1791. Syst. p. 813. — Pers. 1797. Syst. p. 526. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1155. n. 1021.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 112. n. 460: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Amentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 578.
Scop. 1777. Intr. p. 273: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 291: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 210. — Batsch 1802. Tab. p. 62. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 93. — Pers. 1807. Ench. II. p. 63. n. 1261. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 818; 1825. Syst. II. p. 606. n. 1963; 1830. Gen. I. p. 442. n. 2187. — DC. 1824. Pr. I. p. 515. Sect.: Sloanea, Gynostoma, Myriochaeta, Oxyandra, Foveolaria? — Poir. 1826. Dict. v. 44. p. 231 (*Quapalier*). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 555. Sect. ut DC. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 37. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 268.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5453: g. Tiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28) exclusa Foveolaria.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Sparmanniear.
Endl. 1840. Gen. n. 5363. p. 1006; 1841. Ench. p. 522: g. Sloanear. Sect.: Sloana, Gynostoma, Oxyandra? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7948. (genuinar.) Sect. eaed. — Walp. 1846. Rep. V. p. 116. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 648. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 329.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Sloanidar.
Synon. Sloana Plum.; Dasycarpus Örst.?

Sloanea Löfling 1758. It. p. 311.
= Apeiba Aubl.

Sloanea DC. 1824. Prodr. I. p. 515: sect. Sloaneae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5453*a*; 1841. Nom. p. 209. n. 7948. 1. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 555.
= Sloana Endl.

Sloaneae Endl. 1840. Gen. p. 1005; 1841. Ench. p. 522: trib. Tiliacear. verar. Gen.: Hasseltia, Ablania, Dasynema, Sloanea. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 583. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 209: subdiv. Tiliear. Sect.: Ablanieae, *genuinae* (gen.: Sloanea, Hasseltia).

Sloanidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 372: trib. Tilear. Gen. Sloanear. Endl.

Smeathmannia*) „Soland. mss.“ R. Brown 1820. Linn. Trans. XIII. 1. p. 220 adnot. (Verm. bot. Schr. II. p. 638): nov. g. Passiflorear. *Cf.* Isis 1823. p. 1376. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 271. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 257. (?) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 294.
DC. 1828. Pr. III. p. 322: g. Paropsicar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3460; 1841. Nom. p. 131. n. 5069. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 46. — Meisn. 1838. Gen. p. 124 (89). — Endl. 1839. Gen. n. 5094. p. 925; 1841. Ench. p. 482. — Walp. 1846. Rep. V. p. 770. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 129. 136.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42: g. Paropsiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.
Synon. Bülowia Schum.; Bülovia Wittst.

Smegmadermos**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 144. t. 31: nov. g. Polygam. Dioec. *Cf.* *Smegmaria Willd.*
= Quillaja Molin.

Smegmanthe Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5246 *a*. p. 972; 1841. Ench. p. 506: sect. Saponariae. Subsect.: Bolanthus, Cymanthus, Proteinia, Smegmathamnium.
= Saponaria Fenzl 1842.

Smegmaria Willd. 1805. Spec. IV. p. 1123. n. 1923: g. Polygam. Dioec.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 811: g. Büttnerear.

---

*) Dicat. Joh. Hadr. Slevogt, prof. Jenensi.
**) Dicat. Hans Sloane, praesidi societatis regiae anglicanae.

*) Dicat. Smeathman, detectori.
**) *σμῆγμα*, unguentum, sapo.

Smegmaria Willd. cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 440. n. 1740: g. Decandr. Pentagyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5581: inter genera vix cognita.
= Smegmadermos Ruiz & Pav.

Smegmathamnium Endl. 1840. Gen. n. 5246 *a* *d*. p. 972; 1841. Ench. p. 506: subsect. Smegmanthes.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7817: g. Saponariear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 93: sect. Saponariae. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 181.

Smelowskia*) C. A. Meyer 1831 in Ledeb. fl. Alt. III. p. 165 (Ledeb. Ic. II. t. 151): nov. g. Sisymbrear. (Sisymbrium album Pall.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 520. n. 2557: g. Siliquosar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7024: g. Erysimear.
Endl. 1839. Gen. n. 4910. p. 876; 1841. Ench. p. 450: g. Sisymbriear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 171; 1843. II. p. 761.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.

Smilaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 146: ordo 3 class. III. Gen. §. 1: Ruscus, Smilax, Dioscorea. §. 2: Tamus, Rajania. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 369.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 100. t. 16. Gen. §. 1: Dracaena, Dianella, Ripogonum, Floscopa, Flagellaria, Asparagus, Callixene, Philesia, Oechmea, Herreria, Medeola, Trillium, Paris, Convallaria. §. 2: Ruscus, Smilax, Dioscorea, Oncus. §. 3: Ubium, Tamnus, Rajania.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 220: ordo Sarmentacear. Gen.: Smilax, Tamus, Dioscorea, Rajania, Braunea, Ripogonum, Medeola, Myrsiphyllum, Trillium.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar.
Gray 1821. Brit. pl. p. 186: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Paris, Convallaria, Polygonatum, Ruscus.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Thalamauliae.
Agdh. 1823. Aphor. p. 161; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: div. Asparagear. Gen. §. 1: Trillium, Paris; Drymophila, Streptopus, Uvularia, Convallaria, Ophiopogon, Medeola. §. 2: Myrsiphyllum, Ripogonum, Smilax, Braunea, Ruscus, Stemona.
Rchb. 1828. Consp. p. 64 (1830. Fl. exc. p. 100): div. Sarmentacear. Gen.: Paris, Trillium, Drymophila, Asparagus, Streptopus, Convallaria, Polygonatum, Ledebouria, Ophiopogon, Smilacina, Medeola, Eustrephus, Luzuriaga, Myrsiphyllum, Leptodermis ?, Ruscus, Ripogonum, Smilax; Herreria.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (249) Hexapetaloidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 52: ordo (37) Liliacear. Divis.: Asparageae, Parideae.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo Smilalium.
Mart. 1835. Consp. p. 6: ordo 27.

*) Dicat. T. Smelowski, botanico rossico.

Smilaceae Vent. cont.
Endl. 1837. Gen. p. 152; 1841. Ench. p. 87: ordo Coronariar. Trib.: Parideae, Convallarieae. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 171; 1846. Chlor. prot. p. LXVII. Gen. foss.: Schizoneura, Smilacites.
Bernh. 1840. Flora II. p. 426: trib. Alliacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 47: fam. Liliiflorar. Divis.: Acorinae, Smilacinae, Dioscoreae.
Meisn. 1842. Gen. p. 402 (305): subordo Liliacear. Trib.: Uvularieae, Asparageae, Aspidistreae, Parideae.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 208: fam. (209) Liliacear. Trib. ut Bartl. Affines: Ophiopogoneae.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 651: fam. Monocotyledonum. Trib. ut Endl.

Smilaceae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 292. Ed. Nees p. 148: ordo Monocotyledonum restrictus. Gen.: Drymophila, Ripogonum, Smilax.
Rchb. 1837. Hdb. p. 153: subdiv. Smilacinar.
Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. IV. p. 1. Gen.: Smilax, Herreria.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 46; 1850. Enum. V. p. 159: trib. Smilacinear. Gen.: Smilax, Coprosmanthus, Ripogonum?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 215: ordo Dictyogenar. Gen.: Smilax, Ripogonum.

Smilacina Desfont. 1807. Ann. Mus. IX. p. 51: nov. g. a Convallaria disjunctum. (C. racemosa, stellata et trifolia L.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 369.
Elliott 1817. Sketch I. p. 394: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 225.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 97. n. 1259; 1830. Gen. I. p. 262. n. 1365: g. Sarmentacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIV. 303. Sect.: genuinae, Majanthema. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1120.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1325: g. Smilacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 652.
Link 1829. Hdb. I. p. 186: g. Convallariacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Maianthemear.
Bartl. 1830. Ord. p. 53: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Endl. 1837. Gen. n. 1183. p. 154; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. Sect.: Majanthemum, Smilacina. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1732. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 43; 1850. ibid. (f. 1848) p. 32; 1850. Enum. V. p. 148 (disjuncto Majanthemo). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 126. Sect. ut Endl. et Monaeranthus.
Synon. Tovaria Neck. pt.; Sigillaria Raf. pt.

Smilacina Kunth 1838. Fl. Berol. II. p. 269: g. Asparagear. (Convallaria bifolia L.)
= Maianthemum Wigg.

Smilacinae Link 1822. En. II. p. 426. 434; 1829. Hdb. I. p. 275: ordo 18 Endogenear. Gen.: Thamnus, Smilax, Dioscorea.
Rchb. 1837. Hdb. p. 153: div. Sarmentacear. Subdivis.: Convallarieae, Rusceae, Smilaceae.
Rchb. 1841. Nom. p. 47: div. Smilacear. Subdivis.: Parideae, Convallarieae.

Smilacineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Asparaginear. Gen.: Smilax, Ripogonum, Myrsiphyllum, Uvularia.
Kunth 1844. Abh. Berl. Ak. f. 1842. p. 36 (*Smilaceae*); 1850. ibid. f. 1848. p. 31; 1850. Enum. V. p. 114: ordo Monocotyledonum. Trib.: Parideae, Convallarieae, Smilaceae, Rusceae, Luzuriageae?
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.

Smilacites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 129; 1828. Prodr. p. 128: g. Liliacear. foss.
Endl. 1837. Gen. p. 257. n. 1786: g. Palmar. foss.
Endl. 1841. Ench. p. 137: g. Amphibryor. foss. dubii ordinis.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 171; 1846. Chlor. prot. p. LXVII: g. Smilacear.

Smilales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 35: nixus Imperfectar. Ordines: Dioscoreae, Smilaceae, Roxburghiaceae.

Smilax*) Tourn. 1700. Inst. p. 654. t. 421. (in Append.)
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 144. Ed. Hall. 1745. p. 157: g. pl. class. VII.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 217.
Linn. 1737. Gen. p. 305. n. 751; 1737. Cliff. p. 458; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1028; 1759. Syst. ed. X. p. 1292. n. 992; 1763. Sp. ed. II. p. 1458; 1764. Gen. ed. VI. p. 524. n. 1120; 1767. Syst. ed. XII. p. 654: g. Dioec. Hexandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 264. — Murr. 1774. Syst. p. 743; 1784. Syst. p. 887. — Reich. 1778. Gen. p. 520. n. 1225. — Lour. 1790. Coch. II. p. 621. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 692. n. 1528. — Pers. 1797. Syst. p. 929; 1807. Ench. II. p. 618. n. 2235. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 237. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 773. n. 1800; 1809. En. p. 1015. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 237 (sph. *Similax*). — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 58. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 791.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 76. n. 319: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 308.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 99. n. 1272; 1830. Gen. I. p. 263. n. 1371. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1122.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 52: g. Asparagor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 42.
Hill 1769. Ht. kew. p. 423: g. Dioicear.
Scop. 1777. Intr. p. 84: g. Liliacear.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 152; 1818. Fl. cap. II. p. 349: g. Hexandr. Trigyn. — Par.

*) Nomen vetustum, varia significans.

Smilax Tourn. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 582. — Swartz 1797. Ind. occ. I. p. 637.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 59. t. 16. f. 7 (zeylanica).
Neck. 1790. El. III. p. 391. n. 1836: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 148: g. Smilacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 105. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 293. Ed. Nees p. 149. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 221. — Agdh. 1823. Aphor. p. 161. — Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1333; 1830. Fl. exc. p. 101. — Blume 1830. En. pl. Jav. p. 17. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 45; 1850. Enum. V. p. 160. — Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. IV. p. 3 (sect.: Pachysmilax, Pharmacosmilax); 1844. Rumel. II. p. 401. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 216. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 649. — Webb 1850. Canar. III. p. 322. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 563.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
DC. 1805. Franç. III. p. 178: g. Asparagear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 270. — Kunth 1822. Syn. I. p. 277. — D. Don 1825. Nepal. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Koch 1837. Syn. p. 706. Ed. II. p. 815. — Meisn. 1843. Gen. p. 403 (307). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 225.
Link 1822. En. II. p. 426; 1829. Hdb. I. p. 275: g. Smilacinar.
Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 126 (*Salseparcille*): g. Asparaginear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Smilacinear. — Par. Kunth 1850 in Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 39. (emend.)
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1184. p. 155; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1734. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 128. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 234.

Smithia Scopoli 1777. Introd. p. 322. n. 1476: g. Disciferar.
Neck. 1790. El. II. p. 222. n. 957: g. Eredophytor.
= Quapoya Aubl.

Smithia*) Aiton 1789. Hort. kew. III. p. 469.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 809. n. 1760: g. Diadelph. Decandr. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 1161. n. 1371. — Pers. 1807. Ench. II. p. 315. n. 1733. — Roxb. 1832. Fl. Ind. III. p. 342.
Gis. 1792. Prael. p. 415: g. Papilionacear.
Batsch 1802. Tab. p. 95: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 239. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 336. (Verm. bot. Schr. II. p. 483.) — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 121. t. 4. — Link 1822. En. II. p. 246. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 323. n. 2599; 1831. Gen.

*) Dicat. Jam. Ed. Smith, praesidi societatis Linnaeanae Londin.

Smithia Aiton cont.
II. p. 592. n. 2925. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 370.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 758: g. Coronillear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 134.
DC. 1825. Pr. II. p. 323: g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 286. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 220. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (64). — Endl. 1841. Gen. n. 6608. p. 1284; 1841. Ench. p. 670. — Walp. 1842. Rep. I. p. 735. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 211 (includens Kotschyam Endl.). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 535.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 3995; 1841. Nom. p. 153. n. 5968: g. Onobrychear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 294.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 271: g. Hedysarear.
Synon. Damapana Adans.?; Petagnana Gmel.

Smithia Gmel. 1791. Syst. p. 388: g. Pentandr. Monogyn.
= Humbertia Comm.

Smolecopteris Linnaea XI. t. 10: vid. *Scolecopteris.*

Smyda Dumort. vid. *Samyda Linn.*

Smyrneae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 133: trib. 13 Umbelliferar. Gen.: Smyrnium, Physospermum, Conium, Echinophora, Hippomarathrum, Cachrys, Pleurospermum.
DC. 1830. Pr. IV. p. 233: trib. Campylospermar. Gen.: Lagoecia, Oliveria, Anisosciadium, Echinophora, Exoacantha, Arctopus, Cachrys, Prangos, Colladonia, Lecokia, Magydaris, Hermas, Conium, Vicatia, Arracacha, Pleurospermum, Hymenolaena, Physospermum, Smyrnium, Eulophus, Scaligeria. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 370. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 319. Ed. II. p. 351. Gen.: Echinophora, Conium, Pleurospermum, Hladnikia (= Malabaila in ed. II.), Smyrnium. — Endl. 1839. Gen. p. 788. Gen. ut DC. et Pycnocycla, Petrocarvi, Pentacrypta, Malabaila, Aulacospermum, Anosmia, Perideridia (loco Eulophi). Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1414 et Ench. p. 380) Heptaptera, Opoidia, Cynapium, Deweya, Musenium et 1843 (Spl. III. p. 83) Eleutherospermum, Keramocarpus. — Meisn. 1838. Gen. p. 150 (107). Subtrib.: Echinophoreae, Cachrydeae, Pleurospermeae. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. ut Endl. 1841. — Endl. 1850. Spl. V. p. 13. Subtrib.: Echinophoreae, Eusmyrneae.
Brongn. 1843. En. genr. p. 113: trib. Campylospermear. Gen. ex DC.

Smyrnidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 779: trib. Apiacear. Gen. Smyrnear. Endl. 1843 et Dicyclophora, Thecocarpus, Meliocarpus, Coelopleurum, Hansenia, Smyrniopsis.

Smyrnieae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 634: ordo Umbelliferar. Gen.: Smyrnium, Cachrys, Coriandrum, Biforis, Siler, Cicuta, Aethusa, Physospermum, Pleurospermum, Hasselquistia, Tordylium, Thysselinum.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXVII; 1825. Syst. I. p. 530; 1830. Gen. I. p. 222: trib. Umbelliferar. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIII: div. Umbelliferar. Gen.: Bupleurum, Smyrnium, Physospermum, Conium, Echinophora, Pleurospermum.
Rchb. 1828. Consp. p. 143: subdiv. Umbelliferar. genuinar. costatar. Gen.: Trachypleurum, Bupleurum, Heteromorpha; Echinophora, Conium, Smyrnium, Physospermum, Pleurospermum, Hippomarathrum, Cachrys.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 440: subdiv. Solenospermar. Gen.: Echinophora, Conium, Pleurospermum, Physospermum, Smyrnium. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 219. Gen. Smyrnear. DC. (exclusa Lagoecia) et Grafia et Perideridia loco Eulophi. — Rchb. 1841. Nom. p. 139. Gen. Smyrnear. Endl. 1841.

Smyrniopsis Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 72: nov. g. Smyrnear. — (S. Aucheri.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 922.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15. n. $4541/_1$: g. Eusmyrnear.

Smyrnium*) Tourn. 1700. Inst. p. 315. t. 168: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 81. n. 233; 1737. Cliff. p. 104; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 66; 1753. Sp. I. p. 262; 1759. Syst. ed. X. p. 962. n. 325; 1762. Sp. ed. II. p. 376; 1764. Gen. ed. VI. p. 144. n. 363; 1767. Syst. ed. XII. p. 216. n. 360: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 240; 1784. Syst. p. 290. — Reich. 1778. Gen. p. 147. n. 393. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 194. n. 495. — Gmel. 1791. Syst. p. 490. — Pers. 1797. Syst. p. 307. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1467. n. 559; 1809. En. p. 321. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 206.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 58. n. 238: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 96.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 102. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 322. n. 719.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 72. — Scop. 1777. Intr. p. 115. — Juss. 1789. Gen. p. 219. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 12. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 467. — DC. 1805. Franç. IV. p. 340. — Hedw. 1806. Gen. p. 203. n. 833. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 101. (g. div. 1 restrict.) — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 16. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 525. — Link 1821. En. I. p. 283. — Lois. 1823. Dict. v. 27. p. 485 (*Maceron*). — Kunth 1824. Syn. III. p. 98. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.

---

*) Olim eadem herba ac Olusatrum.

Smyrnium Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 101: g. Foeniculor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 101. t. 22. f. 11. (Sm. Olusatrum.)
Neck. 1790. El. I. p. 189. n. 320: g. Scadiophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 634; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXVII. 436; 1825. Syst. I. p. 891. n. 1051; 1830. Gen. I. p. 222. n. 1152: g. Smyrniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3744; 1832. Fl. exc. p. 442; 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5361. — Parlat. .... in Webb Canar. II. p. 168.
Presl 1822. Delic. Prag. I. p. ...: g. Sileracear.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 133; 1836. Syn. p. 320. Ed. II. p. 352: g. Smyrnear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 247. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 380. — Endl. 1839. Gen. n. 4541. p. 791; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 989. — Brongn. 1843. En. genr. p. 114. — Walp. 1843. Rep. II. p. 426. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 364. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 749. — D. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 534 (*Maceron*).
Link 1829. Hdb. I. p. 325: g. Pimpinellear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34.
Bernh. 1832. Linnaea VII. p. 608. Char. emend. Sejungitur Anosmia.
Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 177.
Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108): g. Cachrydear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 351: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.
Synon. Olusatrum Caesalp.

Smyrnium Elliott 1817. Sketch bot. South-Carol. I. p. 359: g. Pentandr. Digyn. (S. aureum, atropurpureum, integerrimum et Thapsia trifoliata.)
Nutt. 1818. Gen. I. p. 195: g. Umbellatar.
= Zizia Koch.

Soala*) Blanco 1837. Flora de Filipin. p. 437: nov. g. Polyandr. Monogyn. (S. littoralis.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 5455/1. p. 1423; 1841. Ench. p. 535: g. Clusiacear. dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402 (*Souala*).
Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8050: g. Mangostanear. ?
Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Guttiferar.

Soaresia Allem. ex Hook. journ. bot. V. p. 270: nov. g. Urticear., Pseudolmediae aff.

Sobelewskia Rchb. vid. *Sobolewskia MB.*

Soberbaea Dietr. vid. *Sowerbaea Smith.*

Sobolewskia*) Marsch.-Bieb. 1819. Tl. taur. cauc. III. p. 421 (Cent. pl. rar. ross. II. t. 59): nov. g. Tetradynam. Siliculos. (Crambe macrocarpa MB. antea.) — Par. Link 1822. En. II. p. 149.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 242; 1821. Syst. II. p. 575; 1824. Pr. I. p. 212: g. Isatidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4736 (*Sobelewskia*); 1837. Hdb. p. 258; 1841. Nom. p. 179. n. 6893 (*Sowelewskia*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 225. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Endl. 1839. Gen. n. 4941. p. 881; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 213.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 850. n. 2258; 1831. Gen. II. p. 511. n. 2501: g. Synclistar.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 326: g. Carcerulosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 677: g. Siliculosar.
Synon. Macrosporum DC. (Macrospermum Steud.)

Sobralia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 120. t. 26: nov. g. Gynandr. Diandr.
Pers. 1807. Ench. II. p. 517. n. 1994: g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 745. n. 3042; 1831. Gen. II. p. 673. n. 3402. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 374. — Rchb. f. 1858 in Houtte Fl. d. serr. VIII. p. 245. t. 840. Sect.: Eusobralia, Brasolia.
La Llave & Lex. 1825. Nov. veget. II. Orch. p. 21: g. Rinemospermar. epidendrar. (S. citrina.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 176: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1516; 1841. Nom. p. 56. n. 2185.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 53. t. 93: g. Gastrodiear.
Endl. 1837. Gen. n. 1611. p. 219; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Lindl. 1840. Orchid. p. 430: g. Vanillear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.
Lindl. 1854. Fol. Orchid. 21. Jan. Sect.: Brasolia.

Sobreya „Rz. & Pav." Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 375: sph. pro *Sobreyra.*

Sobreyra***) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 109. t. 23: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl.
= Enydra Lour.

Sobrus Reich. Gen. p. 256: sphalm. pro *Sorbus.*

Sobrya Pers. 1807. Ench. II. p. 473. n. 1906: g. Syngenes. Superfl.
= Enhydrae DC. pars.

---

*) Ratio nominis desideratur.

*) Dicat. Gregorio Sobolewski, florae Petropolitanae auctori.
**) Dicat. Franc. Martinez Sobral.
***) Dicat. R. P. Joanni Sobreyra et Salgado.

Soccus Rumph. 1741. Amboin. I. p. 104. 110. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 327 (*Saccus*). 332.
= Artocarpus Linn.

Socratea Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 263: nov. g. Palmar. (S. elegans et Orbignyana.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 838.

Socratesia*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 22: nov. g. Vacciniear. (S. melastomoides.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1081.

Soda Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 23: sect. Salsolae. — Par. Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 146; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 188. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 41. n. 1944 *c*. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 803. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1022.

Sodada**) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 81: nov. g. Octandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 615.
Scop. 1777. Intr. p. 324. n. 1491 (*Sododa*): g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 243: g. Capparidum.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 3: g. Capparidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 262. n. 1057. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 321 (*Hombac*); 1827. v. 49. p. 376. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 213. n. 1425 (1827. Cur. post. p. 145 Capparidi injunctum).
Delile 1813. Fl. aegypt. p. 74. t. 26.
DC. 1824. Pr. I. p. 245: g. Capparear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4873. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 278. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296.
Endl. 1839. Gen. n. 5000 *a*. p. 893; 1841. Ench. p. 456: sect. Capparidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7126. 1.
Synon. Hombak Adans.; Lindackera Sieb.

Sodeae Moqnin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 169: subtrib. Salsolear. Gen.: Helicilla, Horaninovia, Traganum, Caroxylon, Salsola.

Sodio Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 898.
= Rhapis Linn. f.

Sododa Scopoli vid. *Sodada Forsk.*

Sömmerringia***) Martius 1828. Monogr. c. ic.: nov. g. Hedysarear. (S. semperflorens.) *Cf.* Linnaea IV. Litt. p. 3.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 592. n. 2923: g. Leguminosar.
Meisn. 1837. Gen. p. 91 (64): g. Euhedysarear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6606. p. 1283; 1841. Ench. p. 670. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554 (*Sommeringia*).
Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5970: g. Onobrychear.

Sogalgina†) Cassini 1818. Bull. soc. philom. Févr. p. 31: nov. g. Millericar.? (Galinsoga trilobata Cav.)
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 17; 1827. v. 49. p. 397: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2598. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 40.

Sogalgina Cassini cont.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 265; 1830. v. 60. p. 575: g. Galinsogear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3114. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
DC. 1836. Pr. V. p. 678: g. Eugalinsogear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2620. p. 426; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133).
Synon. Sogalgina et Galinsogea Less.; Sogaligna Steud.

Sogalgina Lessing 1832. Syn. Compos. p. 245: g. restrict. Galinsogear. (Galinsogea balbisioides Kunth.)
= Sogalginae Cass. pars.

Sogaligna Steud. Nomencl. ed. I. vid. *Sogalgina Cass.* (DC.)

Soija Hasskarl vid. *seq.*

Soja*) Mönch 1794. Meth. p. 153: g. Thalamostemonis. (Dolichos Soja L.)
Savi 1824. Diss. p. 16.
DC. 1825. Pr. II. p. 396: g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3939. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — Link 1831. Hdb. II. p. 181. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 356. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 328. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (66). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 130. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 276 (*Soija*).
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 247: g. Euphaseolear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555: g. Glycinear.
Synon. Soya Benth., etc.

Sol „Rivin." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 154. Ed. Hall. 1745. p. 167: g. pl. class. VIII.
= Helianthus Linn.

Solana Adans. 1763. Fam. II. p. 215: fam. 28 plant. Gen.: Stramonium, Capsicum, Solanum, Lycopersicon, Alkekengi, Nicandra, Neudorfia, Belladonna, Lycium, Parqui.
= Solanaceae Hall.

Solana Dunal 1816. Solan. syn. p. 1. Gen.: Witheringia, Lycopersicum, Solanum.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: sect. Solanear. Gen.: Solanum, Nycterium, Lycopersicum.

Solanaceae Hall. 1742. En. stirp. Helv. Praef. p. 34: div. Dicotyledonum petalodear. Isostemonum. Gen.: Solanum, Alkekengi, Belladonna, Verbascum, Hyoscyamus.
Pers. 1805. Ench. I. p. 214: fam. plant. Gen.: Verbascum, Ramonda, Datura, Brugmansia, Hyoscyamus, Nicotiana, Petunia, Lamarkea; Ulloa, Jaborosa, Triguera, Solandra, Atropa, Nicandra, Linkia, Physalis, Solanum, Capsicum, Cestrum.
Bals.-Criv. 1824. De Solanacear. fam.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1826. Isis p. 587: ordo Tubiflorar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 193. Gen.: Cestrum, Juanulloa, Lycium, Capsicum, Solanum, Nycterium, Androcera, Bassovia, Aquartia, Peltanthera, Lycopersicon, Dierbachia, Witheringia, Physalis, Herschellia, Duperreya, Nicandra, Atropa,

*) Dicat. philosopho Socrati.
**) *Sodád*, Arabum.
***) Dicat. Sam. Thom. de Sömmerring.
†) Anagramma vocis Galinsoga.

*) *Soija*, nomen japonicum. (Hassk.)

Solanaceae Hall. cont.
Mandragora, Saracha, Witharia, Anisodus, Nectouxia, Jaborosa, Linkia, Rapinia, Solandra, Metternichia; Datura, Brugmansia, Nierembergia, Nicotiana, Petunia, Lehmannia, Scopolina, Hyoscyamus. *Desciscentia:* Nolana, Triguera, Aragoa. — Endl. 1839. Gen. p. 662; 1841. Ench. p. 330. Trib.: Nicotianeae, Datureae, Hyoscyameae, Solaneae, Cestrineae, Vestieae. — Meisn. 1840. Gen. p. 272. 276 (182). Trib. eaed.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXX: fam. Limbatar. Divis.: Polemoniaceae, Datureae, Atropeae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125; 1831. Fl. exc. p. 387. Divis.: Nolaneae, Datureae, Solaneae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 200; 1841. Nom. p. 121. Divis.: Nolaneae, Luridae, Mandragoreae.

Schlechtend. 1832. Linnaea VII. p. 52. Sect.: Cestrinae, Solaneae.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 293: ordo disjunctis Cestraceis restrictus.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 397: ordo Corollaeflorar. Trib.: Solaneae, Nicotianeae, Datureae, Franciseeae, Anthocerceae, Nolanieae, Cestrineae.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 54: fam. (133) Tubiflorar. Trib. ut Endl.

Sendtn. 1846 in Mart. fl. Bras. fasc. VI. p. 5. Gen.: Solanum, Cyphomandra, Witheringia, Lycopersicum, Saracha, Nicandra, Physalis, Athenaea, Aureliana, Capsicum, Himeranthus, Jaborosa, Salpichroa, Acnistus, Lycium, Grabowskia, Solandra, Datura, Hyoscyamus, Nicotiana, Petunia, Nierembergia.

Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. Subord.: *Rectembryae* (trib.: Metternichieae, Cestrineae, Fabianeae, Nicotianeae), *Curvembryae* (trib.: Datureae, Hyoscyameae, Solaneae). *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 796.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 618: ordo Solanalium. Div.: Rectembryae, Curvembryae.

Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: ordo exclusis Atropaceis emendatus. Trib.: Metternichieae, Cestrineae, Fabianeae, Jaboroseae, Jochromeae, Physaleae, Witheringeae, Solaneae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 558.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 659: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Trib.: (*A. Curvembryeae*) Nicotianeae, Datureae, Hyoscyameae, Solaneae, (*B. Rectembryeae*) Cestrineae, Vestieae.

Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 1: ordo (142) Corolliflorar. Trib.: Nolaneae, Solaneae.

Conf. Luridae Linn.; Solana Adans.; Solaneae Juss.

Solanales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 30: nixus Dicarpar. Ord.: Solaneae, Cestrinae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 415: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Oleaceae, Solanaceae, Asclepiadaceae, Cordiaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Polemoniaceae.

Solanandra Pers. vid. *Solenandria Palis.*

Solanarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20: ordo Torocoronar. Fam. unica: Solanideae.

Solandra*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1269. 1380. n. 1170: g. Monoec. Hexandr., a Linn. f. (1781. Suppl. p. 176) ad Hydrocotylem reductum.

Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1407; 1764. Gen. ed. VI. p. 491. n. 1061; 1767. Syst. ed. XII. p. 627: g. Monoec. Pentandr.

Adans. 1763. Fam. II. p. 102: g. Ginsenum.

Gled. 1764. Syst. p. 50. n. 195: g. Thalamostemonum.

Crantz 1767. Cl. Umb. p. 122: g. Umbelliferar. habitus deliquescentis.

Murr. 1774. Syst. p. 767: g. Polygam. Monoec. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 543. n. 1269.

Scop. 1777. Intr. p. 108: g. Umbelliferis aff.

Neck. 1790. El. I. p. 155. n. 262: g. Gitonophytor.

= Centella Linn.

Solandra Murray 1784. Comm. Gotting. p. 21. t. 1; 1784. Syst. p. 623: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Pers. 1797. Syst. p. 661.

Cavan. 1788. Diss. V. p. 279. t. 136.

Juss. 1789. Gen. p. 273: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 186. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 63. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 404.

= Laguna Cavan.

Solandra Swartz 1787. Act. Holm. VIII. p. 300. t. 11; 1788. Prodr. p. 3. 42; 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 386. t. 9: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 793. n. 1732. — Willd. 1797. Sp. I. p. 936. n. 341; 1809. En. p. 216.

Gis. 1792. Prael. p. 487: g. Personatar.

Salisb. 1802. Linn. Trans. VI. p. 100.

Pers. 1805. Ench. I. p. 218. n. 501: g. Solanacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 194. — Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 158.

Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 389. t. 4. f. 1 (grandiflora).

Hedw. 1806. Gen. p. 127. n. 558: g. Solanear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 457; 1825. Syst. I. p. 701. n. 760; 1830. Gen. I. p. 160. n. 806. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LVII. 699. n. 840. — Link 1821. En. I. p. 192. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3315. — Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1551. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 714. — Brongn. 1843. En. genr. p. 58. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 661.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX; 1837. Hdb. p. 201: g. Atropear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Cestrinear.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 475: g. Daturear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3846. p. 664; 1841. Ench. p. 331. — Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 71. — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4744. — Walp. 1845. Rep. III. p. 18. 954. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 533.

*) Dicat. Dan. C. Solander, peregrinatori.

Solandra Swartz cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166: g. Solandrear.
Synon. Swartzia Gmel.

Solandra Endl., Lindl. sphalm. pro *Rolandra.*

Solandreae Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 166: trib. Atropacear. Gen.: Solandra, Marckea, Juanulloa, Sarcophysa, Ectozoma.

Solaneae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 24 plant. Gen.: Bontia, Brunsfelsia, Aquartia, Crescentia, Lycium, Arduina, Cestrum, Hyoscyamus, Nicotiana, Solanum, Physalis, Atropa, Capsicum, Datura, Nolana.
Juss. 1789. Gen. p. 124: ordo 8 class. VIII. Gen. §. 1: Celsia, Verbascum, Hyoscyamus, Nicotiana, Datura. §. 2: Triguera, Jaborosa, Mandragora, Atropa, Nicandra, Physalis, Aquartia, Solanum, Capsicum, Lycium, Cestrum. §. 3. *Affinia*: Bontia, Brunsfelsia, Crescentia. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 255 et 1827. Dict. v. 49. p. 407, ubi accedunt ad §. 1: Nierembergia, Petunia, Salpiglossis, Anthocercis; ad §. 2: Nectouxia, Rapinia, Witheringia, Duboisia, Lycopersicon, Dunalia, Dartus, Ulloa; ad §. 3: Nolana, Cerium, Codon, Billarderia.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 365: ordo 10 class. VIII. Gen. §. 1: Celsia, Verbascum, Hyoscyamus, Nicotiana, Datura. §. 2: Mandragora, Atropa, Nicandra, Physalis, Solanum, Capsicum, Lycium. §. 3. *Affinia:* Nolana, Cestrum, Bontia, Crescentia.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 284. t. 46. Gen. ut Vent. et in §. 2: Triguera, Jaborosa, Witheringia, Aquartia, Cestrum, Billardiera; in §. 3: Brunsfelsia.
DC. 1805. Franç. III. p. 598: fam. (46) Dicotyledonum monopetalar. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 879.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 443. Ed. Nees p. 299: ordo Dicotyledonum monopetalar. Novum genus: Duboisia. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 633. Trib.: Eusolaneae, Datureae.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 452: fam. 45 plant. Gen. §. 1: Solanum, Lycopersicon, Witheringia, Capsicum, Physalis, Atropa, Mandragora, Nicandra, Desfontainia, Rapinia, Lycium, Cestrum, Solandra, Triguera, Nolana. §. 2: Nicotiana, Petunia, Lehmannia, Datura, Lamarckia, Nierembergia, Hyoscyamus, Ramondia, Verbascum.
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 507. Ed. II. p. 583. Gen.: Lycium (1844), Solanum, Physalis, Atropa, Scopolina, Hyoscyamus, Nicotiana, Datura.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 325: fam. Corolliflorar. Gen.: Verbascum, Hyoscyamus, Nicotiana, Stramonium; Atropa, Dulcamara, Solanum, Lycopersicon.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae.
Rchb. 1828. Consp. p. 126; 1831. Fl. exc. p. 389: div. Solanacear. Gen.: Vestia, Cestrum, Lamarkea, Dartus, Doraena?; Aquartia; Nycterium, Solanum, Witheringia, Lycopersicon, Dierbachia, Bassovia, Capsicum, Physalis, Herschellia, Duperreya, Juanulloa, Saracha, Atropa, Witharia, Mandragora, Nicandra, Anisodus, Nectouxia, Jaborosa, Linkia, Lycium, Rapinia, Solandra, Metternichia.
Link 1829. Hdb. I. p. 558: ordo (30) Hypanthar. Gen.: Hyoscyamus, Scopolia, Nicotiana, Datura, Mandragora, Atropa, Nicandra, Physalis, Solanum, Lycopersicon, Capsicum, Cestrum, Lycium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Solanidear. Gen.: Solanum, Lycopersicum, Atropa, Mandragora, Capsicum, Aquartia, Physalis, Nicandra, Sarachra, Withleya, Anisodus, Nycterium.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (213) Monopetalar.
Schltd. 1832. Linnaea VII. p. 66: sect. Solanacear. Gen.: Acnistus, Lycium, Grabowskia.
Lindl. 1833. Nix. p. 30: ordo Solanalium.
Nees 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 37. (*cf.* Flora 1836. II. Beibl. p. 1.) Gen.: Solanum, Lycopersicum, Capsicum, Physalis, Anisodus, Datura, Nicotiana, Hyoscyamus.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 400: trib. Solanacear. Gen.: Solanum, Lycopersicum, Peltanthera, Capsicum, Physalis, Saracha, Witheringia, Netouxia, Mandragora, Atropa, Anisodus, Nicandra, Lycium, Acnistus, Jaborosa. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 664. Gen.: Nicandra, Physalis, Sarracha, Witheringia, Capsicum, Solanum, Lycopersicum, Atropa, Withania, Mandragora, Himeranthus, Jaborosa, Juanulloa, Lycium, Acnistus. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1404 et Ench. p. 332) Margaranthus. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). Gen. ead. et Stigmatococca?, Dartus? — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. 74. Gen. ut Endl. et Herschellia, Jaltomata, Margaranthus, Pseudocapsicum, Nycterium, Bassovia, Aquartia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57. Gen. ex Endl. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 177 (restricta). Gen.: Solanum, Cyphomandra, Triguera, Lycopersicum. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 661. Gen. ut Endl. accedentibus Sendtnerianis et Miersianis. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 21. Subtrib.: Triguereae, *Solaneae* (divis.: Solanineae, Atropineae, Lycineae), Datureae, Hyoscyameae, Nicotianeae, Retzieae, Fabianeae, Metternichieae, Cestreae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201; 1841. Nom. p. 121: subdiv. Luridar. Sect.: Atropeae, Physalideae, Solana (1841 *genuinae* [gen.: Sarracha, Witheringia, Capsicum, Solanum, Lycopersicum]).

Solanecio Schultz Bip. 1842. Flora XXV. p. 441: g. Senecionidear. non descriptum. *Cf.* Walp. Rep. VI. p. 273.
= Senecio Linn. (Meisn. Comm. p. 363.)

Solanideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 24: fam. Solanariear. Trib.: Nicotianeae, Datureae, Solaneae, Cestrineae.

Solanineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XIX. 57: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Cestrineae, Solaneae.

Solanineae Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 23: div. Solanear. Gen.: Lycopersicum, Solanum, Cyphomandra, Witheringia, Bassovia, Capsicum, Saracha, Nicandra, Physalis, Margaranthus, Withania.

Solanoides Tourn. 1706. Act. Ac. Paris. p. 87. t. 3: nov. g. pl.
- Dill. 1719. Nov. gen. p. 153. t. 9.
- Mönch 1794. Meth. p. 307: g. Thalamostemonis.
  = Rivina Linn.

Solanum*) Tourn. 1700. Inst. p. 148. t. 62: g. pl. class. II.
- Rupp. 1718. Fl. jen. p. 43. Ed. Hall. 1745. p. 48: g. pl. class. I.
- Linn. 1737. Gen. p. 51. n. 145; 1737. Cliff. p. 60; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 48; 1753. Sp. I. p. 184; 1759. Syst. ed. X. p. 934. n. 224; 1762. Sp. ed. II. p. 263; 1764. Gen. ed. VI. p. 100. n. 251; 1767. Syst. ed. XII. p. 172. n. 250: g. Pentandr. Monogyn. (ampliat.) — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 161. — Murr. 1774. Syst. p. 186; 1784. Syst. p. 223. — Reich. 1778. Gen. p. 102. n. 268. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 134. n. 337. — Lour. 1790. Coch. I. p. 128. — Gmel. 1791. Syst. p. 382. — Pers. 1797. Syst. p. 232. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1025. n. 383; 1809. En. p. 232. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 56. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 127. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 244; ed. 1832. I. p. 563. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 26. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 128.
- Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 218. t. 102.
- Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 506: g. Solanacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 220. n. 506. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 694. — Bartl. 1830. Ord. p. 194. — Endl. 1833. Norf. p. 54. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 53. — Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 9.
- Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 215. n. 898: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 473 (emisso Pseudocapsico).
- Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 183. — Gis. 1792. Prael. p. 384. — Batsch 1802. Tab. p. 195. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 142.
- B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Solanear. — — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 476. — Juss. 1789. Gen. p. 126; 1827. Dict. v. 49. p. 409. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 373. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 289. — DC. 1805. Franç. III. p. 612; 1815. V. p. 417. — Hedw. 1806. Gen. p. 123. 378. n. 542. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 444. Ed. Nees p. 300. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 453; 1825. Syst. I. p. 677. n. 747; 1830. Gen. I. p. 158. n. 795. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 18. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LIV. 569. n. 826. Sect. ut Dunal 1816. — Link 1821. En. I. p. 182; 1829. Hdb. I. p. 563. — — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 332. (restrict.) — Kunth 1823. Syn. II. p. 158; 1838. Berol. II. p. 50. — Lois. 1824. Dict. v. 32. p. 519 (*Morelle*). — D. Don 1825. Nepal. p. 96. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3294; 1831. Fl. exc. p. 390; 1841. Nom. p. 122. n. 4761. Sect. (1841): Solanum, Pseudocapsicum, Bassovia, Melongena, Dulcamara, Acquartia, Nycterium. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 236. Sect.: Solana, Dulcamarae. — Nees 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 37. (1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 345.) Sect.: Maurella, Geminifolia, Verbascifolia, Melongena, Torva, Nycterium, Pinnatifolia. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 400. — Koch 1837. Syn. p. 507. Ed. II. p. 583. — Endl. 1839. Gen. n. 3855. p. 665; 1841. Ench. p. 332. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 696. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 90. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 77. (restrict.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57. — Walp. 1845. Rep. III. p. 38. 954. Sect. ex Dun. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 344 (*Morelle*). — Rchb. f. . . . . in Webb Canar. III. p. 120. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 187. Sect.: Dulcamara, Maurella. — Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 542. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 181.
- Adans. 1763. Fam. II. p. 218: g. Solanor. — Par. Dunal 1813. Hist. d. Solan. p. 115; 1816. Solan. syn. p. 5. Sect.: Pseudocapsica, Maurella, Leiodendra, Polymeris, Leprophora, Persicaria, Eriophylla, Micracantha, Subinermia, Nycteria, Melongena, Acanthophora, Cryptocarpum. — Rchb. 1837. Hdb. p. 201 (distinctis Nycterio et Lycopersico).
- Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 94: g. Oligantherar.
- Hill 1769. Ht. kew. p. 148: g. Monopetalar.
- Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 275. *Cf. Pseudo-Capsicum* et *Dulcamara Med.*
- Neck. 1790. Cl. II. p. 60. n. 706: g. Arcythophytor. Sejunguntur Psolanum et Licopersicum.
- Gärtn. 1791. Fr. II. p. 239. t. 131.
- Cram. 1803. Disp. p. 33 in Tetrandr. Monogyn. (S. flexuosum) et p. 176 in Syngenes. Monogam.
- Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX: g. Atropear.
- Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
- Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 27: g. Solaninear. Sect.: Pachystemonum, Leptostemonum.
- Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 636: g. Eusolanear.

Synon. Melongena Tourn.; Battata Hill; Dulcamara Med.; Pseudocapsicum Mönch;

---

*) Nomen ex Plinio.

Solanum Tourn. cont.
Aquartia Linn.; Acquartia Rchb.; Bassovia Aubl.; Nycterium Vent.; Androcera Nutt.; Ceranthera Raf.; Potatoe, Lycioides, Polymeris, Leprophora et Cryptocarpum Dun.; Holophylla, Holochlaina, Torvum et Lathyrocarpum G. Don; Torva Nees.

Solaria*) Philippi 1858. Linnaea XXIX. p. 72: nov. g. Gilliesiacear. (S. miersioides.)

Soldanella**) (Franke 1674. De Soldanella diss., respondente J. H. Soldan.)?
Tourn. 1700. Inst. p. 82. t. 16: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 41. n. 115; 1737. Cliff. p. 49; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 144; 1759. Syst. ed. X. p. 918. n. 182; 1762. Sp. ed. II. p. 206; 1764. Gen. ed. VI. p. 81. n. 199; 1767. Syst. ed. XII. p. 151: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 135. — Murr. 1774. Syst. p. 163; 1784. Syst. p. 194. — Reich. 1778. Gen. p. 83. n. 212. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 106. n. 260. — Gmel. 1791. Syst. p. 328. — Pers. 1797. Syst. p. 200; 1805. Ench. I. p. 170. n. 382. — Willd. 1797. Sp. I. p. 808. n. 296; 1809. En. p. 192. — Gmel. 1826. Fl. Bad. IV. p. 156.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 488: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 205. n. 852: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 6. 75.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 97.
Hill 1769. Ht. kew. p. 153: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 186: g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 28. n. 653: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 290: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 222. — DC. 1805. Franç. III. p. 451. — Hedw. 1806. Gen. p. 96. n. 435. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIV. 132. n. 657. — Link 1821. En. I. p. 158; 1829. Hdb. I. p. 415. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 413. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Koch 1837. Syn. p. 591. Ed. II. p. 679. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 347. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 663.
Batsch 1802. Tab. p. 207: g. Primulariar.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 24. t. 183.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 384; 1825. Syst. I. p. 573. n. 615; 1830. Gen. I. p. 141. n. 706: g. Primulear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 642. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 58. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 445.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 128. n. 3358; 1831. Fl. exc. p. 405: g. Androsacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4203. p. 731; 1841. Ench. p. 356. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 461.

*) Dicat. Franc. de Borja Solar.
**) Nomen a moneta italica „*soldo*" ob folia rotunda.

Soldanella Tourn. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4828: g. Cortusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.
Synon. Golia Adans.

Soldevilla Lagasca 1806. Varied. de cienc. an. 2. nr. 19: nov. g. Syngenes. Aequal. (S. setosa.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 378. n. 1777.
Lag. 1816. Gen. et spec. p. 24: g. Cichoracear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 813.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 902; 1831. Gen. II. p. 648. n. 3267: g. Cichorear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 672. n. 2908: g. Lapsanear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 310: g. Hypochoeridear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 143.
Less. 1832. Syn. p. 127: g. Lampsanear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2968. p. 493; 1841. Ench. p. 249; 1843. Spl. III. p. 71. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Boiss. & Reut. 1842. Diagn. pl. Hisp. p. 20. = Hispidella Barnad.

Solea*) Spreng. 1800 in Schrad. Journ. II. t. 6; 1813. Pugill. rar. I. p. 22.
Ging. 1824 in DC. Pr. I. p. 306: g. Violear. (restrict.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4886. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 191. n. 967. — Bartl. 1830. Ord. p. 284. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 335. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 497. — Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 838.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 521. 803. n. 895: g. Jonidior.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Jonidiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7143: g. Pombaliear.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 144: g. Violacear.
= Ionidii Vent. pars.

Soleirolia Gaudich 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 504: nov. g. Parietariear. (Helxine Soleirolii Req.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2503. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25.
Endl. 1837. Gen. n. 1886. p. 285; 1841. Ench. p. 170: g. Urticacear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 349 (260). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262.
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 110: sect. Parietariae.
Synon. Helxine Req.

Solena**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 514. Ed. Willd. p. 629: nov. g. Syngenes. Monogam. (S. heterophylla.)
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 11. 33: g. Eubryoniear.
= Bryonia Linn.?

*) Dicat. W. Sole, de Menthis scriptori.
**) σωλήν, tubulus: a stamine tubuloso.

Solena Willd. 1797. Spec. I. p. 961. n. 347: g. Pentandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear.
Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 464: g. Rubiacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 760. n. 821; 1830. Gen. I. p. 177. n. 891. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 798. Injungitur Randia DC.
= Posoqueria Aubl.

Solenacanthus Örsted 1855. Mexicos og Centralam. Acanth. p. 10: nov. g. Acanthacear. (Dipteracanthus longiflorus.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 638.

Solenachne Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 12: nov. g. Phalaridear. (S. phalaroides.)

Solenandra Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 288: subg. Cryptandrae. — Simil. Endl. 1850. Spl. V. p. 85. n. 5742 *b.* — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 269.
= Stenanthemum Reiss.

Solenandria Palis. 1804 in Vent. Malmais. t. 69.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 380: g. Monadelph. Pentandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 215. n. 1587 (*Solanandra*).
= Galax Linn.

Solenantha G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 39: nov. g. Rhamnear. (Cryptandra spinosa Cunn.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 820 (*Solenanthe*). — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Endl. 1840. Gen. n. 5749. p. 1103; 1841. Ench. p. 582 (dubium).
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5583: g. Phylicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.?
= Hymenanthera R. Brown? (Planch.)

Solenanthe Wittst. vid. *praeced.*

Solenanthis HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 309: sect. Lobeliae.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 412: sect. Isotomae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3994. 2.
Endl. 1841. Ench. p. 264. n. 3060 *d:* sect. Laurentiae.
Synon. Hippobroma Don.

Solenanthus Ledeb. 1828. Ic. pl. fl. ross. ill. t. 26; 1829. Fl. Alt. I. p. 193: nov. g. Asperifoliar. (S. circinnatus.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 198.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2965; 1837. Hdb. p. 192: g. Borraginear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 311: g. Rinderear.
Endl. 1839. Gen. n. 3783. p. 650; 1841. Ench. p. 321: g. Cynoglossear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 279 (188). — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4352. — DC. 1846. Pr. X. p. 163. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 169.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 30: g. Asperifoliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.

Solenarium Spreng. 1813. Pl. pugill. I. p. 66: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 49. p. 436. — Par. Kunze 1817. Mykol. Heft. I. p. 45. t. 2. f. 4.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 17; 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 101: g. Hysterior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Sphaeriacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 414. n. 3460; 1831. Gen. II. p. 761. n. 3880: g. Sphaerioideor.
= Glonium Mühlenb.

Solenerica Link 1829. Handb. I. p. 611: subg. Ericae.

Solenia Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. t. 8: nov. g. Fungor. (Utriculosor. — S. candida et ochracea.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 49. p. 437.
Pers. 1797. Tent. p. 36: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XIX. 675: sect. Pezizae.
Agdh. 1821. Aphor. p. 85: g. Cupuliformium.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 334. t. 12. f. 8. 9: g. Helvelloideor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Acetabulear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 200; 1828. Elench. II. p. 27: g. Heteroclitar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 570: g. Pezizear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 267.
Fries 1825. Pl. homon. p. 87: g. Sticteor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 308.
Leman 1826. Dict. v. 39. p. 376: g. Pezizoidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Sticticdear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 767. n. 3927: g. Pezizoideor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 448: g. Hymenomycetum angiosporor.
Endl. 1836. Gen. n. 422. p. 36; 1841. Ench. p. 20: g. Cupulator. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 437.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 338: g. Tympanideor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 357: g. Helvellaceor.?
Bonord. 1851. Hdb. p. 204: g. Pezizeor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 63. t. 20.

Solenia Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 417: sect. Ulvae. — Par. Leman 1828. Dict. v. 56. p. 244.
Agdh. 1824. Syst. p. XXXII. 185: g. Ulvacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 367. n. 3435: g. Solenotar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 87.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 201: g. Dumontiar.
= Enteromorpha Link.

Soleniata Lyngbye 1819. Tent. hydr. dan. p. XXX. 61: sect. 2 Hydrophytor. Gen.: Scytosiphon, Gastridium, Chorda, Bryopsis, Vaucheria, Bangia, Oscillatoria, Scytonema, Nodularia.

Solenidium Lindl. 1846. Orchid. Linden. p. ... : nov. g. Vandear.

Soleniopsis Massalongo 1851. Piant. foss. Vicent. (Flora 1852. p. 732): g. Algar. foss.
= Halymenites Sternb.

Soleniscia*) DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 737: nov. g. Stypheliear. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 607 (*Solenisia*). — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4267/$_1$. p. 1411; 1841. Ench. p. 367. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4807. — Meisn. 1843. Comm. p. 364.

Solenisia Steud. vid. *praeced.*

Solenites Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. II. t. 121.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 115; 1846. Chlor. prot. p. LIII: g. Isoëtear.
Synon. Flabellaria Phill.?

Solenocarpus Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 171: nov. g. Anacardiear.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (55): g. Cassuviear.
Endl. 1840. Gen. n. 5908. p. 1129; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5663: g. Pistaciear.

Solenococcum Rchb. vid. *Sclerococcum Fries.*

Solenocoela Rchb. vid. *Selenocoele DC.*

Solenodonta Cast. 1845. Pl. Marseill. I. p. 202. t. 2.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor. (Puccinia coronata Corda.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 514: g. Puccinieor.
Rabenh. 1851. Bot. Zeit. p. 450.
= Puccinia Tul.

Solenogyne Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 493: aliud nomen pro *Cryptogyne Cass.* propositum.

Solenogyne Cassini 1828. Dict. v. 56. p. 174; 1830. v. 60. p. 582: nov. g. Bellidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31.
Less. 1832. Syn. p. 193: g. Asterear.
DC. 1836. Pr. V. p. 367: g. Solenogynear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2392. p. 387; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3591. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: g. Grangeinear.

Solenogyneae DC. 1836. Prodr. V. p. 365: div. Asterinear. Gen.: Duhaldea, Microtrichia, Nolletia, Sarcanthemum, Leptothamnus, Solenogyne. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 387; 1841. Ench. p. 235. Gen. ead. et 1842 (Spl. II. p. 41) Chroilema. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 91: subdiv. Conyzear. Gen. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ut Endl.

Solenomelus**) Miers 1844. Linn. Trans. XIX. p. 95: nov. g. Iridear., Sisyrinchio aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Cruckshanksia Miers.

*) σωληνίσκος, tubulosus.
**) σωλήν, tubus; μέλος, membrum.

Solenophora Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 68: nov. g. Gesneriacear. (S. coccinea.) *Cf.* Flora Lit. XI. p. 106.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4167/$_1$. p. 1408; 1841. Ench. p. 349: g. Eugesnerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4672: g. Gloxiniear.
Meisn. 1843. Comm. p. 367 (*Selenophora*): g. Gesneriear. — Par. Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 401.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Gesnerear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 205: g. Rhytidophyllear.
Örsted 1858. Gesn. centroam. p. ... : g. Solenophorear.

Solenophoreae Örsted 1858. Gesn. centroam. p ... : subtrib. Rytidophyllear. Gen.: Arctocalyx, Solenophora. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 431.

Solenopsis Presl 1836. Prodr. mon. Lobel. p. 32; 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 290: nov. g. Lobeliear. (Lobelia minuta L., etc.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186. — Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147).
Endl. 1838. Gen. n. 3060 *a.* p. 512; 1841. Ench. p. 264: sect. Laurentiae.
= Laurentia Mich. (DC. Pr. VII. p. 409.)

Solenopteris Wallich mss.
= Loxogramma Blume.

*Solenospermae**)* Rchb. 1832. Fl. exc. p. 440; 1837. Hdb. p. 219: div. Umbelliferar. Subdivis.: Smyrnieae, Scandicineae, Caucalinae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 138. Subdivis.: Scandicinae, Smyrnieae, Caucalineae.

Solenospora Massalongo 1855. Framm. lich. p. ... : nov. g. Lichenum.

Solenosporium Lév. vid. *Selenosporium Corda.*

Solenostemma Hayne .... Arzneigew. IX. t. 38: nov. g. Asclepiadear. (Cynanchum Arghel Del.). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.) — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 668.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3441; 1841. Nom. p. 128. n. 4964: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 546.
Endl. 1838. Gen. n. 3467. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175).
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 433: g. Cynoctonar.
Synon. Argelia Decne.

Solenostemon Schumach. 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 45: nov. g. plant. (S. ocymoides.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 464. n. 2282: g. Labiatar.
Benth. 1832. Labiat. p. 52; 1848 in DC. Pr. XII. p. 72: sect. Colei. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 682. — Endl. 1838. Gen. n. 3576 *c.* p. 610; 1841. Ench. p. 306.

*) „Fructu (albumine) sulco insigni."

Solenostemon Schum. cont.
— Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4140. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 515. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 949.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162: g. Ocymoidear.
Synon. Mitsa Chap.

Solenosterigma*) „Klotzsch" Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 81: grex Philodendri. (Ph. Prieureanum, etc.)

Solenostigma Endl. 1833. Prodr. fl. Norfolk. p. 41: nov. g. Celtidear. (serius [Gen. p. 277] ad Sponiam Comm. reductum.) — Par. Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 66.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 263. 305: subg. Celtidis. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 399.

Solenostigma Klotzsch mss. in Herb. Krauss.: g. Stilbinear. (Walp. Rep. III. p. 125.)
= Retzia Thunb.

Solenostrobus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 272; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 11. n. 1816/$_6$: g. Cupressinear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 122.

Solenotae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 313: fam. Algar. Gen.: Bangia, Oscillatoria, Scytonema, Stigonema, Vaucheria, Bryopsis, Codium, Valonia, Alysium, Caulerpa, Solenia. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 754. Gen.: Striaria, Lemanea, Scytosiphon, Encoelium, Valonia, Codium, Alysium, Scytonema, Monema, Stigonema, Oscillatoria, Calothrix, Vaucheria, Bryopsis.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 87: trib. Orthydronematum. Gen. ut Spreng. 1827.

Solenotheca Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 371: nov. g. Tagetinear. (S. tenella.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 44. n. 2579/$_2$: g. Tagetear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 172.

Solenotinus DC. 1830. Prodr. IV. p. 328: sect. Viburni. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 388. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 442. — Endl. 1838. Gen. n. 3340 *a*. p. 569; 1841. Ench. p. 282 (*Solenotus*). — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2744. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 450. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 386. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 120.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 305: g. Viburninear.

Solenotus Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 105: sect. Astragali. (A. fruticosus, etc.)

Solenotus Endl. vid. *Solenotinus DC.*

Solerotheca Walp. vid. *Sclerotheca A. DC.*

Solidagineae Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 467: ordo plant. Gen.: Senecio, Xanthium.

Solidagineae Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 458; 1830. v. 60. p. 581: div. Asterear. Subdivis.: Grindelieae, Psiadieae, *verae* (gen.: Glyphia [Glycyderas], Euthamia, Solidago, Aplopappus [1830], Diplopappus, Heterotheca), Lepidophylleae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. Sect.: Grindeliaceae, Psiadiaceae, *genuinae* (gen.: Euthamia, Solidago, Diplopappus, Heterotheca), Lepidophylleae. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29. 226. Gen. ex Cass. et DC.
DC. 1836. Pr. V. p. 328: subdiv. Chrysocomear. Gen.: Bigelowia, Solidago, Amphirhapis, Commidendrum, Steiractis, Rochonia, Aplopappus, Pyrrocoma, Lessingia, Linosyris, Chrysocoma, Pteronia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 385; 1841. Ench. p. 235. Gen. ead. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 39) Chrysoma, Chrysothamnus, Homopappus, Stenotus, Prionopsis, Ericameria, Macronema, Isocoma, Ammodia, Eriocarpum et 1843 (Spl. III. p. 67) Brachychaeta, Isopappus. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). Gen. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtr. Asteroidear. Gen. ut Endl. et Pentachaeta.

Solidago Vaillant 1720. Act. Ac. Par. p. 292: g. Corymbiferar.
= Senecionis Linn. pars.

Solidago*) Linn. 1737. Gen. p. 253. n. 651; 1737. Cliff. p. 409; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 259; 1753. Sp. II. p. 878; 1759. Syst. ed. X. p. 1218. n. 859; 1763. Sp. ed. II. p. 1232; 1764. Gen. ed. VI. p. 425. n. 955; 1767. Syst. ed. XII. p. 556: g. Syngénes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 635; 1784. Syst. p. 763. — Reich. 1778. Gen. p. 421. n. 1035. — Lour. 1790. Coch. II. p. 501. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 556. n. 1292. — Gmel. 1791. Syst. p. 1235. — Pers. 1797. Syst. p. 804; 1807. Ench. II. p. 447. n. 1856. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2053. n. 1486; 1809. En. p. 888. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 159. Sect.: Solidago, Euthamia.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 729: g. Corymbiferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 181. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 538. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 398. — DC. 1805. Franç. IV. p. 155. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 465. — Link 1822. En. II. p. 331. — Math. 1853. Belg. I. p. 275.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 154: g. Compositar. ord. 4.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 254. n. 1050: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 598.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.
Hill 1769. Ht. kew. p. 20: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 447. t. 170. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 218. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 560; 1826. Syst. III. p. 538. n. 2763; 1831. Gen. II. p. 628. n. 3118. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 525. — Lois. 1827. Dict. v. 49.

---

*) *στήριγμα*, fulcrum.

*) Nomen ex medio aevo a solidando vulnera.

Solidago Linn. cont.
p. 441. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 10. 315. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 100.
Scop. 1777. Intr. p. 130: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 5. n. 3: g. Actinophytor.
Rebent. 1804. Neom. p. 111: g. Pentandr. Monogyn.
Cass. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 65: g. Asterear. — Par. HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 103. — Kunth 1823. Syn. II. p. 406; 1838. Berol. I. p. 330. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 245. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 252. — Less. 1832. Syn. p. 163. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 1. — Koch 1837. Syn. p. 355. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 44. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 188.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1830. v. 60. p. 581: g. Solidaginear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2527. (genuinar.) — DC. 1836. Pr. V. p. 330. Sect.: Virgaurea, Euthamia. — Endl. 1838. Gen. n. 2376. p. 385; 1841. Ench. p. 235. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 226. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 195. Sect.: Chrysastrum, Virgaria, Chrysoma, Euthamia. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3330. Sect. ut Nutt. 1818. — Walp. 1843. Rep. II. p. 589. 960; 1847. VI. p. 129. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 493. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
D. Don 1825. Nepal. p. 177: g. Carduacear.
Link 1829. Hdb. I. p. 741: g. Asteroidear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 670.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 326: g. Chrysocomear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.
Koch 1843. Syn. ed. II. p. 389: g. Asterinear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 4: g. Asteracear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 92: g. Erigerinear.
Synon. Virga-Aurea Tourn.; Jacobaeoides Vaill.; Doria Adans.; Euthamia Cass.

Solidago P. Browne 1756. Jamaic. p. 320. t. 33. f. 2.
= Liabi Adans. pars.

Solidago Nutt. 1818. Gen. II. p. 159: sect. Solidaginis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3330. 1.
= Virgaurea DC.

Soliera Decaisne vid. *Solieria J. Agdh.*

Soliera Clos 1849 in Gay Fl. Chil. IV. p. 480: nov. g. Labiatar., Saturejae aff. (S. pulchella.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 249: g. Saturejear.

Solieria J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 156: nov. g. Delesseriear. (Gigartina Gaditana Mont.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 53. n. $122/_{88}$. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XI. p. 670.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (*Soliera*; *cf.* Flora 1843. p. 98): g. Chondriear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gen. p. 401; 1849. Sp. Alg. p. 748. n. 496: g. Gigartinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Delesseriar.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 120: g. Solieriear.

Solierieae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 115: subordo Gelidiacear. Gen.: Eucheuma, Solieria.

Soligrania Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: stirps Fluidaciae. Ordines: Granulinia, Gelatinia.

Solitegmia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: stirps Corticaliae. Ord.: Julacia, Thalamitegmia, Fructitegmia, Nuditegmia.

Soliva*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 113. t. 24: nov. g. Syngenes. Polygam. Necessar. *Cf.* Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 452. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 491. n. 1943.
R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. 1. p. 101 (Verm. bot. Schr. II. p. 538): g. Compositar. Injungitur Gymnostyles Juss.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 302: g. Anthemidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 515. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 39.
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2342: g. Gymnostylear.
Less. 1832. Syn. p. 268: g. Hippiear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 142. — Endl. 1838. Gen. n. 2708. p. 441; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 213 (135). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 425. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3446. — Walp. 1843. Rep. II. p. 643. 992. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 128: g. Senecionidear.
Synon. Gymnostyles Juss.; Solivaea Cass.; Ranunculi sp. Poir.

Solivaea Cassini 1823. Dict. v. 29. p. 177; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. Cotulear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.
= Soliva Ruiz & Pav.

Sollya**) Lindl. 1831. Bot. Regist. XVII. t. 1460; 1834. XX. (n. ser. VII.) n. 1719: nov. g. a Billardiera Sm. distinctum. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 60.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 415: g. Pittosporear. — Par. Endl. 1837. En. pl. Hügel. p. 9; 1840. Gen. n. 5666. p. 1083; 1841. Ench. p. 572. — Meisn. 1837. Gen. p. 66 (47). — Putterl. 1839. Syn. Pittosp. p. 25; 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 203. — Walp. 1842. Rep. I. p. 257; 1846. V. p. 73. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 672.

---

*) Dicat. Salvatori Soliva.
**) Dicat. Rich. Horsman Solly, botanico anglo.

Sollya Lindl. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 270; 1841. Nom. p. 187. n. 7164: g. Billardierear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 441: g. Pittosporacear.

Solori Adans. 1763. Fam. II. p. 327: g. Phaseolor.
= Dalbergia Roxb.

Solorina*) Achar. 1810. Lich. univ. p. 27. 149. t. 1. f. 5. 6; 1814. Syn. Lich. p. 8: nov. g. Homogeneor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 49. p. 453.
Mart. 1817. Erlang. p. 241: g. Lichenum scutellator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 429: g. Peltidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Lobiolatar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 21: g. Dermatocarpear.
Leman 1825. Dict. v. 38. p. 333: sect. Peltigerae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 404 *b*; 1841. Nom. p. 17. n. 566. 1. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 555. — Fries 1831. Lich. eur. p. 2. 48; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 104. — Endl. 1836. Gen. n. 174 *b*. p. 15; 1841. Ench. p. 11.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Peltigerear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350. — De Notar. 1851. Mem. Ac. Torin. Ser. 2. XII. Sect.: Eusolorina, Pleurothea. — Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13. (Flora 1854. p. 235.) — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 355. — Arnold 1858. Flora I. p. 110.
Genth 1836. Nass. I. p. 322: g. Peltideacear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 65. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 62. — Bayrh. 1849. Taun. p. 63.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 104: g. Parmeliacear.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 22: g. Peltideor.
Synon. Sommerfeltia Flk.

Solstitiaria Hill 1769. Hort. kew. p. 62: nov. g. Associatar. ex typo Centaureae solstitialis.

Soltmannia (splendens) Herb. Berol.
= Eumiconiae sp. (Naud.)

Somatispongia Bowerbank 1845. Ann. and Mag. XV. p. 301: nov. g. Spongiar. aquae dulcis. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 603.

Somea „Bory" Wittst. vid. *Sommea Bory*.

Somerauera**) Hoppe 1819. Flora I. p. 26: nov. g. Octandr. Trigyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5348 *a*: sect. Cherleriae. (= *Siebera Schrad.* Rchb. Nom. Synon. p. 106.)
Endl. 1841. Ench. p. 505. n. 5227 *d* (*Sommerauera*): sect. Alsines.
= Alsines sect. Arctioideae Fenzl.

Somion Adans. 1763. Fam. II. p. 5: g. Fungor. (*Agaricum Mich.* t. 64. f. 3. 4. 5. — *Hydnum L.*)

Sommea***) Bory St. Vinc. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 94. t. 87: nov. g. Cynarocephalar. anomalar. (Boopidear. — S. calcitrapa.) *Cf.* Wittst. Et. Handw. p. 821 (*Somea*).
= Acicarpha Juss.

Sommera Schlechtend. 1834. Linnaea IX. p. 602: nov. g. Rubiacear., incertae sedis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3316. p. 564; 1841. Ench. p. 275. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2975. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 77.
Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116): g. Gardeniear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.

Sommerauera Endl. vid. *Somerauera Hoppe*.

Sommerfeldtia*) Schumacher 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 105: nov. g. pl. (S. obovata.)
= Drepanocarpus Meyer.

Sommerfeldtia Meisn., Schultz Bip. vid. *Sommerfeltia Less.*

Sommerfeltia Flörke . . .
= Solorina Achar.

Sommerfeltia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 189: nov. g. Asterear. (Conyza spinulosa Spr.)
DC. 1836. Pr. V. p. 302: g. Heteropappear. Par. Endl. 1838. Gen. n. 2344. p. 380; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126: *Sommerfeldtia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31: g. Bellidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3262: g. Boltoniear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (*Sommerfeldtia*): g. Erigerear.

Sommeringia Lindl. vid. *Sömmerringia Mart.*

Somphocarya Torr. ex Steud. Nom. I. p. 546; II. p. 610.
= Heleocharis Lestib.

Soncheae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 140: sect. Lactucear. Gen.: Sonchus, Picridium. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 394.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 418: div. Lactucacear. Gen. ead.

Sonchidium DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 247: sect. Dubyaeae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3027/1 *b*. p. 1389; 1841. Ench. p. 251. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3731. 2.
Synon. Lasiopus Don.

Sonchus**) Tourn. 1700. Inst. p. 474. t. 268: g. pl. class. XIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 197. Ed. Hall. 1745. p. 204: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 196: g. Cichoracear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 752. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 169. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 484. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 373. — DC. 1805. Franç. IV. p. 12. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 418. — D. Don 1825. Nepal. p. 163. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 887. — Link 1829.

---

*) σόλος, discus; ῥινός, scutum.
**) Dicat. Jgn. Somerauer, detectori.
***) Dicat. dom. Sommé.

*) Dicat. Sör. Christ. Sommerfeldt, botanico norvegico.
**) Nomen ex Plinio.

Sonchus Tourn. cont.
Hdb. I. p. 783. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 4. 28. — Math. 1853. Belg. I. p. 305. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 112.
Linn. 1737. Gen. p. 238. n. 617; 1737. Cliff. p. 384; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 244; 1753. Sp. II. p. 793; 1759. Syst. ed. X. p. 1192. n. 813; 1763. Sp. ed. II. p. 1115; 1764. Gen. ed. VI. p. 400. n. 908; 1767. Syst. ed. XII. p. 519: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 594; 1784. Syst. p. 712. — Reich. 1778. Gen. p. 398. n. 987. — Lour. 1790. Coch. II. p. 480. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 527. n. 1233. — Gmel. 1791. Syst. p. 1171. — Pers. 1797. Syst. p. 750; 1807. Ench. II. p. 362. n. 1763. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1509. n. 1403; 1809. En. p. 814. - Nutt. 1818. Gen. II. p. 124. — Link 1822. En. II. p. 279. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 402.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 9: g. Semiflosculosar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 123. — Batsch 1802. Tab. p. 250. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 483.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130 (sphalm. *Sanchus*); 1764. Syst. p. 241. n. 991: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 544.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.
Hill 1769. Ht. kew. p. 42: g. Ligulatar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 463: g. Chicoracear. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 230.
Neck. 1790. El. I. p. 47. n. 84: g. Glossariphytor.
Rebent. 1804. Neom. p. 90: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 579; 1826. Syst. III. p. 647. n. 2880; 1831. Gen. II. p. 644. n. 3239: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 138.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 61. 151 (*Laitron*); 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Lactucear. (Archetypar.) — Par. D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 145. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Bartl. 1830. Ord. p. 145. — Koch 1837. Syn. p. 432 (sect.: Cicerbita, Sonchus); 1844. Ed. II. p. 497. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 184. Sect.: Anoleptus, Eusonchus, Atalanthus. — Endl. 1838. Gen. n. 3003. p. 498; 1841. Ench. p. 250. Sect. (1841): Anoleptus, Eusonchus. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 500. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3705. (genuinar.) Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 33. — Walp. 1843. Rep. II. p. 690; 1847. VI. p. 359. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 489. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 833. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 115.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 431. Sejungitur Cicerbita.

Sonchus Tourn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2173; 1831. Fl. exc. p. 273: g. Scorzonerear. Sect. (1831): Mulgedium, Sonchus.
Less. 1832. Syn. p. 140: g. Sonchear. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 394. — Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 424. Subgen.: Prenocephalum, Acanthosonchus, Dendrosonchus, Lactucosonchus, Eusonchus, Pterosonchus.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 277: g. Liguliflorar.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 324: g. Crepoidear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 152: g. Compositar.
Soncorus Rumph. Amboin. t. 69. f. 2. = Kämpferia Linn.
Sondaria Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Sondari Rheede* V. t. 40.)
Sondera*) Lehmann 1844. Bot. Zeit. p. 109 (*cf.* Flora 1844. p. 82); 1844. Pl. Preiss. I. p. 256: nov. g. Droseracear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 62. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 434. — Endl. 1850. Spl. V. p. 44. n. $5033/_1$.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 187 Droserae injungit.
Sonerila Roxb. 1820. Fl. Ind. ed. Wall. I. p. 180. Ed. 1832. I. p. 176: nov. g. Triandr. Monogyn. (*Sonneri-Ila Rheede.*) — Par. Schult. 1822. Mant. I. p. 249. 270.
Jack 1820. Malay. Misc. I. n. 2. p. 7. *Cf.* Hook. 1831. Bot. Misc. II. p. 63.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 145. n. 143: g. Burmanniar.
D. Don 1825. Nepal. p. 154: g. Ericeis aff. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 22.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 410: g. Rhodoracear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3391 (err. etiam p. 60. n. 1211 inter Burmannieas et p. 174. n. 4644 inter Blakeaceas. *Cf.* Ind. ejusd. operis p. 286.)
Bartl. 1830. Ord. p. 156: g. Ericear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 170.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 35. n. 153: g. Melastomear.
Blume 1831. Flora II. p. 489: g. Miconiear. Sect.: Sonerila, Trigonocapsa. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 775. Sect. eaed.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 321: g. Melastomacear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 42: g. Sonerilear. — Par. Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 211. t. 44. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 10. — Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 319. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 884. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 561. Sect.: Sonerila, Sonerilopsis.
Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81): g. Lavoisierear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6192. p. 1209; 1841. Ench. p. 646. Sect.: Eusonerila, Trigonocapsa. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6700. Sect. ut Blume. — Walp.

*) Dicat. O. Guil. Sonder, Hamburg.

Sonerila Roxb. cont.
1843. Rep. II. p. 122 (sect. ut Endl.); 1846. V. p. 684. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Synon. Cassebeeria Dennst.

Sonerila Blume 1831. Flora II. p. 490: sect. Sonerilae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 775. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6700. 1.
= Eusonerila Endl.

Sonerileae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 42. Gen.: Sonerila, Sarcopyramis, Cyathanthera, Noterophila.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 315: subtrib. Miconialium. Gen.: Salpinga, Bertolonia, Lithobium, Sonerila, Triolena, Diolena, Eriocnema, Sphaerogyne, Phyllagathis, Gravesia. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 883.

Sonerilopsis Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 565: sect. Sonerilae. (S. heterostemon Naud.)

Sonneratia*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 38. n. 1396: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 464. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 337. n. 853. — Pers. 1797. Syst. p. 498. — Willd. 1799. Sp. II. p. 999. n. 986. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 506.
Juss. 1789. Gen. p. 325: g. Myrtor.
Neck. 1790. El. II. p. 80. n. 734: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 675: g. Decandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 13: g. Myrtoidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 165: g. Myrtear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80. — Poir. 1825. Dict. v. 37. p. 226 (*Pagapate*). — DC. 1828. Pr. III. p. 231. — Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4691. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 409. n. 2045. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 829. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 149. — Meisn. 1837. Gen. p. 108 (77). — Endl. 1840. Gen. n. 6312. p. 1231; 1841. Ench. p. 651. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738.
Pers. 1807. Ench. II. p. 33. n. 1213: g. Myrtacear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 327. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 38. 87.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 792: g. Aurantior.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 177. n. 6859: g. Psidiear.
Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 21. p. 336: g. Lythrariear.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 495: g. Sonneratiear.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 691: g. Lagerströmiear.
Synon. Blatti Rheede; Pagapate Sonn.; Aubletia Gärtn.

Sonneratia Comm. mss.
= Catha Forsk.

Sonneratieae Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 495: trib. Myrtacear. Gen.: Sonneratia.

*) Dicat. P. Sonnerat, peregrinatori.

Sonninia*) Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3437: g. Cynanchear. genuinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Asclepiadear. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3474. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Calotropidear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4987.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 589: g. Oxypetalar.
Synon. Diplolepis R. Brown, non Zoolog.; Diplolepium Dumort.

Soo-tsiku Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 898.
= Rhapis Linn. f.

Sophandra „Don" Meisn. Comm. p. 152 in synon. Ericae (et in Ind.): sphalm. pro *Lophandra*.

Sophia Adans. 1763. Fam. II. p. 417: g. Erucar.
Hall. 1768. Helv. n. 484.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 689: subsect. Sisymbrii.
Webb 1836. Canar. I. p. 73: sect. Descurainiae.
Rchb. 1841. Nom. p. 183. n. 7035: g. Sisymbriear. genuinar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 96: sect. Sisymbrii.
= Descurea Guett.

Sophia Linn. 1775. Amoen. ac. VIII. Ed. 1785. p. 259: nov. g. Monadelph. non descriptum.
= Carolinea Linn. f.

Sophisteques Commers. mss.
= Gomphia Schreb.

Sophoclesia**) Klotzsch 1851. Linnaea XXV. p. 29: nov. g. Vacciniear. (Sphyrospermum cordifolium Benth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1085.

Sophora***) Linn. 1737. Gen. p. 125. n. 350; 1737. Cliff. p. 156; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 373; 1759. Syst. ed. X. p. 1015. n. 456; 1762. Sp. ed. II. p. 533; 1764. Gen. ed. VI. p. 204. n. 508; 1767. Syst. ed. XII. p. 287. n. 503: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 325; 1784. Syst. p. 391. — Reich. 1778. Gen. p. 209. n. 551. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 275. n. 694. — Gmel. 1791. Syst. p. 664. — Pers. 1797. Syst. p. 418; 1805. Ench. I. p. 452. n. 1003. — Willd. 1799. Sp. II. p. 499. n. 805; 1809. En. p. 436. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 280. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 316.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 91. n. 370: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 69.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Lomentacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 98.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar.

*) Dicat. C. N. Sig. Sonnini de Manoncourt, peregrinatori.
**) Dicat. poëtae Sophocli.
***) *Sophera* apud Arabes nomen plantae huic proximae. (Ht. Cliff.)

Sophora Linn. cont.
— Par. Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 33. — Scop. 1777. Intr. p. 297. — Juss. 1789. Gen. p. 352. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 383. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 211. — Hedw. 1806. Gen. p. 293. n. 1166. — R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 2. (Verm. bot. Schr. II. p. 451.) — Link 1821. En. I. p. 400. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 346. n. 1639; 1830. Gen. I. p. 363. n. 1830. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 468. — Schott 1830. Wien. Zeitschr. III. p. 844. (Char. sejuncto Styphnolobio reform.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 55. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1497.

Adans. 1763. Fam. II. p. 318: g. Cassiar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.

Hill 1769. Ht. kew. p. 312: g. Pentapetalar. irregular.

Neck. 1790. El. III. p. 49. n. 1369: g. Cyteophytor. Sejungitur Aphora.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 741: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 95. Sect.: Eusophora, Pseudosophora. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4090. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — Ledeb. 1830. Alt. I. p. 109; 1842. Ross. I. p. 716. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 109. Sect. ut DC. et Disemaea. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 160. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 179. — Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57). Sect.: Styphnolobium, Radiusia, Sophora. — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 87. Sect. ut G. Don et Maya. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 389. Sect. ut DC. et Styphnolobium. — Endl. 1841. Gen. n. 6738. p. 1308; 1841. Ench. p. 673. Sect.: Maya, Eusophora, Dichosemaea, Pseudosophora, Patrinia? — Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6043. Sect.: Maya, Sophora, Dichosemaea. — Walp. 1842. Rep. I. p. 806; 1843. II. p. 903. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 83. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 394. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 683. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 124. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 586.

Link 1831. Hdb. II. p. 146: g. Sophoracear.

Sophoraceae Link 1831. Handb. II. p. 143: sect. Papilionacear. Gen.: Cercis, Eutaxia, Callistachys, Chorizema, Podaliria, Baptisia, Anagyris, Edwardsia, Sophora.

Sophoreae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 741: div. Leguminosar. Gen.: Sophora, Edwardsia, Ormosia, Anagyris, Thermopsis, Virgilia, Cyclopia, Podaliria, Chorizema, Podolobium, Brachysema, Gompholobium, Viminaria, Sphaerolobium, Aotus, Dillwynia, Pultenaea, Daviesia, Cercis; Mirbelia, Callistachys.

Bronn 1822. Diss. p. 131: trib. Curvembryar. Gen.: Myrospermum, Edwardsia, Sophora, Ormosia, Virgilia, Anagyris, Thermopsis, Cyclopia, Euchylus, Viminaria, Daviesia, Podalyria, Baptisia, Burtonia, Gompholobium, Jacksonia, Dillwynia, Pultenaea, Gastrolobium, Sclerothamnus, Oxylobium, Brachysema, Podolobium, Chorizema, Callistachys, Mirbelia, Sphaerolobium, Aotos.

Sophoreae Spreng. cont.

DC. 1825. Pr. II. p. 94 (Lég. mém. V.): trib. (1) Papilionacear. Gen. ut Bronn et Macrotropis, Eutaxia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 94. 108. Gen. ead. et Piptanthus. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. 158. Gen. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57). Gen. ut Don et Lacara?, Ammodendron, Layia? — Endl. 1841. Gen. p. 1307; 1841. Ench. p. 673. Gen. ut Benth. 1838 et Cladrastis, Macrotropis, Castanospermum, Gourliea. — Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 133. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen.: Styphnolobium, Edwardsia, Sophora, Cadia, Ammodendron, Calpurnia, Virgilia, Cladrastis, Bowdichia, Gourliea, Ormosia, Dibrachion, Alexandrina, Diplotropis, Spirotropis, Macrotropis, Callerya, Myrospermum, Castanospermum?, Dalhousiea, Delaria. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 272. Gen. ut Endl. (exclusa Cercide) et Dibrachion.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVIII; 1828. Consp. p. 154: div. Cassiear. Gen. ut DC. et 1828 Xeropetalum, Ammodendron, Delaria; Exostyles?, Melanoxylon?, Acosmium?, Lacara?

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: trib. Leguminosar. Gen. fere ut Bronn. — Par. Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 85. Gen.: Myrospermum, Edwardsia, Sophora, Styphnolobium, Virgilia, Ormosia, Diplotropis, Bowdichia, Calpurnia, Cercis, Ammodendron.

Bartl. 1830. Ord. p. 408: div. Papilionacear. Gen. ut DC. et Delaria, Xeropetalum. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 544.

Rchb. 1837. Hdb. p. 226: subdiv. Genistear. Gen. ut 1828.

Rchb. 1841. Nom. p. 154: div. Cassiacear. Gen. ut Endl. et Radiusia?, Patrinaea? Sect.: Moringeae.

Sophorocapnos Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 570: nov. g. Fumariacear., Corydali aff. (Corydalis pallida Turcz.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 707. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 27.

Sophronanthe Benth. 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 445: nov. g. Gratiolear. (*Cf.* Meisn. Comm. p. 221 sub *Gratiola.*) — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Walp. 1845. Rep. III. p. 298. 966.

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 405: sect. Gratiolae.

Sophronia*) Lichtenst. 1817 in Röm. & Schult. Syst. I. p. 343. 482. n. 134: nov. g. Iridear. (S. caespitosa.) *Cf.* Meisn. Comm. p. 293 sub *Witsenia.* — Par. Leman 1827. Dict. v. 49. p. 471.

Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 4: g. Ixiear.

= Witsena Thunb.?

---

*) σώφρων, modestus.

Sophronia „Pers." Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 178. t. 1. f. 2: nov. g. Fungor. (Phallus indusiatus Vent., etc.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Phalloideor.?
= Hymenophallus Nees.

Sophronia Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1129: nov. g. Vandear. (S. cernua.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1490.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.
= Sophronitis Lindl.

Sophronitis Lindl. 1828. Bot. Regist. XIV. t. 1147 adnot.; 1838. Sert. Orchid. t. 5. f. 2; 1840. Misc. not. nr. 18.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 676. n. 3417: g. Orchidear. — Par. Hook. 1838. Bot. Mag. t. 3677.
Endl. 1837. Gen. n. 1397. p. 196; 1841. Ench. p. 110: g. Epidendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 1996. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.
Synon. Sophronia Lindl.

Sopoubia Endl. vid. *seq.*

Sopubia*) Hamilt. mss." D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 88: nov. g. Scrophularinar. (S. trifida.)
Spreng. 1827. Cur. post. p. 222; 1831. Gen. II. p. 494. n. 2435: g. Scrofularinar.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218 (*Sopulina*): g. Scrofularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3163: g. Antirrhinear.
Benth. 1835. Scroph. ind. p. 49; 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 210. t. 11: sect. Gerardiae.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gerardiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 559. — Endl. 1839. Gen. n. 3998. p. 691; 1841. Ench. p. 340 (*Sopoubia*). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Meisn. 1840. Gen. p. 309 (220). — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4520. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 539. — Walp. 1845. Rep. III. p. 388. 970. — Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 507. 521: g. Sopubiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 706.
Synon. Raphidophyllum Hochst.

Sopubieae Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 507: sect. Gerardiear. Gen.: Graderia, Sopubia, Aulaya, Harveya, Centranthera.

Sopulina Juss. vid. *Sopubia Ham.*

Soramia Aublet 1775. Guian. I. p. 552. t. 219: nov. g. Polyandr. Monogyn. (S. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 821. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 372.
Scop. 1777. Intr. p. 266: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 433: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 279. n. 1044: g. Catizophytor.
Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 472: g. Dilleniacear.
= Doliocarpi Roland. pars.

*) Nomen vernaculum *Sopubi-sua.*

Soranthe Salisb. . . .
= Sorocephalus R. Brown.

Soranthera Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 19: nov. g. Gasterocarpeis, Dictyoteis et Ulvoideis intermedium.
Endl. 1843. Spl. III. p. 25. n. 96: g. Dictyotear. — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 120. (dubiae affinitatis.) — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 566. n. 373. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 425: g. Punctariear.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 117: g. Dictyotacear.

Soranthus*) Ledeb. 1828. Ic. pl. I. p. 20. t. 82; 1829. Fl. Alt. I. p. 344; 1844. Fl. Ross. II. p. 271: nov. g. Seselinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3714; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5420. — DC. 1830. Pr. IV. p. 669. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 307. — Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4428. p. 774; 1841. Ench. p. 378.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Sorastrum Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 144; 1849. Sp. Alg. p. 195. n. 149: nov. g. Desmidiear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 51.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Pediastrear. — Par. Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 98.

Sorbaria Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 545: sect. Spiraeae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4449 *c*; 1841. Nom. p. 168. n. 6510. 4. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 520. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 442. — Endl. 1840. Gen. n. 6391 *c*. p. 1247; 1841. Ench. p. 660. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 15.
Synon. Schizonotus Lindl.

Sorbus Tourn. 1700. Inst. p. 633: g. pl. class. XXI, ab Auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 126. Ed. Hall. 1745. p. 140: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 144. n. 405; 1737. Cliff. p. 188; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 477; 1759. Syst. ed. X. p. 1057. n. 548; 1762. Sp. ed. II. p. 683; 1764. Gen. ed. VI. p. 250. n. 623: 1767. Syst. ed. XII. p. 343: g. Icosandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 388; 1784. Syst. p. 465. — Reich. 1778. Gen. p. 256. n. 679 (*Sobrus*). — Schreb. 1789. Gen. I. p. 338. n. 855. — Pers. 1797. Syst. p. 499. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1008. n. 989; 1809. En. p. 520. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 305. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 294. 314.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 350: g. Pomiferar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 7.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 275. n. 1131: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 335. — Gis. 1792. Prael. p. 444. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 337. — DC. 1805. Franç.

*) *σωρός*, cumulus; *ἄνθος*, flos.

Sorbus Tourn. cont.
IV. p. 435. — Pers. 1807. Ench. II. p. 38. n. 1227. Sect.: Aria, Sorbus. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 308. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 627. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 91. — Koch 1836. Syn. p. 236. Ed. II. p. 261. — Kunth 1838. Berol. I. p. 209. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 93. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 101. 136. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 572. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 685.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 183. — Link 1822. En. II. p. 35. — Lois. 1827. Dict. v. 49. p. 480.
Adans. 1763. Fam. II. p. 296: g. Rosar.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 178: g. Calycifloрar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 83.
Scop. 1772. Carn. I. p. 346: sect. Mespili. (M. aucuparia.)
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 290. 291. *Cf. Aucuparia Medic.*
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 138. 155: g. Mespilor. (S. domestica L.)
Neck. 1790. El. II. p. 75. n. 726: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 834: g. Polyandr. Trigyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 222.
Medic. 1793. Gesch. d. Bot. p. 87; 1794 in Usteri n. Ann. III. p. 93: g. Thalamo-Mallonandriae. (S. domestica.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 563: sect. Pyri. — Par. Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. p. ... *Cf.* Flora 1823. I. p. 163. — DC. 1825. Pr. II. p. 636. — Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4470 *c;* 1841. Nom. p. 169. n. 6540. 3. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 648. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 472. — Endl. 1840. Gen. n. 6342 *f.* p. 1237; 1841. Ench. p. 656. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 99.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Pyrear.

Soredospora*) Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 12; 1842. V. p. 9; 1842. Anl. Mycol. p. 34: nov. g. Bactridiacear. (S. Graminis.)
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 139: g. Bactridiaceor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 87: g. Sporotricheor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44 (*Soredosporium*): g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Helminthosporeor.
= Cometella Schw.?

Soredosporium Lindl. vid. *praeced.*

Sorema**) Lindl. 1844. Bot. Regist. t. 65; 1847. Veg. kingd. p. 654: nov. g. Nolanacear. (Nolana paradoxa Lindl.) *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 146 et Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 209. — Par. Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 368.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 547: g. Nolanear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 11: sect. Nolanae.

*) σωρηδόν, acervatim.
**) σωρός, cumulus.

Sorga Adans. 1763. Fam. II. p. 38: sect. 7 Graminum. Gen.: Sorgum, Andropogon, Schoenanthus, Digitaria.

Sorgheae Nees 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 238: subtrib. Saccharinear. Gen.: Chrysopogon.

Sorghum*) Mönch 1794. Meth. p. 207: g. Thalamostemonis. (Holcus saccharatus et bicolor L.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 101. n. 180: g. Triandr. Digyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 64.
Hedw. 1806. Gen. p. 43. n. 204: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 131. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 53. 836. n. 383. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 291. n. 303. — Link 1829. Hdb. I. p. 93.
Willd. 1809. Enum. p. 1036: g. Polygam. Monoec.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 180. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 984; 1830. Fl. exc. p. 34. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Trin. 1820. Fund. p. 188: g. Graminum. — Par. Link 1821. En. I. p. 80. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 12.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 542: sect. Andropogonis. (*Synon. Blumenbachia Köl.*) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1330. 4. — Steud. 1854. Glum. I. p. 393.
Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.
Link 1827. Hort. I. p. 244: g. Villiflorar.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 327: g. Andropogineor.
Koch 1837. Syn. p. 770. Ed. II. p. 890: g. Andropogonear. — Par. Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 476. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 20. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 255. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 442. — Parlat. 1850 in Webb Canar. III. p. 427. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 470. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 502.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 473; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 475: g. Saccharear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: in synon. Trachypogonis.
Conf. Sorgum Mich.; Trachypogon Nees.

Sorgum Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: nov. g. pl. class. XIV a (non descriptum).
Adans. 1763. Fam. II. p. 38: g. Sorgorum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Andropoginear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 62. n. 305: g. Graminum.
= Sorghum Mönch.

Soria Adans. 1763. Fam. II. p. 421: g. Thlaspium. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 489.
Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 168. t. 25. f. 3.
= Euclidium R. Brown.

Soridium Miers .... Linn. Trans. XXI. p. 49; 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 325: nov. g. Triuriacear. (ibid. p. 327 Sciaphilear.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 918.

*) Nomen barbarum.

Sorindeia*) Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 80 in Römer Collect. bot. p. 214: nov. g. Terebintacear. (An Mangifera pinnata L.?)
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 431 (Verm. bot. Schr. I. p. 200): g. Amyridear.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 342 (Gen. Tereb. p. 10): g. Terebinthacear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 490.
DC. 1825. Pr. II. p. 80: g. Burseracear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 245.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3847: g. Burserear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 394.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 86: g. Burseriacear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 170: g. Anacardiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 412.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (54): g. Cassuviear.
Endl. 1840. Gen. n. 5895. p. 1128; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 13. p. 204.
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5658: g. Pistaciear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 84.

Sorindeja Kunth, Walp. vid. *praeced.*

Sorocea A. St. Hilaire 1821. Mém. Mus. VII. p. 473: nov. g. Urticear. (S. diclinis.) — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 204.
Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1821; 1837. Hdb. p. 172: g. Cecropiear.
Endl. 1837. Gen. n. 1864. p. 280; 1841. Ench. p. 168: g. Artocarpear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261).
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2539: g. Pouroumear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 38: g. Artocarpidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear.
Tréc. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 145: g. Brosimear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 667.
Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 111: g. Soroceear.
Rupr. 1858. Bull. Ac. Pet. XVI. p. 276. (Observ. circa Parthenogenesin.)

Soroceeae Miquel 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 82. 111: subtrib. Artocarpear. propriar. Gen.: Sorocea.

Sorocephalus**) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811.) p. 139 (Verm. bot. Schr. II. p. 224): nov. g. Proteacear. (Spatallae sp. Salisb.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 22. 389. n. 532. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 470. n. 505; 1830. Gen. I. p. 103. n. 515. — Poir. 1827. Dict. v. 49. p. 492. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 521.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 331: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1737; 1841. Nom. p. 63. n. 2385: g. Proteear. (genuinar.) Sect. (1841): Sorocephalus, Cardiocaryon. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 418. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 303. Sect. ut Endl.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Protear.
Endl. 1838. Gen. n. 2128. p. 338; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 79: g. Proteinar. Sect.: Mischocaryon, Cardiocaryon.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (244): g. Proteinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Proteidar.
Synon. Soranthe Salisb.

Sorocybe Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 468: nov. g. Sporocybeor. (Sporocybe resinae.)

Sorodiscus Allm. 1846. Rep. Brit. Assoc. II. p. 89: nov. g. Algar., Coleochaetae aff.

Soromanes Fée 1844. Acrost. p. 16. 82; 1852. Gen. Fil. p. 50: nov. g. Acrostichear. (S. serratifolium.)
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 430: sect. Polybotryae.

Sorosia*) L. & C. Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 98: sect. Nidulariae. (Cyathus globosus Ehr., etc.)

Sorospora Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 309: nov. g. Palmellear.
= Microhaloa et Gloeocapsa Kütz.

Sorosporium Rudolphi 1829. Linnaea IV. p. 116. t. 2: nov. g. Coniomycetor. (S. Saponariae.)
= Schizoderma Kunze.

Sorostachys Steudel 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Cyperacear. (Nomen.)
Steud. 1855. Glum. II. p. 71: g. Cyperear. (S. kyllingioides.) — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 295.

Sotor*) Fenzl 1843 in Cons. Nat. Cur. Graz. (Flora 1844. p. 42): nov. g. Crescentiear., Spathodeae Palis. proximum. — Par. Seem. 1853. Fl. panam.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674: g. Crescentiacear.
= Kigelia DC. (Seem. 1854.)

Souala Lindl. vid. *Soala Blanco.*

Souari Endl., Rchb. vid. *Saouari Aubl.*

Soubeyrania Necker 1790. Elem. bot. I. p. 365. n. 563: nov. g. Plasyrgophytor., a Barleria L. sejunctum.

Soulamea Lamarck 1783. Dict. I. p. 449. *Cf.* Juss. 1817. Dict. v. 5. p. 243 (*Bouati*).
Juss. 1789. Gen. p. 429: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 249. n. 1012 (*Sulamea*).
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 361 (*Sulamea*): g. Hexandr. Digyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 335: g. Polygalear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 2. p. 60. (*Cf.* Linnaea I. p. 646.) — Spreng. 1826. Syst. III. p. 172. n. 2490; 1827. Cur. post. p. 130; 1830. Gen. I. p. 281. n. 1454. — Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3035. — A. St. Hil. & Moq. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 334. — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXXIX. 1379. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 364 (*Soulamia*). — Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). —

*) *Von Sorindi* incolarum.
**) *σωρός,* cumulus.

*) *σωρός,* congeries, unde: sorosus.
**) Nomen vernaculum.

Soulamea Lamarck cont.
Endl. 1840. Gen. p. 1080. n. 5658. (anomal.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1200.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Polygalacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378.
Endl. 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 188. t. 16.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 152: g. KramerIear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6791.
Endl. 1841. Ench. p. 570: g. Soulamear.
Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 576: g. Ailanthear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 168. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. n. 5967/$_4$.
Synon. Cardiocarpus Reinw.; Cardiophora Benth.

Soulameae Endl. 1841. Ench. p. 570: fam. Polygaleis aff. Gen.: Soulamea.

Soulamia G. Don vid. *Soulamea Lam.*

Soulangia*) Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 377. t. 17: nov. g. Rhamnear. (Phylica axillaris Lam.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 42. — Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1498. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 471. — Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. I. p. 135. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50).
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3805: g. Ceanothear.
Endl. 1840. Gen. n. 5740. p. 1101; 1841. Ench. p. 581: g. Phylicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5580. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 122.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Souroubea Aublet 1775. Guian. I. p. 244. t. 97: nov. g. Pentandr. Monogyn. (S. guianensis.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 355 (*Surubea*). — Hedw. 1806. Gen. p. 155. n. 662 (*Surubea*).
Juss. 1789. Gen. p. 428: g. an Rhamnis, an Berberidibus aff.?
Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104: g. Guttiferar.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 218: g. Marcgraviacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 236.
= Ruyschia Jacq.

Southbya Spruce 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 501: nov. g. Hepaticar., Jungermanniae et Alicularíae comparatum.

Southwallia Steud. Nom. II. p. 613: lege *Southwellia.*

Southwellia**) Salisb. .... Parad. t. 69.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 310: g. Sterculiacear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 507.
Schott. & Endl. 1832. Melet. p. 32: g. Sterculiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 30 (25).
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Southwelliear.
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *b*. p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 2.

Southwellia Salisb. cont.
Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. 5319 *c β*: subsect. Ivirae.
Synon. Balanghas Burm.; Cavalam Adans.; Astrodendrum Dennst.; Astrodendron Wittst.

Southwellieae Rchb. 1837. Handb. p. 291: subsect. Sterculiear. genuinar. Gen.: Sterculia, Southwellia, Trichosiphum, Cola, Cavallium.

Souza Flor. Flum. VII. t. 1—3 (Comes, Marchia et Proregia). *Cf.* Steud. Nom. II. p. 613.
= Sisyrinchium Linn.

Sowelewskia Rchb. vid. *Sobolewskia MB.*

Sowerbaea*) Smith 1800. Linn. Trans. V. p. 159: nov. g. Hexandr. Monogyn. (S. juncea.)
Hedw. 1806. Gen. p. 232. n. 941 (*Sowerbea*): g. Asphodelear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 285. Ed. Nees p. 141. — Agdh. 1823. Aphor. p. 164. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 48. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 265. n. 1381. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LIX. 999. — Bartl. 1830. Ord. p. 51. (descisc.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1129 (*Soberbaea*). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 33.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 244; 1825. Syst. II. p. 40. n. 1187: g. Spathacear.
Link 1821. En. I. p. 316: g. Narcissinar.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 181: g. Narcissear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1152: g. Xyridear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Alliacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Ornithogalear.
Endl. 1837. Gen. n. 1138. p. 147; 1841. Ench. p. 84: g. Anthericear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1792. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305): g. Aphyllanthear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 17 (*Sowerbea*): g. Xerotear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 640: g. Asphodeleis aff. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256.

Sowerbea Hedw., Brongn. vid. *Sowerbaea Smith.*

Soya Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Glycinear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6649. p. 1291; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5805. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 222. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 552.
= Soja Mönch.

Soyeria**) Monnier 1829. Ess. Hierac. p. 74: nov. g. ab Hieracio sejunctum. *Cf.* Flora Lit. I. p. 73.
Less. 1832. Syn. p. 142: g. Picrosiear.
Koch 1837. Syn. p. 442. Ed. II. p. 508: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.

*) Dicat. Et. Soulange-Bodin.
**) Dicat. Rob. Southwell, botanophilo.

*) Dicat. James Sowerby, botanico anglo.
**) Dicat. Soyer-Willemet.

Soyeria Monnier cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3029. p. 501; 1841. Ench. p. 251: g. Hieraciear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3716. 3: sect. Crepidis.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 342: g. Crepoidear.
Synon. Catonia Cass.; Lepicaune Lapeyr.; Hapalostephium Don; Hieracioides DC.

Soymida A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 250. t. 22. f. 26: nov. g. Swieteniear. (Swietenia febrifuga Roxb.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 110. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 122. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 168. — Meisn. 1837. Gen. p. 47 (35). — Rchb. 1837. Hdb. p. 313 (genuinar.); 1841. Nom. p. 213. n. 8086. — Endl. 1840. Gen. n. 5551. p. 1054; 1841. Ench. p. 553. — Walp. 1842. Rep. I. p. 436. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 129. 134.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 462: g. Swietenear.

Spachea*) A. Juss. 1837 in Deless. Ic. sel. III. p. 19. t. 31; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 325; 1843. Arch. Mus. III. p. 325: nov. g. Malpighiear. Sect.: Spachea, Meckelia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7867. (genuinar.) Sect. eaed. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 268. — Meisn. 1843. Comm. p. 346. — Walp. 1846. Rep. V. p. 187. Sect. eaed.
Endl. 1840. Gen. n. 5591. p. 1064; 1841. Ench. p. 557; 1842. Spl. II. p. 85: g. Apterygiar. Sect. (1842) eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Malpighear.

Spachia Lilja 1840. Trädgardtidning p. 62, serius *Ellobium*.
= Fuchsia Spach.

Spadactis*) Cassini 1827. Dict. v. 47. p. 499. 510; 1827. v. 50. p. 51; 1830. v. 60. p. 570: g. Carlinear. Archetypar., ab Atractylide L. sejunctum. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9.
DC. 1837. Pr. VI. p. 550: sect. Atractylidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2860 *e*. p. 470; 1841. Ench. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3659. 5.

Spadicales Batsch 1802. Tab. affin. p. 158: ordo Incompletar. Fam.: Aroideae, Inundatae.

Spadicatae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 65: class. (15) Spathanthar. Ord.: Typharieae, Piperarieae, Ararieae, Balanophorarieae, Cycadarieae.

Spadiceae Scopoli 1777. Introd. p. 67: gens Obsoletar. Gen. §. 1: Zostera, Artocarpus, Casuarina, Valisneria, Ambrosinia, Calla, Piper, Potos, Dracontium, Arum. §. 2: Palmae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: div. Petaloidear. Ord.: Balanophoreae, Pandaneae, Aroideae, Typhaceae, Fluviales, Juncagineae, Pistiaceae.

*) Dicat. Ed. Spach, botanico Parisiensi.
**) σπάδων, castratus.

Spadiceae Scopoli cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 132: class. Cryptocotyledonear. Trib.: Acoroideae, Pandaneae, Aroideae, Cycadeae, Palmae.

Spadicia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: ordo Insolitegmiae. Fam.: Typhaceae, Aroideae, Naiadeae, Pandaneae, Cycadeae.

Spadiciflorae Endl. 1837. Gen. p. 232; 1841. Ench. p. 126: class. (21) Amphibryor. Ord.: Aroideae, Typhaceae, Pandaneae.
Meisn. 1842. Gen. p. 353. 442 (264): class. (40) Monocotyledonear. Ord.: Palmae, Pandanaceae, Typhaceae, Aroideae. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 66. Fam.: Aroideae, Potamogetoneae, Typhaceae, Cyperaceae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: subdiv. Perispermear. Fam.: Lemnaceae, Pistiaceae, Araceae, Orontiaceae, Typhaceae, Pandaneae, Cyclantheae; Palmae.

Spadicinae Agardh 1822. Aphor. p. 130; 1825. Class. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: class. 2 Cryptocotyledonear. Ord.: Acoroideae, Pandaneae, Aroideae, Cycadeae, Palmae. *Cf. Spadicineae* Agdh. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. p. 101.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Ternariar. Fam. 31—41.

Spadonia*) Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 80: nov. g. Phalloideum. *Cf.* Batt. Hist. p. 75. t. 40. f. A. E.
Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 203: g. Trichodermacear. submitratar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 769. n. 3937: g. Trichodermear.
Endl. 1836. Gen. n. 304. p. 25; 1841. Ench. p. 16: g. Onygeneor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 380. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. (?)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 23; 1842. Mycol. p. 92: g. Lycoperdaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 360: g. Dermateor.
Synon. Foetidaria St. Hil.?

Spadonia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 99: nov. g. Mutisiear.
Endl. 1838. Gen. p. 483. n. 2914: g. Eumutisiear.
= Moquinia DC.

Spadonisma DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 23: sect. Moquiniae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2914 *a*. p. 1385; 1841. Ench. p. 248.

Spadostyles Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 80: nov. g. Pultenaear. (Pultenaea euchila DC.)
Endl. 1840. Gen. n. 6445. p. 1258; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 574. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5939: g. Pultenaeear.
Meisn. 1843. Comm. p. 350: g. Sophorear.

Spadothea Dumort. vid. *Spathodea Palis.*

Spaendoncea**) Desf. (Déc. phil. polit. et litt. VII. p. 259) 1796 in Usteri n. Ann.

*) σπάδων, eunuchus.
**) Dicat. Gerh. van Spaendonck, pictori.

Spaendoncea Desf. cont. XIII. p. 15: nov. g. Leguminosar. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 64.
= Cadia Forsk.

Spaerocarya Rchb. vid. *Sphaerocarya Wall.*

Spaerophorus Schär. En. Lich. eur. p. 176: sphalm. pro *Sphaerophorus.*

Spaetalumeae Nuttall ex Torr. & Gray Fl. North-Amer. I. p. 677.
= Lewisieae Hook.

Spalanthus Walp., Miq. vid. *Sphalanthus Jack.*

Spalanzania Dietr. vid. *Spallanzania Poll.*

Spalanzania Endl. Ench. p. 274: vid. *Spallanzania DC.*

Spallanzania*) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 79. n. 733: g. Sarcodiphytor. (*Pirigara Aubl.*)
= Gustavia Linn.

Spallanzania Pollin. 1816. Giorn. fis. Pav. p. 187 c. ic.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 862: g. Sanguisorbear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 245. n. 1493; 1830. Gen. I. p. 320. n. 1633: g. Rosacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230 (*Spalanzania*). 1311.
= Aremonia Neck.

Spallanzania DC. 1830. Prodr. IV. p. 406: nov. g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 514. — Endl. 1838. Gen. n. 3255. p. 552; 1841. Ench. p. 274 (*Spalanzania*). — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2891.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.

Spanante Steud. vid. *seq.*

Spananthe**) Jacq. 1789. Coll. III. p. 247.
Gmel. 1791. Syst. p. 478: g. Pentandr. Digyn.
Gis. 1792. Pracl. p. 508 (sphalm. *Spanathe*): g. Umbellatar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 191. n. 786.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 34: g. Thalamostemonis.
Hoffm. 1813. Umbell. p. 34: g. Umbelliferar. — Par. Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 93. (Divis. 1.) — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 25. — Link 1821. En. I. p. 261. — Kunth 1824. Syn. III. p. 104. — Bartl. 1830. Ord. p. 236. (descisc.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 630; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXII. 356; 1825. Syst. I. p. 878. n. 1035; 1830. Gen. I. p. 220. n. 1135: g. Hydrocotylinar.
A. Rich. 1820. Ann. sc. phys. IV. p. 160. t. 50. f. 2.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 142: g. Hydrocotylinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3768: g. Hydrocotylear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Bolacinear.

*) Dicat. Laz. Spallanzani, prof. Paviensi.
**) σπανός, rarus, parcus.

Spananthe Jacq. cont.
DC. 1830. Pr. IV. p. 81: g. Mulinear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5525. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4376. p. 766; 1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934. — Steud. 1841. Nom. II. p. 613 (*Spanante*). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 110. — Fenzl 1850 in Endl. Gen. Spl. V. p. 3. (ampliat.) Sect.: Huanaca, Euspananthe.
Tausch 1834. Flora I. p. 353: g. Azorellear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: g. Tetragonospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.

Spanathe Giseke vid. *Spananthe Jacq.*

Spanioptilon*) Lessing 1832. Syn. Compos. p. 10: nov. g. Carduinear. (Carduus linearis Thunb.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 621. — Endl. 1838. Gen. n. 2883, p. 477; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 225 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3909: g. Cirsiear.

Spanoghea Blume 1850. Rumphia III. p. 172: nov. g. Cupaniear. (S. ferruginea et glabra.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 219: g. Sapindear.

Spanotrichum „E. Meyer mss." DC. 1837. Prodr. VI. p. 291: sect. Osmitae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2784 c. p. 454; 1841. Ench. p. 244. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3542. 3.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25: g. Anthemidear. verar.

Sparangium Ritgen vid. *Sparganium Tourn.*

Sparassidei Rchb. 1841. Nomencl. p. 11: sect. Clavarieor. Gen.: Sparassis, Martella.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 330: subsect. Clavariacear. Gen.: Sparassis.

Sparassis**) Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 80: nov. g. Fungor. (Clavaria crispa.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 66.
Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 464; 1828. Elench. I. p. 227: g. Clavator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 577: g. Clavariear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 88: g. Pileolator. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 305. — Endl. 1836. Gen. n. 420. p. 36; 1841. Ench. p. 20.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 533: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Fries 1838. Epicr. p. 570: g. Clavarieor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 435: g. Sparassideor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 330.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41; 1842. Mycol. p. 173: g. Clavariacear.

*) σπάνιος, tenuis; πτίλον, pluma.
**) σπαράττω, dilacero.

Sparassis Fries cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 337: g. Clavarineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 167: g. Clavariaceor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 20. t. 27.

Sparattanthelium Martius 1837. Herb. Bras. p. 280; 1841. Flora Beibl. p. 40: nov. g. Gyrocarpo aff.
Mart. 1841 in Regensb. Denkschr. III. p. 298. t. 11.
Endl. 1842. Spl. II. p. 35. n. 2068/₁: g. Gyrocarpear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 368.

Sparattophyllum Philippi 1857. Bot. Zeit. p. 721: sect. Jaborosae. An genus?

Sparattosperma „Martius mss." DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 300 (208); 1845. Prodr. IX. p. 203: nov. g. Catalpear. (Pleostictidum.)
Endl. 1841. Ench. p. 346. n. $4118/_3$: g. Tecomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.

Sparaxis*) Bell.-Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 225: nov. g. Ensatar. (Ixia fragans Jacq., etc.)
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 319: g. Gladiolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1197; 1841. Nom. p. 44. n. 1579.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 252; 1825. Syst. I. p. 149. n. 153; 1830. Gen. I. p. 37. n. 165: g. Spathacear.
Ker 1827. Irid. gen. p. 19: g. Iridear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 67. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1241. p. 168; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 159. — Meisn. 1842. Gen. p. 392 (294). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23.
Eckl. 1827. Verz. p. 27: g. Ixiacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Ixiear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 92.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.

Sparganieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: trib. Typhacear. Gen.: Sparganium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 149; 1841. Nom. p. 43: div. Typhacear. Gen. id.

Sparganioideae Link 1829. Handb. I. p. 133: subordo Cyperoidear. Gen. unicum: Sparganium.

Sparganion Adans. vid. *Sparganium Tourn.*

Sparganium**) Tourn. 1700. Inst. p. 530. t. 302: g. pl. class. XV. — Par. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 325.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 307: g. pl. class. XIV.
Linn. 1737. Gen. p. 281. n. 706; 1737. Cliff. p. 439; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 971; 1759. Syst. ed. X. p. 1260. n. 925; 1763. Sp. ed. II. p. 1378; 1764. Gen. ed. VI. p. 480. n. 1041; 1767. Syst. ed. XII. p. 615: g. Monoec. Triandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 215. — Murr. 1774. Syst. p. 702; 1784. Syst. p. 841. — Reich. 1778. Gen. p. 475. n. 1132. — Schreb.

*) σπάραξις, dilaceratio.
**) σπαργάνιον s. σπάργανον, fascia, fasciola.

Sparganium Tourn. cont.
1791. Gen. II. p. 621. n. 1402. — Pers. 1797. Syst. p. 885. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 199. n. 1635; 1809. En. p. 952. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 202. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 2. 16.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 259: g. Graminibus adfine.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 133: g. Graminum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 14. n. 48: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 361.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Inundatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 66.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 471 (*Sparganion*): g. Aror.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calamariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 129. — Batsch 1802. Tab. p. 154. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 582.
Hill 1769. Ht. kew. p. 376: g. Triphyllar. incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462: g. Aracear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 75. t. 19. f. 4 (erectum).
Juss. 1789. Gen. p. 26: g. Typhar. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 338. Ed. Nees p. 194. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 336.
Neck. 1790. El. III. p. 246. n. 1637: g. Chortodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 147: g. Triandr. Monogyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 19.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 89: g. Typhoidear. — Par. Link 1822. En. II. p. 382; 1827. Hort. I. p. 370.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 189: g. Monoec. Polyandr.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 61: g. Typhacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 149. — Pers. 1807. Ench. II. p. 533. n. 2028. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 39. Sejungitur Platanaria. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 381 (*Rubanier*). — Bartl. 1830. Ord. p. 70. — Koch 1837. Syn. p. 681. Ed. II. p. 786. — Endl. 1837. Gen. n. 1710. p. 242; 1841. Ench. p. 132. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (268). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 20. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 126. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 710. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 3.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 127: g. Aroidear. — Par. Agdh. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. p. 101. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 475. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 238.
Agdh. 1823. Aphor. p. 124: g. Najadear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 832. n. 3090; 1831. Gen. II. p. 688. n. 3470: g. Aroideis aff. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 236.
Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 189: g. Typhinear. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 304; 1841. Enum. III. p. 88.
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 791: g. Saururear.

Sparganium Tourn. cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 133: g. Sparganioidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: g. Sparganiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 149; 1841. Nom. p. 43. n. 1541.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 12: g. Alismacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 134 (sphalm. *Sparangium*): g. Acoroidear.
Synon. Platanaria Gray.

Sparganophora Benth. vid. *Sparganophorus Gärtn.*

Sparganophoreae Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 499: subdiv. Euvernoniacear. Gen.: Sparganophorus, Pacourina.

Sparganophoros*) Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 308: g. Corymbiferar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 121 (*Spargonaphoros*): g. Tanacetor.
= Sparganophorus Gärtn.

Sparganophorus Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 396. t. 165: g. Tubulosar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 398. n. 1819: g. Syngenes. Aequal.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 548; 1826. Syst. III. p. 458. n. 2716; 1831. Gen. II. p. 617. n. 3061: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2188.
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 488; 1828. v. 57. p. 340: g. Ethuliear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 11. — Endl. 1838. Gen. n. 2199. p. 357; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3853. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Link 1822. En. II. p. 311: g. Corymbiferar.
Cass. 1827. Dict. v. 50. p. 71; 1830. v. 60. p. 586: g. Verniear. (Archetypar.) — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 335; 1832. Syn. p. 147. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 135. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39. (verar.)
Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 499: g. Sparganophorear.
Benth. 1849. Niger fl. p. 425 (*Sparganophora*): g. Compositar.
Synon. Sparganophoros Vaill.; Spargonaphoros Adans.; Struchium P. Browne; Athenaea Adans.; Ethuliae sp. Linn.

Sparganophorus Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 95. t. 42: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 138.
= Sclerolepis Cass.

Spargonaphoros Adans. vid. *Sparganophoros Vaill.*

Sparmannia Linn. f. 1781. Suppl. p. 41. n. 1400: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234.
Juss. 1789. Gen. p. 290: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 210. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 92. — Pers. 1807. Ench. II. p. 64. n. 1263. — DC. 1824. Pr. I. p. 503. — Poir. 1827. Dict. p. 50. p. 79. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 541. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 5. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 76.

*) σπάργανον, pannus.

Sparmannia Linn. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5437: g. Tiliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303; 1841. Nom. p. 210. n. 7973: g. Sparmanniear.
Endl. 1840. Gen. n. 5369. p. 1007; 1841. Ench. p. 522: g. Grewiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.
= Sparrmannia Thunb.

Sparmannieae Rchb. 1837. Handb. p. 303: subdiv. Tiliariar. Gen: Abatia, Foveolaria, Ablania, Sloanea, Myriochaeta, Oxyandra, Triumfetta; Antichorus, Heliocarpus, Triumfettaria; Clappertonia, Sparmannia.
Rchb. 1841. Nom. p. 210: subdiv. Tiliear. Gen.: Antichorus, Sparmannia, Heliocarpus, Bancroftia.

Sparrmania Murr., Neck. vid. *seq.*

Sparrmannia*) Thunb. 1784. Nov. gen. V. p. 88; 1800. Prodr. II. p. 92. 191: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 492 (*Sparrmania*). — Schreb. 1789. Gen. I. p. 355. n. 893. — Gmel. 1791. Syst. p. 814. — Pers. 1797. Syst. p. 528. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1160. n. 1027; 1809. En. p. 565.
Neck. 1790. El. II. p. 277. n. 1041 (*Sparrmania*): g. Catizophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 320: g. Gruinalium?
Batsch 1802. Tab. p. 62. g. Tiliacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 819; 1825. Syst. II. p. 572. n. 1893; 1830. Gen. I. p. 425. n. 2111. — Link 1822. En. II. p. 71; 1831. Hdb. II. p. 349.
Meisn. 1837. Gen. p. 37 (28): g. Tiliear.
Ch. Morren 1841. Nouv. Mém. Ac. Brux. XIV. (Motus staminum.)
Synon. Sparmannia Linn. f.

Spartanthus Link vid. *Spartianthus Link.*

Spartea Trinius 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 670. 673): div. Graminum. Gen.: Nardus, Spartina, Aegopogon, Lycurus; Schmidtia.

Sparteae Rchb. 1828. Consp. p. 55: div. Graminear. Gen. unicum: Lygeum.

Spartianthus Link 1822. Enum. II. p. 223 (1823. Flora p. 755: *Spartanthus*): nov. g. Leguminosar. (Spartium junceum L.)
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1244: sect. Spartii.
Link 1831. Hdb. II. p. 148: g. Genistoidear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 518; 1841. Nom. p. 150. n. 5856: g. Genistear. (genuinar.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 199.
= Spartium DC.

Spartieae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 746: div. Leguminosar. Gen.: Spartium, Calycotome, Cytisus, Ononis, Anthyllis, Ulex, Stauracanthus, Lupinus, Ödmannia, Borbonia, Piscidia, Viborgia, Lebeckia, Platylobium, Poiretia, Bossiaea, Scottia, Goodia, Tephrosia, Rafnia, Aspalathus, Teramnus, Crotalaria, Abrus.

Spartina Schreb. 1789. Gen. I. p. 43. n. 89: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 123. — Willd. 1809. En. p. 80. — Elliott 1817. Sketch I. p. 94. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 459. *Cf.* Panzer 1814 in Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 277.

*) Dicat. Andr. Sparrman. (Thunb.)

Spartina Schreb. cont.
Gis. 1792. Prael. p. 136: g. Graminum. — Par. Link 1821. En I. p. 40. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 54. n. 259. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 229.
Batsch 1802. Tab. p. 156: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 90. — Palis. 1812. Agrost. p. 25. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 10. 261. n. 203. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 265. n. 270. — Juss. & Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 81. — Link 1829. Hdb. I. p. 19.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 144. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 174: g. Hordeacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 151.
Trin. 1820. Fund. p. 115: g. Triandr. Digyn.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 673): g. Sparteor.
Link 1827. Hort. I. p. 46: g. Spartinacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 858; 1830. Fl. exc. p. 22; 1841. Nom. p. 37. n. 1320: g. Chloridear. Sect. (1828): Trachynotea, Ponceletia. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Kunth 1830. Gram. p. 94; 1833. Agrost. p. 277. — Koch 1837. Syn. p. 779. Ed. II. p. 900. — Endl. 1837. Gen. n. 846. p. 94; 1841. Ench. p. 58. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 35. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 713. — Steud. 1854. Glum. I. p. 214.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 408: g. Agrostear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 463: g. Spartinear.
Synon. Trachynotia Michx.; Limnetis Rich.; Ponceletia Pet.-Th.; Tristania Poir. (Steud.)

Spartinaceae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 46: fam. Graminear. Gen.: Spartina.

Spartineae (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 434. 462: trib. 5 Graminear. Gen.: Cynodon, Spartina.

Spartinieae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 357: cohors Chloridear. Gen.: Microchloa.

Spartioides Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 107: sect. Amygdali. (A. arabica Oliv.) — Par. Römer 1847. Fam. nat. III. p. 4. 7.

Spartioides Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 113: sect. Stenocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 485.

Spartium Tourn. 1700. Inst. p. 644. t. 412: g. pl. class. XXII, a sequentibus varie circumscriptum.
Linn. 1737. Gen. p. 218. n. 577; 1737. Cliff. p. 356; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 208; 1753. Sp. II. p. 708; 1759. Syst. ed. X. p. 1156. n. 765; 1763. Sp. ed. II. p. 995; 1764. Gen. ed. VI. p. 368. n. 858; 1767. Syst. ed. XII. p. 474: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 535; 1784. Syst. p. 643. — Reich. 1778. Gen. p. 367. n. 929. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 487. n. 1166. — Gmel. 1791. Syst. p. 1088. — Pers. 1797. Syst. p. 680; 1807. Ench. II. p. 286. n. 1690. — Willd. 1800. Sp. III. p. 926. n. 1332; 1809. En. p. 743.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 132. n. 546: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 130.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 80.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 387. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 214. — Link 1822. En. II. p. 222. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 176. n. 2496; 1831. Gen. II. p. 578. n. 2825.
Hill 1769. Ht. kew. p. 307: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 26. n. 1333: g. Cyteophytor. Disjungitur Apartium.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 746: g. Spartiear.
Link 1823. Flora II. p. 756. Char. emend.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1231. 1244: g. Genistear. Sect.: Spartianthus, Genistoides.
= Genista Linn., Spartium DC. et Sarothamnus Wimm.

Spartium Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar. (*Cytiso-Genista Tourn.*)
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 481. 502: g. Monadelph. Decandr.
Hoffm. 1804. Bot. Taschenb. p. 72: g. Diadelph. Decandr. — Par. Gmel. 1808. Fl. Bad. III. p. 153.
Rebent. 1804. Neom. p. 185: g. Decandr. Monogyn.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 445: g. Papilionacear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 519; 1841. Nom. p. 150. n. 5854: g. Genistear. (genuinar.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 204.
= Sarothamnus Wimm.

Spartium Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 595: sect. Genistae. (Spartium Scoparia, Genista tinctoria et pilosa.)
= Sarothamnus Wimm. et Genistae sp.

Spartium DC. 1825. Prodr. II. p. 145: g. restrict. Genistear. (Sp. junceum L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4031. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 148. — Koch 1836. Syn. p. 151. Ed. II. p. 165. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6497. p. 1265; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 515. — Walp. 1842. Rep. I. p. 627; 1843. II. p. 839. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 1. — Webb 1846. Canar. II. p. 57. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 347.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
Synon. Apartium Neck.; Spartianthus Link; Spartanthus Link.

Spartium Link 1831. Handb. II. p. 152: g. Genistoidear. (Sp. monospermum L.)
Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 285. (Monogr.)
= Retama Boiss.

Spartocarpus Spach 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 240: subg. Genistae. Sect.: Asterospartum, Ephedrospartum, Acanthospartum, Echinospartum, Cephalospartum, Leptospartum, Voglera. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 462.

Spartocytisus Webb & Berth. 1846. Phytogr. Canar. II. p. 49: nov. g. Genistear. (Cytisus albus, etc.) Sect.: Oreosparton, Spartothamnus.

Spartothamnus A. Cunn. 1830 in Loud. Hort. brit. Suppl. p. 600. *Cf.* Endl. Gen. p. 643 et Meisn. Comm. p. 201.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 247: g. Myoporinear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 694.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4449: g. Stenochilear.?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 65: g. Lantanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 665: g. Myoporacear. — Par. A. DC. 1847. Pr. XI. p. 705. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 714.

Spartothamnus Webb & Berth. 1846. Phyt. Canar. II. p. 45: sect. Spartocytisi. (Cytisus albus et sessilifolius DC.) *Cf.* Presl Botan. Bemerk. p. 139.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 221: g. Genistear.

Spartum Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: g. pl. class. XIV a. (Nomen.)

Spatalanthus*) Sweet .... Brit. fl. gard. I. fol. 100. t. 300.
= Geissorhiza Ker.

Spatalla „Salisb. Parad. 67" R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811.) p. 143 (Verm. bot. Schr. II. p. 230): g. Proteacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 22. 392. n. 533. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 470. n. 506; 1830. Gen. I. p. 103. n. 516. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 83. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 521.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 331: g. Ceclismenar. — Par Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1736; 1841. Nom. p. 63. n. 2386: g. Proteear. (genuinar.) Sect. (1841): Spatalla, Cyrtostigma. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 400. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 306. Sect. ut Endl.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Protear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 121.
Endl. 1838. Gen. n. 2129. p. 338; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 79: g. Proteinar. Sect.: Coilostigma, Cyrtostigma.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (244): g. Proteinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Proteidar.

Spatangidium Brébiss. 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 95: nov. g. Coscinodiscear.

Spatanthus „Desv." Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 239: g. Juncear.
Kunth 1841. Enum. III. p. 368: g. Rapatear.
= Spathanthus Desv.

Spatela Adans. vid. *Spathelia Linn.*

Spatellaria Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4897: g. Alsodinear., pro *Spatularia St. Hil.* substitutum. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 285.
= Amphirrhox Spreng.

Spathaceae Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: ordo 8 plant. Gen.: Leucojum, Galanthus, Narcissus, Pancratium, Amaryllis, Crinum, Haemanthus.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 9 plant. Gen. ead. et Allium, Bulbocodium, Colchicum, Gethyllis. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 274. Accedunt Massonia, Agapanthus, Cyrtanthus, Tulbaghia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 241: ordo Coronariar. Gen.: Mnasium, Pollia, Tulbaghia, Albuca, Massonia, Brodiaea, Rhipidodendron; Agapanthus, Ornithogalum, Allium, Sowerbaea, Androcymbium, Bulbocodium, Merendera, Blandfordia, Funckia, Yucca, Pontederia; Narcissus, Pancratium, Galanthus; Leucoïum, Peliosanthes, Amaryllis, Crinum, Strumaria, Cyrtanthus, Eustrephia, Haemanthus, Hypoxis, Curculigo, Sisyrinchium, Galaxia, Ferraria, Witsenia, Aristea, Crocus, Ixia, Sparaxis, Trichonema. — Par. Eckl. 1827. Verz. p. 5. Gen.: Tulbaghia, Albuca, Agapanthus, Ornithogalum, Androcymbium, Amaryllis, Brunswigia, Cyrthanthus, Hessea, Strumaria, Haemanthus, Hypoxis.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: ordo Liliflorar. Trib.: Ornithogaleae, Croceae, Galantheae.

Spathacei Linn. 1747. Class. pl. p. 409: ordo 1 methodus calycinae. Gen.: Musa, Thalia, Costus, etc.

Spathandra Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1312 *d*: sect. Xerotis.

Spathandra Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 313. t. 71: nov. g. Melastomacear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 272: g. Charianthear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 111 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6268. p. 1222; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1470. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6777. — Walp. 1846. Rep. V. p. 725. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Decne 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p...: g. Memecylear. — Par. Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 262. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 799.

Spathanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 62: subdiv. Triadanthar. Class.: Achnospathae, Spadicatae.

Spathanthus*) Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. 45. t. 4. f. 1: nov. g. Juncinear. (Mnâsium unilaterale Rudg.)
Meisn. 1842. Gen. p. 405 (310): g. Rapateacear. — Par. Schomb. 1845. Rap. Frid. Aug., etc. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 129.
Spach 1846. Vég. phan. VIII. p. 134: g. Juncaceis aff.
Steud. 1855. Glum. II. p. 313: g. Rapatear.
Synon. Spatanthus Juss.

*) σπατάλη, heluatio, luxus.

*) σπάθη, spatha.

Spathe P. Browne 1756. Jamaic. p. 187: nov. g. Pentandr. Trigyn.
= Spathelia Linn.

Spathelea Gmel. vid. *seq.*

Spathelia*) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 386; 1764. Gen. ed. VI. p. 148. n. 373; 1767. Syst. ed. XII. p. 219. n. 370: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 244; 1784. Syst. p. 296. — Reich. 1778. Gen. p. 151. n. 403. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 198. n. 506. — Gmel. 1791. Syst. p. 498 (*Spathelea*). — Pers. 1797. Syst. p. 314; 1805. Ench. II. p. 328. n. 730. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1496. n. 570.
Adans. 1763. Fam. II. p. (23 *Spatela*): g. Pistaciar.
Gled. 1764. Syst. p. 39. n. 157: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 228: g. Nomadear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 278. t. 58. f. 3 (simplex).
Juss. 1789. Gen. p. 371: g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 254.
Neck. 1790. El. II. p. 381. n. 1193: g. Ypsoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 337: g. Bicornium.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Hedw. 1806. Gen. p. 206. n. 845: g. Terebinthacear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XLII. 667. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 942. n. 1121; 1830. Gen. I. p. 231. n. 1216. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 100. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1007.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 337 (Gen. Tereb. p. 25): g. Pteleaceis aff.?
DC. 1825. Pr. II. p. 84: g. Pteleacear.?
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 68: g. Anacardiear.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 232: g. Amyridear.
Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56): g. Burseracear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5979. p. 1148; 1841. Ench. p. 609: g. Zanthoxyleis aff.
Rchb. 1841. Nom. p. 169. n. 7482: g. Xanthoxylear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 84: g. Zanthoxylear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 277.
Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 580: g. Spathelicar. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 173. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. n. 5967/6.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.
Synon. Spathe P. Browne.

Spathelieae Planchon 1846. Lond. journ. bot. V. p. 580: trib. Simarubacear. Gen.: Spathelia, Dictyoloma, Eurycoma. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 173. Gen. ead. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. Gen. ead.

Spathepteris Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 355: nov. g. Aneimiacear. (Aneimia verticillata Sw.)

Spathestigma Hook. & Arn. mss.
= Pterostigma Benth. (Hook. & Arn.)

Spathicarpa Hook. 1831. Bot. Miscell. II. p. 146. t. 77: nov. g. Aroidear. (S. hastifolia.)
Schott 1832. Melet. p. 20; 1856. Syn. Aroid. I. p. 124: g. Spathicarpear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1691. p. 238; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 52. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1103. — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 40.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Anaporear.

Spathicarpeae Schott 1832. Melet bot. p. 20: subtrib. Anaporear. Gen.: Spathicarpa, Dieffenbachia. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 238; 1841. Ench. p. 128. Gen. ead. et Atherurus (1841 Pinellia). — Kunth 1841. Enum. III. p. 52. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (269). Gen. ut Endl. 1841.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 40: sect. Anaporear. Gen. ut Schott et Hemicarpurus.
Schott 1846. Syn. Aroid. I. p. 124: trib. Aroidear. efilamentatar. pachyzeugmaticar. peristatogonear. Gen.: Spathicarpa, Asterostigma, Dieffenbachia.

Spathiostemon*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 621: nov. g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5810. p. 1115; 1841. Ench. p. 588. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7374: g. Ricinear. genuinar.
Meisn. 1841. Gen. p. 329 (252): g. Rottlerear.
Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 41: g. Acalyphear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 292: g. Ricinidear. Sect.: Euspathiostemon, Haematospermum.

Spathiphyllum Schott 1832. Melet. bot. p. 22: nov. g. Pothoinar. (Dracontium lancaefolium Jacq.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1703. p. 240; 1841. Ench. p. 129. — Kunth 1841. Enum. III. p. 83. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1115. — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 147 (*Stathiphyllum*). — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269).
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 85. t. 295. 296.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 33: g. Orontiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p 194.
C. Koch .... Bonplandia IV. p. 10; 1857. Berl. Gartenz. p. 173: g. Aroidear.

Spathiphyllum Schott 1853. Aroid.
= Massowia C. Koch.

Spathium**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 217. Ed. Willd. p. 270: nov. g. Hexandr. Trigyn. (S. chinense = Aponogeton monostachyon L., teste Willd. l. c. in not.)
E. Meyer 1827. De Houtt. p. ....: g. Saururear. — Par Bartl. 1830. Ord. p. 84. — Endl. 1837. Gen. n. 1826. p. 267; 1841. Ench. p. 152. — Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248). — Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2559. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 6. — Edgew. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 402. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 63.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 29: g. Najadear.
= Saururus Linn.?

Spathium Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81; 1853. Fol. Orchid. 10 Jan.

*) Nomen e Browneano factum.

*) *σπάθιον*, spatula, specillum.

**) *σπάθιον*, parva spatha: a calyce spathiformi, exotico.

Spathium Lindl. cont.
p. 43: subg. Epidendri. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 16. n. 1371.

Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 137: subsect. Acranthii.

Spathodea Palis. 1805. Fl. Owar. I. p. 46. t. 27—29: nov. g. Didynam. Angiosperm., a Bignonia distinctum. *Cf.* Vent. 1807. Mém. Inst. I. p. 19 et Schrad. n. Journ. III. 1. p. 102.

Pers. 1807. Ench. II. p. 173. n. 1512: g. Bignoniacear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 471. Ed. Nees p. 327. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 146. — Kunth 1823. Syn. II. p. 247. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 761. (verar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23 (*Spadothea*). — Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Hook. 1838. Bot. Mag. n. 3681. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 413; 1825. Syst. II. p. 835. n. 2227; 1831. Gen. II. p. 502. n. 2470: g. Bignoniear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 101. — Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3262. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 222. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 562. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 62.

DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123. 130; 1840 in Meisn. Gen. p. 300 (208); 1845. Pr. IX. p. 203: g. Catalpear. (Monostictidum.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 513. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 753.

Endl. 1839. Gen. n. 4118. p. 712; 1841. Ench. p. 346: g. Tecomear. Sect.: Dolichandra, Spathodea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4554.

Spathodea Chamisso 1832. Linnaea VII. p. 657: g. Bignoniacear., sejuncta Dolichandra restrict.

Endl. 1839. Gen. n. 4118 *b*. p. 712; 1841. Ench. p. 346: sect. Spathodeae.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130: g. Bignoniear.

Spathoglottis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 400. f. 76: nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 105. — Steud. 1841. Nom. II. p. 616 (*Spatoglottis*).

Lindl. 1831. Orchid. p. 119: g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1384. p. 194; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1980. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 673.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.

Spatholobus Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 52: nov. g. inter Platymiscium Vog. et Endespermum Bl. collocandum. (S. littoralis.)

Meisn. 1843. Comm. p. 352: g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 104. n. 6719/1. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 284. — Walp. 1846. Rep. V. p. 545. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Spatholobus Hasskarl cont.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 238. (*Synon. Buteae sp. Auct.* et *Drebbelia Zoll.*)

Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 203: g. Erythrinear.

Spathopeplus Körnicke 1856. Linnaea XXVII. p. 599: subg. Eriocaulonis. (E. palustre Salzm.)

Spathoscaphe Örsted 1858. Palm. Centroam. p. 29: nov. g. Chamaedoreear. (Chamaedorea Arenbergiana Wendl.)

Spathostigma Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 380: sect. Pterostigmatis. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 678.

Spathula „Tausch" Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1187 *e*; 1830. Fl. exc. p. 82: sect. Iridis. (I. graminea et foetidissima.)

Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1556. 2 (*Spatula*): sect. Limniridis.

Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 31; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 97: subg. Iridis. (I. foetidissima.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 820.

Spathularia Pers. 1797. Tent. disp. p. 36: g. Hymenothecii. (Pers. Clavar. p. 54.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 105.

Pers. 1801. Syn. p. XVIII. 610; 1822. Mycol. eur. I. p. 197: g. Helvelloideor.

GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 365: g. Fungor.

DC. 1805. Franç. II. p. 95: g. Gymnocarpor.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 52: g. Dermatothecior.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 18: g. Clavariar.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. 490: g. Clavator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 975. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 495. n. 3483.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 663 (p. 598 *Spatularia*): g. Helvellidear.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 82: g. Clavellariar.?

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 576: g. Clavariear.

Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 304: g. Mitrulator.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 765. n. 3911: g. Mitrator.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 533: g. Hymenomycetum gymnosporor.

Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 36: g. Helvellacear.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Geoglosseor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 206.

Bail 1858. Syst. p. 66. t. 21: g. Helvellaceor.

= Spathulea Fries. (*Conf. Spatularia Link.*)

Spathularia A. St. Hilaire 1824. Mém. Mus. XI. p. 51; 1829. Fl. Bras. II. p. 148: nov. g. Violacear. (S. longifolia.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 106.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 318. 342 (*Spatularia*): g. Alsodinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 522.

= Amphirrhox Spreng.

Spathularia „Haw." DC. Prodr. IV. p. 40 in synon. Arabidiae: vid. *Spatularia Haw.*

Spathularia C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 229: subsect. Glossophylli.

Spathulea Fries 1825. Pl. homon. p. 89: g. Mitrulinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 419. p. 36; 1841. Ench. p. 20. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 330.
Grev. .... Scot. t. 165.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 434. 1 (*Spatulea*): sect. Mitrulae.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 157: g. Leotiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 347: g. Helvellaceor.
Synon. Spathularia Pers.; Spatularia Link.

Spathyema Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 171 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 173): nov. g. pro Dracontio foetido L. propositum.
= Symplocarpus Salisb.

Spathysia*) Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. 178: nov. g. Jecorariar., pro Dumortiera Spathysii propositum.
= Dumortiera Reinw.

Spatoglossum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phycol. gener. p. 339; 1845. Phycol. germ. p. 272; 1849. Sp. Alg. p. 560. n. 366: nov. g. Dictyotear., Dictyotae, Padinae etc. species complectens.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: inter Phycoideas dubias.

Spatoglottis Steud. vid. *Spathoglottis Blume.*

Spatula Rchb. vid. *Spathula Tausch.*

Spatularia Link 1809. Berl. Mag. III. p. 40: g. Fungor. alt. seriei.
Nees 1816. Syst. p. 171; 1817. Überbl. p. 44: g. Clavariar. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 400. (stipitatar.)
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 598: vid. *Spathularia.*
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Helvellaceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Clavariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
= Spathularia Pers.

Spatularia Haworth 1821. Saxifr. en. p. 47: nov. g. Saxifragear. (Saxifraga Clusii, etc.)
= Arabisa Tausch.

Spatularia G. Don vid. *Spathularia St. Hilaire.*

Spatulea Rchb. vid. *Spathulea Fries.*

Speciosae Scopoli 1777. Introd. p. 184: gens Tubulatar. Gen. §. 1: Pisonia, Littorella, Rhacoma, Mirabilis, Cressa, Galax, Montia, Cleytonia, Aretia, Royena, Samyda, Androsace, Primula, Cortusa, Dodecatheon, Cyclamen, Soldanella, Trientalis, Glaux, Theophrasta, Hottonia, Menyanthes, Lysimachia, Anagallis, Samolus, Voyria, Gentiana, Coris, Scoparia, Centunculus; Plantago, Budleia, Exacum, Polypremum, Roridula, Houstonia, Syringa, Eranthemum, Schrebera, Cuscuta, Camdenia, Bistella, Nama, Spigelia, Vallaris, Lisianthus, Nigrina, Hydrolea, Macrocnemum, Ophiorrhiza, Codon, Chironia; Maireria, Lerchea, Sagonea, Potalia; Pouteria, Penaea, Blaeria, Erica; Epacris, Azalea, Rhododendron, Epigaea, Gualteria, Brossaea; Leea; Hoferia, Dupinia, Lecythis, Pontopidana, Marcgravia. §. 2: Jasminum, Nyctanthes, Phyllirea, Ligustrum, Olea, Chionanthus, Achras, Maba, Petitia, Jacquinia, Aquartia, Callicarpa, Labatia, Secura, Ilex, Menais, Olax, Plotia, Coprosma, Bellevalia, Alstonia, Maesa, Bassovia, Stisseria, Benteca, Arduina, Dickia, Idesia, Prinos, Chrysophyllum; Diospyros, Arbutus, Adoxa, Tinus, Dais, Styrax, Licania, Inocarpus, Cassyta, Guapira, Laurus.

Specklinia*) Lindl. 1830. Orchid. gen. p. 8: nov. g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1318. p. 187; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1905. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (276). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 51. t. 89. 90.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. n. 1797: g. Malaxidear.

Specularia Heist. 1748. Syst. pl. gen. p. 8.
A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 344; 1839. Pr. VII. 2. p. 489: g. Campanulear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 29. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 768. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4022. (genuinar.) Sect.: Specularia, Triodallus. — Endl. 1838. Gen. n. 3086. p. 517; 1841. Ench. p. 267. Sect.: Apenula, Dysmicodon. — Meisn. 1839. Gen. p. 242 (150). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 891. — Webb .... Canar. III. p. 5. Sect.: Apenula, Hesperocodon. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
Kunth 1838. Berol. I. p. 403: g. Campanulacear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 558. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 544. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 278. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 720. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 404.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 757: subg. Campanulae.
Synon. Speculum Hall.; Speculum Veneris Ger.; Prismatocarpus L'Her.; Pentagonion Tab.; Avicularia Gesn.; Elatine Caesalp.; Apenula Neck.; Legouzia Durand; Triodallus Rafin.

Specularia Solander mss.
= Monopsis Salisb.

Speculum Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 31: g. pl. class. I.
= Specularia Heist.

Speculum Veneris (Ray) Gerard (ex Meisn. Comm. p. 364.)
= Specularia Heist.

*) Dicat. Spathys, detectori.

*) Dicat. Rud. Specklin, sculptori in ligno eximio.

Speira*) Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 9. t. 2. f. 140; 1842. V. p. 5; 1842. Anl. Mycol. p. 19: nov. g. Torulacear. (verar.) — Par. Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 707.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 36: g. Torulaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495 (*Speirea*).

Speiranthes Hassk. vid. *Spiranthes Rich.*

Speirea Lév. vid. *Speira Corda.*

Speirema Hook. f. & Thoms. .... Journ. Proc. Linn. soc. II. p. 27.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1082: g. Delisseacear. (Lobelia montana Reinw.)

Spelta**) Endl. 1837. Gen. n. 913 *a*. p. 103; 1841. Ench. p. 59: sect. Tritici.
= Triticum Palis.

Spennera***) „Martius" DC. 1828. Prodr. III. p. 115: nov. g. Rhexiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4582; 1841. Nom. p. 173. n. 6703. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 741. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 221. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6195. p. 1210; 1841. Ench. p. 646. — Walp. 1843. Rep. II. p. 124; 1846. V. p. 689. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Crüger 1847. Linnaea XX. p. 100. Char. ampliat.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 112. t. 255: g. Melastomacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1275. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 118.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 308. n. 1572: g. Melastomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 329.
Naud. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 141: g. Lasiandralium. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 589.
Synon. Jaravaea Scop. pt.

Spenotoma G. Don Gen. syst. III. p. 774. n. 25: sphalm. pro *Sphenotoma.*

Speranskia†) Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 388: nov. g. Crotonidear. (Croton tuberculatum Bunge.)

Spergella Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 206. n. 5352: g. Alsinear., pro Spergulae speciebus exstipulatis propositum. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Kunth 1838. Berol. I. p. 120.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 794: g. Stellarinar.
Koch 1836. Syn. p. 109: sect. Spergulae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Cerastiear.
Koch 1841. Flora p. 504; 1843. Syn. ed. II. p. 118: sect. Saginae.
Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7762: g. Saginear.
= Saginae Linn. pars.

Spergella Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5227 *k*. p. 965; 1841. Ench. p. 505: sect. Alsines.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 247: sect. Saginae.

*) σπεῖρα, spira.
**) Spelta Veterum e voce germanica *Spelt* s. *Speltz.*
***) Dicat. F. C. L. Spenner, prof. Friburg.
†) Dicat. Speranski, ministro Rossiae.

Spergula*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 66. Ed. Hall. 1745. p. 73: g. pl. class. IV.
Dillen. 1719. Nov. gen. p. 131. t. 7: g. ex Volkamerio et Rajo adoptatum.
Linn. 1737. Gen. p. 133. n. 375; 1737. Cliff. p. 173; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 440; 1759. Syst. ed. X. p. 1040. n. 519; 1762. Sp. ed. II. p. 630; 1764. Gen. ed. VI. p. 232. n. 586; 1767. Syst. ed. XII. p. 321: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 363; 1784. Syst. p. 437. — Reich. 1778. Gen. p. 238. n. 638. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 312. n. 798. — Gmel. 1791. Syst. p. 738. — Pers. 1797. Syst. p. 468. — Willd. 1799. Sp. II. p. 818. n. 922; 1809. En. p. 493. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 290.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 98. n. 407: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 226.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 301. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 242. — Batsch 1802. Tab. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 113. — Pers. 1805. Ench. I. p. 522. n. 1148. — Hedw. 1806. Gen. p. 336. n. 1321. — Link 1821. En. I. p. 435. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 422. n. 1722; 1830. Gen. I. p. 381. n. 1920. — Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 75 (*Spargoute*). — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 172. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1597. Sect.: Spergularia, Spergula, Lepigonum. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 710 (*Spargoute*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 271: g. Spergular.
Hill 1769. Ht. kew. p. 201: g. Pentapetalar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 318: sect. Stellariae.
Neck. 1790. El. II. p. 156. n. 851: g. Catotaphytor.
Cram. 1803. Disp. p. 68 in Pentandr. Pentagyn.
DC. 1805. Franç. IV. p. 772: g. Alsinear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 651. — Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 394. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 63. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 424 (exclusis arvensi et pentandra). — Link 1831. Hdb. II. p. 252. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 219. — Koch 1836. Syn. p. 109 (sect.: Spergella, Spergula); 1841. Flora p. 503 (sect.: Saginella, Spergella); 1843. Syn. ed. II. p. 120 (emissa Spergella). — Kunth 1838. Berol. I. p. 118. — Webb .... Canar. I. p. 145. — Godr. 1842. Obs. fam. Alsin. (Flora 1842. Lit. p. 93.) Emend. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 834: g. Stellarinar.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 291: g. Alsinacear.

*) Nomen originis germanicae ex sententia Beckmanni.

Spergula Rupp. cont.
Presl 1826. Sicul. I. p. 159: g. Stellariar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Paronychiear. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 212.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4276; 1832. Fl. exc. p. 566; 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6307: g. Spergulear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 174. Sect.: Spergula, Spergularia. — Endl. 1840. Gen. n. 5219. p. 962; 1841. Ench. p. 504. — Walp. 1842. Rep. I. p. 265. — Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 169. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 274.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 38: g. Lepigonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1052: g. Polycarpear.

Spergula Bartl. 1825 in Bartl. & Wendl. Beitr. II. p. 158; 1830. Ord. p. 302; 1832. Linnaea VII. p. 624: g. Spergulear. (Spergulae et Arenariae stipulatae.)
= Spergularia Pers.

Spergula G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 425: sect. Spergulariae. (arvensis et pentandra.)

Spergulae Adans. 1763. Fam. II. p. 270: fam. 38 plant. Gen. §. 1: Spergula, Tissa, Buda, Löflingia, Telephium, Anthyllis, Pharnaceum, Mosina. §. 2: Queria, Paronychia, Polygonifolia.

Spergularia Pers. 1805. Ench. I. p. 504: sect. Arenariae. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 400. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 740. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 98.
Presl 1826. Sicul. I. p. 160: g. Stellariar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Paronychiear. — Par. Bartl. 1830. Rel. Hänk. II. 1. p. 9. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 212.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4275: g. Spergulear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 133. — Endl. 1840. Gen. n. 5219. p. 962; 1841. Ench. p. 504. — Walp. 1842. Rep. I. p. 264. — Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 165. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 275. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 245.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 175. t. 110: g. Caryophyllear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 425: g. Alsinear. Sect.: Spergula, Arenaria.
Koch 1836. Syn. p. 111: sect. Alsines.
Meisn. 1838. Comm. p. 97: g. Spergulariear.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 175: sect. Spergulae. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1597.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Synon. Buda et Tissa Adans.; Segetella Pers.; Stipularia Haw.; Delila Dumort.; Balardia Cambess.; Spergula Bartl.; Lepigonum Fries.

Spergularia Link 1831. Handb. II. p. 259: g. Alsinear. (Arenaria rubra L.)
Fries 1856. Ind. sem. Ups.; 1858. Linnaea XXIX. p. 728: subg. Lepigoni. (L. rubrum.)

Spergularieae Meisn. 1838. Gen. Comm. p. 97: trib. Paronychiear. Gen. (p. 132: *Sperguleae*): Limeum?, Ortegia, Cerdia, Balardia?, Aylmeria, Löflingia, Hapalosia, Stipulicida, Arversia, Polycarpaea, Polycarpon, Drymaria, Spergularia.

Spergulastrum Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 275: nov. g. Decandr. Tetragyn., Stellariae aff.
Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 421: g. Alsinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5347. — Bartl. 1830. Ord. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 448. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (21).
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 77 (*Spargoutine*): g. Caryophyllear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Saginear.
= Arenariae Linn. pars.

Sperguleae Bartl. 1825 in Bartl. & Wendl. Beitr. II. p. 158: div. Paronychiear. Gen.: Drymaria, Spergula. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 302. Gen.: Cerdia, Löflingia, Ortegia, Cypselea, Polycarpon, Stipulicida, Polycarpaea, Mollia, Lahaya, Spergula, Drymaria.
Rchb. 1828. Consp. p. 162; 1832. Fl. exc. p. 566: subdiv. Paronychiear. Gen.: Larbrea, Drymaria, Holosteum, Spergularia, Spergula, Mollugo, Pharnaceum, Ginginsia; Physa?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: trib. Stellariacear. Gen.: Spergula, Delia, Buda, Polycarpon, Ortegia, Mollia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162: sect. Mollginear. Gen.: Spergula et 1841 Alsine, Drymaria.
Meisn. 1838. Gen. p. 132: vid. *Spergularieae Meisn.*
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 173: trib. Illecebracear. Gen.: Stipulicida, Polycarpon, Löflingia, Spergula.
Endl. 1839. Gen. p. 960; 1841. Ench. p. 504: subtrib. Polycarpear. Gen.: Cerdia, Polycarpon, Arversia, Ortegia, Stipulicida, Polycarpaea, Aylmeria, Spergularia, Spergula, Drymaria.
Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 274: trib. Alsinear. Gen.: Spergula, Spergularia.

Sperlengia Miquel vid. *seq.*

Sperlingia*) Vahl 1810 in Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 112: nov. g. plant. (S. verticillata, opposita.)
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 523 (*Sperlengia*): sect. Hoyae. (*Synon. Acanthostemma Blume, Triacma van Hass.*)
= Hoyae R. Brown pars.

Spermacocee Dumort. vid. *Spermacoce Dill.*

Spermacocceae Dumort. vid. *Spermacoceae Spreng.*

Spermacoce**) Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 369. t. 277. f. 358. 359.
Linn. 1737. Gen. p. 25. n. 68; 1737. Cliff. p. 33; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 102; 1759. Syst. ed. X. p. 890. n. 911; 1762. Sp. ed. II. p. 147; 1764. Gen. ed.

*) Dicat. O. Sperling, horti Hafniensis directori.
**) *σπέρμα*, semen; *ἀκωκή*, mucro, acumen.

Spermacoce Dillen. cont.
VI. p. 50. n. 119; 1767. Syst. ed. XII. p. 115: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 124; 1784. Syst. p. 148. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 55. t. 19—22. — Reich. 1778. Gen. p. 51. n. 126. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 66. n. 55. — Lour. 1790. Coch. I. p. 79. — Gmel. 1791. Syst. p. 233. — Pers. 1797. Syst. p. 152; 1805. Ench. I. p. 123. n. 233. — Willd. 1797. Sp. I. p. 568. n. 177; 1809. En. p. 150. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 60. (reform.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 94. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 372; ed. 1832. I. p. 366.

Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 164. n. 668: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 492.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 197; 1820. Mém. Mus. VI. p. 372. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 569. — Batsch 1802. Tab. p. 232. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 432. — Hedw. 1806. Gen. p. 65. n. 312. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 274. 530. n. 485. — Link 1821. En. I. p. 131; 1829. Hdb. I. p. 656. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 400. n. 393; 1830. Gen. I. p. 93. n. 463. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 946. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 113. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 474.

Adans. 1763. Fam. II. p. 145: g. Aparinium.

Hill 1769. Ht. kew. p. 120: g. Monopetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 139: g. Opulinar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 122. t. 25. f. 9 (tenuior).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 203; 1789. Phil. Bot. I. p. 54.

Neck. 1790. El. I. p. 201. n. 336: g. Phyllastrophytor. Emittuntur Covolia, Gruhlmania, Chenocarpus.

G. F. W. Meyer 1818. Fl. esseq. p. 80: g. emissa Borreria emend. *Cf.* Flora 1819. I. p. 342.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 598: g. Spermacocear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 341. — Kunth 1824. Syn. III. p. 14. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI; 1841. Nom. p. 74. n. 2770. (genuinar.) — Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 355. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 150. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 464. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 330.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae. (restrict.)

D. Don 1825. Nepal. p. 134: g. Stipulariar.

Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1997: g. Coffeacear. Sect.: Gruhlmannia, Covalia, Chaenocarpus.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33 (*Spermacocce*): g. Spermacoceear.

DC. 1830. Pr. IV. p. 552: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III.

Spermacoce Dillen. cont.
p. 619. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 438. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180. — Endl. 1838. Gen. n. 3121. p. 527; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 26. — Walp. 1843. Rep. II. p. 465; 1847. VI. p. 29.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Synon. Tardavel Adans.; Covolia Neck.; Chenocarpus Neck.

Spermacoceae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 598: ordo Rubiacear. Gen.: Spermacoce, Knoxia, Diodia, Serissa, Phyllis, Richardia.

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 341: sect. Rubiacear. Gen.: Spermacoce, Richardsonia, Machaonia. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 14. Gen. ead. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI. Gen.: Spermacoce, Bigelovia, Knoxia, Diodia, Plocama, Phyllis, Serissa, Richardsonia. — Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 309. Gen.: Borreria, Diodia, Richardsonia, Spermacoce, Psyllocarpus, Mitracarpum, Staëlia. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. Gen.: Plocama, Richardia, Borreria, Mitracarpum, Staëlia, Spermacoce, Knoxia, Diodia, Hexasepalum, Psyllocarpus, Ernodea, Cuncea, Hydrophylax, Schiedea, Nerteria; Lasianthus, Mitchella.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33 (*Spermacocceae*): trib. Rubiacear. Gen.: Knoxia, Spermacocce, Cephalanthus, Diodia, Putoria, Richardsonia.

Conf. Euspermacoceae DC.

Spermacoceae A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 147: trib. (4) Rubiacear. Divis.: *verae* (gen.: Spermacoce, Mitracarpum, Staelia, Psyllocarpus, Knoxia, Gaillonia, Richardsonia, Cephalanthus), Putorieae. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 538. Subtrib.: Cephalantheae, Euspermacoceae, Putorieae. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 609. Subtrib. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119). Subtrib. eaed. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. 462. Gen. Cephalanthear. et Putoriear. DC. et Euspermacocear. Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48. Subtrib. ut DC. (Spermacoceae.)

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 210: div. Rubiacear. (Gen.: Sherardia, Ernodea.)

Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 74: subdiv. Coffeariar. Sect.: Putorieae, *genuinae* (gen.: Sherardia, Democritea, Octodon, Borreria, Spermacoce, Hexasepalum, Diodia, Ebelia, Crusea, Richardsonia, Mitracarpum, Perama, Staelia, Tessiera, Psyllocarpus, Gaillonia, Otiophora, Knoxia, Machaonia; Deppea; Cruickshankia), Cephalantheae.

Endl. 1838. Gen. p. 525; 1841. Ench. p. 271: trib. Coffeacear. Subtrib. ut DC.

Spermacocidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 764: trib. Coffear. Gen. Spermacocear. Endl. et Pentanisia, Richardsonia, Ptychostigma, Jaubertia, Emmeorhiza.

Spermadictyon Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 32. t. 236: nov. g. Pentandr. Monogyn.

Spermadictyon Roxb. cont.
(Sp. suaveolens.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 472 (g. Sapindor.)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 702. n. 762; 1830. Gen. I. p. 162. n. 815: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 715.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2059 (*Spermadyction*): g. Cinchonear.
= Hamiltonia Roxb.

Spermadyction Rchb. vid. *praeced.*

Spermatochnus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phycol. gener. p. 334; 1845. Phycol. germ. p. 268; 1849. Sp. Alg. p. 549. n. 359: nov. g. Chordear.
Synon. Stilophora J. Agdh.; Stilephora Rabenh.; Stylophora Decne; Spilophora Wittst.

Spermatodermia Wallr. vid. *Spermodermia Tode.*

Spermatodium Fée . . .
= Verrucaria Pers.

Spermatura Rchb. 1828. Consp. p. 141. n. 3662: g. Scandicinear. (*Uraspermum Nutt.*)
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
= Osmorrhiza Rafin.

Spermaxyron Steud. vid. *seq.*

Spermaxyrum Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 84. t. 233.
Pers. 1807. Ench. II. p. 596. n. 2167: g. Monoec. Gynandr.
DC. 1824. Pr. I. p. 532: g. Olacinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 580. — Meisn. 1837. Gen. p. 45(33). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 180. — Steud. 1841. Nom. II. p. 619 (*Spermaxyron*).
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 118: g. Sapotear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 136. n. 3611: g. Olacinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Fissiliear.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 11. 19: g. Olacear.
= Olax Linn.

Spermipole Rafin . . . . : g. Rivulinicar., teste Leman 1827. Dict. p. 45. p. 490.

Spermococe Linn. 1764. sphalm. pro *Spermacoce.*

Spermodermia Tode 1790. Meckl. . . .: g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 133. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1482. — Kunze 1823. Mykol. Heft. II. p. 95 (clandestina).
DC. 1815. Franç. V. p. 17: g. Gymnocarpor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 262 (*Spermatodermia*): g. Sporomycetum entosporor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 480: g. Sclerotiaceor.
? = Sphaeriae status juvenilis. (Fries Syst. I. p. 159.)

Spermodon „Palis." Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 20 et Schult. Mant. II. p. 8): nov. g. Cyperear. (Schoeni sp. Rottb. & Vahl.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1079.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 296: g. Rhynchosporear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 137.

Spermodon Palis. cont.
Endl. 1837. Gen. n. 975. p. 114; 1841. Ench. p. 64: g. Schoenoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1457.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 118: g. Haloschoenor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271: sect. Rhynchosporae.
Synon. Triodon Rich.

Spermoedia*) Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 268: nov. g. Sclerotiaceis aff. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 134 et Fries 1825. Pl. homon. p. 199.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 566: g. Sclerotiear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 776. n. 4000.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 996: g. Hymenomycor. anomalor.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 5: g. Uredineor. praeformativor.
Endl. 1836. Gen. p. 16; 1841. Ench. p. 13: g. Gymnomycetum proletarior.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 316: g. Spermoedieor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 238: sect. Sclerotii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 519: g. Strumacear.
Synon. Sphacelia Lev.

Spermoediei Rchb. 1841. Nomencl. p. 8: sect. Sclerotiaceor. genuinor. Gen.: Spermoedia.

Spermogonia Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 199: nov. g. Confervear. (Oscillatoriae sp. Agdh.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 134.
= Bangia Lyngb.

Spermolepis Rafin. 1830 in Seringe Bull. p. 217: nov. g. Umbelliferar. (Ligusticum pusillum, Ammi divaricatum Pers., etc.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 82.
= Leptocaulis Nutt.

Spermomorphia Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 178: nov. g. Mycetum. (Sclerotium semen.) *Cf.* *seq.*
Endl. 1836. Gen. n. 281 *d.* p. 24; 1841. Ench. p. 16: sect. Sclerotii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 317. 4.

Spermomorphium Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Sclerotiacear. *Cf.* *praeced.*

Spermophylla Necker 1790. Elem. bot. I. p. 24. n. 43: nov. g. Actinophytor., ab Arctotide L. separatum.
= Sphenogyne R. Brown.

Spermoptera DC. 1837. Prodr. VI. p. 65: sect. Chrysanthemi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2671 *e.* p. 435; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3070. 5.

Spermosira Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 213; 1845. Phycol. germ. p. 174; 1849. Sp. Alg. p.

---

*) „Nomen a *σπέρμα* et *οἰδέω*, quia totus fungus simul nisi semen fervescendo oedematosum."

Spermosira Kütz. cont.
294. n. 205: nov. g. Nostoccar. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 726. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 40.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 69: g. Nostochinar. genuinar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Anabaenear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Spermothamnion „Aresch." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: nov. g. Ceramiear. (Ceramium Turneri Mert.) — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 334.

Sphacelaria*) Lyngbye 1819. Tent. hydr. Dan. p. 103. t. 30—32: nov. g. Stereogonator. (Ceramium pennatum Fl. dan.)
Agdh. 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 332: g. Hutchinsidear.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 189: g. Hydrophytar. loculatar.
Agdh. 1824. Syst. p. XXX. 164; 1828. Spec. II. 1. p. 17: g. Ectocarpear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 396; 1841. Brit. Alg. p. 37. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 149. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 127. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 128. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 463. n. 286.
Fries 1825. Pl. homon. p. 330: g. Fucacear.
Leman 1827. Dict. v. 50. p. 140: g. Algar. articulatar.
Bonnem. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 107: g. Epidermear.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 399: g. Phlomidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 504: g. Sporochnear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Ceramidear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 752. n. 3816: g. Confervinar.
Duby 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 333: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 6. n. 72. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 713. — Math. 1853. Belg. II. p. 485.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 75: g. Myelothamnior.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93): g. Sphacelariear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 23. n. 85. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phyc. gen. p. 291; 1845. Phyc. germ. p. 239. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 154. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 175. — J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 29. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XI. p. 726. — Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 389. — Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 136.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Sphacelaridar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p . . . : g Stilophorear.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 364: g. Phaeosporear.

*) σφάκελος, gangraena, caries.

Sphacelaria Lyngbye cont.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 221: g. Ectocarpacear.
Synon. Lyngbyella Bory; Delisella Bory; Sphacellaria Bory.

Sphacelaria Léveillé mss.: vid. *Sphacelia Lév.*

Sphacelaridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Halyserear. Gen. Sphacelariear. Decne.

Sphacelarieae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93): ordo Aplosporear. Gen.: Sphacelaria, Myriotrichia, Cladostephus. *Cf. Sphacellarieae J. Agdh.*
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phyc. gen. p. 291: fam. Dermatosiphear. Gen.: Sphacelaria, Halopteris, Stypocaulon, Ballia, Chaetopteris, Cladostephus.
Endl. 1843. Spl. III. p. 23: trib. Halyseridear. Gen. ut Decne.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 238: fam. Confervinar. Gen. ut antea.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 175: subsect. Chordariear. Gen.: Sphacelaria, Cladostephus.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: trib. Ectosporear.
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 27: ordo Fucoidear. Gen.: Sphacelaria, Chaetopteris, Cladostephus.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: trib. Phycoidear. Gen. ut Decne.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 387: fam. Syntamiidar. Gen. ut Rabenh.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 134: subordo Ectocarpacear. Gen. ut J. Agdh. et 1858 (ibid. III. p. 124) Myriotrichia.
= Ectocarpear. Kütz. pars.

Sphacele Benth. 1829. Bot. Regist. n. 1289 (Bot. Mag. n. 2993): nov. g. Labiatar. — Par. Hook. & Arn. 1831. Bot. Beech. voy. Pt. I. p. 41. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 795. n. 4123.
Benth. 1834. Labiat. p. 567: g. Stachydear. Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 835. — Rchb. 1837. Hdb. p. 188. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 449. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 198.
Endl. 1838. Gen. n. 3651. p. 626; 1841. Ench. p. 308: g. Lamiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 287(196). — Walp. 1845. Rep. III. p. 844. 988.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Lamidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 254: g. Melissear.
Synon. Alguelaguen Adans.; Phytoxys Molin.

Sphacelia Léveillé 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 578: nov. g. Fungor. parasiticor. (S. segetum), antea *Sphacelaria.*
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.
= Spermoedia Fries.

Sphacellaria Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 226: g. Confervear.
Menegh. 1838. Cenni Alghe p. 33: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 4. n. 72.

Sphacellaria Bory cont.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 28: g. Sphacellariear. — Par. Zanard. 1843. Classif. p. 10.
= Sphacelaria Lyngb.

Sphacellarieae J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 27: trib. Fucoidear. Gen.: Sphacellaria, Cladostephus.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Antheridio-sporear. Gen. ead.
= Sphacelarieae Decne.

Sphacelus „Rivin." Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 231: g. pl. class. IX. (Sideritidis sp. Auct.)

Sphaenodesma Schauer, Miq. vid. *Sphenodesme Jack.*

Sphaenoplea Spreng. (Auct.) err. pro *Sphaeroplea Agdh.*

Sphaenopteris Sternb., Ritg. vid. *Sphenopteris Brongn.*

Sphaeoplea Wallr. vid. *Sphaeroplea Agdh.*

Sphaeralcaea Endl. vid. *seq.*

Sphaeralcea*) A. St. Hilaire 1825. Fl. Bras. I. p. 209 (Pl. us. Brés. nr. 52): nov. g. Malvear. (S. cisplatina.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 351. — Meisn. 1837. Gen. p. 26(22). — Endl. 1840. Gen. n. 5272. p. 980; 1841. Ench. p. 511; 1850. Spl. V. p. 58 (*Sphaeralcaea*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 296; 1843. II. p. 789. — Brongn. 1843. En. genr. p. 76. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — D.G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 727. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 301.
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 4255; 1837. Hdb. p. 286; 1841. Nom. p. 199. n. 7619: g. Lavaterear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 465: g. Malvacear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 228.
Synon. Phymosia Desv.; Sphaeroma DC.; Meliphlea Zucc.?

Sphaeralidia Fée 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 5 (Isis 1834. p. 1054): sect. Chiodecti.

Sphaerangium Presl 1836. Mon. Lobel. p. 19; 1837 in Eckl. & Zeyh. En. pl. Afr. III. p. 398: sect. Rapuntii.
Endl. 1838. Gen. p. 511. n. 3058 *d*: sect. Lobeliae.
Endl. 1841. Ench. p. 264. n. 3868 *a γ*: subsect. Rapuntii.

Sphaerantheae Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 581: subdiv. Buphthalmear. Gen.: Sphaeranthus, Gymnarrhena.
DC. 1836. Pr. V. p. 368: subdiv. Conyzear. Gen.: Blepharispermum, Athroisma, Sphaeranthus. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 387; 1841. Ench. p. 235. Gen. ead. Accedit 1842 (Spl. II. p. 105) Leucoblepharis. *Cf.* 1843. Spl. III. p. 67. — Meisn. 1839. Gen. p. 189(127). Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. Gen. ead.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: div. Amellear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ut Endl. 1842.

Sphaeranthoides Cunningh. in litt. (DC. Prodr. V. p. 456.)
= Monenteles Labill.?

Sphaeranthos Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 289: g. Corymbiferar.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 220. t. 94. f. 3.
= Sphaeranthus Linn.

Sphaeranthus Linn. 1737. Coroll. p. 18. n. 984; 1740. Syst. p. 29; 1742. Gen. ed. II. p. 426. n. 817; 1753. Sp. II. p. 927; 1759. Syst. ed. X. p. 1236. n. 893: g. Syngenes. Polygam. Necessar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 240. n. 984: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Capitator.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1314; 1764. Gen. ed. VI. p. 452. n. 998; 1767. Syst. ed. XII. p. 581: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 663; 1784. Syst. p. 797. — Reich. 1778. Gen. p. 448. n. 1083. — Lour. 1790. Coch. II. p. 509. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 591. n. 1352. — Gmel. 1791. Syst. p. 1279. — Pers. 1797. Syst. p. 838; 1807. Ench. II. p. 449. n. 1963. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2394. n. 1577; 1809. En. p. 942. — Link 1822. En. II. p. 367. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 445. — Blanco 1837. Filipin. p. 635 (*Sphaerantus*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 114: g. Echinopor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Capitatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538. — Batsch 1802. Tab. p. 251.
Juss. 1789. Gen. p. 176: g. Cinarocephalar. (anomalar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 507. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 389.
Neck. 1790. El. I. p. 92. n. 168: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 413. t. 164: g. Tubulosar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 541: g. Centaurear.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 566: g. Buphthalmear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2482.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 409. n. 2667; 1831. Gen. II. p. 609. n. 3005: g. Cynarear.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 891: g. Echinopsidear.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 581: g. Sphaeranthear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 369. Sect.: Eusphaeranthus, Cuspidella, Polycephalos. — Endl. 1838. Gen. n. 2395. p. 388; 1841. Ench. p. 235. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 189(127). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3572. Sect. fere ut DC. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Cass. 1827. Dict. v. 50. p. 208: g. Inulear. Sect.: Oligolepis, Polylepis. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Less. 1832. Syn. p. 201: g. Conyzear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 291: g. Baccharidear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 44.

*) *σφαῖρα, globulus.*

Sphaeranthus Linn. cont.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 35: g. Asterinear. *Synon.* Sphaeranthos Vaill.; Polycephalos Forsk.; Oligolepis Cass.

Sphaeranthus Scopoli 1777. Introd. p. 125: g. Flosculosar., a DC. ex praecedente exclusum.
= . . . ?

Sphaerantus Blanco vid. *Sphaeranthus Linn.*

Sphaerastrum Meyen 1820. Nov. Act. Leop. XIV. 2. p. 776. t. 43: nov. g. Algar., Protococco aff. *Cf.* Flora Lit. I. p. 318 et Linnaea VI. Litt. p. 63.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 606: g. Micrasteriadis.
Menegh. 1838. Cenni p. 34; 1840. Linnaea XIV. p. 237: g. Desmidiear. (nudar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 651. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phyc. gen. p. 165; 1845. Phyc. germ. p. 143; 1849. Sp. Alg. p. 194. n. 148. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 51. — Math. 1853. Belg. II. p. 529.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Closteriear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Pediastrear.

Sphaereda Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. III. t. 159. *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 728.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 259; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIX: g. incertae sedis.

Sphaerella Sommerf. 1824. Mag. for Naturwedensk. IV. p. 249.
= Protococcus Agdh.

Sphaerella Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 395: subg. Sphaeriae.

Sphaeria Hall. 1768. Helvet. III.
„Weber Spicil. p. 281" Wiggers 1780. Fl. Holsat. p. 84: g. Sphaerospermar.
Roth 1788. Germ. I. p. 553: g. Fungor. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 770. n. 1684. — Gmel. 1791. Syst. p. 1473. — Pers. 1796. Obs. myc. p. 64. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 18. 233.
Juss. 1789. Gen. p. 7: g. Lichenum.
Pers. 1797. Tent. p. 1. 49: g. Sclerocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 1: g. Sclerocarpor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 322. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45.
Batsch 1802. Tab. p. 270: g. Fungoideor.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. XI: g. Xylomycor.
DC. 1805. Franç. II. p. 282; 1815. V. p. 116: g. Hypoxylor. (*Hypoxylon, Variolaria* et *Clavariae* sp. Bull.) — Par. Leman 1827. Dict. v. 50. p. 143.
Mirb. 1815. Elém. II. p. 864: g. Hypoxylear.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 168; 1818. II. p. 318: g. Sphaerioideor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 383. n. 3450; 1831. Gen. II. p. 759. n. 3870.
Nees 1816. Syst. p. 284; 1817. Ueberbl. p. 74: g. Myelomycor.
Mart. 1817. Erlang. p. 474: g. Myelomycetum.

Sphaeria Hall. cont.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Sphaeriar. — Par. Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 526: g. Spheridear. restrict.
Agdh. 1821. Aphor. p. 33: g. Sphaeriacear. — Par. Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 583. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 749. — Math. 1853. Belg. II. p. 175.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 319; 1818. Elench. II. p. 53; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 388: g. Sphaeriaceor. Subgen. (1849): Bertia, Gibberidea, Pirostoma, Sphaerella. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181. — A. Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 132. — Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 40; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Bonord. 1851. Hdb. p. 265. Sect.: Cryptosphaeriae, Gymnosphaeriae. — Bail 1858. Syst. p. 51 (simplicium).
Schmidt 1823 in Kunze Mykol. Heft. II. p. 1—30: divisio generis.
Fries 1825. Pl. homon. p. 108: g. Sphaerinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 276; 1841. Nom. p. 7. n. 298. — Endl. 1836. Gen. n. 394. p. 34; 1841. Ench. p. 19. — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 242. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 168.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1000: g. Sclerogastrum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 765: g. Pyrenomycetum. (eustomor.) — Par. Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 28; 1839. III. p. 28; 1840. IV. p. 10. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 333.
Synon. Aecidium Hill; Pustularia et Perisporularia Rouss.; Circinostoma, Exormatostoma et Cucurbitaria Gray; Phialospora Rafin.; Splanchnonema Corda; Cryptosphaeriae Grev. pars.

Sphaeriaceae Agardh 1821. Aphor. p. 83: subdiv. Pyrenomycetum. Gen.: Sphaeronema, Telebolus, Atractobolus, Cytospora, Rhytisma, Stegia, Phacidium, Hysterium, Solenarium, Polystigma, Lophium, Sphaeria.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 583: trib. Hypoxylear. Gen.: Sphaeria, Depazea, Dothidea, Erysyphe, Corynella, Eustegia, Lophium. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 163. Gen.: Xilaria, Poronia, Hypoxylon, Sphaeria, Diplodia, Hyphasma, Hindersonia, Depazea, Septoria, Cheilaria, Neottiospora, Thamnomyces, Dothidea, Asteroma, Ectostroma, Eustegia, Lophium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 74: fam. Sphaeriariear. Trib.: Stigmaspherae, Platispherae, Astomospherae.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. unica Pyrenosporangiar. Sect.: Sphaeriacea, Dothideacea, Strigulacea, Dichaenacea.

Sphaeriacei Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LII: sect. Pyrenomycetum. Gen.: Phoma, Bostrychia, Sphaeria, Dothidea. — Simil. Fries 1823

Sphaeriacei Fries cont.
Syst. myc. II. p. 318. Gen.: Dothidea, Sphaeria, Stegia, Lophium, Corynella.
Fries 1825. Pl. homon. p. 103: ordo Pyrenomycetum. Subord.: Sphaerini, Dichaenei, Strigulini, Dothidini. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 381. Gen.: Cordyceps, Xylaria, Rhizomorpha, Thamnomyces, Camillea, Poronia, Hypocrea, Hypoxylon, Diatrype, Endothia, Melogramma, Dothidea, Nectria, Sphaeria, Ceratostoma, Massaria, Hercospora, Halonia, Pyrenophora, Saccothecium, Pemphidium, Micropeltis.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: fam. Mycetum. Gen.: Depazea, Pustularia, Megathecium, Polystigma, Trichostroma, Sphaeria, Solenarium, Poronia, Hypoxylon, Cordylia, Chordostylum, Thamnomyces.
Rchb. 1828. Consp. p. 10 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Gasteromycetum. Divis.: Cytisporei, Phacidiacei, Sphaeriacei (subdivis. ut Fries 1825).
Endl. 1836. Gen. p. 33; 1841. Ench. p. 19: trib. Pyrenomycetum. Subtrib. ut Fries 1825. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 241.
Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123: sect. Xylomycor. Gen.: Sphaeria, Lophium.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 24: fam. Hyphomycetum. (?) Gen.: Ceuthospora, Melanospora, Sphaeronema.
Rchb. 1837. Hdb. p. 130: fam. Dermatomycetum (continens Sclerotiaceos et Sphaeriaceos Rchb. 1828). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 6. Divis.: Xylomacei, Phacidiacei, *genuini* (subdivis.: Dothidei, Strigulini, Hypospilei, Sphaerini). — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 136. Sect.: Sphaeronemeae, Phacidiacei, *genuini* (subsect.: Dothidini, Sphaerini).
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 31; 1842. Mycol. p. LXXXVIII. 130: fam. Sclerogasterum. Gen.: Perisporium, Ascochyta, Asteroma, Cheilaria, Sporotheca, Splanchnonema, Melanospora, Chaetomium, Meliola, Sphaeria, Discosia, Ostropa, Hypospila, Dichaena, Gibbera, Pemphidium, Dothidea, Cucurbitaria, Corynelia, Hypocrea, Valsa, Poronia, Hypoxylon, Thamnomyces, Acrosphaeria, Xylaria, Cordyceps.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 40: fam. Thecasporor. Gen.: Sphaeria, Depazea, Dothidea, Hysterium, Lembosia, Asterina.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: subordo Ascomycetum. Gen.: Hypocrea, Acrosphaeria, Thamnomyces, Hypoxylon, Sphaeria, Stigmea, Saccothecium, Splanchnonema, Melanospora, Haplosporium, Pemphidium, Micropeltis, Discosia, Cheilaria, Dothidea, Corynelia.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: trib. Endothecor. Gen.: Hypocrea, Hypoxylon, Acrosphaeria, Acroscyphus, Thamnomyces, Chaenocarpus, Cordiceps, Bacillaria, Sphaeria, Podostrombium, Aposphaeria, Depazea, Stigmea, Sporotheca, Dothidea, Pyrenochium,

Sphaeriacei Fries cont.
Polystigma, Saccothecium, Melanospora, Splanchnonema, Asterina, Pisomyxa?, Lembosia, Meliola, Microthyrium, Micropeltis, Pemphydium, Hypospila?, Perisporium.
Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 143: fam. Dermatogasterum. Gen.: Perisporium, Chaetomium.
Bonord. 1851. Hdb. p. 263: fam. Pyrenomycetum. Divis.: Sphaeriae *simplices* (gen.: Perisporium, Sphaeria, Ceratostoma, Platystoma, Corynelia, Acrosphaeria, Thamnomyces, Onygena), *synbioticae* (gen.: Circinaria, Pustularia), *compositae* (gen.: Synsphaeria, Cucurbitaria, Pyrenodochium, Pyrenodermium, Ascostroma, Pulvinaria, Poronia, Xylaria, Hypoxylon, Kentrosporium). — Par. Bail 1858. Syst. p. 50. Divis.: *simplices, synbiotici, stromatici.*
Sphaeriae Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: cohors Fungor. Gen.: Cordylia, Poronia, Pulvinaria, Sphaeria.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: trib. Hypoxylear. Pseudofungor. Gen.: Rhizomorpha, Sphaeria, Naemaspora, Stilbospora.
Sphaeriae compositae, simplices et synbioticae Bonord. vid. *Sphaeriacei Fries.*
Sphaeriarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: ordo Sarcosporar. Fam.: Sphaeriaceae, Hysterineae, Xylomateae.
Sphaeridiophorum*) Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 125. t. 6. f. 35: nov. g. Leguminosar. (Indigofera linifolia.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 168.
= Indigofera Linn.
Sphaeridium Fresen. 1852. Beitr. z. Mykol. H. 2 (Flora 1854. p. 696): nov. g. Fungor.
Sphaerieae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 84: fam. Tectigraniae. Gen.: Molgosphaera, Phyllosphaera, Cyathisphaera, Cladosphaera, Platisphaera, Dryinosphaera, Syphosphaera, Phialisphaera, Trichosphaera, Stigmatisphaera, Hydropisphaera, Thallisphaera, Gamosphaera, Ephedrosphaera, Porosphaera, Discosphaera, Xylosphaera, Corynesphaera, Mitrasphaera.
Sphaerine Herbert 1837. Amaryll. p. 67. 106: nov. g. Alströmeriear. (Alströmeria distichifolia Rz. & Pav.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 168. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 19. 280. — Kunth 1850. Enum. V. p. 784.
Sphaerini Fries 1825. Pl. homon. p. 103: subordo Sphaeriaceor. Gen.: Hypocrea, Hypoxylon, Valsa, Sphaeria.
Rchb. 1828. Consp. p. 12: subdiv. Sphaeriaceor. Gen. ead.
Endl. 1836. Gen. p. 34; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Sphaeriaceor. Gen. ead. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 241. Accedit Hemisphaeria.
Rchb. 1841. Nom. p. 7: subsect. Sphaeriaceor. genuinor. Gen. ut Fries. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 169. Gen.: Sphaeria, Hypoxylon, Codonia, Cordyceps.

*) σφαιρίδιον, parvus globulus.

Sphaerioidei Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 314. Gen.: Poronia, Cordylia, Sphaeria, Ceratostoma, Corynelia, Lophium, Sphaeronaema, Naemaspora, Dothidea, Stegia, Actidium, Hysterium, Leptostroma, Xyloma, Depazea, Erysiphe, Asterophora, Lignidium, Lycogala, Naematelia, Racodium, Phyllerium, Erineum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 376: div. Myelomycetum. Gen.: Sphaeria, Lophium, Stegia, Sphaeromyxa, Alphitomorpha, Lasiobotrys, Bostrychia, Phacidium, Rhytisma, Hysterium, Solenarium. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 759. Gen.: Sphaeria, Lophium, Heterosphaeria, Stegia, Vermicularia, Actidium, Rhytisma, Dothidea, Phacidium, Hysterium, Solenarium, Lasiobotrys, Erysiphe, Splanchnonema.

Sphaeriomorphium Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 171 (*Sphaeromorphium*) et p. 180: g. Sclerotiacear. (Dothidea sphaeroidea.)
= Dothidea Fries.

Sphaeritis*) Ecklon & Zeyh. 1837. Enum. pl. Afr. austr. III. p. 299: nov. g. Crassulacear. (Crassula muricata Thunb.)
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Umbilicear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1034: g. Sedear.
Walp. 1843. Rep. II. p. 255; 1846. V. p. 792: g. Eucrassulear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 20. n. 4611/$_1$: g. Rochear.

Sphaerobolideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 565. 580: div. Gasteromycear. Gen.: Sphaerobolus.

Sphaerobolus Tode 1790. Meckl. I. p. 43: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 169. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1462.
Pers. 1797. Tent. p. 5. 58: g. Sarcothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 115: g. Sarcocarpor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 32: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 129; 1817. Überbl. p. 33: g. Geogastror.
Mart. 1817. Erlang. p. 386: g. Dermatogasterum.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Phallor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 580: g. Sphaerobolidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69; 1829. Anal. fam. p. 74: g. Carpobolear. — Par. Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 561.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 309; 1825. Pl. homon. p. 132; 1828. Elench. II. p. 52; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 439: g. Carpobolor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 213. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 26. 66; 1842. Mycol. p. 106. — Bonord. 1851. Hdb. p. 231.

*) σφαιρίτης, globularis.

Sphaerobolus Tode cont.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Pezizoideor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 999: g. Angiogastrum.
Grev. .... Sc. crypt. fl. III. p. 158.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 518. n. 3493; 1831. Gen. II. p. 770. n. 3948: g. Geogasterum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 764: g. Pyrenomycetum sphinctrostomor.
Endl. 1836. Gen. n. 337. p. 29; 1841. Ench. p. 17: g. Carpoboleor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 401. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 303.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 38: g. Nidularieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Nidulariaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 398: g. Carpobolinear.
Synon. Carpobolus Mich.

Sphaerocapnos DC. 1821. Syst. II. p. 131; 1824. Prodr. I. p. 130: sect. Fumariae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4827 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 145.
= Fumaria Tourn.

Sphaerocardamum Schauer 1847. Linnaea XX. p. 720: nov. g. Camelinear. (S. nesliaeforme.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 43.

Sphaerocarpa Schumach. 1803. En. pl. Seland. II. p. 220: nov. g. pl. (Sph. operculata.)
Endl. 1836. Gen. n. 315 *b*. p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Craterii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 362. 2.

Sphaerocarpaea „Griseb." Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 3550 *b*. p. 1400; 1841. Ench. p. 302: sect. Lisyanthi. (L. fruticosus Cham.)
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5099. 3: sect. Lysianthi.

Sphaerocarpos Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 4. t. 3: g. pl. class. I. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 170.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 39: g. Eccalyptrocarpor.
Raddi 1818. Opusc. scient. Bologn. II. p. 360; 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17: g. Hepaticar.
Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Targioniacear.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 38: g. Lichenastror. cryptocephalor.
Conf. Sphaerocarpus Adans.

Sphaerocarpos Gmel. 1791. Syst. p. 9: g. Monandr. Monogyn.
Juss. 1816. Dict. v. 2. spl. p. 20 (*Sphaerocarpus*): g. Amomear.
= Colebrookia Don.

Sphaerocarpus Adans. 1763. Fam. II. p. 15: g. Hepaticar. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 766. n. 1667. — Willd. 1809. Berl. Mag. III. p. 101. — Agdh. 1822. Aphor. p. 104. — Leman 1827. Dict. v. 50. p. 170. — Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 111.

Sphaerocarpus Adans. cont.
Schwägr. 1814. Musc. hep. prodr. p. 35: g. Muscor. hepaticor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 236. n. 3358; 1831. Gen. II. p. 740. n. 3751.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 66: g. Homallophyllar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 681: g. Targionidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 77: g. Phialicarpear.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 522: g. Epiphyllinor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 70; 1831. Syll. Jung. p. 7: g. Ricciacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 455. p. 43; 1841. Ench. p. 25. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 19: g. Targioniear.
Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 1037. 1039: g. Ricciear. — Par. Lindenb. 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 414. 496. — Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXXII. 361. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 795. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 4. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 749.
Mont. 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 39; 1839 in d'Orb. voy. Bot. p. 50. Char. reform.
Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 235: g. Corsiniear. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 594.
Math. 1853. Belg. II. p. 88: g. Homalophyllar.
= Sphaerocarpos Mich.

Sphaerocarpus Bulliard 1780. (?) Herb. pl. t. 386, etc.: nov. g. Fungor. (species complectens Trichiae, Physari, Liceae, Cribrariae, Leangii, etc. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 172.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 15. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 5.
DC. 1805. Franç. II. p. 250: sect. Trichiae.

Sphaerocarpus Batsch 1802. Tab. affin. p. 253: g. Corymbiferar.

Sphaerocarpus Juss. vid. *Sphaerocarpos Gmel.*

Sphaerocarpus Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 133: sect. Lasiandrae. (L. tetraptera.)

Sphaerocarya Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 371: nov. g. Rhamnear. (S. edulis.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 27. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51).
Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 195. n. 986: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 856.
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3635 (*Sphenocarya*): g. Mimusopear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 377: g. Aquifoliacear. (?) — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 422.
Wight 1833 in Edinb. n. phil. journ. XV. p. 180; 1840. Ic. pl. Ind. I. t. 255: g. Santalacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2079. p. 327; 1841. Ench. p. 207. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 16. p. 244. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 777.

Sphaerocarya Wallich cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Santalear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240).
Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2354 (*Spaerocarya*): g. Osyridear.
= Pyrularia Michx. (A. DC. Pr. XIV. 2. p. 628.)

Sphaerocaryum Nees herb. ex Steud. Nomencl. II. p. 620.
= Panicum elegans Wight.

Sphaerocephala Wallroth vid. *Lichenastra Wallr.*

Sphaerocephalos Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 9: nov. g. pl. class. I. (Fungoidaster parvus Mich. t. 82. f. 1.)
= Trichia Hall.?

Sphaerocephalum Wiggers 1780. Prodr. fl. Holsat. p. 87: nov. g. Aspidoferar. (Mucor sphaerocephalus L.)

Sphaerocephalus Rupp. . . .
= Echinops L. (DC. Pr. VII. 1. p. 52.)

Sphaerocephalus Hall. Enum. stirp. Helv. I. p. 9 passim: vid. *Sphaerocephalos Hall.*

Sphaerocephalus Batt. . . . . .
= Agarici sp. (DC. Pr. VII. 1. p. 52.)

Sphaerocephalus Necker 1790. Elem. bot. III. p. 334. n. 1748: nov. g. Phryganophytor.
= . . . ?

Sphaerocephalus „Lagasc." DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 67: nov. g. Labiatiflorar. — Par. Don 1832. Edinb. n. phil. mag. *Cf.* Flora Lit. III. p. 163.
= Caloptilium Lag.

Sphaerochloa Palis. 1828. Ann. sc. nat. XIII. t. 5. f. 1.
= Nasmythia Huds.

Sphaerocionium Presl 1843. Hymenoph. p. 125: nov. g. Hymenophylloidear. (Hymenoph. hirsutum Sw., etc.)

Sphaerocista Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 734: nov. g. Melanconiacear. (Sphaeria Prunastri Fr.?)

Sphaeroclinium DC. 1837. Prodr. VI. p. 50: sect. Matricariae. (M. nigellaefolia.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2669 *b*. p. 434; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3066. 2.
Schultz Bip. 1844. Üb. Tanac. p. 20; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 207: g. Chrysanthemear. — Simil. Visian. 1846. Sem. Patav. (ex typo Candolleano.) *Cf.* Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 379.

Sphaeroclinium Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 409; 1857 in DC. Prodr. XIV. 2. p. 574: sect. Lachnaeae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 65. n. 2103 *a*.

Sphaerococca DC. 1824. Prodr. I. p. 615: sect. Melicoccae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5208 *b*.
= Hypelate P. Browne.

Sphaerococcaricae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: ordo Coccosporar. Fam.: Ceramideae, Sphaerococceae.

Sphaerococceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: fam. Acininae. Gen.: Sphaerococcus.
Rchb. 1828. Consp. p. 28: div. Floridear. Gen.: Rhytiphloea, Rhodomela, Ptilota, Lia-

Sphaerococceae Dumort. cont. gora, Chondria, Dasia, Thamnophora, Plocaria, Sphaerococcus, Bonnemaisonia. — Par. J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 11. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126. Gen.: Delesseria, Nitophyllum, Plocamium, Rodhymenia, Phyllophora, Gigartina.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: fam. Sphaerococcariear. Gen.: Sphaerococcus, Plocamium, Gigartina, Plocaria, Halymenia, Delesseria, Chondrus, Lomentaria, Volubilaria, Gelidium, Sporochnus.

Rchb. 1841. Nom. p. 21: fam. Ascophycar. Divis.: Plocamieae, Polyideae, Furcellarieae.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 407; 1845. Phyc. germ. p. 307: fam. Periblastear. Gen.: Bowiesia, Sphaerococcus, Trematocarpus. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 772. Gen.: Sphaerococcus, Melanthalia, Trematocarpus, Corallopsis, Acropeltis, Rhodophyllis, Fauchea, Epymenia.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: subordo Ceramiacear. Gen. Sphaerococcoidear. Endl.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 156: fam. Ascophycear. Sect.: Rhodomeleae, Sphaerococcoideae, Delesserieae.

Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 289: fam. Floridear. Gen. scand.: Delesseria, Aglaophyllum, Plocamium, Rhodomenia, Gigartina, Phyllophora.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: trib. Centrothalamar. Subtrib.: Dichophyceae, Cystoclonieae, Plocarieae, Eusphaerococceae, Stenogrammeae, Wormskioldieae, Botryocarpeae, Thamnophoreae, Corinaldieae, Chrysymenieae.

Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 91: trib. Sphaerococcoidear. Gen. amer.: Calliblepharis, Gracilaria, Corallopsis.

Sphaerococcites Sternb. 1838. Vers. II. p. 28: g. Floridoitum.

Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 55. n. $122/_{103}$: g. Algar. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 59.

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 13; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII. 126. t. 39: g. Floridear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear. foss.

Synon. Algacites Schloth.

Sphaerococcoideae J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 67. 148: trib. Floridear. Gen.: Hypnea, Gracilaria, Rhodomenia, Heringia, Sphaerococcus. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 50. Gen.: Hypnea, Plocaria, Rhodomenia, Sphaerococcus.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Gloiopeltis, Gigartina, Gelidium, Mammea, Chondrus, Grateloupia, Heringia, Sphaerococcus, Suhria; Hypnea, Calocladia; Peyssonelia.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 170: sect. Sphaerococcear. Gen.: Hypnea, Cystoclonium, Rhynchococcus, Sphaerococcus.

Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 88: ordo Desmiospermear. Trib.: Delesserieae, Sphaerococceae.

Sphaerococcus Stackhouse 1801. Nereis brit. p. XXIV: nov. g. Algar., a sequentibus varie circumscriptum. *Cf.* Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 8 et Leman 1827. Dict. v. 50. p. 173.

Web. & Mohr 1805. Beitr. I. p. 298. Char. reform.

Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XV. 22; 1821. Aphor. p. 100; 1822. Spec. I. 2. p. 227; 1824. Syst. p. XXXIV. 211: g. Floridear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 364. Sect.: Dromius, Sphaerococcus, Mammillaris, Chondrus. — Fries 1825. Pl. homon. p. 332. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 893. — Menegh. 1838. Cenni p. 39. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 79.

Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 10: g. Phycoidator.

Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 7: g. Fucor. *Cf.* Flora 1821. II. p. 513.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72; 1829. Anal. fam. p. 76: g. Sphaerococcear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 497. Sect.: Chondrus, Gelidium, Hypnea, Plocamium, Gigartina, Erinacea. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 408 (sect.: Gracilaria, Rhodomenia, Ceratococcus); 1845. Phyc. germ. p. 307; 1849. Sp. Alg. p. 772. n. 518. (emend.) Sect.: Plocaria, Rhodymenia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193: g. Fucoidear.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 334. n. 3405; 1831. Gen. II. p. 750. n. 3802: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 94. p. 8; 1841. Spl. I. p. 1337; 1841. Ench. p. 6. Sect.: Phyllophora, Chondrus, Erinacea, Gelidium, Rhodomenia, Gigartina et (1841) Stenogramma. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 44.

Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 164. t. 16. 17. 20: g. Halymeniar.

Grev. 1830. Alg. brit. p. 137. (Syn. p. LVII.)

Ritg. 1831. Marb. II. p. 86: g. Chromatophycoidear.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 90: g. Chondrothamnior.

Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 727: g. Plocamiear.

J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 154: g. Sphaerococcoidear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360. (Flora 1843. p. 98.) — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 192. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 171. Sect.: Gracilaria, Rhodomenia.

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Delesseriear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54; 1849. ibid. XI. p. 749: g. Coccocarpear.

Synon. Ceramianthemum Donati; Ceramion Adans.

Sphaerocrotale Endl. 1840. Gen. n. 6472 *b.* p. 1262; 1841. Ench. p. 668: sect. Crotalariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5884. 2.

Sphaerodesmus „Corda“ Meneghini 1838. Cenni Alghe p. 34: g. Desmidiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 655.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 63: g. Pediastrear.?

Sphaerodium Presl 1843. Hymenoph. p. 123: sect. Hymenophylli. (H. Wilsoni Hook.)

Sphaerogasteres Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 389: div. Myxomycetum. Gen.: Lycogala, Bovista, Lycoperdon, Tylostoma, Geaster.

Sphaerogona Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: nomen pro *Sphaeroplea Agdh.* propositum.

Sphaerogyne Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 331: nov. g. Sonerilear. (S. latifolia.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 886.

Sphaeroidei Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 40: circulus Fungor. hypogaeor. Gen.: Endogone, Uperhiza, Tuber.

Sphaerolobium Smith 1805 in Konig Ann. bot. I. p. 509; 1808. Linn. Trans. IX. p. 261: nov. g. Leguminosar. (Sph. vimineum.) — Par. R. Brown 1811 in Ait. h. kew. III. p. 13. (Verm. bot. Schr. II. p. 465.) — Link 1821. En. I. p. 403. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 350. n. 1650; 1830. Gen. I. p. 366. n. 1848. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 183. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1506.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 744: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 132. — DC. 1825. Pr. II. p. 107. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4069. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 120. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. — Meisn. 1837. Gen. p. 81(58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 32; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 76: g. Pultenaear. — Par. Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 57.
Endl. 1840. Gen. n. 6437. p. 1257; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 571; 1846. V. p. 420. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 355.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5931: g. Pultenaeear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 127: g. Podalyriear.

Sphaeroma DC. 1824. Prodr. I. p. 435: sect. Malvae. An genus proprium?
Schltd. 1837. Linnaea XI. p. 352: g. Malvacear.
= Sphaeralcea St. Hil.

Sphaeromeria Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 401: nov. g. Artemisiear. (Sph. capitata et argentea.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 47. n. 2696/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 414: sect. Tanaceti.

Sphaeromorphaea DC. 1837. Prodr. VI. p. 140: nov. g. Artemisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2703. p. 440; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 212(135).

Sphaeromorphaea DC. cont.
— Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3462. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.

Sphaeromorphium Link vid. *Sphaeriomorphium Link.*

Sphaeromphale Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 374: g. Trypethelinar.
Endl. 1836. Gen. n. 151. p. 14; 1841. Ench. p. 10: g. Trypetheliacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 529.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 13: g. Verrucariear. — Par. Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 334. (emend.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Trypethelidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: g. Trypethelicar.
Trevis. 1855. Flora p. 181: g. Sphaeromphalear.
Synon. Segestria Fries (non Zoolog.); Segestrella Fries; Pyrenocarpus Trev.?

Sphaeromphaleae Trevisan 1855. Flora I. p. 181: fam. Lichenum. Gen.: Sphaeromphale.

Sphaeromyces Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 365: nov. g. Aspergillinor. (S. algeriensis.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494: g. Sepedoniaceor.

Sphaeromyci Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 6: circulus III. Protomycor. Gen.: Gymnosporangium; Aegerita, Dermosporium, Fusarium; Melanconium, Epicoccum, Didymosporium, Exosporium, Coryneum; Tubercularia, Atractium, Calicium.

Sphaeromyxa Spreng. 1827. Syst. IV. p. 406. n. 3453: g. Sphaerioideor.

Sphaeronaema*) Fries 1818. Obs. myc. II. p. 346: g. Sphaerioideor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 183.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 535; 1825. Pl. homon. p. 118; 1818. Elench. II. p. 115: g. Cytisporeor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1014: g. Sclerogastrum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 774. n. 3983: g. Cytisporear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 761: g. Pyrenomycetum sphinctrostomor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Sphaeronaemeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 400: g. Dichaenaceor. Sect.: Zythinia, Melanocybe, genuina.
= Sphaeronema Fries.

Sphaeronaemei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: sect. Endoclinor. Gen.: Zythia, Sphaeronaema, Hercospora, Ascospora, Septoria, Phoma, Melasmia, Ceuthospora, Stigmella, Sporocadus, Couturea, Cryptosporium, Hendersonia, Acrospermum, Micropera, Cytispora, Polychaeton, Fumago.

*) σφαῖρα, ναίω, νᾶμα: globulus natans. (Fries.)

Sphaeronema Fries 1815. Obs. myc. I. p. 187: nov. g. Fungor. (Calicium cladoniscum Ach.)
Agdh. 1821. Aphor. p. 83 (*Spheronema*): g. Sphaeriacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 586: g. Cytisporear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 242.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Nemasporeor.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 248: g. Phomaceor.
Endl. 1836. Gen. n. 368. p. 32; 1841. Ench. p. 19: g. Cytisporeor. — Par. A. Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123. — Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 270. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 148.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 25: g. Trichiaceor.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 27; 1840. IV. p. 39: g. Pyrenomycetum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 31; 1842. Mycol. p. 128: g. Sphaeronemear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 142.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 63: g. Sphaeropsideor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 233: g. Perisporiaceor.
Conf. Sphaeronaema Fries.

Sphaeronemeae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Anl. Mycol. p. LXXXVII. 122: fam. Sclerogasterum. Gen.: Coniothyrium, Sacidium, Leptostroma, Phoma, Leptothyrium, Sphinctrina, Strigula, Actinothyrium, Apiosporium, Microthecium, Ascospora, Hercospora, Dilophospora, Septoria, Acrospermum, Zythia, Coccobolus, Sphaeronema, Polystigma, Microthyrium, Ceuthospora.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 136: sect. Sphaeriaceor. Subsect.: *asporae* (Depazea, Asteroma), *sporophorae* (Leptothyrium, Leptostroma, Actinothyrium, Endotrichum, Labrella, Prosthemium), Cytisporei.
Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 142: fam. Dermatogasterum. Gen.: Leptothyrium, Sphaeronema.

Sphaeronemei Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: subordo Coniomycetum. Gen.: Microthyrium, Coniothyrium, Sacidium, Leptostroma, Phoma, Leptothyrium, Actinothyrium, Apiosporium, Microthecium, Cryptosporium, Sphaeronema, Aposphaeria, Acrospermum, Diplodia, Hendersonia, Lichenopsis, Pyrenotrichum, Vermicularia, Phlyctidium, Septoria, Dilophosporium, Neottiosporia, Pestalozzia, Angiopoma, Prosthemium, Asteroma, Couturia, Bryocladium.
Bonord. 1851. Handb. p. 220: ordo 10 Fungor. Fam.: Alphitomorphei, Perisporiacei, Thyreomycetes, Excipulini, Podosporiacei, Sporocadei.

Sphaeroophytum *) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 308: gen. 52 plant. Spec. natur.: Zaluzanskia, Ophioglossum, Onoclea, Osmunda, Struthiopteris, Trichomanes, Achomanes, Adianthum, Gleichenia, Polypodium, Psidopodium, Acrosticum, Phyllitis, Onopteris, Asplenium, Hemionitis, Lonchitis, Pteris, Oetosis, Blechnum, Pillularia.

*) σφαιρόομαι, sum rotundus, contrahor in orbem; φυτόν, planta.

Sphaerophora Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: series Mazediator. Gen.: Rhizomorpha, Thamnomyces, Sphaerophoron, Roccella.

Sphaerophora Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 12. p. 179: nov. g. Morindear. (S. gemella et glomerata.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 759.
= Padavara Rheede, DC. (Miq.)

Sphaerophoraceae Theobald 1858. Nat. Abh. Geb. Wett. p. 379: ordo Lichenum. Fam. Sphaerophoreae.

Sphaerophoreae Fries 1825. Pl. homon. p. 258: trib. Gasterothalamor. Gen. unicum: Sphaerophoron. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 14; 1841. Ench. p. 10. Gen. ut Fries 1831.
Rchb. 1828. Consp. p. 20 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Hyphopsorar. Gen.: Sphaerophoron.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Isidium, Sphaerophorum. — — Par. Fries 1831. Lich. eur. p. 5. 403. (angiocarpor.) Gen.: Sphaerophoron, Siphula. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350. Gen. ead.
Genth 1836. Nass. I. p. 316. 409: ordo Coniocarpor. Gen.: Sphaerophorus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 132; 1841. Nom. p. 14: fam. Crateropsorar. Gen. ut antea. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 75. Gen. ut Endl.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 124; 1849 in Orb. Dict. XI. p. 751: trib. 3 Lichenum. Gen.: Sphaerophoron et 1849 Acroscyphus.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 3: fam. Lichenum heteromericor. acroblastor. Gen. ut Fries 1831.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 119: div. Lichenum nucleiferor. Gen. ead.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 10 (Flora 1854. p. 233): trib. Coniophorear. Gen.: Sphaerophoron.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 50: fam. Thamnoblastor. Gen.: Sphaerophorus, Siphula?
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 379: fam. Sphaerophoracear. Gen.: Sphaerophorus.

Sphaerophorei Schärer 1850. En. Lich. eur. p. 176: fam. Lichenum capitator. Gen.: Sphaerophorus.

Sphaerophoridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: trib. Gasterothalamear. Gen.: Siphula, Sphaerophoron.

Sphaerophoron „Pers." Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXII. 134: g. Coenothalamor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 44: g. Angiocarpor.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 116. 585; 1814. Syn. Lich. p. 286: g. Cephaloideor.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Sphaerophoror.

Sphaerophoron Achar. cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 487: g. Rhizomorphidar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 23: g. Plocariar.
Meyer 1825. Flecht. p. 324: g. Coniocarpor.
Fries 1825. Pl. homon. p. 258; 1831. Lich. eur. p. 7. 404; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 119: g. Sphaerophorear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 362; 1841. Nom. p. 14. n. 515. — Endl. 1836. Gen. n. 159. p. 14; 1841. Ench. p. 16. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 124; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XI. p. 751. — Körb. 1846. Lich. eur. sp. p. 3. — Bayrh. 1849. Taun. p. 94. — Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 10. (Flora 1854. p. 233.)
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 876: g. Gasterothalamar.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 310. n. 3383; 1831. Gen. II. p. 747. n. 3783: g. Gymnosporor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Sphaerophoridar.
= Sphaerophorus Pers.

Sphaerophoros Wallr. vid. *Sphaerophorus Pers.*

Sphaerophorum GMS., Leman vid. *seq.*

Sphaerophorus Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 23: g. fam. tertiae plantar. lichenosar.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 210: g. Lichenum (caulescentium). — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 18. 228 (*Sphaerophorum*). — DC. 1805. Franç. II. p. 327; 1815. V. p. 178. — Leman 1827. Dict. v. 50. p. 185 (*Sphaerophorum*).
Link 1826 in Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 188: g. Hymenocarpor.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 580 (*Sphaerophoros*): g. Coniocymatior.
Genth 1836. Nass. I. p. 409: g. Sphaerophorear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 76. — Körb. 1856. Syst. Lich. Germ. p. 51. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 379.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 176: g. Sphaerophoreor.
Synon. Coralloides Hoffm.; Sphaerophoron Achar.

Sphaerophysa DC. 1825. Prodr. II. p. 270 (Mém. Legum. VI): nov. g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3913. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 245. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88(63)? (An Astragalear.?) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 574.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 581. n. 2852: g. Leguminosar. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 336.
Endl. 1840. Gen. n. 6569. p. 1277; 1841. Ench. p. 669: g. Astragalear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5757. — Walp. 1843. Rep. II. p. 860. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Sphaeroplea Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXV. 76: nov. g. Oscillatorinar. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 187. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 352. — Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 459. — Endl. 1836. Gen. n. 47. p. 4; 1841. Ench. p. 3; 1843. Spl. III. p. 14. n. 25.
Link 1826. Abh. Berl. f. 1824. p. 190: g. Conjugatar.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 55 (*Sphaeoplea*): g. Trichonematum.
Menegh. 1838. Cenni p. 30: g. Cadmear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 628.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 144: g. Confervear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phyc. gener. p. 262. — Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 19. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XI. p. 732.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Confervacear.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Lyngbyear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 89.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Oscillatoridar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 362. n. 245: g. Sphaeropleacear.
Synon. Sphaerogona Link; Sphaeroplethia Duby; Cadmus Bory?

Sphaeropleaceae Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 362: fam. Confervinar. Gen.: Sphaeroplea.

Sphaeroplethia Duby 1830. Bot. gall. II. p. 985.
= Sphaeroplea Agdh.

Sphaeropleum (Ehrenb.?) Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 171. 181: g. Sporigastreor.

Sphaeropsidei Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 61: fam. Stromatosporor. Gen.: Phylacia, Sphaeropsis, Sphaeronema, Phoma, Sacidium, Pestalotia, Asteroma, Meliola, Chaetomium, Piptostomum, Myxotrichum.
Lév. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 284: fam. Fungor. Gen.: Asteroma, Ypsilonia, Pestalozzia, Discosia, Parmularia, Scopulina, Hindersonia, Diplodia, Sphaeropsis.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: sect. Endoclinor. Gen.: Acrosphaeria? Phylacia, Corynelia?, Sphaeropsis, Piptostomum, Sphinctrina, Scopinella, Diplodia, Apiosporium, Microthecium, Gibbera, Spilobolus, Coccobolus, Pyrenotrichum, Sclerococcum, Chaetomium, Myxotrichum, Angiopoma, Vermicularia, Schizothecium, Dryophilum?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 415: ordo Pyrenomycetum. Gen.: Levieuxia, Topospora, Angiopoma, Pestalozzia, Lichenopsis, Prosthemium, Hendersonia, Diplodia, Haplosporium, Crocicreas, Clinterium, Dothiora, Dilophospora, Sphaeropsis?; Vermicularia, Actinothyrium, Sacidium. (*Synon. Apiosporinei Fries.*)

Sphaeropsis Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 62; 1846. ibid. 3e sér. V. p. 293; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: nov. g. Sphaeropsideor. (Sphaeria arundinacea Sow., etc.) — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 419. (restrict.)

Sphaeropsis Léveillé cont.
Lév. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 254. Char. emend.
Sphaeropsis Flotow 1847. Bot. Zeit. p. 65: nov. g. Porinear.
= Thelocarpon Nyl.
Sphaeropteris Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 112: nov. g. Filicum gyratar. (Polypodium medullare Forst.)
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 18: g. Helicogyratar.
= Cyathea Smith.
Sphaeropteris „Wallich mss." R. Brown 1829 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 41. t. 42 (Verm. bot. Schr. V. p. 364): nov. g. Filicum. (Peranema cyathoides Don.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 201.
Schott 1834. Gen. Fil. Fasc. I. t. 4.
Endl. 1836. Gen. n. 649. p. 63; 1841. Spl. I. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1040.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 41: g. Davalliacear.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 190: g. Aspidiear.
Meisn. 1843. Gen. p. 433(334): g. Dicksoniear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 339.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 58: g. Woodsiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 99: g. Aspidiacear.
Synon. Peranema Don; Nematopera Kunze; Prionopteris Wall.; Podeilema R. Brown.
Sphaerosacme Wallich 1824 in Roxb. Fl. ind. II. p. 429: nov. g. Meliacear. (Aglaia? decandra Wall.)
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 81. 98: g. Trichiliear.
= Lansium Rumph.
Sphaeroschoenus Walk.-Arn. 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 227 adnot.: novum nomen pro *Morisia Nees* propositum.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 97: g. Rhynchosporear.
Synon. Morisia Nees; Microchaeta Rchb.
Sphaerosoma Klotzsch .... in Dietr. Fl. boruss. p. 467: nov. g. Hymenomycetum octosporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 339: g. Hymenogasterum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 251: g. Hymenogastereor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Tuberaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438: g. Tubereor.
Bail 1858. Syst. p. 65. t. 19: g. Sphaerosomaceor.
= Sphaerozosma Corda et Sphaerozone Zob.
Sphaerosomacei Bail 1858. Syst. Pilz. p. 65: fam. Discomycetum. Gen.: Sphaerosoma.
Sphaerosparton Webb 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 282: subg. Retamae. (Genista sphaerocarpa DC.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 509.
Conf. Boelia Webb.
Sphaerosperma Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 732: nov. g. Sphaeriaceor. (S. protusum.)
Sphaerospermae Wiggers 1780. Prodr. fl. Holsat. p. 83: ordo 8 Cryptogamiae. Gen.: Riccia, Blasia, Fucus, Sphaeria.
Sphaerospermeae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: sect. Angiosporear.
Sphaerospermo-sporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: sect. Angiosporear.
Sphaerospora Sweet ex Steud. Nomencl. II. p. 620 (imbricata et triphylla).
= Gladiolus Linn.
Sphaerospora „Schwein." Lindl. vid. *seq.*
Sphaerosporium Schweinitz .... Trans. Amer. phil. soc. IV. p. 303. t. 19. f. 5.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43 (*Sphaerospora*): g. Stilbaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 481: g. Illosporiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.
= Melanconium Link?
Sphaerostachyon Miquel 1843. Syst. Piperac. p. 278: sect. Chavicae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 16. n. 1823/1 *b*.
Sphaerostachys Miquel 1844. Syst. Piperac. II. p. 375: nov. g. Piperinar. (Piper piluliferum Kunth.) — Par Endl. 1847. Spl. IV. p. 17. n. $1823/_{10}$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar.
Sphaerostachys Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 664: sect. Statices.
Sphaerostema Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 22: nov. g. inter Anonaceas et Menispermeas intermedium. *Cf.* Linnaea I. p. 497.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 247; 1831. Gen. II. p. 563. n. 2749: g. Anonear.
Blume 1830. Fl. jav. Schizandr. p. 13: g. Schizandrear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 177: g. Schizandracear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 306. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 416. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 84. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 79.
Conf. Sphaerostemma Rchb.
Sphaerostemma Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1897; 1841. Nom. p. 193. n. 7313: g. Schizandrear. Par. Blume (1833. Nov. fam. expos.) 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 91. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 6. — Walp. 1842. Rep. I. p. 92. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 95.
Bartl. 1830. Ord. p. 243: g. Menispermear. descisc.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 101: g. Schizandriacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 5(7): g. Schizandracear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4732. p. 836; 1841. Ench. p. 426.
Conf. Sphaerostema Blume.
Sphaerostephanos J. Smith .... in Hook. Gen. Fil. t. 24.
Kunze .... Farrenkr. p. 20. t. 11. 12.

Sphaerostephanos J. Smith cont.
Endl. 1841. Spl. I. n. 609/2. p. 1346 (*Sphaerostephanus*); 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1025.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 116: g. Dryopteridear.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335): g. Dicksoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
= Stegnogramma Blume. (Fée. *Cf.* Smith in Hook. journ. bot. III. 1841. p. 17.)

Sphaerostephanus Endl. vid. *praeced.*

Sphaerostichum Presl 1850. Epimel. bot. p. 494: nov. g. Polypodiear. (Niphobolus acrostichoides Smith.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 262: sect. Niphoboli?

Sphaerostigma Seringe 1828 in DC. Prodr. III. p. 46: sect. Oenotherae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 684. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 508.
Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. sem. h. Petr. n. 62: g. distinctum Onagrariar. *Cf.* Ann. sc. nat. 1836. 2e sér. V. p. 186; Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 9 et Linnaea 1837. Litt. p. 119.
Meisn. 1838. Gen. p. 120 (86): g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6113. p. 1189; 1841. Ench. p. 637: g. Epilobiear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 77.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6559: g. Sphaerostigmear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 117: g. Oenotherear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.
Synon. Onosuris Rafin.; Camissonia Link; Heterostemum Nutt.; Gyranthus Nutt.; Agassizia Spach; Holostigma Spach.

Sphaerostigmeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 170: sect. Epilobiear. Gen.: Sphaerostigma, Gayophytum, Meriolix.

Sphaerostylis Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 466: nov. g. Dysopsidear. (S. Tulasneana.)

Sphaerotele*) Presl 1827. Reliq. Hänk. I. p. 119. t. 16. f. 2: nov. g. Amaryllidear. *Cf.* Flora 1828. II. p. 433. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LIV. 900. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1609.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1251: g. Amaryllear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1280. p. 178; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 9. 53.
= Stenomesson Herb.

Sphaerotele Link, Otto & Klotzsch 1843. Icon. p. 95. t. 38.
= Pentlandia Herb.

Sphaerothallia Nees 1831. Nov. Act. Leop. XV. 2. p. 360 not.: nov. g. Parmeliacear. (Lecanora esculenta Eversm.) *Cf.* Nyland. 1858. Flora p. 489, ubi ad Lecanoram revocatur.
Synon. Chlorangium Link.

*) τέλος, finis, extremum.

Sphaerotheca „Desvaux" Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 8 *b:* sect. Uredinis.
= Peridermium Link.

Sphaerotheca Chamisso & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 605: nov. g. Scrofularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3140: g. Linderniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 172: g. Buddlejear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3: g. Gratiolear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 546. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199 (et p. 204 inter Scoparinas); 1841. Nom. p. 118. n. 4613. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3939. p. 681; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 517. — Walp. 1845. Rep. III. p. 278. 964.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 390: sect. Conobeae.

Sphaerotheca Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 80: sect. Crepidii. (Crepis Dioscoridis L.)
= Gatyona Cass.

Sphaerotheca Léveillé 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 138: nov. g. Erysiphear. (Alphitomorpha pannosa Wallr., etc.)

Sphaerothrombium Kütz. mss. 1832 teste ipso in Linnaea VIII. p. 370. (Nec *Hydrothrombium*, ut habet Endl.)
= Micraloa Bias.

Sphaerothylax Bischoff 1844. Flora II. p. 426. t. 1: nov. g. Podostemonear. — Par. Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 107; 1852. Arch. Mus. VI. p. 160. (*Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 788.) — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 440.

Sphaerothyrium Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 431: g. Hymenomycetum angiosporor.
= Stegilla Rchb.

Sphaerotilus Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 358: nov. g. Algar. aquae dulcis, Hygrocrocidi proximum. (S. natans.)
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 611: g. Leptomitear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phyc. gener. p. 150; 1845. Phyc. germ. p. 120; 1849. Sp. Alg. p. 147. n. 104: g. Cryptococcear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 71: g. Oscillatorinar.

Sphaerozone Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 53: nov. g. Sphaerozosmatineor. (Sph. Tulasnei.)

Sphaerozosma*) „Corda" Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 335: g. Tubereor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 27; 1842. Mycol. p. 109: g. Tuberacear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 277: g. Tuberaceor.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 52: g. Sphaerozosmatineor.
Cf. Sphaerosoma Klotzsch.

Sphaerozosma Ralfs 1845. Trans. Edinb. soc. II. p. 167.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Desmidicar.
= Isthmosira Kütz.

*) ζῶσμα, cingulum.

Sphaerozosmatinei Zobel in Corda Ic. Fung. VI. p. 52: subordo Tuberaceor. Gen.: Sphaerozosma, Sphaerozone.

Sphaerozyga Agardh 1827. Flora II. p. 634: nov. g. Confervoidear. (ab Endl. Gen. p. 4 ad Oscillariam reductum).
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 6: g. Myxophysalidum.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326 (Flora 1843. p. 92): g. Nostochinear. — Par. Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. ... — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phyc. gen. p. 211; 1845. Phyc. germ. p. 172; 1849. Sp. Alg. p. 289. n. 203: g. Nostocear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 42. — Math. 1853. Belg. II. p. 517.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 67: g. Nostochinar. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Nostochear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 734: g. Nostocinear.

Sphagna Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: fam. 19 Muscor. Gen.: Sphagnum.

Sphagnacea Rchb. 1841. Nomencl. p. 24: fam. Phyllobryor. Gen.: Sphagnum.

Sphagnaceae Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 83 adnot.: fam. Muscor. Trib.: Sphagneae, Andreaeeae.

Sphagnaceae Endl. 1836. Gen. p. 47; 1830. Ord. p. 30: ordo Muscor. Gen. unicum: Sphagnum. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 3. Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 137: fam. Phyllobryor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 3: trib. Muscor.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 97: div. Bryacear. Gen. id.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 66: fam. unica Diarrhagomitrior.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 87: trib. Acrocarpor. Gen. id.
Bayrh. 1849. Taun. p. 35: fam. Muscor. frondosor. Gen. id.
Synon. Musci evaginulati cladocarpi Brid.; Sphagnoidei Brid.; Sphagnoidei Brid.; Sphagneae Dumort.; Sphagnea Rchb.; Sphagna Fürnr.; Sphagnoideae Arnott; Diarrhagomitria Hampe; Sphagnacea Rchb.

Sphagnea Rchb. 1828. Consp. p. 31: subdiv. Eleutherophyllinor. Gen.: Sphagnum.

Sphagneae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: fam. Urnuliniae. Gen.: Sphagnum.
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 83 adnot.: trib. Sphagnacear.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 41.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 73: fam. Muscor. frondosor. Gen. id.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen. id.

Sphagnella Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 17: subg. Sphagni. (S. acutifolium.)

Sphagnideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. 69: fam. Hypnariear. Gen.: Sphagnum.

Sphagnites Endl. 1836. Gen. n. 600*a*. p. 58; 1841. Ench. p. 32: sect. Muscitae.

Sphagnoecetis*) Nees 1844. Syn. Hepat. p. 148: nov. g. Jungermannidear. (Jung. Sphagni Dicks.) — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 33. — Bayrh. 1849. Taun. p. 47. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 735.
Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 227: g. Jungermanniear.
= Odontoschisma Dumort.

Sphagnoideae Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 215: trib. 2 Muscor. Gen.: Sphagnum.
Corda 1829 in Opiz Beitr. I.; 1830 in Sturm Jungerm. p. 6: trib. Hepaticinor. Gen. id.
Genth 1836. Nass. I. p. 132: ordo Hepaticar. Gen. id.

Sphagnoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII: fam. unica Cladocarpor. Gen. unicum: Sphagnum.

Sphagnon Adans. vid. *Sphagnum Dill.*

Sphagnum**) Dillen 1719. Nov. gen. p. 86. t. 2; 1741. Hist. musc. p. 240. t. 32: g. Muscor. (varia complectens.) — Par. Linn. 1737. Gen. p. 323. n. 790; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1106; 1759. Syst. ed. X. p. 1331. n. 1051; 1763. Sp. ed. II. p. 1569; 1764. Gen. ed. VI. p. 562. n. 1187; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 698. — Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 95. — Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Adans. 1763. Fam. II. p. 492 (*Sphagnon*). — Scop. 1772. Carn. II. p. 305. (acalyptrator). — Murr. 1774. Syst. p. 794; 1784. Syst. p. 944. — Reich. 1778. Gen. p. 558. n. 1304. — Hedw. 1782. Fund. p. 85; 1801. Spec. p. 27. (frondosor.) — Juss. 1789. Gen. p. 12. — Lour. 1790. Coch. II. p. 683. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 758. n. 1637. — Gmel. 1791. Syst. p. 1323. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 984. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 52. — Roth 1800. Germ. III. p. 116. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 285. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 29. — DC. 1805. Franç. II. p. 442; 1815. V. p. 205. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 71. — Mart. 1817. Erlang. p. 117. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 709. — Grev. & Arn. 1822. Mem. Wern. Soc. IV. 1. p. 130. — Leman 1827. Dict. v. 50. p. 190 (propriam divisionem formans). — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 147. n. 3291; 1831. Gen. II. p. 727. n. 3686. (frondosor.) — Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60 (fam. 29); 1833. Flora I. p. 1. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 108. (anoplostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 71.
Gled. 1764. Syst. p. 293. n. 1188: g. Muscosar. (nudar.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 450.
Scop. 1777. Intr. p. 357: g. Muscoidear.
Neck. 1790. El. III. p. 333. n. 1745: g. Phryganophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 727: g. Cryptostemonis.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 21: g. Calyptrator.
Brid. 1797. Musc. rec. I. p. 150; II. 1. p. 21; 1806. Suppl. I. p. 12: g. Gymnoperi-

*) *οἰκητός*, habitans.

**) Sphagnum Plinio passim pro canis arborum villis.

Sphagnum Dillen. cont.
stomator. — Par. Röhl. 1809. Ann. Wett. Ges. I. 2. p. 196.
Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.
Rebent. 1804. Neom. p. 252: sect. Gymnostomi.
Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 13; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 433: g. Apogonor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 36: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 1; 1826. Bryol. I. p. 1: g. Evaginulator. — Par. Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 1.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: g. Sphagnear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 73. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XI. p. 735.
Agdh. 1822. Aphor. p. 107: g. Gymnostomar.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 775: g. Bryoideor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII: g. Sphagnoideor.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 215: g. Sphagnoidear. — Par. Corda 1829 in Opiz Beitr. I. (*cf.* Linnaea V. Litt. p. 81); 1830 in Sturm Jungerm. p. 7. Subgen.: Sphagnum, Sphagnella. — Genth 1836. Nass. I. p. 133.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 533: g. Sphagneor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Sphagnidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 21: g. Gymnostomor.
Endl. 1836. Gen. n. 476. p. 47; 1841. Ench. p. 30: g. Sphagnacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 3. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 97. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 88. — Bayrh. 1849. Taun. p. 35. — Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 212. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 57.
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 850: g. Sphagnaceor.

Sphalanthus Jack 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 155: nov. g. Combretacear. (S. confertus.) — Par. D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 735.
Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78): g. Combretear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6090. p. 1183; 1841. Ench. p. 632. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 6611. (genuinar.) — Walp. 1843. Rep. II. p. 68; 1846. V. p. 663 (*Spalanthus*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718 (*Spalanthus*). — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 611 (*Spalanthus*).

Sphallerocarpus*) „Besser mss." DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 64. t. 2; 1830. Prodr. IV. p. 230: nov. g. Scandicinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 368. — Rchb. 1837. Hdb. p. 219. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 113. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 353. Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.
Endl. 1839. Gen. n. 4509. p. 787; 1841. Ench. p. 380: g. Scandicinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5326.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Sphalmopteris*) Corda 1842. Fl. d. Vorw. p. 76: nov. g. Protopteridear. (Anomopteris Mougeotii Brongn.)

Sphanellopsis Steud. Herb.
= Davya DC. (Naud.)

Sphanidia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: ordo 3 Corisantheriae. Subord.: Rubiacea, Osaritia.

*Sphanidophytum***) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 119: gen. 5 plant. Spec. natur.: Valeriana, Kentranthus, Mitrophora, Odontocarpa, Mouffetta, Boerrhavia, Morina, Morinda, Ixora, Pavetta, Petesia, Mitchella, Chomelia, Lonicera, Symphoricarpa, Cobaea, Diervilla, Lobelia, Laurentia, Stooria, Dortmania, Cyphia, Ymnostema, Juchia, Scaevola, Laugeria, Triosteum, Catesbaea, Ramspekia, Ronabea, Hamelia, Nonatelia, Pecheya, Fuchsia, Bertiera, Sabicea, Loranthus, Santalum, Erithalis, Coffea, Mathiola, Viburnum, Sambucus, Genipa, Chiococca, Psychotria, Agylophora, Mussenda, Belonia, Cinchona, Rondeletia, Portlandia, Chimarrhis, Sipanea.

Spharagidia Thwait. vid. *Sphragidia Thwait.*

Sphenandra***) Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 373: nov. g. Buchnerear. (Buchnera viscosa Ait.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 589. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 528.
Endl. 1839. Gen. n. 3967. p. 686; 1841. Ench. p. 339: g. Manulear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4642. — Walp. 1845. Rep. III. p. 310. 967. — Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 353: g. Manuleicar.

Sphenantha Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 416: nov. g. Cucurbitacear.
Endl. 1839. Gen. n. 5145. p. 939; 1841. Ench. p. 491: g. Cucurbitear. minus notum. — Par. Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 275. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 268 (*Sphenanthe*). — Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Walp. 1846. Rep. V. p. 762.
Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3947: g. Bryoniear.?
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 18. 102: g. Sphenanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745: g. Loasear.?

Sphenanthe Wight vid. *praeced.*

*) *σφαλερός*, lubricus, fallax. (?)

*) *σφάλμα*, error.
**) *στεφανηδόν*, in modum coronae; *φυτόν*, planta.
***) *σφήν*, cuneus.

Sphenantheae Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 18. 102: trib. Cucurbitear. Gen.: Sphenantha.

Sphenanthera „Hasskarl mss.“ Klotzsch 1857. Bot. Zeit. p. 180: nov. g. (Begoniacear.) Ragadogoniear.
Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 345: g. inter Platycentreas et Isopterideas medium.
Synon. Nanopteron Miq.

Sphenella Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 556: subg. Frustuliae.
Kütz. 1844. Bacill. p. 83; 1845. Phyc. germ. p. 87; 1849. Sp. Alg. p. 62. n. 41: g. Gomphonemear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw. Dict. p. . . . — Math. 1853. Belg. II. p. 537.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 744: g. Diatomear.
Synon. Styllaria Bory pt.; Rhabdium Wallr. pt.

Sphenismelia Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 272; 1847 in Walp. Repert. VI. p. 202: sect. Ismeliae.

Sphenocarpus Richard 1808. Anal. d. fr. p. 92.
= Laguncularia Gärtn.

Sphenocarya „Wall.“ Rchb. vid. *Sphaerocarya Wall.*

Sphenoclea*) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 113. t. 24. f. 5. (S. zeylanica: *Tembul-waenna* zeylonens.)
Willd. 1797. Sp. I. p. 927. n. 334: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 173. n. 395. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXV. 354. n. 707. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 116; ed. 1832. I. p. 507.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 845: g. Aizoidar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 622. n. 655; 1830. Gen. I. p. 152. n. 761: g. Aizoidear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 683.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1138: g. Ficoidear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93)?
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4018: g. Pongatiear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 548: g. unicum Sphenocleacear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 569.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: g. Campanulacear. anomalum.
Synon. Pongati Rheede; Pongatium Juss.; Gärtnera Retz.; Rapinia Lour.

Sphenocleaceae Martius 1835. Consp. p. 31: ordo 162.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 238: subordo Campanulacear.?
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 548: ordo (110) Calyciflorar. Gen.: Sphenoclea.
Synon. Pongatieae Endl.

Sphenoderma „Jack.“ Wallich nr. 1735 (Meisn. Comm. p. 200): vid. *seq.*

Sphenodesme Jack 1830 in Hook. Bot. Misc. I. p. 285: nov. g. Viticum. (Roscoea pentandra Roxb.)

*) κλείς, clavis.

Sphenodesme Jack cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 622 (*Sphaenodesma*): g. Symphoremear. — Par. Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 13. t. 1474. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 909 (*Sphaenodesma*).
Synon. Sphenoderma Wall.; Viticastrum Presl.

Sphenogyne R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed sec. V. p. 142 (Verm. bot. Schr. II. p. 443): nov. g. Synantherear. (Arctotis anthemoides, paleacea W., etc.)
Link 1822. En. II. p. 355: g. Corymbiferar.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 180; 1827. v. 50. p. 204. 498; 1830. v. 60. p. 579: g. Anthemidear. (Archetypar. verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140. — Less. 1831. Linnaea VI. p. 165. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25. (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2403: g. Anthemear.
Less. 1832. Syn. p. 242: g. Calear. Subgen.: Anthemoides, Thelythamnos, Xerolepis.
DC. 1836. Pr. V. p. 681: g. Sphenogynear. Sect. ut Less. (exclusa prima.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2626. p. 427; 1841. Ench. p. 240. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 208 (133). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3635. Sect.: Sphenogyne, Xerolepis. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 182.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 40: g. Heleniear.
D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 745: g. Asteroidear. Sect. ut DC.
Synon. Spermophylla Neck.; Thelythamnos Spreng.; Oligaerion Cass.

Sphenogyneae DC. 1836. Prodr. V. p. 681: subdiv. Galinsogear. Gen.: Sphenogyne, Ursinia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 427; 1841. Ench. p. 240. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 208 (133). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 92: subdiv. Ursiniear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: subtrib. Senecionidear. Gen. Sphenogynear. et Madiear. Endl.

Sphenoneis Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: nov. g. Gomphonemear. (Sphenellae sp. Kütz.)

Sphenopecopteris Sternb. 1838. Vers. II. p. 158: sect. Pecopteridis. (P. angustissima, debilis.)
= Alethopteridis et Sphenopteridis sp.

Sphenophora Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 567: sect. Gomphonemae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 5 c. p. 2; 1841. Ench. p. 2. — Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 635. 3.

Sphenophyllites Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 234. 306. t. 2. f. 8: g. Vegetabilium foss. class. III.
= seq.

Sphenophyllum Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 76; 1828. Prodr. p. 28; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 787; 1849. ibid. XI. p. 746: g. Marsileacear. foss.
Endl. 1836. Gen. n. 692. p. 98; 1841. Ench. p. 45: g. Marsilaeaceis aff., foss.

Sphenophyllum Brongn. vid.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 113; 1846. Chlor. prot. p. LIII: g. Marsilaeacear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 101: g. Asterophyllitar.
Synon. Rotularia Sternb.; Sphenophyllites Brongn.

Sphenopterides Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 173: div. Filicum foss. Gen.: Cheilanthites, Hymenophyllites, Trichomanites, Steffensia.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 58; 1846. Chlor. prot. p. XXXIX: ordo Filicum. Gen. ead. (Sphenopteris loco Cheilanthitae.) — Par. M'Coy 1847. Ann. and Mag. XX. p. 149. Gen.: Sphenopteris.

Sphenopteris Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 233: sect. Filicitis.
Sternb. 1825. Vers. I. p. XV (*Sphaenopteris*): g. Filicum. (verar.) — Par. Brongn. 1828. Ann. sc. nat. XV. p. . . .; 1828. Dict. v. 57. p. 59; 1828. Hist. vég. foss. I. p. 169; 1849 in Orb. Dict. XI. p. 747; 1849. ibid. XIII. p. 69. — Endl. 1836. Gen. n. 676. p. 66; 1841. Ench. p. 43.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 103 (*Sphaenopteris*): g. Hizospermar.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 55. 126: g. Filicitum.
Göpp. 1841. Gatt. foss. Pfl. I. p. 67.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 59; 1846. Chlor. prot. p. XXXIX. 124. t. 37. f. 5: g. Sphenopteridum. Sect. (1845): Davallioides, Cheilanthoides, Dicksonioides. — Par. M'Coy 1847. Ann. and Mag. XX. p. 149.
F. Braun 1847. Flora I. p. 83: g. Polypodiacear. foss.
Synon. Germaria Sternb.; Sphenopecopteris Sternb. pt.; Hymenopteris Mant.; Cheilanthites et Aspidites Göpp.

Sphenopteris Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 76: sect. Asplenii. (A. Serra, caudatum, etc.)

Sphenopus Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 135: nov. g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1012: g. Melicacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1412.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 45: g. Poacear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 383: g. Poëar.
Steud. 1854. Glum. I. p. 287: sect. Glyceriae.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 554: g. Festucacear.
= Sclerochloa Palis.

Sphenosira Ehrenb. 1843. Amer. p. 98.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Stauroneidear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 68. n. 43: g. Gomphonemear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw. Diat.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 747: g. Diatomear.

Sphenostyles Steud. vid. *seq.*

Sphenostylis E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 148: nov. g. Phaseolear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 94(67). — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5779.

Sphenostylis E. Meyer cont.
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Euphaseolear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6678. p. 1297; 1841. Ench. p. 672.
Steud. 1841. Nom. II. p. 621 (*Sphenostyles*): g. Viciear.

Sphenotoma R. Brown 1810. Prodr. I. p. 556. Ed. Nees p. 412: sect. Dracophylli. (D. squarrosum, etc.)
Sweet 1828. Fl. austral. t. 44: g. a Dracophyllo distinctum.
Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1515: g. Epacridear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 785: g. Epacriear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 770: g. Epacrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4293. p. 750; 1841. Ench. p. 368. — Meisn. 1839. Gen. p. 249(157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 335. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 436.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4812: g. Richeear.

Spherideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 508. 510: div. Sarcothalamear. Gen.: Xylaria, Hypoxylon, Peripherostoma, Poronia, Nemania, Cucurbitaria, Engizostoma, Circinostoma, Exormatostoma, Astoma, Sphaeria.

Spheronema Agardh vid. *Sphaeronema Fries.*

Sphinctanthus*) Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 212: nov. g. Gardeniear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 360.
Walp. 1843. Rep. II. p. 520: g. Eugardeniear.
= Conosiphon Pöpp.

Sphincterina Rchb. vid. *Sphinctrina Fries.*

Sphincterostigma**) Schott 1832. Melet. bot. p. 19: sect. Philodendri. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1690 *d.* p. 237; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 51. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1102. 4.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 113: grex Philodendri.

Sphinctocystis Hassall 1845. Brit. fresw. Alg. p. 436.
= Surirella Turp.

Sphinctolobium***) Vogel 1837. Linnaea XI. p. 417: nov. g. Caesalpiniear. (S. virgilioides, nitidum, floribundum.)
Endl. 1841. Gen. n. 6714. p. 1304; 1841. Ench. p. 673: g. Dalbergiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 6006. — Walp. 1842. Rep. I. p. 798. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Sphinctosporium „Kunze" Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 243: g. Xylomaceor.? *Cf.* Endl. Gen. p. 31.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 262: g. Leptostromateor.
Vid. Sphinctrosporium.

Sphinctrina Fries 1825. Pl. homon. p. 120: nov. g. Xylomaceor. (Calicium turbinatum Pers.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 224. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 241. — Endl. 1836. Gen. n. 364. p. 31; 1841. Ench. p. 19.

---

*) *σφιγκτός*, ligatus, strangulatus.
**) *σφιγκτήρ*, ligatura.
***) *σφιγκτός, λόβιον*: propter legumen inter semina plerumque compressum et contractum.

Sphinctrina Fries cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 261 (*Sphincterina*): g. Leptostromateor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 125: g. Sphaeronemear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 731; 1854. ibid. XXVI. 6. p. 711.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 366: g. Patellariaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 304: g. Calyciear.
Th. Fries 1856. Öfvers. K. Vet. Ak. Förh. XIII (Flora 1857. p. 633): g. Calicioidear.
Arnold 1858. Flora II. p. 700: g. Caliciear.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 347: sect. Calycii.

Sphinctrosporium „Kunze herb." Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 501: g. Dematiaceor. (Sph. Pulvinulus.)
Conf. Sphinctosporium.

Sphingium*) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 65: nov. g. Genistear. (Ononis microphylla Thunb.?) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 82(59).
= Melolobium Eckl. & Zeyh.

Sphondilium Rupp. vid. *Sphondylium Tourn.*

Sphondylantha**) Presl 1834. Reliq. Hänk. II. p. 35. t. 53.
Spach. 1835. Vég. phan. IV. p. 337 (*Spondylantha*): g. Jussievear.
Meisn. 1837. Comm. p. 85 (*Spondylantha*): g. Jussiear.?
Walp. 1843. Rep. II. p. 97: g. dubium Oenotherear. — Par. D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 757.
Conf. Endl. Gen. p. 1195 et Walp. Rep. V. p. 671.

Sphondylastrum Endl., Rchb. vid. *Spondylastrum* Torr. & Gray.

Sphondylia Adans. 1763. Fam. II. p. 99: sect. 5 Umbellatar. Gen.: Hydrocotyle, Sphondylium, Imperatoria, Oreoselinum, Thysselinum.

Sphondylia Duby 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 34: sect. Primulae.

Sphondylium ***) Tourn. 1700. Inst. p. 319. t. 170: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 262 (*Sphondilium*). Ed. Hall. 1745. p. 275: g. pl. class. XII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 447: g. Umbelliferar. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 203. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 520.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 83.
Adans. 1763. Fam. II. p. 100: g. Sphondylior.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 86. t. 21. f. 4 (Sph. Panaces).
= Heracleum Linn.

Sphondylium Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 129: g. Umbelliferar. restrict. (Heracleum Sphondylium L.)

Sphondylium Hoffm. cont.
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 367: sect. Heraclei. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3682 *c*; 1832. Fl. exc. p. 456. — DC. 1830. Pr. IV. p. 192. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 342 (*Spondylium*). — Endl. 1839. Gen. n. 4477 *c*. p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Walp. 1843. Rep. II. p. 415.— (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 696.

Sphondylocladium Nees 1819. Rad. pl. mycetoid.
= Spondylocladium Mart.

Sphondylococca „Willd. mss." Schult. 1820. Syst. VI. p. LXX. 799. n. 1270: nov. g. Pentandr. Pentagyn. (S. malabarica.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 971. n. 1150; 1830. Gen. I. p. 236. n. 1243 (*Spondylococcus*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 107 (*Spondylococcus*).
Rchb. 1828. Consp. p. 212[d.] n. 5582 (*Spondylococcus*): inter genera vix cognita.

Sphondylococcum „Mitch." Endl. Gen. p. 637 in synon. Callicarpae: vid. *Spondylococcos Mitch.*

Sphondylophyllum Endl. vid. *Spondylophyllum Torr. & Gray.*

Sphragidia*) Thwaites 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 269. t. 10 (*Spharagidia*): nov. g. Buxear. (S. zeylanica.)
= Cyclostemon Blume. (Baill.)

Sphranthus Wight Ic. III. 4. p. 8: lege *Sphaeranthus.*

Sphyridium Flotow 1843. Arb. schles. Ges. p. 196: nov. g. Lichenum. (Biatora byssoides Fries, Baeomyces carneus Flk.)
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 273: g. Baeomycear. — Par. Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296. — Arnold 1858. Flora I. p. 100.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Lecideidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: g. Lecidinear.?
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 330: sect. Biatorae.

Sphyrospermium Spach vid. *seq.*

Sphyrospermum**) Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 4. t. 8: nov. g. Vacciniear. (S. buxifolium.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 243(151). — Endl. 1839. Gen. n. 4330. p. 757; 1841. Ench. p. 370. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 522 (*Sphyrospermium*). — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4922. (genuinar.) — Walp. 1847. Rep. VI. p. 414. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 36.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 758: g. Vacciniacear.

Spica Benth. 1833. Labiat. p. 148; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 145: sect. Lavandulae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 709. — Endl. 1838. Gen. n. 3585 *b*. p. 612; 1841. Ench. p. 306. — Walp. 1845. Rep. p. 574.

Spicant ***) „Trag." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 325. Ed. Hall. 1745. p. 346: g. Epiphyllospermar.
= Blechni Linn. spec.

---

*) *σφιγγίον*, armilla, collare.
**) *σφόνδυλος*, verticillus.
***) Nomen antiquum plantae.

*) *σφραγίς*, *σφραγίδιον*, sigillum, signum.
**) *σφύρα*, malleus.
***) Nomen contractum in Germania ex Spica indica?

Spicanta Presl 1850. Epimel. bot. p. 474(114): nov. g. Blechnear. (Blechnum boreale et onocleoides.)

Spicaria Benth. 1833. Labiat. p. 78; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 87: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 687. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *b*. p.611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 525.

Spicaria Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 147; 1844. Rumel. II. p. 62; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 60: sect. Erythraeae.

Spicillaria A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 252: nov. g. Gardeniar. (S. Leschenaultii.)
= Petunga DC.

Spicillaria Rchb. 1841. Nomencl. p. 220 in Ind.: nomen propositum pro *Spicularia Pers.*

Spiciviscum Engelm. . . .
= Phoradendron Nutt.

Spiculaea Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. LVI. f. 4: nov. g. Arethusear. (Sp. ciliata.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1598/2. p. 1367; 1841. Ench. p. 114. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2168. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Lindl. 1840. Orchid. p. 428: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 10.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Caleyidar.

Spicularia Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 38: nov. g. Mucedinum. (Botrytis simplex.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 234.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 115 *a*: sect. Botrytidis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Gonocladear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 106: g. Polyactideor.
= Polyactis et Spicularia Endl.

Spicularia Chevall. 1826. Fl. Paris. p. 94.
Endl. 1836. Gen. n. 404 *a*. p. 35; 1841. Ench. p. 20: sect. Exidiae. — Par. Fries 1838. Epicr. p. 591. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 422. 1. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 312.

Spicularia Endl. 1836. Gen. n. 227 *d*. p. 19; 1841. Ench. p. 14: sect. Botrytidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 162. 3. *Cf. Spicillaria.*
Synon. Spiculariae Pers. sp.; Polyactis Link.

Spiegelia Mönch vid. *Spigelia Linn.*

Spielmania Necker, Dumort. vid. *seq.*

Spielmannia *) Medic. 1775. Act. Theod. Palat. III. p. 196. t. 10; 1789. Vorles. IV. 1. p. 299; 1789. Phil. Bot. I. p. 151: nov. g. ex typo Lantanae africanae L.
Juss. 1789. Gen. p. 109: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 383. n. 596 (*Spielmania*): g. Plasyrgophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 414. n. 1027: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 321. n. 1166; 1809. En. p. 652.
Gis. 1792. Prael. p. 487: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 193.
Mönch 1794. Meth. p. 479: g. Petalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 322: g. Pyrenacear.

Spielmannia Medic. cont.
Cram. 1803. Disp. p. 33: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 135. n. 288.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 250: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75; 1828. Dict. v. 55. p. 328. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 7. 163. n. 441. — Link 1822. En. II. p. 126. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 235. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 423; 1825. Syst. II. p. 763. n. 2127; 1831. Gen. II. p. 480. n. 2369: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2905. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22 (*Spielmania*). — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227.
Link 1829. Hdb. I. p. 449: g. Viticear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4194.
Endl. 1838. Gen. n. 3694. p. 635; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291(199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 606. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 58.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 525: g. Spielmanniear.
Synon. Oftia Adans.

Spielmannia Guss. . . . . ex Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 328.
= Trinia Hoffm.

Spielmannieae Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 525: subtrib. Verbenear. Gen.: Spielmannia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 184. Gen. id.

Spiesia *) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 13. n. 1311: nov. g. Cyteophytor. (Phacae sp. Pall.)
= Oxytropis DC.

Spigeleae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 604: trib. Loganiacear. Gen. Spigeliacear. G. Don.

Spigelia **) Linn. 1737. Gen. p. 361. n. 903: nov. g. pro *Arapabaca Plum.* constitutum.
Linn. 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 69. n. 160; 1753. Sp. I. p. 149; 1758. Amoen. ac. V. Ed. 1788. p. 133; 1759. Syst. ed. X. p. 920. n. 192; 1762. Sp. ed. II. p. 213; 1764. Gen. ed. VI. p. 84. n. 209; 1767. Syst. ed. XII. p. 153. n. 208: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 166; 1784. Syst. p. 197. — Reich. 1778. Gen. p. 86. n. 222. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 110. n. 272. — Gmel. 1791. Syst. p. 333. — Pers. 1797. Syst. p. 203. — Willd. 1797. Sp. I. p. 824. n. 308; 1809. En. p. 197. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 9. (reform.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 134.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 208. n. 864: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 159 (*Spiegelia*).
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.

*) Dicat. Jac. Reinh. Spielmann, prof. Argentorat.

*) Dicat. Joh. Car. Spies, prof. Helmstad.

**) Dicat. Adriano van der Spigel, prof. Patavino.

Spigelia Linn. cont.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 367: in Appendice.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar.
Scop. 1777. Intr. p. 190: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 143: g. Gentianar.
Neck. 1790. El. II. p. 37. n. 669: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 417: g. Gentianear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 199. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 324. — Pers. 1805. Ench. I. p. 281. n. 629. — Hedw. 1806. Gen. p. 100. n. 448. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 478; 1825. Syst. I. p. 584. n. 634. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 184. t. 226. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIX. 190. n. 679. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346. — Link 1821. En. I. p. 208; 1829. Hdb. I. p. 427. — Kunth 1823. Syn. II. p. 272. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 236. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 681.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 113. t. 198.
Cham. & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 200: g. familiae propriae, cum Mitreola constituendae.
Mart. 1827: Nov. gen. II. p. 124. t. 192—194: g. Spigeliacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 170. — Endl. 1838. Gen. p. 607. n. 3568. — Meisn. 1839. Gen. p. 258(167). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 51. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 761.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI: g. Ophiorrhizear.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3651: g. Rauwolfiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Spigeliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5135. — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 3. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 496.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 152. n. 759: g. Gentianeis (et Rubiaceis) aff. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 7.
Endl. 1841. Ench. p. 289. n. $3363/_1$: g. Coelostylear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Spigelear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424: g. Strychnear.
Synon. Arapabaca Plum.; Anthelmenthica P. Browne; Canala Pohl; Coelostylis Torr. & Gray.

Spigeliaceae Martius 1827. Nov. gen. II. 2. p. 132: novus ordo plant. Gen.: Spigelia.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (198) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 29: g. Gentianalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 298.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 169: ordo Corollaeflorar. Gen.: Spigelia, Mitreola, Mitrasacme.
Endl. 1838. Gen. p. 606: ordo (135) Contortar., serius (1841. Spl. I. p. 1395 et Ench. p. 289 sub nomine *Coelostylear.*) Loganiaceis insertus. Gen.: Spigelia.
Meisn. 1839. Gen. p. 258(167): subordo Loganiacear. Gen. id.

Spigeliaceae Mart. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 51: fam. Asclepiadinear. Gen. id.

Spigelieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Gentianacear. Gen.: Spigelia.
Rchb. 1841. Nom. p. 133: sect. Loganiear. Gen. id.
DC. 1845. Pr. IX. p. 2: subordo (et tribus) 1 Loganiacear. Gen. Spigeliacear. G. Don et Polypremum?

Spilacron *) Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 238. 247; 1830. v. 60. p. 571: nov. g. Chryseidear. (verar.: Centaurea arenaria Marsch.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11.
DC. 1837. Pr. VI. p. 581: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 s. p. 474; 1841. Ench. p. 246. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 701.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 3*e*: subsect. Cyani.

Spilantheae Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 137; 1830. v. 60. p. 576: subdiv. Helianthear. Gen.: Spilanthes, Platypteris, Ditrichum, Petrobium?, Salmea, Isocarpha?, Melanthera.

Spilanthes Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 214. t. 126: g. Syngenes. Polygam. Aequal. (Sp. urens.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 543. n. 1266. — Gmel. 1791. Syst. p. 1193. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1712. n. 1446; 1809. En. p. 846.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 545; 1826. Syst. III. p. 444. n. 2689; 1831. Gen. II. p. 615. n. 3045: g. Eupatorinar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 208: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 468. — Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 50. p. 257. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 912. — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2640. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 136. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 79. Sect. ut DC.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 52: g. Syngenes. Polygam. Superfl.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 137; 1830. v. 60. p. 576: g. Spilanthear.
Link 1829. Hdb. I. p. 769: g. Coreopsidear.
Less. 1830. Linnaea V. p. 157: g. Anthemidear.
DC. 1836. Pr. V. p. 620: g. Verbesinear. Sect.: Acmella, Salivaria. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2553. p. 415; 1841. Ench. p. 239. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 356. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3156. Sect.: Acmella, Spilanthes. — Walp. 1843. Rep. II. p. 621. 987. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 761: g. Senecionidear.
Synon. Spilanthus Linn.; Pyrethrum Medic.; Ceruchis Gärtn.

---

*) *σπίλος*, macula; *ἄκρον*, summum.

Spilanthus Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 533. n. 1287: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 609; 1784. Syst. p. 731. — Reich. 1778. Gen. p. 409. n. 1011. — Forst. 1789. Comm. Gott. IV. p. 66. — Lour. 1790. Coch. II. p. 484. — Pers. 1797. Syst. p. 771; 1807. Ench. II. p. 393. n. 1809 (sejuncta 1807 Acmella). — Roxb. 1832. Ind. III. p. 410.
Scop. 1777. Intr. p. 127: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 187: g. Corymbiferar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 526. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 413. — Link 1822. En. II. p. 305.
Neck. 1790. El. I. p. 87. n. 158: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. t. 167.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Mönch 1794. Meth. p. 582: g. Petalostemonis.
Less. 1832. Syn. p. 232: g. Verbesinear.
= Spilanthes Jacq.

Spilobolus „Link" Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor. (Nomen.)

Spilocaea*) Fries 1819. Novit. fl. suec. V. p. 79: nov. g. Fungor. (S. Pomi.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 265.
Agdh. 1821. Aphor. p. 78 (*Spilocea*): g. Coniomycetum.
Link 1825. Sp. II. p. 86: g. Gymnomycetum. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 482.
Fries 1825. Pl. homon. p. 198: g. Hypodermior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 7 (*Spilocoea*).
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Uredineor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 2. (genuinor.) — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492 (*Spilocea*); 1849. ibid. XII. p. 788 (dubium).
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 503: g. Sporodesmieor.
Endl. 1836. Gen. n. 188. p. 17; 1841. Ench. p. 13: g. Sporodermeor.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 2 (*Spilocoea*): g. Praeformativor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 6: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Torulaceor.
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 374: g. Uredinear. dubium.
Bonord. 1851. Hdb. p. 37: g. Protomycetum.

Spilocea Agdh. vid. *praeced.*

Spilocoea Rchb. vid. *praeced.*

Spilodium Massalongo 1856. Miscell. lich. (Flora 1857. p. 487): nov. g. Celidiear.
= Celidium Tul. (Trev.)

Spiloma**) Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIX. 9: nov. g. Stercothalamor. (Lepraria fallax Pers.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 266. (ubi = Coniocarpon DC.)
Achar. 1810. Lich. univ. p. 23. 135; 1814. Syn. Lich. p. 1: g. Homogeneor.
DC. 1815. Franç. V. p. 152; 1817. Mém. Mus. III. p. 318: sect. Xylomatis.

*) *καίω*, uro.
**) *σπίλωμα*, naevus.

Spiloma Achar. cont.
Mart. 1817. Erlang. p. 285: g. Lichenum (difformium). — Par. Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 59.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Variolariar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 480: g. Spilomidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Rimatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 357: g. Coniocarpicar.
Rchb. 1841. Nom. p. 14. n. 512: g. Coniocarpicear.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 5: g. Spilomacear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 99: g. Anamorphosium.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 241 in app.: g. Lichenum crustaceor.

Spilomaceae Rabenhorst 1845. Krypt. II. 1. p. 5: div. Lichenum imperfector. Gen.: Spiloma.

Spilomideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 410. 479: div. Cenothalamear. Gen.: Arthonia, Spiloma.

Spilonema Bornet 1856. Mém. soc. Cherb. IV. p. 225 (Bot. Zeit. 1858. p. 144): nov. g. Lichenum.

Spilophora Wittstein 1856. Etym. Handw. p. 831: nomen pro *Stilophora Agdh.* propositum.

Spilosphaeria Rabenhorst 1857. Herb. viv. myc. ed. nov. Cent. VI. nr. 556: nov. g. Sphaeriacear. (Ascochyta tiliae Lasch.) *Cf.* Flora 1857. p. 382.

Spilotospermum*) Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 332: subg. Cardui. Sect.: Baeospermum, Megaspermum.

Spina Scopoli 1772. Fl. Carn. I. p. 344: sect. Mespili. (M. oxyacantha.)

Spina cervina Dillen. Nov. gen. p. 145: vid. *Cervispina Riv.*

Spinachia „Moris." Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. catal. p. 579.
Magnol. 1720. Char. plant. lib. 1. sect. 3. (Linn. Class. pl. p. 383.)
Hill 1769. Ht. kew. p. 421: g. Dioicear.
Neck. 1790. El. II. p. 205. n. 931: g. Syselophytor.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 279: g. Chenopodear.
= Spinacia Tourn.

Spinacia**) Tourn. 1700. Inst. p. 533. t. 308: g. pl. class. XV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 308: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 326 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 303. n. 748; 1737. Cliff. p. 457; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 296; 1753. Sp. II. p. 1027; 1759. Syst. ed. X. p. 1291. n. 986; 1763. Sp. ed. II. p. 1456; 1764. Gen. ed. VI. p. 520. n. 1112; 1767. Syst. ed. XII. p. 653: g. Dioec. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 742; 1784. Syst. p. 886. — Reich. 1778. Gen.

*) *σπιλωτός*, maculatus.
**) Nomen saeculi XIV deductum a semine spinoso. (Beckmann.)

Spinacia Tourn. cont. p. 517. n. 1218. — Lour. 1790. Coch. II. p. 617. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 688. n. 1520. — Pers. 1797. Syst. p. 928; 1807. Ench. II. p. 617. n. 2227. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 766. n. 1792; 1809. En. p. 1014. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 198. 280. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 771.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 47. n. 186: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 318.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 260: g. Blitor.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 85: g. Incompletar.

Scop. 1777. Intr. p. 337: g. Defloratar.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 324; 1789. Phil. Bot. I. p. 179.

Juss. 1789. Gen. p. 85: g. Atriplicum.

Gmel. 1791. Syst. p. 508: g. Pentandr. Tetragyn.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 198. t. 126.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 258: g. Chenopodear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 383. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 313; 1826. Syst. III. p. 903. n. 3179; 1831. Gen. II. p. 707. n. 3566. — Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4350. — Link 1831. Hdb. II. p. 415. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 286.

Rebent. 1804. Neom. p. 74: g. Tetrandr. Tetragyn.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 200: g. Attriplicear.

Mirb. 1815. Elém. II. p. 875: g. Atriplicear. — Par. Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 78 (*Épinard*). — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1832. Fl. exc. p. 578; 1837. Hdb. p. 238; 1841. Nom. p. 164. n. 6368. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17. — Koch 1837. Syn. p. 609. Ed. II. p. 700. — Endl. 1837. Gen. n. 1915. p. 294; 1841. Ench. p. 181. — Meisn. 1841. Gen. p. 320 (232). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 117. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 711.

Link 1822. En. II. p. 424: g. Atriplicinar.

Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.

Moq.-Tand. 1840. Chenop. mon. p. 77: g. Spinaciear. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 15.

Brongn. 1843. En. genr. p. 101: g. Cyclolobear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.

Synon. Spinachia Moris. et Auct.

Spinacieae Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 20.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. mon. p. 48: trib. Cyclolobear. Gen.: Exomis, Atriplex, Obione, Spinacia, Acnida, Axyris, Eurotia, Ceratocarpus. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315. Gen. ead. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 88. Subtrib.: Atripliceae, Eurotieae.

Synon. Atripliceae C. A. Meyer.

Spinacina Moquin-Tand. 1840. Chenop. mon. p. 75: sect. Obiones. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 32. n. 1912/1 *b*.
= Halimus Wallr.

Spinifex Linn. 1771. Mant. II. p. 163. n. 1333: g. Polygam. Monoec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 757; 1784. Syst. p. 902. — Reich. 1778. Gen. p. 535. n. 1250. — Lour. 1790. Coch. II. p. 647. — Pers. 1797. Syst. p. 943.

Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790. (Amoen. ac. X.) p. 30: g. Graminum. (capitator.) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 136. — Trin. 1820. Fund. p. 193.

Juss. 1789. Gen. p. 30: g. Graminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 178. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 198. Ed. Nees p. 54. — Palis. 1812. Agrost. p. 137. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 55. 844. n. 386. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 239. n. 244; 1830. Gen. I. p. 52. n. 251. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 269 (*Spinelle*). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 292.

Neck. 1790. El. III. p. 236. n. 1625: g. Achyrophytor.

Schreb. 1791. Gen. II. p. 744. n. 1611: g. Polygam. Dioec. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 1129. n. 1929.

Gmel. 1791. Syst. p. 177: g. Triandr. Digyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 110. n. 201. — Hedw. 1806. Gen. p. 41. 363.

Agdh. 1823. Aphor. p. 149: g. Panicear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 55; 1833. Agrost. p. 174. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835) p. 103. — Endl. 1837. Gen. n. 791. p. 86; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 133. 299. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1299. — Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319). — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 177; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 95. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 113.

Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 843: g. Cenchrinar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Spinificear.

Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.

Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 474: g. Eupanicear.

Synon. Ixalum Forst. (Steud.)

Spinificeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Calliflorar. Gen.: Spinifex.

Spinularia Roussel ex Desvaux Journ. bot. I. p. 43.
= Desmarestia Lamx.

Spinus Römer 1847. Fam. nat. syn. III. p. 5. 34: sect. Pruni. (P. spinosa L.)

Spiracantha*) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 28. t. 313: nov. g. Echinopsidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 367.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 673. n. 2912; 1831. Gen. II. p. 649. n. 3275: g. Compositar. descisc.

---

*) σπεῖρα, spira.

Spiracantha HBK. cont.
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 281: g. Flosculosar.
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2345: g. Lagascinear.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 343; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear. — Par. Less. 1831. Linnaea VI. p. 692; 1832. Syn. p. 150. — DC. 1836. Pr. V. p. 90. — Endl. 1838. Gen. n. 2235. p. 363; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Less. 1829. Linnaea IV. p. 321: g. Vernoniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3932: g. Lagascear.
Synon. Acosta DC.

Spiradiclis*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 975: nov. g. Rubiacear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 288: g. Cinchonear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 418: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 524. — Endl. 1838. Gen. n. 3243. p. 550; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2878. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 160.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.

Spiraea**) Tourn. 1700. Inst. p. 618. t. 389: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 116. Ed. Hall. 1745. p. 129: g. pl. class. V.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 662.
Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.
Neck. 1790. El. II. p. 88. n. 748: g. Sarcodiphytor. Distinguuntur Filipendula et Alipendula.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 588: sect. Spiraeae. (S. salicifolia.) — Par. Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 237. 354. (S. Aruncus, etc.)
= Spiraeae Linn. pars.

Spiraea Linn. 1737. Gen. p. 145. n. 409; 1737. Cliff. p. 190; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 131; 1753. Sp. I. p. 489; 1759. Syst. ed. X. p. 1061. n. 554; 1762. Sp. ed. II. p. 700; 1764. Gen. ed. VI. p. 253. n. 630; 1767. Syst. ed. XII. p. 347: g. Icosandr. Pentagyn. (1737—1748 exclusa Filipendula). — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 384. — Murr. 1774. Syst. p. 392; 1784. Syst. p. 471. — Reich. 1778. Gen. p. 258. n. 686. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 341. n. 862. — Lour. 1790. Coch. I. p. 322. — Pers. 1797. Syst. p. 506; 1807. Ench. II. p. 46. n. 1236. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1055. n. 996; 1809. En. p. 539. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 307. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 295. 331. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 512.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Comosar.

*) δικλίς, janua valvis duabus.
**) σπείραια Theophrasti.

Spiraea Linn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 189. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 900. — Link 1822. En. II. p. 39. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 502. n. 1850; 1830. Gen. I. p. 412. n. 2057. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1114. — Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 285. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 124.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444.
Gled. 1764. Syst. p. 276. n. 1137: g. Calycostemonum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 188: g. Calycriflorar.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 109: g. Multisiliquar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Potentillas, Prunos et Myrtos conjungens.
Pall. 1777. Reis. russ. R. II. App. p. 44; 1778. ibid. III. p. 50. 51; 1789. Fl. Ross. II. 1. p. 71. 75. 76 etc. (ubique *Spirea.*)
Scop. 1777. Intr. p. 220: g. Calycanthemar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 337. t. 69. f. 5 (opulifolia et laevigata).
Juss. 1789. Gen. p. 339: g. Spiraear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 9. — Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 229. 352. Sect.: Spiraea, Ulmaria, Physocarpos, Gillenia, Keria. *Cf.* Isis 1830. p. 385. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 413. Sect.: Physocarpos, Euspiraea, Ulmaria, Aruncus, Lütkea, Petrophytum.
Gmel. 1791. Syst. p. 849: g. Polyandr. Pentagyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 225.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 351: g. Ulmariar. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 477; 1815. V. p. 546. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 588. Sect.: Spiraea, Filipendula, Ulmaria.
Cram. 1803. Disp. p. 127 in Icosandr. Trigyn. (opulifolia) et p. 119 in Dioec. Dodecandr. (Aruncus.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 865: g. Spiraeear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4449 (sect.: Ulmaria, Aruncus, Sorbaria, Spiraria, Physocarpus); 1841. Nom. p. 168. n. 6510 (sect.: Spiraea, Filipendula, Aruncus, Sorbaria, Chamaedryon, Physocarpus). — Bunge 1840 in Ledeb. Alt. II. p. 212. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 209.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 234: g. Spiraeacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 475; 1838. Berol. I. p. 202. — Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 541. Sect.: Physocarpos, Chamaedryon, Spiraria, Sorbaria, Aruncus, Ulmaria. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Bartl. 1830. Ord. p. 404. — Link 1831. Hdb. II. p. 95. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 517. Sect. ut Ser. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 171. Sect. eaed. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 430. Sect. fere eaed. — Koch 1836. Syn. p. 208. Ed. II. p. 230. Sect. ex Ser. — Walp. 1843. Rep. II. p. 49. 914; 1846. V. p. 657. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 94. Sect. ex Ser. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 11. Sect. eaed. et Eriogynia. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 768. — Miq. 1855. Ind. bat. I

Spiraea Linn. cont.
p. 389. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 666.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 312: g. Senticosar.
D. Don 1825. Nepal. p. 227: g. Spireacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 125.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 626: g. Spirariar. Sect.: Aruncus, Ulmaria, Filipendula, Spiraria.
Meisn. 1837. Gen. p. 103 (73): g. Ulmariear. Subgen.: Spiraea (Mönch), Lütkea, Schizonotus, Gillenia.
Endl. 1840. Gen. n. 6391. p. 1247; 1841. Ench. p. 660: g. Spirear. verar. Sect. ut Ser. (excepta Spiraria). — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 517.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Spiraeidar. *Synon.* Spiraea, Ulmaria, Filipendula et Barbae caprae Tourn.; Alipendula Neck.

Spiraeaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 234: sect. Rosacear. Gen.: Spiraea, Kageneckia, Vauquelinia, Lindleya. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 475. Gen. ead. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. Gen.: Spiraea, Gillenia, Kerria, Purshia.
DC. 1825. Pr. II. p. 541: trib. Rosacear. Gen.: Purshia, Kerria, Spiraea, Gillenia, Neillia, Kagenekia, Quillaja, Vauquelinia, Lindleya. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. Gen.: Gillenia, Spiraea, Kerria. — Koch 1836. Syn. p. 207. Ed. II. p. 230. Gen.: Spiraea. — Meisn. 1837. Gen. p. 103 (72). Subtrib.: Quillajeae, Ulmarieae.
Bartl. 1830. Ord. p. 403: ordo (240) Calophytar. Gen. ut DC.
Link 1831. Hdb. II. p. 94: ordo 31 Perigynar. Gen. ut Dumort.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 516: ordo (81) Calyciflorar. Gen. ut Rchb. 1827 et Adenilema?
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 427: fam. 7 Calophytar. Gen. ut DC.
Endl. 1840. Gen. p. 1247; 1841. Ench. p. 660: subordo Rosacear. Trib.: Spireae verae, Quillajeae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 49. Trib.: Spiraéaceae verae, Quillajeae.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 94: subtrib. Rosear. Gen.: Spiraea.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 209: fam. Rosacear. Trib.: Spiraeeae, Quillajeae.
Synon. Ulmariae Vent.; Spireaceae D. Don.

Spiraeae Juss. 1789. Gen. p. 339: sect. Rosacear. Gen.: Spiraea, Suriana, Tetracera.
Batsch 1802. Tab. p. 9: fam. Frugariar. Gen.: Spiraea, Tetracera, Curatella.
Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 229: trib. Rosacear. Gen. unicum: Spiraea.

Spiraeanthemum A. Gray 1853. Char. n. gen. p. 9 (Proc. Am. Soc. III); 1854. Un. St. expl. exp. p. 660; 1855. Ann. sc. nat. 4e série IV. p. 176: nov. g. Saxifragacear. (*cf.* Flora 1855. p. 621), ex Griseb. (Jahresber. p. 389) ad Legnotideas referendum.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 23: g. Saxifragear.

Spiraeanthus C. A. Meyer . . . . Ind. sem. h. Petr. p. 96: sect. Spiraeae. (Walp. Rep. II. p. 914.)

Spiraeeae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 865: div. Rosacear. Gen.: Spiraea, Gillenia, Suriana.
Rchb. 1828. Consp. p. 167: subdiv. Pomacear. Gen.: Spiraea, Kerria, Gillenia, Dicoryphe?, Neillia, Purshia, Kageneckia, Quillaja, Vauquelinia, Lindleya, Euphronia?
Rchb. 1837. Hdb. p. 243: subdiv. Potentillear. Gen. ead. excluso ultimo. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 168. Sect.: *genuinae* (gen.: Spiraea, Neillia, Kerria, Gillenia; Nuttalia [serius Ömleria]; Brayera), Quillajeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 209: trib. Spiraeacear. Gen. Spirear. Endl.

Spiraeidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 565: trib. Rosacear. Gen. Spirear. verar. Endl.

Spiraeoideae Agardh 1825. Class. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Icosandrar.

Spiraeopsis Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 719: nov. g. Cunoniacear. (Cunonia celebica Bl.)

Spiragyne Necker 1790. Elem. bot. II. p. 14. n. 626: nov. g. Darinyphytor., a Gentiana L. sejunctum.
= Crossopetalum DC.

Spiralepis D. Don 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 551: nov. g. Compositar. (Gnaphalium squarrosum L.)
= Leontonyx Cass.

Spirantheae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 62: vid. *Spiranthidae Lindl.*

Spiranthera St. Hilaire 1823. Bull. soc. philom. p. 130; 1823. Mém. Mus. X. p. 361; 1824. Pl. rem. Brés. p. 148. t. 17; 1825. Fl. Bras. I. p. 83: nov. g. Rutacear. (Sp. odoratissima.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 283. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 184. n. 933. (Pentandr. Monogyn.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 824.
DC. 1824. Pr. I. p. 728: g. Diosmear. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 492. t. 23. f. 3. — Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45).
Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5147; 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. n. 7525: g. Cuspariear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 388. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 796. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 347. — Endl. 1840. Gen. n. 5988. p. 1150; 1841. Ench. p. 611. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Synon. Terpnanthus Nees & Mart.

Spiranthera Bojer 1837. Hort. maurit. p. 226.
= Ipomoea Linn. et Batatas Rumph.

Spiranthera Hook. . . . . Bot. Mag. n. 2523.
= Pronaya Hügel.

Spiranthes Richard 1818. Mém. Mus. IV. p. 42. 50; 1818. Orchid. eur. p. 28: nov. g. Orchidear. (Neottia spiralis W.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 208. — Spreng.

Spiranthes Richard cont.
1826. Syst. III. p. 708. n. 2959; 1831. Gen. II. p. 660. n. 3324. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1552. 1570. — Link 1829. Hdb. I. p. 248. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 422. 476. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 172. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 242.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1429. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 212. n. 1547. Sect.: Spiranthes, Cyclopogon, Stenorhynchus, Sarcoglottis. — Kunth 1838. Berol. II. p. 248. — A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 78. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2214. Sect. fere ut Endl. (Stenorrhynchium.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 368. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 47 (*Speiranthes*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 767. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 84. — Math. 1853. Belg. I. p. 524. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 267.

Rchb. 1830. Fl. exc. p. 127: g. Ophrydear.

Koch 1837. Syn. p. 696. Ed. II. p. 802: g. Limodorear.

Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 9. t. 110.

Lindl. 1840. Orchid. p. 463: g. Spiranthidar. Sect.: Euspiranthes, Sarcoglottis. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1559. p. 113; 1842. Spl. II. p. 19. Sect. (1841: Ibidium, Cycloptera, Sarcoglottis) 1842 ut Lindl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182 (exclusa Sarcoglottide). — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 722.

Meisn. 1842. Gen. p. 385(288): g. Spiranthidear.

Rchb. 1844. Fl. sax. p. 93: g. Ceriochidear.

Klotzsch .... in Hayne Arzneigew. XXIV: g. Ponthievear.

Synon. Orchiastrum Mich.; Triorchis Hall.; Helictonia Ehrh.: Aristotelea Lour.; Gyrostachys Pers., Dumort.; Cyclopogon Presl.

Spiranthes Endl. Gen. Suppl. II. p. 19: vid. *Spiranthidae*.

Spiranthidae Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 441. 462; 1847. Veg. kingd. p. 182: div. Neottear. Gen.: Cnemidia, Spiranthes, Stenorhynchus, Sauroglossum, Pelexia et 1847 Stenoptera, Sarcoglottis, Cordylestylis. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Endl. 1841. p. 113; 1842. Spl. II. p. 19: div. Neottiear. Gen. ut Lindl. Accedit 1843 (Spl. III. p. 62) Chaeradoplectron.

Spiranthideae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 385(288): subtrib. Neottiear. Gen. Spiranthidar. Lindl.

Spiraria Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 544: sect. Spiraeae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4449 *d*; 1832. Fl. exc. p. 626. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 518. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 432 (includens Chamaedryon).
= Chamaedryon Ser.

Spirariae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 626: subdiv. Rosear. Gen.: Spiraea.

Spirastigma L'Herit. mss.
= Pitcairnia L'Herit.

Spirea Pallas vid. *Spiraea Linn.*

Spireaceae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 227: ordo plant. Gen.: Spiraea. *Affine*: Neillia.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 124: fam. Rosinear. Gen.: Kerria, Spiraea, Gillenia.

Spireae verae Endl. 1840. Gen. p. 1247; 1841. Ench. p. 660: trib. Spiraeacear. Gen.: Kerria, Spiraea, Neillia, Gillenia; Nuttallia. *Affine:* Brayera. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 95) Rhodotypos et 1843 (Spl. III. p. 102) Stephanandra.

Spirelepidodendrum Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 103: nov. g. Hizospermar. (Lepidodendri pars.)

Spirhymenia Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): nov. g. Rytiphlear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55 (*Spirrymenia*): g. Rhodomelear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 847. n. 556: g. Rytiphlaeacear.

Spiridanthes Endl. Gen. Suppl. III. p. 70: vid. *seq.*

Spiridanthus *) Fenzl 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 105. n. 2656/1: nov. g. Chrysocomear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 835 (*Spyridanthus*). — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 363.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Chrysanthemear.

Spiridens Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 141. t. 17: nov. g. Muscor. (diploperistomior. — Sp. Reinwardti.) *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 335 et Leman 1828. Dict. v. 50. p. 290. — Par. Nees 1824. Syll. Ratisb. p. 84. (Diploperistomor. pleurocarpor.) — Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 164. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 735. n. 3728. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 769.

Brid. 1827. Bryol. II. p. 279: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLVI Brachypodum?)

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 297: g. Hypnoidear. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60.

Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 554: g. Fontinaloideor.

Endl. 1836. Gen. n. 593. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 971: g. Calyptrobryor.

C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 120: sect. Neckerae.

Spiridia „Decne" Flora 1843. p. 98: vid. *Spyridia Harv.*

Spirillum Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 279: nov. g. Nostochinear.
= Spirulina Link.

Spirillus Gay 1854. Compt. rend. de l' Ac. Par. XXXVIII. p. 703: nov. g. Potamear. primae sectionis.

*) σπυρίς, sporta, corbis.

Spirocarpaea DC. 1824. Prodr. I. p. 475: sect. Helicteris. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 205. n. 5323 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 506. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 31.
Endl. 1840. Gen. n. 5316 *a β*. p. 992; 1841. Ench. p. 515: subsect. Euhelicteris. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 332.

Spirocarpos Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 174: sect. Medicaginis. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1267. n. 6507 *b*. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 527. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 387.
Synon. Spirocarpus Rchb.; Diploprion Vis.?

Spirocarpus Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3877 *c*: sect. Medicaginis. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 169. — Koch 1836. Syn. p. 161. Ed. II. p. 177. — Kunth 1838. Berol. I. p. 224. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 16.
= Spirocarpos Seringe.

Spiroceras Jaub. & Spach 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 232: sect. Ciceris.

Spirochaeta Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. I. p. 166: nov. g. Elephantopear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 146.

Spiroconus Steven 1851. Bull. soc. Mosc. Nr. 2. p. 567: nov. g. Boraginear., Boragini aff. (Borago cretica Szov.) *Cf.* Flora 1852. p. 239.

Spirodela *) Schleiden 1839. Linnaea XIII. p. 391: nov. g. Lemnacear. (Lemna polyrhiza L.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1668/2. p. 1370; 1841. Ench. p. 126. — Kunth 1841. Enum. III. p. 6. — Meisn. 1842. Gen. p. 363(271). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 18. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 222.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1128: g. Lemnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 125: g. Pistiacear.
Synon. Lenticularia Mich.

Spirodiscus Eichwald 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 285.
= Ophiocytium Näg. (A. Braun.

Spirogera Dumort. vid. *Spirogyra Link.*

Spirogyra Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 10: nov. g. pro Oscillatoria viridi Mert. & Mohr propositum.
= Oscillariae sp. (Kütz.)

Spirogyra Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 5: g. a Conferva L. distinctum. (Conjugatae sect. 1 Vauch.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: g. Conjugatar. — Par. Rudolphi 1829. Flora I. p. 367. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78 (*Spirogera*).
Meyen 1827. Linnaea II. p. 410: g. Confervar.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 466 *b*: sect. Zygnemae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 54 *c*. p. 5; 1841. Ench. p. 4.
Menegh. 1838. Cenni p. 33: g. Zygnemear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 663. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466.) — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gen. p. 278. — Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 14. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 120. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 771.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 222; 1849. Sp. Alg. p. 437. n. 275: g. Zygnemacear. — Par. Nägeli 1847. Alg. Syst.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Zygnemidar.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. homococytidear. synechocytidear.
Synon. Salmacis Bory.

Spirolobae Link 1831. Handb. II. p. 442: ordo 16 Apetalar. Gen.: Kölreutera.

Spirolobeae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 154. 670; 1824. Prodr. I. p. 229: subordo 4 Cruciferar. Tribus: Buniadeae, Erucarieae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 263. Trib. eaed. — Endl. 1839. Gen. p. 887; 1841. Ench. p. 451. Trib. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: subordo Brassicacear. Trib.: Buniadae, Erucaridae.

Spirolobeae C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 370: subordo Chenopodear. Trib.: Anabaseae, Salsoleae. — Par. Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 209; 1840. Chenop. p. 117. Trib.: Salsoleae, Suaedineae. — Koch 1837. Syn. p. 602. Ed. II. p. 692. (Trib.: Salsoleae.) — Endl. 1837. Gen. p. 237; 1841. Ench. p. 182. Trib.: Baselleae, Suaedineae, Salsoleae. — Meisn. 1841. Gen. p. 321(234). Trib. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 165: sect. Chenopodear. Divis.: Suaedeae, Salsoleae.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315: subordo Atriplicear. Trib. ut Moq.-Tand.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: trib. Chenopodear. Gen.: Schanginia, Suaeda, Schoberia, Salsola, Halimocnemis.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 152: subordo Salsolacear. Trib. ut Rchb. 1841.

Spironema Lindl. 1840. Bot. Regist. t. 47. App. p. 26: nov. g. Commelinear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1031/2. p. 1356; 1841. Ench. p. 71; 1842. Spl. II. p. 12: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1534: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 101.
Meisn. 1842. Gen. p. 406(311): g. Tradescantiear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122: g. Commelinacear.

Spironema Hochstett. in Schimp. pl. abyss. nr. 330.
= Cyclonema Hochst.

Spirophyta Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 3: div. plantar. vascularium.

Spirorhynchus Karelin & Kirilow 1842. Bull. soc. Mosc. Nr. 1. p. 160: nov. g. Isatidear. (S. sabulosus.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 311, Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 315 et Wittst. Etym. Handw. p. 833 (*Spirorrhynchus*). — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 88. n. 4943/2.

*) δῆλος, conspicuus, planus.

Spirorrhynchus Wittst. vid. *praeced.*

Spirospermum Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 63 in Römer Collect. bot. p. 210: nov. g. Menispermor., Cissampelo aff.
DC. 1818. Syst. I. p. 514; 1824. Pr. I. p. 96: g. Menispermear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 304. — Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1868; 1841. Nom. p. 70. n. 2621. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 243. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 104. — Meisn. 1837. Gen. p. 5(7). — Endl. 1839. Gen. p. 826. n. 4690. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 6.
Endl. 1841. Ench. p. 415. n. 4690: g. Menispermacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: inter genera polypetala incertae sedis.

Spirostachys Sonder 1850. Linnaea XXIII. p. 106: nov. g. Hippomanear. (S. africana.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 360.
Baill. 1858. Euphorb. p. 521: sect. Stillingiae.

Spirostigma Nees (1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 83) 1847 in DC. Prodr. XI. p. 308: nov. g. Gendarussear.

Spirostyles Dumort. vid. *seq.*

Spirostylis Presl 1829 in Schult. Syst. VII. p. XVII. 163. n. 1318: nov. g. Loranthear. (S. Hänkei.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2729. (genuinar.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34 (*Spirostyles*): g. Loranthidear.
Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 17: sect. Loranthi. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *a*. p. 802; 1841. Ench. p. 399. — Walp. 1843. Rep. II. p. 444.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234: g. Loranthacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791.

Spirotaenia Brébiss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 711: nov. g. Desmidiear. (Nomen.) *Cf.* Bot. Zeit. 1856. p. 46.

Spirotheros Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. p. 221: nov. g. Graminear. (Stipa melanocarpa Mühl.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 85 et Steud. 1854. Glum. I. p. 389.
= Andropogon (melanocarpus) Ell.

Spirotropis Tulasne 1844. Arch. Mus. IV. p. 113: nov. g. Sophorear. (Swartzia longifolia DC.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Walp. 1846. Rep. V. p. 548: g. Dalbergiear.

Spiroxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 172. 190: g. Cupressinear. foss. (Sp. Ratzeburgii.)

Spirrymenia Mont. vid. *Spirhymenia Decne.*

Spirula Dozy & Molkenb. 1846. Musc. Archip. ind. Fasc. III. t. 26: nov. g. Muscor. *Cf.* Hampe in Bot. Zeit. 1847. p. 921.
= Schistomitrium Dozy & Molk.

Spirularia „Kütz." Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326 (Flora 1843. p. 93): g. Nostochinear.

Spirulina „Turp., Link" Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phyc. gener. p. 182; 1845. Phyc. germ. p. 156; 1849. Sp. Alg. p. 235. n. 180: g. Oscillariear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 59. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52.(?) — Bréb.

Spirulina Turp. cont.
1849 in Orb. Dict. XI. p. 775. — Math. 1853. Belg. II. p. 520.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: in synon. Oscillatoriae.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 72: g. Oscillatorinar.
Crouan 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 38. (Novae species.)
= Spirillum Hass.

Spirydia Menegh., Rchb. vid. *Spyridia Harv.*

Spitzelia*) Schultz Bip. 1833. Flora II. p. 725: nov. g. Scorzonerear. (Picris pilosa Delile.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 378 et Schultz 1835. Flora p. 657.
Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478: g. Piridear. verar.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 130: sect. Picridis. (An genus proprium?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3698 2. — C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 666.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6: g. Crepidear.

Spixia**) Schrank 1816. Pl. rar. h. Monac. II. t. 80 (Less. et DC. — t. 18 ex Endl.); 1822. Denkschr. Regensb. Ges. I: nov. g. plant. (Sp. violacea.) *Cf.* Isis 1823. p. 852.
= Centratherum Cass.

Spixia Leandro de Sacram. 1821. Denkschr. Ak. Münch. VII. p. 231: nov. g. Tithymaloidear. *Cf.* Schrank ibid. p. 242.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 317: g. Polygam.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3798: g. Ceanothear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 714. n. 3597: g. Tricoccar.?
Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 179: g. Prosopidoclinear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 87. n. 5768/2. — Meisn. 1843. Comm. p. 369. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.

Splachnaceae Bruch & Schimp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 23. 24: fam. Muscor. Gen.: Oedipodium, Tayloria, Dissodon, Tetraplodon, Splachnum.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 127: subtrib. Funarioidear. Gen. ead.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 90: subsect. Funarioidear. Gen. ead. excepto Oedipodio.
Bayrh. 1849. Taun. p. 19: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Splachnum.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 372: trib. Acrocarpor. Gen.: Tayloria, Dissodon.

Splachnea Rchb. 1828. Consp. p. 34: sect. Splachnoideor. Gen.: Oedipodium, Orthodon, Aplodon, Splachnum, Systylium, Tayloria.

Splachneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Aplopogonor. Gen.: Splachnum, Dissodon, Tayloria.
Angstr. 1847 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 89: div. Bryacear. Gen. ead. et Oedipodium.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen. ead. et Haplodon, Systilium, Orthodon, Cyrtodon, Eremodon, Raineria, Tetraplodon.

*) Dicat. dom. de Spitzel, botanico Monacensi.
**) Dicat. Joh. Bapt. de Spix, peregrinatori.

Splachnidium Greville 1830. Alg. Syn. p. XXXVI: nov. g. ex typo Fuci rugosi Turn.
Endl. 1836. Gen. n. 118. p. 10; 1841. Ench. p. 8: g. Fucacear. — Par. Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 151; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331. (Flora 1843. I. p. 93.) — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 186. — Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 215.
A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 328: g. Fucoidear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 44. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 394. (*Splancnidium*). — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 782. — Endl. 1843. Spl. III. p. 29. n. 121.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gen. p. 350; 1849. Sp. Alg. p. 585. n. 394: g. Fucear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Fucidar.

Splachnoidea Rchb. 1828. Consp. p. 33: subdiv. Acrocarpior. Sect.: Phascea, Gymnostomea, Grimmiacea, Campylopodia, Splachnea.

Splachnoideae Greville & Arnott 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 442: trib. Muscor. Gen.: Splachnum, Dissodon, Tayloria. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 228. Gen. ead.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 4 Muscor. Gen.: Oedipodium, Cryptodon, Systylium, Orthodon, Eremodon, Splachnum, Tayloria.

Splachnoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIII: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Oedipodium, Orthodon, Eremodon, Splachnum, Systylium, Hookeria.

Splachnon Adans. 1763. Fam. II. p. 13: g. Fucor. (*Tremella Dill.* Musc. t. 9. f. 7. 8; *Ulva Raj.; Enteroides Vaill.; Tubularia Vaill.*)
= Ulva Linn.

Splachnum *) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 25; 1753. Syn. II. p. 1108; 1759. Syst. ed. X. p. 1332. n. 1054; 1763. Sp. ed. II. p. 1572; 1764. Gen. ed. VI. p. 563. n. 1191; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 699: g. Muscor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 314. — Par. Neck. 1771. Meth. musc. p. 125. 259 (plumulascentium). — Scop. 1772. Carn. II. p. 307. (calyptrator.) — Murr. 1774. Syst. p. 795; 1784. Syst. p. 945. — Reich. 1778. Gen. p. 558. n. 1308. — Hedw. 1782. Fund. p. 88; 1801. Spec. p. 51. (frondosor.) — Juss. 1789. Gen. p. 11. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 759. n. 1641. — Gmel. 1791. Syst. p. 1325. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 986. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 50. — Roth 1800. Germ. III. p. 133. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 287. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 30. — DC. 1805. Franç. II. p. 450; 1815. V. p. 208. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72. — Mart. 1817. Erlang. p. 116. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 717. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — R. Brown 1824. Parry's voy. App. XI. p. CCC (Verm. bot. Schr. I. p. 444). — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 150. n. 3303; 1831. Gen. II. p. 730. n. 3700. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 118. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 67.
Gled. 1764. Syst. p. 295. n. 1194: g. Muscosar. calyptratar.
Neck. 1790. El. III. p. 334. n. 1747: g. Phryganophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 729: g. Cryptostemonis.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 22: g. Calyptrator.
Brid. 1797. Musc. rec. I. p. 159; II. 1. p. 102; 1806. Spl. I. p. 142: g. Aploperistomator.
Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 22; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 447: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 220.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 36: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 104: g. Peristomor. acrocarpor.
Grev. & Arn. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 448: g. Splachnoidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. V. p. 228. — Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 239: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII Splachnoideor.)
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 766: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 161.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 602: g. Splachneor. Sect.: Pycnapophysium, Cystapophysium, Discapophysium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Splachnear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 89. Sect.: Diplodon, Aplodon, Tetraplodon. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402 (restrict.); 1849. ibid. XI. p. 776.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 77: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 503. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. Sect. ut Rchb. et Sciadophysium.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 878: g. Calyptrobryor. Sect. ut 1828.
Bruch & Schimp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 23. 24: g. Splachnacear. (restrict.) — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 94. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 143. Sect.: Ampullaria, Umbracularia. — Bayrh. 1849. Taun. p. 19.
Conf. Aplodon R. Brown; Eremodon Brid.

Splanchnomyces *) Corda 1837 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 3. t. 2: nov. g. Fungor. (S. roseolus.)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 26; 1842. Mycol. p. 107: g. Splanchnomycetum. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 36.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Hypogaeor.

---

*) Num e graeco σπλάγχνον, viscus? (Linn. Phil. bot. p. 181.)

*) σπλάγχνον, viscus.

Splanchnomyces Corda cont.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Hysterangieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 243: g. Hymenogastereor.
= Mylitta Fries?

Splanchnomycetes Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 26; 1842. Anl. Mycol. p. LXXXII. 107: fam. Dermatogasterum. Gen.: Splanchnomyces, Octaviania, Hymenogaster. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 33. Gen.: Gautieria, Octaviania, Splanchnomyces, Melanogaster.

Splanchnonema Corda 1829 in Sturm Flor. Fung. II. p. 115. t. 54: nov. g. Fungor. (S. pustulatum.) *Cf.* Flora Lit. II. p. 47.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 761. n. 3883: g. Myelomycetum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 31; 1842. Mycol. p. 131: g. Sphaeriaceor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
= Sphaeria Hall.?

Splancnidium Harv. vid. *Splachnidium Grev.*

Split Caesalp. 1533. De plant. trib. 6. (Linn. 1747. Class. pl. p. 14 = *Fumaria.*)
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 257. Ed. Hall. 1745. p. 268: g. pl. class. XI.
= Corydalis Vent.

Splitgerbera*) Miquel 1840. Comm. phytogr. III. p. 133. t. 14.
Meisn. 1842. Gen. p. 349 (260): g. Urticacear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 30. n. $1884/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 32: sect. Böhmeriae.
= Böhmeria Gaudich. (Wedd.)

Spodiaceae Hasskarl 1844. Cat. Bogor. alt. p. 247: ordo Terebinthinear. Gen.: Spodias.

Spodias**) Hasskarl 1844. Cat. Bogor. alt. p. 247: g. Spodiacear.
= Spondias Linn.

Spodiopogon Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 192. t. 17: nov. g. Triandr. Digyn. (S. sibiricus.) — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 14.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 980: g. Saccharinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 158.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 359: g. Saccharinear.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 299: g. Andropogineor.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 476: g. Saccharear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 398: sect. Andropogonis.
= Ischaemum Linn.?

Spogopsis „Michx.“ Rchb. Consp. p. 212c in synon. Brickelliae: sphalm. pro *Ipomopsis?*

Spolverinia Massalongo 1855. Sched. crit. p. 18; 1856. Flora p. 281: nov. g. Spolverinicar.

*) Dicat. Fr. L. Splitgerber, peregrinatori Surinamensi.

**) Nomen ex Theophrasto a σπόδος, σποδία, cinis derivatum. (Beckmann.)

Spolverinieae Massalongo 1855. Sched. crit. p. 18; 1856. Flora 1856. p. 282: trib. Lichenum. Gen.: Spolverinia.

Spondiaceae Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 362 (Gen. Tereb. p. 30); 1825 in HBK. Nov. gen. VII. p. 47; 1825. Syn. IV. p. 171: fam. Terebinthacear. Gen.: Spondias, Poupartia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 469. Gen. ead. et Sclerocarya.
DC. 1825. Pr. II. p. 74: trib. Terebinthacear. Gen. ead. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55). Gen. ead. et Tapiria?, Hemprichia, Hippobromus, Thysanus, Sabia, Loxostylis, Stagmaria, Methyscophyllum, Eurycoma, Tetradium, Asaphes?
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVI: div. Terebinthacear. Gen. ut Kunth.
Rchb. 1828. Consp. p. 147: sect. Cassuviear. Gen. ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: trib. Balsameacear. Gen.: Spondias.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (109) Calyciflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 78. Gen. ut Kunth.
Link 1831. Hdb. II. p. 126: subordo Vernicear. Gen.: Spondias.
Lindl. 1833. Nix. p. 20: ordo Melialium.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 186. 204: trib. Cassuviear. Gen.: Spondias, Lannea.
Endl. 1840. Gen. p. 1134; 1841. Ench. p. 599: fam. Anacardiaceis aff. Gen. ut Kunth.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 84: trib. Anacardiacear. Gen.: Spondias.

Spondias*) Linn. 1737. Gen. p 365. n. 916; 1737. Cliff. p. 484: nov. g. pro *Monbin Plum.* constitutum.
Linn. 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 175. n. 402; 1753. Sp. I. p. 371: g. Enneandr. Trigyn.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 228: g. Decandr. Di- Tetragyn.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1036. n. 453; 1762. Sp. ed. II. p. 613; 1764. Gen. ed. VI. p. 229. n. 577; 1767. Syst. ed. XII. p. 316. n. 573: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 357; 1784. Syst. p. 428. — Reich. 1778. Gen. p. 234. n. 627. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 308. n. 786. — Gmel. 1791. Syst. p. 729. — Pers. 1797. Syst. p. 459. — Willd. 1799. Sp. II. p. 750. n. 909. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 451.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Gled. 1764. Syst. p. 101. n. 421: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 327: g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 372: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 449. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 256. — Hedw. 1806. Gen. p. 338. n. 1329.
Neck. 1790. El. III. p. 392. n. 1838: g. Coryphophytor.?
Gärtn. 1791. Fr. II. t. 104.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.

*) Nomen ex Athenaeo, aliis *Spodias.*

Spondias Linn. cont.
Pers. 1805. Ench. I. p. 509. n. 1134: g. Terebinthacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 652; 1825. Syst. II. p. 439. n. 1737. — Link 1821. En. I. p. 441. — Poir. 1824. Dict. v. 32. p. 439 *(Monbin)*. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1617.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 363 (Gen. Tereb. p. 31); 1825. Syn. IV. p. 172: g. Spondiacear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 48. — DC. 1825. Pr. II. p. 74. Sect.: Mombin, Cytheraea. — Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3854. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Link 1831. Hdb. II. p. 126. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 79. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 204. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55). — Endl. 1840. Gen. n. 5920. p. 1134; 1841. Ench. p. 599. Sect. ut DC. — Walp. 1842. Rep. I. p. 556; 1846. V. p. 418. — Brongn. 1843. En. genr. p. 84. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 382. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 777. Sect. eaed.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 384. n. 1934: g. Terebinthear.
Bartl. 1830. Ord. p. 396: g. Anacardiacear. (?) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 172: g. Spondiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 146. n. 5673. Sect.: Spondias, Cytheraea.
Synon. Monbin Plum.; Spodias Hassk.; Wirtgenia Jungh.?; Harpephyllum Bernh.?

Spondieae Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 172: subordo Terebinthacear. Gen.: Spondias.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224: sect. Sumachinar. Gen.: Spondias, Poupartia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 146. Gen. ead. et Shakua, Exothea?, Huertea?, Anaphrenium?, Rumphia?, Augia?, Ophiocaryon? *Anomalum*: Sabia.

Spondioides Smeathm. Herb.
= Connari et Cnestidis sp. ex DC.

Spondycladium Lév. vid. *Spondylocladium Mart.*

Spondylantha Spach, Meisn. vid. *Sphondylantha Presl.*

Spondylastrum*) Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 529: sect. Myriophylli. (M. scabratum.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 6135 *b.* p. 1427; 1841. Ench. p. 640 (*Sphondylastrum*).
Rchb. 1841. Nom. p. 169. n. 6544 (*Sphondylastrum*): g. Myriophyllear.

Spondylium G. Don vid. *Sphondylium Hoffm.*

Spondylocladium Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 354: nov. g. Inomycetum aëreor. (Dematium verticillatum Hoffm.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 329 (*Sphondylocladium Nees*).
Link 1824. Spec. I. p. 79: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. p. 33. p. 542: g. Chloridiear.

*) σπόνδυλος = σφόνδυλος, verticillus.

Spondylocladium Mart. cont.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166: g. Conopleacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 160: g. Aspromycetum rhizomorphor.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 198: g. Dematieor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 12; 1842. Mycol. p. 48: g. Sporodaear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494 (*Spondycladium*): g. Menisporeor.
= Stachylidium Link?

Spondylococcos Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 218 (nec *Sphondylococcum*, neque *Spondylococcum*, ut citant Auctores): nov. g. Ixorae L. aff.
= Callicarpa Linn.

Spondylococcum Wittst. vid. *praeced.*

Spondylococcus „Willd." Spreng., Rchb., Dietr. vid. *Sphondylococca Willd.*

Spondylomorum Ehrenb. 1848. Monatsber. Berl. Ak. p. 236: nov. g. Infusorior. (*Cf. Synaphia Perty.*)

Spondylomycetes Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 89: ordo Pilophytor. Gen.: Stachylidium, etc. Nova gen.: Cladaspergillus, Cladobyssus.

Spondylophyllum Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 529: sect. Myriophylli. (M. spicatum et verticillatum.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 6135 *a.* p. 1427; 1841. Ench. p. 640 (*Sphondylophyllum*).

Spondylosium „Brébiss. mss." Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 189. n. 140: nov. g. Desmidiear. *Cf. seq.*

Spondylotium Brébiss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 711: g. Desmidiear. (Nomen.) *Cf. praeced.*

Spondylydronemata Ritgen 1831 in Schr. Marb. Ges. II. p. 85: ordo Galactinophytor. Trib.: Confervinae, Tremelloideae, Amphibolae.

Spongia*) Tourn. 1700. Inst. p. 575: g. pl. class. XVII.
Linn. 1737. Cliff. p. 480; 1745. Fl. suec. p. 390: g. Lithophytor. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1753. Sp. II. p. 1169; 1759. Syst. ed. X. p. 1348. n. 1072: g. Algar.
Gled. 1764. Syst. p. 300. n. 1209: g. Algacear. vesicularium.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 358: g. Spongidiar. (S. infundibuliformis, Ventilabrum, etc.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 192: g. Spongiacear. (S. lacustris.)
= . . . ?

Spongia Scop. 1772. Fl. Carn. II. p. 411. (S. vermicularis Scop. t. 64: Kütz.)
= Dasycladus Agdh.

Spongiaceae Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 192: subordo Algar. Gen.: Spongia.

Spongidiae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 318. 354: div. Thalassiophytar. Gen.: Tupha, Scypha, Spongia, Tethya.

*) σπόγγος, spongia.

Spongilla „Lamk.“ Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 353: g. Alcyonidear. (S. pulvinata Lam., Ephidatia fluviatilis Lamx.) *Cf.* Hogg 1840. Linn. Trans. XVIII. 3. p. 363.

Spongiocarpeae Greville 1830. Alg. brit. p. 68.

Harv. 1841. Brit. Alg. p. 6. 53: trib. Rhodospermear. Gen.: Polyides.

J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 86. 91: subtrib. Cryptonemear. Gen.: Polyides, Peyssonellia, Phyllophora, Chondrus. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 38. Gen. ead. et Furcellaria, Stenogramma, Dasyphloea. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54. Gen.: Furcellaria, Polyides, Peyssonnelia, Hildenbrandtia, Phyllophora, Chondrus, Gymnogongrus; Dasyphloea.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 146: subsect. Cryptonemear. Gen.: Furcellaria, Ahnfeldtia, Phyllophora, Chondrus.

Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 126: ordo Desmiospermear. Gen. amer.: Polyides.

Spongiocarpidae Lindl. 1847. Veg. phan. p. 24: trib. Cryptonemear. Gen.: Furcellaria, Polyides, Rhododermis, Thuretia, Peysonnellia, Phyllophora, Stenogramma, Chondrus, Gymnogongrus, Dasyphlaea.

Spongiocarpus Greville 1824. Fl. Edin. p. 286. = Furcellaria Lamx.

Spongiteae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 385; 1845. Phycol. germ. p. 295; 1849. Sp. Alg. p. 695: fam. Epiblastear. Gen.: Hapalidium, Pneophyllum, Melobesia, Mastophora, Spongites.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 129: subsect. Corallinear. Gen.: Melobesia.

Spongites Kütz. 1841. Polyp. calc. p. 31; 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gen. p. 386; 1845. Phycol. germ. p. 296; 1849. Sp. Alg. p. 698. n. 468: g. Spongitear.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 126: sect. Melobesiae. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 130.

Synon. Cellepora (Cellipora) et Millepora Linn.; Nullipora Lam.; Pollicipora Ehrh.; Lithophyllum et Lithothamnium Phil.

Spongocarpeae Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 304: fam. Periblastear. Gen.: Furcellaria.

= Gigartinear. Kütz. pars.

Spongocarpus Kütz. 1843. Bot. Zeit. p. 55: nov. g. Fucor. (Fucus sisymbrioides Turn.)

Endl. 1843. Spl. III. p. 32. n. $122/_7$ *d*: sect. Sargassi.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phyc. gener. p. 365: g. Halochloar.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 631. n. 424: g. Sargassear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 780.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Cystosirear.

Spongocladia Aresch. 1853. Öfvers. Vet. Ak. Förh. X. p. 201: nov. g. Algar., Acrosiphoniae Agdh. aff. *Cf.* Flora 1855. p. 653.

Spongoclonium Sonder 1854. Linnaea XXVI. 5. p. 515: nov. g. Haloplegmear. (S. conspicuum.)

Spongodes Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. 429; 1846. Syn. Hepat. p. 607: sect. Ricciae.

Spongodieae Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 286: ordo Thalassiophytor. non articulator. Gen. unicum: Spongodium. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 332.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93): trib. Aplosporear. Gen.: Spongodium, Codium.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 2; fam. Aplosporear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 20: subtrib. Hydrogastrear. Gen.: Codium.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: trib. Phycoidear. Gen.: Codium, Flabellaria.

Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 232: fam. Chlorosporear. Gen.: Codium.

Spongodium Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 288: nov. g. Spongodiear. (Alcyonium bursa L. et Fucus fungosus Desf.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 333.

Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 375: g. Ulvacear.

= Codium Agdh.

Spongodium Decaisne 1841. Arch. Mus. II. p. 126: g. Siphonear. (Codium adhaerens Ag.)

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93): g. Spongodiear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 20. n. 64 *a*: sect. Codii. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 128.

Spongomorpha Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gener. p. 273: g. Confervear.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 113: sect. Confervae.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 417: sect. Cladophorae.

Spongomorpha Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 237: g. Ectocarpear.

= Spongonema Kütz.

Spongonema Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 461. n. 283: g. Ectocarpear. (antea 1845 *Spongomorpha*).

Spongopsis Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phyc. gener. p. 261: g. Confervear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 380: sect. Chaetomorphae.

Spongostemma Rchb. „1824. Hort. p. 38“ 1828. Consp. p. 92. n. 1933 *b*; 1831. Fl. exc. p. 194: sect. Asterocephali. (Scabiosa atropurpurea, acutiflora, ambigua.)

Rchb. 1841. Nom. p. 72. n. 2692: g. Scabiosear.

Rchb. 1844. Fl. sax. p. 127: sect. Scabiosae.

= Cyrtostemma Mert. & Koch.

Spongotrichum Nees 1833. Gen. et spec. Aster. p. 176: nov. g. Asterum genuinor. (Aster glandulosus Labill.)

DC. 1836. Pr. V. p. 269: sect. Eurybiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2317 *c*. p. 376; 1841. Ench. p. 234. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3304. 3. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 419. — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 462.

Spongotrichum Nees cont.
Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125): g. Euasterear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. verar.
Spongotrichum Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 36; 1849. Sp. Alg. p. 674. n. 449: nov. g. Callithamniear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Haloplegmear.
Sponia*) Comm. 1796 in Lam. Dict. IV. p. 138.
Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 498: g. Celtidear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1852. p. 276; 1841. Ench. p. 163. — Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). — Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 46 (?); 1842. Vég. phan. XI. p. 98. — Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2554. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 264. 316. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 580: g. Celtear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 402: g. Celtidacear.
Conf. Trema Lour.
Sponioceltis Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 263. 303: subg. Celtidis. (C. cinnamomea Lindl.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 398.
Sporabolus Hassk. vid. *Sporobolus R. Brown.*
Sporacanthus**) Kütz. 1855. Tab. phycol. V: nov. g. Ceramiear. *Cf.* Bot. Zeit. 1858. Beil. p. 93.
Sporangiobrya Rchb. 1828. Consp. p. 23. 30; 1832. Fl. exc. p. L: formatio Muscor. Fam.: Jungermanniea, Bryoidea.
Sporastatia Massalongo 1854. Geneacaena Lich. p. 9: nov. g. Lichenum.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 265: g. Lecidinar.
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: g. Eulecideinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 343: sect. Lecideae.
Sporendonema Desmaz. 1827. Ann. sc. nat. XI. t. 21.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 66: g. Bysseor.?
Spreng. 1831. Gen. II. p. 800. n. 4146: g. Mucorum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 434: g. Mucedinum. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 218. p. 19; 1841. Ench. p. 14.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 141: g. Aspergillinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494: g. Sepedoniaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Torulaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 50: g. Phragmidiaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 461: g. Botrydear.

*) Dicat. Jac. Spon, peregrinatori.
**) σπορά, semen.

Sporidermium Nees 1816. Syst. p. 22; 1817. Überbl. p. 5: g. Coniomycor. liberor. — Simil. Nees fr. 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 229.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Spondylomycetum.
= Sporidesmium Link.
Sporidesmiacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 504: ordo Coniomycetum. Divis.: Torulei, Sporidesmiei, Stilbosporei.
Sporidesmieae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 419: sect. Melanconiear. Gen: Gymnosporangium, Podisoma, Phragmotrichum, Exosporium, Coryneum, Vermicularia.
Sporidesmiei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 505: div. Sporidesmiaceor. Gen.: Cometella, Stemphylium, Sporidesmium, Ceratosporium, Clasterisporium, Phragmidium.
Sporidesmium*) Link 1809. Berl. Mag. III. p. 41. f. 64: nov. g. Epiphytar. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 336.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Phragmidior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 79 (*Sporodesmium*): g. Coniomycetum. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 785. n. 4074.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 527: g. Stilbosporear.
Link 1825. Spec. II. p. 120: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 191: g. Sporodesmior. ambiguum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Exosporeor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1040: g. Pulveraceor.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 35: g. Entophytor. (ambiguor.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 186. p. 17; 1841. Ench. p. 13.
Corda 1829 in Sturm Fl. Fung. II. p. 37. t. 17—22.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Uredinear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 492: g. Sporodesmieor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 228: g. Sporomycetum hyposporor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 7; 1838. II. p. 6; 1839. III. p. 4; 1840. IV. p. 23; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 16: g. Phragmidiacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Fl. III. H. 25. 26. p. 7. t. 4; 1851. Linnaea XXIV. p. 102. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 4.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 24: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 29. — Bonord. 1851. Hdb. p. 48.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 68: g. Uredineor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Torulaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 506: g. Sporidesmieor. Subgen.: Bryomyces, Entomyclium.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
Synon. Sporidermium Nees.

*) σπορά, δεσμός: quod vinctis gaudet sporis.

Sporidinia Rchb. vid. *Sporodinia Link.*

Sporigastrei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: div. Gastromycetum. Gen.: Sporigastrum, Sphaeropleum, Botrydium, Polyangium, Amphisporium, Dichosporium.

Sporigastrum Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 171. 181: g. Sporigastreor.

Sporisorium „Ehrenb." Link 1825. Spec. II. p. 86: nov. g. Gymnomycetum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 337.
 Fries 1825. Pl. homon. p. 365: g. Sporomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 99.
 Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Uredineor.
 Fries 1831. Syst. myc. III. 2. p. 454: g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 208. p. 18; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 92.
 Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 9: g. Caeomacear.
 Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
 Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Ustilagineor.

Sporledera Hampe*) 1837. Linnaea XI. p. 279: nov. g. Phascacear.
 C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 99; 1848. Syn. Musc. I. p. 18: sect. Bruchiae.

Sporledera Bernhardi 1842. Linnaea XVI. p. 41: nov. g. Sesamear. (S. Kraussiana et triloba.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 367. — Endl. 1843. Spl. III. p. 79. n. $4104/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670.
 DC. 1845. Pr. IX. p. 252: g. Eusesamear.

Sporoacania Massalongo 1855. Framm. lich.: nov. g. Lichenum.

Sporoblastia Trevisan („1851") 1856. Linnaea XXVIII. p. 290: g. Biatorear. (*Biatorina* et *Gyalolechia Mass.*)

Sporobolus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 169. Ed. Nees p. 25: nov. g. Graminear. (Agrostis indica L.) — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 26. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 338. — Link 1829. Hdb. I. p. 34. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 295.
 Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 367: sect. Agrostidis.
 Link 1821. En. I. p. 71: g. Graminum. — Par. Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 4.
 Link 1827. Hort. I. p. 87: g. Agrostidear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 67; 1833. Agrost. p. 209. — Endl. 1837. Gen. n. 809. p. 89; 1841. Ench. p. 57. — Meisn. 1843. Gen. p. 419(321). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 7. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 139; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 97. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 461. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 71. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 17 (*Sporabolus*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 781. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 487. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 375. (verar.)
 Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 912 *b*: sect. Vilfae.

*) Dicat. Sporleder, botanico Wernigerod.

Sporobolus R. Brown cont.
 Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 312: g. Agrostoidear.
 Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1174: g. Agrostear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
 Synon. Heleochloa Palis.; Agrosticula Raddi; Calotheca Steud.

Sporocadeae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 34; 1842. Anl. Mycol. p. XC. 140: fam. Sclerogasterum. Gen.: Sporocadus, Pestalozzia, Prosthemium.
 Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 145: fam. Dermatogasterum. Gen.: Sporocadus.

Sporocadei Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 228: fam. Sphaeronemeor. Gen.: Sporocadus, Pestalozzia, Angiopoma, Prosthemium, Phragmotrichum.

Sporocadus*) Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 23; 1840. IV. p. 39: nov. g. Pyrenomycetum.
 Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 61: g. Stilbosporeor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 48.
 Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 266: g. Cytisporeor.
 Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Mycol. p. 140: g. Sporocadear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 145.
 Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Sphaeronaemeor.
 Bonord. 1851. Hdb. p. 228: g. Sporocadeor.
 Synon. Hendersonia Berk.; Hindersonia Lév.

Sporocephalum Chevall. 1826. Fl. Paris. p. 59. = Dactylium Nees.

Sporocephalum „Chevall. Paris. p. 60. t. 3. f. 9" Endl. 1836. Gen. n. 227 *a*. p. 19; 1841. Ench. p. 14: sect. Botrytidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 162. 1.
 Synon. Cephalocladium Rchb.; Haplotrichum Link.

Sporochnaceae Harvey 1852. Ner. bor. am. I. p. 73: ordo Melanospermear. Gen. amer.: Arthrocladia, Desmarestia, Chnoospora.

Sporochneae Rchb. 1828. Consp. p. 28: div. Fucoidear. Gen.: Cladostephus, Sphacelaria, Scytosiphon, Sporochnus.
 Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Ectogymnosporear. Gen.: Sporochnus, Stilophora.
 Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 342; 1845. Phyc. germ. p. 273: fam. Pycnospermear. Gen.: Sporochnus, Carpomitra, Desmarestia, Arthrocladia. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 567. Gen. ead. et Cladothele, Chnoospora.
 Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 346: fam. Episporear. Gen. scand.: Desmarestia.
 Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: trib. Dermatothallar.
 Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: trib. Phycoidear. Gen.: Sporochnus, Desmarestia, Arthrocladia, Dichloria.
 Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 238: fam. Phaeosporear. Gen. ut Zanard.
 Math. 1853. Belg. II. p. 494; trib. 5 Algar. Gen.: Sporochnus, Desmaretia.

*) κάδος, vas, cadus. (?)

Sporochnidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Halyserear. Gen.: Sporochnus, Desmarestia.

Sporochnideae Rchb. 1841. Nomencl. p. 21: subdiv. Chordariear. Gen.: Desmarestia.

Sporochnoideae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 395; 1841. Man. brit. Alg. p. 2. 25: trib. Melanospermear. Gen. 1838: Desmarestia et 1841 Dichloria, Sporochnus, Elaionema.
Menegh. 1838. Cenni p. 41: fam. Algar. Gen.: Desmarestia, Dichloria, Sporochnus.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 42: trib. Fucoidear. Gen.: Arthrocladia, Desmarestia.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93): ordo Aplosporear. Gen.: Sporochnus.
Endl. 1843. Spl. III. p. 28: trib. Halyseridear. Gen.: Sporochnus, Desmarestia.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 185: subsect. Chordariear. Gen. ut Endl. et Lichina, Arthrocladia.
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 160: ordo Fucoidear. Trib.: Arthrocladieae, Sporochnoideae (p. 173. Gen.: Sporochnus, Carpomitra).

Sporochnus*) Agardh 1817. Syn. Alg. p. XII. 10; 1821. Spec. Alg. I. 1. p. 147 (Aphor. p. 101): nov. g. Fucoidear. (Fucus aculeatus L.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 339. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 387.
Agdh. 1824. Syst. p. XXXVI. 258: g. Chordariear. — Par Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 133.
Fries 1825. Pl. homon. p. 329: g. Fucacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 328. n. 3395; 1831. Gen. II. p. 749. n. 3795: g. Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 365: g. Floridear. (emend.)
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 506: g. Sporochnear. — Par. Zanard. 1843. Classif. p. 10. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gen. p. 342; 1845. Phyc. germ. p. 274; 1849. Sp. Alg. p. 568. n. 376. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XI. p. 781. — Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 238. — Math. 1853. Belg. II. p. 494.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Sphaerococcear.
Grev. 1830. Alg. Brit. p. 40. (Syn. p. XL.)
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 89: g. Chondrothamnior.
Menegh. 1838. Cenni p. 41: g. Sporochnoidear. — Par. Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. t. 26. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 27. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 68. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 28. n. 113. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 186. — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 173.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 759: g. Sporochnidear.

Sporochnus Agdh. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Sporochnidar.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 216: g. Sporochnacear.

Sporocybacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 467: ordo Gymnomycetum. Divis.: Sporocybei, Periconiei?, Stilbei.

Sporocybe Fries 1825. Pl. homon. p. 170: nov. g. Cephalotricheor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 341.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 47: g. Cephalotrichior.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 340: g. Dematieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 241. p. 20; 1841. Ench. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 29; 1842. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 59: g. Stilbinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 124. — Bonord. 1851. Hdb. p. 138.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 216: g. Stilbeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Periconieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 467: g. Sporocybeor.
Synon. Periconiae sp. Nees; Rhacodii et Dematii sp. Auct.

Sporocybei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 467: div. Sporocybaceor. Gen.: Cephalotrichum, Doratomyces, Sporocybe, Actinocladium.

Sporodaeae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 12; 1842. Anl. Mycol. p. LXII. 47: fam. Hyphomycetum. Gen.: Sporodum, Spondylocladium, Gonatorrhodum.

Sporodeae Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 122: fam. Hyphomycetum. Gen.: Gonatorrhodum, Sporodium.

Sporodermei Endl. 1836. Gen. p. 17; 1841. Ench. p. 13: subordo Gymnomycetum. Gen.: Spilocaea, Torula, Phragmidium, Phragmotrichum, Conoplea.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 245: ordo Gymnomycetum. Gen.: Torula, ...

Sporodermiei Fries vid. *Sporodesmiei Fries.*

Sporodermii Fries vid. *Sporodesmii.*

Sporodesmia Fries 1821. Syst. myc. I. p. 40: ordo Coniomycetum. Gen.: Seiridium, Sporodesmium, Exosporium, Gymnosporangium.

Sporodesmiei Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 489 (p. 460 *Sporodermiei*): ordo Coniomycetum. Gen.: Conoplea, Phragmotrichum, Sporidesmium, Aregma, Xenodochus, Torula, Spilocaea.

Sporodesmii Fries 1825. Pl. homon. p. 189 (p. 168 *Sporodermii*): trib. Entophytor. Gen.: Gymnosporangium, Podisoma, Phragmotrichum, Coryneum; Sporidesmium, Exosporium. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 4. Gen.: Coryneum, Phragmotrichum, Podisoma, Gymnosporangium.

Sporodesmium Agardh vid. *Sporidesmium Link.*

Sporodictyon Massalongo 1852. Flora p. 321; 1853. Mem. lich. p. 181; .... Ann. Bologn. V. p. 393: nov. g. Lichenum. (Parmelia atra var. Schär.)

*) ὄχνη, pyrus sylvestris (?); χνοῦς, lanugo. (?)

Sporodina Fries vid. *seq.*

Sporodinia*) Link 1824. Spec. I. p. 94: nov. g. Hyphomycetum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 341. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 317. (entosporor.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Aspergillacear.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 22; 1842. V. p. 18; 1842. Mycol. p. 70: g. Mucoroidear. (verar.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 129.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 227 (*Sporidinia*): g. Mucoroideor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 488 (*Sporodina*): g. Mucoreor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Ascophoreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 125: g. Mucorum.
= Aspergillus Mich.?

Sporodium Preuss vid. *seq.*

Sporodon Lév. vid. *seq.*

Sporodum Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 18. f. 247; 1839. III. p. 8: nov. g. Psiloniacear. (Sp. conopleoides.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 76.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 117: g. Psiloniaceor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 12; 1842. Mycol. p. 47: g. Sporodaear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495 (*Sporodon*): g. Oidieor.
Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 122 (*Sporodium*): g. Sporodear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 73: g. Torulaceor.
= Dematium Pers.?

Sporomega Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 34. 76. t. 9. f. 60; 1842. Mycol. p. 143: nov. g. Hysteriacear. (Sp. degenerans.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 262: g. Hysteriaceor.

Sporomesti Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 368: series Aërogasterum. Gen.: Eurotium; Aethalium, Lycogala; Myrothecium, Licea, Dermodium.

Sporomycetes Fries 1825. Pl. homon. p. 50: subclass. Fungor. Cohortes: Gasteromycetes, Coniomycetes.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 174: ordo 2 Fungor. Divis.: *Epispori* (gen.: Nemaspora, Coccospora, Phloeospora, Fusidium, Stilbospora, Asterospora, Melanconium, Oospora, Monilia, Didymosporium, Tetracolium?, Hormiscium, Siridium, Phragmidium, Entomyclium), *Hypospori* (Schizoderma, Cryptosporium, Bullaria, Physoderma, Erysibe, Puccinia, Blennoria, Coryneum, Sporidesmium, Prosthemium, Sarcopodium, Gymnosporangium, Podisoma, Phragmotrichum, Exosporium), *Perispori* (Epicoccum, Aegerita, Dermosporium, Illosporium, Tubercularia, Fusarium, Conoplea, Hyphelia, Trichoderma), *Entospori* (Aecidium, Myxarium, Sclerococcum?, Ostracococcum, Spermatodermia, Peridermium, Onygena, Cenococcum, Chaetomium, Cylichnium, Myrothecium, Stephanoma, Asterophora).

Sporomyci Nees 1817. Syst. Überbl. p. 11: series Mucedinum liberar. Gen.: Acremonium, Epochnium, Fusisporium, Trichothecium.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLIII: subsect. Mucedinum. Gen.: Arthrinium, Fusisporium, Epochnium, Acremonium.
Fries 1825. Pl. homon. p. 186: trib. Mucedinum. Gen.: Psilonia, Conoplea, Arthrinium, Polythrincium, Dematium, Sporisorium.
Rchb. 1828. Consp. p. 6: subdiv. Mucedineor. genuinor. Gen. ut Fries 1825 et Sporophloeum, Goniosporium, Camptoum.

Sporonema Desmaz. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 182: nov. g. Pyrenomycetum. (S. phacidioides.)
Desmaz. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 319: g. Pilidio aff. Char. emend.

Sporophleum*) „Nees mss." Link 1824. Spec. I. p. 45: nov. g. Hyphomycetum. *Cf.* Spreng. Grdz. wiss. Bot. t. 5. f. 5 et Leman 1827. Dict. v. 50. p. 342.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 102 (*Sporophloeum*): g. Sporomycor.
Endl. 1836. Gen. n. 231 *a*. p. 120; 1841. Ench. p. 14: sect. Arthrinii.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 182 (*Sporophloeum*): g. Dematieor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43 (et ibid. iterum inter Mucedines).
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 44: g. Psiloniacear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 88: g. Psiloniaceor.

Sporophloeum Rchb. vid. *praeced.*

Sporopodium Montagne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 54: nov. g. Lecidinear. An *Echinoplaca Fée*? (S. Leprieurii.)
Trevis. 1856. Linnaea XXVIII. p. 294: g. Biatorear.
Synon. Ectolechia Trevis.

Sporormia De Notaris 1850. Mem. Torino X. p. 342: nov. g. ex typo Sphaeriae stercoris DC.?

Sporoschisma Berkeley & Broom 1847. Gard. Chron. p. 540 adnot.: g. Hyphomycetum. (S. mirabile.)
Mont. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 299: g. Fungor., Helminthosporio aff.
Berk. & Broom 1850. Ann. nat. hist. V. p. 461: g. Torulaceor.
Synon. Pithospermum Mont.

Sporoseira Ruprecht 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 40: g. Ceramiear. (Seirospora Griffithsiana Phyc. brit.)

*) δινέω, volvo. (?)

*) φλοιός, cortex.

Sporotheca Corda 1829 in Sturm Flora Fung. II. p. 113. t. 53: nov. g. Fungor. (S. Carpini.) *Cf.* Flora Lit. II. p. 47.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 31; 1842. Mycol. p. 131: g. Sphaeriaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 164: g. Dothidinor.?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 507: g. Stilbosporeor.
= Dothidea Fries?

Sporothrichum Link 1809 et 1816: vid. *Sporotrichum Link.*

Sporotricha Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: cohors Fungor. Gen.: Mycogone, Sepedonium, Byssocladium, Sporotrichum, Alytosporium, Trichoderma, Trichothecium, Scolicotrichum, Camptosporium, Bactridium, Fusisporium, Arthrinium, Epochnium.

Sporotrichaceae Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 10; 1838. II. p. 10; 1840. IV. p. 26; 1842. V. p. 7; 1842. Anl. Mycol. p. LVII. 22: fam. Hyphomycetum. Gen.: Ramularia, Tuburcinia, Athelia, Acrothamnium, Alytosporium, Capillaria, Sporotrichum, Dendrina, Fusisporium, Circinotrichum, Plecotrichum, Miainomyces, Chrysosporium, Chromelosporium, Nematogonum, Myxonema, Colletosporium, Melanotrichum, Memnonium, Merosporium. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 108. Gen.: Sporotrichum.

Sporotricheae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 536: div. Mucedinear. verar. Gen.: Oidium, Geotrichum, Sporotrichum, Byssocladium, Fusisporium, Arthrinium, Scolicotrichum, Trichothecium, Sepedonium, Mycogone, Epochnium, Acremonium.

Sporotrichei Rchb. 1841. Nomencl. p. 4: sect. Mucedineor. Gen.: Capillaria, Myxonema, Colletosporium, Chrysosporium, Plecotrichum, Geotrichum, Nematogonium, Sporotrichum, Byssocladium, Fusisporium, Zygodesmus, Amphiblistrium, Acremonium, Monotospora, Bactridium, Trichothecium, Anodotrichum, Acrotrichum, Cladotrichum, Myxocladium, Soredospora, Blastotrichum. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 77. Gen. fere ead. Accedunt Ramularia, Schinzia, Nägelia.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: trib. Aleurineor. Gen.: Sporotrichum, Fusidium, Aleurisma, Asterophora, Mycogone, Sepedonium, Nematogonium, Colletosporium, Acrothamnium?, Plecotrichum?, Mainomyces, Chrysosporium?, Chromosporium?, Myxonema?, Melanotrichum?, Memnonium?, Artotrogus.

Sporotrichiaceae Preuss in Linnaea XXIV. p. 108: vid. *Sporotrichaceae.*

Sporotrichium Ritgen vid. *seq.*

Sporotrichum Link 1809. Berl. Mag. III. p. 12 (*Sporothrichum*): nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 343. — Par. Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 34. (Byssoidear.) Subgen.: Lysisporium, Alytosporium. — Mart. 1817. Erlang. p. 335. — Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 415. — Endl. 1836. Gen. n. 223. p. 19; 1841. Ench. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Nees 1816. Syst. p. 48; 1817. Überbl. p. 12: g. Trichomycor. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 185. — Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 113.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: g. Sporotrichor.
Link 1820. Jahrb. I. 1. p. 163. Monogr.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 550: g. Mucedinear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 72: g. Byssoideor. (veror.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 547. n. 3549; 1831. Gen. II. p. 780. n. 4030.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 537: g. Sporotrichear.
Link 1824. Spec. I. p. 1: g. Hyphomycetum. Subgen.: Sporotrichum, Byssocladium. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 274. (episporor.) — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 88.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Gonocladear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90 (*Sporotrichium*): g. Spondylomycetum.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 10; 1842. Ic. Fung. V. p. 7; 1842. Mycol. p. 25: g. Sporotrichacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 108.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 126: g. Sporotricheor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 78. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494: g. Sepedoniaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 102: g. Dendrinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 458: g. Botrydear.
Synon. Nematogonum Desv.; Nematogonium Rchb.; Virgaria Nees?; Geotrichum Link?

Sporozoideae Derbès & Solier 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 263: div. Algar. Gen.: Anadyomene, Caulerpa, Petalonia, Draparnaldia, Chorda, Asperococcus, Castagnea, Nemacystus, Arthrochladia, Nereia, Laminaria.

Spraguea*) Torrey 1853. Pl. Fremont. p. 4. t. 1: nov. g. Portulacacear., Monocosmiae aff. *Cf.* Griseb. Jahresber. p. 381 et Flora 1853. p. 704.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 8: g. Calandriniear.

Sprekelia**) Heist. .... Trew Ehret. pict. t. 24: nov. g. ex typo Amaryllidis formosissimae Mart.
Herb. 1821. App. p. 34; 1825. Bot. Mag. App. p. III; 1837. Amaryll. p. 71. 134: g. Amaryllidear. (Hippeastriformium.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1255: g. Amaryllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p.

---

*) Dicat. Isaac Sprague.
**) Dicat. J. H. v. Sprekelsen, Hamburg. (Wittst.)

Sprekelia Heist. cont. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 13. 142.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 809: sect. Amaryllidis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1173 *d.* p. 176; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 417: subg. Amaryllidis.
Kunth 1850. Enum. V. p. 507: g. Hippeastrear.

Sprengelia*) Smith 1794. Vet. Ac. n. Handl. p. 260. t. 8: nov. g. plant.
Willd. 1797. Sp. I. p. 833. n. 314: g. Pentandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 357.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 554. Ed. Nees p. 410: g. Epacridear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXX. 384. n. 732. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 630. n. 675; 1830. Gen. I. p. 155. n. 776. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 348. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 689.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 519: g. Epacridum.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3349: g. Sprengeliacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Epacrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4288. p. 749; 1841. Ench. p. 368. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 768. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 784: g. Epacriear.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4817: g. Sprengeliear.
Synon. Poiretia Cav.; Springalia Andr.

Sprengelia Schultes 1809. Observ. bot. p. 134: nov. g. ex typo Broterae ovatae Cavan.
= Brotera Cavan.

Sprengeliaceae Rchb. 1828. Consp. p. 128: sect. Epacrear. Gen.: Cosmelia, Andersonia, Ponceletia, Sprengelia.

Sprengelieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 123: sect. Epacrear. Gen. Sprengeliacear. Rchb.

Springalia Andr. (ubi?)
= Sprengelia Smith.

Sprucea Hook. & Wilson in sched. musc. antarct.: nomen *Holomitrio Brid.* perperam substitutum. (Benth. 1853.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401; 1849. ibid. XI. p. 783: g. Trichostomear.

Sprucea Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 229: nov. g. Cinchonear.? (S. rubescens.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 120.

Sprunera „Schultz“ Meisn. Gen. Comm. p. 362 in synon. Sphaeranthi: vid. *seq.*

Sprunnera Schultz Bip. in Kotschy It. Assyr. n. 576. (Flora 1842. I. Beibl. p. 134. 135.)
= Polycephalos DC.

*) Dicat. Curt. Sprengel, prof. Halensi.

Sprunnera Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 954: g. Inulear. legitimar. (Codonocephalum inuloides Fenzl.)
= Codonocephalum Fenzl.

Spumaria „Pers. Fung. ined.“ Gmel. 1791. Syst. p. 1466: g. Fungor. (Reticularia alba Bull.) — Par. Pers. 1796. Obs. myc. p. 94.
Pers. 1797. Tent. p. 8: g. Dermatocarpi. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 350.
Pers. 1801. Syn. p. XIV. 162: g. Trichospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 346. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 48.
DC. 1805. Franç. II. p. 260: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 23: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 101; 1817. Überbl. p. 26: g. Gasteromycor. efflorescentium.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Leiocarpor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 567: g. Spumaridear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Spumidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 552: g. Fuliginear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 396.
Fries 1825. Pl. homon. p. 146; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 94; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 449: g. Aethalinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 180; 1841. Nom. p. 9. n. 342. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 22; 1842. Mycol. p. 88. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 252. — Bonord. 1851. Hdb. p. 218.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 1029: g. Trichogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 532. n. 3522; 1831. Gen. II. p. 773. n. 3977: g. Aërogasterum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Spumariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 335: g. Placogasterum.
Endl. 1836. Gen. n. 319. p. 27; 1841. Ench. p. 17: g. Aethalineor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Spumarieor.

Spumariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Lycoperdariear. Gen.: Spumaria, Aethalium, Reticularia, Myrothecium, Trichoderma, Amphisporium, Dichosporium.

Spumarideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 566: div. Gasteromycear. Gen.: Eurotium, Aethalium, Lignydium, Spumaria, Strongylium, Lycogala.

Spumariei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: sect. Coniogastror. Gen.: Spumaria, Pittocarpium?

Spumideae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 80: fam. Tectigraniae. Gen.: Reticu-

Spumideae Dumort. cont. laria, Spumaria, Strongylium, Lygnidium, Fuligo, Aethalium.

Spurie-gyratae Swartz Syn. Filic. p. 1. 150: vid. *Rimatae Sw.*

Spyridanthus Wittst. vid. *Spiridanthus Fenzl.*

Spyridia*) Harvey .... in Hook. Brit. fl. V. p. 336; 1841. Man. brit. Alg. p. 100: nov. g. Ceramiear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 32 (*Spirydia*). — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 179; 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XI. p. 783. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 707 (*Spirydia*). — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 79. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358. (Flora 1843. p. 98: *Spiridia*). — Endl. 1843. Spl. III. p. 35. n. $122/_{19}$. — Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 168. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 142.
Kütz. 1841. Linnaea XV. p. 731. 743: g. a Ceramio distinctum.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 100; 1843. Phyc. gener. p. 376; 1845. Phyc. germ. p. 288; 1849. Sp. Alg. p. 665. n. 438: g. Callithamniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Ceramear.
Nägeli 1847. Alg. Syst.: g. Ceramiacear.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 680: g. Spyridiear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 204; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 256: g. Spyridiacear.
Synon. Bindera J. Agdh.; Hypnothalia Grev.

Spyridiaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 203: ordo Gongylospermear. Gen.: Spyridia.

Spyridieae Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 680: fam. Floridear. Gen.: Spyridia.

Spyridium Fenzl 1837 in Enum. pl. Hügel. p. 24 in adnot.: nov. g. Rhamnear., inter Phylicam et Soulangiam medium. (S. eriocephalum.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 348. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 783. — Reissek 1858. Linnaea XXIX. p. 283. Char. amplif.
Endl. 1840. Gen. n. 5741. p. 1101; 1841. Ench. p. 581: g. Phylicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5581.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Spyris**) Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 313: nov. g. Algar. (Fucus atomarius β Bert.)
= Stypopodium Kütz.?

Squamaria „Rivin." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 232. Ed. Hall. 1745. p. 238: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 183. n. 510; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 286. n. 599: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 438.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 611: g. Dymeizonum.

*) σπυρίς, corbis.
**) σπυρίς, sporta, corbis.

Squamaria Rivin. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129: g. Petalostemonum.
Hall. 1768. Helvet. p. 297.
= Lathraea Linn.

Squamaria Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. p. 151: sect. Lobariae. (L. semipinnata, stellaris, aipolia, pulverulenta, speciosa, stygia, etc.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 357.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 405 *a:* sect. Cetrariae. — Par. Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 52. — Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 46.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Squamariear.

Squamaria Endl. 1836. Gen. n. 172 *A.* p. 15; 1841. Ench. p. 11: subg. Parmeliae. Sect.: Urceolaria, Patellaria, Psora, Placodium. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 570. 1. Subsect.: Myriotrema, Echinoplaca, Patellaria, Psora, Placodium.
Conf. Squammaria DC.

Squamaria Zanardini 1841. Alg. adriat. p. 133. t. 8. f. 4 (Mem. Ac. Torin. Ser. 2. IV.): nov. g. Squamariear. (Zonaria Squamaria Ag.)
= Peyssonellia Decne.

Squamarieae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Psora, Squamaria, Placodium.

Squamarieae Zanardini 1842. Mem. Ac. Torin. Ser. 2. IV. p...: nova trib. Algar. Gen.: Squamaria, Zanardinia, Hildenbrandia. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 376.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 128: ordo Desmiospermear. Gen.: Peyssonelia.

Squammaria DC. 1805. Fl. franç. II. p. 374: nov. g. Lichenum. (Lichen tartareus Jacq.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 355 (*Squamaria*).
Math. 1853. Belg. II. p. 142: g. Lichenear. sect. 5.
Synon. Squamaria Endl.

Squilla Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. V. (1751.) p. 124: g. Thalamostemonum.
= Scilla Linn.

Squilla Steinheil 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 276: nov. g. ex typo Scillae maritimae L.
Endl. 1842. Spl. II. p. 13. n. 1131 *a:* sect. Squillae.

Squilla Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 13. n. 1131: g. Hyacinthear. Sect.: Squilla, Urginea, Stellaris?
Synon. Stellaris Mönch; Urginea Endl.

Sruthanthus „Mart." DC. Prodr. IV. p. 671: sphalm. pro *Struthanthus Mart.*

Staafia Wittst. vid. *seq.*

Staavia*) Dahl 1787. Observ. bot. p. 15; 1788 in Röm. & Ust. Mag. Bot. IV. p. 28: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Brunia radiata et glutinosa.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 836 (*Staafia*). — Par. Willd. 1797. Syst. I. p. 1144. n. 429. — Pers. 1805. Ench. I. p. 246. n. 547.

*) Dicat. dom. Martino Staaf.

Staavia Dahl cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 474: g. Rhamnoidear. — Par. Link 1821. En. I. p. 231.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 273: g. Rhamneis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 153. n. 655: g. Rhamnear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIX. 345. n. 969. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 376.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 667: g. Diosmear.
R. Brown 1818. Pl. Abel. Chin. p. 3 (Verm. bot. Schr. I. p. 562): g. Bruniacear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 45. — Brongn. 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 378. t. 36. — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4224. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — Bartl. 1830. Ord. p. 374. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 48. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 479. — Meisn. 1837. Gen. p. 72(52). — Endl. 1839. Gen. n. 4599. p. 807; 1841. Ench. p. 402. — Walp. 1842. Rep. I. p. 544. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 183. n. 926: g. Bruniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 159. n. 6203. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 820.
Synon. Levisanus Schreb.; Astrocoma Neck.; Stavia Thunb.; Bruniae sp. Linn.

Staberoha*) Kunth 1841. Enum. pl. III. p. 442: nov. g. Restiacear. (Restio imbricatus Thunb.) — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Endl. 1842. Spl. II. p. 11. n. 1018/$_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 257.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139: g. Restionear.

Stacheae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 662: subordo Lamiacear. Trib: Melittidae, Lamidae, Marrubidae, Ballotidae.

Stachis Neck. vid. *Stachys Tourn.*

Stachyacanthus Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 65; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 168: nov. g. Ruelliear.

Stachyandra Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1312 *e:* sect. Xerotis.

Stachyanthus G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 410: sect. Struthanthi. (Loranthi §. *Stachyanthi DC.*)

Stachyanthus DC. 1836. Prodr. V. p. 84: nov. g. Albertiniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2229. p. 362; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177(123). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3864.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: g. Heterocomear.

Stachyarpagophora**) Vaillant 1722. Act. Ac. Paris. p. 204: g. Dipsacear.
= Achyranthes Linn.

Stachyarpheta Juss. vid. *Stachytarpheta Vahl.*

Stachyastrum Engelm. & Gray 1847. Bost. Journ. V. p. 256.

*) Dicat. H. Staberoh, Berolin.
**) στάχυς, spica; ἅρπαξ, harpago.

Stachyastrum Engelm. cont.
A. Gray 1848. Mem. Amer. Ac. n. ser. III. p.... t. 5: sect. Benzoniae.

Stachybotrys Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 21. t. 6: nov. g. Aspergillinor. (Stachyobotrydear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Dematieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494 (*Strachybotrys*: g. Cephalosporeor.) p. 494: g. Cladobotryeor.
= Stachyobotrys Rchb., Corda.

Stachybotrys G. Don vid. *Stachyobotrys Benth.*

Stachycarpus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 218; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 9. n. 1810 *c:* sect. Podocarpi.

Stachychrysum Bojer 1837. Hort Maurit. p. 114.
= Euacacia Endl.

Stachycrater Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 466: nov. g. ordinis incerti, Caseariae aff.? (St. Philippinus.)

Stachydeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Labiatar. Subtrib.: Betoniceae, Galeopsideae. — Par. Benth. 1834. Labiat. p. 503. Gen.: Melittis, Physostegia, Macbridea, Synandra, Lamium, Leonurus, Galeopsis, Stachys, Sphacele, Sideritis, Marrubium, Ballota, Lasiocorys, Roylea, Otostegia, Leucas, Leonotis, Phlomis, Notochaete, Eremostachys, Eriophyton, Moluccella, Lagochilus?, Holmskioldia, Achyrospermum, Colquhounia? — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 815. Gen. ead. et Anisomeles, Lepechinia, Craniotome, Hymenocrater. — Koch 1837. Syn. p. 563. Ed. II. p. 647. Gen.: Melittis, Lamium, Galeobdolon, Galeopsis, Stachys, Betonica, Sideritis, Marrubium, Ballota, Leonurus, Chaiturus, Phlomis. — Endl. 1838. Gen. p. 623; 1841. Ench. p. 308. Subtrib.: Melitteae, Lamieae, Marrubieae, Balloteae. — Meisn. 1840. Gen. p. 286(195). Subtrib. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. 204. Gen. ut G. Don et Wiedemannia, Orvala, Galeobdolon, Chaiturus, Panzeria, Ambleia, Zietenia, Cuminia, Empedoclea, Hesiodia, Burgsdorfia, Acrotome, Beringeria, Acanthoprasium, Phlomidopsis. — Brongn. 1843. En. genr. p. 66. Gen. ex Benth. — Walp. 1845. Rep. III. p. 799. Subtrib. ut Endl. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 407. Divis.: Scutellarieae, Melitteae, Marrubieae, Lamieae. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 195. Gen. bras.: Leonurus, Stachys, Sphacele, Marrubium, Leucas, Leonotis, Scutellaria.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: subdiv. Nepetear. Gen.: Galeopsis, Anisomeles, Betonica, Stachys, Sphacele, Chasmonia, Lagochilus, Lamium, Leonurus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 105. Gen. Lamiear. Endl. et Galeobdolon, Chaiturus, Panzeria, Betonica, Phytoxys.

Stachyditypus Wittst. vid. *seq.*

Stachydotypus Dumort. 1827. Fl. belg. p. 45 (ex Endl. Gen.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 836 (*Stachyditypus*).
= Stachyotypus Benth.

Stachygynandrum *) Palis. 1804. Dict. v. 2. p. 125 (*Androgynette*); 1805. Prodr. Aethéog. p. 105: nov. g. Lycopodior. (L. alpinum L., etc.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 39: g. Licopodacear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 109: subg. Lycopodii.
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 185: sect. Lycopodii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1676 *b*; 1831. Fl. exc. p. 153.
= Stachygynandri Brongn. pars.

Stachygynandrum Brongn. 1826. Dict. class. IX. p. 557.
Endl. 1836. Gen. n. 696 *c*. p. 69; 1841. Ench. p. 47: sect. Lycopodii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2315. 4.
Synon. Stachygynandrum, Diplostachium, Selaginella et Gymnogynum Palis.; Rhachyobryum Ritg.

Stachylidium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 15: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 378. — Par. Nees 1816. Syst. p. 57; 1817. Ueberbl. p. 15. (capitatar.) — Mart. 1817. Erlang. p. 343. — Fries 1832. Syst. III. 2. p. 389. — Endl. 1836. Gen. n. 228. p. 19; 1841. Ench. p. 14.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Botrytidum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 553: g. Aspergillidear.
Link 1824. Spec. I. p. 77: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 302. (synsporor.)
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 535: g. Botrytidear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 178: g. Acremonior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 136 (ex Link).
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185: g. Aspergillacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 115 *e*: sect. Botrytidis (ex Nees).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 779. n. 4022: g. Byssoideor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 89: g. Spondylomycetum. (Nees f. 56.)
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 21: g. Aspergillinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 147.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 13; 1842. Mycol. p. 52: g. Polyactidear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 89: g. Mucedineor. genuinor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 490: g. Botrytideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cladobotryeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 110: g. Polyactideor.
Math. 1853. Belg. II. p. 453: g. Botrydeor.
Synon. Stachylis Pers.; Spondylocladium Mart. (Sphondylocladium Nees); Sceptromyces et Botryosporium Corda.

*) στάχυς, spica; γυνή, femina; ἀνήρ, mas.

Stachylis Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 37: sect. Botrytidis.
= Stachylidium Link.

Stachymacris A. Hamilt. 1832 in Mém. soc. Linn. Lyon I. p. 17 (Seringe Bull. bot. I): sect. Scutellariae. — Par. Benth. 1834. Labiat. p. 482; 1848 in DC. Pr. XII. p. 417. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 793. — Endl. 1838. Gen. n. 3626 *c*. p. 621; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4167. 3. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 129. — Walp. 1845. Rep. III. p. 751. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 702. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 396.

Stachymorpha Otth 1824 in DC. Prodr. I. p. 371: sect. Silenes. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 149. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 402. — Endl. 1840. Gen. n. 5248 *d*. p. 973; 1841. Ench. p. 50 6; 1843. Spl. III. p. 93. n. 5248 *f*. — Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7828. 1 (*Stachyomorpha*). — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 315. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 176.
Synon. Corone Hoffmsg.; Ocymastrum Rchb. pt.

Stachyobium Lindl. .... in Paxt. Fl. gard. I sub tab. 27: sect. Dendrobii. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 643.

Stachyobotrydeae Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 21: nova fam. pro Stachybotryde indicata.

Stachyobotrys Benth. 1835. Labiat. p. 672; 1845 in DC. Prodr. XII. p. 581: sect. Teucrii. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 864 (*Stachybotrys*). — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *e*. p. 631; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4160. 4. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 148. — Walp. 1845. Rep. III. p. 909. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 442.

Stachyobotrys Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 149: g. Aspergillinor.
Corda 1842. Mycol. p. 57: g. Arthrobotrydear. (antea *Stachybotrys.*)
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 90: g. Mucedineor. genuinor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 491: g. Botrytideor.?
Bonord. 1851. Hdb. p. 117: g. Basidiophoror.

Stachyocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 27: class. I. Cryptogamor. Gen. unicum: Equisetum.

Stachyocnide Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 227: nov. g. Urticacear., Pouzolziae aff.

Stachyocodonia Rchb. 1841. Nomencl. p. 103. n. 4038. 1: sect. Wahlenbergiae.
= Phyteumoides A. DC.

Stachyomorpha Rchb. vid. *Stachymorpha Otth.*

Stachyophorbe Liebm. .... in Mart. Syn. palm. p. 309.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 458: sect. Chamaedoreae.
Örsted 1858. Palm. Centroam. p. 9: g. Chamaedoreear. (Chamaedorea oreophila, pygmaea.)

Stachyophorbe Klotzsch 1852 in Otto's Gartenz. Nr. 46. p. 363: g. Palmar., Chamaedoreae aff.
= Dasystachys Örst.

Stachyopterides Willd. 1802. Bem. üb. Farrenkr. p. ...: ordo 1 Cryptogamar. Gen.: Equisetum, Lycopodium, Bernhardia.
Rebent. 1804. Neom. p. 245: class. I. Cryptogamiae. Gen.: Equisetum, Lycopodium.
Willd. 1810. Spec. V. p. 10 (Grundr. ed. Link 1831. p. 135): ordo 2 Cryptogamiae. Gen.: Lycopodium, Dufourea, Tmesipteris, Bernhardia, Ophioglossum, Botrychium. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 379.
Mart. 1817. Erlang. p. 11: ordo 4 Cryptogamiae. Gen.: Ophioglossum, Botrychium, Lycopodium.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 107: div. Pteroidum. Excluditur Lycopodium.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 28: ordo 5 Filicum. Trib.: Osmundeae, Ophioglosseae, Lycopodeae.

Stachyosporae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Synorganor. sporiferor. Gen.: Ophioglossum.

Stachyotypus Benth. 1834. Labiat. p. 541; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 468: sect. Stachydis. — Par. Koch 1837. Syn. p. 568. Ed. II. p. 653. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 827. — Endl. 1838. Gen. n. 3650 *e.* p. 626; 1841. Ench. p. 308. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 138. — Walp. 1845. Rep. III. p. 824. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 689. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 413.
Synon. Trixago et Stachys Link & Hoffmsg.; Campanistrum Rchb.; Stachydotypus Dumort.; Stachyditypus Wittst.

Stachyphora C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 625: sect. Luzulae. (L. spicata, campestris, etc.)
= Gymnodes Griseb.

Stachyphylla Presl 1826. Fl. sicul. I. p. 152: sect. Silenes. (S. sedoides Jacq.)
= Rupifragae Otth sp.

Stachys *) Tourn. 1700. Inst. p. 186. t. 86: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 221. Ed. Hall. 1745. p. 227: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 174. n. 485; 1737. Cliff. p. 309; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 170; 1753. Sp. II. p. 580; 1759. Syst. ed. X. p. 1100. n. 638; 1763. Sp. ed. II. p. 811; 1764. Gen. ed. VI. p. 293. n. 719; 1767. Syst. ed. XII. p. 394: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 410. — Murr. 1774. Syst. p. 447; 1784. Syst. p. 535. — Reich. 1778. Gen. p. 297. n. 777. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 390. n. 974. — Gmel. 1791. Syst. p. 906. — Pers. 1797. Syst. p. 572. — Willd. 1800. Sp. III. p. 97. n. 1109; 1809. En. p. 615. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 30.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 642: g. Gymnotetraspermar.

*) Nomen ex Plinio.

Stachys Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 185. n. 765: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 396.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 163. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 371.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 190. — — Juss. 1789. Gen. p. 114. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 339. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 263. — DC. 1805. Franç. III. p. 547; 1815. V. p. 400. — Pers. 1807. Ench. II. p. 123. n. 1392. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 308. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 58 (*Épiaire*). — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 372. (Disjunguntur Trixago et Eriostomum.) — Link 1822. En. II. p. 108; 1829. Hdb. I. p. 472. — Kunth 1823. Syn. II. p. 85. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 733. n. 2097; 1831. Gen. II. p. 474. n. 2339. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 407.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 239: g. Gymnospermar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 264.
Hill 1769. Ht. kew. p. 256: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 474 (*Stachis*): g. Labiacear.
Neck. 1790. El. I. p. 315. n. 495: g. Corythophytor. restrict.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 364: g. Pericarpiferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 61: g. Tetrandr. Monogyn.
Link & Hoffmsg. 1806. Fl. portug. p. 66. Sejungitur Lasiopera.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 436: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2879 (sect.: Trixago, Chamaesideritis, Eriostomum); 1831. Fl. exc. p. 318 (sect.: Campanistrum, Chamaesideritis, Eriostachys). — Bartl. 1830. Ord. p. 183.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Betonicear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 3. 63: g. Bilabiatar.
Benth. 1834. Labiat. p. 525: g. Stachydear. Sect.: Alopecuros, Betonica, Eriostachys, Calostachys, Stachyotypus, Olisia, Chamaesideritis, Ambleia, Zietenia. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 823. Sect. eaed. — Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 105. n. 4078. Sect. fere eaed. — Koch 1837. Syn. p. 567. Ed. II. p. 652. Sect.: Eriostachys, Stachyotypus, Pseudosideritis. — Kunth 1838. Berol. II. p. 112. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. (restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 441. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 137. Sect. 5 ex Benth. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 796. Sect. ut Benth. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 686. Sect.: Eriostachys, Eustachys, Zietenia. — Schmidt 1858 in Mart. fl. Bras. fasc. XXII. p. 197.

Stachys Tourn. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3650. p. 625; 1841. Ench. p. 308: g. Lamiear. Sect. ut Benth. 1834. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 287 (195). — Walp. 1845. Rep. III. p. 816. 988. Sect. eaed. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 462. Sect.: Eriostachys, Calostachys, Stachyotypus, Olisia, Chilostachys, Chamaesideritis, Zietenia, Ambleia. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 684. Nova sect.: Dasystoma. — Webb.... Canar. III. p. 94. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 409. Sect. ex Benth.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Lamidar.
Synon. Tertiola Caesalp.; Epimeredi Adans.?; Bonamya Neck.?

Stachysagria „Spach" Endl. Gen. Suppl. V. p. 30: vid. *Staphysagria DC.*

Stachysanthes Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 312: sect. Diphyis. (D. odorata, gibbosa, flavescens.)

Stachystemon Planchon 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 471. t. 15: nov. g. Euphorbiacear., Pseudantho aff. (St. vermiculare.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 560: g. Stachystemonear.

Stachystemoneae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 559: div. Euphorbiacear. biovulatar. Gen.: Williamia, Stachystemon.

Stachytarpha*) Link 1821. Enum. I. p. 18: g. Verbenacear. (Nomen emendat. pro *Stachytarpheta Vahl. Cf.* Flora 1822. II. p. 490, ubi rectius nomen proponitur: *Stachytarpheia.*)
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 561: g. Verbenear. Sect.: Abena, Tarphostachys. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 907.
Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 197: g. Euverbenear. Sect. ut antea.
= Stachytarpheta Vahl.

Stachytarpheia vid. *Stachytarpha.*

Stachytarpheta**) Vahl 1805. Enum. I. p. 205. n. 48: nov. g. Diandr. Monogyn. (Verbena indica Jacq.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 50. p. 379, ubi proponitur nomen emend.: *Sarcostachya.* — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 15. — Willd. 1809. En. p. 30. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 57. 203. n. 89.
Pers. 1807. Ench. II. p. 139. n. 1428: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75 (*Stachyarpheta*). — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 279. — Kunth 1823. Syn. II. p. 62. — Link 1829. Hdb. I. p. 451. — Cham. 1832. Linnaea VII. p. 243. Sect.: genuinae, Melasanthus. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 99. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. — Clos 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 381.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 432: g. Salviear.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 69: g. Viticear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 53. n. 87; 1830. Gen. I. p. 19. n. 71: g. Labiatar.

---

*) ταρφός, densitas.
**) ταρφειός, densus, frequens.

Stachytarpheta Vahl cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2896; 1841. Nom. p. 108. n. 4185: g. Verbenear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 798.
Endl. 1838. Gen. n. 3685 *a*. p. 633; 1841. Ench. p. 312: sect. Verbenae.
Meisn. 1840. Gen. p. 290 (198): g. Lippiear. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 4 (sect.: Eustachytarpheta, Melasanthus); 1847. VI. p. 686.
Synon. Sherardia Vaill.; Abena Neck.; Vermicularia Mönch; Cymburus Salisb.; Stachytarpha Link; Stachytarpheia . . . ; Sarcostachya Juss.; Melasanthus Pohl.

Stachyura Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2876 *b*: sect. Nepetae.

Stachyura Hassk. vid. *Stachyurus Sieb. & Zucc.*

Stachyureae Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 11. p. 162: subordo Pittosporear. Gen.: Stachyurus.

Stachyurus Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 42. t. 18: nov. g. Pittosporear. (St. praecox.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 187. n. 7173. — Meisn. 1843. Comm. p. 348. (?) — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 228 (*Stachyura*).
Endl. 1840. Gen. n. 5669. p. 1083; 1841. Ench. p. 572: g. Pittosporeis aff.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 125: g. Cyrillear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 441: g. Pittosporacear.?
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 162: g. Stachyurear.

Stackhousea Hook. f. vid. *Stackhousia Smith.*

Stackhouseae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 555 (Verm. bot. Schr. I. p. 54): ordo plant. inter Celastrinas et Euphorbiaceas intermedius. Gen.: Stackhousia. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 50. p. 381 (*Stackhousieae*).
Bartl. 1830. Ord. p. 368: ordo (216) Tricoccar. Gen. id.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 539: fam. (31) Tricoccar. Gen. id.
= Stackhousiaceae Lindl.

Stackhousia*) Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 218.
Labill. 1804. Nov. Holl. I. p. 177. t. 104.
Hedw. 1806. Gen. p. 206. n. 846: g. Terebinthacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 656; 1825. Syst. I. p. 943. n. 1122. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXII. 667. (?)
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 555 (Verm. bot. Schr. I. p. 54): g. Stackhousear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 369. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 540. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 47 (*Stackhousea*).
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 381: g. Stackhousiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197.

---

*) Dicat. John Stackhouse, botanico anglico.

Stackhousia Smith cont.
n. 5119 (*Stackousia*); 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. n. 7467. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 229. n. 1204: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 999.
A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 89: g. Stackhousiar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 118; 1847. Veg. kd. p. 589: g. Stackhousiacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5763. p. 1107; 1841. Ench. p. 586. — Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). — Bunge 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 180. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 799. — Schuch. 1853. Linnaea XXVI. p. 3.

Stackhousia Lamx. (ubi?) g. Algar. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 380.
= Scytothalia Grev.

Stackhousiaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 118; 1847. Veg. kingd. p. 589: ordo Rhamnalium. Gen.: Stackhousia, Tripterococcus.
Endl. 1840. Gen. p. 1106; 1841. Ench. p. 585: ordo (242) Tricoccar. Gen.: Stackhousia, Tripterococcus. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 799: fam. Dicotyledonear. polypetalar. perigynar. Gen. ead.
Schuch. 1853. Linnaea XXVI. p. 1. Synops. fam. Gen. ut Endl. et Plokiostigma.
Synon. Stackhouseae R. Brown; Stackhousieae Juss.; Stackhousiae A. Rich.

Stackhousiae A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 89.
= Stackhousiaceae Lindl.

Stackhousieae (Juss. 1827. Dict. v. 50. p. 381) Rchb. 1828. Consp. p. 197: subdiv. Rutariar. Gen. unicum: Stackousia.
Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 21. 27: fam. Jasminariear. Gen.: Stackhousia.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (92) Calyciflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo Euphorbialium.
Mart. 1835. Consp. p. 55: ordo 265.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196: sect. Empetrear. Gen.: Pseudanthus (1841 emissus), Stackhousia, Tripterococcus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: fam. Rhamnoidear.?

Stackousia Rchb. vid. *Stackhousia Smith.*

Stadmania „Lam.“ Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 382: g. Sapindear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285: g. Cupaniear.
Vid. seq.

Stadmannia*) Lamarck 1793. Illustr. t. 312.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 477: g. Sapindacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1304. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 225; 1848. Pl. jav. rar. p. 292.
DC. 1824. Pr. I. p. 615: g. Sapindear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 317. n. 1616.
— Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 669.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 243. n. 1483: g. Octandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5206: g. Cupaniear.
Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38): subg. Cupaniae?
= Cupania Plum.? (Endl.)

Staebe Hill 1769. Hort. kew. p. 65: g. Associatar.
= Centaureae Linn. pars. (Lopholomae et Acrolophi Cass. sp.)

Staebe Juss. 1789. Gen. p. 180: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 396.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31.
= Stoebe Linn.

Stähelina*) Linn. 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 390. n. 767; 1753. Sp. II. p. 840; 1759. Syst. ed. X. p. 1205. n. 844; 1763. Sp. ed. II. p. 1176; 1764. Gen. ed. VI. p. 415. n. 938; 1767. Syst. ed. XII. p. 538: g. Syngenes. Polygam. Aequal. (ab auctoribus varie modificatum.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 614; 1784. Syst. p. 738. — Reich. 1778. Gen. p. 413. n. 1018. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 546. n. 1274. — Gmel. 1791. Syst. p. 1202. — Pers. 1797. Syst. p. 778; 1807. Ench. II. p. 391. n. 1804. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1783. n. 1460; 1809. En. p. 856.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 247. n. 1022: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cinarocephalar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 175. (verar.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 387.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Pracl. p. 539.
Scop. 1777. Intr. p. 126: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 74. n. 131: g. Siphoniphytor. Excluditur Roccardia.
Batsch 1802. Tab. p. 251: g. Capitatar.
DC. 1805. Franç. IV. p. 106: g. Cynarocephalar.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 110: g. Carlinear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 537; 1826. Syst. III. p. 391. n. 2654: g. Cynarear.
Link 1822. En. II. p. 304; 1829. Hdb. I. p. 703: g. Acarnacear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 610. n. 3012: g. Eupatorinar.
= Stähelina DC., Helichrysi sp., etc.

Stähelina Hall. Helvet. p. 312 citantibus Nonnullis. *Cf. Stähelinia Hall.*
= Bartsia Linn.

Stähelina DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 156. 192: g. restrictum Carduacear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 290.
Cass. 1827. Dict. v. 50. p. 438: g. Stäheli-

*) Dicat. Stadmann, peregrinatori botanico.

*) Dicat. Bened. Stähelin, botanico helveto.

Stähelina DC. cont.
near. Subgen.: Stähelina, Barbellina, Hirtellina. — Par. Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 328.
Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2301; 1841. Nom. p. 94. n. 3666: g. Carlinear. Sect. (1841) ut Cass. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Bartl. 1830. Ord. p. 145. — Koch 1837. Syn. p. 406. Ed. II. p. 465. — DC. 1837. Pr. VI. p. 543. Sect. ut Cass. — Endl. 1838. Gen. n. 2858. p. 469; 1841. Ench. p. 246. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 225 (139). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 273.
Less. 1832. Syn. p. 5: g. Serratulear.
D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 799: g. Cynarear.
Synon. Stähelinae sp. Linn. 1764.

Stähelina Cassini 1827. Dict. v. 47. p. 500. 512; 1830. v. 60. p. 570: g. Stähelinear., disjunctis Hirtellina et Barbellina restrict. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10.
Cass. 1827. Dict. v. 50. p. 438: subg. Stähelinae.
DC. 1837. Pr. VI. p. 544: sect. Stähelinae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2858 *a*. p. 469; 1841. Ench. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3666. 1.

Stähelineae Cassini 1827. Dict. v. 47. p. 499: div. Carlinear. Gen.: Gochnatia, Stiftia, Hirtellina, Barbellina, Stähelina, Saussurea, Theodorea. — Par. Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 570. Accedunt Arction, Lagurostemon, Proustia, Plazia?, Flotovia? — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9. Gen.: Proustia, Harmodia, Calopappus, Hyalis, Cyclolepis, Leucomeris, Gochnatia, Hedraiophyllum, Pentaphorus, Plazia?, Flotovia?, Stiftia, Anastraphia, Hirtellina, Barbellina, Stähelina, Stechmannia, Arctium, Dolomiaea, Aplotaxis, Saussurea, Lagurostemon, Theodorea.
Schultz 1846. Linnaea XIX. 3. p. 328: subdiv. Serratulear. Gen.: Stähelina. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 429.

Stähelinia Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 624: g. Dymeizonum.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 294: g. Angiospermar.
= Bartsia Linn.

Staëlia*) Chamisso & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 364: nov. g. Spermacocear. (St. thymoides.) — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 151. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2778. (genuinar.) — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 799.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2000: g. Coffeacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 573: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 631. — Endl. 1838. Gen. n. 3129. p. 529; 1841. Ench. p 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119).

*) Dicat. baroni Aug. de Staël-Holstein.

Staëlia Chamisso & Schltd. cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 801. n. 4149: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 481.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Stagmaria*) „Jack Malay. Misc. I. p. 12“ G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 76: g. Sumachinear.
Jack 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 267: g. Pentandr. Trigyn.
Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55): g. Spondiacear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5912. p. 1132; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 799.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5685: g. Anacardiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 555.

Stalagmites Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 784: g. Mesuëar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: g. Calophyllear.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5491; 1841. Nom. p. 212. n. 8044: g. Mangostanear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 425. n. 2109: g. Guttiferar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Cambogiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5444. p. 1027; 1841. Ench. p. 534: g. Garciniear. — Par. Wight 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 194.
= Stalagmitis Murr.

Stalagmitis**) Murray 1789. Comm. Götting. IX. p. 173: g. Polygam. Monoec. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 729. n. 1585. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 980. n. 1888.
Gmel. 1791. Syst. p. 810: g. Polyandr. Monogyn.
Pers. 1807. Ench. II. p. 68. n. 1278: g. Guttiferar. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104. — Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 425.
DC. 1824. Pr. I. p. 562: g. Calophyllear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 294.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 620: g. Garciniear. Sect.: Xanthochymus, Brindonia. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 326. — Meisn. 1837. Gen. p. 43 (32). Sect.: Stalagmitis, Brindonia, Xanthochymus, Oxycarpus.
Synon. Stalagmites Spreng.; Xanthochymus Roxb.

Stalea Walp. Repert. II. p. 611: sphalm. pro *Halea*.

Staminacia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: class. I. Vegetabilium. Subclass.: Corticalia, Decorticalia.

Stamineae Hill 1769. Hort. kew. p. 410: class. XXXVI. herbar. Typus: Zanichellia.

Stammarium „Willd. herb.“ DC. 1836. Prodr. V. p. 102: sect. Lorenteae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2251 *b*. p. 365; 1841. Ench. p. 233.
Synon. Lorentea Less.

Stangeria***) Moore 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 228: nov. g. Cycadear. (An Filicum zamioidear.?) — Par. J. Smith 1854. Kew gard. misc. VI. p. 88 (abnorme).

*) σταγμα, gutta.
**) στάλαγμα, gutta.
***) Dicat. Dr. Stanger, introductori.

Stanhopea*) Hook. 1829. Bot. Mag. t. 2948. 2949: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 666. n. 3359.

Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1529; 1833. Orchid. p. 157: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1421. p. 198; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2027. — Meisn. 1842. Gen. p. 376(282). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Lindl. 1852. Fol. Orchid. 1 Oct. Revisio generis.

Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 110. 111: g. Catasetear.

Synon. Ceratochilus Lindl.

Stanhopeastrum Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 927: nov. g. Vandear. (Stanhopea ecornuta Ch. Lem.)

Stanleia Spreng. vid. *Stanleya Nutt.*

Stanleya**) Nuttall 1818. Gen. amer. II. p. 71: nov. g. Tetradynam. Siliquos. (Cleome pinnata Pursh.)

DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 239; 1821. Syst. II. p. 511; 1824. Pr. I. p. 200: g. Sisymbrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4804. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 214. — Meisn. 1837. Gen. p. 13(12). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 98.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 909. n. 2323; 1831. Gen. II. p. 523. n. 2574 (*Stanleia*): g. Siliquosar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 717.

Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 386: g. Cruciferar.

Rchb. 1837. Hdb. p. 260: g. Erysimear.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 297: g. Cleomear.

Endl. 1839. Gen. n. 4916. p. 876; 1841. Ench. p. 450: g. Sisymbriear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 173.

Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7031: g. Stanleyear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.

Synon. Podolobus Rafin.

Stanleyeae Nuttall 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 83 (?): fam. inter Cruciferas et Capparideas media. Gen.: Stanleya, Warea. (Spach Vég. phan. VI. p. 297.)

Rchb. 1841. Nom. p. 182: subsect. Erysimear. Gen.: Warea, Stanleya.

Stannia Karsten 1848. Gew. Venez. II. II. p...; 1858. Fl. Colum. I. p. 31. t. 16: nov. g. Gardeniear. *Cf.* Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 441.

Stapelia***) Linn. 1737. Gen. p. 64. n. 183; 1737. Cliff. p. 77; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 53; 1753. Sp. I. p. 217; 1759. Syst. ed. X. p. 947. n. 241; 1762. Sp. ed. II. p. 316; 1764. Gen. ed. VI. p. 121. n. 307; 1767. Syst. ed. XII. p. 194. n. 304: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 215; 1784. Syst. p. 260. — Reich. 1778. Gen. p. 125. n. 334. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 169. n. 432. — Lour. 1790. Coch. I. p. 165. — Gmel. 1791. Syst. p. 447. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 28. t. 30; 1819. III. p. 36. t. 241. — Pers. 1797. Syst. p. 273. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1277. n. 494; 1809. En. p. 279. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 165.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 199. n. 824: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Contortor.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Apocinor.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 201.

Hill 1769. Ht. kew. p. 151: g. Monopetalar.

Juss. 1789. Gen. p. 146: g. Apocinear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 427. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 331. — Hedw. 1806. Gen. p. 132. n. 574.

Neck. 1790. El. I. p. 252. n. 402: g. Campylophytor.

Masson 1796. Stapeliae novae. (Lond.)

Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 314: g. Stigmatostemonis.

Pers. 1805. Ench. I. p. 277. n. 628: g. Apocynear.

Jacq. 1806. Stapeliae cult. (Vindob.) = Stapelia, Huernia, Piaranthus et Caralluma R. Brown.

Stapelia R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 23 (Verm. bot. Schr. II. p. 360): g. restrict. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 488; 1825. Syst. I. p. 837. n. 967; 1830. Gen. I. p. 208. n. 1062. Sect.: Duvalia, Orbea, Tromotriche, Podanthes, Obesia, Gonostemma, Caruncularia, Piaranthus. — Schult. 1820. Syst. VI. p. VII. 10. Sect.: genuinae, Gonostemones, Podanthae, Tridentae, Tromotrichae, Orbeae, Obesiae, Duvaliae, Carunculariae. — Link 1821. En. I. p. 253. Sect.: Stapelia, Gonostemon, Caruncularia, Huernia, Podanthes, Tromotriche, Orbea, Obesia, Duvallia, Piaranthus. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 884. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 801.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: g. Apocinear.

Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 388: g. Apocynear.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: g. Stapeliacear.

Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411; 1841. Nom. p. 129. n. 5018: g. Stapeliear. Sect.: Hewenia, Caruncularia, Duvallia, Obesia, Orbea, Tromotriche, Tridentea, Podanthe, Gonostemon, Stapelia. (1841 fere eaed.)

Endl. 1838. Gen. n. 3524. p. 598; 1841. Ench. p. 300: g. Ceropegiear. Sect.: Stapeltonia, Gonostemon, Podanthes, Tridentea, Tromotriche, Caruncularia, Orbea, Obesia, Duvalia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 271(178).

*) Dicat. Phil. Henr. comiti de Stanhope.

**) Dicat. Lord Stanley.

***) Dicat. Joh. Bodaeo a Stapel, laboriosissimo commentatori in Theophrasti opera: Linn. (Hort. Cliff. p. 77.)

Stapelia R. Brown cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 559: g. Pergulariear. Subgen. ex Endl. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 43.
Dcne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 652: g. Ceropegiar. Sect. ut Endl. (Stapletonia loco Stapeltoniae) et Pectinaria. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 495.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Synon. Crassa Rupp.; Pectinaria Haw.?
Stapelia Haworth 1812. Syn. succ. p. 14 (Ed. Schrank 1819. p. 14); 1819. Suppl. p. 8: g. Pentandr. Digyn., sejunctis multis arctius definitum.
Schult. 1820. Syst. VI. p. 10: sect. Stapeliae. — Par. Link 1821. En. I. p. 253. — Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *k*; 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 9.
Link 1829. Hdb. I. p. 433: g. Asclepiadear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Stapeliear. — Par G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 114.
= Stapletonia Decne.
Stapeliaceae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XL: div. Asclepiadear. Gen.: Stapelia, Heurnia, Brachystelma, Coralluma, Ceropegia.
Stapeliae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 606: trib. Asclepiadear. Divis.: Pergulariae, Gymnemae, Ceropegiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: trib. Asclepiadacear. Gen. Stapeliar. Decne et Anisotoma, Apoxyanthera.
= Stapelieae Endl.
Stapelieae Rchb. 1828. Consp. p. 130; 1837. Hdb. p. 208: subdiv. Asclepiear. Gen.: Ceropegia, Huernia, Piaranthus; Stapelia, Desmidochus, Caralluma, Microstemma, Leptadenia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: trib. Asclepiadear. Gen.: Ceropegia, Huernia, Prianthus, Stapelia, Duvalia, Pectinaria, Orbea, Tridentea, Tromotriche, Podanthes, Obesia, Caruncularia, Brachistelma, Caralluma.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 109: subtrib. Orthophuramiar. Gen.: Ceropegia, Huernia, Piaranthus; Stapelia, Gonostemon, Podanthes, Tridentea, Tromotriche, Orbea, Obesia, Duvalia, Caruncularia, Pectinaria, Caralluma, Boucerosia, Hutchinia, Eriopetalum, Microstemma, Leptadenia, Orthanthera, Brachystelma, Fischeria.
Endl. 1838. Gen. p. 597; 1841. Ench. p. 299: subtrib. Pergulariear. Sect.: Leptadenieae, Ceropegieae. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 271(177). Divis. eaed.
Rchb. 1841. Nom. p. 129: sect. Pergulariear. Subsect.: *genuinae* (gen.: Stapelia, Desmidorchis?, Apteranthes, Piaranthus, Heurnia), Ceropegieae, Leptadenieae.
Stapeltonia Endl. 1838. Gen. n. 3524 *a*. p. 598; 1841. Ench. p. 300: sect. Stapeliae.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 560: subg. Stapeliae.
Synon. Stapelia Haw.; Stapletonia Decne.
Staphidiastrum Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 325: nov. g. Clidemiear. (Clidemia latifolia DC. etc.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 751.
Synon. Sagraeae sp. DC.
Staphidium Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 305: nov. g. Clidemiear. (Clidemii et Heterotrichi sp. DC. et Stephanotrichum Naud.) Sect.: Stephanotrichum, Eustaphidium. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 745.
Staphilaea Allion. vid. *Staphylea Linn.*
Staphilea Necker vid. *praeced.*
Staphisagria*) „C. & J. Bauh." Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. catal. p. 582.
DC. 1824. Pr. I. p. 56: sect. Delphinii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4949 *c*; 1841. Nom. p. 191. n. 7243. 4. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 54. — Endl. 1841. Ench. p. 435. n. 4796 *d*.
Synon. Staphysagria DC. 1818.
Staphylaceae Rchb. 1828. Consp. p. 200: subdiv. Sapindear. Gen.: Staphylea, Turpinia.
= Staphyleaceae DC.
Staphylaea**) Linn. 1737. Gen. p. 87. n. 248; 1737. Cliff. p. 112; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 128. n. 296; 1748. Ups. p. 269; 1764. Gen. ed. VI. p. 148. n. 374: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 198. n. 507.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 37. n. 143: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 38: g. Trihilatar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 304: g. Zizyphor.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 619: g. Celastrinar.
= Staphylea Linn.
Staphylaeeae Rchb. 1837. Handb. p. 285: subdiv. Zygophyllear. Gen.: Staphylea, Turpinia.
= Staphyleaceae DC.
Staphylea***) Linn. 1753. Sp. I. p. 270; 1759. Syst. ed. X. p. 965. n. 336; 1762. Sp. ed. II. p. 386; 1767. Syst. ed. XII. p. 219. n. 371: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 244; 1784. Syst. p. 296. — Reich. 1778. Gen. p. 151. n. 404. — Gmel. 1791. Syst. p. 498. — Pers. 1797. Syst. p. 314; 1805. Ench. I. p. 328. n. 731. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1497. n. 571; 1809. En. p. 329. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 204. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 25. 448.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rhamnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 377. — Batsch 1802. Tab. p. 70.
Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 68 (*Staphilaea*): g. Pentastemonum tristylar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Trihilatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 357.
Scop. 1777. Intr. p. 253 (*Staphyllaea*): g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 334. t. 69. f. 1 (pinnata).
Neck. 1790. El. II. p. 300. n. 1074 (*Staphilea*): g. Synathrophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 462: g. Rhamnoidear. — Par. Link 1821. En. I. p. 289.
Cram. 1803. Disp. p. 62: in Pentandr. Digyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 265: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 207. n. 852. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 663; 1825. Syst. I. p. 944. n. 1124; 1830. Gen.

*) σταφίς, uva sicca.
**) σταφυλή, vitis, uva.
***) Nomen contractum ex Staphylodendron.

Staphylea Linn. cont.
I. p. 230. n. 1211. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 396. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1002.
DC. 1805. Franç. IV. p. 619: g. Frangulacear.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIII. 667: g. Rhamnacear.
DC. 1825. Pr. II. p. 2: g. Staphyleacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 382. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 2. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 394. — Koch 1836. Syn. p. 146. Ed. II. p. 160. — Lindl. 1836. Nat. syst. p. 121; 1847. Veg. kd. p. 381. — Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 256. — Endl. 1840. Gen. n. 5673. p. 1085; 1841. Ench. p. 573. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 496. — Walp. 1842. Rep. I. p. 529. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 153. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 803. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 332.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5203: g. Staphylacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 116: g. Celastrinar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 769: g. Staphyleariar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. n. 7560: g. Staphyleear.
Synon. Staphylodendron Tourn.; Staphylodendrum Mönch; Staphylaea Linn.; Bumalda Thunb.

Staphyleaceae DC. 1825. Prodr. II. p. 2: trib. Celastrinear. Gen.: Staphylea, Turpinia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. Gen. ead. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 1. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48). Gen. ead.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (97) Calyciflorar. syncarpar.
Bartl. 1830. Ord. p. 381: ordo (225) Tricoccar. Gen. ead.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo ad Celastrinas accedens.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 393: fam. (22) Tricoccar. Gen. ead.
Mart. 1835. Consp. p. . . . : fam. Malpighinar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 121; 1847. Veg. kd. p. 381: ordo Sapindalium. Gen. ut Endl.
Endl. 1840. Gen. p. 1084; 1841. Ench. p. 573: ordo Frangulacear. Gen. ut DC. et Euscaphis.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 88: fam. Celastroidear. Gen.: Staphylea.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 802: fam. Dicotyledonear. Gen. ut Endl.
Synon. Staphylaceae, Staphyleariae, Staphylaeeae, Staphyleeae Rchb.

Staphyleariae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 769: subdiv. Sapindear. Gen.: Staphylea.

Staphyleeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 198: subdiv. Zygophyllear. Gen.: Staphylea, Euscaphis, Turpinia.

Staphylinus „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 265. Ed. Hall. 1745. p. 278: g. pl. class. XII.
= Daucus Linn.

Staphylium Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Caucalidear., inter Torilidem et Turgeniam collocatum. (Nomen.) An = praeced.?

Staphyllaea Scopoli vid. *Staphylea Linn.*

Staphyllodendron Scopoli vid. *Staphylodendron Tourn.*

Staphylodendron Herm. 1698. Parad. 232 c. ic.
= Royena Linn.

Staphylodendron Tourn. 1700. Inst. p. 616. t. 386: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 110. Ed. Hall. 1745. p. 123: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 423: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Scop. 1772. Carn. I. p. 223 (*Staphyllodendron*): g. Pentandr. Trigyn.
Mönch 1794. Meth. p. 64 (*Staphylodendrum*): g. Thalamostemonis.
= Staphylea Linn.

Staphylodendrum Mönch vid. *praeced.*

Staphylopteris Presl 1838 in Sternb. Vers. II. p. 172: g. Filicitum dubium. (Filicites polybotrya Brongn.) *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 804; 1849. ibid. XIII. p. 83.

Staphysagria „Bauh." DC. 1818. Syst. I. p. 362: sect. Delphinii. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 26. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 736. — Koch 1836. Syn. p. 23. Ed. II. p. 25. — Endl. 1839. Gen. n. 4796 *d.* p. 849; 1850. Spl. V. p. 30.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 347: g. Aconitinear.
= Staphisagria Bauh., Herm.

Stapletonia Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 652: sect. Stapeliac.
= Stapeltonia Endl.

Starbia Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 23 in Römer Collect. bot. p. 200: nov. g. Pedicularium, Rhinantho aff. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 403.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3082: g. Pedicularinar.
= Glossostylis Cham. & Schltd.?

Starckia „Willd." Juss. 1827. Dict. v. 50. p. 453: vid. *Starkea Willd.*

Starkea Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 2216. n. 1524: g. Syngenes. Superfl. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 470. n. 1892. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 169.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 561: g. Radiatar.
DC. 1836. Pr. V. p. 97: sect. Liabi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2245 *b.* p. 364; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3223. 2.
Synon. Andromachia Cass.; Starckia Juss.

Stathiphyllum A. Rich. vid. *Spathiphyllum Schott.*

Staticaceae Trautv. 1856. Bull. Ac. Pet. XIV. p. 250. (Gen.: Goniolimon, Statice.)

Statice*) Tourn. 1700. Inst. p. 341. t. 177: g. pl. class. VIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 85. Ed. Hall. 1745. p. 96: g. pl. class. V.
Adans. 1763. Fam. II. p. 283: g. Thymelaear.
Hill 1769. Ht. kew. p. 77: g. Aggregatar.
Neck. 1790. El. I. p. 114. n. 200: g. Psydomorphytor. Distinguitur Taxanthema.
Mönch 1794. Meth. p. 623: g. Petalostemonis. Separantur Limonium et Limoniastrum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 296: g. Staticinar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: g. Armeriacear.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 26. 453: g. Pentandr. Pentagyn.
= Armeria Willd.

Statice Linn. 1737. Gen. p. 88. n. 252; 1737. Cliff. p. 115; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 71; 1753. Sp. I. p. 274; 1759. Syst. ed. X. p. 967. n. 348; 1762. Sp. ed. II. p. 394; 1764. Gen. ed. VI. p. 153. n. 388; 1767. Syst. ed. XII. p. 222. n. 384: g. Pentandr. Pentagyn. ampliat. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 226. — Murr. 1774. Syst. p. 248; 1784. Syst. p. 300. — Reich. 1778. Gen. p. 155. n. 418. — Roth 1788. Germ. I. p. 140; 1789. II. p. 374. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 205. n. 527. — Gmel. 1791. Syst. p. 510. — Pers. 1797. Syst. p. 319; 1805. Ench. I. p. 332. n. 748. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1522. n. 589. — Thunb. 1818. Fl. cap. p. 241. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 205. Subgen.: Armeria, Limonium.
Gmel. 1747. Sibir. II. p. 216: g. Aggregatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 528. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 191.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 190. n. 792: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jalapar.
Scop. 1777. Intr. p. 205: g. Pseudocompositar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 210. t. 44. f. 10 (Limonium).
Juss. 1789. Gen. p. 92: g. Plumbaginum.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 278: g. Plumbaginear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 217. — DC. 1805. Franç. III. p. 419; 1815. V. p. 379. Sect.: Armeria, Limonium. — Hedw. 1806. Gen. p. 214. n. 880. Sect. eaed. — Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 36. 489. — Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 404. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 432. — Koch 1837. Syn. p. 594. Ed. II. p. 682. Sect. ut DC. — Webb .... Canar. III. p. 176.
Batsch 1802. Tab. p. 224: g. Jalapinar.
Ledeb. 1849. Ross. III. p. 456: g. Staticear. Sect. ut DC.
= Statice Willd., Armeria Willd. et Limoniastrum Mönch.

*) Nomen ex Plinio.

Statice Willd. 1809. Enum. p. 335: g. Pentandr. Pentagyn., disjuncta Armeria a Linnaeano discrepans.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 382; 1825. Syst. I. p. 957. n. 1146; 1830. Gen. I. p. 236. n. 1247: g. Plumbaginear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIX. 777. — Link 1821. En. I. p. 295. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1020. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 70. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 296. Sect.: Limonium, Tropidice, Armeriastrum. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 804. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 738. Sect.: Pterocládos, Limonium, Globulariastrum, Schizhymenium, Myriolepis.
Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1924: g. Staticear. Sect.: Statice, Taxanthema. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 127. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 190; 1837. Hdb. p. 203; 1841. Nom. p. 123. n. 4783. — Endl. 1838. Gen. n. 2172. p. 349; 1841. Ench. p. 224. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 344. Subgen.: Limonium, Pterocladus. — Meisn. 1840. Gen. p. 315 (226). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 641. — Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 634. Sect.: Pterocládos, Ctenostachys, Plathymenium, Limonium, Sphaerostachys, Jovibarba, Schizhymenium, Circinaria, Polyarthrion, Myriolepis, Siphonantha, Psylliostachys. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 716. Sect.: Phyllocaulon, Tropidice, Limonium. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 995.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Armeriacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 263: g. Staticinar.
Trautv. 1856. Bull. Ac. Pet. XIV. p. 252: g. Staticacear.
Synon. Limonium Tourn.; Taxanthema Neck.; Taxanthemum Poir.; Eurychiton Nimmo.

Staticeae Rchb. 1828. Consp. p. 91; 1831. Fl. exc. p. 189; 1841. Nom. p. 122: div. Plumbaginear. Gen.: Armeria, Statice, Aegialitis. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 127. Gen. ead. — Rchb. 1837. Hdb. p. 203. Gen. ead. exclusa Armeria.
Endl. 1838. Gen. p. 348; 1841. Ench. p. 224: trib. Plumbaginear. Gen. ead. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 340. Gen. ead. et Limoniastrum. — Meisn. 1840. Gen. p. 315 (226). Gen. ut Rchb. 1828. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 289. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 641: trib. Plumbaginacear. Gen.: Armeria, Statice, Armeriastrum, Aegialitis. — Par. Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 621. Gen.: Aegialitis, Acantholimon, Goniolimon; Statice, Armeria, Limoniastrum.

Staticinae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 291. 295: fam. Corolliflorar. Gen.: Statice, Limonium.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Subaggregatar.
Link 1831. Hdb. II. p. 262: ordo 10 Anastemonum. Gen.: Armeria, Statice.
= Staticeae Rchb.

Staticopsis Boissier 1846. Diagn. pl. or. nov. I. Nr. 7. p. 71; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 624: sect. Acantholimonis.

Statomarathrum Rchb. 1841. Nomencl. p. 140. n. 5422. 2: sect. Seselios.
= Hippomarathroides DC.

Statuminatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: ordo 62 plant. Gen.: Ulmus, Celtis, Bosea.

Stauntonia*) DC. 1818. Syst. I. p. 513: nov. g. Menispermear. (verar.) — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 408.
DC. 1824. Pr. I. p. 96: g. Lardizabalear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1866; 1841. Nom. p. 70. n. 2633. — Bartl. 1830. Ord. p. 243. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 104. — Sieb. & Zucc. 1835. Fl. japon. p. 138. t. 76. — Decne 1839. Arch. Mus. I. p. 191. t. 11. f. C; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 104. — Spach 1839. Vég. phan. I. p. 7. — Endl. 1841. Spl. I. n. 4701. p. 1418; 1841. Ench. p. 417; 1842. Spl. II. p. 72.
Endl. 1839. Gen. p. 828. n. 4701 *a:* sect. Stauntoniae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 304: g. Lardizabalacear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 25: g. Holböllicar.

Stauntonia Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 5 (7): g. Lardizabalear., injuncta Holböllia dilatat. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 828. n. 4701. Sect.: Stauntonia, Holböllia.
D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 805: g. Menispermacear.
= Stauntonia DC. et Holböllia Wall.

Stauracanthus**) Link 1808 in Schrad. n. Journ. II. 2. p. 52: nov. g. Diadelph. Decandr. (St. aphyllus.) — Par. Willd. 1809. En. p. 746.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 747: g. Spartiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 144: g. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4032; 1841. Nom. p. 150. n. 5857. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 148. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6496. p. 1265; 1841. Ench. p. 668. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 466.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 226. n. 2532; 1831. Gen. II. p. 578. n. 2828: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 409.
Link 1831. Hdb. II. p. 148: g. Genistoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
Planch. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 210: ad Ulicem reducit.
Webb 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 285: g. Ulicinear.

Stauranthera Benth. 1835. Scroph. ind. p. 57.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 665: g. Loxotiear.

*) Dicat. Georgio Staunton, itineris Macartneyani socio.
**) σταυρός, palus, crux.

Stauranthera Benth. cont.
R. Brown 1838 in Horsf. pl. jav. rar. p. 120 (Flora 1842. p. 218): g. Cyrtandrear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 719. n. 4152 (dubium). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. (?) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 582.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 303 (212); 1845. Pr. IX. p. 278: g. Epithemear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 735. Sect.: Quintilia, Eustauranthera.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1408. n. $4143/_3$; 1841. Ench. p. 349. n. $4140/_1$: g. Didymocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4711: g. Henckeliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.

Stauranthus Liebm. 1853. Nov. gen. mex. dec. p. 91: nov. g. Ilicinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 428.

Staurastrum Meyen 1829. Nov. Act. Leop. XIV. 2. p. 777: nov. g. Algar. *Cf.* Flora Lit. I. p. 318 et Linnaea VI. Litt. p. 63.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 599: sect. Micrasteriadis.
Menegh. 1838. Cenni p. 34; 1840. Linnaea XIV. p. 224: g. Desmidiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 650. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phyc. gener. p. 163. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 56. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 806.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Eumicrasteriear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.
= Phycastrum Kütz.

Stauridium Corda (bicuspidatum et Crux melitensis.)
= Pediastrum Meyen. (Kütz. Spec. Alg. p. 193.)

Staurocarpus Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 177: g. Conjugatear.
= Staurospermum Kütz.

Stauroceras Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 133; 1849. Sp. Alg. p. 166. n. 122: nov. g. Desmidiear. (Closterium Acus Nitzsch.) — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 526.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.

Staurocystis Itzigs. . . . . . nov. g. Palmellear. *Cf.* Bot. Zeit. 1856. p. 46.

Staurogalion Tausch 1835. Flora I. p. 339: subsect. Eugalii. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 634 (*Staurogalium*).

Staurogenia Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 194. n. 147: g. Desmidicar.
Synon. Crucigenia Morren.

Staurogeton Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 764 *b;* 1830. Fl. exc. p. 10: sect. Lemnae. (L. trisulca L.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1668/_1$ *b.* p. 1369; 1841. Ench. p. 126.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1131: g. Lemnear.

Stauroglottis Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 432: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 61. n. $1493/_1$. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179.
Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: g. Brassidar.

Staurogramma Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Naviculacear.

Staurogyne Wallich 1831. Pl. As. rar. II. p. 80. t. 186: g. Acanthacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4103. p. 708; 1841. Ench. p. 344. (dubium.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680.
Meisn. 1840. Gen. p. 294(203): g. Ruelliear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4296: g. Andrographidear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 596: g. Echmatacanthor.
= Ebermaiera Nees.

Stauromatum Endl. vid. *Sauromatum Schott.*

Stauroneideae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: sect. Eunaviculear. Gen.: Navicula, Amphipleura, Ceratoneis, Stauroneis, Amphiprora, Amphora, Diadesmis, Sphenosira.

Stauroneis Ehrenb. 1843. Amer.
Kütz. (1844. Bacill.) 1845. Phyc. germ. p. 97; 1849. Sp. Alg. p. 89. n. 47: g. Naviculear. Sect.: Stauroneis, Stictoneis, Stauroptera. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 33. — Math. 1853. Belg. II. p. 536.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Stauroneidear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 807: g. Diatomear.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat: g. Naviculacear.

Staurophallus Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 273: nov. g. Phalloidear. (St. senegalensis.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 524; 1849. ibid. VIII. p. 488: g. Lysurear. (imperfecte cognitum.)
Corda 1854. Ic. Fung. VI. p. 21. t. 4. f. 1. 2: g. Lysuroidear.

Staurophora Willd. 1809. Berl. Mag. III. p. 101: nov. g. Hepaticar. (Marchantia cruciata L.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 70. — Agdh. 1822. Aphor. p. 104.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 683: g. Marchantiadear.
= Lunularia Mich.

Staurophragma Fisch. & Meyer 1843. Ind. IX. sem. h. Petr.; 1844. Linnaea XVIII. p. 199: nov. g. Verbasco aff. (St. natolicum.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 78. n. $3879/_1$: g. Verbascear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 447. 958. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 248; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684.

Stauroptera Ehrenb. 1843. Amer. p. 134.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 91: sect. Stauroneidis.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Naviculacear.

Stauropteris Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 86: sect. Tetrapteridis.

Staurospermum „Thonning" Schumacher 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 93: nov. g. plant. (St. verticillatum.)
= Mitracarpum Zuccar.

Staurospermum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 278: nov. g. Zygnemear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 15. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 120. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 808.

Staurospermum Kütz. cont.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 225; 1849. Sp. Alg. p. 436. n. 274: g. Zygnemacear.
= Agardhia Gray.

Staurostigma Scheidweiler 1848 in Otto's Gartenz. Nr. 17. p. 129: nov. g. Aroidear. (St. odorum.) *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 141.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 499: g. Anaporear.
= Asterostigma Fisch. & Mey.? (Schott 1856.)

Stavia Thunb. 1792. Nov. pl. gen. VII. p. 108; 1794. Prodr. I. p. 41; 1818. Fl. cap. II. p. 95: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1797. Syst. p. 251 not. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 781. n. 861.
= Staavia Dahl.

Steatopia Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 56: g. Pyror. (*Schmalzbirne.*)

Steccherinum „Mich." Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 651 (p. 597 *Stecherina*): g. Hydnidear. (Hydnum ochraceum, gelatinosum et erinaceus Pers.)

Stecherina Gray vid. *praeced.*

Stechmannia*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 543: nov. g. Carlinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2857. p. 469; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 283.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10: g. Stähelinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3658: g. Atractylidear.

Steegia Steud. vid. *Stegia DC.*

Steenhammaria Lindl. vid. *seq.*

Steenhammera**) Rchb. 1831. Fl. exc. p. 337; 1841. Nom. p. 111. n. 4320: g. Echiear. (Pulmonaria maritima L.) *Cf. Stenhammaria Lilja.*
Endl. 1839. Gen. n. 3760. p. 647; 1841. Ench. p. 320: g. Anchusear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 56.
Turczan. 1840. Bull. Mosc. p. 241: g. Borraginear. emend. (Flora 1842. II. Lit. p. 44.)
Meisn. 1840. Gen. p. 280 (190): g. Lithospermear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 42: g. Asperifoliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656 (*Steenhammaria*): g. Anchusidar.
= Pneumaria Hill.

Steerbeckia Dumort. vid. *seq.*

Steerebeckia Brongn. vid. *Sterrebekia Link.*

Steetzia***) Lehm. 1846. Pl. Preiss. II. p. 129: g. Diplomitriear. — Par. Nees 1847. Syn. Hepat. p. 785.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 165: g. Hepaticar. frondosar.
= Pallavicinius Gray.

Steetzia Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 450: nov. g. Eutussilaginear., inter Celmisiam et Alciopen medium. (St. pannosa.)

Steffensia†) Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 269; 1841. Gatt. foss. Pfl. I. p. 59: g. Sphenopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 72; 1846. Chlor. prot. p. XLII.

---

*) Dicat. J.P. Stechmann, de Artemisiis scriptori.
**) Dicat. C. Steenhammer, Holmiensi.
***) Dicat. Dr. Joach. Steetz, Hamburg. (Nomen mutatum ob *Blyttiam Fries.*)
†) Dicat. Henr. Steffens, prof. tandem Berolin.

Steffensia Sternb. 1838. Vers. II. p. 121: g. Polypodiacitum. Sect.: Notopteris, Acropteris. = Polypodites Göpp. (sp.)

Steffensia Kunth 1839. Linnaea XIII. p. 609: nov. g. Piperacear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1820 *f.* p. 1374; 1841. Ench. p. 149: sect. Piperis.
Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2567: g. Piperear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335(248).
= Artanthe Miq.

Stegania*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 152. Ed. Nees p. 8: nov. g. Polypodiacear. (Onoclea nuda Labill., Blechnum procerum Sw., etc.) — Par. Endl. 1833. Norf. p. 11.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 16: g. Blechnidear.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 86: g. Filicum.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 74: g. Aspleniacear.
= Lomaria Willd.

Steganosporium Rchb. vid. *Stegonosporium Corda.*

Steganotaenia**) Hochstett. 1844. Flora I. Beil. p. 4: nov. g. Peucedanear.
= Euferulago Fenzl?

Steganotropis Lehm. 1826. Sem. h. bot. Hamb.; 1827. Flora I. p. 96 (Linnaea 1828. Litt. p. 11); 1829. Nov. Act. Leop. XIV. 2. p. 820: nov. g. Leguminosar.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 b. n. 3931 b: g. Phaseolear.? *Cf.* Meisn. 1837. Gen. p. 94(67).
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 219: g. Clitoriar.
Meisn. 1838. Gen. p. 86(62): g. Clitoricar.?
= Centrosema DC.

Stegasma***) Corda 1842. Icon. V. p. 20. 58. t. 3. f. 34; 1842. Mycol. p. 82: nov. g. Physareor. (Perichaena depressa Lib.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 272. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 458: sect. Perichaenae.

Stegia DC. 1805. Franç. IV. p. 835: g. Malvacear. (Lavatera trimestris L.) Non Mönch Meth. p. 609, ut citant nonnulli. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 634 (*Steegia*).
DC. 1824. Pr. I. p. 438: sect. Lavaterae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5258 *a*; 1832. Fl. exc. p. 773; 1841. Nom. p. 200. n. 7621. 1. — Endl. 1840. Gen. n. 5269 *c*. p. 980; 1841. Ench. p. 511.

Stegia Fries 1818. Obs. myc. II. p. 351: nov. g. Sphaerioideor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 435. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 406. n. 3452; 1831. Gen. II. p. 760. n. 3873.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Sclerotior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Sphaeriaccar.

Stegia Fries cont.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 318: g. Sphaeriaceor., serius (ibid. p. 532) *Eustegia.*
Fries 1825. Pl. homon. p. 113: g. Patellareor.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Gastromycetum div. 2.
A. Lib. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 122: g. Phacidiaceor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 370.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Mycol. p. 142: g. Stegiacear.
= Stegilla Rchb.

Stegiaceae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Anl. Mycol. p. 142: sect. Hysteriacear. Gen.: Stegia.

Stegilla Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 264: g. Patellarior.
Endl. 1836. Gen. n. 382. p. 33; 1841. Ench. p. 19: g. Tympanideor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 285.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 163: g. Stegillaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Stegilleor.
Bail 1858. Syst. p. 58. t. 18: g. Phacidiaceor.
Synon. Stegia, Eustega et Eustegia Fries; Sphaerothyrium Wallr.

Stegillacei Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 163: subsect. Phacidiaceor. Gen.: Stegilla.

Stegillei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: trib. Endothecor. Gen.: Stegilla, Schizoderma.

Stegionepeta Benth. 1834. Labiat. p. 474: sect. Nepetae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 805. — Endl. 1838. Gen. n. 3636 c. p. 622; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4084. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 779.
= Pycnonepetae Benth. pars.

Stegnocarpus DC. 1845. Prodr. IX. p. 559: sect. Coldeniae.

Stegnogramma*) Blume 1830. Enum. pl. Jav. II. p. 172: nov. g. Polypodiacear. (St. aspidioides.)
Presl 1836. Pterid. p. 209 (*Stegnogramme*): g. Grammitidear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 439(331). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693 (*Stenogramma*).
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 136: g. Grammariar.
Endl. 1841. Spl. I. n. 609/1. p. 1346; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 994 (*Stegnogramme*). — J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 53.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 204 (*Stegnogramme*): g. Asplenicar.
Synon. Mesochlaena R. Brown; Sphaerostephanos Smith; Sphaerostephanus Endl.

Stegnogramme Presl, Rchb., Fée vid. *praeced.*

Stegnosperma Benth. 1844. Voy. Sulph. Bot. p. 17. t. 12.

---

*) στεγάνη, tectura.
**) στεγανός, tectum; ταινία, vitta.
***) στέγασμα, operculum, tegumentum.

*) στεγνός, tectus; γραμμή, linea.

Stegnosperma Benth. cont.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. I. p. 631: g. Stegnospermear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 35.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 509: g. Phytolaccacear. — Par. D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 810.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 571: g. Phytolaccear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 58. n. 5263/₁: g. Giesekiear. dubium.

Stegnospermeae A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. I. p. 631: trib. Phytolaccear. Gen.: Stegnosperma.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 35: trib. Gyromeriear. Gen. id.

Stegobolus Montagne 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 4: nov. g. Lichenum, Thelotremati aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XI. p. 810: g. Endocarpear.

Stegocarpi C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 37: class. 3 Muscor. frondosor. Subclass.: Acrocarpi, Pleurocarpi.

Stegocarpi Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 86: subdiv. Acrocarpor. Sect.: Funarioideae, Desmatodonteae, Leucobryaceae, Dicranoideae, Grimmiaceae, Encalypteae, Orthotrichoideae, Bartramioideae, Meesiaceae, Bryoideae, Mnioideae, Polytrichaceae, Buxbaumiaceae.

Stegonosporium Corda („1826 in Opiz Beitr.") 1839. Icon. Fung. III. p. 22. t. 4. f. 61.62: nov. g. Pyrenomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 55 (*Steganosporium*): g. Stilbosporeor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 33; 1842. Mycol. p. 139: g. Melanconiacear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 738.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconieor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Bonord. 1851. Hdb. p. 60: g. Naemasporeor.

Stegonotus Cassini 1825. Dict. v. 35. p. 396: nov. g. Arctotidear. (Arctotis undulata Gärtn.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. (verar.)
= Arctotis Gärtn.

Stegosia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 51. Ed. Willd. p. 65: nov. g. Triandr. Digyn. (St. cochinchinensis.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 75: g. Graminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 40. 363.
Agdh. 1823. Aphor. p. 151: g. Hordeacear.
Endl. 1837. Gen. n. 927 *b*. p. 105; 1841. Ench. p. 60: sect. Rottböllae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1365. 2.
Synon. Cymbachne Retz.?

Stegozoon Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 329: sect. Sempervivi. (S. tectorum.)

Steinchisma (?) Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I ex Linnaea VIII. Litt. p. 84: nov. g. Graminear. (Panicum divaricatum, hians.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 635 (*Steinschisma*).

*) *στέγος*, tectum: ab usu plantae apud indigenas.

Steineria*) Klotzsch 1855. Begon. p. 184: nov. g. Begoniacear.

Steinhauera**) „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 202. t. 49. 57: nov. g. Coniferitum.
Endl. 1842. Spl. II. p. 25. n. 1796/₅: g. Cupressinar. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 194; 1846. Chlor. prot. p. LXXIII: g. Cupressinear.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 302; 1847. Gen. Spl. IV. p. 13. n. 1816/₂₆: g. Abietinear. foss.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 120 species ad genera Morindae et Artocarpeis affinia refert.

Steinheilia***) Decaisne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 339. t. 12: nov. g. Asclepiadear. (Asclepias radians Forsk.) — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626 (verar. — *Steinheillia*).
Meisn. 1840. Gen. p. 267(174): g. Metastelmear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3454/₁. p. 1397; 1841. Ench. p. 298. — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5007.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 510: g. Micrmicrelomar.

Steinheillia Lindl. vid. *praeced.*

Steinschisma Steud. vid. *Steinchisma (?) Rafin.*

Steiractis†) DC. 1836. Prodr. V. p. 345: nov. g. Solidaginear. (Solidago arborescens Fenzl.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2379. p. 385; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3333. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Steiremis Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 40.
= Bucholzia Mart.

Steirocaulos Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 405: sect. Junci. (J. glaucus, effusus, etc.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 626.

Steirochaete A. Braun & Casp. 1853. N. Verh. Berl. Gartenb. I. p. 188. t. 1 C: nov. g. Mucedineor., Chloridio aff.

Steirochloa Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 407: sect. Junci. (J. acutiflorus, lampocarpus, squarrosus, etc.)

Steirocoma DC. 1837. Prodr. VI. p. 257: sect. Disparaginis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2758 *c*. p. 449; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3310. 3 (in Ind. corr. *Steirocomaea*).

Steirocoma DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 36: sect. Dicomae.
Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3417: g. Mutisiear.
= Microcoma DC.

Steirocomaea Rchb. vid. *Steirocoma DC.* 1837.

*) Dicat. prof. Steiner, Berolinensi.
**) Dicat. H. Steinhauer.
***) Dicat. A. Steinheil, peregrinatori.
†) *στεῖρος*, rigidus.

Steirodiscus*) Lessing 1832. Compos. p. 251: nov. g. Chrysanthemear. (Cineraria capillacea Thunb.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 74. — Endl. 1838. Gen. n. 2675. p. 436; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 210(134). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3088. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Schultz Bip.... in Webb Canar. II. p. 245: g. Euchrysanthemear.

Steiroglossa DC. 1837. Prodr. VI. p. 38: nov. g. Chrysanthemear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2654. p. 432; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 210(134). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3083. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Schultz Bip..... in Webb Canar. II. p. 245: g. Euchrysanthemear.

Steironema „Rafin." Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 346: g. Anagalleidar. (Lysimachia ciliata L.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.

Steirostilpna **) DC. 1837. Prodr. VI. p. 258: sect. Disparaginis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2758 *d.* p. 449; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3310.4.

Synon. Wigandia Less.

Steirotis Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 79: nov. g. Loranthiae. (L. pedunculatus.)

Stekhovia Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 166: g. Goodeniear. (*Monochila Don.*) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 385.

Stelechobatus ***) Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 226: sect. Rubi. (R. idaeus, caesius, fruticosus, etc.)

Synon. Rubus (sect.) Gray.

Stelechocarpus Blume 1829. Fl. jav. Anon. p. 13 (*Stelechocarpae*): sect. Uvariae.

Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 94: g. Uvariear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 49. — Zolling. 1858. Linnaea XXIX. p. 303.

Stelechospermum Blume 1829. Fl. jav. Dipteroc. p. 7 in not.: nov. g. ex typo Vateriae flexuosae Lour. *Cf.* D. G. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 812.

Endl. 1840. Gen. n. 5452. p. 1028; 1841. Ench. p. 535: g. dubium Clusiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.

Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8047: g. Mangostanear.?

Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Calophyllear.

Stelechotrichum Ritgen 1831 in Schr. Marb. Ges. II. p. 91: nov. g. Leptomycetum. (Nees Syst. f. 87.)

= Cephalotrichum Link.

Steleocorys †) Endl. 1837. Gen. n. 1597 *b.* p. 218; 1841. Ench. p. 114: sect. Corysanthis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2165. 2.

Stelephorus „Ad." Meisn. Gen. Comm. p. 318 in synon. Phlei: vid. *Stelephuros Adans.*

Stelephuros Adans. 1763. Fam. II. p. 31: g. Phalaridum.

= Phleum Linn.

Stelis*) Swartz 1799 in Schrad. Journ. II. p. 239; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 97: nov. g. Orchidear. (Epidendrum ophioglossoides L.) — Par. Batsch 1802. Tab. p. 102. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 166. — Pers. 1807. Ench. II. p. 524. n. 2005. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. V. p. 210. (Verm. bot. Schr. II. p. 35.) — G. Don 1825. Nepal. p. 32. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 730. n. 3008; 1831. Gen. II. p. 669. n. 3376. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 447.

Willd. 1805. Sp. IV. p. 138. n. 1611: g. Gynandr. Monandr. — Par. Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1549. 1998.

HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 361: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 344. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 288: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1569. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57.

Lindl. 1830. Orchid. p. 11: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1325. p. 188; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1912. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (276). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 25. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.

Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 46. t. 79—81.

Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. Misc. p. 68; 1847. Veg. kd. p. 181: g. Pleurothallidar.

Synon. Humboltia Ruiz & Pav.

Stella Medic. (Vorles. II. p. 377) 1789. Phil. Bot. I. p. 210: nov. g. ex typo Astragali sesamei L.

= Astragali §. 5 DC.

Stellales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 29: nixus Epigynar. Ordo: Stellatae.

Stellanthe Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 640: sect. Ericae. Subsect.: Myra, Ceramus, Euryloma, Platyloma, Callista, Cyatholoma, Platyspora, Lamprotes. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *c.* p. 1411; 1841. Ench. p. 370. Subsect. eaed.

Synon. Actinianthe Rchb.

Stellara Fischer mss. ex Endl.

= Boschniakia C. A. Meyer.

Stellaria „Raj." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 50. Ed. Hall. 1745. p. 54: g. pl. class. II.

Dill. 1719. Nov. pl. gen. p. 119. t. 6: g. Dipetalar. Vasculiferar.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 198: g. ordinis 8 Apetalar. staminiferar.

= Callitriche Linn.

Stellaria Linn. 1745. ...; 1753. Sp. I. p. 421; 1759. Syst. ed. X. p. 1033. n. 504;

---

*) στεῖρος, sterilis.
**) στιλπνός, lucidus.
***) στέλεχος, truncus; βάτος, rubus.
†) στελεόν, manubrium.

*) „*Stelis* significat Viscum, quod arbori innascitur, quae natura hujus plantae est." (Sw.)

Stellaria Linn. cont.
1762. Sp. ed. II. p. 603; 1764. Gen. ed. VI. p. 226. n. 568; 1767. Syst. ed. XII. p. 311. n. 563: g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 352; 1784. Syst. p. 422. — Reich. 1778. Gen. p. 231. n. 617. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 304. n. 773. — Gmel. 1791. Syst. p. 717. — Pers. 1797. Syst. p. 452. — Willd. 1799. Sp. II. p. 710. n. 896; 1809. En. p. 479. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 289.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 98. n. 405: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 235.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 301. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 244. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 115. — Pers. 1805. Ench. I. p. 500. n. 1119. — Hedw. 1806. Gen. p. 330. n. 1299. — Link 1821. En. I. p. 429. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 25. — Kunth 1824. Syn. III. p. 343. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 392. n. 1712; 1830. Gen. I. p. 378. n. 1908. — D. Don 1825. Nepal. p. 215. — Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 451. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 167. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 152. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1552. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 25.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
Neck. 1790. El. II. p. 157. n. 853: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. t. 130. f. 3.
DC. 1805. Franç. IV. p. 793; 1815. V. p. 614; 1824. Pr. I. p. 396: g. Alsinear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 206. n. 5349. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 62. 177. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 427. — Link 1831. Hdb. II. p. 253. — Koch 1836. Syn. p. 118. Ed. II. p. 129. Sect.: Dichodon, Hylebia, Stellaria, Larbrea. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 206. — Webb 1836. Canar. I. p. 130. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Kunth 1838. Berol. I. p. 130. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 183. — Godr. 1842. Obs. fam. Alsin. (Flora 1842. Lit. p. 96.) Emend. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 205. Sect.: Eustellaria, Larbrea. — Brongn. 1843. En. genr. p. 104. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Duch. 1849 in Crb. Dict. XI. p. 813. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1054.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 833: g. Stellarinar. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 784. Sect.: Stellaria, Dichodon.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: g. Stellinear.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 274: g. Alsinacear.
Presl 1826. Sicul. I. p. 160: g. Stellariar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5240. p. 969; 1841. Ench. p. 505; 1843. Spl. III. p. 92: g. Arenariear. Sect.: Schizotechium, Eustellaria, Leucostemma, Adenonema. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7796. Sect.: Alsinella, Stellaria, Holostea, Acanthidia. — Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 375. Subgen.: Eustellaria, Adenonema. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 263. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 260.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 36: g. Stellariear. Sect.: Malachodes, Holostea, Astrochloë.

Stellaria Scopoli 1772. Fl. Carn. I. p. 313: g. Decandr. Digyn. ampliat. Sect.: legitimae, Spergulae, Cerastia.

Stellaria Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 656: g. Alsinear. ampliat. Sect.: Alsine, verae, Cerastium.

Stellaria Debray ex Endl.
= Holosteum Linn.

Stellariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Stellariear. Trib.: Diantheae, Sileneae, Alsineae, Sperguleae.

Stellariae Presl 1826. Fl. sicul. I. p. 159: trib. Caryophyllear. Gen.: Löfflingia, Spergula, Stellaria, Spergularia, Arenaria, Holosteum, Cerastium.

Stellarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam.: Stellariaceae, Corrigiolaceae, Elatinideae.

Stellarieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 205: sect. Stellarinar. Subsect.: Möhringieae, Arenarieae, Cerastieae, Merckieae.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 36: div. Alsinacear. Gen.: Malachium, Stellaria, Cerastium, Holosteum, Arenaria.

Stellarinae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 833: div. Caryophyllear. Gen.: Stellaria, Arenaria, Cerastium, Cherleria, Hydropityon?, Spergula, Bergia.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 782: div. Caryophyllacear. Gen.: Buffonia, Möhringia, Holosteum, Siebera, Cherleria, Stellaria, Sabulina, Arenaria, Mönchia, Esmarchia, Sagina, Spergella, Malachium, Cerastium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 297: subdiv. Caryophyllear. Sect.: Sagineae, Arenarinae, Cerastieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 204. Sect.: Sagineae, Sabulineae, Stellarieae.

Stellarineae Fenzl 1840 in Endl. Gen. p. 966; 1841. Ench. p. 505: trib. Alsinear. Subtrib.: Arenarieae, Cerastieae, Malachieae. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 255. Subtrib. eaed.

Stellarioides Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 369: nov. g. ab Ornithogalo separatum. (St. canaliculata.)

Stellaris Dillen. 1719. Nov. pl. gen. p. 110: g. herbae Bulbosae . . . .
Mönch 1794. Meth. p. 303: g. Thalamostemonis.
= Gageae et Scillae sp.

Stellaris Rchb. 1822. Flora II. p. 538: sect. Ornithogali. (O. umbellatum et nutans.) — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1367 *b*. (restrict.)

Stellaris Steinheil 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 286: nov. g. ex typo Scillae parviflorae Desf.
Endl. 1842. Spl. II. p. 13. n. 1131 *c*: sect. Squillae.

Stellatae Ray 1691. Syn. stirp. brit. p. 223: class. XII. plant. Gen. §. 1: Cruciata, Rubia quadrif., Gallium vulg., Mollugo, Aparine, Asperula, Rubeola arv. §. 2: Rubia cynanch., Rubia spicata. *Cf.* Linn. 1747. Class. pl. p. 82.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 456: div. Dicotyledonum petalodear. Isostemonum. Gen.: Sherardia, Asperula, Rubeola, Galium, Rubia, Cornus.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: ordo 44 plant. Gen.: Anthospermum, Rubia, Aparine, Galium, Valantia, Spermacoce, Sherardia, Asperula, Crucianella, Hedyotis, Phyllis, Houstonia, Spigelia, Lippia, Diodia, Knoxia, Cornus?, Coffea.

Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 47 plant. Gen. §. 1: Phyllis, Richardia, Crucianella, Spermacoce, Sherardia, Asperula, Galium, Valantia, Anthospermum, Hedyotis, Knoxia, Lippia, Diodia, Rubia. §. 2: Ophiorrhiza, Spigelia, Houstonia, Oldenlandia. §. 3: Coffea, Psychotria, Cornus, Ixora, Pavetta. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520. Gen. ead. et ad §. 1 Ernodea.

Batsch 1802. Tab. p. 231: fam. Rigidar. Gen.: Sherardia, Asperula, Galium, Crucianella, Valantia, Rubia, Anthospermum.

DC. 1807. Ann. Mus. IX. p. 217; 1830. Pr. IV. p. 580: trib. Rubiacear. Gen. (1830): Sherardia, Asperula, Crucianella, Rubia, Galium, Callipeltis, Vaillantia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 637. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). Gen. ead.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 597: ordo Rubiacear. Gen.: Galium, Valantia, Rubia, Asperula, Sherardia, Crucianella, Anthospermum.

D. Don 1825. Nepal. p. 133: fam. Rubiacear. Gen.: Gallium, Rubia.

Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 220: sect. Rubiacear. Gen.: Galium, Rubia. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 378. 469. Gen. ut DC.

Rchb. 1828. Consp. p. 93; 1831. Fl. exc. p. 204; 1837. Hdb. p. 179: div. Rubiacear. Gen. ut Batsch. (Phyllis loco Anthospermi.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 209. Gen. ead. exclusa Phyllide. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. Gen. ut DC. excepta Sherardia.

Link 1829. Hdb. I. p. 644: subordo Rubiacear. Vid. *Rubiaceae Link.*

Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (189) Monopetalar.

Lindl. 1833. Nix. p. 29: ordo unicus Stellalium.

Koch 1836. Syn. p. 326. Ed. II. p. 358: ordo Calyciflorar. Gen. ut DC. (praeter Callipeltidem.)

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 249.

Endl. 1838. Gen. p. 522; 1841. Ench. p. 270: trib. Coffeacear. Gen. ut DC.

Conf. Aparineae Link; Galeae Kunth; Asperuleae A. Rich.

Stellera*) Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 126: nov. g. pro *Chamaejasme Amm.* constitutum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. natur.: g. Veprecular. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414.

Linn. 1753. Sp. I. p. 559; 1759. Syst. ed. X. p. 1004. n. 439; 1762. Sp. ed. II. p. 512; 1764. Gen. ed. VI. p. 193. n. 488; 1767. Syst. ed. XII. p. 273. n. 483: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 309; 1784. Syst. p. 373. — Reich. 1778. Gen. p. 197. n. 529. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 261. n. 667. — Gmel. 1791. Syst. p. 634. — Pers. 1797. Syst. p. 399. — Willd. 1799. Sp. II. p. 429. n. 776. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 5. 32.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 436. n. 970. — Lois. 1827. Dict. v. 50. p. 455. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436.

Adans. 1763. Fam. II. p. 285: g. Thymelaear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 77. — Batsch 1802. Tab. p. 181. — DC. 1805. Franç. III. p. 360. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 325.

Gled. 1764. Syst. p. 270. n. 1108: g. Calycostemonum.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 27: g. Incompletar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 328 (*Stelleria*): g. Monopetalar. incompletar.

Scop. 1777. Intr. p. 343: g. Seminudar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 186. t. 39. f. 2 (Passerina).

Neck. 1790. El. II. p. 180. n. 890: g. Aclithrophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 239: g. Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2435.

Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 266: g. Petalostemonis.

Cram. 1803. Disp. p. 111 in Decandr. Monogyn.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 182: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 281. n. 1127.

Link 1821. En. I. p. 357: g. Thymelinar.

Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 1779: g. Daphnear. — Par. C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 359. (emend.) Sect.: Chamaestellera, Dendrostellera. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 548. Sect. eaed.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Thymelinear.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 163: g. Thymeleacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: in synon. Passerinae.

Endl. 1847. Spl. IV. p. 62. n. 2098: g. Stellerear. Sect. ut Meyer.

Synon. Chamaejasme Amm.

Stellera Turczan. 1840. Bull. soc. Mosc. p. 167 (Flora 1842. Lit. p. 42): nov. g. Gentianear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.

*) Dicat. G. W. Steller, peregrinatori Kamtschatk.

Stellera Turczan. cont.
Endl. 1843. Spl. III. p. 76. n. 3531/1: g. Chironiear.
Meisn. 1843. Comm. p. 365: g. Swertiear. — Par. Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 123. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 72.
= Rellesta Turczan.

Stellereae Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 59: div. Daphnear. Gen.: Stellera, Diarthron, Arthrosolen, Cryptadenia, Gnidia, Lachnaea.

Stelleria Hill vid. *Stellera Linn.*

Stelliflorae Rchb. 1828. Consp. p. 130; 1831. Fl. exc. p. 187. 418: formatio Rotiflorar. Fam.: Asclepiadeae, Contortae, Sapotaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 177; 1841. Nom. p. 128: formatio Limbiflorar. Fam. eaed.

Stellineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: fam. Thalamisertiae. Gen.: Dianthus, Stellaria.

Stellulina Link 1833. Handb. III. p. 261.
Endl. 1836. Gen. n. 54 *b.* p. 5; 1841. Ench. p. 4: sect. Zygnemae.
= Zygnemae Agdh. pars.

Stemastrum Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 177: nov. g. Fungor., Geastro simile.
Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 204: g. Lycoperdineor.
= . . . ?

Stematospermum Wittst. vid. *Stemmatospermum Palis.*

Stemionitei Endl. vid. *Stemonitei.*

Stemionitis Dumort. vid. *Stemonitis.*

Stemmacantha*) Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 12; 1817. Dict. v. 7. p. 94: nov. g. Carduacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 144.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 310. 320; 1827. v. 50. p. 460; 1830. v. 60. p. 572: g. Rhaponticear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2314.
Less. 1832. Syn. p. 6: subg. Rhapontici.
DC. 1837. Pr. VI. p. 663: sect. Rhapontici. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2894 *a.* p. 479; 1841. Ench. p. 247. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3891. 1 (*Stemmacanthe*). — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 751. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 238.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12: g. Carduinear.

Stemmacanthe Rchb. vid. *praeced.*

Stemmadenia Benth. 1844. Voy. Sulph. Bot. p. 124: nov. g. Tabernaemontanear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 468.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Stemmaria Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 137: nov. g. Aspergillinor. (St. globosa.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 160.

Stemmasiphum D. G. vid. *Stemmatosiphum Pohl.*

Stemmatophysum Steud. vid. *praeced.*

Stemmatopteris Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 76: nov. g. Protopteridear. (Sigillaria peltigera Brongn.)

*) *στέμμα*, corona.

Stemmatosiphon Meisn. 1837. Gen. p. 49 (36): g. Trichiliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Calpandriear.
= Stemmatosiphum Pohl.

Stemmatosiphum*) Pohl 1831. Pl. Brasil. II. p. 86. 199. t. 157—159: nov. g. Meliacear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 187, Benth. 1839. Linn. Trans. XVIII. 2. p. 225 et D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 4 (*Stemmasiphum*). — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 637 (*Stemmatophysum*).
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 181: g. Trichilieis aff.
Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158): g. Styracear.?
= Symplocos L'Herit. (Benth.)

Stemmatosperma Kunth vid. *seq.*

Stemmatospermum**) Palis. 1812. Agrost. p. 144. t. 25. f. 5: nov. g. Graminear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 840 (corr. *Stematospermum*). — Par. Juss. 1827. Dict. v. 50. p. 472.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 75 (*Stemmatosperma*): g. Bambusacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 32.
= Nastus Juss.

Stemmodontia Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 11: nov. g. Helianthear. (prototypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2664. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 399. 407; 1830. v. 60. p. 577: g. Heliopsidear.
= Wedeliae Jacq. pars.

Stemodia***) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1118. 1374. n. 1154; 1763. Sp. ed. II. p. 881; 1764. Gen. ed. VI. p. 320. n. 777; 1767. Syst. ed. XII. p. 422: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 479; 1784. Syst. p. 573. — Reich. 1778. Gen. p. 322. n. 839. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 420. n. 1043. — Gmel. 1791. Syst. p. 954. — Pers. 1797. Syst. p. 610. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 33. t. 163; 1832. Ind. III. p. 94. — Willd. 1800. Sp. III. p. 344. n. 1183.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 210: g. Personatar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 177. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 273. — Link 1822. En. II. p. 144. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 476.
Gled. 1764. Syst. p. 179. n. 737: g. Petalostemonum.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 243. t. 52. f. 5 (ruderalis).
Juss. 1789. Gen. p. 118: g. Scrophulariar.
Neck. 1790. El. I. p. 348. n. 543: g. Chasmatophytor.

*) *στέμμα*, stamen; *σίφων*, tubus s. urceolus.
**) *στέμμα*, corona.
***) Nomen contractum e Stemodiacra P. Browne.

Stemodia Linn. cont.
Pers. 1807. Ench. II. p. 167. n. 1493: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3193. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24. — Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 398; 1825. Syst. II. p. 810. n. 2191; 1831. Gen. II. p. 494. n. 2436: g. Scrofularinar.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 356: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 118. — D. Don 1825. Nepal. p. 89.
St. Hil. 1824. Pl. remarq. Brés. p. 216.
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 4: g. Scrofularinear. (Char. emend.) Sect.: Modestia, Diamoste.
Benth. 1835. Scroph. ind. p. 22; 1835. Scroph. rev. p. 3: g. Gratiolear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 539. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4622. (genuinar.) Sect.: Stemodia, Diamoste. — Endl. 1839. Gen. n. 3926. p. 679; 1841. Ench. p. 339. Sect. ut Cham. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 511. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Walp. 1845. Rep. III. p. 266. 963. Sect. eaed. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 380. (verar.) Sect.: Adenosma, Diamoste.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 679.
Synon. Unanuea Ruiz & Pav.; Unannea Steud.

Stemodiacra P. Browne 1756. Jamaic. p. 261. t. 22. f. 2: nov. g. Didynam. Angiosperm.
= Lindenbergia Link & Otto. (Meisn. Comm. p. 221.)

Stemona*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 404. Ed. Willd. p. 490: nov. g. Monadelph. Tetrandr. (St. tuberosa = Ubium polypoides Rumph.), a Willd. (l. c. in adnot.) Tamo comparat.
Agdh. 1823. Aphor. p. 161: g. Smilacear.
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 478: g. Asparaginear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
= Roxburghia Jones.

Stemonacanthus Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 53; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 205: nov. g. Ruelliear.

Stemonitei Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 75: div. Myxogastrum. Gen.: Cribraria, Dictydium, Stemonitis, Diachea. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 455. Gen. ead. et Stylonites.
Endl. 1836. Gen. p. 26 (*Stemionitei*); 1841. Ench. p. 16: trib. Myxogasterum. Gen. ut Fries et Enerthenema.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 265: subsect. Myxogasterum. Gen. ut Fries.

Stemonites Fries vid. *Stemonitis Gled.*

Stemonitideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 565. 578: div. Gasteromycear. Gen.: Stemonitis.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 22; 1840. IV. p. 34: fam. Myelomycetum. Gen. id.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 21; 1842. Mycol. p. LXXIV. 85: fam. Dermatogasterum. Gen.: Stemonitis, Diachea. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 140. Gen. nov.: Comatricha.

Stemonitidei Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 215: fam. Myxogasterum. Gen.: Stemonitis, Diachea, Dictydium, Cribraria.

Stemonitis Gleditsch (1749 in Mém. Ac. Berl. 1751. p. 135) 1753. Meth. Fung. p. 140: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 479. — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 547. — Gmel. 1791. Syst. p. 1467. — Mönch 1794. Meth. p. 779. — Pers. 1796. Obs. myc. p. 56. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 268.
Gled. 1764. Syst. p. 303. n. 1219: g. Fungosar. occultatar.
Wigg. 1780. Holsat. p. 110: g. Fungoidear.
Pers. 1797. Tent. p. 10: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIV. 186: g. Trichospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 348. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 48.
DC. 1805. Franç. II. p. 256: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 28: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 132; 1817. Überbl. p. 32: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 381.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Cribrariar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 578: g. Stemonitidear. Sect.: Embolus. — Par. Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 22; 1840. IV. p. 34; 1842. V. p. 21. 59; 1842. Mycol. p. 85.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 87.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 80 (*Stemionitis*): g. Trichosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 556: g. Trichiacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74 (*Stemionitis*).
Fries 1825. Pl. homon. p. 143: g. Trichiaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 185; 1841. Nom. p. 9. n. 359. Sect. (1841): Stemonitis, Embolium, Clathroidastrum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1025: g. Trichogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 532. n. 3520; 1831. Gen. II. p. 772. n. 3967: g. Trichogasterum.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 156; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 455 (*Stemonites*): g. Stemoniteor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 312. p. 26; 1841. Ench. p. 17. Sect.: Coscinium, Embolium, Clathroidastrum. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 268.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.

*) στήμων, stamen, a staminibus notabili forma con[illegible]

Stemonitis Gled. cont.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 386: g. Angiogasterum.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 311: g. Myxogasterum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: g. Podaxineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 215: g. Stemonitideor.
Math. 1853. Belg. II. p. 388: g. Trichiear.

Stemonoporus Thwaites 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 67. t. 2 A: nov. g. Dipterocarpear. (St. Gardneri, etc.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 333.

Stemonureae Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 12. 23: trib. Olacinear. Gen.: Platea, Stemonurus.

Stemonurus Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 648: nov. g. Santalaceis aff. (An Olacinear.?) Sect.: Stemonurus, Anacolosa.
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 481: g. Santalacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 113.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1708 c: g. Osyridear.
Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33): g. Olacinear.? — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5496. p. 1042; 1841. Ench. p. 546. Sect.: Eustemonurus, Anacolosa. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5267. Sect. ut Blume. — Walp. 1842. Rep. I. p. 378. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 263. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 16. p. 249.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Santalear.?
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 13. 24: g. Stemonurear. Sect. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: g. Olacacear. dubium.
Miers 1852. Ann. and Mag. X. p. 30: g. Sarcostigmear.
Synon. Gomphandra Wall.; Lasianthera Palis.

Stemoptera Miers 1839. Proc. Linn. soc.; 1840. Ann. nat. hist. V. p. 134: nov. g. Burmanniacear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1218/4. p. 1359; 1841. Ench. p. 96 (*Stenoptera*). — Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292).
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1648: g. Burmanniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 172 (*Stenoptera*): g. Apteriear.
= Apteria Nutt.

Stemphylium*) Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 300: g. Hyphomycetum synsporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 157: g. Aspergillinor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 10; 1842. Mycol. p. 38: g. Helminthosporiacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 93: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Dematieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 506: g. Sporidesmieor.

*) στέμφυλον, recrementum.

Stemphylium Wallroth cont.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Helminthosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 83: g. Acmosporiaceor.
A. Braun & Bary 1853. N. Verh. Berl. Gart. I. p. 178. t. 2.
= Helminthosporium Link?

Stenactinium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 128: sect. Phycastri.

Stenactis*) Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 462. 485: nov. g. Erigerear. (Aster annuus L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2549.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Asterear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 139. — Nees 1833. Aster. p. 273. (in Append.) — Koch 1837. Syn. p. 353. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 240. (verar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 45.
DC. 1836. Pr. V. p. 298: g. Heteropappear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2339. p. 379; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185(126). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 491. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 172: sect. Erigerontis.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3257: g. Boltoniear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.
Koch 1843. Syn. ed. II. p. 387: g. Asterinear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 99: g. Erigerinear.
Synon. Diplopappi, Phalacrolomatis et Stenactidis sp. Cass.

Stenactis Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 483; 1830. v. 60. p. 582: g. Erigerear. dilatat.
= Stenactis Cass. et Polyactidium DC.

Stenandrium Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 285. 444.
Endl. 1839. Gen. n. 4054. p. 701; 1841. Ench. p. 343: g. Ruelliear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen. p. 295(203). — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4251.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 590: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.
Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 73; 1847 in DC. Pr. XI. p. 281: g. Aphelandrear.
Synon. Caldenbachia Pohl.

Stenantaeris Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 235: sect. Tetrapteridis.

Stenanthemum Reissek 1858. Linnaea XXIX. p. 295: nov. g. Rhamnear. (antea Cryptandrae subg. *Solenandra Reiss.*)

Stenanthera R Brown 1810. Prodr. I. p. 538. Ed. Nees p. 394: nov. g. Epacridear. (St. pinifolia.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLI. 469. n. 770. — Link 1821. En. I. p. 211. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 486. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 137. n. 685. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 633.

*) στενός, angustus.

Stenanthera R. Brown cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3340: g. Stypheliacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Stenantherear.
Bartl. 1830. Ord. p. 158: g. Stypheliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 775. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 739. — Endl. 1839. Gen. n. 4269. p. 747; 1841. Ench. p. 367. — Meisn. 1839. Gen. p. 248(156). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 435. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4803. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 425.

Stenanthereae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: trib. Epacridear. Gen.: Styphelia, Stenanthera, Leucopogon, Cyathodes, Lissanthe, Astroloma, Monotoca, Trochocarpa, Acrotriche, Melichrus.

Stenanthium A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 119: subg. Veratri.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1067 *a*. p. 1357; 1841. Ench. p. 79: sect. Veratri. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1698. 1.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 189: g. Veratrear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235.

Stenanthus „Örsted mss." Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 209: nov. g. Hypocyrtear. (St. heterophyllus.)

Stenarrhena*) D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 111: nov. g. Labiatar. (St. lanata.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 222; 1831. Gen. II. p. 467. n. 2295.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2827: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
= Salviae sect. Aethiopis Benth.

Stengelia**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 258. n. 1011: g. Dapsilophytor.
= Mourera Aubl.

Stengelia Schultz Bip. mss. in Schimp. pl. Abyss. ex Flora 1841. Intell. p. 26. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 638.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3890: g. Serratulear.
= Vernoniae sect. Ascaricida. (Walp. Rep. II. p. 946.)

Stenhammara Arnold vid. *Stenhammera Flot.*

Stenhammaria Lilja 1843. Linnaea XVII. p. 111: nomen *Steenhammerae Rchb.* emend. *Cf.* Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 191.
= Pneumaria Hill.

Stenhammera „Flot. in litt." Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 221: g. Lecidinar.
Arnold 1858. Flora p. 331 (*Stenhammara*): g. Hymeneliear.

Stenia Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1991 (in text.); 1838. t. 20: nov. g. Vandear. (St. pallida.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1407/1. p. 1363; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2011. — Meisn. 1842. Gen. p. 376(283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.

---

*) *στενός, angustus; ἄῤῥην, mas.*
**) Dicat. G. v. Stengel, societatis Mannheimensis praesidi.

Stenia Lindl. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Stenobromus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 448: sect. Bromi. (B. maximus, tectorum, sterilis, etc.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 418.
Synon. Bromi sect. 4 Koch; Micranthera Bess.

Stenobryum „Wilson mss." Spruce 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 359: sect. Bryi. (B. pyriforme L.)
= Physcomitrii Brid. pars.

Stenocalyx Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 309; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 335: nov. g. Eugenioidear. (Eugeniae sp. Auct.)

Stenocalyx Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 393: nov. g. Malpighiacear., tribus incertae. (St. involuta.)

Stenocarpa Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 350: sect. Disae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1537 *b* ζ. p. 1365; 1841. Ench. p. 112: subsect. Calodisae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1882. 2 *f*.

Stenocarpus R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 201 (Verm. bot. Schr. II. p. 311); 1810. Prodr. I. p. 390. Ed. Nees p. 246; 1830. Suppl. I. p. 34 (Verm. bot. Schr. V. p. 110): nov. g. Proteacear. (Embothrium umbellatum Forst.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 27. 436. n. 559. — Link 1821. En. I. p. 118. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 484. n. 530; 1830. Gen. I. p. 108. n. 540. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 488. — Bartl. 1830. Ord. p. 118. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 536.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 338: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 237. — Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1763; 1841. Nom. p. 63. n. 2402. — Endl. 1838. Gen. n. 2156. p. 343; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 88. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 450.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Banksiear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 121. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565; 1849. ibid XII. p. 6.
Meisn. 1841. Gen. p. 333(245): g. Rhopalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.
Synon. Cybele Knight & Salisb.; Agnostus A. Cunn.

Stenocarpus Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 106: subg. Genistae. Sect.: Scorpioides, Erinacoides, Spartioides, Genistella, Genistoides, Chamaespartum, Lasiospartum. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 481. Sect. eaed.

Stenochasma Miquel 1850. Pl. Jungh. Fasc. I. p. 45: nov. g. Artocarpear., inter Euartocarpeas et Pouroumeas fere medium. (S. Ancolanum.)

Stenochileae Rchb. 1841. Nomencl. p. 114: subdiv. Myoporinar. Gen.: Stenochilus, Pholidia, Spartothamnus?, Eremophila, Dasymalla.

Stenochilum Willd. herb.
= Lamourouxia HBK. (Walp. Rep. III. p. 398.)

Stenochilus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 517. Ed. Nees p. 373: nov. g. Myoporinar. (St. glaber et longifolius.) — Par. Link 1822. En. II. p. 129. — Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3043; 1837. Hdb. p. 196. — Bartl. 1830. Ord. p. 177.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 419: g. Myoporear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 767. n. 2135; 1831. Gen. II. p. 481. n. 2377: g. Verbenear.
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 489: g. Myoporinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Endl. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 202; 1839. Gen. n. 3736. p. 643; 1841. Ench. p. 318. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 247. — Meisn. 1840. Gen. p. 292(201). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 628. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 64. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 351. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 140. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 8.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVII: g. Polygalear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II; 1847. Veg. kd. p. 665: g. Myoporacear. — Par. A. DC. 1847. Pr. XI. p. 713. Sect.: Amphichilus, Euchilus.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4447: g. Stenochilear.

Stenochlaena J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 401; 1842. ibid. IV. p. 149: nov. g. Acrostichiear. orthophlebiear. (Acrostichum scandens L.)
Kunze 1846. Bot. Zeit. p. 441; 1848. ibid. p. 142: genus adoptat. (*Synon. Lomariopsis Fée.*)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Presl 1850. Epimel. bot. p. 522: g. Acrostichacear. Subg.: Cafraria.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 77: g. Lomariear.
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 46: g. Polypodiear.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 281: g. Blechnoidear.
Synon. Olfersiae Presl pars.

Stenocladium Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 117: sect. Trichochloae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 905 *a*.

Stenocline DC. 1837. Prodr. VI. p. 218: nov. g. Helichrysear. Sect.: Tricephalum, Eustenocline, Chionolepis? — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2744. p. 447; 1841. Ench. p. 243. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 219(137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3487. Sect. fere ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Stenocoelium*) Ledeb. 1829. Fl. Alt. I. p. 297 (Ic. t. 175); 1845. Fl. Ross. II. p. 332: nov. g. Pachypleurear. (Cachrys athamantoides Bieb.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 145(105). — Endl. 1839. Gen. n. 4452. p. 777; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5448. — Walp. 1846. Rep. V. p. 871. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 8.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 347: g. Silerinear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: g. Peucedanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Pachypleuridar.

Stenocoryne Lindl. 1843. Bot. Regist. XXIX. Misc. 68: nov. g. Orchidear. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 552.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Stenocybe „Nyland. mss." Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 306: nov. g. Calyciear.

Stenodictyon C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 325 (err. evid. *Senodictyon*): sect. Bryi.

Stenodiscus Reissek 1858. Linnaea XXIX. p. 295: nov. g. Rhamnear. (Cryptandra ulicina Hook.)

Stenodon Naudin 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 146: nov. g. Melastomacear. (S. suberosus.) — Par. D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 10.
Walp. 1846. Rep. V. p. 698: g. Rhexiear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733: g. Lavoisierear.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 215: g. Microlicialium.

Stenogastra Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 205: nov. g. Ligeriear. (Gloxinia hirsuta Lodd.)

Stenoglossum HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 355. t. 87: nov. g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 340. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 881: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 742. n. 3032; 1831. Gen. II. p. 674. n. 3405: g. Orchidear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 490.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1558.
Lindl. 1830. Orchid. p. 62: g. Dendrobiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 191. n. 1359. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1836 in Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 356: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1841. Ench. n. $1316/_1$. p. 109; 1842. Spl. II. p. 16. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1903. — Meisn. 1842. Gen. p. 368(276).
Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. Misc. p. 68; 1847. Veg. kd. p. 181: g. Pleurothallidar.

Stenoglottis Lindl. 1836 in Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 209: nov. g. Orchidacear. (St. fimbriata.)
Endl. 1837. Gen. n. 1533. p. 211; 1841. Ench. p. 112: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1876. — Meisn. 1842. Gen. p. 381(286). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gymnadenidar.

*) στενός, angustus; κοῖλος, cavus.

Stenogonum Nuttall .... Journ. Ac. Philad. n. ser. I.
= Eriogonum Michx.

Stenogramma Harvey 1841 in Beech. voy. Bot. p. 408.
Endl. 1841. Spl. I. n. 94 $f/_1$. p. 1337; 1841. Ench. p. 6: sect. Sphaerococci.
Endl. 1843. Spl. III. p. 39. n. $122/_{38}$: g. Spongiocarpear.
Mont. 1846 in Duchartre Rev. bot. I. p. 481; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 11: g. Floridear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Spongiocarpidar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106 (*Stenogramme*): g. Stenogrammear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Plocariear.?
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 873. n. 574: g. Delesseriear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 162: g. Tylocarpear.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 40: g. Rhodophycear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 249: g. Cryptonemiacear.

Stenogramma Brongn. vid. *Stegnogramma Blume.*

Stenogramme Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 411: sect. Gymnogrammes. (G. Ehrenbergiana.)

Stenogramme Trevisan vid. *Stenogramma Harv.*

Stenogrammeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subdiv. Sphaerococcear. Gen.: Stenogramme.

Stenogyne Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 493: aliud nomen pro *Cryptogyne Cass.* propositum.

Stenogyne Benth. 1831. Bot. Regist. ad calc. t. 1292; 1835. Labiat. p. 654; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 555: nov. g. Prasiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 859. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189 (genuinar.); 1841. Nom. p. 107. n. 4156. — Endl. 1838. Gen. n. 3675. p. 630; 1841. Ench. p. 308. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 465. — Walp. 1845. Rep. III. p. 900. 991. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662.
Synon. Phaeopsis Nutt.?

Stenolepis Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 337: subg. Cardui. (C. Personata Jacq.)
= Cardui Gärtn. sp.

Stenolobium D. Don 1823. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 264: nov. g. Bignoniacear. (Bignonia serrata Pav.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3273: g. Bignoniear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 227. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 566.
Endl. 1841. Ench. p. 346. n. 4124 *b*: sect. Bignoniae.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571: g. Eubignoniear.
= Bignonia Juss.

Stenolobium Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 125: nov. g. Glycinear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6648. p. 1291; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5804. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Meisn. 1843. Comm. p. 350: g. Clitoriear.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 443: g. Phaseolear.

Stenolobus Presl 1836. Pterid. p. 129: g. Davalliear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 643 *d*. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: sect. Davalliae? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1032. 4.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
= Davalliae Fée pars.

Stenoloma Fée 1852. Gen. Filic. p. 330: nov. g. Davalliear. (Davallia aculeata, etc.)
Synon. Hymenotomia Gaudich.

Stenolophus Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247. 499; 1830. v. 60. p. 571: nov. g. Jaceinear. verar.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
= Lepteranthus DC.

Stenomeria Turczan. 1852. Bull. Mosc. II. p. 312: nov. g. Asclepiadear., Tassadiac aff. *Cf.* Flora 1853. p. 720.

Stenomerideae Planchon 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 320: sect. Thismiear.? Gen.: Stenomeris.

Stenomeris Planchon 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 319: nov. g. Thismiear. (Stenomeridear.? — St. dioscoreaefolia.)

Stenomesson Herbert 1821. App. p. 40; 1825. Bot. Mag. App. p. II; 1837. Amaryll. p. 74. 198: nov. g. Amaryllidear. (Pancratiformium.) *Cf.* Bot. Mag. t. 2640. 2641. 3615. 3803.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1262 *c*: sect. Chrysophialae.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 903: sect. Chrysiphialae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Narcissear.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 15. 160: g. Narcissinear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 637: g. Pancratiear.
Synon. Chrysiphiala Ker; Chrysophiala Rchb.; Sphaerotele Presl.

Stenonia*) Endl. 1847. Syn. Conif. p. 290; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 13. n. $1816/_{21}$: g. Abietinear. foss.

Stenonia Didrichsen 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . . : nov. g. Crotonear. (St. Montevidensis.)

Stenonia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 578: nov. g. Wielandiidear. (St. Boiviniana.)

Stenopetalum „R. Brown" DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 239; 1821. Syst. II. p. 513; 1824. Prodr. I. p. 201: nov. g. Camelinear. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 501. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4781; 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6976. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 214. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (13). — Endl. 1837. En. pl. Hügel. p. 4; 1839. Gen. n.

*) Dicat. Nic. Stenoni, scientiae palaeontologicae parenti.

Stenopetalum R. Brown cont.
4920. p. 877; 1841. Ench. p. 450. — Walp. 1842. Rep. I. p. 174; 1846. V. p. 40. — Bunge 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 257.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 880. n. 2302; 1831. Gen. II. p. 519. n. 2548: g. Siliculosar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 672.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Camelinidar.

Stenophyllarion Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 227: sect. Heteropteridis.

Stenophylloseris Schultz Bip. 1841. Linnaea XV. p. 725: sect. Lactucae. (L. saligna L.)

Stenophyllum Lessing 1831. Linnaea VI. p. 704: sect. Liabi. (Conyza ericoides Lam.)
Less. 1832. Syn. p. 262: subg. Morysiae.

Stenophyllum Lessing 1832. Syn. Compos. p. 412: subg. Pereziae.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 64: sect. Homoianthi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3767. 2.
Endl. 1838. Gen. n. 2962 $\alpha\gamma$. p. 492; 1841. Ench. p. 249: subsect. Clarioneae.

Stenophyllum C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 606 (err. evid. *Senophyllum*): sect. Barbulae.

Stenophyllus Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I: nov. g. Cyperacear. (Scirpus stenophyllus Ell.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 83.

Stenoptera Presl 1827. Reliq. Hänk. I. 2. p. 95: nov. g. Epipactear. *Cf.* Flora 1828. I. p. 344.
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1436: g. Neottiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 447; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1548/3. p. 113; 1842. Gen. Spl. II. p. 18.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Cranichidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Spiranthidar.

Stenoptera Endl., Lindl. vid. *Stemoptera Miers.*

Stenopuntia Engelm. 1856. Syn. Cactac. p. 289 (Emory Cact. p. 45): subg. Opuntiae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 48.

Stenorhynchus Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 59 (*Stenorynchus*); 1818. Orchid. eur. p. 37 in not.: nov. g. Orchidear. (Neottia speciosa, lanceolata, orchioides et calcarata Willd.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 709. n. 2961; 1831. Gen. II. p. 660. n. 3326 (*Stenorrhynchos*).
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1431 (*Stenorrhynchus*). — Bartl. 1830. Ord. p. 56 (*Stenorrhynchus*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Endl. 1837. Gen. p. 213. n. 1547 *c:* sect. Spiranthis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2114. 3 (*Stenorrhynchium*).
Lindl. 1840. Orchid. p. 476; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Spiranthidar. Sect.: Stenorhynchus, Bivesica. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1560. p. 113; 1842. Gen. Spl. II. p. 20.
Benth. 1842. Pl. Hartweg. p. 92 (*Stenorhyncus*): g. Orchidacear.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Spiranthidear.
Synon. Ibidium Salisb.

Stenorhyncus Benth. vid. *praeced.*

Stenorrhynchis Rchb. f. 1849. Linnaea XXII. p. 815: g. Orchidear. (St. novofriburgensis et Arrabidae.) Sect.: Sarcoglottis.

Stenorrhynchium Rchb. vid. *Stenorhynchus Rich.*

Stenorrhynchos Spreng. vid. *praeced.*

Stenorrhynchus Rchb., Bartl. vid. *praeced.*

Stenorynchus Rich. vid. *praeced.*

Stenosemia*) Presl 1836. Pterid. p. 237: nov. g. Acrostichacear. (Acrostichum auritum Sw.)
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 395; 1842. ibid. IV. p. 52: g. Polypodiear. symplophlebiear.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1345. n. 603 $b\beta$; 1841. Ench. p. 35. n. 603 $b\,\delta$: subsect. Acrostichi.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 987. 2: sect. Acrostichi.
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330): g. Grammitidear.
Fée 1844. Acrost. p. 17. 82; 1852. Gen. Fil. p. 53: g. Acrostichear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.

Stenosiphon Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 170: nov. g. Gaurinear. (Gaura linifolia Nutt.) — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 520.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6132. p. 1195; 1841. Ench. p. 638: g. Gaurear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6586. — Walp. 1846. Rep. V. p. 670. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725.

Stenosiphonia Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phycol. gener. p. 420; 1845. Phycol. germ. p. 314; 1849. Sp. Alg. p. 809: sect. Polysiphoniae.

Stenosiphonium Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 84; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 105: nov. g. Ruelliear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4249. — Endl. 1839. Gen. n. 4052. p. 700; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). — Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 19. t. 1502. 1503. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 784.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 589: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.

Stenosolenium Turczan. 1840. Bull. soc. Mosc. p. 253: nov. g. Borraginear. (Anchusa saxatilis Pall.) *Cf.* Flora 1842. II. Lit. p. 47.
Meisn. 1843. Comm. p. 366: g. Craniospermear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 77. n. 3766/1: g. Anchusear.

---

*) στενόσημος, margo acutus.

Stenosolenium Turczan. cont.
A. DC. 1846. Pr. X. p. 103: g. Lithospermear. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 142.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.

Stenospermum „Sweet“ Brongn. 1843. Énum. genr. p. 123: g. Leptospermear. (Nomen.)

Stenostemum Juss. vid. *Stenostomum Gärtn. f.*

Stenostephanus Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 91: nov. g. Aphelandrear.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 310: g. Gendarussear.

Stenostomum Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 69 (lucidum — *Sturmia* in tab.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 604: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2025.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 377 (*Stenostemum*): g. Rubiacear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 203: sect. Malaneae.
DC. 1830. Pr. IV. p. 460: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 553. — Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2845. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3195. p. 541; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
Synon. Sturmia Gärtn.; Malaneae et Laugeriae sp. Auct.

Stenotaenia Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 339: nov. g. Peucedanear. (St. tordylioides.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 888. — Endl. 1850. Spl. V. p. 10. n. $4477/_2$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Stenotaphrium Griseb. vid. *seq.*

Stenotaphrum*) Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 175: nov. g. Graminum. (Rottbölla dimidiata L.) *Cf.* Schrank 1824. Flora II. Beil. p. 25.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 857: g. Chloridear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 30. (?)
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 127: g. Graminear.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 91: g. Paniccar. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 42; 1833. Agrost. p. 137. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 189. — Endl. 1837. Gen. n. 774. p. 84; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 286. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1275. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 118.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265 (*Stenotaphrium*): g. Paspalear.
Synon. Rottbölla Swartz.

*) τάφρος, fossa.

Stenotheca Monnier 1829. Ess. mon. Hierac. p. 71: nov. g. ab Hieracio sejunctum. *Cf.* Flora Lit. I. p. 72.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 476: sect. Hieracii.
= Aracium Neck. (Endl.)

Stenotheca Fries 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 390; 1850. ibid. XIV. p. 132: series Hieracii. *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 805. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1005.

Stenotium Presl 1836. Mon. Lobel. p. 12; 1837 in Eckl. & Zeyh. En. pl. Afr. III. p. 395: sect. Rapuntii.
Endl. 1838. Gen. p. 511. n. 3058 *b*; 1841. Ench. p. 264. n. 3058 *a α*: sect. Lobeliae. (1841 subsect. Rapuntii.)

Stenotorus Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 222: sect. Heteropteridis.
Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 63: subsect. Ptycheteropteridis.

Stenotropis Hasskarl 1855. Retzia I. p. 184; 1858. Hort. Bogor. I. p. 194: nov. g. Erythrinae proximum. (Erythrina poianthes Brot.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 558: g. Erythrinear.

Stenotus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 334: nov. g. Chrysocomear. (Chrysopsis acaulis Nutt.) Subgen.: Oonopsis.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 237: g. Solidaginear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 40. n. $2377/_2$. — Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 591. 966. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Stenygra Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 346: sect. Eupareae. (Anagallis rubricaulis Hils. & Boj.)

Stephanandra*) Sieb. & Zucc. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 739: nov. g. Spiraeacear.? — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 102. n. $6392/_1$. — Walp. 1846. Rep. V. p. 658.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Spiraeidar.

Stephananthus Lehm. 1826. Sem. h. Hamb.; 1827. Flora I. p. 96; 1829. Nov. Act. Leop. XIV. 2. p. 821: nov. g. Eupatorinar. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 11. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. $212^{a.}$ n. $2238^{b.}$ — Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 610. n. 3013.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Tarchonanthear.
= Baccharis Linn.

Stephanephorus Körb. vid. *Stephanophorus Flot.*

Stephania**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 608. Ed. Willd. p. 746: nov. g. Dioec. Monandr. (St. rotunda et longa.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 504. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 899. n. 3160.
Rchb. 1828. Consp. p. $212^{d.}$ n. 5583: inter genera vix cognita.

*) στέφανος, sertum.
**) στεφάνη, corona: ab anthera in formam coronae aureae caput filamenti circumdante.

Stephania Lour. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 243: g. Menispermear. (genuinar.) — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 703. n. 3545. — Endl. 1839. Gen. p. 827. n. 4694. (Atakt. t. 49. 50.) — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7. — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2625. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 96.
Endl. 1841. Ench. p. 415. n. 4694: g. Menispermacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 309.
Miers 1851. Ann. and Mag. 2d. ser. VII. p. 36: g. Cissampelidear. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 195. (Injungitur Ileocarpus Miers.) — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 129.
Synon. Clypea Blume.

Stephania*) Willd. 1799. Spec. II. p. 239. n. 686: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 391. n. 859. — Hedw. 1806. Gen. p. 220. n. 895.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 475 (*Stephanium*): g. Capparidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 775: g. Capparidum.
DC. 1824. Pr. I. p. 253: g. Capparear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4872. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 285. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267: g. Cadabear.
= Steriphoma Spreng.

Stephanium Schreb. 1789. Gen. I. p. 124. n. 308: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 368.
= Palicourea Aubl.

Stephanium Juss. vid. *Stephania Willd.*

Stephanocarpeae Klotzsch 1855. Begon. p. 121: subordo Begoniacear. Trib.: Begoniaceae, Pritzelieae.

Stephanocarpus Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 368: nov. g. Cistoidear. (Cistus monspeliensis L.)
Webb .... Canar. I. p. 123: g. Cistinear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 81. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 231. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 722.
Bernh. 1838. Flora II. p. 692: g. Cistacear.
Endl. 1839. Gen. n. 5028 *f.* p. 905; 1841. Ench. p. 467: sect. Cisti? — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 166.
Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7192: g. Cistear. genuinar.

Stephanocoelium Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 54: nov. g. Algar. (Caulerpa pusilla Mart.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Bryopsidear.
= Chauvinia Bory.

Stephanocoma Lessing 1832. Syn. Compos. p. 56: nov. g. Arctotidear. Subgen.: Carduoides, Berkheyoides.
DC. 1837. Pr. VI. p. 497: g. Gorteriear. Sect. eaed. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2839. p. 465; 1841. Ench. p. 245. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3640. Sect.: Stephanocoma, Berkheyaria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 278.

Stephanocystis „Trevisan mss." Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 31. n. 122/$_6$ *c:* sect. Cystoscirae.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 68: g. pro Fuco osmundaceo Turn. adoptatum.
= Myriodesma Decne et Halidrys Lyngb. sp.

Stephanodiscus Ehrenb. 1845. Ber. Ak. Berl. p. 72: nov. g. Naviculaceor.
Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 21. n. 18: g. Melosirear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw. Diat.

Stephanogastra Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 425: nov. g. Osbeckiear. (St. purpurea.)

Stephanogonia Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 264: nov. g. Naviculaceor., a Pyxidicula separatum.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 26. n. 20: g. Melosirear.

Stephanoma Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 269: nov. g. Sporomycetum entosporor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 226: g. Excipulinor.
= Asterothecium Wallr.

Stephanomeria Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 427: nov. g. Scorzonerear. (Lygodesmia minor Hook.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 472. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 348.

Stephanonia „Wallr." Endl. Ench. p. 16 in synon. Asterothecii: vid. *Stephanoma Wallr.*

Stephanopappus Lessing 1831. Linnaea VI. p. 234: nov. g. Relhaniear. (Relhania reflexa Thunb.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 283: sect. Nestlerae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2779 *a.* p. 453; 1841. Ench. p. 244.
Synon. Columellea Jacq.; Columellia Willd.

Stephanophorus „Flot." Montagne 1849 in Orb. Dict. VII. p. 351: g. Collemacear. verar. (Nomen.) — Par. Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 395 (*Stephanephorus*).

Stephanophyllum „Guill." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 122: g. Eriocaulacear.

Stephanophysum*) Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 83. t. 155. 156: nov. g. Acanthear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 186. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 430.
Endl. 1839. Gen. n. 4051. p. 700; 1841. Ench. p. 343: g. Ruelliear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4028. — Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 49; 1847 in DC. Pr. XI. p. 201.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.

*) Dicat. Frid. Stephan, prof. Moscowiensi.

*) στεφάνιον, corolla; φύσα, vesica.

Stephanopodium Pöppig & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 40. t. 246: nov. g. Chailletiaccear. (St. peruvianum.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 97. n. 5759/₁. — Walp. 1846. Rep. V. p. 408. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 583.

Stephanopyxis Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Akad. p. 262. 264: subg. Pyxidiculae. (1845. ibid. p. 80 genus.)
= Pyxidicula Ehrenb.

Stephanosira Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Melosirear.

Stephanosphaera Cohn 1852 in Sieb. & Köll. Zeitschr. f. wiss. Zool. IV. 1. p. 77; 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 323: g. Volvocinear.

A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. ambiguar. coenobiar.

Stephanostachys Klotzsch 1852 in Otto's Gartenz. Nr. 46. p. 363: subg. Chamaedoreae. (Ch. Casperiana.) *Cf.* Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 836.

Örsted 1858. Palm. Centroam. p. 26: g. Chamaedoreear.

Stephanostoma Zippel. ex Macklock in Bijdr. tot Nat. Wet. V. p. 142 (Feruss. Bull. XVIII. p. 92): g. nondum descriptum. (Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 52.)

Stephanothricum A. Juss. vid. *Stephanotrichum Naud.*

Stephanotis Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 35 in Römer Collect. bot. p. 203: nov. g. Apocinear. (Ceropegia acuminata Roxb.?) *Cf.* Schult. 1820. Syst. VI. p. VI.

Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3408 *b:* sect. Ceropegiae.

Brongn. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 30: g. Asclepiadear. Char. emend. — Par. D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 23.

Endl. 1838. Gen. n. 3510. p. 597; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270(177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5050.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 53.

Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear.

Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 620: g. Pergulariar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Synon. Isaura Comm.

Stephanotrichum Naudin 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 54: nov. g. Melastomaccear. (St. hispidum.)

Walp. 1846. Rep. V. p. 718: g. Miconiear.?

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 74 (*Stephanothricum*): g. Lavoisierear.

Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 306: sect. Staphidii. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 746.

Stephanoxanthium Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 184. n. 134: nov. g. Desmidiear. (Desmidii, Staurastri, Phycastri sp. Auct.)

Stephegyne Korthals .... Verh. natuurl. Geschied. VI. p. 161.

Walp. 1843. Rep. II. p. 513; 1847. VI. p. 70: g. Naucleear.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 140: sect. Naucleae.

Stephensia Tulasne 1845 in Compt. rend. Ac. XXI. Dec.: nov. g. ex typo Geneae bombycinae Vitt.

Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 54: g. Tuberaceor. (genuinor.) — Par. Bail 1858. Syst. p. 46.

Steppia Schultz Bip. 1847 in Walp. Repert. VI. p. 163: sect. Prestinariae.

Steptorhamphus*) Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 205; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 381: nov. g. Lactucear., Lomatolepidi aff.

Sterbeckia Schreb. 1789. Gen. I. p. 360. n. 909: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 820. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1177. n. 1044.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 785: g. Mesuëar.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 599. n. 1925: g. Guttiferar.
= Singana Aubl.

Sterbeeckia**) Dumort. 1822. Comment. bot. p. 33: nov. g. Fungor. (p. 83 Hymenacear. — Peziza cornucopioides L.)

Sterculeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 362: trib. Sterculiacear. Gen. Sterculiear. Endl. et Micrandra.

Sterculia***) Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 139: nov. g. plant.

Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 166. n. 349 (Nov. gen. zeyl. p. 13. n. 1070): g. Monoec. Adelph. — Par. Blanco 1837. Filipin. p. 762.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.

Linn. 1753. Sp. II. p. 1007; 1759. Syst. ed. X. p. 1277. n. 963; 1763. Sp. ed. II. p. 1430; 1764. Gen. ed. VI. p. 504. n. 1086; 1767. Syst. ed. XII. p. 637: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 723; 1784. Syst. p. 866. — Reich. 1778. Gen. p. 500. n. 1185. — Lour. 1790. Coch. II. p. 586. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 25. t. 24. 25; 1819. III. p. 84. t. 287. — Pers. 1797. Syst. p. 910.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 244. — Gis. 1792. Prael. p. 474.

Gled. 1764. Syst. p. 142. n. 596: g. Thalamostemonum.

Cavan. 1788. Diss. V. p. 284. t. 141—145: g. Malvacear. Char. emend. *Cf.* Römer & Ust. Mag. Bot. XI. p. 126. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 278. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 202. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 72. — Pers. 1807. Ench. II. p. 239. n. 1617. — Link 1822. En. II. p. 6.

---

*) *στεπτός*, coronatus; *ῥάμφος*, rostrum curvum.
**) Dicat. Franc. van Sterbeeck.
***) Nomen ab odore stercoris.

Sterculia Linn. cont.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 324. n. 828: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 872. n. 955; 1809. En. p. 498.
Neck. 1790. El. II. p. 347. n. 1144: g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1034: g. Monadelph. Dodecandr. — Par. Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1160. — Cram. 1803. Disp. p. 164.
Batsch 1802. Tab. p. 22: g. Columniferar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 809: g. Büttnerear.
Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 66: g. Hermanniear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 609.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 310: g. Sterculiacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 515. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 24.
DC. 1824. Pr. I. p. 481: g. Sterculiear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 81. n. 2418. — St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 276. — Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5287; 1841. Nom. p. 202. n. 7699. Sect. 1841 ut Endl. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Endl. 1840. Gen. n. 5320. p. 993; 1841. Ench. p. 516. Sect.: Sterculia, Southwellia, Poecilodermis, Brachychiton, Trichosiphon, Cola, Cavallium, Hildegardia, Scaphium, Firmiana, Erythropsis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 78. — Walp. 1846. Rep. V. p. 97.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 552. n. 2701: g. Bombacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 351: g. Büttneriacear.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 144: g. Monoec. Dodecandr.

Sterculia Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 32: g. restrict. Sterculiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 30(25). — R. Brown 1844 in Horsf. pl. jav. rar. p. 226.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 504: g. Sterculiacear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 60. n. 5319. Sect.: Eusterculia, Chichaea, Ivira. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Southwelliear.
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *a*. p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. Subsect.: Eusterculia, Ivira. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 1. Subsect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.

Sterculiaceae Vent. 1804. Malmais. II. p. 91.
DC. 1819. Théor. élém. p. 244: ordo Thalamiflorar.
= Byttneriacear. DC. pars.

Sterculiaceae Kunth 1821. Nov. gen. V. p. 310 (Diss. Malv. p. 6.): sect. Büttneriacear. Gen.: Sterculia, Southwellia, L'Heritiera.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: trib. Büttneriacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: div. Geraniacear. Gen.: Sterculia, Triphaca, Heritiera, Kleinhovia.

Sterculiaceae Kunth cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 340: ordo(196) Columniferar. Gen.: Sterculia; Triphaca; Cheirostemon, Heritiera?
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (27) Thalamiflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 515. Gen.: Sterculia, Triphaca, Reevesia, Heretiera.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 500: fam. (51) Columniferar. Gen.: Pterygota, Heritiera, Triphaca, Sterculia, Southwellia, Poecilodermis, Cola, Cavallium, Hildegardia, Scaphium, Firmiana, Erythropsis, Trichosiphum, Brachychiton, Reevesia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615: fam. Diclinar. monoicar. Gen. Sterculiear. R. Brown 1844.

Sterculiaceae Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 30: ordo plantar. emendat. Trib.: Helictereae, Sterculieae, Bombaceae.
Lindl. 1833. Nix. p. 20; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 92; 1847. Veg. kd. p. 360: ordo Malvalium. Trib.: Bombaceae, Helictereae, Sterculeae.
Meisn. 1837. Gen. p. 28(24): ordo Columniferar. Trib. ut Schott & Endl. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 987; 1841. Ench. p. 513. Trib. eaed.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 77: fam. Malvoidear. Trib. eaed.
Synon. Bombaceae et Sterculiaceae Kunth; Bombaceae et Sterculieae DC.

Sterculiariae Rchb. 1837. Handb. p. 291; 1841. Nomencl. p. 201: div. Geraniacear. Subdivis.: Hermannieae, Rhynchotheceae, Sterculieae.

Sterculieae DC. 1824. Prodr. I. p. 481: trib. Byttneriacear. Gen.: Sterculia, Triphaca, Heritiera.
St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 276: trib. Malvacear. Gen.: Sterculia.
Rchb. 1828. Consp. p. 203 (Fl. exc. p. 775): div. Geraniacear. Subdivis.: Rhynchotheceae, *genuinae* (gen.: Kleinhovia; Heritiera, Triphaca, Sterculia), Götheaceae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Hermanniacear. Gen.: Sterculia, Heriteria.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 32: trib. Sterculiacear. Gen.: Pterygota, Heritiera, Triphaca, Sterculia, Southwellia, Poecilodermis, Cola, Cavallium, Hildegardia, Scaphium, Firmiana, Erythropsis, Trichosiphum, Brachychiton. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 993; 1841. Ench. p. 516. Gen.: Heritiera, Sterculia, Pterygota. Accedunt 1850 (Spl. V. p. 61) Tetradia, Brachychiton, Hildegardia, Firmiana, Scaphium, Pterocymbium, Courtenia, Cola. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 78. Gen.: Heritiera, Sterculia.
Meisn. 1837. Gen. p. 30(25): subordo Sterculiacear. Gen. Schottiana et Chichaea, Biasolettia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: subdiv. Sterculiariar. Sect.: Triphaceae, *genuinae* (subsect.: Southwellieae, Hildegardieae, Brachychitoneae), Kleinhovieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. Gen.: Heritiera, Sterculia, Pterygota.
R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 225.

Sterculieae DC. cont.
Gen.: Sterculia, Tetradia, Brachychiton, Pterygota, Hildegardia, Firmiana, Scaphium, Pterocymbium, Courtenia, Cola, Heritiera; Micrandra?

Stereocauleae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 11 (Flora 1854. p. 234): trib. Cladonioidear. Gen.: Stereocaulon.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 328: fam. Cladoniacear. Gen. id.

Stereocaulon *) Schreb. 1791. Gen. II. p. 768: sect. Lichenis. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 515.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 128: g. Scutellator.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 208: g. Lichenum (caulescentium). — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 16. 171. — DC. 1805. Franç. II. p. 328; 1815. V. p. 178. — Pers. 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 19. — Mart. 1817. Erlang. p. 275. (capitator.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXV: g. Coenothalamor.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 331: g. Lichenacear.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 42: g. Coenothalamior.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 113. 580; 1814. Syn. Lich. p. 284: g. Cephaloideor.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: g. Cephaloidum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 411: g. Baeomycidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Cephaloidear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 23: g. Plocariar.
Meyer 1825. Flecht. p. 334: g. Hymenocarpor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 274. n. 3377; 1831. Gen. II. p. 745. n. 3775.
Fries 1825. Pl. homon. p. 248; 1831. Lich. eur. p. 4. 200; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 109: g. Lecidinar. — Par. Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 294.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 854: g. Hymenothalamar.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 415: g. Capitulariacear.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 438: sect. Patellariae.
Endl. 1836. Gen. n. 169. p. 15; 1841. Ench. p. 11: g. Lecidinear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 117; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XII. p. 25.
Genth 1836. Nass. I. p. 408: g. Cladoniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 523: g. Cladoniacear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. 111. — Körb. 1846. Lich. eur. sp. p. 3; 1855. Syst. Lich. Gen. p. 10. Sect. (1855): Eustereocaulon, Cereolus. — Bayrh. 1849. Taun. p. 74.
Tuckerm. 1845. En. of North-Am. Lich. . . . . Sect.: Pilophoron.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Lecideidar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 117: g. Cladoniaceor. — Par. Th. Fries 1857. Nov. Act. Ups. ser. tert. II. 2. p. 313. (Monogr.) Sect.: Eustereocaulon, Chondrocaulon.

*) στερεός, rigidus, durus.

Stereocaulon Schreb. cont.
Math. 1853. Belg. II. p. 111: g. Lichenear. sect. 2.
Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 11 (Flora 1854. p. 234): g. Stereocaulear. *Cf.* Nyl. 1858. Flora I. p. 115 et Th. Fries ibid. p. 515. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 328.
Synon. Thamnium Vent. pt.

Stereocaulon „Hook. & Harv." Trevisan in Linnaea XXII. p. 446 in synon. Stereothaliae: vid. *seq.*

Stereocladon Hook. f. & Harv. 1845. Lond. journ. bot. IX. p. 250 (Crypt. antarct. t. 174): nov. g. Fucoidear. (St. Lyallii.) *Cf. praeced.*
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 83 in adnot.: g. Dictyotear.?
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubiae affinitatis.
= Dictyosiphon Grev.?

Stereococcus Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 379: nov. g. Algar. (St. viridis.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 366.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326 (Flora 1843. p. 92): g. Nostochinar.
Menegh. 1842. Mon. Nostoch. p. . . . .: g. Protococcoidear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 10. n. 5. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Protococcidar.
= Gongrosira Kütz.

Stereoderma Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: g. Jasminear.
Endl. 1838. Gen. n. 3351. p. 572; 1841. Ench. p. 286: g. Oleinear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 258. — Meisn. 1839. Gen. p. 256(166). — DC. 1844. Pr. VIII. 290. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 550.
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5241: g. Oleinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617: g. Olear.
Synon. Pachyderma Blume.

Stereodon Brid. 1827. Bryol. II. p. 550: sect. Hypni. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 566 *b.* p. 55; 1841. Ench. p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 944. 2.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Hypnor.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 578: g. Hypneor.
= Hypni Linn. pars.

Stereogonata *) Lyngbye 1819. Tent. hydroph. dan. p. XXXI. 101: sect. 3 Hydrophytor. Gen.: Lomentaria, Cladostephus, Sphacelaria, Hutchinsia, Ceramium.

Stereonema Kütz. 1835. Alg. aq. dulc. dec. XVI; 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phycol. gener. p. 158; 1845. Phycol. germ. p. 128; 1849. Sp. Alg. p. 160. n. 115: g. Phaeonemear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 68. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 26.
Menegh. 1838. Cenni p. 28: g. Leptomitear. (?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 614.
Cohn 1854. Nov. Act. Leop. XXIV. 1. p. 109: genus delendum declarat.

*) στερεός, solidus; γόνυ, genu, articulus.

Stereosandra Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 176: nov. g. Epipogiear. (St. javanica.)
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 717: g. Arethusear.

Stereospermum Chamisso 1832. Linnaea VII. p. 720: nov. g. Bignoniacear. (St. Kunthianum.) — Par. Endl. 1839. Gen. p. 714. n. 431 (dubium). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131. — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4570. — Lindl. 1847. Veg. p. 677.
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 124: g. Eubignoniear. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 300(209); 1845. Pr. IX. p. 210: g. Catalpear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 755.
Endl. 1841. Ench. p. 346. n. $4118/_2$: g. Tecomear.

Stereothalami *) Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXIX: ordo Lichenum. Gen.: Pulveraria, Lepraria, Spiloma, Variolaria.

Stereothalia Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 446: nov. g. Scytosiphonear.? („*Stereocaulon Hook. & Harv.*")
= Stereocladon Hook. f. & Harv.

Stereoxylon **) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 38. t. 6; 1802. Fl. peruv. III. p. 13. t. 234—238: nov. g. Pentandr. Monogyn.
= Escallonia Mutis.

Stereoxylum Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 48: sect. Escalloniae.

Stereum Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 35: nov. g. Fungor. *Cf.* Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 15 et Leman 1827. Dict. v. 50. p. 518.
Pers. 1797. Tent. p. 30: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVIII. 566; 1822. Mycol. eur. I. p. 116: sect. Thelephorae. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 104. — Leman 1828. Dict. v. 53. p. 446. — Fries 1828. Elench. I. p. 172. (subtrib.) — Spreng. 1831. Gen. II. p. 764. — Endl. 1836. Gen. n. 437 *h*. p. 39; 1841. Ench. p. 21. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 392. — Bonord. 1851. Hdb. p. 162. — Math. 1853. Belg. II. p. 315.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 39: g. Fungor. primae seriei.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 155; 1818. II. p. 274.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12. 23: g. Exosporior.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 652: g. Thelephoridear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 84; 1838. Epicr. p. 545; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 332: g. Auricularinor. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 76; 1842. Pl. cell. Cub. p. 374. — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 238. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Thelephoreor.

Stereum Pers. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 323: g. Auricularior.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 461: g. Hydneor.
Fries 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 137: g. Auriculinor.
Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 109. (Flora 1852. p. 683.) Subg.: Malachodermum. (St. vitile Fr.)
Synon. Auriculariae sp. Auct.

Sterigma *) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 242; 1821. Syst. II. p. 579; 1824. Prodr. I. p. 212: g. Anchoniear. — Par. C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 209. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 226. — Meisn. 1837. Gen. p. 14(13). — Endl. 1839. Gen. n. 4946. p. 882; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 215. — Walp. 1843. Rep. II. p. 762. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 26.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 854. n. 2271; 1831. Gen. II. p. 513. n. 2515: g. Synclistar.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 322: g. Lomentacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6909: g. Goldbachiear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 728: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Anchonidar.
Synon. Sterigmostemum M-Bieb.; Sterigmostemon Poir.; Arthrolobus Stev.; Arthrolobos Wittst.

Sterigmostemon Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 519: g. Cruciferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 181. n. 4717: g. Anchionear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259: g. Goldbachiear.
= *seq.*

Sterigmostemum Marsch.-Bieb. 1819. Fl. taur. cauc. III. p. 444: nov. g. Tetradynam. Siliquos. (Cheiranthus tomentosus et torulosus MB. antea.)
= Sterigma DC.

Steripha **) „Banks & Sol." Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 81. t. 94. f. 6 (reniformis Sol. mss.).
= Dichondra Forst.

Steriphoma Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 130; 1830. Gen. I. p. 251. n. 1311: g. Capparidear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XIV. 82. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1069.
Endl. 1832. Flora II. p. 395; 1839. Gen. n. 5005. p. 894; 1841. Ench. p. 456: g. Capparear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 201 (*Steriphonia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
Rchb. 1841. Nom. p. 1816. n. 7117: g. Cadabear.
Synon. Stephania Will.; Römeria Tratt.

Steriphonia Walp. vid. *praeced.*

*) στερέω, privo, orbo.
**) Nomen a materiei firmitate.

*) στήριγμα, fundus, fulcrum.
**) στέριφος, durus, firmus.

Steris Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium. (Lychnis 3 Linn. sp. 436.)
= Viscaria Riv., Rupp.

Steris Linn. 1767. Mant. p. 8. n. 1254; 1767. Syst. ed. XII. p. 197: g. Pentandr. Digyn. (Burm. Fl. Ind. p. 73. t. 39.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 218; 1784. Syst. p. 264. — Reich. 1778. Gen. p. 127. n. 342. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 172. n. 440. — Gmel. 1791. Syst. p. 454. — Pers. 1797. Syst. p. 277.
Scop. 1777. Intr. p. 183: g. Luridar.
Neck. 1790. El. II. p. 61. n. 709: g. Arcythophytor.
= Hydrolea Linn.

Sternbergia*) Waldst. & Kit. 1805. Pl. hung. II. p. 172. t. 159: nov. g. ex typo Colchici monogyni MB.
Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 26 adnot.; 1809. En. p. 356. n. 393: g. Hexandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 239: g. Liliacear.
Link 1821. En. I. p. 315: g. Narcissinar.
Herb. 1821. App. p. 38; 1825. Bot. Mag. App. p. IV (*Sternebergia*): g. Amaryllidear. (Hippeastriformium, disjuncto Oporantho restrict.); 1837. Amaryll. p. 73. 186 (Oporanthiformium). — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Link 1829. Hdb. I. p. 198. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVIII. 793. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 87; 1841. Nom. p. 44. n. 1598. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Koch 1837. Syn. p. 702. Ed. II. p. 810. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 376. — D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 27.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 57. n. 1202; 1830. Gen. I. p. 276. n. 1434: g. Spathacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1186.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1237: g. Amaryllear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1270. p. 175; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 410. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 8. 44. Sect.: Sternbergia (Herb.), Oporanthus. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 114. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 252.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Dilatridear.
Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 2008: g. Amaryllidacear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 698: g. Sternbergiear. Sect. ut Römer.

Sternbergia Artis 1825. Antedil. Phyt. t. 8: nov. g. Equisetacear. foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 134 et Brongn. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 27.
Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 137; 1828. Prodr. p. 137: g. Monocotyledonar. foss.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 439.
= Artisia Sternb.

Sternbergieae Kunth 1850. Enum. V. p. 694: subtrib. Amaryllinear. Gen.: Gethyllis, Sternbergia, Tapeinanthus.

*) Dicat. Casp. Mar. comiti de Sternberg.

Sternebergia Herb. vid. *Sternbergia Waldst. & Kit.*

Steropa Fries 1815. Obs. myc. I. p. 99: sect. Merulii. (M. crucibulum, tremellosus.)

Sterophyllum Brid. mss.
= Fabronia Raddi.

Steropus*) Fries 1818. Obs. myc. II. p. 313: trib. Cortinariae. (Agaricus disgregus et plurimae Cortinariae acyaneae P.)

Sterrebeckia Fries vid. *Sterrebekia Link.*

Sterrebeellia Fries 1818. Obs. myc. II. p. 313: nov. g. pro Peziza coriaria Bull. propositum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 544.

Sterrebekia Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 44: nov. g. Gastromycor.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 559 (*Steerebeckia*): g. Lycoperdinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73 (*Steerbeckia*): g. Meruliear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 443 (*Sterrebeckia*): g. Sclerodermeor.
Conf. Actinodermium Nees.

Sterrojambosa**) Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 108: sect. Jambosae. (Eugenia grandis Wight.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 637. — Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 344; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 378.

Steudelia***) Spreng. 1822. Neue Entd. III. p. 59: nov. g. Büttnerear.
= Erythroxylon Kunth.

Steudelia Martius Nov. gen. t. 168. 169: vid. *Leonia Ruiz & Pav.*

Steudelia Presl 1830. Flora II. p. 631; 1830. Symb. I. p. 3. t. 2: nov. g. Paronychiar. (Pharnaceum glomeratum Steud. & Hochst.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 52 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 358.
Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 283: g. Illecebrear.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: g. Steudeliear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236. — Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95).
= Adenogramma Rchb.

Steudelieae Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: trib. Portulacear. Gen.: Steudelia, Portulacaria. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95). Gen. ead. et Adenogramma, Tetradiclis.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236: sect. Molluginear. Gen.: Adenogramma, Steudelia.
= Adenogrammeae Fenzl.

Stevartia Linn. Ord. natur., Rchb. vid. *Stewartia Linn.*

Stevartia Forsk. 1775. Aeg. p. 126 (ex Endl.)
= Sida Linn.

Stevena Andrz. Crucif. ined. (ex DC. Syst.)
= Berteroa DC.

Stevenia†) Adams & Fisch. 1820. Mém. soc. Mosc. V. p. 84: nov. g. Cruciferar. *Cf.* Syllog. Ratisb. II. p. 155. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 544.

*) στερός, sterilis. (?)
**) στεῤῥός, rigidus.
***) Dicat. Ern. Gottl. Steudel, Esslingensi.
†) Dicat. Chr. a Steven, botanico.

Stevenia Adams & Fisch. cont.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 230; 1821. Syst. II. p. 209; 1824. Pr. I. p. 141: g. Arabidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4791. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 160. — Meisn. 1837. Gen. p. 10 (10). — Endl. 1839. Gen. n. 4855. p. 865; 1841. Ench. p. 448. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 123.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 880. n. 2305; 1831. Gen. II. p. 519. n. 2552: g. Siliquosar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 633. 688.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Cardaminear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6991: g. Cheiranthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Arabidar.

Stevensia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 348. n. 1767: nov. g. Athrosophytor., a Lichene L. sejunctum.

Stevensia*) Poiteau 1804. Ann. Mus. IV. p. 235: nov. g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 438. — Pers. 1805. Ench. I. p. 392. n. 864. — Hedw. 1806. Gen. p. 224. n. 913. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 389. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 127. n. 1310; 1830. Gen. I. p. 243. n. 1271. — Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 546. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XVI. 95. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1051.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 99. t. 197.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 611: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2071. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 285. — DC. 1830. Pr. IV. p. 349. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 472. — Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Endl. 1838. Gen. n. 3279. p. 557; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2916: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.

Stevia**) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 32. t. 354—356: nov. g. Syngenes. (Polygam.) Aequal. (St. salicifolia.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 547. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1774. n. 1457; 1809. En. p. 854. — Pers. 1807. Ench. II. p. 402. n. 1823.
Lag. 1816. Nov. gen. et sp. p. 26: g. Discoidear. Sejungitur Palafoxia.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 546; 1826. Syst. III. p. 447. n. 2698; 1831. Gen. II. p. 613. n. 3034: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2237. — Bartl. 1830. Ord. p. 136.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 139: g. Eupatorear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 430.

*) Dicat. Edw. Stevens.
**) In memoriam Petri Jacobi Stevii, Hisp.

Stevia Cavan. cont.
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 10: g. Eupatoriear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46.
Link 1822. En. II. p. 308: g. Corymbiferar.
Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 227: g. Ageratear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 155. — DC. 1836. Pr. V. p. 115. — Endl. 1838. Gen. n. 2264. p. 367; 1841. Ench. p. 233. Sect.: Achaetostevia, Chaetostevia, Polychaete. — Meisn. 1838. Gen. p. 180 (124). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 281. — Walp. 1843. Rep. II. p. 546; 1847. VI. p. 107. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 153.
Link 1829. Hdb. I. p. 768: g. Coreopsidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3820: g. Steviear. Sect.: Achaetostevia, Stevia, Polychaeta.
Schltd. 1842. Linnaea XVI. p. 323. 367. (Spec. mexicanae.)
Synon. Mustelia Spreng.

Stevieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 97: sect. Ageratear. Gen.: Coelestinia, Ageratum, Anisochaeta, Adenostemma, Sclerolepis, Phania, Stevia, Palafoxia, Carelia, Agrianthus, Ophryosporus?

Stevogtia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 23. n. 642: nov. g. Darinyphytor., a Convolvulo L. sejunctum.

Stewartia Linn. 1741. Act. soc. Upsal. p. 79. n. 1025: nov. g. Polyandr. Monogyn.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
Linn. 1753. Sp. II. p. 698; 1759. Syst. ed. X. p. 1150. n. 758; 1763. Sp. ed. II. p. 982; 1764. Gen. ed. VI. p. 356. n. 847; 1767. Syst. ed. XII. p. 464: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 525; 1784. Syst. p. 631. — Reich. 1778. Gen. p. 355. n. 912. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 470. n. 1142. — Gmel. 1791. Syst. p. 1068. — Pers. 1797. Syst. p. 669. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 43. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 84.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Malvar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 398.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 288. — Gis. 1792. Prael. p. 453.
Gled. 1764. Syst. p. 234. n. 967: g. Petalostemonum.
Cavan. 1788. Diss. V. p. 303. t. 159: g. Malvacear. Disjungitur Malachodendron. *Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 135. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 553.
Juss. 1789. Gen. p. 292: g. Tiliacear. (verar.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 94. — Pers. 1807. Ench. II. p. 66. n. 1269.
Neck. 1790. El. II. p. 416. n. 1239: g. Omoplephytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 802: g. Sidear.
DC. 1824. Pr. I. p. 528: g. Gordoniear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 126. n. 2459. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI (*Stevartia*). — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 78.
Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 378. 406: g. Ternströmiacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 41 (30).

Stewartia Linn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5413; 1837. Hdb. p. 302: g. Ternströmiear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 561. n. 2740.
Bartl. 1830. Ord. p. 385: g. Camelliaceis aff.
Link 1831. Hdb. II. p. 348: g. Camelliacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5423 *b*. p. 1022; 1841. Ench. p. 531: sect. Stuartiae.
Synon. Stuartia L'Herit.

Sthälina Lagasca Nov. gen. et spec. p. 24: sphalm. pro *Stähelina*.

Stibadotheca*) Klotzsch 1855. Begon. p. 248: nov. g. Isopterygear. (Begonia magnifica Warsc.)

Stibas Comm. mss.
= Phyllachne Forst.

Stibasia „Presl mss." Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 92: nov. g. Marattiacear. (Nomen.)
Presl 1847. Pterid. suppl. p. 275: g. Marattiear. (Marattia alata Hook. & Arn.) — Par. Vriese & Hart. 1853. Mon. Maratt.

Stichenus Rchb. vid. *seq.*

Sticherus**) Presl 1836. Pterid. p. 51: nov. g. Gleicheniacear. (Mertensia laevigata W.) — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 35.
Endl. 1841. Spl. I. n. 659 *b*. p. 1351; 1841. Ench. p. 40: sect. Gleicheniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1043. 2 (*Stichenus*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Gleichenear.

Stichocarpus***) Agardh 1827. Flora II. p. 637: nov. g. Ceramiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 ^{a}. n. 498 ^{c}: g. Sphaerococcear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 66: subg. Dasyae.
= Dasyae Agardh pars.

Stichococcus Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 76: g. Tetrasporear.

Stichodias Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 137: subsect. Acranthii.

Stichophora Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 32. n. 122/$_{7}$ *e*: sect. Sargassi. (S. Hornschuchii Ag.)
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 282; 1849. Sp. Alg. p. 627. n. 422: g. Sargassear.

Stichophyllum Philippi 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Portulacear. (*Cf.* Phil. 1860. Fl. Atacam. p. 19. t. 1. f. D.)

Stichorchis (*Stichorckis?*) Petit - Thouars . . . . . . teste Leman 1827. Dict. v. 51. p. 1
= Malaxis Swartz.

Stickmannia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 171. n. 1525: nov. g. Ymnodiphytor., e speciebus Commelinae Aubl. compositum. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 51. p. 1.

Sticta†) Schreb. 1791. Gen. II. p. 768: sect. Lichenis. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 2. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 821.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 156: g. Lichenum. (foliaceor.) — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 404; 1815. V. p. 190. — Mart. 1817. Erlang. p. 201. (scutellator.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIV: g. Coenothalamor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 42: g. Coenothalamior.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 86. 445; 1814. Syn. Lich. p. 230: g. Discoideor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 429: g. Peltidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Lobiolatar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 20: g. Parmeliacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 241; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 104; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 144. — Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 403; 1841. Nom. p. 17. n. 567. Sect. (1841): Sticta, Delisea. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71. — Genth 1836. Nass. I. p. 337. — Endl. 1836. Gen. n. 173. p. 15; 1841. Ench. p. 11. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 105; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 34. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 64. (genuinar.) — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 5; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 65. — Bayrh. 1849. Taun. p. 63. — Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 273. Sect.: Chrysosticta, Damaecornes, Foliosae, Hirsutae.
Delise 1825. Mon. du genre Sticta. (Paris.)
Meyer 1825. Flecht. p. 335: g. Hymenocarpor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 188. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 302. n. 3379; 1831. Gen. II. p. 746. n. 3778.
Fries 1831. Lich. eur. p. 2. 49: g. Parmeliear. — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 233; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349. — Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 214. — Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13. (Flora 1854. p. 235.)
De Notar. . . . . Mem. Ac. Torin. Ser. II. (Monogr.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Parmeliadar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 30: g. Parmeliaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 93: g. Lichenear.
Arnold 1858. Flora I. p. 108: g. Sticteaг.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 361: g. Imbricariear.
Synon. Pulmonaria Hoffm.; Lobaria Hoffm.?; Dermatodea Vent. pt.; Reticularia Baumg.; Crocodia Link; Plectocarpon Fée?

Sticteae Arnold 1858. Flora I. p. 108: trib., Parmeliacear. Gen.: Sticta.

Stictei Fries 1825. Pl. homon. p. 86: trib. Elvellaceor. Gen.: Stictis, Solenia.
Rchb. 1828. Consp. p. 13: subdiv. Helvellarior. Gen. ead.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: sect. Cyathideor. Gen.: Stictis, Cryptodiscus, Godronia, Melittosporium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 345. 372: ordo Discomycetum. Gen.: Cryptomyces, Propolis, Xylographa, Stictis, Naevia, Seriella. (*Synon. Cupulati Endl., Helvellaceor. trib. I.*)

*) *στιβάς*, cubile; *θήκη*, theca.
**) *στιχηρός*, seriatus.
***) *στίχη*, series.
†) *στικτός*, punctus, maculatus.

Stictideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: trib. Pezizacear. Gen.: Stictis, Solenia.

Stictis Pers. 1799. Obs. mycol. II. p. 73; 1801. Syn. p. XIX. 674: sect. Pezizae. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 6.
DC. 1805. Franç. II. p. 270: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 41: g. Fungor. alter. seriei.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 663: g. Pezizadear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 335: g. Helvelloideor. Sect.: Stictis, Alomea.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Acetabulear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 191; 1828. Elench. II. p. 24: g. Dermear. Subgen.: Stictis, Corticia, Xylographa, Propolis.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 571: g. Pezizear. — Par. Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 38; 1842. V. p. 36; 1842. Mycol. p. 152. — Math. 1853. Belg. II. p. 268.
Fries 1825. Pl. homon. p. 86; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 373: g. Sticteor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 309. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 34.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Pezizoideor. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 767. n. 3926.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 992: g. Cupulator. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 423. p. 36; 1841. Ench. p. 20. Sect. ut Fries 1823. (Eustictis loco Stictidis.) — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 439. Sect. eaed. exclusa Propolide.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Stictidear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 442: g. Hymenomycetum angiosporor.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 81; 1842. Pl. cell. Cub. p. 355: g. Discomycetum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 331: g. Dermeor. Sect.: Propolis, Mellitiosporium, Cryptodiscus, Xylographa, Corticia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 199: g. Patellariaceor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 61.

Stictogeum Seringe 1823. Mém. soc. Genève II. p. 139; 1825 in DC. Prodr. II. p. 553: sect. Gei.
= Coluria R. Brown.

Stictoneis Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 91: sect. Stauroneidis.

Stictophylla DC. 1837. Prodr. VI. p. 285: sect. Polychaetiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2780 *a*. p. 453; 1841. Ench. p. 244. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3539. 1.

Stictophyllum Edgeworth 1846. Linn. Trans. XX. 1. p. 78.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 308: g. Serratulear.

Stictophyllum Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 1: nov. g. Heterocarpear. (Halymenia membranacea Harv.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubiae affinitatis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 874. n. 575: g. Delesseriear.

Stictosiphonia Hook. & Harv. 1845. Crypt. antarct. p. 77.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 57: subg. Bostrychiae.

Stictyosiphon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phycol. gener. p. 301; 1845. Phycol. germ. p. 248: nov. g. Enteromorphear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 133.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 80 in adnot.: g. Dictyotear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 484. n. 303: g. Dictyosiphonear.

Sticfia Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 40: nov. g. ex typo Salviae coloratae L.

Stifftia*) Mikan 1820. Del. fl. Bras. I. (Flora 1821. I. p. 113): nov. g. Cynarocephalar.
Cass. 1827. Dict. v. 51. p. 9; 1830. v. 60. p. 570: g. Stähelinear. *Cf. Stiftia Cass.*
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 291: g. Stifftiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 35: g. Mutisiear.
= Augusta Leandro.

Stifftia Nardo 1834 in Oken Isis XXVII. p. 677: nov. g. Algar. (Zonariae squamariae var. Nacc.)
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 273 (*Stiftia*): g. Dictyotear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 181 (*Stiftia*). — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56 (*Stiftia*).
= Zonaria Agdh.

Stifftieae D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 291: trib. Labiatiflorar. Gen: Stifftia, Anastraphia, Pentaphorus.

Stiftia „Mik." Cassini 1827. Dict. v. 47. p. 499. 511: g. Stähelinear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10.
Less. 1830. Linnaea V. p. 263; 1832. Syn. p. 103: g. Mutisiear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 26: g. Eumutisiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 230(142).
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3791: g. Chuquiragear.
= Stifftia Mik.

Stiftia Pohl Ic. h. imp. Vindob. n. 3151.
= Ebermaiera Nees.

Stiftia Kütz., Rabenh., Mont. vid. *Stifftia Nardo.*

Stigeoclonium Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 352. n. 240: g. Ulothrichear.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 222: g. Draparnaldiear.
Math. 1853. Belg. II. p. 515: g. Rivulariear.
= Stygeoclonium Kütz.

Stigmanthus**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 146. Ed. Willd. p. 181: nov. g. Pentandr. Monogyn., Mussaendae aff. (St. cymosus.)
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XV. 225. n. 912 (*Stigmatanthus*): g. Rubiacear. — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 390. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 13.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2076: g. Cinchonear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 469: g. Guettardear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 212 (*Stigma-*

*) Dicat. Andr. Jos. de Stifft, archiatro.
**) Nomen a magnitudine exotica stigmatis.

Stigmanthus Lour. cont. *tanthus*). — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 560. — Meisn. 1838. Gen. p. 167(117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2867.
Endl. 1838. Gen. n. 3217. p. 544; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.

Stigmaphyllon A. Juss. 1833 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 48. t. 170. 171: nov. g. Malpighiacear. (Banisteria ciliata Lam., etc.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 845 (*Stigmaphyllum*). — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 153 (*Stigmatophyllum*). — Brongn. 1843. En. genr. p. 86.
Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39 *Stigmatophyllon*). 347: g. Banisteriear. — Par. Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 201; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 36. — A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 287; 1843. Arch. Mus. III. p. 357. t. 12. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7860. — Walp. 1846. Rep. V. p. 202. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 372.
Endl. 1840. Gen. n. 5581. p. 1062; 1841. Ench. p. 557: g. Notopterygiar.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1587 (*Sigmatophyllum*): g. Malpighiear.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 264: g. Banisteriar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Banisterear.

Stigmaphyllum Wittst. vid. *praeced.*

Stigmaria Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 228: g. Vegetabilium foss. class. II. (*Variolaria Sternb.*)
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXVIII: g. Dicotyledonum foss.
Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 93; 1828. Prodr. p. 88: g. foss. Lycopodiacear.
Lindl. 1835. Foss. fl. III. n. 17. t. 166.
Endl. 1836. Gen. p. 69. n. 694: g. foss. Isoëteis aff.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 441: g. Euphorbiacear.
Brongn. 1839. Arch. Mus. I. p. 426. t. 29 (St. ficoides). Structura interna.
Endl. 1841. Ench. n. 694. p. 46; 1842. Spl. II. p. 5: g. Stigmariear. — Par. Unger 1845. Syn. p. 115; 1846. Chlor. prot. p. LIII.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 32: g. Sigillariear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 35; 1849. ibid. XIII. p. 105.
Synon. Variolaria Sternb.; Anabathra With.; Ficoidites Artis; Sedeites . . . ?

Stigmariae Unger 1838. Aphor. p. . . .: ordo class. VIII. Acrobryor.
Endl. 1841. Ench. p. 46: fam. Isoëteis aff. Gen.: Stigmaria.
Göpp. 1841. Gatt. foss. Pfl. p. . . . Nova gen.: Ancistrophyllum?, Didymophyllon.
Unger 1842 in Endl. Spl. II. p. 5; 1845. Syn. p. 115; 1846. Chlor. prot. p. LIII: ordo Selaginum. Gen.: Stigmaria et 1846: Didymophyllon, Ancistrophyllum.

Stigmarota*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 633. Ed. Willd. p. 778: nov. g. Dioec. Polyandr. (St. Jangomas et africana.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 13.
DC. 1824. Pr. I. p. 257: g. Flacourtiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4882; 1837. Hdb. p. 267. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 292. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 133.
Bartl. 1830. Ord. p. 279: g. Flacourtianear.
= Flacourtiae Comm. pars.

Stigmasphaera Dumort. vid. *Stigmatisphaera Dumort.*

Stigmaspherae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: trib. Sphaeriacear. Gen.: Corynesphaera, Mitrosphaera, Xylosphaera, Discosphaera, Porosphaera, Ephedrosphaera, Gamosphaera, Thallosphaera, Stigmasphaera.

Stigmatanthus Röm. & Schult., Bartl., vid. *Stigmanthus Lour.*

Stigmatea Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 421: nov. g. Phyllosticteor. (St. conferta, maculaeformis, etc.) Subg.: Coleroa.

Stigmatidium G. F. W. Meyer 1825. Entw. Flecht. p. 328: nov. g. Myelocarpor. (Porina compuncta Ach., etc.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 16. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 243. n. 3366; 1831. Gen. II. p. 743. n. 3761.
Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 366: g. Porinear. Sect.: Nematora, Phyllocharis, Craspedon, Melanophthalmum.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 16: g. Verruceariear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 95: g. Endocarpear.
Math. 1853. Belg. II. p. 131: g. Lichenear. sect. 4.
Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 236): g. Graphidear.
= Sagedia Fries?

Stigmatisphaera Dumort. 1822. Comment. bot. p. 89: g. Sphaeriear. (Sphaeria porphyrogona, rubella, etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74 (*Stigmasphaera*): g. Stigmaspherar.

Stigmatococca Willd. mss. 1827 in Schult. Mant. III. p. 3. 55: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (St. solanacea.)
Endl. 1839. Gen. p. 669; 1841. Ench. p. 332. n. $3874/_1$: g. dubium Solanacear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 125. 956. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622.
Meisn. 1839. Gen. p. 227(184): g. Solanear. ?

Stigmatomma**) Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 337: nov. g. Verrucariear. (Lecanora cervina var. protuberans Schär.)
Synon. Paraphysorma Massal. (Dermatocarpon Massal.)

Stigmatophyllon Meisn. vid. *Stigmaphyllon A. Juss.*

Stigmatophyllum Spach vid. *praeced.*

*) „Nomen a stigmate in formam rotae expanso, radiato."
**) *στίγμα*, punctum; *ὄμμα*, oculus.

Stigmatosori Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 372: trib. Polypodiacear. Gen.: Amphidesmium, Polypodium.

Stigmatostemon Mönch 1794. Meth. p. 4. 41. 167; 1798. Einleit. p. 228: class. VII. plantar.

Stigmatotheca Schultz Bip. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 255; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 198: nov. g. Euchrysanthemear. Sect.: Eustigmatotheca, Otopappus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Chrysanthemear.

Stigmea Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 556: sect. Xylomatis.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 329: g. Pyrenomycetum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Sphaeriaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.

Stigmella „Léveillé in Voy. Demid." Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 426: g. Ascosporeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Sphaeronaemeor.

Stigonema *) Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXII. 42: nov. g. Lichenoidear. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 37.
Leman 1827. Dict. v. 51. p. 20: g. Algar. articulatar.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 364. n. 3428; 1831. Gen. II. p. 755. n. 3836: g. Solenotar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 87.
Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 457: g. Oscillatorinar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 46. p. 4; 1841. Ench. p. 3.
Menegh. 1838. Cenni p. 29: g. Lyngbyear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 627. — Trevis. 1842. Fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467.) — Nägeli 1847. Alg. Syst.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 153: g. Oscillatoriear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Ulvacear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 18. n. 56. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg.: g. Stigonemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.
Jessen 1848. Prasiolae mon.: g. Blastosporear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 318. n. 216: g. Scytonemear.
Synon. Girardia Gray.

Stigonemeae Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. ... : sect. Scytonemear. Gen.: Stigonema, Hassallia, Scytonema, Petalonema, Arthronema.

Stilaginaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 179) 1847. Veg. kingd. p. 259: ordo Urticalium. Gen.: Antidesma, Stilago, Falconeria.
= Antidesmeae Sweet.

Stilagineae Agardh 1825. Aphor. p. 199; 1825. Class. plant. p. 9; 1826. Isis p. 585: ordo Micranthar. Gen.: Antidesma, Stilago.

*) στίζω s. στίγω, pungo.

Stilagineae Agardh cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. Urticariear. Gen. ead.
Lindl. 1830. Nat. syst. p. 96. Clav.: ordo (81) Apetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 25: ordo Urticalium.
Mart. 1835. Consp. p. 14.
Rchb. 1841. Nom. p. 66: subdiv. Faginear. Gen.: Stilago, Antidesma, Falconeria, Pyrenacantha.
= Antidesmeae Sweet.

Stilaginella Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 240: nov. g. Antidesmear. (St. amazonica, etc.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 603: g. Wielandiidear.

Stilago Linn. 1767. Mant. p. 16. n. 1273; 1767. Syst. ed. XII. p. 597: g. Gynandr. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 683; 1784. Syst. p. 820. — Reich. 1778. Gen. p. 460. n. 1106. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 608. n. 1381. — Pers. 1797. Syst. p. 865.
Scop. 1777. Intr. p. 98: g. Disparium.
Neck. 1790. El. III. p. 108. n. 1436: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 107: g. Triandr. Monogyn.
Roxb. 1798. Corom. II. p. 35. t. 166; 1832. Ind. III. p. 757: g. Dioec. Triandr. — Par. Willd. 1805. Spec. IV. p. 714. n. 1760. — Pers. 1807. Ench. II. p. 605. n. 2185. — Blanco 1837. Filipin. p. 782.
Agdh. 1825. Aphor. p. 199: g. Stilaginear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2478.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5086: g. Phyllanthear.?
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 179; 1847. Veg. kd. p. 259: g. Stilaginacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1892 *a*. p. 287; 1841. Ench. p. 173: sect. Antidesmae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Hippomanear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Urticeis aff.
= Antidesma Linn.

Stilbaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 280; 1847. Veg. kingd. p. 607: ordo Gentianalium. Gen.: Stilbe, Campylostachys, Eurylobium.
A. DC. 1848. Pr. XII. p. 604: ordo (151) Corolliflorar. Gen. ut Lindl. et Euthystachys.
Clarke 1850 in Hook. Kew gard. misc. II. p. 348: ordo Diapensiaceis proximus. Char. emend.
Synon. Stilbineae Kunth; Stilbeae Rchb.; Stilbinae Lindl.

Stilbacei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: div. Gastromycetum. Gen.: Stilbum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: subordo Hyphomycetum. Gen.: Graphium, Stilbum, Corallodendron, Ceratopodium, Hyalopus, Doratomyces, Periconia, Phycomyces, Tubercularia, Periola, Ciliciopodium, Chaetostroma, Volutella, Blennoria, Fusarium, Illosporium, Epicoccum, Sphaerospora.

Stilbe *) Berg. 1767. Fl. cap. p. 30. t. 4. f. 6. Linn. 1771. Mant. II. p. 165. n. 1336: g. Polygam. Dioec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 772; 1784. Syst. p. 919. — Reich. 1778. Gen. p. 548. n. 1277. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 737. n. 1600. — Pers. 1797. Syst. p. 961. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 1116. n. 1916. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 393.

Scop. 1777. Intr. p. 203: g. Pseudocompositar.

Juss. 1789. Gen. p. 418: g. incertae sedis.

Neck. 1790. El. I. p. 117. n. 205: g. Psydomorphytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 226: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 29; 1818. Fl. cap. I. p. 533.

Pers. 1807. Ench. II. p. 612. n. 2197: g. Dioec. Tetrandr.

Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 2. 90. n. 412: g. Globulariar.?

Spreng. 1825. Syst. I. p. 417. n. 422: g. Verbenear.

Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 22: g. Epacridear.?

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII: g. Buchnerear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 80. n. 389: g. Globulariear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 128. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 427.

Kunth 1831. Abh. Berl. Ak. p. 206: g. Stilbinear. *Cf.* Ann. sc. nat. XXX. 1833. p. 335. — Par. E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 279. — Endl. 1838. Gen. n. 3724. p. 639; 1841. Ench. p. 315. — Meisn. 1840. Gen. p. 315(226). — Walp. 1845. Rep. IV. p. 171.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 280; 1847. Veg. kd. p. 608: g. Stilbacear. — Par. A. DC. 1848. Pr. XII. p. 606. Sect.: Amphistilbe, Eustilbe.

Rchb. 1837. Hdb. p. 203; 1841. Nom. p. 123. n. 4789: g. Stilbear.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 245: g. Selagineis aff.

Synon. Nepa Petiv.; Lühea Schmidt.

Stilbeae Rchb. 1837. Handb. p. 203; 1841. Nomencl. p. 123: subdiv. Epacridear. Gen.: Campylostachys, Stilbe.

= Stilbaceae Lindl.

Stilbei Fries 1825. Pl. homon. p. 168: vid. *Stilbini Fries.*

Rchb. 1841. Nom. p. 5: subsect. Mucorinor. genuinor. Gen.: Periconia, Graphium, Stilbum, Sporocybe, Ciliciopodium, Gliocladium.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: sect. Sarcopsideor. Gen.: Hyalopus, Stilbum, Graphium, Melanostroma, Gloiocladium.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 468: div. Sporocybacear. Gen.: Corallomyces, Chordostylum, Stilbum, Graphium.

Stilbideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 563: div. Nematomycear. Gen.: Stilbum.

Stilbinae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 30: ordo Labialium.

= Stilbaceae Lindl.

*) Num Graecorum στίλβη, nitor, splendor?

Stilbineae Kunth 1831. Handb. Bot. p. 393; 1831. Abh. Berl. Ak. p. 205: ordo plantar. Gen.: Stilbe, Campylostachys. *Cf.* Ann. sc. nat. XXX. 1833. p. 336. — Par. E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 278.

Mart. 1835. Consp. p. 19.

Endl. 1838. Gen. p. 639; 1841. Ench. p. 314: ordo (138) Nuculiferar. Gen. ut Kunth. Accedit 1843 (Spl. III. p. 77) Eurylobium.

Meisn. 1840. Gen. p. 315(225): ordo Labiatiflorar. Gen. ut Kunth.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 68: fam. Verbeninear.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 38: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Gen. ead.

= Stilbaceae Lindl.

Stilbini Fries 1825. Pl. homon. p. 174: trib. Mucorinor. Gen.: Chordostylum, Stilbum.

Rchb. 1828. Consp. p. 7: subdiv. Mucorinor. Gen.: Stilbum, Chordostylium.

Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 16; 1839. III. p. 13; 1840. IV. p. 29; 1842. V. p. 15; 1842. Mycol. p. LXIV. 58: fam. Hyphomycetum. Gen.: Hyalopus, Haplotrichum, Sporocybe, Cephalotrichum, Periconia, Doratomyces, Phycomyces, Cephalosporium, Rhopalomyces, Stilbum, Graphium, Ceratopodium, Ciliciopodium.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 118: subsect. Mucorinor. genuinor. Gen.: Periconia, Phycomyces, Graphium, Stilbum, Sporocybe, Ciliciopodium, Gliocladium.

Bonord. 1851. Hdb. p. 136: fam. Mycetinor. Gen.: Stysanus, Graphium, Stilbum, Sporocybe, Ceratopodium, Cephalotrichum, Coremium, Scleromitra.

Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 130: fam. Hyphomycetum. Gen.: Gomphinaria, Periconia, Cephalosporium, Oedocephalum, Stilbum, Graphium, Scopularia, Botryocladium.

Stilbocarpa Hook. f. 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 95: sect. Araliac. (A. polaris H. & J.)

Stilbodendrium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 117: nov. g. Basidiophoror. (Stilbum nodosum Corda.)

Stilboidei Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLVII: ordo Hyphomycetum. Gen.: Stilbum, Periconia.

Stilbospora Pers. 1795 in Usteri n. Ann. IX. p. 31; 1796. Obs. mycol. p. 31: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 34. — Par. Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. t. 13. f. 2. (Lomentaceor.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 248.

Pers. 1797. Tent. p. 13: g. Dermatocarpi.

Pers. 1801. Syn. p. XIII. 96: g. Sclerocarpor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46.

Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. XI: g. Xylomycor.

Rebent. 1804. Neom. p. 358: g. Gymnospermor.

Link 1809. Berl. Mag. III. p. 7: g. Epiphytar.

Strauss 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 81: sect. Uredinis.

DC. 1815. Franç. V. p. 149: g. Hypoxylor.

Stilbospora Pers. cont.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 30: g. Mucedinum entophytar.
Nees 1816. Syst. p. 21; 1817. Überbl. p. 4: g. Coniomycor. liberor.
DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 316. 333: g. Sphaeriar. Sect.: Stilbospora, Hygrochroma. — Par. Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384.
Mart. 1817. Erlang. p. 323: g. Coniomycetum (elementarium). — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 79. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 569. n. 3591 (liberor.); 1831. Gen. II. p. 786. n. 4078.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Hypodermior.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XXXIX; 1825. Pl. homon. p. 193; 1832. Syst. myc. III. 2. p. 483; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 508: g. Stilbosporeor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180. — Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 26; 1841. Nom. p. 2. n. 58. — Endl. 1836. Gen. n. 196. p. 17; 1841. Ench. p. 13. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 47. — Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 66.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 545: g. Stilbosporidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 526: g. Stilbosporear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 423.
Link 1825. Spec. II. p. 95: g. Gymnomycetum.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1039: g. Pulveraceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Spondylomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 178: g. Sporomycetum episporor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 14: g. Phragmidiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconieor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Bonord. 1851. Hdb. p. 46: g. Phragmidiaceor.
Conf. Rhabdosporium Chev.; Ceratosporium Schwein.; Cheirospora Moug.; Asterosporium Kunze; Asterospora Wallr.; Astrosporium Fries.

Stilbospora Montagne 1837. Ann. sc. nat. Dec. t. 18. f. 5.
= Cheirospora Fries.

Stilbosporeae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 526: trib. Uredinear. Gen.: Didymosporium, Septaria, Stilbospora, Asterosporium, Prostemium, Coryneum, Exosporium, Sporidesmium, Seiridium, Antennaria, Phragmotrichum.
Math. 1853. Belg. II. p. 423: sect. Melanconiear. Gen.: Stilbospora, Coniothecium, Epicoccum, Didymosporium, Prosthemium, Melanconium.

Stilbosporei Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XXXIX: subordo Entophytar. Gen.: Melanconium, Fusidium, Stilbospora, Naemaspora.

Stilbosporei Fries cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 192: trib. Entophytor. Gen.: Seiridium, Astrosporium, Cheirospora, Stilbospora, Didymosporium, Melanconium, Cryptosporium. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 3. Gen. ead. et Cylindrosporium.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: div. Epiphytor. Gen.: Cryptosporium, Fusidium, Hypodermium, Melanconium, Didymosporium, Stilbospora, Phoma, Melanosorium.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 477: ordo Coniomycetum. Gen.: Naemaspora, Septoria, Fusidium, Cryptosporium, Stilbospora, Didymosporium, Melanconium.
Endl. 1836. Gen. p. 17; 1841. Ench. p. 13: subordo Gymnomycetum. Gen. ut Fries 1832 et Entomycelium.
Rchb. 1841. Nom. p. 2: sect. Tuberculario r. Gen.: Myxosporium, Nemaspora, Fusidium, Septoria, Blennoria, Hypodermium, Melanconium, Trichoconium, Steganosporium, Dapsilosporium, Gymnosporium, Stilbospora, Sciniatosporium, Cryptosporium, Sporocadus. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 41. Gen. fere ead.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 66: fam. Stromatosporor. Gen.: Stilbospora, Melanconium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 507: div. Sporidesmiaceor. Gen.: Botryosporium, Sporotheca, Hyperomyxa, Cheirospora, Asterosporium, Stilbospora, Didymosporium, Melanconium, Papularia.
Conf. Stilbosporideae Gray, Stilbosporeae Brongn.

Stilbosporideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 533. 544: div. Protomycear. Gen.: Fusidium, Stilbospora.

Stilbum*) Tode 1790. Fung. Meckl. I. p. 10. t. 3: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 37. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1483.
Pers. 1797. Tent. p. 39: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XIX. 680; 1822. Mycol. eur. I. p. 347: g. Helvelloideor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 382.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 30: g. Gastromycor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 53: g. Dermatothecior.
Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 209.
DC. 1815. Franç. V. p. 15: g. Gymnocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 88; 1817. Überbl. p. 24: g. Sarcocephalor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 366.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Tuberculariar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 80: g. Mucedinum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 563: g. Stilbidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: g. Cephalosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 548: g. Isariear.?

*) στιλβός, nitidus, lucidus.

Stilbum Tode cont.

Fries 1825. Pl. homon. p. 175: g. Stilbinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 144. — Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 16; 1839. III. p. 13; 1842. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 61. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 120. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 132. — Bonord. 1851. Hdb. p. 137.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Stilbaceor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.

Leman 1826. Dict. v. 39. p. 376: g. Pezizoidear.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1033: g. Mucoroideor.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 545. n. 3548; 1831. Gen. II. p. 779. n. 4019: g. Cephalotrichor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Mucorinear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.

Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 299: g. Mucorinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 260. p. 22; 1841. Ench. p. 15.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 324: g. Hyphomycetum. (entosporor.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 307.

Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 20: g. Aspergillinor.

Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 215: g. Stilbeor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 469. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.

Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 68: g. Tubercularieor.

Math. 1853. Belg. II. p. 450: g. Mucorear.

Conf. Ciliciopodium Corda; Atractium Link.

Stilephora Rabenh. vid. *Stilophora Agdh.*

Stillingfleetia Bojer 1837. Hort. Mauritian. p. 284.

= Eustillingia Klotzsch.

Stillingia*) Garden 1767 in Linn. Mant. p. 19: g. Monoec. Adelph.

Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 637. n. 1279: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 724; 1784. Syst. p. 866. — Reich. 1778. Gen. p. 501. n. 1187. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 658. n. 1470. — Pers. 1797. Syst. p. 910. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 213. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 588. n. 1728; 1809. En. p. 996 (*Styllingia*). — Nutt. 1818. Gen. II. p. 226.

Scop. 1777. Intr. p. 240: g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 805. n. 3084; 1831. Gen. II. p. 686. n. 3460.

Juss. 1789. Gen. p. 390: g. Euphorbiar.

Neck. 1790. El. II. p. 340. n. 1132: g. Cyrtosiphytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 1003: g. Monadelph. Diandr.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 499: g. Tithymaloidear.

*) Dicat. Benj. Stillingfleet, botanico anglico.

Stillingia Garden cont.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 287: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 589. n. 2151. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 64. — Kunth 1822. Syn. I. p. 392. — Link 1822. En. II. p. 408. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 49. t. 16. f. 52. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 40.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 371: g. Euphorbiear. — Par. A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27.

Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5027; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7344: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 523. — Endl. 1840. Gen. n. 5780. p. 1110; 1841. Ench. p. 587; 1842. Spl. II. p. 88. (Sect. 1842 ut Klotzsch.) — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251). — Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 187. Subgen.: Eustillingia, Sapium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Huracear.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.

Baill. 1858. Euphorb. p. 509: g. Stillingiidear. ampliat. Sect.: Eustillingia, Triadica, Sapiopsis, Sapium, Bonania, Cnemidostachys, Elachocroton, Excaecaria, Gussonia, Sebastiania, Maprounea, Spirostachys, Sclerocroton, Sarothrostachys, Anomostachys.

Synon. Stillingfleetia Boj.; Sapium Jacq.; Triadica Lour.

Stillingieae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: trib. Euphorbiacear. Gen.: Maprounea, Adenopeltis, Colliguaia, Dactylostemon, Excoecaria, Gymnanthes, Sebastiania, Gussonia, Adenogyne, Sennefeldera, Actinostemon, Sarothrostachys, Styloceras, Commia, Synaspisma, Hura, Hippomane, Pachystemon, Omalanthus, Stillingia, Coelebogyne, Microstachys.

Conf. Hippomaneae Rchb.

Stillingiideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 509: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Stillingia, Falconeria, Omphalea, Gymnanthes, Actinostemon, Adenopeltis, Colliguaja, Sennefeldera, Omalanthus, Hippomane.

Stilophora Agardh 1827. Flora II. p. 642: nov. g. Ulvacear. (Solenia crinita Ag.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 831. 846 (corr. *Spilophora*).

Menegh. 1838. Cenni p. 41: g. Dictyotear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 144; 1849 in Orb. Dict. X. p. 56. — J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 6; 1842. Alg. medit. p. 42; 1848. Sp. Fuc. p. 83. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 139; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (*Stylophora*). *Cf.* Flora 1843. p. 93. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 761 (*Stylephora*). — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 358.

Zanard. 1843. Classif. p. 10: g. Sporochnear. — Par. Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 238.

Stilophora Agardh cont.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 184 (*Stilephora*): g. Chordear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ... : g. Stilophorear.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 435: g. Scytosiphonear.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 112: g. Dictyotacear.
= Spermatochnus Kütz.?

Stilophoreae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. ... : trib. Mesogloeacear. Gen.: Myriotrichia, Sphacelaria, Cladostephus, Elachista, Leathesia, Mesogloea, Chordaria, Stilophora, Scytosiphon, Cutleria, etc.

Stilosanthes Gmel. vid. *Stylosanthes Swartz.*

Stilpnogyne*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 293: nov. g. Erechtitear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2789. p. 455; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3548.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32: g. Senecionear. verar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Neurolaenear.

Stilpnoides DC. 1837. Prodr. VI. p. 92: sect. Morysiae.
Endl. 1838. Gen. n. 2692 *b*. p. 438; 1841. Ench. p. 242: sect. Saintmorysiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3849. 2 (*Stilpnopsis*).

Stilpnopappus „Martius" DC. 1836. Prodr. V. p. 75: nov. g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2218. p. 360; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123). — Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 228. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3882: g. Pacourinear.

Stilpnophyllum Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 35. n. 1859 *F:* sect. Ficus. (F. elastica Roxb.)
Synon. Macrophthalma Gasp.; Sycocarpus Miq. pt.

Stilpnophyton Lessing 1832. Syn. Compos. p. 264: nov. g. Artemisiear. (Tanacetum axillare Thunb.)
= seq.

Stilpnophytum DC. 1837. Prodr. VI. p. 92: g. Artemisiear. Sect.: Eustilpnophytum, Mesosteirus. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2693. p. 438; 1841. Ench. p. 242. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 212 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3452. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.
Synon. Stilpnophyton Less.

Stilpnopsis Rchb. vid. *Stilpnoides DC.*

Stipa Linn. 1753. Sp. I. p. 78; 1759. Syst. ed. X. p. 877. n. 84; 1762. Sp. ed. II. p. 115; 1764. Gen. ed. VI. p. 37. n. 90; 1767. Syst. ed. XII. p. 98: g. Triandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 85. — Murr. 1774. Syst. p. 104; 1784. Syst. p. 121. — Reich. 1778. Gen. p. 38. n. 96. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 51. n. 121. — Gmel. 1791. Syst. p. 191. — Pers. 1797. Syst. p. 125; 1805. Ench. I. p. 99. n. 178. — Willd. 1797. Sp. I. p. 440. n. 141; 1809. En. p. 98. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 229. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 401. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 58. — Trin. 1820. Fund. p. 110. Sect.: Aristella, Stipa. — Mert.&Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 370. 530.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 30. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 99. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 75. — DC. 1805. Franç. III. p. 27; 1815. V. p. 257. — Hedw. 1806. Gen. p. 40. n. 185. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 174. Ed. Nees p. 30. — Palis. 1812. Agrost. p. 18. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 15. 331. n. 226. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 254. n. 264. — Lois. 1827. Dict. v. 51. p. 42. — Link 1829. Hdb. I. p. 37.
Adans. 1763. Fam. II. p. 31: g. Phalaridum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 74. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1805. Gram. Austr. III. p. 4. t. 5. — Link 1821. En. I. p. 72. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 66. 170. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 80. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 59. n. 289. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 72 (sect.: Nassella, Aristella, Stipa); 1835. ibid. IV. (1838.) p. 35 (sect.: Stipa, Dichelachne).
Gled. 1764. Syst. p. 17. n. 63: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 181.
Hill 1769. Ht. kew. p. 401: g. Glumosar.
Neck. 1790. El. III. p. 217. n. 1590: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 125; 1822. Syn. I. p. 195; 1830. Gram. p. 59; 1833. Agrost. p. 179; 1838. Berol. II. p. 369: g. Stipacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 153. — Link 1827. Hort. I. p. 96. — Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 920 (sect.: Aristella, Jarava, Eriocoma); 1841. Nom. p. 35. n. 1199. Sect. ut Endl. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Endl. 1837. Gen. n. 798. p. 88; 1841. Ench. p. 57. Sect.: Aristella, Nasella, Stipa. — Koch 1837. Syn. p. 787. Ed. II. p. 908. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 31. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 300. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 11. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 55; 1850 in Webb Canar. III. p. 388. Sect.: Stipa (Bert.), Aristella. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 190. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 440. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 41. — Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 730. Sect. ut Trin. & Rupr. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 448. — Steud. 1854. Glum. I. p. 124. Sect.: Oreostipa, Neosti-

*) στιλπνός, lucidus.

Stipa Linn. cont.
pa, Schizachne, Eustipa, Aristella, Orthoraphium, Lasiagrostis, Macrochloa. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 492.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 157: g. Avenacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 149.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 675): g. Agrostideor. Sect. ut 1820.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 371; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 151; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 98: g. Stipear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 471. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Math. 1853. Belg. I. p. 602.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 28: g. Miliacear.
Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849) p. 25: g. Stipaceor. Sect.: Oreostipa, Jarava, Nesostipa, Schizachne, Eustipa.
Synon. Trichosathera Ehrh.

Stipa Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 110: sect. Stipac. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 798 c. p. 88; 1841. Ench. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1199. 3.
Conf. Eustipa Steud.

Stipacea Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6e sér. Vi. (1849) p. 1: div. Agrostideor. Gen.: Dichelachne, Streptachne, Urachne, Stipa, Aristella, Orthoraphium, Lasiagrostis, Anisopogon, Aristida.

Stipaceae Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 121; 1822. Syn. I. p. 192: trib. 2 Graminear. Gen.: Aristida, Arthratherum, Streptachne, Stipa, Oryzopsis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 153: div. Graminear. Gen.: Stipa. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 28. Gen.: Aristida, Curtopogon, Pentapogon, Streptachne, Stipa, Oryzopsis, Brachyelytrum.
Link 1827. Hort. I. p. 95: fam. Graminear. Gen.: Aristida, Stipa, Lasiagrostis.
Rchb. 1828. Consp. p. 50: subdiv. Agrostidear. Gen.: Brachyelytrum, Oryzopsis, Gymnopogon, Olyra, Stipa, Aristida, Streptachne, Pentapogon. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. Gen.: Oryzopsis, Piptatherum, Lasiagrostis, Dichelachne, Macrochloa, Stipa, Eriocoma, Streptachne, Aristida, Stipagrostis, Lygeum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Calliflorar. Gen.: Stipa, Streptachne, Piptatherum, Aristida.
Kunth 1830. Gram. p. 57; 1833. Agrost. p. 175: trib. 4 Graminear. Gen.: Oryzopsis, Piptatherum, Lasiagrostis, Macrochloa, Stipa, Streptachne, Aristida, Stipagrostis. — Par. Koch 1837. Syn. p. 786. Ed. II. p. 907. Gen.: Milium, Piptatherum, Stipa, Lasiagrostis. — Endl. 1837. Gen. p. 87. Gen. ut Kunth et Dichelachne, Eriocoma. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1353 et Ench. p. 57) Greenia et 1842 (Spl. II. p. 7) Orthorhaphium. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 432. Gen.: Urachne, Lasiagrostis, Stipa, Streptachne, Aristida. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). Gen. ut Endl. 1841. — Spach 1846. Vég. phan. XIII.

Stipaceae Kunth cont.
p. 160. 189. Gen. ead. et Jarava. — Steud. 1854. Glum. I. p. 120. Gen.: Dichelachne, Streptachne, Ortachne, Urachne, Eccoilopus, Stipa, Aristida, Dichaetaria.
Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 31: trib. 7 Graminear. Gen. europ.: Piptatherum, Stipa, Achnatherum.
Brongn. 1843. En. genr. p. 11: trib. Graminum. Gen. ex Kunth.
Parlat. 1845. Palerm. I. p. 49: trib. 3 Graminear. Gen.: Milium, Stipa, Aristida.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 438: div. Parallelanthar. Gen.: Milium, Urachne, Lasiagrostis, Gastridium, Chaeturus, Lagurus, Aristida, Stipa.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 357: cohors Agrostidear. Gen.: Aristida.

Stipagrostis Nees 1832. Linnaea VII. p. 290: nov. g. Stipear. (St. capensis.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Kunth 1833. Agrost. p. 197: g. Stipacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 902. p. 88; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 309. — Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1203. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.
Trin. & Rupr. 1842 in Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849). p. 163: sect. Aristidae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 748. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 451. — Steud. 1854. Glum. I. p. 143.

Stipandra Dietr. vid. *Stypandra R. Brown.*

Stipeae Nees 1829. Agrost. Bras. p. 371; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 148: fam. Graminear. Gen.: Stipa, Chaetaria.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 470: subtrib. Panicear. Gen.: Milium, Stipa.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80: subdiv. Agrostidear. Gen. ut Griseb. — Simil. Math. 1853. Belg. I. p. 602. Gen.: Stipa.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: trib. Graminacear. Gen. Stipacear. Endl.

Stipellaria Benth. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 2: nov. g. Euphorbiacear., Alchorneae et Rottlerae aff. (St. trewioides, mollis, etc.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 449: g. Dysopsidear.

Stipiza Rafin. . . . . . : g. Pezizariar., teste Leman 1826. Dict. v. 39. p. 376; 1827. v. 51. p. 45.

Stipopsis Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 377: sect. Andropogonis. (A. stipaeformis St.)

Stiptanthus Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 82: sect. Anisochili. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 957.

Stipthorpieae A. Juss. vid. *Sibthorpieae.*

Stipularia Palis. 1805. Fl. Owar. II. p. 26. t. 75. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 45.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXI. 269. n. 933: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 406. (minus cognitum.) — DC. 1830. Pr. IV. p. 619. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 664. — Endl. 1838. Gen. p. 566; 1841. Ench. p. 275. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2990.

Stipularia Palis. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Psychotriear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 197: g. Coffeacear.
Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119): g. Cephaëlidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.

Stipularia Haworth 1812. Syn. succ. p. 103. Ed. Schrank 1819. p. 112: nov. g. Decandr. Trigyn. (Arenaria media W. et marina.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 653: sect. Arenariae. (A. rubra L. et marginata DC.)
Conf. Spergularia Pers.

Stipulariae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 134: fam. Rubiacear. Gen.: Spermacoce, Hedyotis, Cuncea, Ophiorhiza, Geophila, Psychotria, Hamiltonia.

Stipuliceda A. Juss. vid. *seq.*

Stipulicida*) Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 26: nov. g. Triandr. Monogyn. (Holosteum cordatum L.) — Par. Elliott 1817. Sketch I. p. 51. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 29.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 24: g. Caryophyllear.
DC. 1828. Pr. III. p. 375: g. Polycarpaear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 92. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 493 (*Stipuliceda*).
Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4262; 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 162. n. 6290: g. Polycarpear.
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Spergulear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 133. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 173. — Endl. 1840. Gen. n. 5215. p. 961; 1841. Ench. p. 504.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205: g. Alsinear.
Meisn. 1838. Comm. p. 97: g. Spergulariear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 177: g. Illecebrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.

Stirlingia Endl. 1838. Gen. n. 2133. p. 339; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 81: g. Conospermear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401. — Meisn. 1841. Gen. p. 332 (244); 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 515; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 325. — Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2409.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Conospermidar.
Synon. Simsia R. Brown.

Stissera**) Giseke 1792 in Linn. Prael. p. 199. 207. 228: nov. g. Scitaminear. (Curcuma longa Kön.)
= Curcuma Linn.

Stisseria Scopoli 1777. Introd. p. 199. n. 874: nov. g. Speciosar. (*Manyl-Kara* Ht. Malab. IV. t. 25.)
= Mimusops Linn.

*) Nomen a stipulis incisis.
**) Dicat. J. A. Stisser.

Stitzolobium Rchb., Link vid. *Stizolobium P. Browne.*

Stixis*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 295. Ed. Willd. p. 361: nov. g. Dodecandr. Monogyn. (St. scandens.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 370. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 461. n. 1784; 1841. Gen. I. p. 396. n. 1987. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3 (26 *Styxis*).
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 48: g. incertum, parum notum. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5584. — Endl. 1841. Gen. n. 6856. p. 1329; 1841. Ench. p. 685.
Meisn. 1841. Comm. p. 250: g. Euphorbiacear.?
= Apactis Thunb.? (Juss.)

Stiza**) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 31: nov. g. Genistear. (Lebeckia pungens Thunb.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. III. p. 554.
Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 355: sect. Lebeckiae.
= Acanthobotrya Eckl. & Zeyh.

Stizolobium P. Browne 1756. Jamaic. p. 290. t. 31: nov. g. Diadelph. Decandr. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 849 (*Strizolobium*). — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 298. n. 1704.
Link 1822. En. II. p. 233: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 252. n. 2564; 1831. Gen. II. p. 585. n. 2877.
DC. 1825. Pr. II. p. 405: sect. Mucunae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3949 *b* (*Stitzolobium*); 1841. Nom. p. 149. n. 5821. 2. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 364. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 338. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 254. — Endl. 1841. Gen. n. 6665 *b*. p. 1295; 1841. Ench. p. 671. — Walp. 1842. Rep. I. p. 767. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 211.
Link 1831. Hdb. II. p. 181 (*Stitzolobium*): g. Phaseolear.
Synon. Macuna Scop.

Stizolophus Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1827. v. 51. p. 49; 1830. v. 60. p. 571: nov. g. Jaceinear. verar.
DC. 1837. Pr. VI. p. 574: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *k*. p. 473; 1841. Ench. p. 246. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 694.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 2 *e*: subsect. Centaureae.
C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 423: g. Centauriear.

Stobaea***) Thunb. 1800. Prodr. II. p. 141. 193: nov. g. Syngenes. Hermaphrodit.
Thunb. 1801. Nov. gen. XV. p. 183; 1818. Fl. cap. p. 620: g. Syngenes. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1703. n. 1442. — Pers. 1807. Ench. II. p. 382. n. 1795.

*) στίξις, punctio: a punctis, quibus drupa distinguitur.
**) στίζω, pungo.
***) Dicat. Stobaeo, prof. Lund.

Stobaea Thunb. cont.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 154: g. Carduacear.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 110: g. Carlinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2298. — Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 394. n. 2658; 1831. Gen. II. p. 608. n. 2996: g. Cynarear.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 498; 1830. v. 60. p. 570: g. Xeranthemear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 57: g. Flosculosar.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 90; 1832. Syn. p. 65: g. Arctotidear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 514: g. Gorteriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3846. p. 466; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223(139). — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3647. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 279.
Synon. Apuleja Gärtn.; Arelina Neck.?

Stockesia Endl., Rchb. vid. *Stokesia L'Her.*

Stocksia*) Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 304: nov g. Dodonaeear. (St. Brahuica.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 374: g. Sapindear.

Stoebe**) „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 206. Ed. Hall. 1745. p. 211: g. pl. class. VIII.
Linn. 1737. Cliff. p. 390; 1737. Coroll. p. 14. n. 975; 1742. Gen. ed. II. p. 391. n. 768; 1753. Sp. II. p. 831; 1759. Syst. ed. X. p. 1202. n. 839: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 240. n. 986: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cinarocephalar.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1315; 1764. Gen. ed. VI. p. 454. n. 1001; 1767. Syst. ed. XII. p. 581: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 664; 1784. Syst. p. 798. — Reich. 1778. Gen. p. 449. n. 1086. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 594. n. 1357. — Gmel. 1791. Syst. p. 1281. — Pers. 1797. Syst. p. 839. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2403. n. 1586. — Link 1822. En. II. p. 367.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.
Neck. 1790. El. I. p. 94. n. 171: g. Siphoniphytor. Sejungitur Wigandia.
Batsch 1802. Tab. p. 253: g. Corymbiferar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 554; 1826. Syst. III. p. 441. n. 2686; 1831. Gen. II. p. 612. n. 3025: g. Eupatorinar.
Poir. 1827. Dict. v. 50. p. 431: g. Flosculosar.
Cass. 1827. Dict. (v. 49. p. 224) v. 51. p. 59: g. Seriphiear. (verar.) Sect.: Eustoebe, Etaeranthis, Eremanthis. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 259. Sect.: Eustoebe, Alopecuroides.

Stoebe Riv. cont.
— Endl. 1838. Gen. n. 2760. p. 450; 1841. Ench. p. 243. Sect. ut DC. — Meisn. 1839. Gen. p. 217(137). — Fenzl 1839. Flora II. p. 728. — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3923. Sect.: Stoebe, Alopecuria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 249.
Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2439: g. Gnaphaliear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 345: g. Helichrysear. emend. Subgen.: Stoebe, Eustoebe.
Synon. Helichrysoides Vaill.; Staebe Juss.; Selago Burm.

Stoebe Pers. 1807. Ench. II. p. 485: sect. Centaureae. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1543; 1831. Fl. exc. p. 215. (C. solstitialis.)

Stoechadina DC. 1837. Prodr. VI. p. 181: sect. Chrysolepideae.

Stoechado-Mentha Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 194. n. 412: g. Didynam. obscurum. (*Ghonakola Herm.* zeyl. 1. 57.)
= . . . ?

Stoechas*) Tourn. 1700. Inst. p. 201. t. 95: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 230. Ed. Hall. 1745. p. 235: g. pl. class. IX.
Adans. 1763. Fam. II. p. 188: g. Labiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2856 *b;* 1841. Nom. p. 105. n. 4093. 2: sect. Lavandulae. — Par. Benth. 1833. Labiat. p. 147; 1848 in DC. Pr. XII. p. 144. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 709. — Endl. 1838. Gen. n. 3585 *a.* p. 612; 1841. Ench. p. 306. — Walp. 1845. Rep. III. p. 572.

Stoechospermum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phycol. gener. p. 339; 1849. Sp. Alg. p. 560. n. 365: nov. g. Dictyotear. (Zonaria marginata Agdh.) — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 98.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: inter Phycoideas dubias.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 454: subg. Dictyotae.

Stöhelina Hall. Helvet. p. 312 (ex Benth. in DC. Pr. X. p. 544): vid. *Stähelinia Hall.*

Störkia**) Crantz 1768. De duobus arbor. Dracon. (Vindob.)
= Dracaena Vand.

Stokesia***) L'Herit. 1788. Sert. p. 27.
Gmel. 1791. Syst. p. 1192: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1703. n. 1441. — Pers. 1807. Ench. II. p. 382. n. 1794. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 128.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 382: g. Cinarocephalar.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 154: g. Carduacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 541; 1826. Syst. III. p. 409. n. 2665; 1831. Gen. II. p. 609. n. 3003: g. Cynarear.

*) Dicat. Dr. J. E. Stocks.
**) Nomen ex Plinio, graece στοιβή, sed alia planta.

*) Planta in Stoichadibus insulis nascens.
**) Dicat. Ant. de Störk, archiatro.
***) Dicat. Will. Stokes, medico Dublin.

Stokesia L'Herit. cont.
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 488; 1828. v. 57. p. 340; 1830. v. 60. p. 586: g. Ethuliear.
Cass. 1827. Dict. v. 51. p. 64: g. Vernoniear. — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 321; 1832. Syn. p. 148. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 60. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2202: g. Eupatorinar.
DC. 1836. Pr. V. p. 71: g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2209. p. 359 (*Stockesia*); 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177(123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3873 (*Stockesia*): g. Pacourinear.
Synon. Cartesia Cass.

Stomandra*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 456. Ed. Nees p. 312: sect. Loganiae. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 200. — Poir. 1823. Dict. v. 27. p. 116. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 165. — Endl. 1838. Gen. n. 3364 *c*. p. 576; 1841. Ench. p. 289. — Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5136. 3. — DC. 1845. Pr. IX. p. 26.

Stomandra Jack 1822. Linn. Trans. XIV. P. 1. p. 1 (Isis 1829. p. 1037): sect. Melastomae. (M. exigua, rotundifolia, etc.)

Stomarrhena DC. 1839. Prodr. VII. p. 738: nov. g. Stypheliear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4267/2. p. 1411; 1841. Ench. p. 367. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4806. — Meisn. 1843. Comm. p. 364.
= Astroloma R. Brown?

Stomatechium Spreng. 1825. Syst. I. p. 562. n. 597: g. Asperifoliar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 607.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2964; 1837. Hdb. p. 192: g. Borraginear.
Endl. 1841. Ench. p. 321. n. 3775: g. Anchusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
= Stomotechium Lehm.

Stomatophorae Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 4: subdiv. Aspiralium. Classis: Peltopterideae.

Stomatotechium Spach vid. *seq.*

Stomotechium Lehm. 1818. Asperif. II. p. 396: nov. g. Asperifoliar. (St. papillosum.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. VIII. 752. n. 634 a. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 126. n. 627.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 894: g. Boraginear.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 75: g. Borraginear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 111. n. 4343.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Anchusear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 649. n. 3775. — Meisn. 1840. Gen. p. 280(188). — DC. 1846. Pr. X. p. 40.

*) στόμα, os, orificium.

Stomotechium Lehm. cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 313: g. Symphytear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31 (*Stomatotechium*): g. Asperifoliear.
Synon. Stomatechium Spreng.

Stooria Necker 1790. Elem. bot. I. p. 131. n. 225: nov. g. Sphanidophytor., a Lobelia L. disjunctum.

Stopinaca Rafin. (ubi?) g. Polygonear., antea *Lyonia Rafin.* (DC. Pr. VII. p. 599 adnot.) = Polygonella Michx.

Strabonia *) DC. 1836. Prodr. V. p. 481: nov. g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2435. p. 359; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192(128).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28: g. Inulear. (genuinar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3398. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Stracheya**) Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 306: nov. g. Hedysarear., Eversmanniae aff. (St. Tibetica.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 545: g. Euhedysarear.

Strachybotrys Lév. vid. *Stachybotrys Corda.*

Strämia Wendl. vid. *Strömia Vahl.*

Strakaea Presl 1850. Epimel. bot. p. 581 (221): nov. g. Aristolochiacear., pone Bragantiam et Lobbiam inserendum. (St. melastomaefolia.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 335.
= Bragantia Lour.

Stramoneum Rupp., Hall. vid. *Stramonium Tourn.*

Stramonia „J. Bauh." Herm. 1687. Hort. Lugd. Batav. catal. p. 583.
= Datura Linn.

Stramonium***) Tourn. 1700. Inst. p. 118. t. 43. 44: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 37 (*Stramoneum*). Ed. Hall. 1745. p. 38: g. pl. class. I.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 221.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 489: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 218: g. Solanor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 157: g. Pentandr. Monogyn.
Mönch 1794. Meth. p. 455: g. Petalostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 330: g. Solanear.
= Datura Linn.

Stramonium Bernhardi (Trommsd. N. Journ. Pharm. XXVI. p. 146) 1833. Linnaea VIII. Litt. p. 121: sect. Daturae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 473. — Endl. 1839. Gen. n. 3845 *b*. p. 664; 1841. Ench. p. 331. — Walp. 1845. Rep. III. p. 15. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 538. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 666.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Daturear.

Strangea Meisn. 1855 in Hook. Kew gard. misc. p. 66; 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 348: g. Grevillear.

*) Dicat. Straboni geographo.
**) Dicat. Rich. Strachey, peregrinatori.
***) Nomen Italis usitatum? (Fuchs.)

Strangospora Arnold 1855. Flora II. p. 507: nov. g. Sarcogynear. (Sarcogyne pinicola Mass.)

Strangweja *) Bertoloni 1835. Descriz. di un nuov. gen. di pianta gigl. (c. ic.); 1837. Mem. soc. ital. Moden. XXI. p. 1: nov. g. Liliacear. (Str. hyacinthoides.) *Cf.* Linnaea XIV. Litt. p. 85.
= Foxia Parlat.

Stransvaesia A. Juss. vid. *seq.*

Stranvaesia Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. n. 1956: nov. g. Pomear. (Crataegus glauca Wall.)
Endl. 1840. n. 6354. p. 1239; 1841. Ench. p. 656: g. Pomacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6537. — Meisn. 1843. Comm. p. 354. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 124. — Walp. 1843. Rep. II. p. 59. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 560. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 104. 216. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 208 (*Stransvaesia*).

Strateuma Salisb. 1812 in Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 290: nov. g. Orchidear. (Orchis militaris et fusca.)
= Herorchis Lindl.

Stratioteae Rchb. 1828. Consp. p. 45: div. Hydrocharidear. Gen.: Hydrilla, Elodea, Anacharis, Vallisneria, Blyxa, Stratiotes, Damasonium, Limnobium. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 144. Gen.: Lilaea, Elodea, Vallisneria, Stratiotes.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: trib. Hydrocharidear. Gen.: Stratiotes, Enhalus. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). Gen. ut Ritgen et Boottia.
Link 1829. Hdb. I. p. 280: ordo 21 Endogenear. Gen.: Stratiotes.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 112: trib. Hydrocharidum. Gen.: Stratiotes, Evhalus, Ottelia, Limnobium, Hydrocharis.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142: trib. Hydrocharidacear. Gen. ead.

Stratiotes **) „Gesn." Vaillant 1719. Act. Acad. Paris. p. 20: nov. g. plantar.
= Hottonia Linn.

Stratiotes Dillen. 1719. Gen. p. 9.
= Hydrocharis Linn.

Stratiotes ***) Linn. 1737. Gen. p. 161. n. 454; 1737. Cliff. p. 221; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 253. n. 543; 1753. Sp. I. p. 535; 1759. Syst. ed. X. p. 1081. n. 607; 1762. Sp. ed. II. p. 754; 1764. Gen. ed. VI. p. 277. n. 687; 1767. Syst. ed. XII. p. 373: g. Polyandr. Hexagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 421; 1784. Syst. p. 506. — Reich. 1778. Gen. p. 281. n. 744. — Gmel. 1791. Syst. p. 852. — Pers. 1797. Syst. p. 542. — Rebent. 1804. Neom. p. 227.

Stratiotes Linn. cont.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 2: g. Palmar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Musar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Palmis aff. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 32.
Hill 1769. Ht. kew. p. 160: g. Tripetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 97: g. Disparium.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 48. t. 14. f. 8.
Juss. 1789. Gen. p. 67: g. Hydrocharidum. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 123. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 170. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 265; 1825. Syst. II. p. 467. n. 1807. (in Dodecandr. Hexagyn.)
Neck. 1790. El. III. p. 119. n. 1459: g. Daphonophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 698. n. 1541: g. Dioec. Decandr.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 213: g. Hydrocharidear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 266. — Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 64. — Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 121. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 220. — Agdh. 1822. Aphor. p. 127. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65. — Link 1822. En. II. p. 431. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 13. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 400. n. 2009. — Koch 1837. Syn. p. 668. Ed. II. p. 770. — Kunth 1838. Berol. II. p. 232. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 4. 33. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 4.
Cram. 1803. Disp. p. 199: g. Dioec. Dodecandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 820. n. 1822; 1809. En. p. 1020. — Pers. 1807. Ench. II. p. 627. n. 2262.
Nolte 1825. Bemerk. üb. Strat. u. Sagitt. (Kopenh.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 656: g. Tripetaloidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 807: g. Stratiotear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. — Link 1829. Hdb. I. 280. — Bartl. 1830. Ord. p. 76. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 112. — Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142.
Endl. 1837. Gen. n. 1211. p. 162; 1841. Ench. p. 95: g. Stratiotidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1156. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 45. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 307.
Synon. Aloides Boerh.

Stratiotideae Endl. 1837. Gen. p. 162; 1841. Ench. p. 95: trib. Hydrocharidear. Gen.: Stratiotes, Enhalus, Ottelia, Bootia, Limnobium, Hydrocharis. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 746. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 34: subdiv. Hydrocharear. Gen. ead.
Synon. Stratioteae et Hydrocharideae Link; Stratioteae Auct.

Straussia *) DC. 1830. Prodr. IV. p. 502: sect. Coffeae. — Par. G. Don 1834. Gen.

*) Dicat. Fox Strangways.
**) „Στρατιώτης, quia Millefolium, cujus folia huic sunt similia, in sanandis militum vulneribus excellere dicitur et a Nonnullis Stratiotes dictum est."
***) Nomen ex Plinio.

*) Dicat. Laur. Strauss, qui 1666 de potu Coffeae disseruit.

Straussia DC. cont. syst. III. p. 583. — Endl. 1838. Gen. n. 3152 *d.* p. 533; 1841. Ench. p. 272. — — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2802. 4. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 308.

Stravadia Pers. vid. *Stravadium Juss.*

Stravadium Juss. 1789. Gen. p. 326: nov. g. Myrtor. (*Tsjeria Samstravadi Rheede.*)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 166: g. Myrtear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 81.
Pers. 1807. Ench. II. p. 30. n. 1207 (*Stravadia*): g. Myrtacear.
DC. 1828. Pr. III. p. 289: g. Barringtoniear. (An potius Barringtoniae sectio?, suadent. Gärtn. et Blume.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 175. n. 4655. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 869. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 186.
Meisn. 1838. Gen. p. 109(77): sect. Barringtoniae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6325 *b.* p. 1233; 1841. Ench. p. 651. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 488.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 755: g. Barringtoniacear.
Synon. Menichea Sonn.; Meteorus Lour.

Strebanthus *) Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 218: nov. g. Eryngio aff. (St. auriculatus.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 82.
Meisn. 1838. Gen. p. 141(103): g. Saniculear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5539.
= Eryngium Tourn.?

Streblanthera **) Steud. in Pl. Schimp. exsicc. nr. 710. *Cf.* Hochstett. in Flora 1844. p. 29.
= Trichodesma R. Brown.

Streblidia Link 1827. Hort. Berol. I. p. 276; 1829. Handb. I. p. 98: nov. g. Cyperoidear. (Schoenus ferrugineus L.) — Par. Bluff & Nees 1836. Fl. germ. I. 1.
Rchb. 1829 ap. Mössl. III. p. 1804: g. Dulichiear.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 299: g. Cladiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 182: g. Cyperacear.
= Chaetospora R. Brown.

Streblocarpus Arnott 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 235: nov. g. pro Niebuhria oblongifolia DC. et Maerua angustifolia Guill. & Perr. propositum.
Endl. 1839. Gen. n. 4997. p. 893; 1841. Ench. p. 456: g. Capparear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 342. *Cf.* Meisn. Gen. Comm. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
Rchb. 1841. Nom. p. 185. n. 7112: g. Morisoniear.

Streblocaulium „Chev.“ Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Botrytideor. (Nomen.)

Streblorrhiza Endl. 1833. Prodr. fl. Norfolk. p. 92: nov. g. Leguminosar. (St. speciosa.)
= Clianthus Don. (Endl.) *Cf.* Meisn. Gen. p. 89(63).

*) An potius Streblanthus?
**) στρεβλός, torsus, curvus.

Streblosa Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 245: nov. g. Rubiacear. (Psychotria tortilis Blume.) *Cf.* Flora 1851. p. 537.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 746: g. Coffeear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 294: sect. Psychotriae.

Streblotrichum Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 27. 89; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 455: nov. g. Entopogonor. (Barbula convoluta Hedw., Mnium setaceum L.) *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. III. p. 222 et Leman 1827. Dict. v. 51. p. 91.
= Barbula Hedw.

Streblus *) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 614. Ed. Willd. p. 754: nov. g. Dioec. Tetrandr. (St. asper et cordatus.) *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 91. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 389.
Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 78: g. Artocarpear. Sect.: verae, Parastreblus.
= Trophis P. Browne.

Streckera **) Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478. 483: nov. g. Fideliear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 100: sect. Thrinciae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3686. 2.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7: g. Scorzonerear.

Streleskia Hook f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 266: nov. g. Lobeliacear. (St. montana.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 468.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1039: g. Cyphiacear.

Strelitsia Thunb. vid. *seq.*

Strelitzia ***) Banks 1789 in Ait. h. kew. I. p. 285. t. 2.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 796. n. 1737: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1792. Nov. gen. VII. p. 111; 1794. Prodr. I. p. 45; 1818. Fl. cap. II. p. 113 (*Strelitsia*). — Willd. 1797. Sp. I. p. 1190. n. 461; 1809. En. p. 269.
Gis. 1792. Prael. p. 199. 203. 211: g. Scitaminear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 198.
Batsch 1802. Tab. p. 106: g. Palmariar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 152: g. Musacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 263. n. 598. — Hedw. 1806. Gen. p. 177. n. 740. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. LII. 594. n. 1067. — Link 1821. En. I. p. 150; 1829. Hdb. I. p. 234. — Agdh. 1823. Aphor. p. 180. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 92. — Rchb. 1828. Consp. p. 71. n. 1610. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 63. — Lestib. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 261. — Brongn. 1843. En. genr. p. 24. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 54.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 273: g. Heliconear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 279; 1825. Syst. I. p. 833. n. 955; 1830. Gen. I. p. 194. n.

*) Nomen ab arboribus ramis nimis distortis.
**) Dicat. Car. Strecker, bibliopolae.
***) Dicat. uxori Georgii III, e gente Mecklenburg-Strelitz.

Strelitzia Banks cont.
983: g. Musear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXV. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 850.
Ker 1818. Strelitzia depicta.
Rich. 1831. Musac. p. 12: g. Uraniar.
Endl. 1837. Gen. n. 1649. p. 228; 1841. Ench. p. 123: g. Uraniear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 143.
Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2235: g. Ravenalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 164: g. Uranear.
Synon. Heliconia Gärtn.

Strempelia*) A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 180: nov. g. Coffeacear. (St. guyanensis.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.
DC. 1830. Pr. IV. p. 498: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 579. — Endl. 1838. Gen. n. 3153. p. 533; 1841. Ench. p. 272.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2803: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Benth. & Örst. 1852. Centr. Am. Rubiac. p. 9: sect. Psychotriae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 108.

Strempeliastrum Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 229: sect. Psychotriae. (Ps. parasitica Sw.)

Strephedium Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 30 adnot. et p. 89: novum nomen pro *Funaria Hedw.* propositum.

Strephium**) „Schrad." Nees 1829. Agrost. Bras. p. 298: nov. g. Olyrear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 687. n. 3467: g. Graminear. (Monoec. Triandr.)
Kunth 1833. Agrost. p. 70: g. Panicear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 765. p. 83; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 252. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1266. — Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.

Strephocystis Cujusnam?: g. Desmidicar. (G. B. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 55.)
= Euastrum Ehrenb.

Strephodon Seringe 1824 in DC. Prodr. I. p. 414: sect. Cerastii. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 441. — Koch 1836. Syn. p. 125. Ed. II. p. 136. — Endl. 1840. Gen. n. 5241 c. p. 970; 1841. Ench. p. 505. — Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7803. 2. — Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 398.
Bartl. 1830. Ord. p. 305: g. Alsinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205.

Strephogyne Rchb. 1828 in Mössl. Handb. ed. sec. II. p. 1563 (*Streptogyne* in Corrig.): sect. Gymnadeniae. (G. viridis et albida.)
= Coeloglossum Hartm. et Gymnadeniae sp.

*) Dicat. Strempel, Berolin.
**) στρέφω, verto, torqueo.

Strephopteris*) „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 120: nov. g. Polypodiacitum. (Str. ambigua t. 50. f. 2.)
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 104; 1846. Chlor. prot. p. L: g. Pecopteridum.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 76: g. Filicum foss.

Strepita Dochnahl 1855. Obstk. I. p. 53: g. Malor. (*Schlotterapfel.*)

Strepsia**) Nuttall 1818. Gen. amer. I. p. 208: sect. Tillandsiae. (T. usneoides.)
= Tillandsiae Linn. pars.

Strepsodineae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 315: subtrib. Graphidear. Gen.: Sarcogyne.

Streptachne***) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 174. Ed. Nees p. 30: nov. g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 20. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 15. 341. n. 227. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 257. n. 265. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 94.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1830. Gram. p. 60; 1833. Agrost. p. 186: g. Stipacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 922; 1841. Nom. p. 35. n. 1201. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Endl. 1837. Gen. n. 800. p. 88; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 304. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161. — Steud. 1854. Glum. I. p. 121. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 750.
Trin. 1820. Fund. p. 111: g. Triandr. Digyn.
Spreng. 1830. Gram. I. p. 59. n. 288: g. Graminum.
Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849) p. 6: g. Stipaceor.

Streptachne HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 124. t. 40: g. Stipacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 194.
= Pseudachne Endl.

Streptanthera Sweet .... Fl. gard. I. t. 209. (Bot. Mag. t. 3512.)
= Gladiolus Tourn.

Streptanthus Nuttall 1825. Journ. Ac. Philad. V. p. 134. t. 7: nov. g. Cruciferar. (S. maculatus.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 63.
Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4792: g. Arabidear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 269. — Hook. 1834. Bot. Mag. n. 3317. *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 292. — Meisn. 1837. Gen. p. 10 (10). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 75. Sect.: Streptanthus, Euklisia. — Endl. 1839. Gen. n. 4852. p. 864; 1841. Ench. p. 448. Sect.: Eustreptanthus, Euclisia. — Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 7001. (genuinar.) Sect. ut Torr. — Walp. 1842. Rep. I. p. 128. — Müll. 1851. Ann. bot. IV. p. 192.
Bartl. 1830. Ord. p. 265: g. Siliquosar. —

*) στρέφω, replico.
**) στρέφω, volvo.
***) στρεπτός, tortus, convolutus.

Streptanthus Nuttall cont.
Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 729.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: g. Cheiranthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Arabidar.

Streptanthus Torrey & Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 75: sect. Streptanthi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 7001. 2.
= Eustreptanthus Endl.

Strepthopus Bong. vid. *Streptopus Rich.*

Streptipomaea Nonnull. vid. *Strophipomaea Ch.*

Streptium Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 25. t. 146; 1832. Fl. Ind. III. p. 90: nov. g. Didynam. Angiosperm. (St. asperum.)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 754. n. 2116; 1831. Gen. II. p. 478. n. 2359: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2912. — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227.
= Priva Adans.

Streptocalyx Beer 1854. Flora p. 348: nov. g. Bromeliacear. Typus novus.
Beer 1857. Bromel. p. 22. 141: g. Hoplophytar.

Streptocarpus Lindl. 1828. Bot. Regist. XIV. t. 1173.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 658: g. Didymocarpear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4139. p. 717; 1841. Spl. I. p. 1408; 1841. Ench. p. 349.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 119: g. Cyrtandrear. *Cf.* Flora 1842. I. p. 218. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 302 (211); 1845. Pr. IX. p. 270: g. Eudidymocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4702: g. Henckeliear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 62: g. Cyrtandracear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.
= Henckelia Spreng.

Streptocarya Jaub. & Spach .... Pl. orient. II. p. 7: sect. Pteropyri. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 54. n. $1993/_3\,a$. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 553. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 31.

Streptocaulon Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 64: nov. g. Asclepiadear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 889.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 161: g. Periplocear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3434. p. 588; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5057. (genuinar.) — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212; 1844 in DC. Pr. VIII. p. 495. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 469.

Streptochaeta „Schrad. mss." Nees 1829. Agrost. Bras. p. 536: nov. g. Bambusear. (verar.) — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXXIV. 1361. — Endl. 1837. Gen. n. 911. p. 103; 1841. Ench. p. 59.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 467: g. Bambusacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1428: g. Bambusar.

Streptochaeta Nees cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bambusidar.
Steud. 1854. Glum. I. p. 339: g. Bambusaceis aff.
Synon. Lepideilema Trin. ined. (Nees.)

Streptodesma A. Gray 1853. Proc. Amer. Ac. III. p. 6; 1854. Un. St. expl. exp. p. 427: nov. g. Hedysarear. *Cf.* Flora 1855. p. 398. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 531.

Streptogyna*) Palis. 1812. Agrost. p. 80: nov. g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 35. 614. n. 312. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 96 (*Streptogyne*).
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Bartl. 1830. Ord. p. 28.
Trin. 1820. Fund. p. 146: g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1018: g. Melicacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 72. n. 349 (*Streptogyne*): g. Graminum.
Kunth 1833. Agrost. p. 427: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 385.
Endl. 1837. Gen. n. 905. p. 102; 1841. Ench. p. 59: g. Bambusear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 426 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1421: g. Arundinariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bambusidar.
Steud. 1854. Glum. I. p. 339: g. Bambusaceis aff.

Streptogyne Poir., Spreng. vid. *praeced.*

Streptogyne Rchb. 1828 in Mössl. Handb. ed. sec. II in Corrig. (*Strephogyne* in textu); 1830. Fl. exc. p. 119: sect. Himantoglossi. (Satyrium viride L.)
Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1854: g. Ophrydear.
= Coeloglossum Hartm.

Streptolirion Edgeworth 1846. Linn. Trans. XX. 1. p. 90: g. Commelinear. (S. volubile.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 885: g. Commelynear.

Streptoloma Bunge 1847. Reliq. Lehm. p. 155 (Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 207; Arb. nat. Ver. Riga I. p. 155): nov. g. Sisymbriear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 158 et Flora 1848. I. p. 101. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 40.

Streptopetalum Hochstett. 1842. Flora. II. p. 665: nov. g. Turneracear.
= Wormskioldia Thonn.? *Cf.* Endl. Spl. II. p. 75.

Streptopodium Benth. 1835. Labiat. p. 658; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 573: sect. Trichostemmatis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3678 *a*. p. 631; 1841. Ench. p. 308. — Walp. 1845. Rep. III. p. 902.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 861: sect. Trichostematis.

---

*) στρεπτός, tortilis.

Streptopogon „Wils. in litt." Mitten 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 51: nov. g. Muscor., Barbulae aff. (Tortula erythrodonta Tayl.)

Streptopus Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 200. t. 18: nov. g. Hexandr. Monogyn. (Uvularia amplexifolia L.) — Par. Elliott 1817. Sketch I. p. 392. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 224.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 119: g. Liliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 244. n. 993.

DC. 1805. Franç. III. p. 174: g. Asparagear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Koch 1837. Syn. p. 704. Ed. II. p. 813. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Brongn. 1843. En. genr. p. 18.

Juss. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 53: g. Asparaginear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 96.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 224: g. Ruscinar.

Link 1821. En. I. p. 339: g. Asparaginar.

Agdh. 1823. Aphor. p. 161: g. Smilacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1320. — Bong. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 166 (*Strepthopus*). — D. Don 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 340; 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 526. (Monogr.) Sejungitur Prosartes.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 98. n. 1265; 1830. Gen. I. p. 262. n. 1366: g. Sarmentacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXV. 310. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1121.

Link 1829. Hdb. I. p. 186: g. Convallariacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Convallariear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1180. p. 154; 1841. Ench. p. 88. — Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1727. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 122. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 228.

Rchb. 1830. Fl. exc. p. 100: g. Convallarinar.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.

Kunth 1843. Enum. IV. p. 204: g. Uvulariear. Distinguitur Hekorima (praeced. Rafin.).

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235: g. Veratrear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.

Streptosema Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 558: nov. g. ab Aspalatho disjunctum. (A. verrucosa L.)

Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 210: g. Genistear.

Streptosolen Miers 1850. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. V. p. 208: nov. g. Salpiglossidear. (Browallia Jamesonii Benth.)

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 181: g. Salpiglossear.

Streptostachys „Desv." Palis. 1812. Agrost. p. 49: nov. g. Graminear. (St. asperifolia.) *Cf.* Isis 1823. p. 701. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 72. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 25. 469. n. 265. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 97.

Streptostachys Palis. cont.

Trin. 1820. Fund. p. 182: g. Graminum.

Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 888: g. Paspalacear.

Bartl. 1830. Ord. p. 30: g. Panicear.

= Panici Linn. pars.

Streptostigma Regel 1853. Gartenflora II. p. 322: nov. g. Solanear. *Cf.* Bot. Zeit. 1854. p. 288.

= Thinogeton Benth. (Seem. in Kew gard. misc. VI. p. 384.)

Streptostigma Thwaites 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 298. t. 9 A: nov. g. Sapindacear. (S. viridiflorum.)

Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 375: g. Sapindear.

Streptotheca Arnott 1825. Disp. meth. p. 43.

Math. 1853. Belg. II. p. 25: sect. Bryi.

= Aulacomnion Schwägr.

Streptothrix Corda 1839. Prachtfl. Schimm. p. 27. t. 13: nov. g. Botrytidi aff. (St. fusca.)

Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 118: g. Psiloniaceor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 43: g. Psiloniacear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 76.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Gyrocereor.

Striaria Greville 1830. Alg. brit. p. 55. t. 9.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 754. n. 3827: g. Solenotar.

Endl. 1836. Gen. n. 107. p. 9; 1841. Ench. p. 7: g. Fucacear.

Menegh. 1838. Cenni p. 42: g. Dictyotear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 762. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 41; 1848. Sp. Fuc. p. 80. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 26. n. 99. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 356. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 183. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.

Zanard. 1843. Classif. p. 10: g. Asperococcear.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 336; 1845. Phyc. germ. p. 270; 1849. Sp. Alg. p. 553. n. 362: g. Encoeliear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.

Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 123: g. Dictyotacear.

Synon. Carmichaëlia Grev.

Striatella Agardh 1832. Consp. Diat. p. 60: nov. g. Fragilarinar.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 192: g. Fragilariear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 199.

Kütz. 1844. Bacill. p. 125; 1845. Phyc. germ. p. 109; 1849. Sp. Alg. p. 114. n. 64: g. Striatellear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 41: g. Achnanthear.

Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 58: g. Diatomear.

Striatelleae Kütz. 1844. Bacill. p. 125; 1845. Phycol. germ. p. 109; 1849. Sp. Alg. p. 114: fam. Diatomear. Gen.: Striatella, Tessella, Hyalosira, Pleurodesmium, Rhabdonema.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: sect. Tabellariear. Gen.: Thaumaleorhabdium, Tessella, Hyalosira, Striatella, Pleurodesmium.

Stribila G. Don vid. *Strobila.*

Stricnideae Dumort. vid. *Strychnideae Dumort.*

Strictae Scopoli 1777. Introd. p. 103: trib. 7 plantar. Gentes: 1. *Fructo sicco* (gen.: Circaea, Aulax, Ludwigia, Epilobium, Oenothera, Skinnera, Caricteria, Jussiaea, Schefflera, Neurada, Decumaria, Acisanthera, Mentzelia, Tattia, Cyphia, Carpodetus, Combretum, Gaura, Trapa, Serpicula, Scopolia, Haloragis, Tacca). 2. *Fructu succulento* (gen.: Protium, Memecylon, Ophira, Bockia, Hambergera, Ehrhardia, Votomita, Cornus, Angolamia, Apella, Plectronia, Ribes, Gronovia, Strumpfia). 3. *Umbelliferis adfines* (gen. §. 1: Polyscias, Aralia, Solandra, Panax, Hedera, Cissus, Arctopus, Echinophora, Hermas, Lagoecia. §. 2: Phyllis).

Striga*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 22. Ed. Willd. p. 27: nov. g. Diandr. Monogyn. (St. lutea.) — Par. Vahl 1805. Enum. I. p. 54. n. 27. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 339. — Hedw. 1806. Gen. p. 351. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 53. 85. n. 62. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 99. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 26. n. 112. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 101.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 77. n. 104: g. Primulear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5585: inter genera vix cognita.
Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 361; 1846 in DC. Pr. X. p. 500: g. Buchnerear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 582. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4631. (genuinar.) Sect.: Orobanchopsis, Euphrasiopsis, Striga, Campuleia. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 703.
Endl. 1839. Gen. n. 3959. p. 685; 1841. Ench. p. 339: g. Eubuchnerear. Sect.: Orobanchoides, Euphrasioides, Eustriga, Campuleia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Walp. 1845. Rep. III. p. 299. 966.
Dietr. 1843. Syn. II. p. 524: sect. Buchnerae.
Synon. Campuleia Pet.-Th.; Campyleia Spreng.

Strigia DC. 1836. Prodr. V. p. 126: sect. Kuhniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2268 *a*. p. 368; 1841. Ench. p. 233.
Synon. Critonia Gärtn.

Strigilia**) Cavan. 1789. Diss. VII. p. 358. t. 201: nov. g. Monadelphiae. (St. racemosa.)
Gmel. 1791. Syst. p. 698: g. Decandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 551. n. 838.

*) Nomen ab habitu plantae strigoso.
**) Nomen ab antheris strigiliformibus.

Strigilia Cavan. cont.
Gis. 1792. Prael. p. 362: g. Trihilatar.
Cram. 1803. Disp. p. 159: in Monadelph. Decandr.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 42: g. Meliacear. - Par. Hedw. 1806. Gen. p. 301. n. 1195. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 518. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 99. — Bartl. 1830. Ord. p. 356.
DC. 1824. Pr. I. p. 621: g. Meliear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 67. n. 2388. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 679.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5507: g. Strigiliear.
Endl. 1839. Gen. p. 743. n. 4252 *b*; 1841. Ench. p. 364. n. 4257 *b*: sect. Styracis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5274. 2.
Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158): g. Styracear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 417.
Synon. Trichogamila P. Browne; Foveolaria Ruiz & Pav.; Tremanthus Pers.

Strigilieae Rchb. 1828. Consp. p. 211: subdiv. Meliear. Gen.: Amoora?, Melia, Sandoricum, Strigilia, Quivisia, Turraea, Geruma?, Canella.

Striglia Adans. 1763. Fam. II. p. 10: g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 101. = Daedaleae Pers. pars.

Strigodium C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 434: subsect. Rigodii. (Hypnum stellatum Schreb.)
Synon. Campylium Sulliv.

Strigosella Boissier 1853. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. Nr. 1. p. 22: nov. g. Cruciferar., Morettiae aff. (St. Cabulica.) *Cf.* Flora 1854. p. 701.

Strigula Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Calicior.
Fries 1825. Pl. homon. p. 111; 1828. Elench. I. p. 114: g. Strigulinor. — Par. Leman 1827. Dict. v. 51. p. 103. — Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 270; 1841. Nom. p. 7. n. 292. Sect. (1841) ut Endl. — Endl. 1836. Gen. n. 387. p. 33; 1841. Ench. p. 19. Sect.: Nematora, Racoplaca, Phyllocharis, Craspedon, Melanophthalmum, Aulaxina.
Fries 1831. Lich. eur. p. 8. 457: g. Limboriear. — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 130; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 351; 1849. ibid. XII. p. 61. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 22.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 125: g. Sphaeronemear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Labrelleor.?
Bonord. 1851. Hdb. p. 223: g. Perisporiaceor.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 15 (Flora 1854. p. 236): g. Endocarpear.
Synon. Stigmatidium Meyer.

Strigulini Fries 1825. Pl. homon. p. 110: subordo Sphaeriaceor. Gen.: Corynelia, Strigula, Meliola. — Par. Leman 1827. Dict. v. 51. p. 103.
Rchb. 1828. Consp. p. 11; 1841. Nom. p. 7: subdiv. Sphaeriaceor. Gen. ut Fries et Myxothecium.

Strigulini Fries cont.
Endl. 1836. Gen. p. 33; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Sphaeriaceor. Gen. ut Fries et Thamnomyces. Accedit 1842. Spl. II. p. 1) Cordierites.

Strilia „Micheli" Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 597. 645: nov. g. Boletidear. (Boletus cinnamomeus Gmel., Pers.)
= Boleti Fries pars.

Strizolobium „P. Br." Wittst. vid. *Stizolobium P. Browne.*

Strobe Reich. Gen. p. 449: sphalm. pro *Stoebe Linn.*

Strobila G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. (308 sphalm. *Stribila*) 327: g. Lithospermear. (*Dioclea Spreng.*, nec DC.)
= Arnebia Forsk.

Strobilacanthus Griseb. 1858. Bonplandia p. 10: nov. g. Aphelandrear.

Strobilaceae Rchb. 1828. Consp. p. 80; 1831. Fl. exc. p. 158: fam. Ambiguar. Divis.: Abietinae, Cupressinae, (et 1831) Altingiaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 161. *Cf. Coniferae Rchb.* 1837.

Strobilanthes*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 796: nov. g. Acanthacear. Sect.: Strobilanthes, Apopedania. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 105. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 62.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 84: g. Ruelliear. Sect.: Eustrobilanthes, Pteracanthus, Sympagis. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190 (*Strobilanthus*); 1841. Nom. p. 109. n. 4250. Sect. eaed. — Endl. 1839. Gen. n. 4053. p. 700; 1841. Ench. p. 343. Sect. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen. p. 295(203). — Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 177. — Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 19; 1850. 4. t. 1511—1521. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 794. Sect.: genuinae, Goldfussia.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 590: g. Echmatacanthor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63.: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.
Synon. Martynia Moon; Didyplosandra Wight.

Strobilanthus Rchb. vid. *praeced.*

Strobilanthus Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 75. n. 2120 *d:* sect. Leucadendri.

Strobiliferae Rich. 1811. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 122: div. Coniferar. Gen.: Pinus, Abies, Altingia, Araucaria. *Cf. Abietinae HBK*

Strobilites Schimp. & Moug. .... Pl. foss. Vosg. p. 21. t. 16.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1816/1. p. 1373; 1841. Ench. p. 147: g. Coniferar. foss.
Endl. 1842. Spl. II. p. 27. n. 1806/4: g. Abietinar. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 204; 1846. Chlor. prot. p. LXXV: g. Abietinear. foss.
= Füchselia Endl.

*) *στρόβιλος*, turbo, strobilus.

Strobilocarpus Klotzsch 1839. Linnaea XIII. p. 380: g. Santalacear. *Cf.* Endl. Gen. Suppl. I. p. 1378 et Meisn. Comm. p. 239, ubi ad Ophiram revocatur.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 618: sect. Grubbiae.
Synon. Ophira Lam.

Strobiloglossa Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 42: sect. Rhytiglossae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 661.

Strobilomyces Berkeley 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 78: nov. g. Polyporeor.

Strobilorachis Lindl. vid. *seq.*

Strobilorhachis Klotzsch 1839 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 39. p. 307 (Link, Klotzsch & Otto Ic. pl. II. p. 117. t. 48): nov. g. Pogonantherar. (St. glabra.)
Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 84; 1847 in DC. Pr. XI. p. 294: g. Aphelandrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679 (*Strobilorachis*): g. Justiciadar.

Strobocalyx*) „Blume in litt." DC. 1836. Prodr. V. p. 21: sect. Vernoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2204 *e*. p. 358; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3868. 5. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 9.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Synon. Leucomeris Blume.

Stroboclinium Rchb. 1841. Nomencl. p. 235: sect. Lachnaeae. (*Conoclinium Meisn.*, non *DC.*)

Stroboides Endl. 1847. Syn. Conif. p. 286: subsect. Pityos.

Strobuliferae Karsten 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 216: div. Gymnospermar. Fam.: Cycadeae, Dammareae, Cupressineae.

Strobus**) D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 54: sect. Pini. (P. Strobus et excelsa.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 394. — Endl. 1847. Syn. Conif. p. 145; 1847. Spl. IV. p. 6. n. 1803. *B. VII.* — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 197.

Strömeria Roxb. vid. *seq.*

Strömia***) Vahl 1790. Symb. I. p. 19: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Cadaba Forskalii.) — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 993. n. 365. — Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 478.
Wendl. 1798. Bot. Beob. p. 13 (*Strämia*).
Cram. 1803. Disp. p. 40: g. Tetrandr. Monogyn. (Cleome fruticosa L.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 775: g. Capparidum.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 765. n. 832; 1830. Gen. I. p. 178. n. 897: g. Capparidear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 802.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 78 (*Strömeria*): g. Pentandr. Digyn.
= Cadaba Forsk.

Stroganovia Lindl. vid. *seq.*

*) *στρόβος*, turbo.
**) Nomen ex Plinio.
***) Dicat. H. Ström, Norvegico.

Stroganowia *) Karelin & Kirilow 1841. Bull. soc. Mosc. p. 386; 1842. ibid. p. 535: nov. g. Vellear. (St. sagittata et brachyota.) *Cf.* Schrenk Enum. II. p. 61 et Linnaea XVI. Litt. p. 289. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 74. n. 4958/1; 1843. Spl. III. p. 89. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 770. — Meisn. 1843. Comm. p. 341. — Walp. 1843. Rep. II. p. 763; 1846. V. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355 (*Stroganovia*): g. Vellidar.

Stromanthe Sonder .... in Otto n. allg. deutsche Gartenz. V. H. 5. p. 225: nov. g. Marantacear. (Maranta sanguinea Hort.) *Cf.* Bot. Zeit. 1850. p. 648 et Flore d. serr. VIII. p. 97. t. 785.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 605: g. Cannacear. — Par. Gris 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 185. Char. emend.

Stromateria Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 5. t. 1: nov. g. Caeomacear. (St. carnea.)
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 76: g. Tubercularinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 58.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.

Stromatopterideae Corda 1832 in Sturm Jungerm. III. IV. p. 63: ordo Stomatophorar. (antea *Peltopterideae*.)

Stromatosphaeria Greville .... Scot. t. 32. 135 etc. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 111.
= Hypoxylon Bull.

Stromatospori Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 61: class. Fungor. Fam.: Sphaeropsidei, Stilbosporei, Cryptoclynei, Tuberculariei, Uredinei.

Strombocarpa Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 351: sect. Prosopidis. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 582.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 614: g. Eumimosear.

Strombodurus Willd. herb. nr. 1629 (gracilis) ex Trin. mss. in Steud. Nom. II. p. 299. 647.
= Pentarrhaphis HBK.

Stromboma Drap. . . . g. Fungor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 125.

Strombosia Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1154: nov. g. Rhamneis aff., sed Marcgraviaceis affinius.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 125: g. Rhamnear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51). — Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 238.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 21: g. Ilicineis aff.
Meisn. 1837. Gen. p. 44 (32): g. Marcgraviacear.?
Rchb. 1837. Hdb. p. 310: g. Strombosiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5752. p. 1103; 1841. Ench. p. 582; 1850. Spl. V. p. 86: g. Rhamneis aff. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5610.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.?

*) Dicat. comiti Stroganow.

Strombosia Blume cont.
Blume 1850. Mus. Lugd. Bat. I. 16. p. 251: g. Olacinear. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 181.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 786: g. Olacacear.

Strombosieae Rchb. 1837. Handb. p. 310: subdiv. Marcgraviear. Gen.: Strombosia.

Stromnothamnus Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 153; 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 17: sect. Calothamni.

Strongilium Brongn. vid. *Strongylium Ditm.*

Strongyle Lindl. .... in Paxt. Fl. gard. I. sub tab. 27: sect. Dendrobii. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 631.

Strongylia Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 29: sect. Malvae. (M. parviflora L.)

Strongylium *) Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXI. 97; 1810. Lich. univ. p. 241; 1814. Syn. Lich. p. 61: sect. Calicii. (C. capitellatum, aciculare, gracilentum, trichiale.) *Cf.* Leman 1827. Dict. p. 51. p. 136.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 485: g. Calicidear.
= Coniocybe Achar.

Strongylium „Ditmar“ Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 2. p. 17: nov. g. Fungor. (Trichoderma fuliginoides Pers.) — Par. Ditm. 1809. ibid. III. 3. p. 55. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 136.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 41: g. Gastromycor. (antea 1809. ibid. III. p. 24 sphalm. *Arongylium*.)
Nees 1816. Syst. p. 101; 1817. Überbl. p. 27: g. Gasteromycor. efflorescent.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Lycogalactum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 568: g. Spumaridear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69: g. Spumidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 551 (*Strongilium*): g. Fuliginear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 533. n. 3525: g. Aërogasterum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 346: g. Aethalinor.
= Reticularia Bull.

Strongylocalyx Blume 1849. Mus. Lugd. Bat. I. Nr. 6. p. 89: nov. g. Myrtear. (Jambosa leptostemon Korth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 638.

Strongylodon **) Vogel 1836. Linnaea X. p. 585: nov. g. Phaseolear. (St. ruber.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66).
Endl. 1841. Gen. n. 6668. p. 1295; 1841. Ench. p. 672: g. Erythrinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5824. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — A. Gray 1854. Un. St. expl. exp. p. 445. Char. auct. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 559.

*) στρογγύλος, rotundus.
**) στρογγύλος, rotundus; ὀδούς, dens: propter calycis dentes rotundatos.

Strongylolepis DC. 1837. Prodr. VI. p. 283: sect. Nestlerae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2779 *b.* p. 453; 1841. Ench. p. 244. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3598. 2.

Strongyloma DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 52: g. Nassauviear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3777. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. (verar.)

Endl. 1841. Spl. I. n. 2947 *b* (err. n. 2974). p. 1386; 1841. Ench. p. 248: sect. Triptilii.

Synon. Acanthophyllum Hook. & Arn.

Strongylosperma Lessing 1832. Syn. Compos. p. 261: nov. g. Cotulear. (Anacyclus australis Sieb.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 82. — Endl. 1838. Gen. n. 2684. p. 437; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 212(135). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3438. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.

C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 40: sect. Pleiogynae.

Stropha Noronh. mss.

= Chloranthus Swartz.

Strophades Boissier 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 82: nov. g. Sisymbrear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 341.

Walp. 1842. Rep. I. p. 171: g. Sisymbriear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 37. n. 4908/$_1$.

Strophanthus*) DC. 1802. Bull. soc. philom. III. p. 122. t. 8; 1805. Mém. d. sav. étr. de l'Inst.: nov. g. plant.

Desf. 1802. Ann. Mus. I. p. 410. t. 27: g. Apocinear. *Cf.* Schrad. n. Journ. I. 3. p. 73. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 330. — Hedw. 1806. Gen. p. 110. n. 491.

Pers. 1805. Ench. I. p. 269. n. 620: g. Apocynear. — Par. R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 72. (Verm. bot. Schr. II. p. 408.) — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 491; 1830. Gen. I. p. 147. n. 734. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXV. 411. n. 748. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1044. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 149.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 637. n. 693: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 654.

Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3531: g. Echitear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3428. p. 586; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 531. — Meisn. 1840. Gen. p. 265(173). — Brongn. 1843. En. genr. p. 52. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 417. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 441.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 84: g. Echitiear.

Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5184: g.Neriear. genuinar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Synon. Christya Harv.

*) στροφή, torsio.

Strophária Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 295: subg. Pratelli. (Agaricus ochreatus, etc.)

Strophiostoma*) Turczan. 1840. Bull. soc. Mosc. II. p. 258: nov. g. Borraginear. (Myosotis sparsiflora Mik.) *Cf.* Flora II. Lit. p. 48.

Meisn. 1843. Comm. p. 366: g. Cynoglossear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 78. n. 3772 *b:* sect. Myosotidis. — Par. DC. 1846. Pr. X. p. 112. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 148.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.

Rupr. 1856. Bull. Ac. Pet. XIV. p. 229: genus restituit.

Strophipomaea Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 450: sect. Ipomaeae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 532.

Conf. seq.

Strophipomoea G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 268: sect. Ipomoeae. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 358. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 605.

Strophocaulos G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 288: sect. Convolvuli. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 406. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 540.

Strophopappus DC. 1836. Prodr. V. p. 75: nov. g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2216. p. 360; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.

Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3880: g. Pacourinear.

Strophostyles Elliott 1822. Carolin. II. p. 229.

DC. 1825. Pr. II. p. 394: sect. Phaseoli. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 355. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 245. — Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 139. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 279. — Endl. 1841. Gen. n. 6674 *d.* p. 1297; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5777. 4. — Walp. 1842. Rep. I. p. 778.

E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 147: g. Phaseolear.

Synon. Phasiolus et Phasellus Mönch.

Strozzius**) Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 682: nov. g. Marchantiadear. (Marchantia hemisphaerica et conica L.)

= Preissia Nees et Conocephalus Hill.

Struchium P. Browne 1756. Jamaic. p. 312. t. 34. f. 2: nov. g. Syngenes. sect. 1.

Juss. 1789. Gen. p. 184: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 406.

Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2224: g. Eupatorinar.

= Sparganophoros Vaill.

Struckeria Flor. Flum. I. t. 20: g. Monandr. Monogyn. (oppugnata) ex Steud. Nom. II. p. 647.

= Vochysia Juss.

*) στρόφιον, strophium.
**) Dicat. Strozzi.

Struma Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 519: g. Strumacear.
Strumaceae Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 519: fam. Exanthematum plantar. Gen.: Spermoedia, Struma, Ectostroma.
Strumaria Jacq. 1790. Ic. rar. t. 356—360; 1797. Hort. Schönbr. t. 71.
Willd. 1799. Sp. II. p. 31. n. 614: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 349. n. 778. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 359. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 851.
Batsch 1802. Tab. p. 147: g. Leucojacear.?
Hedw. 1806. Gen. p. 228. n. 928: g. Amaryllidear. — Par. Herb. 1825. Bot. Mag. App. p. II: 1837. Amaryll. p. 78. 278. (Amaryllidiformium.) — Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVII. 788. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1597. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 248; 1825. Syst. II. p. 57. n. 1203; 1830. Gen. I. p. 277. n. 1436: g. Spathacear. — Par. Eckl. 1827. Verz. p. 8. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1187.
Link 1821. En. I. p. 310: g. Narcissinar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 174: g. Narcissear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 152.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1239: g. Amaryllear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1269. p. 175; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (295). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 409. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Leucoidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 7. 29: g. Galanthear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 622: g. Haemanthear.
Strumarium Rafin 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 89: nov. g. Ambrosidiae. (Xanthii sp. L.)
Strumella Fries 1825. Pl. homon. p. 199: vegetatio fungosa ambigua. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 155.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 4; 1841. Nom. p. 1. n. 3: g. (Uredineor.) Praeformativor.
Endl. 1836. Gen. p. 16; 1841. Ench. p. 13: g. Gymnomycetum Proletarior.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 482: g. Illosporiaceor.
Strumpfia*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 218: nov. g. Syngenes. Monogam. (St. maritima.) — Par. Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1316; 1764. Gen. ed. VI. p. 454. n. 1002; 1767. Syst. ed. XII. p. 582. — Murr. 1774. Syst. p. 665; 1784. Syst. p. 799. — Reich. 1778. Gen. p. 450. n. 1088. — — Schreb. 1791. Gen. II. p. 595. n. 1360. — Pers. 1797. Syst. p. 841.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.

*) Dicat. Christoph. Carolo Strumpff, professori Halensi.

Strumpfia Jacq. cont.
Gled. 1764. Syst. 237. n. 975: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 108: g. Strictar.
Juss. 1789. Gen. p. 436: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 169. n. 711.
Neck. 1790. El. II. p. 136. n. 820: g. Coryphophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 373: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1152. n. 443. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 358. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XL. 507. n. 1017. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 813. n. 912; 1830. Gen. I. p. 196. n. 991. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 857.
Pers. 1807. Ench. II. p. 211. n. 1583 (*Strumphia*): g. Monadelph. Pentandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 822: g. Hermannicar.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 156: g. Rubiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 b. n. 2791 b: g. Lobeliacear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 218. t. 19. f. 3: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
DC. 1830. Pr. IV. p. 469: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 560. — Meisn. 1838. Gen. p. 167(117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2868. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3218. p. 544; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Strumphia Pers. vid. *Strumpfia Jacq.*
Strutanthus Spach vid. *seq.*
Struthanthus*) Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 17: sect. Loranthi. *Cf.* Schult. Syst. VII. p. 1613. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 o. p. 802; 1841. Ench. p. 399. — Walp. 1843. Rep. II. p. 444.
Mart. 1830. Flora I. p. 102: g. Loranthear. *Cf.* DC. 1830. Pr. IV. p. 671 (*Srutanthus.*) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2730 (*Struthianthus*).
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 409: g. Loranthacear. Sect.: Stachyanthus, Protostelis. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 233 (*Strutanthus*). — Miq. 1844 Linnaea XVIII. p. 64. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791.
Struthia**) „Roy." Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 164. n. 380: g. Octandr. Monogyn., a Passerina distinctum.
= Gnidia Linn.
Struthianthus Rchb. vid. *Struthanthus Mart.*
Struthiola Linn. 1767. Mant. p. 4. n. 1244; 1767. Syst. ed. XII. p. 127: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 137; 1784. Syst. p. 164. — Reich. 1778. Gen. p. 65. n. 170. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 86. n. 216. — Gmel. 1791. Syst. p. 277. — Pers. 1797. Syst. p. 170; 1805. Ench. I. p. 148. n. 322. — Willd. 1797. Sp. I. p. 691. n. 252; 1809. En. p. 169.

*) Brasil.: *Erva do Passerino*, herba aviculorum.
**) στρουθός, avicula, passer.

Struthiola Linn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 345: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 77: g. Thymelaear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 181. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 326.; 1825. Syst. I. p. 455. n. 494; 1830. Gen. I. p. 109. n. 546. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 20. 330. n. 519. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 158. — Link 1829. Hdb. I. p. 376. — Bartl. 1830. Ord. p. 115. — Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 463.
Neck. 1790. El. II. p. 179. n. 889 (*Strutiola*): g. Aclithrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 414: g. Veprecular.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 239: g. Daphnoidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2099. p. 331; 1841. Ench. p. 209. — Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2430.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 265: g. Petalostemonis.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 194. t. 215.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 182: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 70. n. 337.
Link 1821. En. I. p. 111: g. Thymelear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 233. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 540. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 449. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1778: g. Daphnear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Thymelinear.
Meisn. 1841. Gen. p. 330 (243); 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 566: g. Gnidiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 61. n. 2096: g. Passerinear.

Struthiopterideae Presl 1836. Pterid. p. 175: sect. Polypodiacear. Gen.: Struthiopteris.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 36: subordo Polypodiacear. Gen. id. et Onoclea.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 37. 226: trib. Cathetogyratar. Gen.: Struthiopteris, Onoclea, Ceratodactylis.

Struthiopteris*) „Cord." Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 132: g. Epiphyllospermar. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 162. — Par. Wigg. 1780. Holsat. p. 73.
Weis 1770. Pl. crypt. p. 286.
Scop. 1772. Carn. II. p. 288: g. Filicum. — Par. Mönch 1794. Meth. p. 22. (Osmunda Spicant L.)
Scop. 1777. Intr. p. 62: g. Dorsiferar.
Neck. 1790. El. III. p. 312. n. 1712: g. Sphaeroophytor.
= Lomaria Willd.

Struthiopteris Willd. 1809. Berl. Mag. III. p. 160; 1809. Enum. p. 1071; 1810. Spec. V. p. 288. n. 1964: g. Filicum. (Osmunda Struthiopteris L.) — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 250. — Leman 1827. Dict. v. 51. p. 161. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 286. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 65. n. 3246; 1831. Gen. II. p. 721. n. 3639. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 325. (verar.)
Link 1822. En. II. p. 460: g. Polypodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80.
Agdh. 1822. Aphor. p. 116: g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. En. p. 142. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (indusiatar.) — Meyer 1836. Chlor. hann. p. 680. — Genth 1836. Nass. I. p. 41. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 4. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 986. (velatar.) — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 324. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 527. (indusiatar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 716: g. Onocleacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Asplenicar.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 26: g. Phyllopteridum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Endl. 1836. Gen. n. 628. p. 61; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Per. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1016. — J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 47. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Presl 1836. Pterid. p. 175: g. Struthiopterideaar. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 38. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 226.
Meisn. 1843. Gen. p. 432 (333): g. Pteridear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 97: sect. Onocleae.
Synon. Onoclea Bernh.

Struthium Seringe 1824 in DC. Prodr. I. p. 352: sect. Gypsophilae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5359 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 381. — Endl. 1840. Gen. n. 5245 *c*. p. 972; 1841. Ench. p. 506. — Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 292. — A. Braun 1843. Flora p. 383.
Synon. Rokejeka Forsk.; Rokeika Scop.; Banffya Baumg.

Struthopteris Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 126: nov. g. Filicum agyratar. (Osmunda regalis L.)
= Osmunda Linn. emend.

Strutiola Necker vid. *Struthiola Linn.*

Struvea Rchb. 1841. Nomencl. Ind. p. 222. 236: novum nomen pro *Torreya Arn.* propositum.

Struvea*) Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 49; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 151: nov. g. Siphonear. (St. plumosa.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Bryopsidear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XII. p. 73: g. Actinocladear.
Kütz. 1856. Tab. phycol. VI.

Strychnaceae Link 1829. Handb. I. p. 439: ordo (23) Hypanthar. Gen.: Strychnos.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 64: ordo Corollaeflorar. Gen.: Strychnos, Picrophloeus, Cyrtophyllum, Lasiostoma, Gardneria; Dicaryum?

*) στρουθίων, struthiocamelus.

*) Dicat. H. de Struve.

Strychneaceae Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1018: fam. plant. Gen.: Strychnos, Picrophloeus, Fagraea, Cyrtophyllum.

Strychneae DC. 1813. Théor. élém. p. 217; 1819. Ed. II. p. 247: ordo Corolliflorar.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Apocynear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Strychnidear. Gen.: Strychnos, Picrophleus, Cyrtophyllum, Ignatia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 211: subdiv. Carissear. Gen.: Allamanda, Aspidosperma et Cerbereae Rchb. 1828. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 134. Sect.: *genuinae* (gen.: Strychnos, Ignatia), Gardnerieae, Antonieae, Labordieae.

Endl. 1838. Gen. p. 575: subordo Loganiacear. Trib.: Eustrychneae, Gardnerieae, Antonieae, Labordieae. Accedit 1841 (Ench. p. 289) trib.: Coelostyleae. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). Trib. ut Endl. 1838. — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 12. Trib. eaed. et Usterieae.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 483: trib. Loganiacear. Gen. Endlicheriana et Rouhamon. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604. Gen.: Strychnos, Rouhamon, Brehmia, Ignatia, Pagamea, Gardneria, Antonia, Labordia, Usteria. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424. Gen. §. 1: Strychnos, Rouhamon, Brehmia, Ignatia, Pagamea, Gardneria. §. 2: Antonia, Labordia, Spigelia, Coelostylis.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 51: trib. Apocynear. Gen.: Potalia, Strychnos, Carissa, Melodinus, Allamanda.

Strychnideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26 (*Stricnideae* p. 21): fam. Jasminariéar. Trib.: Carisseae, Strychneae.

Strychnis Gled. vid. *Strychnus Linn.*

Strychnodaphne Nees 1833. Linnaea VIII. p. 39: nov. g. Laurinar. (St. lanceolata.)

Nees 1833. Progr. p. 17: g. Oreodaphnear.
= Ocotea Aubl.

Strychnos Linn.*) 1753. Sp. I. p. 189; 1759. Syst. ed. X. p. 935. n. 226; 1762. Sp. ed. II. p. 271; 1764. Gen. ed. VI. p. 100. n. 253; 1767. Syst. ed. XII. p. 175. n. 252: g. Pentandr. Monogyn. (*Cf.* Pet.-Th. 1805. Dict. v. 6. p. 423 [*Caniram*] et Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 172.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 189; 1784. Syst. p. 227. — Reich. 1778. Gen. p. 103. n. 270. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 135. n. 339. — Lour. 1790. Coch. I. p. 125. — Gmel. 1791. Syst. p. 387. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 8. t. 4. 5; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 261; ed. 1832. I. p. 575. — Pers. 1797. Syst. p. 236. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1052. n. 385.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 384.

Gled. 1764. Syst. p. 214. n. 896: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 145: g. Opulinar.

Juss. 1789. Gen. p. 149: g. Apocineis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 337. — Hedw. 1806. Gen. p. 122. n. 540.

Neck. 1790. El. II. p. 57. n. 700: g. Arcythophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 203: g. Colubrinar.

Pers. 1805. Ench. I. p. 264. n. 599: g. Apocynear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 469. Ed. Nees p. 325. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LIII. 546. n. 821. — Link 1821. En. I. p. 207.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 496: g. Carissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Bartl. 1830. Ord. p. 205.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: g. Colubrinear.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 672. n. 741; 1830. Gen. I. p. 156. n. 783: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 690.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1018: g. Strychneacear.

Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3578: g. Cerberear.

Link 1829. Hdb. I. p. 439: g. Strychnacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 64.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Strychnear. — Par. Blume 1835. Rumphia I. p. 66. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 485. — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5212. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 51. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.

Endl. 1838. Gen. n. 3359. p. 575; 1841. Ench. p. 288: g. Eustrychnear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 12. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 497.

Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 73: g. Loganiacear.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 378: g. Fagraeear.
Synon. Strychnus Linn.; Strychnis Gled.; Kaniram Pet.-Th.; Narda Fl. Flum.?

Strychnus Linn. 1737. Gen. p. 54. n. 155; 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 84. n. 194: g. Pentandr. Monogyn.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128 (*Strychnis*): g. Petalostemonum.
= Strychnos Linn.

Stryphnodendron*) Martius 1837. Herb. fl. Brasil. p. 117.

Endl. 1841. Gen. n. 6837 *a*. p. 1326; 1841. Ench. p. 683: sect. Ingae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6134. 1.

Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 341: g. Adenantherar.

Walp. 1842. Rep. I. p. 860; 1846. V. p. 579: g. Adenantherear.

Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Mimosear.

Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 81. t. 291.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.

Stuartia**) Catesby 1743. Carolin. III. p. 13. L'Herit. 1785. Stirp. fasc. VI. (*Cf.* Usteri n. Ann. II. p. 17.)

---

*) Nomen ex Plinio.

*) στρυφνός, acidus.
**) Dicat. Joanni Stuart, comiti a Bute.

Stuartia Catesby cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 214: g. Tiliacear.
Willd. 1800. Sp. III. p. 840. n. 1300: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 172.
Link 1822. En. II. p. 214: g. Malvacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Ternstromiear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 573: g. Gordoniear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 223. — Endl. 1840. Gen. n. 5423. p. 1022; 1841. Ench. p. 531. Sect.: Malachodendron, Stewartia et 1842 (Spl. II. p. 81) Adelphonema. — Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7921. (restrict.) — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 75.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397: g. Ternströmiacear.
Conf. Stewartia Linn.

Stuartina Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 521: nov. g. Helichrysear. (St. Mülleri; Gnaphalii sp. Schltd.)

Stubendorffia Schrenk 1843 in Suppl. ind. IX. sem. h. Petrop.; 1844. Linnaea XVIII. p. 218; 1845. Bull. Ac. Pet. III. p. 309: nov. g. Cruciferar., Stroganowiae proximum. (St. orientalis.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 50 (*Stubendorfia*): g. Vellear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 40. n. 4958/2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Vellidar.

Stubendorfia Walp. vid. *praeced.*

Sturmia*) Gärtn. f. 1805. Fruct. III. t. 192. f. 3.
= Stenostomum Gärtn.

Sturmia Hoppe .... in Sturm Deutschl. Fl. VII.
Pers. 1805. Ench. I. p. 76. n. 174: g. Triandr. Digyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 39. n. 183.
Link 1821. En. I. p. 69: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 65. 147.
Agdh. 1823. Aphor. p. 147: g. Agrostidear. — Par. Link 1827. Hort. I. p. 89.
Link 1829. Hdb. I. p. 34: g. Graminear.
= Mibora Adans.

Sturmia Rchb. 1828 in Mössl. Handb. ed. sec. II. p. 1552. 1576: g. Orchidear. (*Liparis Rich.*, non Zoolog.)
Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1564 (Pl. crit. IV. p. 39); 1830. Fl. exc. p. 135: g. Malaxidear.
Koch 1837. Syn. p. 696. Ed. II. p. 803: g. Malaxidinear.
Endl. 1837. Gen. n. 1340 *a*. p. 189; 1841. Ench. p. 109: sect. Liparidis.
Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1927 (1844. Fl. sax. p. 92): g. Pleurothallear.
Synon. Malaxis Pet.-Th.; Liparis Rich.; Alipsa Hoffmsg.; Pseudorchis Gray; Anistylis Rafin.?

Sturtia R. Brown 1849. App. to Sturt's exped. p. 68: nov. g. Malvacear., Gossypio aff. *Cf.* Ann. and Mag. n. h. 1849. III. p. 57. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 149.

*) Dicat. Jac. Sturm, Norimberg.

Stybanthus „Neck.“ Rafin. in Journ. Phys. LXXXIX. p. 258: sphalm. pro *Hybanthus Neck.*

Stygeoclonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phycol. gener. p. 253; 1845. Phycol. germ. p. 197: g. Ulothrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 23.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ...: g. Lyngbyear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 99: sect. Myxonematis.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Draparnaldiear.
Synon. Myxonema Fries pt.; Stigeoclonium Kütz.

Stygiaria Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 4; 1789. Beitr. IV. p. 146. (Juncus stygius L.)

Stygnanthe*) Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 185. 209: nov. g. Hypocyrtear. (Columnea moesta Pöpp.)

Stylandra**) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 170: nov. g. Pentandr. Digyn. (Asclepias pedicellata Walt.)
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 175: g. Apocynear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Cynanchear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 145: sect. Ananthericis.
= Podostigma Ell.

Stylandra „Rafin.“ Meisn. Gen. Comm. p. 306 in synon. Smilacinae: vid. *Styrandra Rafin.*

Stylandreae Perleb 1838. Clav. class. (Isis 1838. p. 811): ordo Monochlamydear. Fam. 118—121. (Cytineae.)

Stylanthus Rchb. & Zoll. 1856. Linnaea XXVIII. p. 312: sect. Rottlerae. (An genus proprium? — Adisca acuminata Bl.) — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 425.

Stylapterus*) A. Juss. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 23: nov. g. Penaeacear. (Penaea fruticulosa L.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 320.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 73. n. 2116 *b*: sect. Penaeae.
A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 486: g. Penear.

Stylaria „Drap.“ Trevis. vid. *Styllaria Bory.*

Stylaria DC. 1824. Prodr. I. p. 242: sect. Polanisiae. (Cleome uniglandulosa Cav.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 275.
= Eupolanisia Endl.

Stylarieae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407: fam. Diatomacear. Gen. cap.: Licmophora.
Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97; trib. Amphiphractar. Subtrib.: Gomphonemeae, Eustylarieae.

Stylbocarpa Decaisne & Planch. 1854. Rev. hortic. 4e sér. III. p. ... : nov. g. Araliacear.

Styledium Andr. (Meisn. Comm. p. 364.)
= Stylidium Swartz.

Stylephora Rchb. vid. *Stilophora Agdh.*

*) στυγνός, tristis.
**) στῦλος, columna, stylus.
***) ἄπτερος, alis destitutus.

Stylesia*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 377: nov. g. Gaillardiear. (Bahia ambrosioides Lag.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 45. n. $2598/_1$: g. Euheleniear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Walp. 1843. Rep. II. p. 627.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Heleniear.

Stylideae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 565. Ed. Nees p. 421; 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 561 (Verm. bot. Schr. I. p. 69): ordo Dicotyledonum monopetalar., a Campanulaceis sejunctus. Gen.: Stylidium, Leevenhookia, Forstera.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 298: fam. 25 plant. Gen.: Stylidium, Leeuwenhoekia; Forstera.
Link 1829. Hdb. I. p. 638: ordo Epanthar. Gen.: Stylidium.
Bartl. 1830. Ord. p. 148: ordo Campanulinar. Gen. ut R. Brown. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 519; 1841. Ench. p. 268. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 238 (146). Gen. ead.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 124: ordo Gynandrar. Gen. ead.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 719: ordo Calyciflorar. Gen. ead.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 580: fam. (159) Campanulinear. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 78: fam. Dicotyledonear. monopetalar. epigynar. Gen. ead.

Stylidiaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 240; 1847. Veg. kingd. p. 696: ordo Campanalium. Gen.: Stylidium, Coleostylis, Forsteropsis, Levenhookia, Forstera.
= Stylidieae Juss.

Stylidiariae Rchb. 1837. Handb. p. 186; 1841. Nomencl. p. 102: div. Campanulacear. Subdivis.: Stylidieae, Scaevoleae, Goodenieae.

Stylidieae Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 12; 1827. Dict. v. 51. p. 117: ordo pl. Gen.: Stylidium, Leeuwenhoekia, Forstera, Phyllachne. *Cf.* Isis 1826. p. 782.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: div. Campanulacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 91: div. Plumbaginear. Gen. ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. 30: fam. Campanariear. Gen.: Stylidium, Levenhookia.
Lindl. 1830. Nat. syst. p. 189 et Clav.: ordo (177) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Goodenalium.
Mart. 1835. Consp. p. 32.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186: subdiv. Stylidiariar. Gen. ut antea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. Gen. ut A. DC.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 331: ordo (103) Calyciflorar. Gen. ut Juss. (exclusa Phyllachne.)
Brongn. 1843. En. genr. p. 32: fam. Campanulinear. Gen.: Stylidium.
Synon. Stylideae R. Brown; Stylidiaceae Lindl.

*) Dicat. Dr. Styles, botanico chilensi.

Stylidium*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 220. Ed. Willd. p. 272: g. Heptandr. Monogyn. (St. chinense.)
= Marlea Roxb.

Stylidium Swartz 1807. Berl. Mag. I. p. 47. t. 1. 2; 1811. ibid. V. p. 89: nov. g. Gynandr. Diandr. *Cf.* Willd. 1807. Berl. Mag. I. p. 53. — Par. Willd. 1805 (?) Sp. IV. p. 146. n. 1614. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 90.
Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 63; 1806. Ann. Mus. VII. p. 400: g. Monandr. Monogyn?, an Monadelph. Diandr.? (Campanulacear.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 210. n. 1579: g. Monadelph. Diandr.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 566. Ed. Nees p. 422: g. Stylidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 299; 1826. Syst. III. p. 746. n. 3045; 1831. Gen. II. p. 677. n. 3419. — Link 1822. En. II. p. 177; 1829. Hdb. I. p. 638. — Bartl. 1830. Ord. p. 149. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 124. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 719. Sect.: Ventenatia, Andersonia. — Endl. 1838. Gen. n. 3093. p. 520; 1841. Ench. p. 269. Sect.: Tolypangium, Nitrangium. — Meisn. 1839. Gen. p. 238 (146). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 581. — Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 370. Sect. ut Endl. et Centridium. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 79.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 7; 1827. Dict. v. 51. p. 178: g. Stylidiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1919; 1841. Nom. p. 102. n. 4003. Sect. (1841): Stylidium, Nitrangium. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 71. — Morren 1838. Nouv. Mém. Ac. Brux. XI. (Motus et anatome.) — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 332. Sect. ut Endl. — Brongn. 1843. En. genr. p. 32. — Walp. 1843. Rep. II. p. 704; 1847. VI. p. 367. Sect. ut Sond. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 570.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 178: g. Lobeliacear.
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 240; 1839. Swan-River p. XXVIII; 1847. Veg. kd. p. 696: g. Stylidiacear.
Synon. Ventenatia Smith; Candollea Labill.; Andersonia Kön.; Styledium Andr.

Stylimnus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 100: nov. g. ex typo Conyzae marilandicae L. *Cf.* Cass. 1826. Dict. v. 42. p. 7.
DC. 1836. Pr. V. p. 450: sect. Plucheae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2414 *a*. p. 391; 1841. Ench. p. 236.
Synon. Leptogyne Ell.; Gymnema Rafin.; Pluchea et Chlaenobolus Cass.; Placus Lour.?

Stylipus (s. *Stylopus*) Rafin. 1825. Neogen. p. 3.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 422: sect. Gei. (G. vernum.) — Par. Endl. 1842.

*) στυλίδιον, parva columna: ob corollam forma cylindrica columellam exhibentem.

Stylipus Rafin. cont.
Spl. II. p. 95. n. 6386 $a/_1$. — Walp. 1843. Rep. II. p. 47.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Dryadear.

Stylis Poir. 1817. Suppl. V. p. 260; 1827. Dict. v. 51. p. 182: g. Heptandr. Monogyn. (*Stylidium Lour.*)
= Marlea Roxb.

Stylisma Rafin. 1818. Monthly mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 258: nov. g. ex typo Convolvuli tenelli.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94 (*Stylismus*): g. Convolvulear. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 450. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.

Stylismus Spach vid. *praeced.*

Styllaria „Bory Dict. class.": nov. g. Bacillariear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 183.
Agdh. 1831. Consp. Diatom. p. 37: g. Styllariear. (emend.) — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 204 (melius *Stylaria* ex Hook).
Endl. 1836. Gen. n. 2. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Frustuliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 632.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 4: g. Diatomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97 (*Stylaria*): g. Eustylariear.
= Sphenella Kütz., Podospheniae et Rhipidophorae sp.

Styllarieae Agardh 1831. Consp. Diatom. p. 37: div. Diatomacear. Gen.: Styllaria, Meridion, Licmophora.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 16. 204: trib. Diatomacear. Gen. ead.

Styllingia Willd. vid. *Stillingia Gard.*

Stylobasis Schwabe mss.: g. Algar., a Sprengelio ad Linkiam reductum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 184.
= Rivularia Roth.

Stylobasium Desfont. 1819. Mém. Mus. V. p. 37. t. 2: nov. g. Terebinthacear. *Cf.* Spreng. N. Entd. II. p. 294. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 357. n. 1673. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 184.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 364: g. Chrysobalanear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4517; 1841. Nom. p. 178. n. 6884 (dubium). — Meisn. 1837. Gen. p. 101(72). — Endl. 1840. Gen. n. 6417. p. 1253; 1841. Ench. p. 664 (dubium). — Nees 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 95. — Walp. 1846. Rep. V. p. 647.
DC. 1825. Pr. II. p. 92: g. Terebinthaceis aff., minus notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 78.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 369. n. 1866: g. Terebinthear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 543: g. Chrysobalanacear.?

Stylobates Fries (in Afz. Fung. Guin. p. 5) 1838. Epicr. p. 370; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 307: nov. g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 492. (genuinor.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 183. 190.

Stylobiblium Ehrenb. 1845. Ber. Berl. Ak. p. 72: nov. g. Naviculaceor., Biblariis proximum.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 116. n. 69: g. Tabellariear.

Styloceras A. Juss. 1824. Euphorb. p. 53. t. 17: nov. g. Euphorbiacear. (Trophis laurifolia W.) *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 164. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 172. t. 637. 638. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 206. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 185.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 906. n. 3194; 1831. Gen. II. p. 710. n. 3579: g. Tricoccar. (Dioec. Polyandr.)
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5019; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7337: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. — Endl. 1840. Gen. n. 5773. p. 1109; 1841. Ench. p. 587. — Meisn. 1841. Gen. p. 338(251). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27: g. Euphorbiear.?
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 665: g. Stylocerear.

Stylocereae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 666: fam. Buxaceis aff. Gen.: Styloceras.

Stylochaeton Leprieur 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 184. t. 5: nov. g. Cryptocorynear. (St. hypogeum.) — Par. Blume 1835. Rumphia I. p. 87. — Endl. 1837. Gen. n. 1672. p. 234; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 13. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1082. — Meisn. 1842. Gen. p. 362(271). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 37. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 132 (*Stylochiton*): g. Stylochitonear.

Stylochiton Schott vid. *praeced.*

Stylochitoneae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 132: tribus unica Aroidear. diclinium filamentatar. Gen.: Stylochiton.

Stylochorina Dcne vid. *Stylocoryna Cavan.*

Stylocline Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 338: nov. g. Tarchonanthear. (St. gnaphaloides.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 266.
Endl. 1842. Spl. II. p. 41. n. 2420/$_2$: g. Plucheinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 139.
Schultz Bip. 1843 in Walp. II. p. 955: g. Evacear.

Stylocomium Brid. mss.
= Dawsonia R. Brown.

Stylocorina Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 100. t. 197 (racemosa).
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 392: g. Rubiacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 982. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 187.
= Stylocoryna Cav.

Stylocorina Labill. 1824. Sert. caled. p. 47. (ex DC.)
= Olostyla DC.

Stylocoryna*) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 45. t. 368: nov. g. Pentandr. Monogyn. (St. racemosa.) — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 145. n. 625.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVIII. 245. n. 922: g. Rubiacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 764. n. 827; 1830. Gen. I. p. 176. n. 886. — Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 419 *(Stylochorina)*. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 794.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2085: g. Cinchonear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 248: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 377: g. Gardeniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 494. — Meisn. 1838. Gen. p. 163(116).
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 202: g. Randiear.
Synon. Benkara Adans.; Stylocorina Gärtn.; Ceriscus Nees; Stylocoryne Wight & Arn.; Wahlenbergia Blume.

Stylocoryne Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 400: g. Gardeniear. (injuncta Cupia ampliat.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2950. (genuinar.) Sect. ut Endl.
Endl. 1838. Gen. n. 3293. p. 559; 1841. Ench. p. 274: g. Eugardeniear. Sect.: Stylocoryne, Cupia. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 516. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 134.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Conf. praeced.

Stylodiscus Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 133. t. 129: nov. g. Euphorbiacear. (Andrachne trifoliata Roxb.)
Endl. 1841. Spl. I. n. $5858/_1$. p. 1424; 1841. Ench. p. 539: g. Phyllanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7422. — Meisn. 1841. Gen. p. 343(254). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
= Bischofia Blume. (Baill.)

Styloglossum Kuhl & Hass. 1827. Orchid. ed. Breda t. 7.
= Calanthe R. Brown.

Stylogyne A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 78. 91; 1844. Prodr. VIII. p. 112: nov. g. Ardisiear. (St. Martiana.) — Meisn. 1843. Comm. p. 365. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648.
Endl. 1842. Spl. II. p. 65. n. $4220/_2$: g. Euardisiear.

Stylolepis Lehm. 1828. Sem. h. Hamb. p. 17; 1829. Flora I. Erg. Bl. p. 55; 1830. Linnaea V. p. 385: nov. g. Podolepidi Labill. aff. (St. gracilis.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 163: sect. Podolepidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2736 *b*. p. 445; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3495. 2. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 463.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 215: g. Gnaphaliear.

Styloncerus**) Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 546; 1826. Syst. III. p. 356. 451. n. 2704; 1831. Gen. II. p. 614. n. 3041: g. Eupatorinar. (Siloxerus humifusus Labill.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 149: g. Angianthear. Par. Endl. 1838. Gen. n. 2711. p. 441; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 216(137). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3517. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 435; 1847. II. p. 244. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 228. — A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 98.
Conf. Siloxerus Labill.; Ogcerostylus Cass.

Stylonema*) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 491; 1824. Prodr. I. p. 196: sect. Erysimi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 76. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 210.
= Syrenia Andrz.

Stylonites Fries 1849. Kongl. Vet. Ac. Handl. (1850. Flora I. p. 33); 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 456: nov. g. Stemoniteor.

Stylopappus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 431: nov. g. Lactucear. Sect.: Stylopappus, Troximeria. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 50. n. $3018/_3$. Sect.: Eustylopappus, Troximeria. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 491: sect. Macrorhynchi.

Stylophora Decaisne vid. *Stilophora Agdh.*

Stylophorum Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 7: nov. g. Polyandr. Monogyn. (Chelidonium diphyllum Michx.)
DC. 1821. Syst. II. p. 87; 1824. Pr. I. p. 121: sect. Meconopsidis. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 61.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 570. n. 1886; 1830. Gen. I. p. 423. n. 2101: g. Papaverear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4853. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 461. — Endl. 1839. Gen. n. 4820. p. 856; 1841. Ench. p. 443. (verar.)
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 189: g. Papaveracear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 135. — Meisn. 1837. Gen. p. 7(9). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 223. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7074: g. Argemonear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 5: g. Papaverinear.

Stylopus Rafin. vid. *Stylipus Rafin.*

Stylosanthes Swartz 1788. Prodr. p. 7. 108; 1789. Vet. Ac. Handl. p. 296; 1806. Fl. Ind. occ. III. p. 1280. t. 25: nov. g. Diadelph. Decandr. (Hedysarum hamatum L.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 505. n. 1203. — Gmel. 1791. Syst. p. 1121 *(Stilosanthes)*. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1165. n. 1373. — Pers. 1807. Ench. II. p. 317. n. 1736. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 106. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 203.

---

*) κορύνη, clava.
**) στυλός, stylum; ὀγκηρός, amplus, tumidus.

*) στύλος, stylus; νῆμα, filum.

Stylosanthes Swartz cont.
Gis. 1792. Prael. p. 415: g. Papilionacear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 505. — Kunth 1825. Syn. p. 128.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 238; 1812. Bull. soc. philom. Déc. p. 193; 1813 in Desv. Journ. bot. III. p. 61: g. Leguminosar. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 124. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 761; 1826. Syst. III. p. 310. n. 2593; 1831. Gen. II. p. 593. n. 2929. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 190.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Coronillear.
DC. 1825. Pr. II. p. 317: g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 280. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 218. — Meisn. 1837. Gen. p. 90(64). — Endl. 1841. Gen. n. 6600. p. 1282; 1841. Ench. p. 670. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 423. — Walp. 1846. Rep. V. p. 521.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 3991 (*Stylosanthus*); 1841. Nom. p. 153. n. 5976: g. Onobrychear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.
Vogel 1838. Linnaea XII. p. 63: g. Hedysarear. Sect.: Eustylosanthes, Styposanthes. — Par. Benth. 1839. Linn. Trans. XVIII. 2. p. 160. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 354. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 277.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554 (*Stylosanthus*): g. Arachidear.
Synon. Trifolium Burm.

Stylosanthus Rchb., Lindl. vid. *praeced.*

Stylostegium Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: g. Seligeriacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 131.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
= Blindia Bruch, Schimp.

Stylostemon Mönch 1794. Meth. p. 4. 41. 711; 1798. Einleit. p. 228: class. VI. plantar.

Stylostemonis Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. V. (1751) p. 112. 133; 1764. Syst. p. XXXIII. 282: class. IV. plantar.

Stylotheca A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 11: sect. Utriculariae.

Stylurus Knight & Salisb. 1809. Prot. p. 115. 116.
= Eriostylis R. Brown.

Stylurus Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 28: nov. g. Ranunculacear. *Cf.* Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 193.
= Flammula DC.

Stypandra*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 278. Ed. Nees p. 134: nov. g. Asphodelear., forsan dividendum. *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 51. p. 195. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXIII. 432. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 267. n. 1393. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1151 (*Stipandra*). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 35.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1392: g. Abamear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Anthericear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1149. p. 148; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1805. — Meisn. 1842. Gen. p. 401(304). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 624. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.

Styphelia*) Smith 1793. Nov. Holl. p. 45. t. 14: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 835. n. 316; 1809. En. p. 198. — Pers. 1805. Ench. I. p. 174. n. 398. — Edw. 1815. Bot. Regist. Nr. 24.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 360: g. Ericar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 109. n. 486. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLI. 467. n. 769.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 537. Ed. Nees p. 393: g. Epacridear. — Par. Link 1821. En. I. p. 211. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 654. n. 710; 1830. Gen. I. p. 137. n. 683. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 195. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 633.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 519: g. Epacridum.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3342: g. Stypheliacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Stenantherear.
Bartl. 1830. Ord. p. 158: g. Styphelicar. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 774. — Meisn. 1839. Gen. p. 248(156). — Endl. 1839. Gen. n. 4267. p. 746; 1841. Ench. p. 367. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 735. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4808. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 296. (includens Soleniscium DC.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 423.

Stypheliaceae Rchb. 1828. Consp. p. 127: subdiv. Epacridear. Gen.: Oligarrhena, Needhamia, Pentachondra, Decaspora, Trochocarpa, Acrotriche, Monotoca, Leucopogon, Lissanthe, Cyathodes, Melichrus, Stenanthera, Astroloma, Styphelia.
= Styphelieae Bartl.

Styphelieae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 158: div. Epacridear. Gen. Stypheliacear. Rchb. excepto Leucopogone.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 774: trib. Epacridear. Gen. Stypheliacear. Rchb. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 734. Gen. ead. et Solenisceia, Stomarrhena, Conostephium, Atherocephala. — Endl. 1839. Gen. p. 746. Gen. ut G. Don et Conostephium. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1411 et Ench. p. 367) Solenisceia, Stomarrhena, Atherocephala. — Meisn. 1839. Gen. p. 248(156).

*) στύπη, stupa, stuppa.

*) στυφελός, acris, firmus.

Styphelieae Bartl. cont.
Gen. ut Endl. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 433. Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 70. Gen.: Monotoca, Leucopogon, Lissanthe, Astroloma, Styphelia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 342.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 223) 1847. Veg. kd. p. 449: trib. Epacridacear. Gen. fere ut Endl. 1839 et Brachyloma, Androstoma.
Rchb. 1837. Hdb. p. 203: subdiv. Epacridear. Gen. ut 1828. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 123. Gen. ut DC.

Stypheliopsis Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 1052: sect. Leucopogonis.

Styphnolobium *) Schott 1830. Wien. Zeitschr. III. p. 844: nov. g. Leguminosar. (Sophora japonica L.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 54.
Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57): sect. Sophorae? — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 390.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 87: g. Sophorear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6743. p. 1309; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6036. — Walp. 1842. Rep. I. p. 807. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 82.

Styphonia Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 70: nov. g. ex typo Lavandulae spicae β Linn.

Styphonia „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 220: nov. g. Anacardiacear. (Rhus mollis HBK.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5906. p. 1131; 1841. Ench. p. 599. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1224. 1226: g. Heptandr. Monogyn.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5669: g. Pistaciear.
Walp. 1842. Rep. I. p. 555; 1846. V. p. 414: g. Anacardiear.
Meisn. 1843. Comm. p. 349: g. Cassuviear.

Styphorrhiza **) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 34; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Polygonum viviparum L.)
= Bistorta Tourn.

Stypnion Rafin. . . . . *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 200.
= Rivularia Roth.

Stypocaulon ***) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phycol. gener. p. 293; 1845. Phycol. germ. p. 241: nov. g. Sphacelariear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 466. n. 287: g. Ectocarpear.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 364: sect. Sphacelariae.

Stypopodium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phycol. gener. p. 341; 1845. Phycol. germ. p. 273; 1849. Sp. Alg. p. 563. n. 369: nov. g. Dictyotear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 181.

*) στυφνός s. στ[illegible]ίς, acidus.
**) στύφω, contraho.
***) στύπος, truncus.

Stypopodium Kütz. cont.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: inter Phycoideas dubias.
= Orthosorus Trevis.

Styposanthes *) Vogel 1838. Linnaea XII. p. 67: sect. Stylosanthis.

Styracaceae A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 244: ordo (126) Corolliflorar. Trib.: Symploceae, Pamphilieae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 592: ordo Rhamnalium. Trib. eaed.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 83: fam. Dicotyledonear. monopetalar. perigynar. Trib.: Symploceae, Styraceae.
Synon. Vaccinior. pars Adans.; Guajacanar. §. 2 Juss.; Bicornium pars Gis. *Conf.* Styraceae Rich.; Styracinae Kunth, Symplocineae D. Don; Symplocineae, Styracineae et Halesiaceae G. Don.

Styraceae Rich. 1811. Anal. d. fr. p. 48.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 505: fam. 51 plant. Gen.: Styrax, Halesia, Royena, Diospyros, Maba, Labatia, Symplocos.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: div. Sapotear. Gen.: Styrax, Halesia.
DC. & Duby 1828. Bot. gall. I. p. 320: trib. Ebenacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 135; 1831. Fl. exc. p. 433: div. Sapotacear. Subdivis.: Fraxineae, Oleinae, *genuinae* (gen.: Maba, Pouteria, Phelline, Styrax, Halesia, Diclidanthera; Houmiri?, Cyrta?).
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (167) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 159: ordo (97) Styracinar. Gen.: Symplocos, Hopea, Schöpfia, Styrax, Halesia; Paralea. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158). Gen.: Morelosia?, Turaria?, Diclidanthera, Strigilia, Styrax, Benzoin, Dicalyx, Drupatris?, Symplocos, Hopea, Stemmatosiphum?, Leucoxylum, Paralea, Halesia.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo ad Ebenaceas accedens.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: subdiv. Sapotear. Gen.: Pouteria, Phelline, Styrax, Halesia, Diclidanthera; Asteranthus, Napoleona. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. Sect.: *genuinae* (gen. Endlicheriana 1839 et Pterostyrax, Euclea; Halesieae), Symploceae, Napoleoneae.
Endl. 1839. Gen. p. 743: fam. Ebenaceis aff. Gen.: Styrax, Diclidanthera, Thuraria, Cyrta, Götzea, Hornschuchia.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 416: fam. (153) Styracinear. Gen. ut Bartl. et Morelosia, Strigilia, Diclidanthera, Thuraria?, Cyrta?, Decadia?
Endl. 1841. Ench. p. 364: ordo (160) Petalanthar. Gen.: Styrax, Pterostyrax, Halesia, Symplocos, Morelosia? Accedit 1842 (Spl. II. p. 67) Liriosma.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 74: fam. Diospyroidear. Gen.: Styrax, Halesia, Symplocos.
DC. 1844. Pr. VIII. p. 259: trib. Styracacear. Gen.: Styrax, Pterostyrax, Halesia. —

*) στύπος, stipes: ob rudimentum stipitiforme floris alterius.

Styraceae Rich. cont.
Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 84. Gen. ead.

Styracifluae Rchb. 1837. Handb. p. 171: div. Myricacear. Gen.: Liquidambar, Altingia.

Styracinae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 256: ordo plant. Gen.: Symplocos, Styrax et (in not.) Halesia. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 315. Gen. ead.

Styracinae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 158: class. (32) Gymnoblastor. Ordines: Styraceae, Ebenaceae, Sapoteae.
Meisn. 1839. Gen. p. 249. 441 (157): class. 28 Diplochlamydear. Ord. ut Bartl. et Aquifoliaceae.

Styracineae Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 88: fam. plant. Gen.: Styrax.
D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. Dec.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: fam. Vaccinariear. Gen.: Styrax, Halesia.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 3: ordo Corollaeflorar. Gen.: Styrax.

Styracineae Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 381: class. (31) Dicotyledoneor. monopetalor. Gen. Styracinar. Bartl.

Styrandra Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 102: nov. g. ex typo Convallariae bifoliae et canadensis. *Cf.* Schult. 1827. Mant. III. p. 5.
= Maianthemum Wigg.

Styrax*) Tourn. 1700. Inst. p. 598. t. 369: g. pl. class. XX. *Cf.* Duchesne 1804. Dict. v. 1. p. 469 (*Aliboufier*).
Linn. 1737. Gen. p. 143. n. 401; 1737. Cliff. p. 187; 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 213. n. 472; 1748. Ups. p. 123: g. Icosandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 230. n. 948: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Hesperidear.
Linn. 1753. Sp. I. p. 444; 1759. Syst. ed. X. p. 1044. n. 527; 1762. Sp. ed. II. p. 635; 1764. Gen. ed. VI. p. 237. n. 595: g. Dodecandr. Monogyn.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 166: g. Vaccinior.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 301. n. 546: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 340; 1784. Syst. p. 409. — Reich. 1778. Gen. p. 225. n. 599. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 297. n. 753. — Gmel. 1791. Syst. p. 699. — Pers. 1797. Syst. p. 437; 1805. Ench. I. p. 483. n. 1095. — Willd. 1799. Sp. II. p. 623. n. 874; 1809. En. p. 456. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 414.
Scop. 1777. Intr. p. 201: g. Speciosar.
Dryand. 1787. Phil. Trans. LXXVII. 2. p. 307.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 284. t. 59. f. 5 (officinale).

Styrax Tourn. cont.
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 339. t. 188. Char. emend. *Cf.* Römer & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 151.
Juss. 1789. Gen. p. 156: g. Guajacanar. — Par. Link 1821. En. I. p. 390.
Neck. 1790. El. II. p. 63. n. 712: g. Arcythophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 446: g. Ebenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 348. — DC. 1805. Franç. III. p. 670. — Hedw. 1806. Gen. p. 316. n. 1251. — Link 1829. Hdb. I. p. 599.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 41: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 83.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 505; 1825. Syst. II. p. 285. n. 1539; 1830. Gen. I. p. 331. n. 1679: g. Styracear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 670. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII; 1828. Consp. p. 136. n. 3592; 1831. Fl. exc. p. 435; 1841. Nom. p. 136. n. 5274. Sect. (1841): Styrax, Strigilia, Benzoin. — Bartl. 1830. Ord. p. 160. — Endl. 1839. Gen. p. 743. n. 4252; 1841. Ench. p. 364. n. 4257. Sect.: Eustyrax, Strigilia. — Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1385. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 421. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 74. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 259. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 459. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 84. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 470.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 261: g. Styracinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 318.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 88: g. Styracinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. — Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 52. t. 133—141. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 4.

*Styridophytum**) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 70: gen. 38 plant. Spec. natur.: Sisymbrium, Eruca, Dentaria, Cardamine, Arabis, Turritis, Erysimum, Cheiranthus, Hesperis, Heliophyla, Brassica, Sinapi, Dondisia, Raphanus, Ormycarpus, Chamira, Hypecoum.

Stysanus Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 21. t. 6; 1838. II. p. 16; 1839. III. p. 12; 1842. V. p. 16; 1842. Anl. Mycol. p. 64: nov. g. Aspergillinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 155. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 137.
Corda 1839. Prachtfl. p. 15. t. 8. f. 1—9 (caput Medusae).
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 92: g. Mucedinear. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Coremieor. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 85 (*Styzanus*).
Bonord. 1851. Hdb. p. 136: g. Stilbinor.

Styxis Dietr. vid. *Stixis Lour.*

Styzanus Mont. vid. *Stysanus Corda.*

*) Nomen ex Virgilio, etc.

**) „σταυρηδὸν, in modum crucis; φυτόν, planta."

Suaeda*) Forsk. 1775. Fl. Aegypt. Ar. p. 69: nov. g. Pentandr. Monogyn.
Scop. 1777. Intr. p. 333: g. Defloratar.
Gmel. 1791. Syst. p. 503: g. Pentandr. Trigyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 309: g. Chenopodear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4339. — Moq.-Tand. 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 303. t. 19—22. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 281. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 312.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Atriplicear. (ibid. I. p. 425 sect. Chenopodii.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Salsolear.
Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 216; 1840. Chenop. p. 120; ..., in Webb Canar. III. p. 207: g. Suaedinear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1941. p. 298; 1841. Ench. p. 182. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6394: g. Suaedear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1020.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Spirolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 214.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 155: g. Schanginiear. restrict. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. 2. p. 777.
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 29: g. Salicorniear. Subgen.: Eusuaeda, Chenopodina.
Synon. Lerchea Hall., Medic.; Lerchia Hall. (ex Endl.); Dondia Adans.; Trikalis Rafin.; Salsina Moq.-Tand.; Cochliospermum Lag.?

Suaeda Rchb. 1832. Fl. exc. p. 580: g. Chenopodear. (Kochia hirsuta Nolte, Salsola hyssopifolia et sedoides Pall.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Kochiear.
Koch 1837. Syn. p. 605. Ed. II. p. 695: sect. Kochiae.
= Echinopsilon Moq.-Tand.

Suaedeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 165: subdiv. Spirolobear. Gen.: Schanginia, Suaeda, Schoberia.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 152: trib. Spirolobear. Subtrib.: Schanginieae, Schoberieae. Gen. aff.: Belowia, Alexandra. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. 2. p. 774. Subtrib.: Schanginieae, Alexandreae.

Suaedineae Moquin-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 215; 1840. Chenop. p. 117: trib. Spirolobear. Gen.: Schoberia, Suaeda, Schanginia. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 298; 1841. Ench. p. 182. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 64) Alexandra. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234). Gen. ead. — A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315. Gen. ut Moq.

*) *Suaed* Arabum.

Suarda Nocca ex Steud. Nomencl. II. p. 651 (ligustrifolia).
= Eugenia baruensis.

Suardia Schrank .... Hort. Monac. II. t. 58; 1822. Denkschr. Ges. Regensb. II (Isis 1823. p. 849): nov. g. plantar.
= Melinis Palis.

Suaresia Leman 1827. Dict. v. 51. p. 201: nov. g. pro Jungermannia platyphylla L. propositum.
= Porella Dill.

Subaggregatae Agardh 1825. Class. plant. p. 17; 1826. Isis p. 590: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ord.: Nyctagineae, Staticinae, Valerianeae, Dipsaceae, Cynarocephalae, Corymbiferae, Cichoraceae, Campanulaceae.

Subdulcamara Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 84: subsect. Dulcamarae.

Suber Tourn. 1700. Inst. p. 584: g. pl. class. XIX.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 176: sect. Quercus. (Q. Ilex, Suber, Pseudo-Suber, coccifera.) — Simil. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 171. (restrict.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 25. n. 1845 *A VI:* sect. Ilicis.

Sublimia Commers. mss.
= Hyophorbe Gärtn.

Subularia Raj. 1670. Angl. *Cf. Subularia Dill.*
= Isoëtes Linn.

Subularia*) Linn. 1737. Gen. p. 191. n. 526; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 642; 1759. Syst. ed. X. p. 1126. n. 716; 1763. Sp. ed. II. p. 896; 1764. Gen. ed. VI. p. 332. n. 799; 1767. Syst. ed. XII. p. 432: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 488; 1784. Syst. p. 585. — Reich. 1778. Gen. p. 334. n. 863. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 436. n. 1075. — Gmel. 1791. Syst. p. 970. — Pers. 1797. Syst. p. 622. — Willd. 1800. Sp. III. p. 423. n. 1224. — Gmel. 1826. Bad. IV. p. 463.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 62. n. 251: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 240. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 506. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. IV. p. 91. (Verm. bot. Schr. V. p. 28.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 696. — Lois. 1827. Dict. v. 51. p. 225.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172 12: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 319: g. Siliculosar. — Par. Smel. 1805. Nov. Act. Petr. XIV. p. 478. — Pers. 1807. Ench. II. p. 189. n. 1556. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 718; 1825. Syst. II. p. 870. n. 2294; 1831. Gen. II. p. 517. n. 2538. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 404. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 674.

*) Nomen a figura foliorum. (Linn. Phil. bot. p. 168.)

Subularia Linn. cont.
Neck. 1790. El. III. p. 89. n. 1413: g. Brachytophytor.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 247; 1821. Syst. II. p. 697; 1824. Pr. I. p. 235: g. Subularieae. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 218. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 268. — Koch 1836. Syn. p. 67. Ed. II. p. 73. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (15). — Endl. 1839. Gen. n. 4977. p. 888; 1841. Ench. p. 451. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 227.
Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4760; 1832. Fl. exc. p. 664: g. Alyssinear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 300.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Heliophilear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6969: g. Camelinear. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 113.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Subularidar.
Synon. Consana Adans. pt.

Subularia Dillen. 1741. Hist. musc. p. 542. t. 81: g. Muscis aff.
Adans. 1763. Fam. II. p. 471: g. Arorum.
= Subularia Raj.?

Subularidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Diplecolobear. Gen.: Subularia.

Subularieae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 247; 1821. Syst. II. p. 155. 697; 1824. Prodr. I. p. 235: trib. Diplecolobear. Gen. unicum: Subularia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 268. Gen. id. et Platypetalum. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (15). Gen.: Subularia. — Endl. 1839. Gen. p. 888; 1841. Ench. p. 451. Gen. id.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI: subdiv. Siliculosar. Gen. id.
Koch 1836. Syn. p. 67. Ed. II. p. 73: trib. Latiseptar. Gen. id.

Succisa*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 211. Ed. Hall. 1745. p. 216: g. pl. class. IX. (ab Auctoribus vario sensu adoptatum.)
Vaill. 1722. Act. Ac. Paris. p. 174: g. Dipsacear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 671. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 476. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 46. *Cf.* Schult. 1827. Mant. III. p. 2 (sub *Cephalaria*). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 130. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 196. — Koch 1837. Syn. p. 344. Ed. II. p. 377.
Neck. 1790. El. I. p. 109. n. 191: g. Psydomorphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 488: g. Petalostemonis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 585; 1825. Syst. I. p. 378. n. 376; 1830. Gen. I. p. 88. n. 433: g. Aggregatar.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 743: sect. Scabiosae. (Sc. succisa et australis.) — Par. Lois. 1827. Dict. v. 48. p. 6. — Kunth 1838. Berol. I. p. 317.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1934; 1841. Nom. p. 72. n. 2693: g. Scabiosear. Sect. (1841): Succisa, Cephalaria.
= Cephalaria Schrad. et Succisa Coult. pt.

Succisa Coult. 1823. Dipsac. p. 37: sect. Scabiosae emend. (Sc. columbaria, etc.) — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 657. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 692. — Endl. 1838. Gen. n. 2195 c. p. 355; 1841. Ench. p. 229. — Walp. 1843. Rep. II. p. 536. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 456.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 450: subsect. Scabiosae verae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 324: g. Scabiosear.
Synon. Columbaria Thuill.

Succovia Spreng., Rchb. vid. *seq.*

Succowia Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 64; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 41: nov. g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen* — Bunias balcarica L.)
Mönch 1794. Meth. p. 265: g. Thalamostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 146: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Link 1822. En. II. p. 148.
Pers. 1807. Ench. II. p. 185. n. 1547: g. Siliculosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 721 (*Succovia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 534. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 675.
R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 79 (Verm. bot. Schr. V. p. 13): g. Cruciferar. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 250.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 642; 1824. Pr. I. p. 224: g. Vellear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 106. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI (*Succovia*); 1828. Consp. p. 182. n. 4737; 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6982. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 254. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4960. p. 884; 1841. Ench. p. 451. — Brongn. 1843. En. genr. p. 92.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 853. n. 2267 (*Succovia*); 1831. Gen. II. p. 512. n. 2510: g. Synclistar.
Link 1831. Hdb. II. p. 301: g. Alyssinear.
Webb 1836. Canar. I. p. 79: g. Anarthrocarpear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Vellidar.

Succowia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 32: nov. g. plant. (*Sida-Pou Rheede* VI. t. 59.)
= Hiptage Gärtn.

Succulentae Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: ordo 46 plant. Gen.: Cactus, Mesembryanthemum, Tetragonia, Aizoon, Sempervivum, Sedum, Cotyledon, Rhodiola, Crassula, Tillea, Anacampseros, Portulaca, Claytonia, Chrysosplenium, Heuchera, Saxifraga, Mitella, Penthorum, Geranium, Linum, Oxalis, Zygophyllum, Fagonia, Tribulus, Neurada?, Averrhoa.

*) Sic dicta, quod radix humano generi salutaris vulgo existimatur ab invido daemone succisa esse. (Borrich.)

Succulentae Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 13 plant. Gen. §. 1: Cactus, Mesembryanthemum, Aizoon, Tetragonia, Galenia, Tamarix, Reaumuria, Neurada. §. 2: Sempervivum, Septas, Penthorum, Sedum, Rhodiola, Tillea, Crassula, Cotyledon, Suriana. §. 3: Nama, Trianthema, Sesuvium, Portulaca, Claytonia. §. 4: Adoxa, Chrysosplenium, Saxifraga, Mitella, Tiarella, Hydrangea. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. Gen. ead. et in §. 1 Nymphaea, Sarracenia, Vahlia, in §. 2 Bergia et in §. 4 Heuchera.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 271: ordo 3 class. XIV. Gen.: Tillaea, Crassula, Cotyledon, Rhodiola, Sedum, Sempervivum, Septas. *Aff.:* Penthorum. (= *Crassulaceae DC.*)
Batsch 1802. Tab. p. 27: fam. Difformariar. Gen. ut Vent.
Haw. 1812. Syn. pl. succul. (Lond.) Ed. Schrank 1819. (Norimb.)
Haw. 1819. Suppl. pl. succ. (Lond.); 1821. Saxifragar. enum. Accedunt revisiones plant. succul.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ord.: Portulaceae, Crassulaceae, Aizoideae, Nopaleae.
Bartl. 1830. Ord. p. 307: class. (49) Gymnoblastor. Ord.: Ficoideae, Crassulaceae, Saxifrageae, Cunoniaceae.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 1: class. (12) Dicotyledoneor. Fam. ut Bartl.

Succuta*) Des Moulins 1853. Ét. org. s. l. Cusc. p. . . . : nov. g. Cuscutinear. (Cuscuta alba Presl.)

Suchtelenia**) „Karelin mss." DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 279 (188); 1846. Prodr. X. p. 162: nov. g. Cynoglossear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3784/2. p. 1403; 1841. Ench. p. 321; 1843. Spl. III. p. 78. — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4346 (*Suchtelinia*). — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 169.
Karelin 1841. Bull. soc. Mosc. p. 16. t. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.

Suchtelinia Rchb. vid. *praeced.*

Sudermannia Lindblad teste Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 449.
= Lindbladia Fries.

Suedineae Endl. Gen. p. 298: vid. *Suaedineae Moq.-Tand.*

Suensonia Gaudich. mss.
= Ottonia Spreng. (Endl. Spl. IV.)

Sufa Adans. 1763. Fam. II. p. 8: g. Fungor. (*Lycoperdon Mich.* t. 97. f. 2.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 270.
= . . . ?

Suffrena Hedw. vid. *seq.*

Suffrenia***) Bellardi 1796. Act. Ac. Taurin. XIII. p. 445. t. 1. f. 1.
DC. 1805. Franç. IV. p. 411: g. Salicariar. Par. Hedw. 1806. Gen. p. 20 (*Suffrena*). — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 60. 282. n. 110. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 711; 1825. Syst. I. p. 94. n. 124; 1830. Gen. I. p. 30. n. 132. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 639. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 104.
A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 377: g. Salicariear. — Par. DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 83; 1828. Pr. III. p. 76. — Lois. 1827. Dict. v. 51. p. 271. — Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4550; 1829 ap. Mössl. III. p. 1789; 1841. Nom. p. 172. n. 6636. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 708. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. — Meisn. 1838. Gen. p. 117 (83).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 615.
Link 1831. Hdb. II. p. 48: g. Lythrariar.
Endl. 1840. Gen. n. 6142. p. 1199; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear.

Suhria*) J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 68 in adnot.: nov. g. Coccocarpear. (Phyllophora villata Grev.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 41. n. 122/47. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54; 1849. ibid. XII. p. 90.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Sphaerococcoidear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 407: sect. Gelidii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Coccocarpidar.
= Gelidium Lamx. (Kütz.)

Suillideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 597. 646: div. Hymenothecear. Gen.: Suillus, Pinuzza, Leccinum, Fistulina.

Suillus Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 126. t. 68. 69: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 29: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 10: g. Fungor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 4.
Pers. 1801. Syn. p. 503: sect. Boleti. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 123.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 646: g. Suillidear.
= Boletus Dill.

Suitramia Rchb. vid. *Svitramia Cham.*

Sukaki „Kämpf." Auct. in synon. Cleyerae: vid. *Sakaki Kämpf.*

Sukana Adans. 1763. Fam. II. p. 269: g. Amaranthor. (*Amaranthus Barrelier* icon. 1195. *Bocc.* Mus. t. 66.)
Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 42. n. 561.
= Celosia Linn.?

Sulamea St. Hil., Hedw. vid. *Soulamea Lam.*

Sulipa**) Blanco 1837. Fl. de Filipin. p. 497: nov. g. Didynam. Angiosperm. (S. Pseudopsidium.) *Cf.* Endl. 1841. Spl. I. p. 1394.

---

*) Anagramma vocis Cuscuta.
**) Dicat. Joh. Petro a Suchtelen.
***) Dicat. Pet. Ant. Suffren de St. Tropez, ammirali.

*) Dicat. J. N. de Suhr, phycologo.
**) *Sulipa* nomen vernaculum.

Sulipa Blanco cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 2997: g. Gardeniear.? — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 360.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 71: g. Naucleear.

Sulitra Medic. (Vorles. II. p. 366) 1789. Vorles. IV. I. p. 345; 1789. Phil. Bot. I. p. 202: nov. g. ex typo Coluteae herbaceae L.
Mönch 1794. Meth. p. 164: g. Thalamostemonis.
= Lessertia DC.

Sulla Medic. (Vorles. II. p. 372) 1789. Vorles. IV. I. p. 352; 1789. Phil. Bot. I. p. 209: nov. g. ex typo Hedysari coronarii L.
= Echinolobium DC.

Sullivantia*) „Torrey & A. Gray mss." A. Gray 1842. Lond. journ. bot. I. p. 228 in adnot.: nov. g. pro Saxifraga? Sullivantia conditum. *Cf.* Sillim. Journ. XL. p. 22.
Endl. 1842. Spl. II. p. 107. n. $4632/_1$: g. Saxifragear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 357.
A. Gray 1846. Mem. Amer. Ac. n. ser. III. t. 6: g. Saxifragacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568.

Sulzeria**) Römer & Schult. 1819. Syst. IV. p. LX. 707. n. 851: g. Pentandr. Monogyn. (S. odorata.)
= Anabata Willd.

Sumac DC. 1825. Prodr. II. p. 67: sect. Rhois. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 211. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 217. — Endl. 1840. Gen. n. 5905 *c.* p. 1131; 1841. Ench. p. 599. Subsect.: Rhus, Toxicodendron. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 133.
Synon. Sumach Rupp.; Sumacrus Hedw.

Sumach Rupp. 1718. Fl. jen. p. 122. Ed. Hall. 1745. p. 135: g. pl. class. V. (Rhus coriaria Dodon.)
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 70: sect. Rhois.
= Sumac DC.

Sumachinae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLVI: div. Terebinthacear. Gen.: Schinus, Rhus. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 489. Gen.: Pistacia, Rhus.
Rchb. 1828. Consp. p. 147: subdiv. Terebinthacear. genuinar. Gen.: Rhus; Mauria, Duvaua, Schinus.
Link 1831. Hdb. II. p. 125: subordo Vernicear. Gen.: Rhus, Schinus.

Sumachinae Rchb. 1837. Handb. p. 224; 1841. Nomencl. p. 145: subdiv. Terebinthinear. Sect.: Pistacieae, Spondieae, Anacardieae.

Sumachineae DC. 1825. Prodr. II. p. 66: trib. Terebinthacear. Gen.: Rhus, Mauria, Duvaua, Schinus. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. Gen. ead. (excepta Mauria.) — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 61. 69. Gen. ead. et Stagmaria.

*) Dicat. Will. S. Sullivant, bryologo.
**) Dicat. Frid. Gabr. Sulzer.

Sumachineae DC. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 396: div. Cassuviear. Gen. ut DC.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 186. 209: trib. Cassuviear. Gen. ut. DC. et Heudelotia.

Sumacrus Hedwig f. 1806. Gen. p. 206. n. 844: g. Terebinthacear.
= Sumac DC.

Sumbavia*) Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 390: nov. g. Crotonidear. (S. rottleroides.)

Sunipia Buchanan ....in Rees Encycl. art. *Stelis.*
Lindl. 1826. Orchid. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1838. Orchid. p. 179; 1853. Fol. Orchid. 10 Jan.: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1495; 1841. Nom. p. 53. n. 2043. — Endl. 1837. Gen. n. 1438. p. 200; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 379(284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar.

Suprago Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 402. t. 167: nov. g. Tubulosar. (S. spicata. — Non S. glauca Gärtn. = Vernoniae sp.)
Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 228; 1827. v. 51. p. 384: g. Liatridear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 294.
Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Eupatorinar.
DC. 1836. Pr. V. p. 129: sect. Liatridis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2270 *b.* p. 368; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3839. 2.

Surculigera C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 611: sect. Androsaces. (A. villosa L.)

Suregada „Jones" Willd. ..... in Berl. n. Schr. IV. p. 206.
A. Juss. 1824. Euphorb. p. 60: g. Euphorbiacear. vix cognitum. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 392. — Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5100; 1841. Nom. p. 195. n. 7451. — Endl. 1840. Gen. n. 5883. p. 1125; 1841. Ench. p. 589.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (253): g. Rottlerear.?
Baill. 1858. Euphorb. p. 395: g. Crotonidear.
= Gelonium Roxb.

Surenus Rumph. 1743. Amboin. III. p. 126.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8092. 2: sect. Cedrelae.
= Cedrelae sect. Toona Endl.

Suriana*) Plumier 1703. Gen. p. 37. t. 40.
Linn. 1737. Gen. p. 340. n. 852; 1737. Cliff. p. 492; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 133. n. 309; 1753. Sp. I. p. 284; 1759. Syst. ed. X. p. 970. n. 253: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 69.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 624; 1764. Gen.

*) Nomen ab insula Sumbawa.
**) Dicat. Josepho Donato Surian, medico Massiliensi.

Suriana Plumier cont.
ed. VI. p. 230. n. 581; 1767. Syst. ed. XII. p. 318. n. 577: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 359; 1784. Syst. p. 431. — Reich. 1778. Gen. p. 236. n. 632. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 310. n. 792. — Gmel. 1791. Syst. p. 733. — Pers. 1797. Syst. p. 462; 1805. Ench. I. p. 513. n. 1142. — Willd. 1799. Sp. II. p. 771. n. 916.
Adans. 1763. Fam. II. p. 249: g. Sedorum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Gled. 1764. Syst. p. 272. n. 1118: g. Calycostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 253: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 339: g. Spiraear.
Neck. 1790. El. II. p. 329. n. 1118: g. Acascophytor.
Hedw. 1806. Gen. p. 339. n. 1332: g. Rosacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 438. n. 1732; 1830. Gen. I. p. 383. n. 1928.(?) — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 405. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1616.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 866: g. Spiraeear.
DC. 1825. Pr. II. p. 91: g. Terebinthaceis aff., minus notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 78.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 361: g. Surianear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99). — Endl. 1840. Gen. n. 5953. p. 1140; 1841. Ench. p. 604. — Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5626.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 142; 1847. Veg. kd. p. 509: g. Surianacear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 556.

Suriana Dombey mss.
= Ercilla A. Juss. (Meisn. Comm. p. 235.)

Surianaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 142; 1847. Veg. kingd. p. 509: fam. Phytolaccacear.? Gen.: Suriana.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 556: ordo Dicotyledonum. Gen. id.

Surianeae Arnott 1834 in Wight & Arn. Prodr. I. p. 360: ordo plant. Gen.: Suriana.
Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99): ordo 96 plant. (p. 440 Corniculatar.) Gen.: Suriana; Cneorum?, Heterodendron?
Endl. 1840. Gen. p. 1140; 1841. Ench. p. 604: fam. Connaraceis aff. Gen. ut Meisn. Accedit 1850 (Spl. V. p. 99) Rhigiostachys.
Rchb. 1841. Nom. p. 145: sect. Connarear. Gen.: Suriana.

Surindia*) Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 68: sect. Nisae.

Surirella**) Turpin 1828. Mém. Mus. XVI. p. 361: nov. g. plantar. (S. striata.)
Ehrenb. 1833. Verb. in Amer. p. 136; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 213: sect. Naviculae.

*) Vernacule *Voa Surindi.*
**) Dicat. Dr. Suriray.

Surirella Turpin cont.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 70; 1849. Sp. Alg. p. 34. n. 28: g. Surirellear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 24; 1853. Süssw. Diatom. — Math. 1853. Belg. II. p. 541.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Eubacillariear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 98: g. Diatomear.
Synon. Sphinctocystis Hass.

Surirelleae Kütz. 1844. Bacill. p. 48; 1845. Phycol. germ. p. 70; 1849. Sp. Alg. p. 32: fam. Diatomear. Gen.: Campylodiscus, Surirella, Bacillaria, Synedra, Raphoneis, Doryphora.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 24: subsect. Naviculacear. Gen.: Surirella, Synedra.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: fam. Diatomacear. ovoidear. Gen.: Surirella, Amphora.
Math. 1853. Belg. II. p. 551: ordo 37 Algar. Gen. ut Rabenh. 1847.

Surubea St. Hil. (et Meyer Esseq. p. 119?): vid. *Souroubea Aubl.*

Surwala Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 85. 108: nov. g. Trichiliear. (Walsura robusta Roxb.)

Susiana Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 70; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 110: subg. Iridis. (I. Susiana L.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 829.

Suspicante „Schwein." Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: g. Tylostomeor.? (Nonne nomen sphalmate ortum?)

Sussodia Hamilt. mss. ex D. Don Fl. Nepal. p. 104.
= Colebrookia Smith.

Susum*) Blume 1830 in Schult. Syst. VII. p. XCV. 1493. n. 1526: nov. g. Smilacear.? (S. anthelminthicum.)
Endl. 1837. Gen. n. 1055. p. 132; 1841. Ench. p. 76: g. Xerotidear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1680. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310). — Steud. 1855. Glum. II. p. 309. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 247.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192: g. Juncacear.

Sutera**) Roth 1787. Bot. Bem. u. Bericht. p. 172; 1821. Nov. spec. p. 291: nov. g. Didynam. Angiosperm.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 4: g. Buchnerear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4634. (genuinar.)
Benth. 1835. Scroph. ind. p. 42: g. Gratiolear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 199. — Endl. 1839. Gen. n. 3929. p. 680; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 513. — Walp. 1845. Rep. III. p. 271. 963.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 362: g. Manuleiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g.

*) Nomen e σοῦσον, lilium.
**) Dicat. Joh. Rud. Suter, prof. Berrensi.

Sutera Roth cont.
Manulear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 676 (*Suteria*).
Synon. Leucospora Nutt.?; Manuleae sp. Willd.

Suteria DC. 1830. Prodr. IV. p. 536: nov. g. Cephäelidear. (Cephäelis calycina Lindl.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 608. — Endl. 1838. Gen. n. 3144. p. 531; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 170(119). — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2794. — Walp. 1843. Rep. II. p. 470; 1847. VI. p. 36.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 253 (*Sutoria*): g. Psychotriear.

Suteria Miquel vid. *Sutera Roth.*

Sutherlandia Gmel. 1791. Syst. p. 1027: g. Monadelph. Decandr.
= Heritiera Dryand.

Sutherlandia Räusch. ex Steud. Nom. II. p. 652: g. Monoec. Polyandr. (S. littoralis.) Quid?

Sutherlandia *) R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 327 (Verm. bot. Schr. II. p. 480): nov. g. Leguminosar. (Colutea frutescens L.) — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 754; 1826. Syst. III. p. 242. n. 2551; 1831. Gen. II. p. 582. n. 2854. — Link 1822. En. II. p. 243. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 412.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 273. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3914; 1841. Nom. p. 148. n. 5755. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 247. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 273. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 121. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6566. p. 1276; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 683. — Brongn. 1843. En. genr. p. 129. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Link 1831. Hdb. II. p. 201: g. Galegoidear.
Synon. Colutia Medic.

Sutoria A. Juss. vid. *Suteria DC.*

Sutrina Lindl. 1842. Ann. nat. hist. X. p. 184: nov. g. Vandear., Macradeniae aff. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 686. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 61. n. 1457 $_1$. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl 1847. Veg. kd p. 182: g Notylidar.

Suttonia **) A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 349: nov. g. Terebinthacear.
Meisn 1837 Gen. p 74 (54): g Cassuviear? *Cf.* Comm. p. 162.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374: g. Ardisiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 449.
Hook. f. 1845. Antarct. voy. I. p. 49; 1853. N. Zeal. I. p. 172: g. Myrsinear.
? = Myrsine Linn.

*) Culta 1683 a Jacobo Sutherland.
**) Dicat. Rev. Dr. Sutton.

Suzygium *) P. Browne 1756. Jamaic. p. 240. t. 7. f. 2: nov. g. Icosandr. Monogyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.
Scop. 1777. Intr. p. 221: g. Calycanthemar.
= Calyptranthes Swartz.

Svartzieae DC. vid. *Swartzieae DC.*

Svertia Adans. vid. *Swertia Linn.*

Svietenia Gled. vid. *Swietenia Linn.*

Svitramia Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 445: nov. g. Osbeckiar.
Meisn. 1838. Gen. p. 116(82): g. Osbeckiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6213. p. 1213; 1841. Ench. p. 646. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1443. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6721 (*Suitramia*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 132. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 86: g. Clidemiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 696.

Swainsona **) „Salisb. Parad. p. 28“ R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 326 (Verm. bot. Schr. II. p. 479): g. Leguminosar. (Colutea galegifolia Sims.)
DC. 1825. Pr. II. p. 271: g. Galegear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6562. p. 1276; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1843. Rep. II. p. 860. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 494. — C. Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 364.
Synon. Loxidium Vent.; Swainsonia Spreng.

Swainsonia Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 754; 1826. Syst. III. p. 242. n. 2550; 1831. Gen. II. p. 582. n. 2853: g. Leguminosar. — Par. Link 1822. Enum. II. p. 243.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3915; 1841. Nom. p. 148. n. 5751. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 245. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 273. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Brongn. 1843. En. genr. p. 129. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
= Swainsona Salisb.

Swalbea Linn. 1751. 1764 vid. *Schwalbea Linn.*

Swammerdamia ***) DC. 1837. Prodr. VI. p. 164: nov. g. Helichrysear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2737. p. 445; 1841. Ench. p. 243. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3494. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 237.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Swanalloia Hort. vid. *Juanulloa Ruiz & Pav.*

*) *συζυγία*, connexio.
**) Dicat. Isaac Swainson, botanico anglico.
***) Ex pappo antenniformi dicat. cl. entomologo Batavo Joh. Swammerdam.

Swartsia Gmel. 1791. Syst. p. 360: g. Pentandr. Monogyn.
= Solandra Swartz.

Swartzia Ehrh. Crypt. exsicc.
= Weisia Hedw.

Swartzia*) Hedwig 1787. Musc. frond. I.
Roth 1800. Germ. III. p. 199: sect. Didymodontis.
Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 20; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 443: g. Ectopogonor.
= Didymodon Hedw. et Trichostomum Hedw. emend.

Swartzia Schreb. 1791. Gen. II. p. 518. n. 1227: g. Polyadelph. Polyandr.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4157 (*Swarzia*): g. Swarziear.
Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6110: g. Swartziear.
= Tounatea Aubl.

Swartzia Willd. 1799. Spec. II. p. 1219. n. 1054: g. Polyandr. Monogyn. emend. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 80. n. 1318.
Cram. 1803. Disp. p. 119: g. Dodecandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 567. n. 1878; 1830. Gen. I. p. 421. n. 2091: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 206. 217.
DC. 1825. Pr. II. p. 422: g. Swartziear. Sect.: Possira, Tounatea. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX. — Bartl. 1830. Ord. p. 413. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 379. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 146. — Vogel 1837. Linnaea XI. p. 168. Sect. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 95(68). — Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73. — Endl. 1841. Gen. n. 6814. p. 1322; 1841. Ench. p. 681. Sect. eaed. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 456. — Walp. 1846. Rep. V. p. 563. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 132: g. Caesalpiniear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 61. t. 267.
Synon. Possira et Tounatea Aubl.; Swartzia et Rittera Schreb.; Hölzelia Neck.; Tunatea Gmel.; Gynantistrophe Poit.

Swartzieae DC. (Lég. Mém. XI.) 1825. Prodr. II. p. 422: subordo 2 (s. tribus 7) Leguminosar. Gen.: Swartzia, Baphia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 103. 379. Gen. ead. et Zollernia. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68). Gen. ut Don.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: trib. Leguminosar. Gen. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 413: ordo (244) Calophytar. Gen. ead. et Zollernia.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo ad Leguminosas accedens.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 145: fam. 3 Calophytar. Gen. ut Bartl. et Calycandra.
Vogel 1837. Linnaea XI. p. 165. Gen. brasil.: Zollernia, Swartzia.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73; 1841. ibid. III. p. 133: trib. Caesalpiniear.

Swartzieae DC. cont.
Gen.: Martiusia, Zollernia, Swartzia, Cordyla, Allania. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen.: Moldenhawera, Martia, Zollernia, Swartzia, Aldina, Trischidium, Cordyla. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 273. Gen. ut Benth. et Bracteolaria, Baphia, Trischidium.
Endl. 1841. Gen. p. 1321: ordo (276) Leguminosar. Gen. ut Bartl. et Aldina.
Rchb. 1841. Nom. p. 156: div. Mimosacear. Gen. ut Endl. et Possira.

Swartzieae Endl. 1841. Ench. p. 681: ordo (278) Leguminosar., latius definitus. Subord.: *verae* (gen.: Baphia, Zollernia, Swartzia, Aldina. Accedunt 1842 [Spl. II. p. 99] Bracteolaria, Martia), Detarieae.

Swarzia Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 161; II. 1. p. 117: g. Aploperistomator.
= Desmatodon Brid.

Swarzia Rchb. vid. *Swartzia Schreb.*

Swarzieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLIX: div. Cassiear. Gen.: Swartzia, Baphia.
Rchb. 1828. Consp. p. 166: div. Mimosear. Gen.: Swarzia, Zollernia, Baphia, Possira.
Rchb. 1837. Hdb. p. 228: div. Mimosacear. Gen. ead.
= Swartzieae DC.

Sweertia Koch vid. *Swertia Linn.*

Sweetia *) DC. 1825. Prodr. II. p. 381: nov. g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3926. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 342. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. — Meisn. 1837. Gen. p. 93(66).
= Galactia P. Browne.

Sweetia Spreng. 1825. Syst. II. p. 213. n. 1424: nov. g. Octandr. Monogyn. (fam. dubiae.)
Spreng. 1830. Gen. I. p. 352. n. 1777: g. Leguminosar.
= Acosmium Schott.

Swenkia Hedw. f. vid. *Schwenkia Linn.*

Swertia **) Linn. 1737. Gen. p. 45. n. 126; 1737. Cliff. p. 53: g. Pentandr. Monogyn.
Linn. 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 101. n. 237; 1753. Sp. I. p. 226; 1759. Syst. ed. X. p. 951. n. 284; 1762. Sp. ed. II. p. 328; 1764. Gen. ed. VI. p. 125. n. 321; 1767. Syst. ed. XII. p. 199. n. 318: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 220; 1784. Syst. p. 266. — Reich. 1778. Gen. p. 130. n. 351. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 175. n. 449. — Gmel. 1791. Syst. p. 459. — Pers. 1797. Syst. p. 280. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1329. n. 511. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 12. 266.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Rotacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Gentianar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 142. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 339. (verar.)

*) Dicat. Olao Swartz, prof. Holmiensi.

*) Dicat. Rob. Sweet, hortulano Londin.
**) Dicat. Eman. Swert, Batavo.

Swertia Linn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 503 (*Svertia*): g. Apocynor.
Gled. 1764. Syst. p. 210. n. 879: g. Petalostemonum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 111: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 134: g. Monopetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 35. n. 666: g. Darinyphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 160. t. 160.
Schmidt 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 9. Excluditur Sw. corniculata? *Cf.* Borckh. ibid. p. 24.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 414: g. Gentianear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 199. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 323. — Pers. 1805. Ench. I. p. 287. n. 636. — DC. 1805. Franç. III. p. 649. — Hedw. 1806. Gen. p. 181. n. 744. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 473; 1825. Syst. I. p. 860. n. 1002; 1830. Gen. I. p. 214. n. 1100. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 174. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XIV. 129. — Link 1821. En. I. p. 258; 1829. Hdb. I. p. 426. — Kunth 1823. Syn. II. p. 266. — D. Don 1825. Nepal. p. 127. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 847. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 290. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 32. — D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 518. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 175. (verar.) — Koch 1837. Syn. p. 485. Ed. II. p. 558 (sphalm. *Sweertia*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 917. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 496.
Cram. 1803. Disp. p. 43 in Tetrandr. Digyn. et p. 79 in Hexandr. Digyn.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 102: g. Tetrandr. Monogyn.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60 (*Swertzia*): g. Gentianidiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3500; 1831. Fl. exc. p. 429: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3530. p. 601; 1841. Ench. p. 302. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 54.
Griseb. .... in Hook. Fl. bor. am. II. p. 66; 1839. Gent. gen. p. 331; 1845 in DC. Pr. IX. p. 131: g. Swerticar. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 133. n. 5131. (genuinar.) — Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 509. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 74.
Synon. *Μελανοστικτη* Renealm.

Swertia Allion. 1785. Fl. Pedem. I. p. 208.
= Tolpis Adans. (Bertol. in Röm. Collect. p. 105.)

Swertia Labill. .... Nov. Holl. t. 97.
= Villarsia Vent.

Swertieae Griseb. .... in Hook. Fl. bor. am. II. p. 54: trib. Gentianear. Gen.: Gentiana, Pleurogyne, Swertia, Frasera, Halenia. — Par. Griseb. 1839. Gent. gen. p. 69. 209.

Swertieae Griseb. cont.
Gen.: Gentiana, Crawfurdia, Tripterospermum, Centaurella, Pleurogyne, Anagallidium, Ophelia, Exadenus, Halenia, Frasera, Swertia. — Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170. Gen. ead. et Mitreola?
Rchb. 1837. Hdb. p. 211: sect. Chironiear. Gen.: Pleurogyne, Gentiana; Anagallidium, Swertia, Ophelia; Parnassia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. Subsect.: Pneumonantheae, *genuinae* (gen.: Swertia, Anagallidium, Ophelia), Parnassieae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6. 13: sect. Gentianear. verar. Gen. ut Griseb. 1839.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 86: subtrib. Gentianear. Gen. ut 1839 et Eudoxia, Stellera. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 78. Gen. ead. et Henricea, Sczuckinia.

Swertzia Dumort. vid. *Swertia Linn.*

Swieteneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 462: trib. Cedrelacear. Gen. Swieteniear. A. Juss.

Swietenia*) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 548; 1764. Gen. ed. VI. p. 209. n. 521; 1767. Syst. ed. XII. p. 294. n. 522: g. Decandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 127. — Murr. 1774. Syst. p. 332; 1784. Syst. p. 399. — Reich. 1778. Gen. p. 217. n. 575. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 286. n. 723. — Gmel. 1791. Syst. p. 680. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 18. 46. t. 17. 64; 1832. Ind. II. p. 398. — Pers. 1797. Syst. p. 427. — Willd. 1799. Sp. II. p. 557. n. 843.
Gled. 1764. Syst. p. 138. n. 584 (*Svietenia*): g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 285: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 266: g. Meliis aff. (B. Juss. in Ht. Trian.: g. Myrtillor.)
Cavan. 1789. Diss. VII. p. 365. t. 209.
Neck. 1790. El. II. p. 431. n. 1258: g. Comizophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 89. t. 96.
Gis. 1792. Prael. p. 364: g. Tribilatar.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 164: g. Meliaceis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 46. — Hedw. 1806. Gen. p. 303. n. 1203.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
Cram. 1803. Disp. p. 160: in Monadelph. Decandr.
Pers. 1805. Ench. I. p. 469. n. 1065: g. Meliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 400; 1831. Hdb. II. p. 335. — Poir. 1823. Dict. v. 28. p. 81 (*Mahogon*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 685; 1826. Syst. III. p. 69. n. 2393; 1831. Gen. II. p. 543. n. 2663: g. Meliear.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 220: g. Cedrelear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 625. — Kunth 1824. Syn. III. p. 219. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 212. n. 5517. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 357. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 85.

*) Dicat. Gerardo L. B. a Swieten. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 206.

Swietenia Linn. cont.
A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 248. t. 22: g. Swieteniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 163. — Meisn. 1837. Gen. p. 47 (35). — Rchb. 1837. Hdb. p. 313 (genuinar.); 1841. Nom. p. 213. n. 8085. — Endl. 1840. Gen. n. 5549. p. 1053; 1841. Ench. p. 553. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 129. 132.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 687: g. Cedreleacear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 241: g. Cedrelacear. — Par. A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 304.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 462: g. Swietenear.
Synon. Mahagoni Adans.; Roia Scop.; Cedrus Mill. pt.

Swietenieae A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 248; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 80: trib. Cedrelacear. Gen.: Swietenia, Khaya, Soymida, Chukrasia. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 163. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 47. Gen. ead. (Chickrassia loco Chukrasiae) et Macharisia? — Endl. 1840. Gen. p. 1053; 1841. Ench. p. 553. Gen. ead. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 128. 132. Gen. ut Meisn.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: subdiv. Meliear. Sect.: *genuinae* (gen.: Swietenia, Soymida, Chickrassia), Khayeae, Cedreleae.
Rchb. 1841. Nom. p. 213: sect. Cedrelear. Gen. Swieteniear. genuinar. 1837.

Swintonia Griffith 1846. Linn. Trans. Febr. *Cf.* Duchartre Rev. bot. II. p. 330 et Hook. f. 1846. Ann. and Mag. XVII.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 200: g. Anacardiear.

Syagrus*) Martius 1824. Palm. fam. p. 18; .... Palm. Bras. p. 129. t. 89. 90: nov. g. Cocoinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1636; 1841. Nom. p. 58. n. 2276. — Endl. 1837. Gen. n. 1773. p. 256; 1841. Ench. p. 136. — Kunth 1841. Enum. III. p. 288. — Meisn. 1842. Gen. p. 358 (267).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 141. n. 1351; 1830. Gen. I. p. 285. n. 1479: g. Palmar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1204.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 63: g. Cocoinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Cocoëar.

Syalita Rheede 1682. Ht. Malab. III. p. 39. t. 38. 39.
Adans. 1763. Fam. II. p. 364: g. Anonar.
= Dillenia Linn.

Syama Jones 1795. Asiat. Research. IV. p. 161.
= Pupalia Mart.?

Sychinium**) Desvaux 1825. Ann. soc. Linn. Par. IV. p. 216. t. 12: nov. g. Urticear. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 416.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 491. 511

*) Nomen palmae apud Plinium.
**) „σύκινος, ficarius."

Sychinium Desvaux cont.
(*Sychinum*): g. Dorsteniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2521.
Endl. 1837. Gen. n. 1860 *a*. p. 279; 1841. Ench. p. 165; 1847. Spl. IV. p. 35: sect. Dorsteniae. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 732.

Sychinum Gaudich. vid. *praeced.*

Sychnogonia*) Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 332: nov. g. Verrucariear. (S. Bayrhofferi.)

Sychnoneura A. DC. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 30; 1856. Prodr. XIV. 1. p. 196: sect. Myristicae. (M. peruviana et gracilis.)

Sycidium Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 228: sect. Ficus. (F. humilis Roxb., etc.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 711.

Sycioideae Walp. Repert. II. p. 204: vid. *Sicyoideae Schrad.*

Sycioides Hall. vid. *Sicyoides Tourn.*

Sycios Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 190: vid. *Sicyoides Medic.*
Nutt. 1818. Gen. II. p. 239: g. Monoec. Monadelph. (corr. in Ind.)
Link 1822. En. II. p. 404: g. Cucurbitacear.
Walp. 1843. Rep. II. p. 204: g. Sycioidear.
= Sicyos Linn.

Syckorea**) Corda 1829 in Opiz Beitr. I. p. ... (*cf.* Linnaea V. Litt. p. 79: *Sykorea*); 1830 in Sturm Jungerm. p. 6. 41: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. viticulosa L.)
= Saccogyna Dumort.

Sycocarpus Miquel 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 33: sect. Ficus. (F. humilis, congesta, etc.)
= Stilpnophyllum Endl.

Sycoideae Link 1829. Hdb. I. p. 292: ordo 2 Vaginalium. Gen.: Ficus, Dorstenia, Artocarpus.

Sycomorphe Miquel 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 35: nov. g. ex typo Ficus oppositifoliae W.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 268: g. Moracear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 34. n. 1859 *A*: sect. Ficus.

Sycomorus***) Gasparr. 1845. Ricerch. Caprif. p. 86: nov. g. a Ficu L. sejunctum. (Ficus Sycomorus L.)
Miq. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 525; 1848. ibid. VII. p. 109: g. Ficuum.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 702: g. Morear.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 64: g. Ficear.

Syderitis Allion. vid. *Sideritis Tourn.*

Syderoxylon Cram. vid. *Sideroxylon Linn.*

Syena†) Schreb. 1789. Gen. I. p. 39. n. 88: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 121. — Willd. 1797. Sp. I. p. 254. n. 106. — Pers. 1805. Ench. I. p. 56. n. 115. — Vahl 1806. Enum. II. p. 180. n.

*) συχνός, copiosus; γονή, proles.
**) Dicat. dom. Syckora, Pragensi.
***) σύκη, ficus; μόρον, morum. Arbor veteribus valde celebrata.
†) Dicat. Arn. Syen, prof. Amstelodam.

Syena Schreb. cont.
109. — Hedw. 1806. Gen. p. 30. 358. — Elliott 1817. Sketch I. p. 50. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 28.
Batsch 1802. Tab. p. 125: g. Ephemeror.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 347. 542. n. 157: g. Juncor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 253; 1825. Syst. I. p. 170. n. 182; 1830. Gen. I. p. 42. n. 193: g. Commelinear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 168. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 129. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 176.
= Mayaca Aubl.

Syennema Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 43: nov. g. Confervar. (C. elongata, nigra, foetida, etc.)
= Polysiphoniae, Chroolepi (?) etc. sp.

*Sygolliphytum**) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 229: gen. 10 plant. Spec. natur.: Jasione, Phyteuma, Pernetya, Campanula, Apenula, Roella, Trachelium, Elaterium, Anguria, Psiguria, Cucumis, Rigocarpus, Melothria, Cucurbita, Citrullus, Momordica, Poppya, Amordica, Sicyos, Bryonia, Trichosanthes, Fevillaea, Zanonia.

Sykesia Walker-Arnott 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 351: nov. g. Gärtneriear. (Psychotria vaginans DC.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XI. 1839. p. 64.
Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168): g. Gärtnerear. — Par. A. DC. 1845. Pr. IX. p. 35.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3370 *b*. p. 1395; 1841. Ench. p. 289: sect. Gärtnerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5142. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Loganear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425: g. Loganiear.

Sykorea „Corda" Linnaea V. Litt. p. 79: vid. *Syckorea Corda.*

Sylibum Dumort. vid. *Silybum Vaill.*

Sylitra**) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 114: nov. g. Galegear. — Par Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6565. p. 1276; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5754. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Syllinum Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 115: sect. Lini. (L. flavum, nodiflorum.) — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 279.
Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 598; 1848. ibid. VII. p. 509: subg. Lini. Series: Limoniopsis, Dasylinum. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 95.

Syllisium Endl., Lindl. vid. *seq.*

Syllysium***) Meyen & Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 334: nov. g. Myrtear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 102. n. 6317/1 (*Syllisium*). — Walp. 1846. Rep. V. p. 751. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738 (*Syllisium*).

Sylvia Gaudin 1828. Fl. Helvet. III. p. 490: sect. Anemones. (A. baldensis, sylvestris, nemorosa, ranunculoides.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 243.
= Anemonantheae DC. pars.

*) *Συγκόλλησις*, conglutinatio, ferruminatio; *φυτόν*, planta.
**) *Συλιθρα* Dioscoridi synonymum Glycyrrhizae?
***) *σύλλισις*, separatio.

Sylvia Benth. vid. *Silvia Benth.*

Symbasiandra Willd. herb. nr. 1638 ex Trin. mss. in Steud. Nom. I. p. 767; II. p. 654 (*Symbascandra*).
= Hilaria HBK.

Symblepharis Montagne 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VIII. p. 252; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 118: nov. g. Trichostomoidear. (S. helicophylla.)
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 460: g. Leptotrichacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Dicranear.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 60: g. Weissiar.

Symblomeria Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 284: nov. g. Vernoniacear. (S. Baldwiniana.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 37. n. 2218/1: g. Heterocomear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 99.

Symbolanthus*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 175. 210: nov. g. Lisianthear. (Lisianthus anomalus HBK.) — Par. Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 79.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.

Symbolophora Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 74: nov. g. Naviculaceor., Actinoptycho aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 131. n. 84: g. Coscinodiscear.

Symmeria Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 630: nov. g. Polygonear. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 55. n. 1997/1.
Meisn. (1848. Linnaea XXI. p. 266) 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 45; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 185: g. Symmeriear.
Synon. Thurnheyssera Mart.; Amalobotrya Kunth.

Symmericae Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5: subtrib. Apterocarpar. Gen.: Symmeria.
Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 185: subordo Polygonacear. Gen. id.

Symmetria Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1130: nov. g. Salicariar. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 391. n. 1964. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 17.
DC. 1828. Pr. III. p. 94: g. Lythrariear. dubium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 725. — Endl. 1840. Gen. n. 6167. p. 1204; 1841. Ench. p. 643.
Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4576; 1841. Nom. p. 172. n. 6670: g. Salicariear.? — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lagerstromear.?
= Carallia Roxb.

Sympagis**) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 84: sect. Strobilanthis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4053 *c*. p. 700; 1841. Ench. p. 343. — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4250. 3.

Symperidium Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 245: nov. g. Aecidineor.

*) *σύμβολον*, annulus (ad basin filamentorum).
**) *συμπαγής*, compositus.

Symphachne „Palis. mss." Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. 47. t. 5. f. 3: nov. g. Eriocaulonear. (S. xyroides.)
Kunth 1841. Enum. III. p. 580: g. Eriocaulear. (dubium.) — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 407 (312). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 140.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 122: g. Eriocaulaceear.?
= Philodice Mart.?

Symphiandra Spach vid. *Symphyandra A. DC.*

Symphioloma Spach vid. *Symphyoloma C. A. Meyer.*

Symphionema R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811.) p. 157 (Verm. bot. Schr. II. p. 250); 1810. Prodr. I. p. 370. Ed. Nees p. 387: nov. g. Proteacear. (S. paludosum et montanum.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 405. n. 541. — Bartl. 1830. Ord. p. 117.
Vid. Symphyonema.

Symphisia Spach vid. *Symphysia Presl.*

Symphitum Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 54: g. Pentastemonum monostylar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 479: g. Borraginear.
Roth 1788. Germ. I. p. 84; 1789. II. p. 215: g. Pentandr. Monogyn.
Spach 1840. Vég. phan. IV. p. 37: g. Asperifoliear.
Math. 1853. Belg. I. p. 354: g. Anchusear.
= Symphytum Tourn.

Symphocalyx*) Berland. 1826. Mém. soc. Genèv. III. 2. p. 56. t. 2; 1828 in DC. Prodr. III. p. 483: sect. Ribis. (An genus proprium?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4247 *d.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 191.
= Siphocalyx Endl.

Symphonia Linn. f. 1781. Suppl. p. 49. n. 411: g. Monadelph. Pentandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 610. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 452. n. 1106. — Gmel. 1791. Syst. p. 1009. — Pers. 1797. Syst. p. 648; 1807. Ench. II. p. 215. n. 1590. — Willd. 1800. Sp. III. p. 585. n. 1256.
Juss. 1789. Gen. p. 263: g. Meliar.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 41: g. Meliacear. — Par. Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 518.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 686: g. Meliear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 334. n. 2615; 1831. Gen. II. p. 598. n. 2952: g. Guttiferar.
Meisn. 1837. Gen. p. 42 (32): sect. Moronobeae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Chrysopiear.
= Moronobea Aubl.

Symphoniaceae Presl 1832. Symb. bot. I. p. 71: div. Guttiferar. Novum genus: Aneuriscus.

Symphonieae Choisy 1824 in DC. Prodr. I. p. 563: trib. Guttiferar. Gen.: Canella, Moronobea, Chrysopia. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 42. Gen.: Gynotroches, Platonia, Canella?, Moronobea.

*) Nomen a calyce tubuloso.

Symphonieae Choisy cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: subdiv. Meliacear. Gen.: Canella, Moronobea.
Bartl. 1830. Ord. p. 294: div. Garciniear. Gen. ut Choisy.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: subdiv. Garciniear. Sect.: Chrysopieae, Gynotrocheae, Platonieae.

Symphopoda Spach vid. *Symphyopoda DC.*

Symphoranthus Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 219 (nec *Symphoranthos*): nov. g. (Tetrandr. Monogyn.)
= Polypremum Linn. (Amoen. ac. III. p. 9.)

Symphorea Elliott vid. *Symphoria Pers.*

Symphorema*) Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 46. t. 186; 1832. Fl. Ind. II. p. 262: nov. g. Octandr. Monogyn. (S. involucratum.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 208. n. 1418; 1830. Gen. I. p. 300. n. 1537. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1262.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 429: g. Heptandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5587: inter genera vix cognita.
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Dodonaeacear.?
Endl. 1838. Gen. n. 3716. p. 638; 1841. Ench. p. 312: g. Aegiphilear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4217.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227: g. Viticear.
Meisn. 1840. Gen. p. 292 (200): g. Symphoremear. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 116. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 621. — Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 13.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Synon. Analectis Vahl?

Symphoremeae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 392 (200): trib. Verbenacear. Gen.: Symphorema, Congea.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 620: subtrib. Viticear. Gen. ead. et Sphaenodesma. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 185. Gen. ead.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 13: ordo? Verbenaceis aff. Gen. ut Meisn. et Sphenodesme.

Symphoria Pers. 1805. Ench. I. p. 214: nomen abbreviatum pro *Symphoricarpo* propositum.
Elliott 1817. Sketch I. p. 272 (*Symphorea*): g. Pentandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 138.
R. Brown 1820. Bot. Mag. n. 2211 (Verm. bot. Schr. V. p. 330): g. Caprifoliacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI. — Link 1829. Hdb. I. p. 666. — Bartl. 1830. Ord. p. 214.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Lygistidiae.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 757. n. 811; 1830. Gen. I. p. 173. n. 871: g. Caprifolior. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 783.

*) συμφόρημα, cumulus.

Symphoria Pers. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1980: g. Lonicerear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Caprifoliar.
Math. 1853. Belg. I. p. 248: g. Caprifoliear.
= Symphoricarpos Dill.

Symphoricarpa Necker vid. *seq.*

Symphoricarpos *) Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 371. t. 278. f. 360.
Adans. 1763. Fam. II. p. 157: g. Caprifolior. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 211. — Hedw. 1806. Gen. p. 148. n. 633. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XIV. 222. n. 904.
Neck. 1790. El. I. p. 129. n. 220 (*Symphoricarpa*): g. Sphanidophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 502: g. Petalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 596: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 455. — Link 1821. En. I. p. 221. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 361. Sect.: Cuphantha, Craterantha.
Michx. 1803. Fl. am. I. p. 106: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1809. Enum. p. 221.
Pers. 1805. Ench. I. p. 214: sect. Lonicerae. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 367.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 429: g. Caprifoliear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 338: g. Lonicerear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 451. — Meisn. 1838. Gen. p. 155(111). — Walp. 1843. Rep. II. p. 446. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 47.
Synon. Symphoria Pers.; Symphorea Ell.; Anisanthus Willd.; Symphoricarpus Kunth.

Symphoricarpus HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 424. g. Caprifoliacear. verar. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 71.
Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 284: g. Lonicerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3334. p. 568; 1841. Ench. p. 282. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 94.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 3: g. Caprifoliar.
Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2741: g. Linnaeacear
= Symphoricarpos Dill.

Symphyandra **) A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 365; 1839. Prodr. VII. 2. p. 494: nov. g. Campanulear. Sect. (1839): Anotocalyx, Otocalyx. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 771. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4025. (genuinar.) Sect. (1841): Anotocalyx, Symphyandra. — Endl. 1838. Gen. n. 3089. p. 518; 1841. Ench. p. 267. Sect.: Melanocalyx, Sericodon. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 896. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148): g. Jasionear.

*) *σύμφορος*, congestus; *κάρπος*, fructus.
**) *σύμφυσις*, concretio; *ἀνήρ*, vir: propter stamina connata.

Symphyandra A. DC. cont.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 758: subg. Campanulae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 536 (*Symphiandra*): g. Campanulacear.

Symphyanthus DC. 1830. Prodr. IV. p. 296: sect. Loranthi. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 382.
= Lepostegeres et Elytranthe Blume.

Symphyecarpon Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. (Nomen.) Quid?

Symphyllanthus Vahl 1810. Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 86: nov. g. plant. (S. rugosus, glaber.)
= Chailletia DC.

Symphyllia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 473: nov. g. Dysopsidear. (Cluytia semperflorens Wall.)

Symphyllocarpus Maxim. 1858. Ac. Pet. Mém. sav. étr. IX. p. 151: nov. g. Melampodinear.? (S. exilis.)

Symphyloma Steud. vid. *Symphyoloma Meyer.*

Symphyochaeta DC. 1837. Prodr. VI. p. 448: sect. Robinsoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2821 *a.* p. 461; 1841. Ench. p. 245.

Symphyodon Montagne 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 279. t. 17: nov. g. Muscor. (S. Perrotteti.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 103. n. 583/$_1$: g. Bryacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399; 1849. ibid. XII. p. 121: g. Hypnear.
= Neckerae sect. Entodon Müll.

Symphyoglossum Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 255: nov. g. Asclepiadear. verar. (Cynanchum Bungei Decne.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 706.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 54: g. Eustegiear.

Symphyogyna Nees & Montagne 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 66: nov. g. Jungermanniear. (Jung. brasiliensis Nees.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 857 (*Symphyogyne*). — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 121. (foliacear.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 472/$_4$. p. 1339; 1841. Ench. p. 27: g. Haplolaenear. — Par. Nees 1845. Syn. Hepat. p. 479. — Lehm. 1846. Pl. Preiss. II. p. 130.
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 832: g. Blasiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Haplolaenidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549: g. Frondosar. — Par. Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 165.
= Hymenophyton Dumort.

Symphyogyne Wittst. vid. *praeced.*

Symphyogyneae G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 197. 203: trib. Cunoniacear. Gen.: Geissois.

Symphyolepis Endl. 1838. Gen. n. 2121 *c.* p. 337; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 76: sect. Petrophilae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2378, 3. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 274.

Symphyoloma C. A. Meyer 1831. Verz. Pfl. Cauc. p. 127: nov. g. inter Pastinacam et Heracleum collocatum.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 341: g. Peucedanear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4476. p. 781; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136 (*Symphioloma*). — Steud. 1841. Nom. II. p. 654 (*Symphyloma*). — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5475. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 320. — Walp. 1846. Rep. V. p. 889.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Symphyomera Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 116: nov. g. Compositar., Strongylospermo et Leptinellae aff. (S. Filicula.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 724: g. Hippiear.

Symphyomyrtus Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 126: nov. g. Callistemonear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 743.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737: g. Leptospermear.

Symphyonema „R. Brown" (*Symphionema*) emend. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 333: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 24. n. 541: g. Proteacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 473. n. 513; 1830. Gen. I. p. 104. n. 523. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 431. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 432. 525.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1747; 1841. Nom. p. 64. n. 2411: g. Persooniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2135. p. 339; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 81. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 327.
Meisn. 1841. Gen. p. 332 (244): g. Proteinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Persoonidar.

Symphyopappus Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 583: nov. g. Compositar., Nothiti aff. (S. decussatus.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 713.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 817: g. Eupatoriear.?

Symphyopetalon „Drumm." Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 54: nov. g. Diosmear. (S. corraeoides.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 407.

Symphyopoda DC. 1825. Prodr. II. p. 515: sect. Bauhiniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4126 *c*; 1841. Nom. p. 155. n. 6093. 3. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 359. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 461. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 125 (*Symphopoda*). — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 296. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1476. — Endl. 1841. Gen. n. 6790 *c*. p. 1318; 1841. Ench. p. 674. — Walp. 1842. Rep. I. p. 850.

Symphyosiphon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 218; 1845. Phycol. germ. p. 176; 1849. Sp. Alg. p. 321. n. 221: nov. g. Scytonemear. — Par.

Symphyosiphon Kütz. cont.
Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 37. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 427; 1849. ibid. XII. p. 122.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 86: sect. Scytonematis.

Symphyosira Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 742: nov. g. Clavariacear. (S. lutea.)

Symphyostemon „Miers" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 161: g. Iridacear.

Symphyothrix Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 200; 1845. Phycol. germ. p. 167: nov. g. Leptothrichear. (Conferva tenuissima E. B.) — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 49. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 122.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 260. n. 186: g. Oscillariear.

Symphyotrichum Nees 1833. Gen. et spec. Aster. p. 135: nov. g. Asterum genuinor. (S. unctuosum.)
= Asteris sect. genuini Nees.

Symphysandrae Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 211: trib. Ericear. Gen.: Salaxis, Philippia, Lagenocarpus, Coccosperma, Blepharophyllum.
Meisn. 1839. Gen. p. 244: subtrib. Ericear. Gen. ead.

Symphysia Presl 1827. Epist. de Symphysia; 1828 in Oken Isis XXI. p. 274; 1831. ibid. XXIV. p. 489: nov. g. Ericacear. (Marcgravia umbellata Sieb.) *Cf.* Presl 1838. Flora I. p. 379 et Linnaea IV. Litt. p. 3.
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1975: g. Vaccinear.?
Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 18: g. Ericear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 394. n. 1978.
Bartl. 1830. Ord. p. 154: g. Vacciniear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 243 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 522 (*Symphisia*). — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 36.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Symphysiear.
Endl. 1841. Ench. p. 371. n. 4333 *c*: sect. Thibaudiae.
Synon. Tauschia Preisl.; Andreusia Dun.; Peyrusa Rich.

Symphysicarpus Miq. vid. *Symphysocarpus Hassk.*

Symphysieae Rchb. 1837. Handb. p. 206: subdiv. Vacciniear. Gen.: Symphysia.

Symphysion Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 460: sect. Syzygii. (S. fruticosum DC.)

Symphysisteae Gaillon 1828. Dict. v. 53. p. 351: div. Thalassiophytor. Ord.: Fucaceae, Florideae, Dictyoteae, Ulvaceae.

Symphysocarpus Haskarl 1857. Flora I. p. 101: nov. g. Asclepiadear., Heterostemmati aff.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 505 (*Symphysicarpus*): g. Ceropegiear.

Symphysodon Dozy & Molkenb. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 314; 1845. Musc. frond. t. 30: nov. g. Muscor. frondosor. (S. neckeroides.) *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 938.

Symphysodon Dozy cont.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403; 1849. ibid. XII. p. 122: g. Muscor. minus cognitum.
= Pterobryi Hornsch. sp. (Müll. Syn. II. p. 182.)

Symphysogynae Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 185: div. Monocotyledonear. Ord.: Hydrocharidinae, Scitamineae, Orchidinae, Ensatae.

Symphyteae D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: trib. Boraginear. Gen.: Symphytum, Onosma, Onosmodium, Cerinthe, Mertensia, Pulmonaria. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 312. Gen. ead. et Colsmannia, Stomotechium.

Symphytocarpus Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 117: sect. Clavimyrti. (Jambosa symphytocarpa Korth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 640.

Symphytum *) Tourn. 1700. Inst. p. 138. t. 156: g. pl. class. II.
Linn. 1737. Gen. p. 39. n. 109; 1737. Cliff. p. 47; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 136; 1759. Syst. ed. X. p. 915. n. 170; 1762. Sp. ed. II. p. 195; 1764. Gen. ed. VI. p. 76. n. 185; 1767. Syst. ed. XII. p. 147: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 126. — Murr. 1774. Syst. p. 158; 1784. Syst. p. 187. — Reich. 1778. Gen. p. 78. n. 197. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 101. n. 245. — Gmel. 1791. Syst. p. 320. — Pers. 1797. Syst. p. 193; 1805. Ench. I. p. 161. n. 356. — Willd. 1797. Sp. I. p. 770. n. 280; 1809. En. p. 183.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 514: g. Asperifoliar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 159. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Lehm. 1818. Asperif. p. 3. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. VIII. 64. n. 634. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 117. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 562. n. 598; 1830. Gen. I. p. 126. n. 628. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 3. 39. — Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 607.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 195. n. 805: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 481.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 131. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 390. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 301. — DC. 1805. Franç. III. p. 628. — Hedw. 1806. Gen. p. 91. n. 414. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 299 (*Consoude*). — Link 1821. En. I. p. 169; 1829. Hdb. I. p. 581. — Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2974; 1831. Fl. exc. p. 346; 1837. Hdb. p. 192; 1841. Nom. p. 111. n. 4340. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 100. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 122.
Adans. 1763. Fam. II. p. 179: g. Borraginum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 76: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 124: g. Monopetalar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 325. t. 67. f. 5 (officinale).
Neck. 1790. El. I. p. 288. n. 456: g. Trachytophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 447: g. Boraginear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 355. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61. — Kunth 1838. Berol. II. p. 39.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Anchusear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 499. Ed. II. p. 575. — Endl. 1839. Gen. n. 3776. p. 649; 1841. Ench. p. 321. — Meisn. 1840. Gen. p. 280 (188). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 56. — DC. 1846. Pr. X. p. 36. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 558. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 113. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 511.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Symphytear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 312.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
Synon. Symphitum All., Roth, etc.

Sympieza *) „Lichtenst. mss." Römer & Schult. 1818. Syst. III. p. 8. 171. n. 447: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (S. capitellata.)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 432. n. 454; 1830. Gen. I. p. 86. n. 423: g. Ericear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3376. — Bartl. 1830. Ord. p. 156; 1832. Linnaea VII. p. 651. — Klotzsch 1833. Linnaea VIII. p. 655; 1838. Linnaea XII. p. 229. (Eleutherostemonum.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 805. (normalium.) — Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4897. (genuinar.) Sect. ut Endl.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Ericacear.
Kunth 1831. Abh. Berl. Ak. p. 211: g. Ericinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Andromedear.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 705: g. Salaxidear. Sect.: Microgomphus, Eusympieza. — Par. Rach 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 791 (*Sympiezia*).
Endl. 1839. Gen. n. 4301. p. 752; 1841. Ench. p. 369: g. Sympiezear. Sect.: Sympieza, Microgomphus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.

Sympiezeae Endl. 1839. Gen. p. 752; 1841. Ench. p. 369: div. Salaxidear. Gen.: Codonanthemum, Syndesmanthus, Sympieza, Simocheilus, Acrostemon, Grieselbachia, Finkea, Eremia; Microtoma?, Thoracosperma?

Sympiezia Rach vid. *Sympieza Lichtenst.*

Symplecia Achar. 1803. Meth. Lich. p. 25: sect. Opegraphae. (Lirellae connatae et ramosae.)

Symploca Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 48: g. Leptothrichear. — Par. Kütz. 1849. Sp.

*) Nomen ex Plinio.

*) συμπιέζω, comprimo. (?)

Symploca Römer cont.
Alg. p. 270. n. 191. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 123.
Mont. 1840 in Orb. Dict. X. p: g. Leptothricear.
Conf. Synploca Kütz.

Symplocaceae Miquel 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVII. p. 21. Gen. bras.: Symplocos.

Symplocarpos Schult. vid. *seq.*

Symplocarpus Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 267: nov. g. Dracontear. (Dracontium foetidum L.)
Nutt. 1818. Gen. I. p. 105: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Schult. 1827. Mant. III. p. 16. 301 (*Symplocarpos*).
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 432: g. Aroidar.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 770: g. Callear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: g. Arear.
Bartl. 1830. Ord. p. 68: g. Orontiacear. — Par. Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 12 (*Simplocarpus*).
Schott 1832. Melet. p. 22: g. Dracontiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1705. p. 240; 1841. Ench. p. 129. — Kunth 1841. Enum. III. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1117. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269). — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 148 (*Symptocarpus*).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 13: g. Callacear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 33: g. Orontiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 194.
Synon. Ictodes Big.; Spathyema Rafin.

Symploceae Desfont. 1820. Mém. Mus. VI. p. 9: novus ordo pro Guajacanar. sect. 2 Juss. Nov. gen.: Asteranthos.
Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 27 (*Simploceae* p. 21): fam. Jasminariear. Gen.: Symplocos, Alstonia, Ciponima.
Endl. 1839. Gen. p. 744: fam. Ebenaceis aff. Gen.: Symplocos, Schöpfia; Morelosia.
Rchb. 1841. Nom. p. 136: sect. Styracear. Gen. ut Endl. et Diacaecarpium, Moutabea?
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 246: trib. Styracacear. Gen.: Symplocos. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 84. Gen. id.

Symplocia Massalongo 1854. Neagenea Lich. p. . . . : nov. g. Lichenum.

Symplocineae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 144: ordo plant. Gen.: Symplocos, Schöpfia.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 1: ordo Corollaeflorar. Gen.: Symplocos.

Symplocos*) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 747; 1764. Gen. ed. VI. p. 272. n. 677; 1767. Syst. ed. XII. p. 369: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 166. t. 175 (martinicensis.) — Pers. 1807. Ench. II. p. 74. n. 1312. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 539.
Gled. 1764. Syst. p. 114. n. 471: g. Thalamostemonum.

Symplocos Linn. cont.
Murr. 1774. Syst. p. 582; 1784. Syst. p. 699: g. Polyadelph. Polyandr. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 391. n. 980. — Swartz 1788. Prodr. p. 109; 1791. Obs. bot. p. 293. Char. emend. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 516. n. 1223. — Gmel. 1791. Syst. p. 1155. — Pers. 1797. Syst. p. 738. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1435. n. 1396.
Scop. 1777. Intr. p. 274: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 157: g. Guajacanar.
Neck. 1790. El. II. p. 396. n. 1214: g. Phalarsiphytor.
Gis. 1792. Prael. p. 453: g. Columniferar.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 349: g. Ebenacear.
= Symploci L'Herit. pars.

Symplocos L'Herit. 1791. Linn. Trans. I. p. 174: g. Monadelph., injunctis Hopea, Alstonia et Ciponima ampliatum. *Cf.* Römer Arch. I. 3. p. 80 et Usteri n. Ann. XII. p. 115.
Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 180. t. 51—55: g. Guayacanar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 507; 1826. Syst. III. p. 339. n. 2626; 1831. Gen. II. p. 602. n. 2971: g. Styracear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 160. — Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 418. — Endl. 1841. Spl. I. n. 4259. p. 1411; 1841. Ench. p. 364; 1842. Spl. II. p. 68. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 74.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 256: g. Styracinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 315.
La Llave & Lex. 1824. Nov. veget. I. p. 22 (*Simplocos*). Nova spec.
D. Don 1825. Nepal. p. 144: g. Symplocinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 1. Sect.: Alstonia, Lodhra, Palura.
Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 432: g. Ebenacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3658; 1837. Hdb. p. 115: g. Mimusopear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Symplocear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 744. n. 4259. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5283. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 246. Sect.: Alstonia, Ciponima, Barberina, Hopea, Palura. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 458.
Benth. 1839 in Linn. Trans. XVIII. p. 225. t. 18. Injungitur Stemmatosiphon.
Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVII. p. 23: g. Symplocacear. Sect.: Ciponima, Barberina, Alstonia.
Synon. Symplocos, Alstonia, Hopea et Eugenioides Linn.; Laurus Burm.; Bobu Herm.; Bobua DC.; Ciponima Aubl.; Decadia Lour.?; Stemmatosiphum Pohl; Stemmatosiphon Meisn.; Carlea Presl.

Sympodium C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 356: nov. g. Ammear. (S. simplex.)
Meisn. 1843. Comm. p. 358: g. Amminear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 82. n.

*) συμπλοκή, connexio, complicatio.

Sympodium C. Koch cont.
4406/2. — Walp. 1843. Rep. II. p. 394. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 252.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Symptocarpus A. Rich. vid. *Symplocarpus Salisb.*

Synachyrum A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 231: sect. Helipteri. (H. floribundum DC.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 280.

Synactinia Rchb. 1837. Handb. p. 206: nov. g. Andromedear., pro Erica monadelpha propositum.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443: g. Ericear.
Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. *1 k:* sect. Ectasis.
Synon. Didymanthera Benth.

Synaedrys Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 171. 441: nov. g. pro nuce chinensi constitutum. *Cf.* Endl. Gen. p. 275.
Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257): g. Quercinear., an Lithocarpo conjungendum?
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2472: g. Faginear. genuinar.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 291: g. Corylacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 29. n. 1846/1: g. Cupuliferar. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 388.
Hance 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 175. Char. ampliat.

Synalissa Fries 1825. Pl. homon. p. 297: nov. g. Rhizomorphear. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 437.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 96: g. Rhizomorpheor. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 778. n. 4012.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 49 adnot. (*Synalyssis*): g. Collemacear.

Synalissa Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 9 (Flora 1854. p. 232): g. Collemear.
Massal. 1855. Lich. exsicc. it. p. 14; 1856. Flora p. 211: g. Omphalariear. — Par. Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 422. — Arnold 1858. Flora I. p. 93.
Conf. Enchylium Agardh.

Synalyssis Lindl. vid. *Synalissa Fries.*

Synammia*) Presl 1836. Pterid. p. 212: nov. g. Grammitidear. (Grammitis elongata Sw.) — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330 *Synamnia*). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Endl. 1841. Spl. I. n. 607 *b.* p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Grammitidis.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 55: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 992.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 406: sect. Mecosori.
= Goniophlebium Presl. (Fée.)

Synamnia Meisn. vid. *Synammia Presl.*

Synandra**) Nuttall 1818. Gen. am. II. p. 29: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (Lamium hispidulum Michx.)

Synandra Nuttall cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 705. n. 2070; 1831. Gen. II. p. 468. n. 2306: g. Labiatar. — Par. Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 442.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2835: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 182: g. Westringiear.
Benth. 1834. Labiat. p. 506: g. Stachydear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 816. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 437.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4154: g. Melittear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3643. p. 624; 1841. Ench. p. 308. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (195). — Walp. 1845. Rep. III. p. 801. 987. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 435.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Melittidar.
Synon. Torreya Rafin.

Synandra Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. p. 715 (Neuwied Reise II. p. 343): nov. g. Acanthacear., Ruelliae aff. (S. amoena.)
= Aphelandra R. Brown.

Synanthera G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 650: sect. Conradiae. — Simil. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 525.

Synantherae L. C. Rich. 1801 in Marthe cat. jard. méd. p. 85.
Mirb. 1805. Elém. II. p. 885: fam. Dicotyledonum monopetalar. Sect.: Semiflosculosae, Flosculosae, Radiatae.
Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. 10 Dicotyledonum (Epicorollear.).
= Compositae Vaill.

Synanthereae Cassini 1812. Bull. soc. philom. Déc. p. 189; 1814. Aout; 1815. p. 171: fam. plant. Trib. (1815): Lactuceae, Labiatiflorae, Carduaceae, Carlineae, Xeranthemeae, Echinopsideae, Arctotideae, Calendulaceae, Heliantheae, Ambrosiaceae, Anthemideae, Inuleae, Astereae, Senecioneae, Tussilagineae, Eupatorieae, Vernonieae. — Simil. Cass. 1816. Bull. philom. p. 198; 1818. Dict. v. 10. p. 131; 1821. v. 20. p. 354; 1827. v. 51. p. 443; 1830. v. 60. p. 568. Trib.: Lactuceae, Carlineae, Centaurieae, Carduineae, Echinopodeae, Arctotideae, Calenduleae, Tagetineae, Heliantheae, Ambrosieae, Anthemideae, Inuleae, Astereae, Senecioneae, Nassauvieae, Mutisieae, Tussilagineae, Adenostyleae, Eupatorieae, Vernonieae. *Cf.* Cass. 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 719. (Isis 1834. p. 1086.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: ordo Gynocoronar. Fam.: Compositae, Calycereae.
Bartl. 1830. Ord. p. 134: ordo (89) Compositar. Divis.: Vernonieae, Eupatorinae, Adenostyleae, Tussilagineae, Mutisieae, Nassauvieae, Senecioneae, Astereae, Inuleae, Anthemideae, Ambrosieae, Heliantheae, Tagetineae, Calendulaceae, Arctotideae, Echinopeae, Carduaceae, Centaureaceae, Carlineae, Lactuceae.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 230. Trib.: Chicoraceae, Calenduleae, Tagetineae, Heliantheae, Anthemideae, Inuleae, Astereae, Senecioneae.
Less. 1832. Syn. p. 1: fam. plant. Trib.: Cynareae, Mutisiaceae, Cichoraceae, Verno-

*) [illegible]
**) Nomen ob adhaerentiam staminum longiorum.

Synanthereae Cassini cont.
niaceae, Eupatoriaceae, Asteroideae, Senecionideae, Nassauviaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 79: fam. Campanacear. Divis.: Compositae, Syncarpicae (1841 Dispositae), Segregatae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 4: fam. Compositar. Trib. ut Cass. 1830.
Synon. Nevramphipetalae Cass.; Cassiniaceae Schultz Bip.

Synantheria L. C. Rich. 1810 in Prael., teste Cassini 1823. Dict. v. 26. p. 224: class. plant. Ordines: Monostigmatia, Distigmatia.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 76: subclass. Endogyniae.

Synaphaea Endl., Spach, Rchb. vid. *seq.*

Synaphea*) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811) p. 155 (Verm. bot. Schr. II. p. 247); 1810. Prodr. I. p. 369. Ed. Nees p. 225; 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 606 (Verm. bot. Schr. I. p. 154): nov. g. Proteacear. (Polypodium spinulosum Burm.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 25. 408. n. 546. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 475. n. 518; 1830. Gen. I. p. 105. n. 528. — Poir. 1827. Dict. v. 51. p. 455. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 526. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 527. (II. p. 251.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 334: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1732: g. Synapheear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Protear.
Endl. 1838. Gen. n. 2131. p. 338 (*Synaphaea*); 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 80: g. Conospermear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401 (*Synaphaea*). — Meisn. 1841. Gen. p. 332 (245); 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 314. — Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2407 (*Synaphaea*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Conospermidar.

Synapheeae Rchb. 1828. Consp. p. 81: div. Proteacear. nuciferar. Gen.: Synaphea, Conospermum, Simsia,

Synaphia Nees .... Bolt. Schw. IV. p. CLXXVII.
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 619: g. Leptomitear.
= Syncollesia Nees.

Synaphia Perty 1852. Kleinst. Lebensf. p. 84. 177.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. ambiguar. coenobiar.
= Spondylomorum Ehrenb. (Rabenh.)

Synaphlebium J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 415; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 423: nov. g. Lindsaear. (Lindsaeae sp. Auct.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 109: g. Lindsayear. (melius *Synphlebium*).

Synapisma Steud. Nom. leg. *Synaspisma Endl.*

Synariza Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 413: subg. Cytisporae. (C. carbonacea, enteroleuca.)

*Synarmophytum**) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 123: gen. 41 plant. Spec. natur.: Neottia, Ophrys, Epipactis, Serapias, Limodorum, Orchis, Dactylorhiza, Abrochis, Cypripedium, Arethusa, Epidendrum, Phadrosanthus, Eydisanthema, Vanillophorum, Forsteria, Disa, Satyrium.
= Orchideae Linn.

Synarrhena Fisch. & Meyer .... Bull. Ac. Pet. VIII. Nr. 16. p. 255.
Endl. 1843. Spl. III. p. 81. n. $4242/_1$: g. Sapotacear.
= Mimusops Linn. (A. DC. Pr. VIII. p. 201.)

Synarthrum Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 448. 455; 1827. v. 51. p. 457; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Senecionear. (Archetypar.: Conyza appendiculata Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2499. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.)
Conf. Hubertia Bory.

Synaspisma Endl. 1840. Gen. n. 5775. p. 1110; 1841. Ench. p. 587: nov. g. Hippomanear. (Crozophora peltata Labill.) — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251). — Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7339. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 387: g. Crotonidear.

Synassa Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528); 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1433; 1841. Nom. p. 55. n. 2131. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1564. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181 (*Synossa*).
Endl. 1841. Ench. p. 113. n. $1575/_1$: g. Physuridar.
= Pelexia Poit.

*Synathrophytum***) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 284: gen. 27 plant. Spec. natur.: Theodoria, Illicium, Magnolia, Cananga, Xylopia, Curatella, Caltha, Isopyrum, Aquilegia, Delphinium, Aconitum, Helleborus, Trollius, Poeonia, Nigella, Butomus, Septas, Rhodiola, Cotyledon, Sempervivum, Sedum, Penthorum, Garidella, Dictamnus, Fagonia, Tetracera, Staphilea, Phyllostoma, Gisekia, Tillaea, Zanthoxylon, Hippocratea, Helicteres, Alicteres, Opsopaea, Quassia, Cimicifuga, Buttneria.

Syncarpae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 20: cohors Polypetalar. Nixus: Malvales, Meliales, Rhamnales, Euphorbiales, Silenales.

Syncarpha DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 157. 205. t. 5: nov. g. Carduacear. (Stähelina gnaphaloides L.)
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 561: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105.

---

*) *συναφή*, connectio: ob peculiarem cohaerentiam stigmatis cum filamento sterili.

*) *συναρμόζω*, coagmento, consocio; *φυτόν*, planta.
**) *συναθροίζω*, in unum cogo, congrego; *φυτόν*, planta.

Syncarpha DC. cont.
n. 2415. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 534; 1826. Syst. III. p. 381. n. 2643; 1831. Gen. II. p. 606. n. 2980: g. Cynarear.

Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1827. v. 51. p. 462; 1830. v. 60. p. 579: g. Faustulear.

Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.

Less. 1832. Syn. p. 321: subg. Helichrysi.

DC. 1837. Pr. VI. p. 213: sect. Helipteri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2742 *b*. p. 447; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3489. 2.

Synon. Roccardia Neck.?

Syncarpia Tenore 1839. Ind. sem. h. Neap. p. 12; 1840. Mem. Accad. Mod. XXII. p. 226; 1842. Rendic. Accad. scienze I. p. 60: nov. g. Myrtacear. (S. laurifolia.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 381.

Endl. 1840. Gen. n. 6291. p. 1227; 1841. Ench. p. 650: g. Leptospermear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737.

Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6836: g. Bäkeear.

Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Melaleucear.

Synon. Kamptzia Nees.

Syncarpicae Rchb. 1837. Handb. p. 182: div. Synantherear. Subdivis.: Xanthieae, Ambrosieae, Calycereae.

Syncephalantha Bartl. 1836. Ind. sem. h. Gott. p. 6: nov. g. Tagetinear., Boeberae proximum. (Linnaea 1838. Litt. p. 80.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 41.

DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 262: inter genera Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $3032/_{12}$. p. 1390; 1841. Ench. p. 251.

Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132): g. Tagetear.? An etiam Flavericis aff.?

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16: g. Pectidear.

Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3213 (*Syncephalanthe*): g. Tagetear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Syncephalanthe Rchb. vid. *praeced.*

Syncephalum DC. 1837. Prodr. VI. p. 282: nov. g. Relhaniear.? — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2777. p. 453; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3536. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Fenzl 1839. Flora II. p. 726: g. Humear.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear.

Synchaeta Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 216: sect. Scytonematis. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 85.

Synchlaena A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 423: sect. Codonopsidis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1392. n. 3074 *b a*.

Synchlamydeae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXVI; 1828. Consp. p. 77; 1837. Hdb. p. 161; 1841. Nomencl. p. 59: class. V. plant. Ordines: Enerviae, Rigidifoliae, Venosae.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 143: div. Phylloblastar. Ord. iid.

Synchodendron „Bojer" DC. 1836. Prodr. V. p. 92: nov. g. Bojeriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2238. p. 363; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.

Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3938: g. Bojerear.

Synclistae Spreng. 1825. Syst. II. p. 845: div. Cruciferar. Gen.: Neslia, Calepina, Sobolewskia, Myagrum, Pugionium; Crambe, Cakile, Goldbachia, Anchonium, Ochthodium, Coronopus, Succovia, Zilla, Bunias; Cordylocarpus, Sterigma, Chorispora, Enarthrocarpus, Raphanus; Clypeola, Tauscheria, Isatis, Biscutella, Peltaria, Euclidium. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 511. Gen. ead. et Hymenophysa.

Rchb. 1837. Hdb. p. 258: div. Tetradynamar. Subdivis.: Euclidieae (et Anastaticeae), Isatideae (et Buniadeae), Calepineae; Cakileae, Goldbachieae, Raphanistreae; Raphaneae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 178. Subdivis.: Nucamentaceae, *Articulatae* (Cakileae, Goldbachieae, Raphanistreae), *Continuae* (Raphaneae).

Synclostemon Steud. vid. *Syncolostemon Meyer.*

Syncoelium Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 151: g. Asporomycetum helicomorphor.

= Byssus Linn.

Syncollesia Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 510: g. Hydronematear. (Tremelloideor.), antea *Synaphia Nees.*

Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXI. 32: g. Funginar. (Confervoidear.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 468 et Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 161 et 428, ubi S. melaena Ag. cum dubio ad Chroolepum relata est.

= Torula Pers. (Endl.) et Clisosporium Fries.

Syncollostemon Lindl. vid. *seq.*

Syncolostemon*) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 230: nov. g. Ocimoidear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 655 (*Synclostemon*).

Endl. 1838. Gen. n. 3580. p. 610; 1841. Ench. p. 306: g. Hyptidear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4128. — Walp. 1845. Rep. III. p. 522. 978.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163: g. Ocymoidear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 385.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661 (*Syncollostemon*): g. Plectranthidar.

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 53: g. Ocimear.

Synconis „Fries" Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 171: g. Trichodermeor.

Syncoryne Fries 1838. Epicr. p. 576; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 338: sect. Cla-

*) *σύγκολλος*, conglutinatus.

Syncoryne Fries cont.
variae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 430. 2. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 321.
= Corynoides Endl.

Syncyclia Ehrenb. 1838. Infus. p. 233; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 216: g. Bacillarior.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 86; 1849. Sp. Alg. p. 61. n. 39: g. Cymbellear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 39.
Trevis. 1838. Alghe coccot. p. 96: g. Encyonemear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418 (*Syncyctia*); 1849. ibid. XII. p. 129: g. Schizonemear.?

Syncyctia Brébiss. vid. *praeced.*

Syndendrium Ehrenb. 1845. Ber. Ak. Berl. p. 73. 155: nov. g. Naviculaceor., Dicladiae proximum.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 141. n. 98: g. Angulatar.?

Syndesmanthus Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 240: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.
Endl. 1839. Gen. p. 752. n. 4300 *a*: sect. Syndesmanthi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4898. 1.
= Eusyndesmanthus Benth.

Syndesmanthus Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 706: g. emendat. Salaxidear. Sect.: Eusyndesmanthus, Macrolinum.
Endl. 1839. Gen. n. 4300. p. 752; 1841. Ench. p. 369: g. Sympiezear. Sect. ut Benth.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4898: g. Ericear. genuinar. Sect.: Syndesmanthus, Blepharidia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.
Synon. Syndesmanthus et Macrolinum Klotzsch.

Syndesmis Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 314: nov. g. Connaraceis aff.? (S. elegans.) *Cf.* Meisn. 1837. Comm. p. 54.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 179. n. 905: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Gen. I. p. 572. 804.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5586 inter genera vix cognita.
Endl. 1840. Gen. n. 5913. p. 1132; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5686: g. Anacardiear.

Syndesmon Hoffmannsegg 1832. Flora Intell. p. 34.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7228: g. Thalictrear.
Endl. 1839. Gen. n. 4772 *c β*. p. 845; 1841. Ench. p. 434: subsect. Euthalictri.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 91: g. Anemoninear.
Synon. Anemonella Spach.

Syndonisce Corda 1829 in Opiz Beitr. p. 646 (ex Endl.): vid. *Sindonysce Corda.*

Syndyodon Hampe 1847. Bot. Zeit. p. 922: nomen pro *Arthrocormo D. & M.* propositum.

Synechanthus*) H. Wendl. 1858. Bot. Zeit. p. 145: nov. g. Palmar., inter Chamaedoream et Euterpen collocandum. *Cf. Rathea Karst.*

*) συνεχής, seriatus.

Synechia Fée 1852. Gen. Fil. p. 112: sect. Adianti.

Synechoblastus Trevisan 1853. Caratt. d. tr. nov. gen. Collem.: nov. g. Collemacear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 411: g. Collemear.
Körb. 1857 in Rabenh. Lich. eur. exs. Fasc. IX. (Bot. Zeit. 1857. p. 623.)
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 376: sect. Collematis.
Synon. Lethagrium Mass. (Körb.)

Synechococcus Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 56: g. Chroococcacear.

Synedra Ehrenb. 1838. Infus. p. 212; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 216: g. Bacillarior.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 73; 1849. Sp. Alg. p. 40. n. 30: g. Surirellear. Sect.: Scaphularia, Echinaria, Ulnaria, Tabularia, Grallatoria, Rimaria. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 25. — Math. 1853. Belg. II. p. 542.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Eubacillariear.
Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: g. Synedrear.
Synon. Exilaria Grev. pt.

Synedreae Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: fam. Diatomacear. Gen.: Synedra, Sigmatella.

Synedrella*) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 456. t. 171. f. 7: nov. g. Radiatar. (Verbesinae sp. L.) *Cf.* Juss. 1806. Ann. Mus. VIII. p. 177.
Rich. 1807 in Pers. Ench. II. p. 472. n. 1901: g. Syngenes. Superfl. (Verbesina nodiflora L.)
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 245: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 487. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41.
Link 1822. En. II. p. 350: g. Oppositifoliar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 51. p. 469: g. Coreopsidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2621. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 320; 1830. v. 60. p. 576: g. Synedrellear.
Less. 1832. Syn. p. 233: g. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 629. — Endl. 1838. Gen. n. 2559. p. 416; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3164. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 171.
Synon. Ucacou Adans. sp.

Synedrelleae Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 319; 1830. v. 60. p. 575: subdiv. Coreopsidear. Gen.: Tetragonotheca?, Mnesiteon?, Synedrella, Chrysanthellina, Neuractis, Glossocardia, Heterospermum, Glossogyne, Narvalina, Georgina.

Syneilesis**) Maxim. 1858. Mém. sav. étr. Ac. Pet. IX. p. 165: nov. g. Compositar. (Cacalia aconitifolia Bunge.)

Synelcosciadium***) Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 345: nov. g. Peuce-

*) συνεδρία, consessus.
**) Nomen ob cotyledonem connatum.
***) συνέλκω, contraho.

Synelcosciadium Boissier cont.
danear. (Heracleum Carmeli Labill.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 891. — Endl. 1850. Spl. V. p. 11. n. 4479/2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Carmelia DC.

Syngenesia Linn. 1737 et in Systematis, Generum et Specierum pl. editionibus, sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XIX. plant. Ordines: Polygamia aequalis, superflua, frustranea et necessaria, Monogamia.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 93. Ordines: Semiflosculosae, Capitatae, Discoideae, Radiatae.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 353; 1831. Gen. II. p. 604. Tribus: Cynareae, Eupatorinae, Perdicieae, Radiatae, Cichoraceae, Desciscentes.

Syngonimicae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129: series Ulvacear. Divis.: Ulveae, Vaucherieae, Undineae.

Syngoninae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 50: subtrib. Caladiear. Gen.: Caladium, Xanthosoma, Acontias, Syngonium.

Syngonium *) Schott 1829. Wien. Zeitschr. III. p. 780: nov. g. Aroidear. (Caladium auritum Vent.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 53. — Par. Mart. 1831. Flora p. 457.
Schott 1832. Melet. p. 19: g. Colocasiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1688. p. 237; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 45. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1100. — Meisn. 1842. Gen. p. 361(270). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 39.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Caladiear.
Schott 1851. Bot. Zeit. p. 85. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 881.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 65: g. Syngoninar.

Syngramma J. Smith 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 168. t. 7. 8: nov. g. Polypodiear., ab Oxygonio disjunctum. (Callipteris vittaeformis Sm.)
Presl 1850. Epimel. bot. p. 504: g. Diplaziear.?
Fée 1852. Gen. Fil. p. 170 (*Syngramme*): g. Hemionitidear.

Syngramme Fée vid. *praeced.*

Synlobus DC. 1846. Prodr. X. p. 15: sect. Echii. (Lobostemon sp. Buek.)

Synnema Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 538: nov. g. Schwalbear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasicar. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 707.

Synnetia Sweet vid. *Synotia Sweet.*

Synnotia Dumort. vid. *praeced.*

Synodon Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 371: subsect. Clidemiopsidis. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. I. p. 765.

Synoecia Miquel 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 525; 1848. ibid. VII. p. 469. t. 9: nov. g. Ficuum. (Ficus diversifolia Bl.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 731: g. Morear.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 67: g. Ficear.

*) σύγγονος, cognatus.

Synorgana Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): div. Heterorganor. Subdivis.: *sporifera* (fam.: Lepidosporae, Peltasporae, Stachyosporae, Botryosporae, Epiphyllosporae, Rhizophorae), *florifera* (fam.: Gramineae etc. (53—93.)

Synorhizae Rich. 1811. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 172. 188: subdiv. Embryonatar. Ord.: Coniferae, Cycadeae. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 132.

Synosma Rafin. ex Steud. Nom. I. p. 244; II. p. 656 (reniformis et suaveolens).
= Cacaliae DC. sp.

Synossa Spach vid. *Synassa Lindl.*

Synotia s. *Synnetia* Sweet .... Brit. fl. gard. I. t. 150.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58 (*Synnotia*): g. Gladiolear.
= Gladiolus Tourn.

Synotoma *) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 746: sect. Phyteumatis. — Par. A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 450.
= Physoplexis Endl.

Synoum **) A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 226. t. 15: nov. g. Trichiliear. (Trichilia glandulosa Sm.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 109. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 48(35). — Endl. 1840. Gen. n. 5531. p. 1049; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8067. — Walp. 1842. Rep. I. p. 429. — — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 82. 101. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Xylocarpear.
Synon. Schoutensia Endl.

Synpetalae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXX; 1828. Consp. p. 91: class. VI. plant. Ord.: Fissiflorae, Lobiflorae, Rotiflorae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 177; 1841. Nom. p. XLVIII. 72. Ord.: Tubiflorae, Fauciflorae, Limbiflorae.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 185: div. Phylloblastar. Ordines ut 1828.

Synphillium „Griff." Benth. vid. *Synphyllium Griff.*

Synphlebium Fée vid. *Synaphlebium.*

Synphragmidium Strauss 1853 in Sturm Flora III. H. 33. 34 (Bot. Zeit. 1853. p. 566): g. Sporidermicor.

Synphyllium Griffith 1836 in Madras journ. lit. Nr. 13. p. 373. t. 11: nov. g. Scrophularinear. (Diandr. Monogyn.) *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 196.
= Curanga Juss.

Synploca Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 201; 1845. Phycol. germ. p. 161: g. Leptotrichear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 80.
Conf. Symploca Röm.

Synsepalum A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 183: sect. Sideroxyli.

Synsphaeria Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 271: nov. g. Sphaeriaceor. (Sphaeriae versatiles Fries.)

*) σύν, cum; τομή, sectio: a cohaerentibus corollae segmentis.

**) Nomen ab ovulis inter se in quovis loculo conjunctis.

Synsporeae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 305. 328 (Flora 1843. p. 87. 93): div. Algar. Gen.: Mougeotia, Tyndaridea, Zygnema; Closterium.

Synsporium Preuss 1849 in Klotzsch herb. viv. mycol. Cent. XIII. n. 85: nov. g. Fungor. (Flora 1849. p. 88.)
Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 121: g. Psiloniacear. *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 159.

Syntamiideae Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 387: ordo Ulvacear. Fam.: Sphacelarieae, Ectocarpeae, Ulveae, Conferveae, Rivularieae, Oscillatorieae.

Syntherisma Walt. 1788. Fl. Carolin. p. 5. 76. n. 35: nov. g. Triandr. Digyn. (S. praecox, serotina, villosa.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 154. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 160.
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 78: sect. Panici.
= Panici Linn. pars.

Synthlipsis *) A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV. 1.) p. 116: nov. g. Thlaspidear. *Cf.* Flora 1850. p. 714.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 40: g. Alyssinear.

Synthyris Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 454; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: nov. g. Digitalear. (Gymnandrae et Wulfeniae sp. Auct.)

Syntrichia Web. & Mohr 1807. Taschenb. p. 214. t. 8. f. 4. 5: nov. g. Muscor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 87. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — C. F. Schultz 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 226. (Monogr.) — Leman 1827. Dict. v. 51. p. 489. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 170. n. 3320; 1831. Gen. II. p. 732. n. 3714. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 192. (odontostomor.)
Brid. 1822. Meth. musc. p. 97: g. Peristomor. acrocarpor.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 578: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Barbuloideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 636: g. Barbulaceor.
Fürnr. 1820. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Desmatodontoidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 83.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 334: g. Acrocarpor. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 536. p. 52; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Genth 1836. Nass. I. p. 208: g. Bryoideor.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 914: g. Calyptrobryor.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 93: sect. Tortulae.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 110: sect. Barbulae. — Par. C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 632. — Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47.
Bayrh. 1849. Taun. p. 11: g. Trichostomear.
Synon. Barbula Mönch; Tortula Schwägr.

*) θλῖψις, compressio.

Synziganthus Steud. vid. *Syziganthus* Steud.

Synzyganthera Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 137. t. 30: nov. g. Polygam. Monoec. *Cf.* A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 28.
A. Juss. 1824. Euphorb. p. 62 (Arch. de Bot. I. p. 72): g. Euphorbiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5107.
Endl. 1837. Gen. n. 1906. p. 291; 1841. Ench. p. 179: g. Lacistemear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 172; 1841. Nom. p. 66. n. 2477. — Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 329: g. Lacistemacear.
Synon. Didymandra Willd.

Syoctonum Bernhardi 1847. Allg. Thür. Gartenz. Nr. 1: nov. g. pro Chenopodio rubro et glauco propositum.

Syorhynchium Hoffmsg. .... Nachtr. II. p. 216.
= Sisyrinchium Linn.

Syosurus Rchb. vid. *Syurus Endl.*

Syphomeris „Bojer" Steud. Nomencl. II. p. 656: g. fam. incertae. (S. Lingum.) *Cf. Siphomeris Boj.*

Syphosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 88: g. Sphaeriear. (Sphaeria coronata.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75 (*Siphosphaera*): g. Dryinospherar.

Syrenia „Andrzej." Spreng. 1825. Syst. II. p. 908: sect. Erysimi. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1169; 1828. Consp. p. 185. n. 4813 *a*.
C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 160: g. Sisymbrear. (Erysimum siliculosum DC.) — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 688. — Koch 1836. Syn. p. 54. Ed. II. p. 58. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12).
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: g. Erysimear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar.
Endl. 1839. Gen. n. 4918. p. 877; 1841. Ench. p. 450: g. Camelinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6971.
Ledeb. 1842. Ross. I. p. 193: g. Sisymbriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Camelinidar.
Synon. Stylonema DC.

Syrenopsis Jaub. & Spach 1842. Ill. pl. or. p. 6. t. 3: nov. g. Cruciferar., Syreniae aff. *Cf.* Flora 1842. Lit. p. 64.
Meisn. 1843. Comm. p. 341: g. Sisymbrear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 87. n. 4912: g. Sisymbriear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 261: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.

Syrigosis Necker 1790. Elem. bot. III. p. 350. n. 1774: nov. g. Athrosophytor., a Lichene L. disjunctum.

Syringa Tourn. 1700. Inst. p. 617. t. 389: g. pl. class. XXI.
Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.
Mönch 1794. Meth. p. 678: g. Calycostemonis.
= Philadelphus Linn.

Syringa Rupp. 1718. Fl. jen. p. 24. Ed. Hall. 1745. p. 24: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 3. n. 8; 1737. Cliff. p. 6; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 6; 1753. Sp. I. p. 9; 1759. Syst. ed. X. p. 848. n.

Syringa Rupp. cont.
22; 1762. Sp. ed. II. p. 11; 1764. Gen. ed. VI. p. 11. n. 22; 1767. Syst. ed. XII. p. 56: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 55; 1784. Syst. p. 57. — Reich. 1778. Gen. p. 11. n. 22. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 14. n. 28. Gmel. 1791. Syst. p. 26. — Pers. 1797. Syst. p. 57; 1805. Ench. I. p. 9. n. 40. — Willd. 1797. Sp. I. p. 48. n. 38; 1809. En. p. 14. — Vahl 1805. Enum. I. p. 38. n. 21. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 10. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 301. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 6. 11.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 152. n. 627: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Sepiariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 506.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jasminor.

Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 224. t. 49. f. 4 (vulgaris).

Neck. 1790. El. II. p. 5. n. 608: g. Darinyphytor.

Batsch 1802. Tab. p. 198: g. Jasminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 8. 345. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 52. 76. n. 55. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 470; 1825. Syst. I. p. 36. n. 61; 1830. Gen. I. p. 17. n. 61. — Lois. 1823. Dict. v. 26. p. 407 (*Lilas*). — Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3547. — Bunge 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 117. — Kunth 1838. Berol. II. p. 23. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 38.

Link 1821. En. I. p. 34; 1829. Hdb. I. p. 444: g. Oleinar. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII; 1831. Fl. exc. p. 434.

Bartl. 1830. Ord. p. 218: g. Oleinear.

Koch 1837. Syn. p. 482. Ed. II. p. 554: g. Lilacear.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 51: g. Syringear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 73. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 282. — Ledeb. 1847. Ross. III. 1. p. 38.

Rchb. 1837. Hdb. p. 213: g. Mogorinar.

Endl. 1838. Gen. n. 3355. p. 573; 1841. Ench. p. 287: g. Fraxinear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 256 (166). — Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5231. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 365 (*Lilas*).

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 279: g. Lilacinear.

Synon. Lilac Tourn.; Lilacum Ren. (Steud.)

Syringeae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 51 (Loud. arbor. 1208): trib. Oleinar. Gen.: Syringa, Forsythia, Fontanesia.

Brongn. 1843. En. genr. p. 73: trib. Oleinear. Gen.: Fontanesia, Syringa.

DC. 1844. Pr. VIII. p. 280: trib. Oleacear. Gen. ut Don et Nathusia.

Syringidium Ehrenb. 1845. Ber. Berl. Ak. p. 357: nov. g. Naviculaceor., aff. Insilellae.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 32. n. 26: g. Melosirear.

Syringodea*) D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 155: g. Ericear. normal. (Erica vestita Thunb.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 818.

Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 623: sect. Ericae. Subsect.: Eurylepis, Callibotrys, Pleurocallis, Evanthe, Chona, Octopera, Dasyanthes, Bactridium. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *b*. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. Subsect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 2. Subsect. fere eaed.

Syringodendron Sternb. 1821. Vers. I. 1. p. 24: nov. g. plant. primordialium. *Cf.* Flora 1827. I. p. 342.

Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 220: g. Vegetabilium foss. class. II. (1825. Ann. sc. nat. IV. p. 46 ad Sigillariam relatum.)

Sternb. 1825. Vers. I. p. XXIV: g. Filicitum anomalar. (*Palmacites Schloth.*)

Brongn. 1828. Hist. vég. foss. I. p. 479; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 134.

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 127; 1846. Chlor. prot. p. LXI: g. Sigillariear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 106.

Syringosma „Mart." Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3526: g. Echitear.? (non descriptum, Meisnero quoque [Comm. p. 170] incognitum.)

Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5226: g. Contortar. dubium. (hoc loco Zuccarinio adscript.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Apocynacear. dubium.

Syrinx „Corda" Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Fragilariear.

Syrmatium *) Vogel 1836. Linnaea X. p. 591: nov. g. Lotear. (Hosackia tomentosa H. & A.)

Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61): g. Trifoliear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6518. p. 1269; 1841. Ench. p. 669.

Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5706: g. Trigonellear.

Syrrhopodon **) Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 110. t. 131. 132; 1827. vol. II. p. 95: nov. g. Muscor. frondosor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 499. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 163. n. 3312 (postea [Gen. II. p. 730] ad Weisiam reductum).

Brid. 1826. Bryol. I. p. 155: sect. Cleistostomatis. (1827. ibid. II. p. XLIV g. Weissioideis aff.)

Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 610: g. Weissiaceor. Sect.: Cleistostoma, Syrrhopodon.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Syrrhopodontoidear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.

Endl. 1836. Gen. n. 498. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. 1. p. 7.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 873: g. Calyptrobryor.

---

*) *σύριγξ*, fistula.

*) Nomen derivatum a *σύρμα*, syrma: ob fructum caudatum.

**) *συῤῥέπω*, conniveo.

Syrrhopodon Schwägr. cont.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 514: g. Acrocarpor.
Hampe 1846. Bot. Zeit. p. 268; g. Hyophilacear.
= Leucophanes Brid. et Syrrhopodon C. Müll.

Syrrhopodon Nees 1842 in Schwägr. Suppl. IV. t. 311 a.
= Leucophanes Brid.

Syrrhopodon Dozy & Molkenb. 1844. Pugill. nov. spec. musc. frond.
= Schistomitrium Dozy & Molk.

Syrrhopodon C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 766: g. Calymperear. emend.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XII. p. 136: g. Syrrhopodontear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 528: g. Calymperacear. Sect.: Hyophilidium, Orthophyllum, Orthotheca, Eusyrrhopodon.
Synon. Cleistostoma Brid.; Cleisostoma Lem.; Trachymitrium Brid.; Codonoblepharum Dozy & Molk.

Syrrhopodonteae Montagne 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen.: Syrrhopodon, Calymperes, Trachymitrium.

Syrrhopodontoideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 7 Muscor. Gen.: Calymperes, Syrrhopodon.

Sysellophytum *) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 194: gen. 23 plant. Spec. natur.: Blittum, Salicornia, Corispermum, Cruzita, Chenopodium, Polycnemum, Beta, Rutica, Urtica, Atriplex, Begonia, Güldenstädtia, Axiris, Parietaria, Spinachia, Cannabis, Herniaria, Calligonum, Alchemilla, Aphanes, Thesium, Scleranthus, Basella, Salsola, Persicaria, Asicaria, Polygonum, Atraphanis, Coccoloba, Rheum, Rumex, Emex, Acetosa, Triplaris, Humulus, Acnida, Astronium, Dorstenia, Ficus, Mikania.

Sysimbrium Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 334. (S. Barbarea.)
= Barbarea R. Brown.

Syspone Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 5: nov. g. Genistear. (Genista sagittalis L.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 845.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 350: sect. Genistae.
= Saltzwedelia GMS.

Systemon Regel 1856. Ind. sem. h. Petr. p. 38: nov. g. Rutacear. (S. Fischeri.)

Systephania Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 264: nov. g. Naviculaceor., Coscinodisco aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 126. n. 77: g. Coscinodiscear.

Systilium Mont. vid. *Systylium Hornsch.*

Systotrema DC. 1805. Fl. franç. II. p. 112: sect. Hydni.
Nees 1816. Syst. p. 225; 1817. Überbl. p. 56: g. Pileator. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 451.

*) συσελλω(?), contraho, coërceo; φυτόν, planta.

Systotrema DC. cont.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Hymenacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 178: g. Hydneor.
= Sistotrema Pers.

Systrepha *) Burchell 1822. Trav. South-Afr. I. p. 546: nov. g. Apocynear. (S. filiformis.) *Cf.* Isis 1823. Litt. Anz. p. 168. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 586; 1841. Ench. p. 295 (dubium). — Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5219.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3530: g. Echitear.? — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173).
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 445.

Systylium Hornschuch 1818. De Voitia et Systylio; 1819. Flora I. p. 87: nov. g. Muscor. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Schwägr. 1823. Suppl. II. Vol. I. 1. p. 25. t. 607. — Leman 1828. Dict. v. 52. p. 70. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 731. n. 3710. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 153. (odontostomor.)
Brid. 1826. Bryol. I. p. 263: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII g. Splachnoideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 603: g. Splachneor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Splachnoidear.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 94: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 504. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 879: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 137: sect. Dissodontis. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 93.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402 (*Systilium*): g. Splachnear.

Sysygites Mont. vid. *Syzygites Ehrenb.*

Sytothalia „Grev." Flora 1843. p. 93: vid. *Scytothalia.*

Syurus **) Endl. 1837. Gen. n. 922 c. p. 105; 1841. Ench. p. 60: sect. Lepturi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1259. 3 (*Syosurus*).

Syziganthus Steudel 1855. Syn. pl. glum. II. p. 153: nov. g. Rhynchosporear.
Synon. Phakellanthus Steud.

Syzigites Lindl. vid. *Syzygites Ehrenb.*

Syzigium Steud. vid. *Syzygium Gärtn.*

Syzygeum Wight vid. *praeced.*

Syzygitei Fries 1825. Pl. homon. p. 179: trib. Mucorinor. Gen.: Syzygites, Azygites, Coccotrichum, Bactridium.
Rchb. 1828. Consp. p. 7: subdiv. Mucorinor. Gen. ead.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: sect. Saprophileor.? Gen.: Syzygites.

*) Nomen ob apices laciniarum corollae in funiculo contortas.
**) σῦς, sus; οὐρά, cauda.

Syzygites*) Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 13. 25; 1820. Berl. Verh. nat. Fr. II. p. 98: nov. g. Ascophorar. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 52. p. 71.
Link 1824. Spec. I. p. 94: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 318. (entosporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 179: g. Syzygiteor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 132. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 312 (*Sysygites*).
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Aspergillacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 541. n. 3542; 1831. Gen. II. p. 777. n. 4005: g. Mucorum. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 127.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Mucorinear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 329: g. Mucorinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 246. p. 21; 1841. Ench. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43 (*Syzigites*).
Corda 1839. Prachtfl. p. 49. t. 24 (megalocarpus).
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 236: g. Mucoroideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 18; 1842. Mycol. p. 70: g. Mucoroidear. (verar.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 134.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 488: g. Mucorineor.
Synon. Zyzygites Agdh.

Syzygium Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 166. t. 33. f. 1: nov. g. pro Myrto zeylanica L. (?) propositum.
DC. 1828. Pr. III. p. 259: g. Myrtear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4677. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 848. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 170. — Meisn. 1837. Gen. p. 108 (77). — Endl. 1840. Gen. n. 6320. p. 1232; 1841. Ench. p. 651. — Brongn. 1843. En. genr. p. 123 (*Zyzygium*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 178. 933; 1846. V. p. 752. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 554 (*Sizygium*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 447. Sect.: Eusyzygium, laevigatae, Jambolana, Symphysion.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 329: g. Myrtacear. — Par. Wight 1838. Ic. pl. Ind. I. 4 (*Syzygeum* in explic.). t. 73. — Steud. 1841. Nom. II. p. 675 (*Syzigium*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 177. n. 6849: g. Eugeniear.
Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 338: g. Eugenioidear.
Synon. Opa Lour.; Calyptranthus Blume; Jambolifera Auct.

Szeglewia Müll. vid. *Sczegleewia Turczan.*

Szovitsia*) Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petr. I. p. 39: nov. g. Caucalinear. (Sz. callicarpa.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 342, Linnaea X. Litt. p. 103 et Wittst. Etym. Handw. p. 861 (*Szovitzia*). — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Endl. 1839. Gen. n. 4500. p. 785; 1841. Ench. p. 380. — Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5369. — Walp. 1843. Rep. II. p. 420 (*Scovitsia*); 1846. V. p. 901. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 340. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97 (*Scovitsia*).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133: g. Caucalidear.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363 (*Szowitsia*): g. Caucalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Caucalinidar.

Szovitzia Wittst. vid. *praeced.*

Szowitsia C. Koch vid *praeced.*

Szukinia Meisn. vid. *Sczuckinia Turczan.*

T.

Tabacina Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3283 *c*: sect. Nicotianae.

Tabacum Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3283 *b*: sect. Nicotianae. — Simil. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 462. — Walp. 1845. Rep. III. p. 7.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 557: subsect. Didicliae.

Tabacus Mönch 1794. Meth. p. 448: g. Petalostemonis. (Nicotiana glutinosa L.)
= Nicotiana L.

Tabebouia „Gomez" Endl. vid. *seq.*

Tabebuia Gomes 1803. Obs. Fasc. II. p. 7. t. 3.
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 130; 1845. Pr. IX. p. 212: g. Catalpear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 300 (208). — Walp. 1847. Rep. VI. p. 514.
Endl. 1841. Gen. Spl. I. p. 1406. n. 4116 (*Tabebouia*); 1841. Ench. p. 346. n. $4116/_1$: g. Tecomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.
Synon. Couralia Splitg.

Tabellaria Ehrenb. 1840. Ber. Berl. Ak. p. 217: g. Bacillarior.
Kütz. 1844. Bacill. p. 137; 1845. Phyc. germ. p. 110; 1849. Sp. Alg. p. 118. n. 72: g. Tabellariear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw.-Diatom.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 40: g. Achnanthear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Eutabellariear.

Tabellarieae Kütz. 1844. Bacill. p. 126; 1845. Phycol. germ. p. 110; 1849. Spec.

*) συζυγίτης, unitus, geminatus.

*) Dicat. J. Szovits, botanico.

Tabellarieae Kütz. cont.
Alg. p. 116: fam. Diatomear. Gen.: Stylobiblium, Biblarium, Tetracyclus, Tabellaria, Terpsinoë, Anaulus, Grammatophora.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: subtrib. Diatomear. Sect.: Striatelleae, Eutabellarieae.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: fam. Diatomacear. nodosar. Gen.: Tetracyclus, Tabellaria, Terpsinoë.
Math. 1853. Belg. II. p. 533: trib. 30 Algar. Gen.: Grammatophora.
Taberna A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 361: sect. Tabernaemontanae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 418.
Tabernaemontana*) Plumier 1703. Gen. p. 18. t. 30.
Linn. 1737. Gen. p. 66. n. 190: g. Pentandr. Digyn.
Linn. 1737. Cliff. p. 76; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 95. n. 221; 1753. Sp. I. p. 310; 1759. Syst. ed. X. p. 945. n. 265; 1762. Sp. ed. II. p. 308; 1764. Gen. ed. VI. p. 118. n. 301; 1767. Syst. ed. XII. p. 191. n. 298: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 211; 1784. Syst. p. 255. — Reich. 1778. Gen. p. 122. n. 327. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 165. n. 424. — Lour. 1790. Coch. I. p. 117. — Gmel. 1791. Syst. p. 438. — Pers. 1797. Syst. p. 267. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1244. n. 485; 1809. En. p. 275. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 21. t. 143. 144. (reform.) — Roxb. 1832. Ind. II. p. 21.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 197. n. 814: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 175.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Contortor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Apocinor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 172: g. Apocynor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 201. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 638. n. 696. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 655.
Scop. 1777. Intr. p. 155 (*Tabernemontana*): g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 145: g. Apocinear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 422. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 329. — Hedw. 1806. Gen. p. 111. n. 494. — D. Don 1825. Nepal. p. 130.
Neck. 1790. El. I. p. 250. n. 398 (*Tabernemontana*): g. Campylophytor. Disjungitur Clerkia.
Pers. 1805. Ench. I. p. 268. n. 616: g. Apocynear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 467. Ed. Nees p. 323. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 492; 1830. Gen. I. p. 148. n. 737. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 225. (verar.) — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXVI. 422. n. 754. — Link 1821. En. I. p. 205; 1829. Hdb. I. p. 430. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 83. — Kunth 1823. Syn. II. p. 294. (verar.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1027. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 77. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 314.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3534; 1841. Nom. p. 134. n. 5177: g. Vincear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26.
Bartl. 1830. Ord. p. 204: g. Echitear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 87: g. Tabernaemontanear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 361. Sect.: Taberna, Ervatamia, Rejoua. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 469. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 417. Sect. ut DC.
Endl. 1838. Gen. n. 3396. p. 581; 1841. Ench. p. 204: g. Plumeriear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 518. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172). — Brongn. 1843. En. genr. p. 52.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.
Synon. Clerkia Neck.?, Pandaca Pet.-Thouars; Reichardia Dennst.; Rejoua Gaudich.
Tabernaemontaneae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 87: trib. Apocynear. Gen.: Tabernaemontana, Cameraria, Vahea, Voacanga, Rejoua, Orchipeda, Plumiera, Conopharyngia, Vinca, Catharanthus.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 349: subtrib. Plumeriear. Gen.: Hunteria, Kopsia, Cerbera, Tanghinia, Ochrosia, Voacanga?, Piptolaena, Orchipeda, Urceola, Bonafousia, Odontadenia, Peschiera, Tabernaemontana, Conopharyngia?, Malouetia, Condylocarpon, Vinca, Amsonia, Rhazya, Thyrsanthus, Gonioma, Cameraria, Plumeria, Anisolobus, Aspidosperma.
Tabernemontana Scop., Neck. vid. *Tabernaemontana Linn.*
Tabularia Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 77; 1849. Sp. Alg. p. 46: sect. Synedrae.
Tacamahaca Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 392; 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 32: sect. Populi. (P. balsamifera L.) — Par. Fisch. 1842. Bull. Ac. Pet. IX. p. 343. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 433. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 629.
Tacazzea*) Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 492: nov. g. Periplocear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Tacca**) Forst. 1776. Char. gen. p. 65: nov. g. Dodecandr. Trigyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 37. n. 1394. — Murr. 1784. Syst. p. 455. — Lour. 1790. Coch. I. p. 300. — Gmel. 1791. Syst. p. 767. — Pers. 1797. Syst. p. 487.
Scop. 1777. Intr. p. 106: g. Strictar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 43. t. 14. f. 2 (pinnatifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 56: g. Narcissor.
Batsch 1802. Tab. p. 244: g. Asarinar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 142: g. Amaryllideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 227. n. 925.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 340. Ed. Nees

*) Dicat. Jac. Theodoro, a patria Tabernaemontano dicto, botanico saeculi XVI.

*) Nomen a fluvio Tacazze Abyssin.
**) Nomen ex Rumphio adoptatum.

Tacca Forst. cont.
p. 196: g. inter Aroideas et Aristolochias intermedium.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 302: g. Aristolochiar.
Roxb. 1819. Corom. III. p. 53. t. 257; 1832. Ind. II. p. 169: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XVIII. 166. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1198.
Link 1821. En. I. p. 343: g. Asparaginar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 118. n. 1294: g. Aristolochiear.
Agdh. 1826. Aphor. p. 244: g. Asarinis aff.
Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 90: g. Narcisseis aff.
Presl 1828. Reliq. Hänk. I. p. 149: g. Taccear. (restrict.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 785; 1841. Nom. p. 33. n. 1119. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Bartl. 1830. Ord. p. 82. — Herb. 1837. Amaryll. p. 81. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 576.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 82: g. Aristolochiaceis aff.
Lindl. 1836. Introd. ed. II. p. 331; 1847. Veg. kd. p. 150: g. Taccacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1204. p. 159; 1841. Ench. p. 93. — Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 22. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 315. — Kunth 1850. Enum. V. p. 458.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 206: g. Dioscoreis aff.

Taccaceae Rchb. 1828. Consp. p. 44: div. Aroidear. Subdivis.: Gymnostachyeae, Tacceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 142. Subdivis.: Tupistreae, Peliosantheae, Tacceae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: vid. *Tacceae Dumort.*
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 159) 1847. Veg. kd. p. 149: ordo Narcissalium. Gen.: Tacca, Ataccia.
Endl. 1837. Gen. p. 159; 1841. Ench. p. 92: ordo Artorhizar. Gen.: Tacca, Ataccia.
Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307): ordo? Coronariar. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 22: fam. Lirioidear. Gen. ead.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 315: fam. Monocotyledonum. Gen. ead. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 457. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.
Conf. Tacceae Presl.

Taccarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: ordo Gynochlamydar. Fam.: Taccaceae.

Tacceae Presl 1828. Reliq. Hänk. I. Fasc. 3. p. 149: fam. nova plant. Gen.: Tacca, Ataccia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: fam. Taccariear. Gen.: Tacca.
Bartl. 1830. Ord. p. 82: ordo (56) Aristolochiear. Gen. ut Presl.
Blume 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 91: fam. Monocotyledonear., Aristolochieis aff. Gen.: Tacca.
Lindl. 1833. Nix. p. 33: ordo Narcissalium.
Herb. 1837. Amaryll. p. 81. 333: subordo Amaryllidacear.? Gen. ut Presl.

Tacceae Presl cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 142: subdiv. Taccacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 33: div. Aroidear. Subdivis.: *genuinae* (gen. Presliana), Peliosantheae, Tupistreae.
Conf. Taccaceae Lindl.

Tacceae Rchb. 1828. Consp. p. 44: subdiv. Taccacear. Gen.: Orontium, Rohdea, Tupistra, Aspidistra, Sanseviella, Eriospermum, Ataccia, Tacca; Roxburghia.

Tachia*) Aublet 1775. Guian. I. p. 75. t. 29: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (T. guianensis.)
Scop. 1777. Intr. p. 139: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 142: g. Gentianar.? An Apocineis affinior?
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 324: g. Gentianear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 58. 370. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346 (sphalm. *Tashia*). — Mart. 1827. Nov. gen. II. 2. p. 118. t. 189. *Cf.* Flora 1827. I. p. 376. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 92. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 33. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 197. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3486: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3555. p. 604; 1841. Ench. p. 303.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5107: g. Erythraeariar.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 203: g. Lisyanthear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 80: g. Lisianthear.
Synon. Myrmecia Schreb.

Tachia Pers. 1805. Enchir. I. p. 459. n. 1017: g. Leguminosar.
= Tachigalia Juss.

Tachiadenus Griseb. 1839. Gent. gen. p. 200: nov. g. Lisyanthear. (Lisianthus carinatus Lam.) — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3554/1. p. 1400; 1841. Ench. p. 302: g. Chironiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 5106: g. Erythraeariar.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 81: g. Lisianthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.

Tachibota**) Aublet 1775. Guian. I. p. 287. t. 112: nov. g. Pentandr. Trigyn. (T. guianensis.)
Juss. 1789. Gen. p. 295: g. Cistis aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 100: g. Cisteis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 209. n. 857.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIII. 679: g. Cistor.
Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 93: g. Cistear.
Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4896: g. Al-

*) *Tachi*, nomen Galibiense.
**) Nomen caribaeum [illegible].

Tachibota Aublet cont.
sodinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 21 (18). An = *Conohoria?*
Bartl. 1830. Ord. p. 285: g. Violarieis aff. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 497.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7156: g. Conohoriear.
Endl. 1839. Gen. n. 5084. p. 922; 1841. Ench. p. 479: g. dubium Bixacear.
Walp. 1842. Rep. I. p. 206 (*Tachybota*): g. Erythrospermear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328. (?)
Synon. Salmasia Schreb.

Tachigali*) Aublet 1775. Guian. I. p. 372. t. 143: nov. g. Decandr. Monogyn. (T. paniculata.)
= Tachigalia Juss.

Tachigalia Juss. 1789. Gen. p. 349: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 207. — Hedw. 1806. Gen. p. 299. n. 1187 (*Tachygalia*). — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 94.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 487: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 436. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70).
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4138; 1841. Nom. p. 154. n. 6058: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. — Vogel 1837. Linnaea XI. p. 393. — Endl. 1841. Gen. n. 6752. p. 1310; 1841. Ench. p. 674. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 160. Sect.: Tachigalia, Cosymbe.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 569. Sect.: Galitachia, Cosymbe. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 60. t. 265.
Synon. Tachigali Aubl.; Cuba Scop.; Cubaea Schreb.; Valentinia Neck.; Tachia Pers.; Tassia Rich.

Tachites Solander mss. An *Tachytes?* ex Steud.
= Melicytus Forst. (Gärtn. Fr. I. p. 206.)

Tachybota Walp. vid. *Tachibota Aubl.*

Tachycarpus Steud. Nom. II. p. 659: lege *Trachycarpus DC.*

Tachygalia Hedw. vid. *Tachigalia Juss.*

Tachygonium**) Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 63: g. Tetrasporear.

Tachytes „Sol." Steud. Nom. II. p. 659: vid. *Tachites Sol.*

Tacsonia***) Juss. 1789. Gen. p. 398: nov. g. Cucurbitaceis aff. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 105. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 299.
Juss. 1805. Ann. Mus. VI. p. 106. 388; 1825. Dict. v. 38. p. 50: g. Passiflorear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 141. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 595; 1826. Syst. III. p. 43. n. 2357; 1831. Gen. II. p. 533. n. 2615. — Kunth 1822. Syn. I. p. 439. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI. — DC. 1828. Pr. III. p. 333. (verar.) Sect.: Eutacsonia, Bracteogama, Distephana, Psilanthus. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. — Bartl. 1830. Ord. p. 271. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 57. Sect. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 124 (90). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 279. — Endl. 1839. Gen. n. 5101. p. 927; 1841. Ench. p. 483. Sect.: Eutacsonia, Distephana. — Brongn. 1843. En. genr. p. 109. — Walp. 1846. Rep. V. p. 773. Sect. eaed. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 132. 192. Sect.: Eutacsonia, Bracteogama. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 4.
Pers. 1807. Ench. II. p. 222. n. 1599: g. Monadelph. Pentandr.
Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3469: g. Granadillear. Sect. ut DC. (Aldinia loco Bracteogamae.)
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 59. t. 180. 181.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5081: g. Tacsoniear. Sect.: Tacsonia, Distephana.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.

Tacsonieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 131: sect. Granadillear. Gen.: Disemma, Tacsonia.

Tacsonioides DC. 1828. Prodr. III. p. 330: sect. Passiflorae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 54. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 183.
Endl. 1839. Gen. n. 5098 *c γ*. p. 926; 1841. Ench. p. 483: subsect. Decalobae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 221.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5078. 3 *c* (*Tacsoniopsis*): subsect. Passiflorae.
Synon. Hellmannia Rchb.

Tacsoniopsis Rchb. vid. *praeced.*

Taeda*) Spach 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 387: sect. Pini. (P. rigida, Taeda, etc.) — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 156; 1847. Spl. IV. p. 6. n. 1803 *B IX*. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 197.

Taenidia Torrey & Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 614: sect. Ziziae. (Z. integerrima DC.)

Taeniocarpium**) Boissier 1853. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. Nr. 1. p. 106: sect. Hyperici.
Conf. Taeniocarpum Jaub. & Spach.

Taeniocarpum Desvaux 1826. Ann. sc. nat. IX. p. 420: nov. g. Phaseolear. (Dolichos articulatus Lam.) *Cf.* Linnaea II. p. 512. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3948; 1841. Nom. p. 149. n. 5784. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 360. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67).
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Euphaseolear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6683. p. 1298; 1841. Ench. p. 672. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

---

*) *Tachigali* nomen caribaeum.
**) *ταχύς*, celer, agilis.
***) *Tacso* Peruvianorum.

*) Nomen ex Plinio.
**) *ταινία*, taenia, lemniscus.

Taeniocarpum Jaub. & Spach .... Pl. or. t. 24. 26—31.
= Holosepalum Spach.

Taeniola Bonorden 1851. Hdb. Mykol. p. 36: nov. g. Protomycetum, a Torula sejunctum. *Cf.* Bot. Zeit. 1852. p. 44.

Taeniopetalum Visiani 1849. Fl. dalmat. III. p. 45: nov. g. Peucedanear. (T. Neumayeri.) *Cf.* Flora 1850. p. 571. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 898.

Taeniopetalum Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 127; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. V. p. 303: nov. g. Angelicear. (Peucedanum alsaticum L.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 75.

Taeniophyllum Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 355: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 225: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1481. p. 205; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2087. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Miq. 1858. Ind., bat. III. p. 684.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Taeniopsis J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 67: nov. g. Polypodiear. (Vittariae sp. Auct.; Haplopteridis sp. Pr.), a Meisn. (Comm. p. 330) ad. Vittariam relatum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 86: sect. Vittariae.
Synon. Taeniopteris Hook.

Taeniopteris Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 70; 1828. Prodr. p. 82; .... Hist. vég. foss. p. 262. t. 82; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 323; 1849. ibid. XIII. p. 70: nov. g. Filicum foss. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 683. p. 66; 1841. Ench. p. 43.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 138: g. Filicitum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 36; 1846. Chlor. prot. p. XXXIII: g. Danaeacear.

Taeniopteris Hook..... Gen. Filic. t. 66 B. (T. Hookeri.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: g. Taenitidear.
= Taeniopsis Smith.

Taeniostema *) Spach 1836 in Bot. Mag. Comp. II. p. 289: nov. g. Cistacear. (Lechea mexicana H. Berol.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 350 (*Taeniostoma*).
Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 371: g. Heteromerinear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 105: g. Cistinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5032. p. 906; 1841. Ench. p. 467 (*Taeniostoma*); 1850. Spl. V. p. 44. — Meisn. 1843. Comm. p. 342. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 75.
Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7191 (*Taeniostemon*): g. Cistear. genuinar.

Taeniostemon Rchb. vid. *praeced.*

*) ταινία, taenia; στῆμα, (potius στήμων), stamen.

Taeniostoma Endl. vid. *praeced.*

Taenitideae Presl 1836. Pterid. p. 222: trib. Gymnosorear. Gen.: Pleurogramme, Notholaena, Pteropsis, Taenitis, Drymoglossum.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 140: subordo Polypodiacear. Gen. ead., excepta Notholaena.
Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331): trib. Polypodiacear. Gen.: Monogramma, Pleurogramma, Taenitis, Polytaenium, Pteropsis, Diblemma. — Par. Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 430. (Gen.: Taenitis.) — Simil. Brongn. 1849, in Orb. Dict. V. p. 693. Gen.: Jenkinsia, Pteropsis, Drymoglossum, Taenitis, Pleurogramme, Taeniopteris, Vittaria, Notochlaena.

Taenitis Swartz 1806. Syn. Filic. p. 24: nov. g. Filicum. (gyratar.) — Par. Willd. 1810. Sp. V. p. 135. n. 1957. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 42. n. 3239; 1831. Gen. II. p. 721. n. 3632. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 217. — Leman 1828. Dict. v. 52. p. 113.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 29: sect. Aspleni.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.
Agdh. 1822. Aphor. p. 116: g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 130. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 19. — Blume 1829. Fl. jav. fasc. III. IV. p. 68; 1830. En. pl. Jav. II. p. 108. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (nudar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 52.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 261: g. Polypodiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 611. p. 60; 1841. Spl. I. p. 1346; 1841. Ench. p. 36. Sect. (1841): Pleurogramme, Pteropsis, Taenitis. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 997. Sect.: Pteropsis, Taenitis. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 26. (auct.)
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 721: g. Gymnopteridum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Polypodear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 430. Sect.: Ampelopteris, Pteropsis.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 280: g. Blechnoidear.

Taenitis Presl 1836. Pterid. p. 226: g. Taenitidear. restrict. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 140. — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (332). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 400; 1842. ibid. IV. p. 66: g. Polypodiear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 611 c. p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Taenitidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 997. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 97: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 90: g. Vittariear. (T. blechnoides W.)

Taetsia Medic. 1786. Theod. spec. p. 82: nov. g. Aloarum. (Dracaena ferrea L.)
= Dracaena Linn.

Tafalla*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 136. t. 29: nov. g. Dioec. Monadelph. *Cf. Tavalla Pers.*
= Hedyosmum Sw. (Rich. Conif. p. 7.)

Tageteae Rchb. 1828. Consp. p. 103 (1831. Fl. exc. p. 247): div. Amphigynanthar. Gen.: Cryptopetalon, Diglossus, Adenophyllum, Chthonia, Dyssodia, Enalcida, Pectis, Porophyllum, Tetranthus, Clomenocoma, Glyphia?, Hymenatherum, Kleinia, Lebetina, Microspermum, Thymnophylla, Tagetes.

Tageteae DC. 1836. Prodr. V. p. 638: div. Tagetinear. Gen.: Adenophyllum, Lebetina, Dysodia, Clomenocoma, Hymenatherum, Tagetes, Thymophylla. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 419. Gen. ead. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1382 et Ench. p. 239) Adenopappus et 1842 (Spl. II. p. 44) Riddellia, Solenotheca. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (123). Gen. ut DC. et Syncephalantha?, Microspermum?, Cadiscus?, Glycideras? — Rchb. 1841. Nom. p. 83. Gen. ut DC. et Microspermum?, Syncephalanthe, Adenopappus, Glycideras?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. et Syncephalantha.

Tagetes**) Tourn. 1700. Inst. p. 478. t. 278: g. pl. class. XIV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 204. Ed. Hall. 1745. p. 210: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1720. Act. Ac. Par. p. 314: g. Corymbiferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 182. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 542. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 402. — DC. 1805. Franç. IV. p. 172. — Link 1822. En. II. p. 339.
Linn. 1737. Gen. p. 261. n. 666; 1737. Cliff. p. 418; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 267; 1753. Sp. II. p. 887; 1759. Syst. ed. X. p. 1220. n. 865; 1763. Sp. ed. II. p. 1249; 1764. Gen. ed. VI. p. 430. n. 964; 1767. Syst. ed. XII. p. 560: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 640; 1784. Syst. p. 770. — Reich. 1778. Gen. p. 426. n. 1044. — Lour. 1790. Coch. II. p. 503. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 561. n. 1302. — Gmel. 1791. Syst. p. 1245. — Pers. 1797. Syst. p. 811; 1807. Ench. II. p. 458. n. 1872. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2126. n. 1502; 1809. En. p. 900. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 434.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 255. n. 1054: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 517.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29 (*Tagetis*): g. Corymbiferor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 131: g. Bidentum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.
Hill 1769. Ht. kew. p. 4: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 437. t. 172. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 563; 1826. Syst. III. p. 571. n. 2781; 1831. Gen. II. p. 631. n. 3144. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 117.
Scop. 1777. Intr. p. 131: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 34. n. 65: g. Actinophytor.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 194: g. Jacobear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 460. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 909.
Link 1829. Hdb. I. p. 776: g. Coreopsidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Tagetinear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 336. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41.
DC. 1837. Pr. V. p. 642: g. Tagetear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2580. p. 420; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3212. — Walp. 1843. Rep. II. p. 624. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 324: g. Senecionidear.
Synon. Tagetes, Enalcida et Diglossus Cass.

Tagetes Cassini 1825. Dict. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: g. restrict. Tagetinear. (Archetypar). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Spach 1840. Vég. phan. X. p. 117.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2366; 1831. Fl. exc. p. 248: g. Tagetear.
= Tagetis Tourn. pars.

Tagetineae Cassini 1818. Dict. v. 10. p. 419: div. Helianthear.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 367; 1825. v. 38. p. 203: trib. 8 Synantherear. — Par. Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 61; 1830. v. 60. p. 574. Divis.: Dyssodieae, *Archetypae* (gen.: Hymenatherum, Tagetes, Diglossus, Enalcida, Thymophylla), Pectideae. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 232. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 15. 116. Sect. ut Cass.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Helianthidear. Gen.: Pectis, Tagetes.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: div. Synantherear. Gen. Tagetear. Rchb. 1828.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 253; 1832. Syn. p. 236: subtrib. Senecionidear. Gen. (1832): Tagetes, Hymenatherum, Thymophylla, Boebera. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 638. Divis.: Tageteae, Porophylleae. — Endl. 1838. Gen. p. 419; 1841. Ench. p. 239. Divis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). Divis. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. Gen. ex Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 83: div. Anthemidear. Subdivis. ut DC.

Tagetis Linn. Phil. bot. p. 29: vid. *Tagetes Tourn.*

Tainia Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 354: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1831. Orchid. p. 132: g. Epidendrear.
= Mitopetalum Blume.

Tala*) Blanco 1837. Flora de Filipin. p. 438: nov. g. Didynam. Angiosperm. (T. odorata.) *Cf.* Meisn. Comm. p. 215. 367.

---

*) Dicat. Joanni Tafalla.

**) A Jovis nepote Tagete nomen habere hoc herbarum genus, auctor est Linn. (Phil. bot. p. 175) dubitante Beckmann et aliis.

*) *Tala* s. *Talatala* nomen vernaculum.

Tala Blanco cont.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4023/2. p. 1405; 1841. Ench. p. 340: g. dubium Scrophularinear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 437. 973. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 708.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4518 b: g. Gerardiear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 586; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Scrophulariacear. dubium.

Tala Miquel 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 179: subg. Celtidis.

Talangninia Chapel. mss. ex DC. Prodr. IV. p. 389.
= Randiae Houst. spec.

Talarodictyon*) Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 14. n. 29: nov. g. Hydrodictyear. (T. Tilesii.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52; 1849. ibid. XII. p. 325.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18 (*Talerodictyon*): g. Hydrodictidar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 512: g Anadyomenear.? obscurum.

Talasium Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 22 (et p. 30 *Thalasium*): nov. g. Graminear.
Schult. 1827. Mant. III. p. 523. 551 (*Thalasium*): g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 823 (*Tolasium*): g. Ophiurear.?
= Panici Linn. pars.

Talauma**) Juss. 1789. Gen. p. 281: nov. g. Magnoliar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 76: g. Magnoliacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 460. — Blume 1823. Verhand. Bat. Genootsch. IX. p. 45 (Flora 1825. I. p. 152); 1829. Fl. jav. Magnol. p. 29. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 25. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 127. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 311.
DC. 1824. Pr. I. p. 81: g. Magnoliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4993. — Bartl. 1830. Ord. p. 249. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 85. — Meisn. 1837. Gen. p. 3 (5). — Endl. 1839. Gen. n. 4735. p. 837; 1841. Ench. p. 427. — Walp. 1842. Rep. I. p. 69; 1843. II. p. 746. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 74. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 41.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7292: g. Talaumear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 447: g. Magnolinear. Sect.: Hilariana, Blumiana.
Synon. Magnolia Plum.; Blumia Nees.

Talaumeae Rchb. 1837. Handb. p. 278; 1841. Nomencl. p. 192: sect. Magnoliear. Gen.: Talauma, Aromadendron.

Talerodictyon Lindl. vid. *Talarodictyon Endl.*

Talguenea***) Miers 1826. Trav. in Chili II. p. 520. *Cf.* Hook. & Arn. 1833. Bot. Misc. III. p. 174.

Talguenea Miers cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5735. p. 1100; 1841. Ench. p. 581: g. Colletiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5608.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
Synon. Trevoa Miers.

Tali Adans. 1763. Fam. II. p. 319: g. Cassiar.
= Omphalobium Gärtn.?

Talictrum Allion. vid. *Thalictrum Tourn.*

Taliera*) Martius 1824. Palm. fam. p. 10: nov. g. Coryphinar. (Corypha Taliera Roxb.) — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXVIII. 1306.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 18. n. 1158; 1830. Gen. I. p. 251. n. 1307: g. Palmar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1063.
Rchb. 1828. Consp. p. 73. n. 1659: g. Coryphacear.
= Corypha Linn.

Taligalea Aublet. 1775. Guian. II. p. 625. t. 252: nov. g. Didynam. Angiosperm. (T. campestris.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 922.
Scop. 1777. Intr. p. 169: g. Personatar.
Juss. 1789. Gen. p. 109: g. Viticum.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 251: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 149.
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2900: g. Verbenear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227.
= Amasonia Linn. f.

Talinastrum DC. 1828. Prodr. III. p. 357: sect. Talini. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4314 *b*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 76. — Endl. 1840. Gen. n. 5178 *b*. p. 951; 1841. Ench. p. 501.

Talineae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LI: div. Portulacear. Gen.: Thelygonum, Talinum, Claytonia, Portulaca.
Rchb. 1828. Consp. p. 163: subdiv. Portulacear. Gen.: Leptrina, Montia, Crypta, Claytonia, Ullucus; Aylmeria, Trianthema, Cypselea, Portulaca, Anacampseros, Talinum, Calandrinia, Portulacaria; Hydropyxis?, Votomita?
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352: trib. Portulacear. Sect.: Calandrinieae, Mollugineae. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94). Subtrib. eaed.
Rchb. 1837. Hdb. p. 237: sect. Portulacear. genuinar. Gen.: Calandrinia, Talinum, Anacampseros, Grahamia, Portulacaria; Lewisia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 164. Subsect.: Calandrinieae, Portulacarieae, Lewisieae.

Talinellum DC. 1828. Prodr. III. p. 358: sect. Talini? (An Calandriniae?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4314 *a*; 1841. Nom. p. 164. n. 6253. 3. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 77. — Endl. 1840. Gen. n. 5178 *c*. p. 951; 1841. Ench. p. 50.

Talinium Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 259: nomen emendat. (?) pro *Talino*.

*) τάλαρος, corbis; δίκτυον, rete.
**) Nomen vernaculum.
***) Nomen vernaculum *Talguen*.

*) Nomen vernaculum.

Talinopsis A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 14. t. 3: nov. g. Portulacacear., Grahamiae aff.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 7: g. Calandriniear.

Talinum*) Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar.
Juss. 1789. Gen. p. 312: g. Portulaccar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 260. — Batsch 1802. Tab. p. 36. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 138. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 840; 1825. Syst. II. p. 452. n. 1762; 1830. Gen. I. p. 393. n. 1975. — Link 1822. En. II. p. 2; 1831. Hdb. II. p. 43. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 75. — Kunth 1824. Syn. III. p. 375. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 150. — DC. 1828. Pr. III. p. 356. Sect.: Phemeranthus, Talinastrum, Talinellum. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 193. — Bartl. 1830. Ord. p. 304. — Hook. f. 1833. Fl. bor. am I. p. 223. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 356. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 76. Sect. ut DC. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 227. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 623.
Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 65. t. 10; 1798. Syst. p. 65: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 862. n. 950; 1809. En. p. 497. — Pers. 1807. Ench. II. p. 6. n. 1178. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 123. Ed. Schrank 1819. p. 134. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 464.
Mönch 1794. Meth. p. 231: g. Thalamostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 136: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 6.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1828. Consp. p. 163. n. 4314; 1837. Hdb. p. 237: g. Talinear. Sect. ut DC.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352; 1839. ibid. II. p. 296: g. Calandriniear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94). — Endl. 1840. Gen. n. 5178. p. 950; 1841. Ench. p. 501. Sect. ut DC. et Eutmon Raf.? — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6352. Sect. ut Endl. (Talinum loco Talinastri.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 105. — Walp. 1843. Rep. II. p. 234. — Miq. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 246; 1857. Ind. bat. I. p. 1062. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 7.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 196: g. Portulacacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 22. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 501.
Synon. Talinium Rafin.

Talisia Aublet 1775. Guian. I. p. 349. t. 136: nov. g. Octandr. Monogyn. (T. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 620.
Scop. 1777. Intr. p. 227: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 247: g. Sapindor.
Vahl 1798. Eclog. II. p. 29. 58. (Char. essent.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 10: g. Saponacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 269. n. 1084.

*) Nomen plantae apud Senegalenses.

Talisia Aublet cont.
DC. 1824. Pr. I. p. 609: g. Sapindear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 223. n. 1461; 1830. Gen. I. p. 313. n. 1598. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 154. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 29. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 669. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 40. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38). — Endl. 1840. Gen. n. 5616. p. 1017; 1841. Ench. p. 561. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5220; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7596: g. Cupaniear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1280: g. Sapindacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 87.
Synon. Acladodea Ruiz & Pav.?

Tamaceae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 189: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Tamus.

Tamara Roxb. ex Steud. Nom. II. p. 188. 661.
= Nelumbium Juss.

Tamara-Tonga s. Carambolas Rheede 1682. Malab. III. p. 51. t. 43. 44.
= Carambola Adans.

Tamaricaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 126) 1847. Veg. kingd. p. 341: ordo Violalium. Gen.: Tamarix, Myricaria, Trichaurus.
Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93): subordo Tamariscinear. Gen. ead.
Conf. Tamariscineae Desv.

Tamaricinae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 554: fam. Calyciflorar. Gen.: Tamarix.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: div. Salicariar.

Tamaricineae A. St. Hilaire 1815. Mém. Mus. II. p. 208 in adnot.; 1815. Bull. soc. philom. p. 24: nova fam., Salicarieis aff. Gen.: Tamarix.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 123: ordo 52 plant.
= Tamariscineae Desv.

Tamarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: ordo Gynochlamydar. Fam.: Dioscorideae, Tamineae.

Tamarindeae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLIX: div. Cassiear. Gen.: Bauhinia, Cercis, Aloëxylon, Hymenaea, Cynometra, Copaifera, Schotia, Afzelia, Cassia, Cathartocarpus, Tamarindus, Ceratonia, Parkinsonia, Haematoxylon, Hoffmanseggia, Poinciana, Caesalpinia, Coulteria, Guilandina, Gymnocladus, Gleditschia, Moringa.

Tamarindus*) Tourn. 1700. Inst. p. 660. t. 445. Append.
Linn. 1737. Gen. p. 9. n. 23; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 15; 1753. Sp. I. p. 34; 1759. Syst. ed. X. p. 861. n. 46; 1762. Sp. ed. II. p. 48; 1764. Gen. ed. VI. p. 23. n. 46; 1767. Syst. ed. XII. p. 73: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 74;

*) Salmasio teste *Tamar* Arabum est palma; inde Dactyli indici.

Tamarindus Tourn. cont.
1784. Syst. p. 81. — Reich. 1778. Gen. p. 24. n. 50. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 24. Char. emend. — Gmel. 1791. Syst. p. 94. — Pers. 1797. Syst. p. 82.

Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 222.

Gled. 1749. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Lomentacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 97.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 296. — Juss. 1789. Gen. p. 347. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 368. — St.-Hil. 1805. Expos. II. p. 203. — Link 1822. En. II. p. 178. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 158. n. 2479; 1831. Gen. II. p. 567. n. 2762. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 160.

Adans. 1763. Fam. II. p. 319: g. Cassiar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 429. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 765. (spuriar.)

Gled. 1764. Syst. p. 138. n. 579: g. Thalamostemonum.

Lour. 1790. Coch. II. p. 403: g. Monadelph. Triandr. —. Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 450. n. 1100. — Willd. 1800. Sp. III. p. 577. n. 1250; 1809. En. p. 690. — Cram. 1803. Disp. p. 148. — Pers. 1807. Ench. II. p. 211. n. 1581.

Neck. 1790. El. II. p. 454. n. 1290: g. Chorisophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 310. t. 46.

Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 488. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 437. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 285. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (70). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 489.

HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 335: g. Caesalpiniear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 50. — Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4116; 1841. Nom. p. 155. n. 6080. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 111. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6778. p. 1315; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 331. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 595.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.

Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.

Link 1831. Hdb. II. p. 138: g. Cassiacear.

Roxb. 1832. Ind. III. p. 215: g. Diadelph. Triandr.

Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 145 in adnot. Char. emend.

Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Amherstiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 845. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 82

Tamarisceae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LIX: div. Cistinear. Gen.: Tamarix, Myricaria.

Rchb. 1828. Consp. p. 166 (1832. Fl. exc. p. 587): div. Aizoidear. Subdivis.: Nitrarieae, *genuinae* (gen.: Tamarix, Myricaria), Reaumurieae.

Tamarisceae Rchb. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166: subdiv. Tamariscinear. Gen. ut 1827 et (1841) Trichaurus.

Conf. Tamariscineae.

Tamariscella C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 482: subsect. Theliphylli. (Hypnum tamariscinum Hedw.)

Tamariscinae Link 1821. Enum. I. p. 291.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (142) Thalamiflorar. syncarpar.

Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo Silenalium.
= Tamariscineae St. Hil.

Tamariscineae A. St. Hilaire 1815. Mém. Mus. II. p. 205.

„Desv." DC. 1819. Théor. élém. p. 245 (*Tamariscinées*); 1828. Pr. III. p. 95: ordo (75) Calyciflorar. Gen.: Tamarix, Myricaria. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 725. Gen. ead. et Hololachna. — Koch 1836. Syn. p. 248. Ed. II. p. 274. Gen. ut DC.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae. Gen.: Tamarix.

Desv. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 344. 348: ordo plant. Gen.: Tamarix, Myricaria.

Juss. 1828. Dict. v. 52. p. 164.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 41: fam. Turnerariear. Gen. ut DC. et Reaumuria.

Link 1831. Hdb. II. p. 46: ordo 13 Perigynar. Gen. ut Desv.

Spach 1836. Vég. phan. V. p. 477: fam. (83) Cistiflorar. Gen. ead.

Endl. 1840. Gen. p. 1038; 1841. Ench. p. 543: ordo (221) Guttiferar. Gen. ut Desv. et Trichaurus.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 75: fam. Guttiferar. Gen. ut Desv.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 332: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.

Synon. Tamariscus Tourn.; Tamarix Linn.; Tamaricineae St. Hil.; Tamaricinae Gray; Tamariscinae Link; Tamaricaceae Lindl.; Tamarisceae Rchb. 1827 et 1837; Tamarisceae genuinae Rchb. 1828.

Tamariscineae Bartl. 1830. Ord. p. 286: ordo (164) Cistiflorar. Gen.: Tamarix, Myricaria, Hololachne, Reaumuria, Fouquiera, Bronnia; Nitraria?, Parnassia?

Rchb. 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166: div. Aizoidear. Subdivis.: Nitrarieae, Reaumurieae, Tamarisceae.

Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93): ordo 91 plant. (p. 438 Parietalium.) Subord.: Tamaricaceae, Reaumurieae, Nitrariaceae, Fouquieraceae.

Tamariscus Tourn. 1700. Inst. p. 661. Append.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 107. Ed. Hall. 1745. p. 120: g. pl. class. V.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 419: g. Dicotyledonum Diplostemonum.

Scop. 1772. Carn. I. p. 224: g. Pentandr. Trigyn.
= Tamarix Linn.

Tamariscus Medic. 1787. Malv. p. 113: g. Monadelph. Decandr. (Tamarix germanica L.)

Tamariscus Medic. cont.
Mönch 1794. Meth. p. 123: g. Thalamostemonis.
= Myricaria Desv.

Tamarix*) Linn. 1737. Gen. p. 84. n. 240; 1737. Cliff. p. 111; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 69; 1753. Sp. I. p. 270; 1759. Syst. ed. X. p. 965. n. 337; 1762. Sp. ed. II. p. 386; 1764. Gen. ed. VI. p. 148. n. 375; 1767. Syst. ed. XII. p. 219. n. 372: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 244; 1784. Syst. p. 296. — Reich. 1778. Gen. p. 151. n. 405 (*Thamarix*). — Schreb. 1789. Gen. I. p. 200. n. 510. — Lour. 1790. Coch. I. p. 182. — Gmel. 1791. Syst. p. 498. — Pers. 1797. Syst. p. 314; 1805. Ench. I. p. 328. n. 732. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1498. n. 572; 1809. En. p. 329. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 943. n. 1123. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 25. 449. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 100.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 37. n. 144: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 269: g. Amaranthor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 189.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 116: g. Oligantherar.
Scop. 1777. Intr. p. 291: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 313: g. Portulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 139. — DC. 1805. Franç. IV. p. 398; 1815. V. p. 527. — Hedw. 1806. Gen. p. 207. n. 853. — Willd. 1812. Abh. Berl. Ak. p. 76. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIII. 669.
Neck. 1790. El. II. p. 385. n. 1200: g. Ypsoophytor.
Vent. 1799. Tabl. IV. p. 24: g. ordinis incerti.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.
Cram. 1803. Disp. p. 153 in Monadelph. Pentandr. et p. 160 in Monadelph. Decandr.
A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 208; 1815. Bull. soc. philom. p. 24: g. Tamaricinear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 706: g. Onagrar. descisc.
Link 1821. En. I. p. 291: g. Tamariscinar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 554: g. Tamaricinar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: g. Tamariscinear. — Par. Webb .... Canar. I. p. 170.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 537. n. 2633: g. Tamariscear.
= Tamarix Medic. et Myricaria Desv.

Tamarix Medic. 1787. Malv. Fam. p. 115: g. Pentandr. restrict. (T. gallica L.) *Cf.* Medic. 1782. Bot. Beob. p. 332.
Desv. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 348: g. Tamariscinear. (Distinguitur Myricaria.) *Cf.*

*) Nomen e Veteribus.

Tamarix Medic. cont.
Leman 1828. Dict. v. 52. p. 162. — Par. Ehrenb. 1827. Linnaea II. p. 252. Subgen.: Oligadenia, Decadenia, Polyadenia. — DC. 1828. Pr. III. p. 95. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 421; 1844. Ross. II. p. 132. — Bartl. 1830. Ord. p. 287. — Link 1831. Hdb. II. p. 46. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 725. Sect. ut Ehrenb. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 40. Sejungitur Trichaurus. — Koch 1836. Syn. p. 248. Ed. II. p. 274. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 479. — Endl. 1840. Gen. n. 5484. p. 1039; 1841. Ench. p. 543. Sect. ut Ehrenb. — Brongn. 1843. En. genr. p. 75. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 219. Sect. eaed. — Walp. 1843. Rep. II. p. 115. Sect. eaed. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 600. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 331. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 693.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX; 1828. Consp. p. 166. n. 4413; 1832. Fl. exc. p. 587; 1837. Hdb. p. 240: g. Tamariscear. Sect. (1828) ut Ehrenb. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6470. Sect.: Oligadenia, Tamarix, Polyadenia (serius Pleiadenia).
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 126; 1847. Veg. kd. p. 342: g. Tamaricacear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93).
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 124: g. Tamaricinear.
Synon. Tamariscus Tourn. pt.; Tamarix Linn. pt.

Tamarix Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 291. t. 61. f. 1 (germanica).
= Myricaria Desv.

Tamarum Caesalp. 1583. De plant. lib. 5. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 11.)
= Tamus Linn.

Tambourissa Sonnerat 1782. Voy. II. t. 134 ex Endl.
Gmel. 1791. Syst. p. 16 (*Tamburissa*): g. Monandr. Monogyn.
= Ambora Juss.

Tamburissa Gmel. vid. *praeced.*

Tamideae „Dumort." Spach 1846. Hist. vég. phan. XII. p. 200: trib. Dioscoreear. Gen.: Tamus, Oncus.

Tamineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. 59: fam. Tamariear. Gen.: Tamus.

Tamnochortus Desv. vid. *Thamnochortus Berg.*

Tamnoides „Mess. mss." Stell. Irc. 27. (Gmel. Sibir. III. p. 108.)
= Menispermum Tourn.

Tamnus Tourn. 1700. Inst. p. 102. t. 28: g. pl. class. I.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 165: g. ord. 3 class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 43: g. Asparagor.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 106: g. Smilacear.

Tamnus Tourn. cont.
Link 1822. En. II. p. 426 (*Thamnus*); 1829. Hdb. I. p. 275: g. Smilacinar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: g. Dioscorinear.
= Tamus Linn.

Tamonea Aublet 1775. Guian. II. p. 659. t. 268: nov. g. Didynam. Angiosperm. (T. spicata.) — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 6. 94. — Gmel. 1791. Syst. p. 965.
Scop. 1777. Intr. p. 168: g. Personatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 486.
Juss. 1789. Gen. p. 109: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 355. n. 555: g. Chasmatophytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. t. 213.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 251: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — Hedw. 1806. Gen. p. 14. 349. — Pers. 1807. Ench. II. p. 139. n. 1427. — Kunth 1823. Syn. II. p. 65 (*Tamonia*). — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 201. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 173. — Schltd. & Cham. 1830. Linnaea V. p. 99 (*Tamonia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 754. n. 2114; 1831. Gen. II. p. 478. n. 2357: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2898. — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227.
Endl. 1838. Gen. n. 3696. p. 635; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (200). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 610. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 115.
Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4197: g. Viticear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 528; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 176: g. Casseliear.
Synon. Kämpfera Houst.; Kempfera Adans.; Ghinia Schreb.; Leptocarpus Willd.

Tamonia Kunth, Schltd. vid. *praeced.*

Tampoa Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 35. t. 388: nov. g. imperfecte cognitum. (T. guianensis.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 175.
Endl. 1841. Gen. p. 1333; 1841. Ench. p. 685. n. 6894: inter genera incognita. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 373.

Tamus*) Linn. 1737. Gen. p. 305. n. 750; 1737. Cliff. p. 458; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1028; 1759. Syst. ed. X. p. 1292. n. 991; 1763. Sp. ed. II. p. 1458; 1764. Gen. ed. VI. p. 524. n. 1119; 1767. Syst. ed. XII. p. 654: g. Dioec. Hexandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 263. — Murr. 1774. Syst. p. 743; 1784. Syst. p. 887. — Reich. 1778. Gen. p. 520. n. 1224. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 691. n. 1527. — Pers. 1797. Syst. p. 929; 1807. Ench. II. p. 618. n. 2234. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 772. n. 1799; 1809. En. p. 1015. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 199. 285.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 38; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 905. n. 3187; 1831. Gen. II. p. 708. n. 3570.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.
Gled. 1764. Syst. p. 74. n. 312: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 423: g. Dioicear.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Vites et Cucurbitas conjungens.
Neck. 1790. El. III. p. 115. n. 1451: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 570: g. Hexandr. Monogyn.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 149: g. Smilacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 221.
DC. 1805. Franç. III. p. 180: g. Asparagear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 189: g. Tamacear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 170: g. Dioscorinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 131.
Lois. 1828. Dict. v. 52. p. 171: g. Asparaginear.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1335; 1830. Fl. exc. p. 101; 1841. Nom. p. 48. n. 1747: g. Dioscorear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Koch 1837. Syn. p. 706. En. II. p. 815. — Endl. 1837. Gen. n. 1202. p. 158; 1841. Ench. p. 92. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 22. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 403. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 118. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 235.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: g. Taminear.
Herb. 1837. Amaryll. p. 67. 122: g. Agavear.
Meisn. 1842. Gen. p. 404 (307): g. Dioscoracear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 201: g. Tamidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 214: g. Dioscoreacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 333.
Webb 1850. Canar. III. p. 317: g. Dioscoridear.
Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 69; 1850. Enum. V. p. 453: g. Dioscorinear.
Math. 1853. Belg. I. p. 536: g. Asparagear.
Synon. Tamarum Caesalp.; Tamnus Tourn.; Thamnus Link.

Tanaceta Adans. 1763. Fam. II. p. 120: sect. 6 Compositar. Gen.: Absinthium, Artemisia, Tanacetum, Carpesium, Contarena, Spargonaphoros, Grangea, Athenaea, Pirarda.

Tanaceteae Cassini 1823. Dict. v. 29. p. 177; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: subdiv. Chrysanthemear. Gen.: Balsamita, Pentzia, Tanacetum. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. Gen. ead.

Tanaceteae Schultz Bip. 1844. Üb. Tanac. (Bot. Zeit. 1845. p. 306): div. 3 Senecionidear. Subdiv.: Chrysanthemeae, Matricarieae, Eutanaceteae.

Tanacetioides Lessing 1832. Syn. Compos. p. 265: subg. Tanaceti.
= Eutanacetum DC.

*) Nomen ex Plinio; aliis *Tamnus*, aliis *Tamarum*.

Tanacetoides Lessing 1831. Linnaea VI. p. 210: subg. Artemisiae. (Tanacetum multiflorum Thunb.)
= Brocchia Vis., DC.

Tanacetosma Fenzl 1853. Beitr. z. Leucanth. u. Pyrethr. p. 14: subg. Tanaceti. (Pyrethri et Tanaceti species plurimae DC.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 254.

Tanacetum Tourn. 1700. Inst. p. 461. t. 261: g. pl. class. XII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 186. Ed. Hall. 1745. p. 194: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1719. Act. Ac. Paris. p. 280: g. Corymbiferar. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 693. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 142. — Juss. 1789. Gen. p. 184. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 550. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 407. — DC. 1805. Franç. IV. p. 188. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 448. — Link 1822. En. II. p. 313. — Math. 1853. Belg. I. p. 290.
Linn. 1737. Gen. p. 247. n. 636; 1737. Cliff. p. 398; 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 393. n. 773; 1748. Ups. p. 254; 1753. Sp. II. p. 843: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 167.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 133: g. Compositar. ordinis 3.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 249. n. 1031: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 572.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1207. n. 848; 1763. Sp. ed. II. p. 1182; 1764. Gen. ed. VI. p. 541. n. 944; 1767. Syst. ed. XII. p. 917: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 618; 1784. Syst. p. 742. — Reich. 1778. Gen. p. 415. n. 1024. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 549. n. 1280. — Gmel. 1791. Syst. p. 1206. — Pers. 1797. Syst. p. 782; 1807. Ench. II. p. 408. n. 1836. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1809. n. 1472; 1809. En. p. 859. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 141.
Adans. 1763. Fam. II. p. 120: g. Tanacetor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 182. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 509. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 8. 223.
Hill 1769. Ht. kew. p. 32: g. Tubulatar.
Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar. — Par. Mirb. 1815. Élem. II. p. 885. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 178 (*Tanaisie*).
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 395. t. 165: g. Tubulosar.
Rebent. 1804. Neom. p. 104: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 549; 1826. Syst. III. p. 485. n. 2728; 1831. Gen. II. p. 620. n. 3075: g. Eupatorinar. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 58.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 178; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. Tanacetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2378.
D. Don 1825. Nepal. p. 181: g. Anthemidear.

Tanacetum Tourn. cont.
— Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 225. — Koch 1837. Syn. p. 369. Ed. II. p. 407. — Brongn. 1843. En. genr. p. 39.
Link 1829. Hdb. I. p. 717: g. Elichrysear.
Less. 1832. Syn. p. 264: g. Artemisiear. Subgen.: Matricarioides, Tanacetioides, Psanacetum. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 327. — DC. 1837. Pr. VI. p. 127. Sect.: Eutanacetum, Psanacetum, Matricarioides, Brocchia, Hippioides. — Endl. 1838. Gen. n. 2696. p. 439; 1841. Ench. p. 242. Sect. ut DC. — Kunth 1838. Berol. I. p. 349. — Meisn. 1839. Gen. p. 213 (135). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 401. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 414. Sect.: Eutanacetum, Homalotes, Sphaeromeria. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3454. Sect.: Tanacetum, Psanacetum, Matricarietum, Brocchia, Hippiopsis. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 600. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 137.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 334 (*Tanaisie*): g. Senecionidear.

Tanacetum Necker 1790. Elem. bot. I. p. 88. n. 160: g. Siphoniphytor., sejuncto Psanaceto restrictum.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 173: g. Chrysanthemear.
= Eutanacetum DC.

Tanacetum Schultz Bip. 1844. Üb. Tanac. p. 46; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 219: g. Artemisiear. Sect.: Balsamita, Eutanacetum, Psanacetum, Xanthogymnocline, Xanthoglossa, Leucogymnocline, Leucoglossa, Fruticosa, Dendranthema, Brocchia.

Tanacetum Fenzl 1853. Beitr. z. Tanac. n. Pyrethrum DC. p. 14: g. emendat. Subgen.: Tanacetosma, Leucanthemum, Decaneurum. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 253.

Tanaceum Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 399: sect. Artemisiae. (A. Fischeriana et abrotanoides.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 423. — Walp. 1843. Rep. II. p. 641.

Tanaecieae DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 285: subtrib. Crescentinear. Gen.: Colea, Boutonia, Arthrophyllum, Parmentiera, Tanaecium (1839 Periblema loco Boutoniae). — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571. Gen. ead.
Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210): trib. Crescentinear. Gen.: Periblema, Phyllarthron, Bravaisia?, Colea, Parmentiera, Tanaëcium.
DC. 1845. Pr. IX. p. 240: subtrib. Crescentiear. Gen.: Colea, Periblema, Phyllarthron, Parmentiera, Tanaecium.
Seem. 1853. Fl. panam. p. 181: trib. Crescentiacear. Gen. ut DC. 1845. (Tripinnaria loco Parmentierae.)

Tanaecium*) Swartz 1788. Prodr. p. 6. 91; 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 1049. t. 20. f. 2: nov. g. Didynam. Angiosperm. — Par.

*) ταναηκής, protensus.

Tanaecium Swartz cont.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 412. n. 1022. — Gmel. 1791. Syst. p. 943. — Willd. 1800. Sp. III. p. 312. n. 1161. — Pers. 1807. Ench II. p. 168. n. 1504. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 176.
Gis. 1792. Prael. p. 376: g. Putaminear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 417: g. Bignoniear. anomalar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 842. n. 2243; 1831. Gen. II. p. 506. n. 2486: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3220: g. Caprariacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Crescentiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 233: g. Crescentiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4172. p. 723; 1841. Ench. p. 350. — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4725. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 568.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123; 1845. Pr. IX. p. 245: g. Tanaeciear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210). — Seem. 1853. Fl. panam. p. 181.
Synon. Jaroba Marcgr.?

Tanaecium Bojer ...
= Kigelia DC.

Tandonia*) Moquin-Tandon 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 226: nov. g. Anredear.

Tangaraca (Pison. 1848. Brasil. p. 92 c. ic.) Adans. 1763. Fam. II. p. 143: g. Aparinium.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82 (sph. *Jangaraca*): g. Hamellidiae.
= Hamelia Jacq.

Tangaraea „Ad." Endl. Gen. p. 544 in synon. Hameliae: vid. *Tangaraca*.

Tanghekolli Adans. 1763. Fam. II. p. 57: g. Narcissor.
= Crinum Linn.

Tanghinia**) Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 31 in Römer Collect. bot. p. 202: nov. g. Apocinear. (Cerbera Manghas?)
Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 204: g. Apocynear. — Par. D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 340.
Bojer 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 290. t. 110.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 97: g. Alyxiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3386. p. 580; 1841. Ench. p. 294: g. Ophioxylear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 512. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 51.
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5204: g. Rauwolfiear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 355: g. Tabernaemontanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Tanibouca***) Aublet 1775. Guian. I. p. 448. t. 178: nov. g. Decandr. Monogyn. (T. guianensis.)
Juss. 1789. Gen. p. 76: g. Elaeagnor.

*) Dicat. Barth. Tandon, Monspel.
**) *Voa Tanghing*, nomen Madagasc.
***) Nomen caribaeum *Tanibouca*.

Tanibouca Aublet cont.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 222; 1824. Dict. v. 31. p. 459: g. Myrobalanear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 205.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 179: g. Terminaliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 323. n. 1275.
Pers. 1805. Ench. I. p. 486. n. 1105 (*Tanibuca*): g. Elaeagnear.
= Catappa Gärtn.

Tanibuca Pers. vid. *praeced.*

Tankervillia Link 1829. Handb. I. p. 251: nov. g. Orchidear.
= Bletia Ruiz & Pav.
= Phaius Lour. (Lindl. 1847.)

Tanroujou Juss. 1789. Gen. p. 351 in adnot.
= Trachylobium Hayne.

Tantalus Nor. ex Steud. Nom. II. p. 513. 663.
= Sarcolaena Pet.-Thouars.

Tanycrania*) Endl. 1839. Gen. n. 4574 *b.* p. 798; 1841. Ench. p. 397: sect. Corni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5562. 2. — Walp. 1846. Rep. V. p. 932. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 378.
Synon. Macrocarpium Spach.

Taonabo Aublet 1775. Guian. I. p. 569. t. 227: nov. g. Polyandr. Monogyn. (T. dentata et punctata.) *Cf. Tonabea, Tonobea, Toanabo.*
= Ternströmia Mutis.

Taonia J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 101: nov. g. Dictyotear. (Zonaria atomaria Agdh.)
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 107: g. Dictyotacear.
Synon. Orthosori Trevis. sect. Calizonia; Stypopodii sp. Kütz.; Spyris Targ.?

Tapanava Adans. 1763. Fam. II. p. 470: g. Arorum.
= Pothos Linn.

Tapanhuacanga Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Römer Script. p. 81. t. 6. f. 5: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Rubiacear.? Steud. Nom. II. p. 663) Quid?

Taparira Scopoli vid. *Tapirira Aubl.*

Tapeina Hedwig vid. *Tapeinia Comm.*

Tapeinaegle*) Herbert 1847. Bot. Regist. t. 22.
= Carregnoa Boiss.

Tapeinanthus Herbert 1837. Amaryll. p. 73. 190. 414: nov. g. Amaryllidear. Pancratiformium. (Pancratium humile Cav.) *Cf. Tapeinaegle Herb.*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Narcissear.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 183: g. Narcissinear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 703: g. Sternbergiear.
= Carregnoa Boiss.

Tapeinanthus „Boiss. mss." Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 436: nov. g. Marrubiear. (T. persicus.) — Par. Boiss. 1853. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 12. p. 68. *Cf.* Flora 1854. p. 699 et Müll. Ann. bot. V. p. 686.

*) *τανύω*, tendo; *κρανία*, cornus.
**) *ταπεινός*, humilis, parvus; *αἴγλη*, nitor, radius.

Tapeinia „Commers." Juss. 1789. Gen. p. 59: nov. g. Iridum. (Ixia pumila Forst.)
Gmel. 1791. Syst. p. 108: g. Triandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos I. p. 148: g. Iridear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 355 (*Tapeina*). — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 831. (Hook. f. Antarct. voy. p. 353.)
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1201: g. Ixiear.
= Witsena Thunb.?

Tapeinidium Presl 1850. Epimel. bot. p. 454: sect. Microlepiae. (Davallia pinnata Cav.)

Tapeinostemon Benth. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 194: nov. g. Gentianear., Schübleriae aff. (T. spenneroides et capitatum.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 509 (sph. *Topeinostemon*).

Tapeinotes DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 544: g. Beslerieear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 304 (214).
Walp. 1843. Rep. II. p. 716: g. Episciear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Gesnerear.
= Tapina Mart.

Tapelia Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 400 *a*: sect. Zeorae.

Tapesia Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 270: sect. Pezizae. — Par. Leman 1828. Dict. v. 52. p. 220.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 105: trib. Lachneae.
Endl. 1836. Gen. n. 430 *Bf.* p. 37 (*Tapezia*): 1841. Ench. p. 21: subsect. Lachni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 2 *b* (*Tapezia*). — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 356 (*Tapezia*).

Tapezia Endl. Rchb., Rabenh. vid. *praeced.*

Taphranthus Wittst. vid. *Tephranthus Neck.*

Taphria*) Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 217: nov. g. ab Erineo separatum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 52. p. 223.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.
Schltd. 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. 73. *Cf.* Isis 1823. p. 853.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 8: sect. Erinei. — Par. Kunze 1823. Mykol. Heft. II. p. 133. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 559. — Math. 1853. Belg. II. p. 450.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 529: g. Phylleriear. — Par. Fée 1834. Mém. Phyllér.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Gastromycetum divis. 2.
= Taphrina Fries.

Taphrina Fries 1825. Pl. homon. p. 317: g. Byssacear. (antea *Taphria*, nomen insecti.)
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 57: g. Byssaceor. cellularium.
Fries 1832. Syst. III. 2. p. 520; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 518: g. Phylleriacear.
Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15: sect. Erinei.
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 88: g. Phylleriaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 64.

Taphrogeton Rchb. 1830. Fl. exc. p. 79; 1844. Fl. saxon. p. 58: sect. Scirpi. (Sc. sylvaticus et radicans.)

*) τάφρη, fossa. (?)

Taphrospermum C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 127 (Ledeb. Ic. t. 320): nov. g. Sisymbrear. (T. altaicum.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 520. n. 2556: g. Siliquosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 717.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7023: g. Erysimear.
Endl. 1839. Gen. n. 4911. p. 876; 1841. Ench. p. 450: g. Sisymbriear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 194. — Walp. 1842. Rep. I. p. 171 (*Trophospermum*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbriear.

Tapia*) (Pison. 1648. Brasil. p. 68?) Plumier 1703. Gen. p. 22. t. 21.
Adans. 1763. Fam. II. p. 407: g. Capparidum.
= Crateva Linn.

Tapina**) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 59. t. 225: nov. g. Gesnerear. (Gesnera barbata N. & M.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 11.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 654: g. Beslerieear. — Par. Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360.
Endl. 1839. Gen. n. 4161. p. 721; 1841. Ench. p. 349: g. Episciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4680. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 578.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257: g. Gesneriear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 209: g. Nematanthear.
Synon. Tapeinotes DC.

Tapinanthus Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 15: sect. Loranthi. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *f.* p. 802; 1841. Ench. p. 399. — Walp. 1843. Rep. II. p. 442.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2716: g. Psittacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791: g. Loranthacear.
Synon. Lichtensteinia Wendl.; Moquinia Spreng.

Tapinia***) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 269; 1825. Pl. homon. p. 74; 1828. Elench. I. p. 36: trib. Dermini.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *D b*: subsect. Dermini. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453 *IV b*. p. 40; 1841. Ench. p. 22. — Math. 1853. Belg. II. p. 356.
Fries 1838. Epicr. p. 317; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 306: trib. Paxilli.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 497. 1: sect. Rutheae.

Tapinia Steud. vid. *Tapiria Juss.*

Tapinocarpus Dalzell 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 345: nov. g. Aroidear., Aro aff. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 869.

Tapiria Juss. 1789. Gen. p. 372: g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 255. — Hedw. 1806. Gen. p. 336. n. 1320.
Pers. 1805. Ench. I. p. 509. n. 1133: g. Terebinthacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52.

*) Nomen americanum.
**) ταπεινός, humilis.
***) ταπεινόω, humilio.

Tapiria Juss. cont.
p. 234. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1617. Steud. 1841. Nom. II. p. 663 (*Tapinia*).
DC. 1825. Pr. II. p. 90: g. Terebinthaceis aff., minus notum.
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5177: g. Quassiear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 384. n. 1932: g. Terebinthear.
Bartl. 1830. Ord. p. 394: g. Burserear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5650.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 91: g. Connaraceis aff.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 230: g. Burseracear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5943. p. 1138; 1841. Ench. p. 652 (minus notum).
Meisn. 1837. Gen. p. 65(47): g. Zanthoxylacear.? et p. 76 (55) Spondiacear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.?
Synon. Tapirira Aubl.; Taparira Scop.; Salabertia Neck.; Joncquetia Schreb.

Tapirira*) Aublet 1775. Guian. I. p. 470. t. 188: nov. g. Decandr. Pentagyn. (T. guianensis.)
Scop. 1777. Intr. p. 323. n. 1483 (*Taparira*): g. Disciferar.
= Tapiria Juss.

Tapogomea**) Aublet 1775. Guian. I. p. 157. t. 60—63: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. violacea.) — Par. Blanco 1837. Fl. de Filipin. p. 145.
Scop. 1777. Intr. p. 120: g. Compositar.
Juss. 1789. Gen. p. 208: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 450. — Hedw. 1806. Gen. p. 144. n. 621. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 236.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Cephelidiae.
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2119 *a*: sect. Cephäelidis. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 533. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 604. — Endl. 1838. Gen. n. 3140 *b*. p. 531; 1841. Ench. p. 271.

Tapomana Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
= Omphalobium Gärtn.

Tapsia Necker vid. *Thapsia Tourn.*

Tapura Aublet 1775. Guian. I. p. 126. t. 48: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 332. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 348.
Scop. 1777. Intr. p. 181: g. Luridar.
Juss. 1789. Gen. p. 419: inter genera incertae sedis.
Pers. 1805. Ench. I. p. 39. n. 83: g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 30. 358.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 443 (Verm. bot. Schr. I. p. 234): g. Chailletear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 225. — Rchb. 1837. Hdb. p. 224.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LIX. 707. n. 848: g. Bignoneis aff.
DC. 1825. Pr. II. p. 58: g. Chailletiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3825 (et p. 124. n. 3216 inter Caprariaceas). —

Tapura Aublet cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 59. — Meisn. 1837. Gen. p. 73 (53). — Endl. 1840. Gen. n. 5759. p. 1105; 1841. Ench. p. 584; 1843. Spl. III. p. 97. — Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 41. t. 246. — Walp. 1842. Rep. I. p. 549. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 583. — Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 289. Char. emend. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 442.
Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 240: g. Didynam. Angiosperm.
Bartl. 1830. Ord. p. 102: g. Chailletiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5618.
Synon. Rohria Schreb.

Taquerinia Schultz Bip. vid. *Faquerina Cass.*

Tara Molina 1789. Chili. Ed. gall. p. 283.
Schult. 1819. Syst. V. p. XXXI. 407. n. 978: g. Pentandr. Monogyn., Humboldtiae aff.
= Coulteria HBK.

Tarachia *) Presl 1850. Epimel. bot. p. 434 (74): nov. g. Filicum. (Asplenium ruta muraria, germanicum, etc.)

Taractogenos Hassk. vid. *seq.*

Taraktogenos **) Hasskarl 1855. Retzia p. 127; 1857. Flora p. 529 (*Taractogenos*); 1858. Hort. Bogor. p. 15: nov. g. Pangiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 229.

Taralea***) Aublet 1775. Guian. II. p. 745. t. 298: nov. g. Diadelph. Decandr. (T. oppositifolia.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1084.
Scop. 1777. Intr. p. 303: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 350. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 208. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 242.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 478: sect. Diptericis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4023 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 427.
Synon. Bolducia Neck.

Taramea Rafin. vid. *Faramea Aubl.*

Taraxaceae D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: trib. 2 Cichoracear. Gen.: Leontodon, Apargia, Oporinia, Thrincia, Calliopea, Aethonia, Tolpis, Hedypnois, Rhagadiolus, Hyoseris, Zacintha, Troximon, Cynthia, Picris, Helmintia. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 139.

Taraxaconastrum Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 179: g. Cichoracear.
= Hyoseris Juss.

Taraxaconoides Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 178: g. Cichoracear.
= Virea Adans.

Taraxacum †) Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 739: g. Cichoracear. (*Dens Leonis Tourn. et Taraxaconoides Vaill.*) — Par. Juss. 1789. Gen. p. 169. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 487. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 376. —

*) Nomen caribaeum *Tapiriri.*
**) Nomen caribaeum *Tapogom.*

*) ταραχή, disordo: ob conditionem variam sori et indusii.
**) ταρακτός, turbatus; γένος, genus.
***) Nomen galibiense *Tarala.*
†) Nomen ex arabico.

Taraxacum Hall. cont.
DC. 1805. Franç. IV. p. 44; 1815. V. p. 450. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 426. — Poir. 1826. Dict. v. 41. p. 141 (*Pissenlit*). — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 220. — Math. 1853. Belg. I. p. 313.
Mönch 1794. Meth. p. 538: g. Petalostemonis.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. 46.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 437.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1370: sect. Leontodontis.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2162; 1831. Fl. exc. p. 270: g. Scorzonerear.
Less. 1832. Syn. p. 135: g. Lactucear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 145. — Endl. 1838. Gen. n. 3010. p. 499; 1841. Ench. p. 250. — Kunth 1838. Berol. I. p. 385. (legitimar.) — Meisn. 1839. Gen. p. 236 (144). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. VII. p. 430. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 493. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3700. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Walp. 1843. Rep. II. p. 694. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 811. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 99.
Koch 1837. Syn. p. 428. Ed. II. p. 491: g. Chondrillear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 268: g. Liguliflorar.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 423: g. Eulactucacear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 316: g. Crepoidear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 152: g. Compositar.
Synon. Dens-Leonis Tourn.; Leontodon Adans.; Leontodontis sp. Linn.

Taraxia „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 506: sect. Oenotherae. (Oe. breviflora.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 85.

Tarchonantheae Cassini 1828. Dict. v. 57. p. 338; 1830. v. 60. p. 586: div. Verniniear. Gen.: Tarchonanthus, Oligocarpha, Piptocarpha?, Arrhenachne, Pingraea. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. Gen. ead. et Henotogyna, Stephananthus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Tarchonanthus.
Less. 1830. Linnaea V. p. 147; 1832. Syn. p. 205: subtrib. Asteroidear. Divis. (1832): Epaltideae, *Tarchonantheae* (p. 208. Gen.: Pingraea, Brachylaena, Tarchonanthus = *Eutarchonantheae DC.*) — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 429. Divis.: Eutarchonantheae, Plucheineae. — Endl. 1838. Gen. p. 391; 1841. Ench. p. 236. Divis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). Divis. eaed. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 390. Gen.: Micropus, Evax. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. Gen. Eutarchonanthear. DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 92: subdiv. Conyzear. Gen. Eutarchonanthear. DC.

Tarchonantheae Cassini cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 44: subtrib. Asteracear. Gen. ex Endl.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: subdiv. Micropear. Gen.: Tarchonanthos.

Tarchonanthes Mönch vid. *Tarchonanthus Linn.*

Tarchonanthos Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 310: g. Corymbiferar. *Cf. Tarchonanthus Adans.*

Tarchonanthus *) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 398; 1737. Coroll. p. 13. n. 974; 1740. Syst. p. 28; 1753. Sp. II. p. 842; 1759. Syst. ed. X. p. 1206. n. 846; 1763. Sp. ed. II. p. 1179; 1764. Gen. ed. VI. p. 416. n. 940; 1767. Syst. ed. XII. p. 539: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 616; 1784. Syst. p. 740. — Reich. 1778. Gen. p. 414. n. 1020. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 547. n. 1246. — Gmel. 1791. Syst. p. 1204. — Pers. 1797. Syst. p. 780; 1807. Ench. II. p. 405. n. 1829. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1792. n. 1465; 1809. En. p. 857.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 248. n. 1025: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 517 (*Tarchonanthes*).
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 185. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 552. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 407. — Link 1822. En. II. p. 311.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.
Hill 1769. Ht. kew. p. 29: g. Tubulatar.
Scop. 1777. Intr. p. 126: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 80. n. 144: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 392. t. 166: g. Tubulosar.
Rich. An IX. Catal. pl. jard. méd. p. 89: g. Liatridear.
Cass. 1816. Bull. soc. philom. p. 128; 1828. Dict. v. 52. p. 245: g. Vernoniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 548; 1826. Syst. III. p. 456. n. 2709; 1831. Gen. II. p. 616. n. 3054: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2205.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 339; 1830. v. 60. p. 586: g. Tarchonanthear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1832. Syn. p. 208. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3596. Sect.: Tarchonanthus, Henotogyna. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 44. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
DC. 1836. Pr. V. p. 431: g. Eutarchonanthear. Sect.: Eutarchonanthus, Henotogyna. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2412. p. 391; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128).

---

*) „*Tarchon*, nomen Artemisiae Dracunculi" Avicenna ex Vent.

Tarchonanthus Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor. (Elichryso affinis Pluk. t. 174.)
= Tarchonanthos Vaill.

Tardavel Adans. 1763. Fam. II. p. 145: g. Aparinium.
= Spermacoce Linn.?

Tarenna*) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 139. t. 28. f. 3: nov. g. plantar. (T. zeylanica.)
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 406: g. (Rubiacear.?) dubium. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 258.
DC. 1830. Pr. IV. p. 395: g. Gardeniear., Cupaniae aff.? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 507.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 206: sect. Stylocorynae.
= Cupia DC.?

Targioneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 58: subordo Marchantiacear. Gen.: Targionia, Cyathodium.

Targionia**) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 3. t. 3: g. pl. class. I.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1136; 1759. Syst. ed. X. p. 1338. n. 1060; 1763. Sp. ed. II. p. 1603; 1764. Gen. ed. VI. p. 565. n. 1197; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 707: g. Algar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 803; 1784. Syst. p. 955. — Reich. 1778. Gen. p. 560. n. 1314. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 995.
Adans. 1763. Fam. II. p. 15: g. Hepaticar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 8. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 764. n. 1663. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 40. — Roth 1800. Germ. III. p. 423. — Batsch 1802. Tab. p. 266. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 24. — DC. 1805. Franç. II. p. 418. — Raddi 1818. Opusc. scient. Bol. II. p. 359; 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17. — Agdh. 1822. Aphor. p. 104. — Leman 1828. Dict. v. 52. p. 271. — Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 110. — Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 170.
Gled. 1764. Syst. p. 297. n. 1200: g. Muscosar. calyculatar.
Neck. 1791. Meth. musc. p. 113. 257: g. Muscor. (frondescentium.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1353. — Schwägr. 1814. Musc. hep. prodr. p. 35. (hepaticor.) — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 235. n. 3353; 1831. Gen. II. p. 739. n. 3746. (hepaticor.)
Scop. 1777. Intr. p. 358: g. Muscoidear.
Neck. 1790. El. III. p. 346. n. 1763: g. Athrosophytor.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 93: g. Ecalyptrator.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 39: g. Eccalyptrocarpor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 680: g. Targionidear. — Par. Dumort. 1831. Syll. Jung. p. 7.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: g. Fissulinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 30. n. 518: g. Hypophyllinor.

Targionia Micheli cont.
Corda 1829 in Opiz Beitr. I.; 1830 in Sturm Jungerm. p. 5; 1832. ibid. p. 73: g. Targioniacear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 77. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 70. — Endl. 1836. Gen. n. 461. p. 44; 1841. Ench. p. 26.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 40: g. Lichenastror. sphaerocephalor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 85; 1838. ibid. IV. p. XXXI. 295; 1846. Syn. Hepat. p. 574: g. Targioniear. — Par. Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 16. — Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 961. — Mont. 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 100. t. 5. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 799. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 6. — Bayrh. 1849. Taun. p. 55.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 63; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549; 1849. ibid. XII. p. 361: g. Marchantiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Targionear.
Math. 1853. Belg. II. p. 87: g. Jungermanniear.

Targioniaceae Corda 1829 in Opiz Beitr. I; 1830 in Sturm. Jungerm. p. 5: trib. Peltopteridear. (1832 ibid. p. 73 Stromatopteridear.) Gen.: Targionia, Sphaerocarpos.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. 70: fam. Jungermanniariear. Gen.: Targionia, Monoclea.
Endl. 1836. Gen. p. 44; 1841. Ench. p. 26: ordo Hepaticar. restrictus. Gen.: Targionia, Cyathodium.

Targionideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 678. 680: div. Hepaticar. Gen.: Targionia, Sphaerocarpus. — Par. Dumort. 1831. Syll. Jung. p. 7. Gen.: Targionia, Monoclea.

Targionieae Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 85: trib. Hepaticar. Gen.: Targionia. — Par. Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 961. Gen. id. et Cyathodium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 3.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 16: ordo Peltopteridear. Gen.: Targionia, Sphaerocarpus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 136: div. Homallophyllear.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXXI: subtrib. Marchantiear. Gen.: Targionia. Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 573. Accedit Cyathodium. — Bayrh. 1849. Taun. p. 55.
Rchb. 1841. Nom. p. 23: div. Ricciacear. Gen. ut Bisch. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 5.

Tariri Aublet 1775. Guian. II. Suppl. II. p. 37. t. 390: nov. g. imperfecto cognitum. (T. guianensis.)
= Picramnia Swartz? (Rchb. 1828. Consp. p. 147.)

Tarphostachys Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 566; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 206: sect. Stachytarphae.
Synon. Melasanthus Pohl.

*) [illegible]
**) [illegible]

Tarrietia*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 227: nov. g. Malpighiacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1540.
Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39): g. Banisteriear.? An potius Sapindacear. vel Acerinear.? (Meisn. Comm. p. 347.)
Endl. 1840. Gen. n. 5638. p. 1074; 1841. Ench. p. 562: g. dubium Sapindacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7610. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Blume 1850. Rumphia III. p. 194: g. Bombacear.
= Ailanthus Desf.

Tartonraira C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 358: sect. Chlamydanthi. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 65. n. 2105 *B a.*
Synon. Thymelaea All., Rchb.

Tartufa Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 592: sect. Tuberis. (T. album.)

Tasalia „Ruiz & Pav." Wittstein 1856. Etym. Handw. p. 865. Quid?

Tashia Juss. vid. *Tachia Aubl.*

Tasmania Wittst. vid. *seq.*

Tasmannia**) „R. Brown" DC. 1818. Syst. I. p. 445. 547: nov. g. Magnoliacear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 865 (*Tasmania*). — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 307. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 50.
R. Brown 1818 in DC. Syst. I. p. 548: g. Winterear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 433. n. 2145. — Meisn. 1837. Gen. p. 3 (5). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419.
DC. 1824. Pr. I. p. 78: g. Illiciear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4969. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 249. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 80. — Endl. 1839. Gen. n. 4741. p. 838; 1841. Ench. p. 428. — Walp. 1842. Rep. I. p. 72 (*Tassmannia*). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 597. n. 1921: g. Magnoliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278: g. Tasmanniear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 433: g. Winterinear.

Tasmannieae Rchb. 1837. Handb. p. 278: sect. Illiciear. Gen.: Tasmannia.

Tassadia***) Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 579: nov. g. Ditassar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.

Tassia Rich. mss.
= Tachigali Aubl.

Tassmannia Walp. vid. *Tasmannia R. Brown.*

Tattia Scopoli 1777. Introd. p. 104. n. 262: g. Strictar.
Gmel. 1791. Syst. p. 836: g. Polyandr. Trigyn.
= Napimoga Aubl.

Taurostalix Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 933: nov. g. Orchidear., Bolbophyllo aff.

Tauscheria*) „Fischer" DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 241; 1821. Syst. II. p. 563; 1824. Prodr. I. p. 210: nov. g. Isatidear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182. n. 4733; 1837. Hdb. p. 258; 1841. Nom. p. 179, n. 6895. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 200. (Ledeb. Ic. t. 139.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 223. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Endl. 1839. Gen. n. 4939. p. 881; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 213. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 92.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 856. n. 2276; 1831. Gen. II. p. 514. n. 2520: g. Synclistar.
Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 350: g. Cruciferar.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Carcerulosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 675: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Isatidar.

Tauschia**) Preisler 1828. Flora I. p. 44: nov. g. Loranthear. *Cf.* Preisl. 1828. ibid. p. 110.
= Symphysia Presl.

Tauschia Schlechtend. 1834. Linnaea IX. p. 607: nov. g. Scandicinar. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4512. p. 787; 1841. Ench. p. 380. — Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5329. — Walp. 1846. Rep. V. p. 907.
Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107): g. Scandicinear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138: g. Amminear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Tavalla Pers. 1807. Ench. II. p. 633. n. 2288: g. Coniferar. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 351.
Agdh. 1825. Aphor. p. 212: g. Taxinar.
= Tafalla Ruiz & Pav.

Tavernaria Rchb. vid. *Taverniera DC.*

Taverniera*) DC. 1825. Prodr. II. p. 339 (Lég. mém. VII. t. 52): nov. g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 299. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (65). — Endl. 1841. Gen. n. 6617. p. 1285; 1841. Ench. p. 670. — Walp. 1843. Rep. II. p. 892. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4002 (*Tavernaria*); 1841. Nom. p. 152. n. 5959: g. Onobrychear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 593. n. 2928: g. Leguminosar. — Par. Walk.-Arn. 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 332. (Char. reform.)

Taxaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 316) 1847. Veg. kingd. p. 230: ordo Gym-

*) *Tarrietie* Javanensium.
**) Dicat. navigatori Abel Jansen Tasman.
***) Anagr. ex Ditassa.

*) Dicat. D. Tauscher, Dresdensi, peregrinatori.
**) Dicat. Ign. Frid. Tausch, prof. Prag.
***) Dicat. Jean Bapt. Tavernier, peregrinatori.

Taxaceae Lindl. cont.
nogenar. Gen. Taxinear. A. Rich. (exclusa Ephedra) et Torreya, Caryotaxus, Nageia, Cephalotaxus.
= Taxineae Rich.

Taxanthema Necker 1790. Elem. bot. I. p. 115. n. 201: nov. g. Psydomorphytor., a Statice L. disjunctum.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 426. Ed. Nees p. 282: g. Plumbaginear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 353 (*Taxanthemum*).
Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1924 *b:* sect. Statices.
= Statice Willd.

Taxanthemum Poir. vid. *praeced.*

Taxeae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 217: ordo Coniferar. Gen.: Taxus, Podocarpus, Salisburia, Thalamia, Exocarpus, Comptonia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 166: div. Taxinear. Gen. unicum: Taxus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 61. Gen.: Taxus, Torreya, Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus, Salisburia.

Taxeae Rchb. 1828. Consp. p. 79: fam. Inconspicuar. Divis.: Casuarineae, Ephedreae, Taxineae, Myriceae.

Taxicaulis C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 277: subsect. Omaliae.

Taxideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 226: fam. Monochlamydear. Gen.: Taxus.

Taxinae L. C. Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 297: sect. Coniferar. Gen.: Podocarpus, Dacrydium, Taxus, Salisburia, Ephedra. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 2. Gen.: Podocarpus, Ephedra.
Agdh. 1825. Aphor. p. 212; 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: trib. Coniferar. Gen.: Taxus, Podocarpus, Tavalla, Ginkgo; Ephedra.
Bartl. 1830. Ord. p. 95: ordo (66) Coniferar. Gen.: Taxus, Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus, Ginkgo; Ephedra.
Lindl. 1833. Nix. p. 32: ordo Gymnospermar.

Taxineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: fam. Julaciae. Gen.: Taxus, Ephedra.
A. Rich. 1826. Conif. p. 124: sect. Coniferar. Gen.: Podocarpus, Dacrydium; Phyllocladus, Taxus, Salisburia, Ephedra.
Rchb. 1828. Consp. p. 79: div. Taxear. Gen.: Taxus, Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus, Ginkgo.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: fam. Pinariear. Trib.: Podocarpeae, Phyllocladeae.
Link 1831. Hdb. II. p. 470: ordo 10 Amentacear. Gen.: Taxus.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 155: fam. Inconspicuar. Divis.: *genuinae* (gen. Taxus); Ephedreae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 165. Divis.: Ephedreae, Taxeae, Podocarpeae. — Rchb. 1841. Nom. p. 61. Divis.: Ephedreae, Gneteae, Taxeae.
Mart. 1835. Consp. p. 11: ordo 58.
Endl. 1837. Gen. p. 261: ordo (78) Coniferar. Gen. ut Rchb. 1828. (Salisburia loco Ginkgo.) Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1373) Torreya, 1841 (Ench. p. 144) Caryotaxus, Nageia, Cephalotaxus. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 27, ubi

Taxineae Dumort. cont.
Nageja ad Podocarpum reducitur. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 353 (263). Gen. ut Endl. 1837 et Torreya. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 209; 1846. Chlor. prot. p. LXXVII. Gen. foss.: Taxites, Taxoxylum, Podocarpus, Salisburia.
Koch 1837. Syn. p. 664. Ed. II. p. 764: trib. Coniferar. Gen.: Taxus. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 124. Gen. foss.: Taxites.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 279: fam. Coniferar. Trib.: Ephedreae, *verae* (gen.: Taxus, Torreya, Ginkgo, Phyllocladus). — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 181. Gen.: Taxus, Torreya, Cephalotaxus, Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus, Ginkgo.
Karsten 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 217: fam. Drupiferar.
Conf. Taxideae Gray; Taxinae Agdh.; Taxeae Spreng.; Taxaceae Lindl.

Taxineae Endl. 1847. Syn. Conif. p. 233; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 9: ordo Coniferar., exclusis Podocarpeis restrictus. Gen.: Phyllocladus, Salisburia, Cephalotaxus, Torreya, Taxus.

Taxites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 111; 1828. Prodr. p. 108; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 367: g. foss. Coniferar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1815. p. 264; 1841. Ench. p. 147.
Unger 1842 in Endl. Gen. Spl. II. p. 28. n. $1813/_1$; 1843. Chlor. prot. p. 83. t. 21 (1846. p. LXXVII); 1845. Syn. pl. foss. p. 209: g. Taxinear. foss. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 307; 1847. Spl. IV. p. 13. n. $1816/_{33}$. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 124.

Taxodineae Endl. 1847. Syn. Conif. p. 6; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 1: div. Cupressinear. Gen.: Taxodium, Glyptostrobus, Cryptomeria.

Taxodioxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 169. 190: g. foss. Cupressinear. (T. Göppertii.)

Taxodites „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 204: nov. g. Coniferitum.
Unger 1842 in Endl. Gen. Spl. II. p. 25. n. $1796/_4$; 1845. Syn. pl. foss. p. 194; 1846. Chlor. prot. p. LXXIII: g. Cupressinear. foss. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 287; 1847. Gen. Spl. IV. p. 12. n. $1816/_{16}$. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 122.
Synon. Phyllites Sternb.

Taxodium L. C. Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 298: nov. g. Cupressinar. (Cupressus disticha.) — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 4. — Agdh. 1825. Syn. p. 212. — Bartl. 1830. Ord. p. 95. — Link 1831. Hdb. II. p. 474. — Endl. 1837. Gen. p. 259. n. 1794; 1842. Spl. II. p. 25. n. 1796.
Rich. 1811. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 121: g. Galbuliferar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 351.
A. Rich. 1826. Conif. p. 143. t. 10: g. Cupressinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12. — Brongn. 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 177; 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 368. — Endl.

Taxodium L. C. Rich. cont.
1841. Ench. p. 139. n. 1794. — Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2369. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 193; 1846. Chlor. prot. p. LXXIII. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 367.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVII: g. Juniperear.
Brongn. 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 175. (Spec. foss.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 66; 1847. Spl. IV. p. 4. n. 1800: g. Taxodinear.
Synon. Schubertia Mirb.

Taxostiche DC. 1837. Prodr. VI. p. 196: sect. Helichrysi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2741 c. p. 446; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3490. 3.
Synon. Pentataxis Don.

Taxotrophis Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 77: nov. g. Artocarpear.

Taxoxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 140. 190: g. Taxinear. foss.

Taxoxylum Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 28. n. 1813/2; 1842. Chlor. prot. p. 33 (1846. p. LXXVII); 1845. Syn. pl. foss. p. 210: g. Taxinear. foss. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 308; 1847. Spl. IV. p. 13. n. 1816/34.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 125 (*Taxoxylon*): g. Coniferar. foss. (*Synon. Taxites Göpp.*)
Synon. Taxoxylon et Callitroxylon Hart.

Taxus*) Tourn. 1700. Inst. p. 589. t. 362: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 316: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 336 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 312. n. 765; 1737. Cliff. p. 464; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1040; 1759. Syst. ed. X. p. 1297. n. 1006; 1763. Sp. ed. II. p. 1472; 1764. Gen. ed. VI. p. 532. n. 1135; 1767. Syst. ed. XII. p. 661: g. Dioec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 750; 1784. Syst. p. 895. — Reich. 1778. Gen. p. 527. n. 1241. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 706. n. 1553. — Pers. 1797. Syst. p. 936. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 856. n. 1842; 1809. En. p. 1024. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 245. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 245. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 201. 302.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 146: g. Coniferar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 354. — Juss. 1789. Gen. p. 412. — Gis. 1792. Prael. p. 586. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 577. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 326. — DC. 1805. Franç. III. p. 279. — Pers. 1807. Ench. II. p. 632. n. 2287. — Mirb. 1812. Bull. soc. philom. p. 93 (char. emend.); 1815. Élém. II. p. 907. — Lois. 1822. Dict. v. 23. p. 3 (*If*). — Link 1822. En. II. p. 435. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 658. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 565. n. 2760.

*) Nomen arboris venenatae apud Veteres.

Taxus Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 145. n. 606: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 366.
Adans. 1763. Fam. II. p. 481: g. Pinuum.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 494: g. Pinetar.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 275: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1071.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 330; 1789. Phil. Bot. I. p. 186.
Neck. 1790. El. III. p. 270. n. 1664: g. Lepyrophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 65. t. 91.
Batsch 1802. Tab. p. 167: g. Sempervirentium.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 297 (sphalm. *Faxus*): g. Taxinar. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 212. — Bartl. 1830. Ord. p. 96.
Rich. 1811. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 121: g. Monocarpar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 217; 1826. Syst. III. p. 148. n. 2475: g. Taxear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 156 (genuinar.); 1841. Nom. p. 61. n. 2335.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 226: g. Taxidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: g. Taxinear. — Par. A. Rich. 1826. Conif. p. 131. t. 2. — Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1693. — Link 1831. Hdb. II. p. 470. — Koch 1837. Syn. p. 664. Ed. II. p. 764. — Endl. 1837. Gen. n. 1799. p. 261; 1841. Ench. p. 144; 1842. Spl. II. p. 27. n. 1807; 1847. Syn. Conif. p. 242; 1847. Spl. IV. p. 10. n. 1816/1. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 291. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 181. — Duch. 1849. ibid. VII. p. 19 (*If*). — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 666.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: g. Phyllocladear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 316; 1847. Veg. kd. p. 231: g. Taxacear.
Kunth 1838. Berol. II. p. 226: g. Cupressinar.
(Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 159: g. Cupressinear.

Tayloria*) Hook. 1818. Musc. exot. t. 172: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 52. p. 436. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 174. n. 3318; 1831. Gen. II. p. 731. n. 3712. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 153. (odontostomor.)
Grev. & Arn. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 470: g. Splachnoidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 230. — Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 604: g. Splachneor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Splachnear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XII. p. 434.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.

*) Dicat. Thom. Taylor, Dr. med.

Tayloria Hook. cont.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 95: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 506. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 884: g. Calyptrobryor.
Bruch & Schimp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 23. 24: g. Splachnacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 91. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 132. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 372.
Synon. Hookeria Schwägr.; Phrissotrichia Brid.: Raineria De Not.

Tayotum*) Blanco 1837. Fl. de Filipin. p. 104: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. nigrescens.)
Endl. 1841. Spl. p. 1397; 1841. Ench. p. 295: g. dubium Apocynacear. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5223. — Meisn. 1843. Comm. p. 366. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 489. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601.

Tazetta „DC." Endl. 1837. Gen. n. 1289 *h β.* p. 179; 1841. Ench. p. 103: subsect. Hermiones. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1169. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1611. *δ b.*

Tazzetta**) Schult. 1830. Syst. VII. p. 966: subsect. Hermiones.

Tazzetta Rchb. 1830. Fl. exc. p. 89: sect. Narcissi. (N. Jonquilla, Tazzetta, polyanthos, stellatus, dubius.)
= Hermione Salisb.

Tchudya Spach vid. *Tschudya DC.*

Teclea***) Raffeneau-Delile 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 90. t. 1: nov. g. Zanthoxylear. (T. nobilis.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 397.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.

Tecmarsis†) DC. 1836. Prodr. V. p. 93: nov. g. Bojeriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2240. p. 364; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3936: g. Bojerear.

Tecoma††) Juss. 1789. Gen. p. 139: nov. g. Bignoniar.
Mönch 1794. Meth. p. 464: g. Petalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 406: g. Bignonear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 318.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 471. Ed. Nees p. 327: g. Bignoniacear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 142. (verar.) — Kunth 1823. Syn. II. p. 244. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23. — Link 1829. Hdb. I. p. 503. — Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 25. Sect.: Campsis, Cyathecoma. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 436.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 834. n. 2225; 1831. Gen. II. p. 502. n. 2468: g. Bignoniear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 444. — Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3259. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 223. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 134. (restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 564. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 62.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1092: sect. Bignoniae.
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123; 1840 in Meisn. Gen. p. 300 (209); 1845. Pr. IX. p. 215: g. Catalpear. Sect. (1845): Eutecoma, Pandorea. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 757. Sect. Campsis, Cyathocoma.
Endl. 1839. Gen. n. 4114. p. 711; 1841. Ench. p. 346: g. Tecomear. Sect.: Pandorea, Eutecoma, Tecomaria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4546. Sect.: Tecomaria, Tecoma, Pandorea.
Synon. Bignonia Tourn.; Campsis Lour.; Incarvillea Spreng.

Tecomaria Endl. 1839. Gen. n. 4114 *c.* p. 711; 1841. Ench. p. 346: sect. Tecomae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4546. 1.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 137: g. Bignoniear.
Fenzl 1841. Regensb. Denkschr. III. p. 226.
Meisn. 1843. Comm. p. 367: g. Catalpear.
= Eutecomae DC. pars.

Tecomeae Endl. 1839. Gen. p. 711: trib. Bignoniear. Gen.: Catalpa, Tecoma, Jacaranda, Zeyheria, Chilopsis, Spathodea. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1406) Rhigozum, Catophractes, Pajanelia, Heterophragma et 1841 (Ench. p. 346) Ceratotecoma, Pteropodium, Tabebouia, Stereospermum, Sparattosperma.
Rchb. 1841. Nom. p. 117: sect. Bignoniear. plagiospermar. Gen. ut Endl.

Teconia Walp. vid. *Feronia Corr.*

Tecophila Walp. vid. *seq.*

Tecophilaea*) „Bertero mss." Colla .... Mem. Torin. XXXIX. p. 19. t. 55. *Cf.* Meisn. 1842. Comm. p. 294.
Herb. 1837. Amaryll. p. 69. 125 (*Tecophilea*): g. Agavear.?
Endl. 1841. Spl. I. n. 1248/1. p. 1360; 1841. Ench. p. 98: g. Irideis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 637 (*Tecophila*): g. Alliaceis aff.
Synon. Phyganthus Pöpp.; Pöppigia Kunze.

Tecophilea Herb. vid. *praeced.*

Tectaria Cavan. .... Prael. n. 621.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 113: g. Aspidiacear. (Aspidium coriaceum Sw.)
= Polystichum Roth.

Tectigrania Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69: ordo Putresciniae. Fam.: Sphaerieae, Sclerotaceae, Tuberaceae, Geoperdineae, Intestineae, Trichosporeae, Spumideae, Dichenticteae, Mucoreae, Carpoboleae

*) *Tayoto* nomen vernaculum.
**) Diminutivum vocis Italae: *tazza*, i. e. cupula.
***) Nomen a Tecla Haimanout, antiquo [illegible] Abyssinorum.
†) *τέκμαρσις*, conjectura: ex floribus ignotis.
††) *Tecomaxochitl* Mexicanorum.

*) Dicat. Tecophilae, botanici Colla filiae.

Tectona*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 20. n. 1371 (*Tektona*): g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 199. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 141. n. 356. — Lour. 1790. Coch. I. p. 137. — Gmel. 1791. Syst. p. 336. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 10. t. 6; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 346; ed. 1832. I. p. 600. — Pers. 1797. Syst. p. 205; 1805. Ench. I. p. 238. n. 531. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1088. n. 402.
Thunb. 1784. Nov. gen. IV. p. 71: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 75.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 274. t. 57. f. 6 (grandis).
Neck. 1790. El. II. p. 63. n. 713: g. Arcythophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Hedw. 1806. Gen. p. 113. n. 503: g. Verbenacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIX. 440. n. 764. — Link 1821. En. I. p. 174. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 820.
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2927: g. Verbenear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Viticear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 233. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 629.
Meisn. 1840. Gen. p. 291 (200): g. Lantanear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 312. n. 3703.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 900: g. Euviticear.
Synon. Theka Rheede; Jatus Rumph.; Tectonia Spreng.

Tectonia Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 893: g. Verbenear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 643. n. 704; 1830. Gen. I. p. 134. n. 669: g. Viticear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 448. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 627. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4204.
Endl. 1838. Gen. p. 636. n. 3703: g. Lantanear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 98.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
= Tectona (Linn. f.) Thunb.

Teedia**) Rudolphi 1799 in Schrad. Journ. II. p. 289: nov. g. ex typo Caprariae lucidae Ait.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 176: g. Petalostemonis.
Pers. 1807. Ench. II. p. 166. n. 1488: g. Antirrhinear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 619: g. Caprifolior.
Link 1822. En. II. p. 141: g. Personatar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 843. n. 2248; 1831. Gen. II. p. 507. n. 2491. (baccatar.) — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 450.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3203: g. Caprariacear.
Link 1829. Hdb. I. p. 506: g. Halleriacear.

Teedia Rudolphi cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Digitalidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 172: g. Buddlejear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5: g. Teediear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 616.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 54: g. Gratiolear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 119. n. 4629. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3919. p. 678; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 509. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 59. — Walp. 1845. Rep. III. p. 263. 962.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 334; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.
Synon. Borkhausenia Roth.

Teedieae Benth. 1836. Scroph. rev. p. 5: trib. Scrophularinear. Gen.: Leucocarpus, Teedia; Hemiphragma. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 616. Gen.: Teedia, Freylinia.

Teesdalia*) R. Brown 1812 in Aiton h. kew. ed. sec. IV. p. 83 (Verm. bot. Schr. V. p. 18): nov. g. Cruciferar. (Iberis nudicaulis L.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 692.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 720; 1825. Syst. II. p. 865. n. 2287; 1831. Gen. II. p. 519. n. 2531: g. Siliculosar. — Par. Gaud. 1829. Helv. IV. p. 188. 231. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 659.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 391; 1824. Pr. I. p. 178: g. Thlaspidear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 193. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 658; 1841. Nom. p. 179. n. 6920. (genuinar.) — Koch 1836. Syn. p. 69. Ed. II. p. 75. — Kunth 1838. Berol. I. p. 49. — Endl. 1839. Gen. n. 4886. p. 870; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 165. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 91.
Link 1822. En. II. p. 155: g. Tetradynam. Siliculos.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182. n. 4743: g. Thlaspidiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Biscutellear.
Link 1831. Hdb. II. p. 290: g. Lepidinear.
Meisn. 1837. Gen. p. 12 (11): g. Iberidear. Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 259. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 141.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 283: g. Angustiseptar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.
Synon. Iberis Dill.; Guepinia Bast.

Teganium**) Schmid. 1747. Anal. pl. p. 67. t. 18.
= Nolana Linn.

Tegneria Lilja 1839. Fl. p. 76.
= Cistanthe Spach.

Tegularia***) Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 3: nov. g. Filicum. (*Ceramium Reinw.* mss.)
= Didymochlaena Desv.

*) *tekka* s. *theka* Malabarensium.
**) Dicat. J. G. Teede.

*) Dicat. R. Teesdal, botanico anglico.
**) τήγανον, catinus.
***) Nomen propter tegulariam indusii figuram.

Teichmeyera Wittst. vid. *seq.*

Teichmeyeria Scopoli 1777. Introd. p. 267. n. 1212: nov. g. Polyandr. (*Japarandiba Marcgr.*) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 867 (*Teichmeyera*).
= Gustavia Linn.

Teichostemma Steud. vid. *Trichostemma R. Brown.*

Tekel „Feuill. t. 4" Adans. 1763. Fam. II. p. 497: g. Iridum.
= Aristea Sol. (Juss. ex Mass. in Dict. v. 3. p. 109.)

Tekelia Scopoli 1777. Introd. p. 88: g. Liliacear.
= praeced.

Tektona Linn. f. vid. *Tectona.*

Telaedema Schousb. mss.
= Gelidium Lamx.

Telamonia *) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 210; 1828. Elench. I. p. 27: trib. Cortinariae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 69: subsect. Cortinarii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *F d.* — Endl. 1836. Gen. n. 453 *V d.* p. 41; 1841. Ench. p. 22. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 490. — Math. 1853. Belg. II. p. 361.
Fries 1838. Epicr. p. 291; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 303: sect. Cortinarii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 498. 2. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.

Telanthera **) R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 477 not. (Verm. bot. Schr. I. p. 318): nov. g. Amaranthacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 362: g. Gomphrenear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1049.
Synon. Teleianthera Endl.

Telebolus Lühnem., Agdh. vid. *Thelebolus Tode.*

Teleiandra ***) Nees 1833. Linnaea VIII. p. 46: nov. g. Laurinar. (T. glauca.)
Nees 1833. Prodr. p. 15; 1836. Laurin. p. 355: g. Oreodaphnear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2048. p. 320; 1841. Ench. p. 197. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1349. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 472. — Meisn. 1841. Gen. p. 326 (238). — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2662.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

Teleianthera Endl. 1837. Gen. n. 1957. p. 301; 1841. Ench. p. 185: g. Gomphrenear. Sect.: Bucholzia, Brandesia, Mogiphanes. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230). Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6424. Sect. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
= Telanthera R. Brown.

Teleiocarpus F. Müll. 1857. Papers roy. soc. Tasman. (Bot. Zeit. 1859. p. 56): sect. Didisci.

Telekia †) Baumgarten 1816. En stirp. Transylv. III. p. 149: nov. g. ex typo Buphthalmi cordifolii W. & K. *Cf.* Cass. 1828. Dict. v. 52. p. 516.

*) *τελαμών*, fascia.
**) *τέλος*, terminus, finis. (?)
***) *τέλειος*, perfectus, completus.
†) Dicat. comiti Teleki de Szek, Hungaro.

Telekia Baumgarten cont.
Spreng. 1818. Anl. II. p. 563: g. Radiatar. dubium.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1531; 1831. Fl. exc. p. 236: sect. Buphthalmi.
Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2472: g. Inulear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Koch 1837. Syn. p. 357. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 222. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 193.
Less. 1832. Syn. p. 209: g. Buphthalmear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 485. — Endl. 1838. Gen. n. 2440. p. 396; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 193 (129). — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3380. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 43. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 391. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 511. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955 (sphalm. *Ulek*): g. Eudontospermear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 441: g. Asteroidear.
Synon. Molpadia Cass.

Teleozoma R. Brown 1823 in Frankl. journ. App. p. 767 (Verm. bot. Schr. I. p. 549): nov. g. pro Pteride thalictroide Sw. propositum.
= Ceratopteris Brongn.

Telephiaceae Link 1831. Handb. II. p. 45: ordo 12 Perigynar. Gen.: Telephium, Corrigiola.

Telephiastrum Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 376. t. 281. f. 363.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 100. (Portulaca Anacampseros L.)
Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 296: subg. Anacampserotis. — Simil. Endl. 1839. Gen. n. 5176 *b.* p. 950; 1841. Ench. p. 501. — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6354. 2.

Telephieae Bartl. 1825. Beitr. II. p. 157; 1830. Ord. p. 302: div. Paronychiear. Gen.: Corrigiola, Telephium et 1830 Limeum.
DC. 1828. Pr. III. p. 366: trib. Paronychiear. Gen.: Telephium, Corrigiola. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 85. Gen. ead. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. Gen. ead. et Limeum. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96). Gen. ut DC. et Polpoda, Polychroa? — Endl. 1839. Gen. p. 959; 1841. Ench. p. 504. Gen. unicum: Telephium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 105. Gen. ut DC. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 492. Gen.: Telephium.
Rchb. 1828. Consp. p. 163; 1832. Fl. exc. p. 574; 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 163: subdiv. Portulacear. Gen. ut DC.
Kunth 1838. Berol. I. p. 141. div. Illecebrear. Gen.: Corrigiola.

Telephioides Tourn. 1700. Coroll. p. 50. t. 485: g. pl. class. VI.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 310: g. Stylostemonis.
Endl. 1840. Gen. n. 5841 *a.* p. 1119; 1841. Ench. p. 588: sect. Andrachnes.
Synon. Eraclissa et Limeum Forsk.

Telephioides Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 21. n. 4622 *b*: sect. Sedi. Subsect.: Anacampseros, Sedum.

Telephium*) Tourn. 1700. Inst. p. 248. t. 128: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 60. n. 172; 1737. Cliff. p. 73: g. Pentandr. Monogyn.
Linn. 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 129. n. 298; 1748. Ups. p. 70; 1753. Sp. I. p. 271; 1759. Syst. ed. X. p. 965. n. 339; 1762. Sp. ed. II. p. 388; 1764. Gen. ed. VI. p. 149. n. 377; 1767. Syst. ed. XII. p. 220. n. 374: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 245; 1784. Syst. p. 297. — Reich. 1778. Gen. p. 152. n. 408. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 201. n. 515. — Gmel. 1791. Syst. p. 504. — Pers. 1797. Syst. p. 315; 1805. Ench. I. p. 329. n. 737. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1506. n. 577; 1809. En. p. 330. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 49. Ed. Schrank 1819. p. 53. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 25. 450.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 39. n. 156: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 231.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: g. Perforatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 271: g. Spergular.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Hill 1769. Ht. kew. p. 201: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 330: g. Caryophyllear.
Juss. 1789. Gen. p. 313: g. Portulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 261. — Batsch 1802. Tab. p. 36. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 140. — DC. 1805. Franç. IV. p. 400. — Hedw. 1806. Gen. p. 209. n. 861. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 898 (*Thelephium*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 841; 1825. Syst. II. p. 942. n. 1119. — Link 1821. En. I. p. 291. — Lois. 1828. Dict. v. 52. p. 521; 1828. v. 53. p. 441 (*Théléphe*).
Neck. 1790. El. p. 158. n. 855: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 221. t. 129.
Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 390: g. Paronychieis aff.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIV. 682: g. Paronychiear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 232. n. 1223. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1009.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 157; 1830. Ord. p. 302: g. Telephiear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 366. — Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4301; 1832. Fl. exc. p. 574; 1837. Hdb. p. 237; 1841. Nom. p. 163. n. 6336. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 85. — Koch 1836. Syn. p. 253. Ed. II. p. 279. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96). — Endl. 1839. Gen. n. 5209. p. 960; 1841. Ench. p. 504. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 105. — Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 164. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 608.

*) Nomen ex Plinio. (Telephos rex Mysiae.)

Telephium Tourn. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Corrigiolacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49.
Link 1831. Hdb. II. p. 45: g. Telephiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Telephium Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 539: sect. Sedi. (S. Telephium L.) — Par. Koch 1836. Syn. p. 257. Ed. II. p. 283. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 329. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 617.
= Anacampseros Tourn.
Telephora Leman, Math., Bonord. vid. *Thelephora*.
Telfairia*) Hook. 1827. Bot. Mag. t. 2751. 2752; 1831. Bot. Miscell. II. p. 154. t. 81. 82: nov. g. Cucurbitacear. (T. pedata.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 83. (De nomine.)
Meisn. 1838. Gen. p. 127 (92): g. Cucurbitear.
Endl. 1839. Gen. n. 5123. p. 935; 1841. Ench. p. 491: g. Telfairiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3967. — Walp. 1846. Rep. V. p. 758. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 7. 22. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 442.
Arnott 1841. Hook. journ. bot. III. p. 273: g. Telfairiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Nhandirobear.
Synon. Joliffia Boj.; Ampelosycios Pet.-Th.
Telfairia Newman mss. ex Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 291.
= Büttneria Löfl.
Telfairiae Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 273: trib. Cucurbitacear. Gen.: Telfairia.
Telfairieae Endl. 1839. Gen. p. 935; 1841. Ench. p. 491: subordo Cucurbitacear. Gen. unicum: Telfairia. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 5. 7. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 101: sect. Cucurbitear. Gen. id.
Telina**) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 67: nov. g. Genistear. (Ononis heterophylla Thunb.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60). — Walp. 1842. Rep. I. p. 623.
Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 599: sect. Lotononidis.
= Krebsia Eckl. & Zeyh.
Telinaria Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 479: novum nomen pro *Teline Med.* propositum.
Teline Medic. 1786. Vorles. II. p. 342; 1789. Phil. Bot. I. p. 203: nov. g. ex typo Genistae candicantis L.
Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 150: subg. Genistae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 502. — Simil. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 357.
Webb 1846. Canar. II. p. 34: g. Genistear. emend.
Synon. Telinaria Presl; Peyssonelia Boiv.

*) Dicat. Ch. Telfair, botanico hibernico.
**) Nomen antiquum, Cytisi synonymon apud Dioscoridem.

Teliostachya Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 71; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 262: nov. g. Barleriear. *Cf.* D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 443.

Telipogon*) HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 335. t. 75: nov. g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 326. — Bartl. 1830. Ord. p. 58 (*Thelypogon*).

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 291 (*Telopogon*): g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 214: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1496; 1841. Nom. p. 54. n. 2077. — Endl. 1837. Gen. n. 1471. p. 204; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 742. n. 3031 (*Thelypogon*); 1831. Gen. II. p. 674. n. 3404: g. Orchidear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 526.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.

Tellima**) R. Brown 1823 in Frankl. journ. p. 766 (Verm. bot. Schr. I. p. 545): nov. g. pro Mitella grandiflora Pursh indicatum.

Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4202: g. Saxifragear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 49. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 239. t. 78 A. (verar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 228. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 63. — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100). — Endl. 1839. Gen. n. 4642. p. 816; 1841. Spl. I. p. 1416; 1841. Ench. p. 409. Sect.: Amilleta, Alletima et 1841 Lithophragmella. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108. — Walp. 1843. Rep. II. p. 371. Sect. eaed. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 228.

Bartl. 1830. Ord. p. 312: g. Heucherear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 157. n. 6143: g. Mitellear. Sect.: Tellima, Lithophragma, Lithophragmella.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.

Tellima Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 583: g. restrict. Saxifragear. (Mitella grandiflora Pursh.)

Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6143. 1: sect. Tellimae.

= Amilleta Endl.

Telmatophace***) Schleiden 1839. Linnaea XIII. p. 391: nov. g. Lemnacear. (Lemna gibba L.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1668/_2$. p. 1369; 1841. Ench. p. 126. — Kunth 1841. Enum. III. p. 6. — Meisn. 1842. Gen. p. 363 (271). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 30. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 17.

Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1127: g. Lemnear. — Par. Webb 1850. Canar. III. p. 297.

*) τέλος, extremum; πώγων, barba.
**) Anagramma nominis Mitella.
***) Φακός, ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων: Diosc.; φακός, lens; τέλμα, palus.

Telmatophace Schleiden cont.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 125: g. Pistiacear. Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 327: sect. Lemnae.

Synon. Lenticula Mich.

Telmatophila Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 24; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Scheuchzeria palustris L.)

Telmissa*) Fenzl 1842. Pugill. pl. nov. Syr. I. p. 15; 1843. Russegg. Reise I. p. 948. t. 17.

Meisn. 1843. Comm. p. 357: g. Sedear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 84. n. $4608/_1$: g. Eucrassulear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 791.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346: g. Crassulear.

Telogyne Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 327: nov. g. Jatrophidear. (T. indica.)

Telopea Solander mss.

= Aleurites Forst.

Telopea**) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 197 (Verm. bot. Schr. II. p. 305); 1810. Prodr. I. p. 388. Ed. Nees p. 244; 1830. Suppl. I. p. 32 (Verm. bot. Schr. V. p. 108): nov. g. Proteacear. (Embothrium speciosissimum Sm., etc.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 27. 432. n. 557. — Link 1821. En. I. p. 119. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 569. — Bartl. 1830. Ord. p. 118.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 338: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 237. — Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1767; 1841. Nom. p. 64. n. 2406. — Endl. 1838. Gen. n. 2154. p. 342; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 88. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 446.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Banksiear.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 426: g. Grevillear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 121. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565.

Meisn. 1841. Gen. p. 333 (245): g. Rhopalear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.

Synon. Hylogyne Knight & Salisb.; Embothrii sp. Sm.

Telopogon „Mutis" Spreng. vid. *Telipogon HBK.*

Telopogon Dietr. vid. *Thelepogon Roth.*

Telostachys Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 326: sect. Cyathulae.

Teloxis Rchb., A. Juss. vid. *seq.*

Teloxys**) Moquin-Tand. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 289. t. 10: nov. g. Chenopodear. (Chenopodium aristatum.)

Endl. 1837. Gen. n. 1933. p. 296; 1841. Ench. p. 181: g. Kochiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 238 (*Teloxis*). — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).

Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 16: g. Anserinear. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315 (*Teloxis*).

Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6387: g. Betear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII.

*) τελμίς, limus.
**) τηλωπός, qui e longinquo cernitur.
***) τέλος, demum, tandem; ὀξύς, acutus.

Teloxys Moquin.-Tand. cont. 2. p. 59. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 692.
Brongn. 1843. En. genr. p. 102: g. Cyclolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Synon. Botrydium Spach.

Tema Adans. 1763. Fam. II. p. 496: g. Poarum.
= Panici Linn. pars?

Temachina Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 115: div. Hygrophytozoor. Gen.: Rhabdium, Temachium, Melosira, Desmidium, Diatoma, Achnanthes.

Temachium*) Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 116: g. Temachinor.
= Fragilaria Lyngb.

Temminckia Vriese 1850. Nederl. kruidk. Arch. p. 141: nov. g. Goodenoviear. (Scaevolae sp.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1057: g. Goodeniacear.
Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 7: g. Scaevolear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 370.

Temnocydia**) „Martius" Endl. 1841. Ench. p. 346. n. 4124 *a α*: subsect. Eubignoniae.

Tempeltonia Steud. vid. *seq.*

Templetonia***) R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 269 (Verm. bot. Schr. II. p. 478): nov. g. Leguminosar. (Rafnia retusa Vent.) — Par. Link 1822. En. II. p. 227. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 235. n. 2545; 1831. Gen. II. p. 580. n. 2846.
Bronn 1822. Diss. p. 132 (*Templettonia*): g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 118. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4051; 1841. Nom. p. 51. n. 5901. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 129. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 190. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59); 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 88. — Endl. 1840. Gen. n. 6457. p. 1260; 1841. Ench. p. 667. — Steud. 1841. Nom. II. p. 665 (*Tempeltonia*). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Hovear.

Templettonia Bronn vid. *praeced.*

Tempskia Brongn. vid. *seq.*

Tempskya†) Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 81. t. 58: nov. g. Phthoropteridum. (T. pulchra, etc.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 86 (*Tempskia*): g. Rachiopteridear.

Temstromia Dumort. vid. *Ternstromia Juss.*

Temus††) Molina 1782. Saggio p. 178: nov. g. plant.
Juss. 1789. Gen. p. 435: g. incertae sedis.
Gmel. 1791. Syst. p. 831: g. Polyandr. Digyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 376. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 2 (*Temo*).
DC. 1824. Pr. I. p. 77: g. Illiciear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4967. — Bartl. 1830. Ord. p. 249. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 79.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 610. n. 1974; 1830. Gen. I. p. 444. n. 2199: g. Magnoliear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 271.
Meisn. 1837. Gen. p. 3 (5): g. Winterear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7299. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419. (?)
Endl. 1839. Gen. n. 1745. p. 839; 1841. Ench. p. 428: g. Magnoliacear. dubium.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 433: g. Winterinear.

Tenageia Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 63; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Juncus Tenageia.)

Tenagocharis*) Hochstett. 1841. Flora p. 369: nov. g. Butomacear. *Cf.* A. Braun 1843. Flora p. 784.
Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273): g. Butomear.
= Butomopsis Kunth.

Tenaris**) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 198: nov. g. Asclepiadear. verar.
Endl. 1838. Gen. n. 3504. p. 596; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5043.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 606: g. Pergulariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Stapeliar.

Tendaridea Bory 1822. Dict. class. I. p. 495: nov. g. Conjugatar. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 40.
Math. 1853. Belg. II. p. 506 (*Tentaridea*): sect. Zygnemae.
Conf. Tyndaridea Auct.

Tenorea Rafin. 1814. Spech. I. p. 193.
= Zanthoxylum HBK. (DC. Pr. I. p. 726.)

Tenorea***) Colla & Bertero 1824. Hort. Ripul. p. 137: nov. g. ex typo Perdicii radialis W. *Cf.* Linnaea IV. Litt. p. 53.
= Prionanthes Schrank.

Tenorea Gasparr. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 342; 1845. Ricerche p. 81: nov. g. a Ficu separatum. (F. stipulata Auct.)
= Rhizocladus Endl.

Tenoria Spreng. 1813. Prodr. Umbell. p. 27: nov. g. Umbelliferar. — Par. Hoffm. 1814. Umb. p. 115.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 631: g. Bupleurear.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXIV. 375: g. Bupleurinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3740 *e*: sect. Bupleuri.
= Bupleuri Tourn. pars.

---

*) τεμάχιον, frustulum.
**) τέμνω, seco, findo.
***) Dicat. John Templeton, Belfast.
†) Dicat. inventori Frid. Tempsky.
††) Nomen vernaculum.

*) τέναγος, stagnum.
**) τείνω, tendo, distendo: propter corollae lacinias rectas distensas.
***) Dicat. Mich. Tenore, prof. Neapolit.

Tenoria Denh. & Giord. 1829. Hort. Camald. ed. II. p. 24.
= Asteracantha Nees.

Tentaridea Math. vid. *Tendaridea Bory.*

Tepalanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 53: subdiv. Exoxylar. Class.: Torotepalae, Calytepalae, Gynotepalae.

Tepesia*) Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 72. t. 192. f. 6 (dubia. — E coll. L'Herit. sub nomine Petesiae.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 438: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 538. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Endl. 1838. Gen. n. 3223. p. 545; 1841. Ench. p. 273. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2920.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.

Tephis Adans. 1763. Fam. II. p. 276: g. Persicariar.
Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 84: sect. Polygoni.

Tephranthus**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 235. n. 980: g. Eredophytor. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 864 (*Taphranthus*).
= Meborea Aubl.

Tephrodes DC. 1836. Prodr. V. p. 24: sect. Vernoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2204 *g.* p. 358; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3868. 7. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 11.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Verniear. verar.
Synon. Isomeria Don.

Tephroseris***) Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1498; 1831. Fl. exc. p. 241: sect. Cinerariae. (C. sudetica, crispa, spathulaefolia, longifolia, campestris, etc.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 359 (*Tephroserides*): sect. Senecionis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2811 *Ii.* p. 459; 1841. Ench. p. 244.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3366; 1844. Fl. sax. p. 146: g. Senecionear. genuinar. Sect.: Tephroseris, Heloseris, Pericallis.
Griseb. & Schenk 1852. Arch. f. Naturg. I. p. 342: g. Synantherear. (*Synon. Cineraria Koch.*)

Tephrosia Pers. 1807. Ench. II. p. 328. n. 1742: nov. g. Diadelph. Decandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 119.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 749: g. Sparticar.
Link 1822. En. II. p. 251: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 232. n. 2544; 1831. Gen. II. p. 580. n. 2845. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 105. — Hook. f. 1849. Niger Fl. p. 296.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 248. Sect.: Mundulea, Brissonia, Craccoides, Reineria. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3892; 1841. Nom. p. 148. n. 5728. Sect. eaed. (1841: Tephrosia, Craccaea, Brissonia, Mundulea.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 228. Sect. ut DC. (Mundulia). — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 209. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 250. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 108. — Meisn. 1837. Gen. p. 89 (63). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 295. — Endl. 1840. Gen. n. 6539. p. 1272; 1841. Ench. p. 669. Sect. ut DC. — Walp. 1842. Rep. I. p. 673; 1843. II. p. 857. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 417. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 292. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 489.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 458: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 108.
Link 1831. Hdb. II. p. 197: g. Galegoidear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 456: g. Lotear. Sect. ut DC.
Synon. Cracca Linn.; Colinil Adans.; Needhamia Scop.

Tephrosioides Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 46: sect. Argyrolobii. (Cytisus arabicus Decne.)

Tepion Adans. 1763. Fam. II. p. 131: g. Bidentum.
= Verbesina Less.

Tepualia*) Griseb. 1856. Abh. Gött. Ges. VI. p. 119: nov. g. Myrtacear. (Metrosideros stipularis D. Hook.)
Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 465: g. Euleptospermear.
Berg 1857. Bot. Zeit. p. 860: g. Leptospermear.

Teramnus**) P. Browne 1756. Jamaic. p. 290: nov. g. Diadelph. Decandr. — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 7. 105; 1806. Fl. Ind. occ. III. p. 1238. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 489. n. 1171. — Gmel. 1791. Syst. p. 1094 (*Tetramnus*). — Willd. 1800. Sp. III. p. 971. n. 1341. — Pers. 1807. Ench. II. p. 296. n. 1702.
Gis. 1792. Pracl. p. 415: g. Papilionacear.
Cram. 1803. Disp. p. 154 in Monadelph. Pentandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 750: g. Sparticar.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 382. — Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3929. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 343. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. — Meisn. 1837. Gen. p. 92 (66).
Spreng. 1826. Syst. III. p. 235. n. 2546; 1831. Gen. II. p. 581. n. 2848: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 110.
= Glycine Wight & Arn.? (Endl.)

Terana Adans. 1763. Fam. II. p. 5: g. Fungor.
Endl. 1836. Gen. n. 437 *b.* p. 38; 1841. Ench. p. 21: sect. Thelephorae.

---

*) Anagramma nominis Petesia.
**) τεφρός, cinereus.
***) τέφρα, cinis.

*) *Tepual* Chilensium.
**) Origo vocis forte ex *Ατεραμνος* Plinii, s. planta inter Legumina crescens et suffocans. (Swartz.)

Terebintaceae Juss. 1789. Gen. p. 368: ordo 12 class. XIV. Gen. §. 1: Cassuvium, Anacardium, Mangifera, Connarus, Rhus, Rourea. §. 2: Cneorum, Rumphia, Comocladia, Canarium, Icica, Amyris, Toddalia, Schinus, Spathelia, Terebinthus, Bursera, Toluifera, Tapiria, Poupartia, Spondias. §. 3: Simaba, Aylantus, Brucea. §. 4. *Affinia:* Cnestis, Fagara, Zanthoxylum, Ptelea; Dodonaea, Averrhoa, Juglans. (*Cf.* Cassel 1810. Nat. Fam. p. 132 et Juss. 1828. Dict. v. 53. p. 120.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 438. Gen. ead. omissis pluribus.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 248. t. 106. Gen. ut Juss. Accednnt in §. 2: Picramnia, Triceros, Hedwigia, in §. 3: Gonus, in §. 4: Thysanus, Ochroxylum.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae. Gen.: Rhus, Pistacia.

Terebinthaceae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 613: fam. (73) Dicotyledonum. Gen.: Rhus, Cneorum, Pistacia, Juglans.

R. Brown 1818 in Tuck. Cong. App. V. p. 430. (Verm. bot. Schr. I. p. 197.) Sejunguntur Cassuviae, Amyrideae, Connaraceae.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 650: fam. 63 plant. Gen.: Pistacia, Schinus, Lardizabala, Spondias, Buchanania, Garuga, Canarium, Astronium, Boscia, Comocladia, Rhus, Ailanthus, Brucea, Schleichera, Connarus, Averrhoa, Xanthoxylon, Fagara, Aubertia, Cnestis; Stackhousia, Cneorum, Anacardium, Semecarpus, Mangifera, Drypetes, Brunellia, Kiggelaria, Melicytus.

DC. 1819. Théor. élém. p. 245; 1825. Pr. II. p. 61: ordo (62) Calyciflorar. Tribus (1825): Anacardieae s. Cassuvieae, Sumachineae, Spondiaceae, Burseraceae, Amyrideae, Pteleaceae, Connaraceae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 60. Trib.: Anacardieae, Sumachineae.

Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 333. (Gen. Tereb. p. 1.) Fam.: *Terebinthaceae* (gen.: Anacardium, Rhinocarpus, Mangifera, Cambessedea, Semecarpus, Rhus, Buchanania, Mauria, Pistacia, Schinus, Duvaua, Astronium, Comocladia, Sorindeia), Juglandeae, Burseraceae, Amyrideae, Pteleaceae, Connaraceae, Spondiaceae. *Cf.* A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 468.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: ordo Trihilatar. (Divis.: Amyrideae, Anacardeae, Connaraceae.)

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLV: fam. Parviflorar. Divis.: Juglandeae, Connaraceae, Amyrideae, Burseraceae, Spondiaceae, Sumachinae, Cassuvieae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. Divis.: Chailletiaceae, Connaraceae, *genuinae* (subdivis.: Amyrideae, Sumachinae, Cassuvieae). — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 488. Divis.: Juglandeae, Sumachinae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 223; 1841. Nom. p. 145. Divis.: Chailleteae, Connareae, Terebinthineae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 41: fam. Terebinthariear. Trib.: Sumachineae, Anacardieae, Amyrideae.

Terebinthaceae DC. cont.

A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 349. Nov. gen.: Suttonia.

Meisn. 1837. Gen. p. 74. 439 (53): class. XIII. Diplochlamydear. Tribus (vel ordines): Juglandeae, Amyrideae, Cassuvieae, Spondiaceae, Burseraceae, Connaraceae.

A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 372. Trib.: Anacardiae, Sumachineae, Spondiaceae, Burseraceae.

Terebintharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36: ordo Calypetalar. Fam.: Connarineae, Terebinthaceae, Balsameaceae, Chailletiaceae.

Terebinthinaceae Batsch 1802. Tab. affin. p. 66: fam. Resinariarum. Gen.: Pistacia, Juglans, Anacardium, Semecarpus, Mangifera, Connarus, Rhus, Robergia, Dodonaea, Cneorum, Rumphia, Comocladia, Canarium, Amyris, Copaifera, Schinus, Spathelia, Bursera, Toluifera, Jonquetia, Poupartia, Spondias, Zwingera, Aylanthus, Brucea, Quassia, Ochna, Cnestis, Fagara, Xanthoxylum, Xanthorrhiza, Ptelea, Fraxinus.

Terebinthinae Bartl. 1830. Ord. p. 382: class. (59) Gymnoblastor. Ordines: Ochneae, Simarubeae, Zanthoxyleae, Diosmeae, Rutaceae, Zygophylleae, Aurantiaceae, Amyrideae, Connaraceae, Cassuvieae, Juglandeae.

Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 87: ordo Choristopetalar.

Terebinthineae Spach 1834. Hist. vég. phan. II. p. 161: class. II. Dicotyledoneor. Fam. Terebinthinar. Bartl.

Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 145: div. Terebinthacear. Subdivis.: Amyrideae, Juglandeae, Sumachinae.

Endl. 1840. Gen. p. 1125; 1841. Ench. p. 595: class. (57) Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Juglandeae, Anacardiaceae, Burseraceae, (Amyrideae), Connaraceae, (Surianeae), Ochnaceae, Simarubaceae, Zanthoxyleae, Diosmeae, Rutaceae, Zygophylleae, (Meliantheae, Biebersteinieae).

Terebinthis Webb .... Phytogr. Canar. III. p. 80: subsect. Piperellae. (Micromeria Teneriffae Benth.)

Terebinthus*) Tourn. 1700. Inst. p. 579. t. 345: g. pl. class. VIII.

P. Browne 1756. Jamaic. p. 345: g. Monoec. sect. 2.

Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 150. (Pistacia Terebinthus L.)

Juss. 1789. Gen. p. 371: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 447. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 254.

Mönch 1794. Meth. p. 345: g. Thalamostemonis.

DC. 1825. Pr. II. p. 64: sect. Pistaciae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 489. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 65. — Endl. 1840. Gen. n. 5893 *a*. p. 1128; 1841. Ench. p. 598.

Terebinti B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 60 plant. Gen.: Anacardium, Avicennia, Chrysobalanus, Hirtella, Myrica, Cneorum, Ptelea, Dodonaea, Fagara, Rhus, Spondias, Schinus, Bursera, Pistacia, Zanthoxylum, Juglans.

---

*) Nomen recentius, olim τέρμινθος.

Terebraria Sessé mss.
= Laugeria Vahl.

Terfezia*) Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 350: sect. Choiromycetis. (Ch. Leonis Tul.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 437: subg. Choiromycetis.
Bail 1858. Syst. p. 48: g. Tuberaceor.
Synon. Tulasneinia Zob.

Terma Endl. 1838. Gen. n. 2847 *a*. p. 467; 1841. Ench. p. 245: sect. Echinopis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3926. 1. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 279.

Terminaleae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 718: trib. Combretacear. Gen. Terminaliear. Endl.

Terminalia Linn. 1767. Mant. p. 21. n. 1283; 1767. Syst. ed. XII. p. 674: g. Polygam. Monoec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 764; 1784. Syst. p. 910. — Reich. 1778. Gen. p. 540. n. 1261. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 728. n. 1583. — Pers. 1797. Syst. p. 951. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 52. t. 197. 198; 1819. III. p. 18. t. 224. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 967. n. 1878; 1809. En. p. 1042.
Scop. 1777. Intr. p. 101: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 76: g. Elaeagnor.
Neck. 1790. El. III. p. 118. n. 1457: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 701: g. Decandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 429.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Elaeagnear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 485. n. 1103.
Mass. 1804. Dict. v. 3. p. 391 (*Badamier*): g. Myrobalanor.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 222; 1824. Dict. v. 31. p. 459: g. Myrobalanear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 440. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. p. 132.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 178: g. Terminaliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 322. n. 1271.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 351. Ed. Nees p. 207: g. Combretacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 439. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 112. — Kunth 1824. Syn. III. p. 399. — Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 41. t. 27. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 642. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 239. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1521. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 485. — Unger 1846. Chlor. prot. p. 142. t. 48. f. 1—4. (?) — Tulasne 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 90.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 327; 1825. Syst. II. p. 358. n. 1682: g. Bucidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: g. Mirobolanear.
DC. 1828. Pr. III. p. 10: g. Terminaliear. Sect.: Catappa, Myrobolanus. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4543. Sect.: Catappa, Myrobalanus. — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 657. Sect. ut Rchb. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 312. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 298. Sect. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (79). Sect.: Terminalia, Myrobalanus, Pentaptera, Chuncoa. — Endl. 1840. Gen. n. 6076. p. 1180; 1841. Ench. p. 631. Sect. ut Rchb.. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 119. — Walp. 1843. Rep. II. p. 60. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 523. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 473. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 598. Sect. ut Rchb. et Pentaptera. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 672.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: g. Myrobolanear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 372. n. 1879: g. Combretear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718: g. Terminalear.
Synon. vide sub sectionibus.

Terminalia Lamarck Illustr. t. 848.
Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6596: g. Terminaliear.
= Catappa Gärtn.

Terminaliaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 178. t. 29: fam. pl. Gen.: Bucida, Terminalia, Chuncoa, Pamea, Tanibouca.

Terminalieae DC. 1828. Prodr. III. p. 9: trib. Combretacear. Gen.: Bucida, Agathisanthes, Terminalia, Pentaptera, Getonia, Chuncoa, Ramatuella; Conocarpus, Laguncularia, Guiera, Poivrea. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 656. Gen. ead. exclusis 3 ultimis. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 296. Gen. ead. et Anogeissus, Gyrocarpus. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78). Gen. ut DC. (exclusis Pentaptera et Chuncoa) et Lumnitzera. — Endl. 1840. Gen. p. 1180; 1841. Ench. p. 631. Gen ut DC. et Anogeissus, Lumnitzera. — Walp. 1843. Rep. II. p. 60. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 119. Gen.: Terminalia, Bucida, Conocarpus.
Rchb. 1828. Consp. p. 171: sect. Combretacear. Gen.: Ceratostachys, Poivrea, Guiera, Bobua?, Bruguiera?, Laguncularia, Conocarpus, Ramatuella, Chuncoa, Getonia, Pentaptera, Terminalia, Agathisanthes, Bucida, Coupoui?, Dirca, Lagetta, Cansjera. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 322. Gen. ut DC. et Gyrocarpus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 247: sect. Combretear. Gen. ut antea. — Par. Rchb. 1841. Nom. 171. Gen. ut Endl. et Myrobalanus.

Terminalis Medic. 1786. Theod. spec. p. 83: g. Aloarum. (Rumph. Amboin. IV. p. 81. t. 35.)
= Cordyline Comm.

Terminthia*) Bernhardi 1838. Linnaea XII. p. 134: nov. g. pro Rhois speciebus capensibus propositum.

Ternaria A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 203: sect. Mimusopis. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1042.

*) *Terfez* et *Camha* Leonis Africani.

*) *τέρμινθος* id quod *τερέβινθος*.

Ternariae Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): class. IV. plant. Ord.: Spadicinae, Glumaceae, Tripetaloideae, Palmae, Liliaceae, Gynandrae.

Ternatea *) Tourn. 1706. Mém. Ac. Paris. p. 84. t. 1: nov. g. plant. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 181.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 155. t. 10.
Adans. 1763. Fam. II. p. 325: g. Phaseolor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 225: g. Leguminosar.
= Clitoria Linn.

Ternatea HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 415: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 88.
DC. 1825. Pr. II. p. 233: sect. Clitoriae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3974 *a;* 1841. Nom. p. 149. n. 5791. 3. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 215. — Endl. 1841. Gen. n. 6635 *a.* p. 1289; 1841. Ench. p. 671.
Link 1831. Hdb. II. p. 196: g. Galegoidear.

Terniola Tulasne 1852. Arch. Mus. VI. p. 189: g. Eutristichear.
Synon. Lawia Griff., Tul.; Mniantbus Walp.; Dalzellia Wight; Tulasnea Wight.

Ternströmia **) „Mutis" Linn. f. 1781. Suppl. p. 39. n. 1397: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 487. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 347. n. 872. — Gmel. 1791. Syst. p. 797. — Pers. 1797. Syst. p. 521; 1807. Ench. II. p. 73. n. 1308. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1128. n. 1007. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 521.
Swartz 1791. Obs. bot. p. 206: g. Columniferar. (Char. emend.) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 453.
Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 99. t. 21: g. Polyadelph. Polyandr.
Cram. 1803. Disp. p. 126: in Icosandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 793: g. Aurantior.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 206. t. 463. f. 1: g. Ternströmiacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 209. — Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 376. 403. — Meisn. 1837. Gen. p. 41 (30). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 220. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 254. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 75. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 408; 1824. Pr. I. p. 523: g. Ternströmiear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 595. n. 1915; 1830. Gen. I. p. 429. n. 2130. — St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 297. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 182. — Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5420; 1837. Hdb. p. 302. — Bartl. 1830. Ord. p. 336. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 564. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 61. — Endl. 1840. Gen. n. 5409. p. 1016; 1841. Ench. p. 530. — Walp. 1846. Rep. V. p. 130. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 341.

*) Nomen ab insula moluccana Ternate.
**) Dicat. C. Ternström, Sueco, peregrinatori.

Ternströmia Mutis cont.
D. Don 1825. Nepal. p. 225: g. Theacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7915: g. Cleyerear.
Synon. Taonabo Aubl.; Dupinia Scop.; Ternstromia Juss.; Tonabea Juss.; Amphania Banks; Tonobea St. Hil.

Ternströmiaceae R. Brown 1818. Plant. Abel. p. 378; Verm. bot. Schr. I. p. 568. Gen.: Euria.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 206: ordo plant. Gen.: Ternströmia, Laplacea, Freziera et 1825 (ibid. VII. p. 220) Palava, Cochlospermum. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 209. *Cf.* A. Juss. 1824. Ann. sc. nat. II. p. 270 et 1828. Dict. v. 53. p. 185.
DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 393; 1824. Pr. I. p. 523: ordo (30) Thalamiflorar. Trib.: Ternströmieae, Freziereae, Sauraujeae et 1824: Laplaceae, Gordonieae? — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 563. Trib. ut DC. et Euryeae, Camellieae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18 (*Ternstromiaceae*); 1836. Isis p. 591: ordo Aridifoliar. (Div.: Camellieae.)
Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 370. 401: ordo ampliatus. Gen.: Cochlospermum, Ternströmia, Cleyera, Freziera, Lettsomia, Euria, Saurauja, Stewartia, Malachodendron, Laplacea, Gordonia, Camellia, Ventenatia, Bonnetia, Architaea, Mahurea, Marila, Kielmeyera, Caraipa, Thea.
Bartl. 1830. Ord. p. 335: ordo (193) Lamprophyllar. Divis.: Sauraujeae, Bonnetieae, Freziereae, Ternströmieae.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo unicus Thealium.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 58: fam. Lamprophyllear. Trib. ut Bartl. et Gordonieae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 79) 1847. Veg. kd. p. 396: ordo Guttiferalium. Gen.: Anneslea, Dicalyx?, Visnea?, Reinwardtia, Ternströmia, Sarosanthera, Adinandra, Eurya, Cleyera, Freziera, Lettsomia, Ventenatia, Microsemma? Ploiarium, Laplacea, Bonnetia, Archytaea, Ixionanthes, Kielmeyera, Catostemma, Ochthocosmus. Caraipa, Marila, Mahurea, Stuartia, Gordonia, Schima, Pyrenaria, Camellia, Thea, Godoya?, Leucoxylon?, Euryanthe?
Meisn. 1837. Gen. p. 40 (29): ordo 30 plant. (p. 439 Lamprophyllar.) Gen.: Cochlospermum, Mahurea, Marila, Caraipa, Dicalyx, Anneslea?, Reinwardta, Godoya?, Saurauja, Bonnetia, Laplacea, Pyrenaria?, Malachodendron, Stewartia, Microsemma, Polyspora, Archytaea, Ventenatia, Kielmeyera, Lettsomia, Freziera, Cleyera, Ternströmia, Eurya, Gordonia, Schima, Geeria, Camellia, Sasanqua, Thea.
Endl. 1840. Gen. p. 1017; 1841. Ench. p. 529: ordo (215) Guttiferar. Trib.: Cochlospermeae, Ternströmieae, Sauraujeae, Laplaceae, Gordonieae, Camellieae.
Brongn. 1849. Én. genr. p. 75: fam. Guttiferar. Gen.: Visnea, Ternströmia, Cleyera, Thea, Camellia, Gordonia.

Ternströmiaceae R. Brown cont.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 476: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Trib. ut Endl.

Ternströmieae Mirbel 1813. Bull. soc. philom. Déc. p. 381: fam. ab Aurantiis Juss. disjuncta. Gen.: Ternstromia, Fresiera. *Cf.* Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 442.

DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Corolliflorar.?

DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 407; 1824. Pr. I. p. 523: trib. Ternströmiacear. Gen. unicum: Ternströmia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 564. Gen. id. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 61. Gen. id. — Endl. 1840. Gen. p. 1018; 1841. Ench. p. 530. (ampliat.) Gen.: Anneslea, Dicalyx, Visnea, Ternströmia, Eurya, Cleyera, Freziera, Lettsomia. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 81) Reinwardtia, Sarosanthera, Adinandra. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 476. Gen. ut Endl. 1840.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV: div. Theacear. Gen. Ternströmiacear. DC. (exclusis Gordonieis.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 208. (1832. Fl. exc. p. 827.) Gen.: Microstemma?, Thea, Caraipa, Kielmeyera, Marila, Mahurea, Architaea, Bonnetia, Ventenatia, Camellia, Gordonia, Schima, Laplacea, Reinwardta, Malachodendron, Stewartia, Saurauja, Geeria, Lettsomia, Freziera, Cleyera, Ternströmia, Cochlospermum. — Rchb. 1837. Hdb. p. 302. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Ternströmia, Cleyera, Freziera, Letsomia, Geeria, Sauravia, Stewartia, Malachodendron), Reinwardteae, Camellieae. — Rchb. 1841. Nom. p. 208. Subdivis.: *genuinae* (sect.: Mocanereae, Cleyereae, Sauraujeae), Gordonieae, Camellieae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47 (*Ternstromieae*): trib. Camelliacear. Gen.: Ternstromia, Cleyera, Freziera, Eurya, Lettosomia, Saurauja, Cochlospermum, Malachodendron, Stuartia, Gordonia, Polyspora.

Bartl. 1830. Ord. p. 336: div. Ternströmiacear. Gen.: Ternströmia.

Ternstromeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae. Gen.: Ternstromia.

Ternstromia Juss. 1789. Gen. p. 262: g. Aurantiis et Meliis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 37.

Neck. 1790. El. II. p. 278. n. 1042: g. Catizophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.

Mirb. 1813. Bull. soc. philom. p. 381: g. Ternstromiear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 442. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47 (sph. *Temstromia*).

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: g. Ternstromear.

= Ternströmia Mutis.

Ternstromiaceae Agdh. vid. *Ternströmiaceae*.

Ternstromieae Auct. vid. *Ternströmieae*.

Terobera*) Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Cyperacear., Gahniae aff. (Nomen.)

Steud. 1855. Glum. II. p. 164: g. Rhynchosporear. (T. scirpoidea.)

Terpnanthus**) Nees & Martius 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 177. t. 31: nov. g. Fraxinellar. (F. jasminodorus.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 187.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 789. n. 868: g. Rutacear.

= Spiranthera St. Hil.

Terpnophyllum Thwaites 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 70. t. 2 C: nov. g. Garciniear. (T. zeylanicum.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 365.

Terpsinoë Ehrenb. 1843. Amer. t. 3.

Kütz. 1844. Bacill. p. 128; 1849. Sp. Alg. p. 119. n. 73: g. Tabellariear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw. Diat.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Terpsinoësear.

Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 477: g. Diatomear.

Terpsinoëseae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: trib. Amphiphractar. Gen.: Terpsinoë.

Terrana Colla, Wittst. vid. *seq.*

Terranea Colla .... Mem. Ac. Torin. XXXVIII. p. 11. t. 33. (*Terrana* ex Wittst. Etym. Handw. p. 869.)

= Euerigeron DC.

Tersonia Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 40: nov. g. Tersoniear.

Synon. Gyrandra Moq.

Tersonieae Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 40: trib. Gyromeriear. Gen.: Tersonia.

Tertianaria J. Bauh. III. t. 30. p. 435.

= Scutellaria Herm.

Tertiola Caesalp. 1583. De plant. lib. 11. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 24.)

= Stachys Linn.

Tertrea***) DC. 1830. Prodr. IV. p. 481: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 568. — Endl. 1838. Gen. n. 3168. p. 536; 1841. Ench. p. 272.

Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 458: g. Rubiacear.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2818: g. Psychotriear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Synon. Schiedea A. Rich.

Tesota A. Gray Pl. nov. Thurb. p. 313; Müll. Ann. bot. IV. p. 479: vid. *Olneya A. Gray*.

Tessarandra†) „Miers" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 617: g. Olear. (Nomen.)

*) Anagr. nominis Bertero.
**) τερπνός, delectabilis; ἄνθος, flos.
***) Dicat. J. B. Du Tertre, peregrinatori.
†) τέσσαρα, quatuor.

Tessarandra Miers cont.
Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. VII. p. 179 (Ill. South-Am. pl. II. p. 83. t. 62): nov. g. Chionanthear. (ex Grisebach Jahresber. f. 1851 p. 408 potius Salvadoracear.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 481.
Tessararthra*) Ehrenb. 1838. Infus. p. 144: animal e familia Bacillarior.
Ch. Morren 1841. Nouv. Mém. Ac. Brux. XIV. 6e Mém. p. 8. t. 7. f. A—D: g. Micrasteriear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 56: g. Desmidicar. (cum sect.: Isthmosira.)
Conf. Tessarthra Kütz.
Tessaria **) Ruiz & Pavon 1794. Prodr. p. 112. t. 24; 1798. Syst. p. 213: nov. g. Syngenes. Polygam. Necessar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 430. n. 1850: g. Syngenes. Superfl.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 561: g. Radiatar.
Cass. 1828. Dict. v. 53. p. 233: g. Vernoniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 339; 1830. v. 60. p. 586: g. Plucheinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 456. — Endl. 1838. Gen. n. 2417. p. 392; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Spach. 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2206: g. Eupatorinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Pluchear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 151: g. Tarchonanthear.
Less. 1832. Syn. p. 207: g. Epaltidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3563: g. Plucheinar.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953: g. Conyzear. legitimar.
Synon. Gynheteria Willd.; Gyneteria Spreng.; Phalacromesus Cass.? Monophalacrus Cass.?
Tessarthonia Turpin 1828. Mém. Mus. XVI. p. 316. t. 13. f. 18. (T. moniliformis.)
= Scenedesmus Meyen.
Tessarthra „Ehrenb." Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phycol. gener. p. 164: g. Desmidiear. (serius ad Scenedesmum Meyen et Isthmosiram Kütz. reductum.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 524.
= Tessararthra Ehrenb.
Tessarthronia Endl. Gen. p. 3 in synon. Scenedesmi: vid. *Tessarthonia Turp.*
Tesselina Dumort. 1822. Comm. bot. p. 78: nov. g. Phialicarpear. (Riccia pyramidata.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 70 (*Tessellina*); 1831. Syll. Jungerm. p. 7: g. Ricciacear.
= Oxymitra Bisch.
Tesselinia „Dumort." Nees Syn. Hepat. p. 596. 597 in synon. Corsiniae et Oxymitrae: vid. *praeced.*
Tessella Ehrenb. 1838. Infus. p. 204; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 217: g. Bacillarior.

*) τέσσαρα, ἄρθρον, membrum, articulatio.
**) Dicat. L. Tessari, prof. Anconensi.

Tessella Ehrenb. cont.
Kütz. 1844. Bacill. p. 125; 1845. Phyc. germ. p. 109; 1849. Sp. Alg. p. 114. n. 65: g. Striatellear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 41: g. Achnanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 524: g. Diatomear.
Tessellaria Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 109; 1846. Chlor. prot. p. LII: sect. Caulopteridis.
Tessellina Dumort. 1829: vid. *Tesselina Dumort.*
Tessiera*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 574: nov. g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 632. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119). — Endl. 1838. Gen. n. 3130. p. 529; 1841. Ench. p. 271.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 483: g. Rubiacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2779. (genuinar.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Testicularia**) Klotzsch 1832. Linnaea VII. p. 202. t. 9. f. a: nov. g. inter Angiogastres et Trichospermos medium. (T. Cyperi.) *Cf.* Berkeley 1839. Ann. nat. hist. III. Aug. p. 400.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 25; 1842. Mycol. p. 101: g. Pisocarpiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 516: g. Ustilagineor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Bonord. 1851. Hdb. p. 236: g. Nidulariaceor.?
= Arachnion Schwein.?
Testudinaria Salisb. 1824 in Burch. trav. II. p. 147: nov. g. ex typo Tami elephantipedis Ait.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1336: g. Dioscorear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 53.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: g. Dioscoridear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 708. n. 3571: g. Sarmentacear.
Herb. 1837. Amaryll. p. 67. 122: g. Agavear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 214: g. Dioscoreacear.
Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 55; 1850. Enum. V. p. 440: g. Dioscorinear.
Teta Roxb. 1832. Fl. Ind. II. p. 165: nov. g. Hexandr. Monogyn. (Asparagor.? — T. viridiflora.)
= Peliosanthes Andr.
Tetanosia***) Rich. mss.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 12. 23: g. Olacear. (Ximenia? olacioides W. & A.)
= Ximenia Plum.

*) Dicat. H. A. Tessier, scriptori.
**) Nomen ob similitudinem.
***) τετανός, extensus, laevis.

Tetena Rafin. vid. *Aedycia Rafin.*

Tethya „Lam. Hist. II." Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 361: g. Spongidiar. (Alcyonium Lyncurium L.?)

Tetilla*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 667: nov. g. Saxifragear.

A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 7; 1833 in Guillem. Arch. bot. I. p. 66: g. Francoacear. — Par. Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 12. t. 19. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 39. — Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99). — Endl. 1839. Gen. n. 4627. p. 812; 1841. Ench. p. 407. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 778. — Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6150. — Walp. 1843. Rep. II. p. 265. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 451.

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 204: g. Galacinar.

Synon. Dimorphopetalum Bert.; Anarmosa Miers; Tetraplasium Kunze.

Tetmemorus**) Ralfs 1845. Trans. Edinb. soc. II. p. 133: nov. g. Desmidiear., a Closterio separatum. — Par. Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 13.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 167: sect. Penii.

Tetracanthium***) Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 113: sect. Euastri.

Tetracarpae Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Thalamanthar. Fam. 142—147.

Tetracarpaea Hook. 1840. Ic. t. 264.

Endl. 1842. Spl. II. p. 73. n. $4758/_1$: g. Dilleniear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 339.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424: g. Dillenear.

Tetracarpum Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 240: nov. g. Petalostemonis. (Schkuhria abrotanoides Roth.)

= Schkuhria Roth.

Tetracellion Turczan. mss.

= Tetrapoma Turcz.

Tetracephala Wallroth vid. *Lichenastra Wallr.*

Tetracera†) Linn. 1737. Gen. p. 345. n. 865; 1737. Cliff. p. 214; 1740. Syst. p. 25; 1753. Sp. I. p. 533; 1759. Syst. ed. X. p. 1080. n. 604; 1762. Sp. ed. II. p. 751; 1764. Gen. ed. VI. p. 275. n. 683; 1767. Syst. ed. XII. p. 371: g. Polyandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 419; 1784. Syst. p. 504. — Reich. 1778. Gen. p. 279. n. 738. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 369. n. 930. — Gmel. 1791. Syst. p. 839. — Pers. 1797. Syst. p. 541; 1807. Ench. II. p. 84. n. 1330. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1240. n. 1064. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 645.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 124. n. 514: g. Thalamostemonum.

Adans. 1763. Fam. II. p. 249: g. Sedor.

Hill 1769. Ht. kew. p. 387: g. Hexaphyllar.

Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar.

Tetracera Linn. cont.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 336. t. 69. f. 3 (volubilis).

Juss. 1789. Gen. p. 339: g. Spiraear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 9.

Neck. 1790. El. II. p. 300. n. 1073: g. Synathrophytor.

Cram. 1803. Disp. p. 126 in Icosandr. Monogyn., p. 127 in Icosandr. Trigyn. et p. 128 in Icosandr. Tetragyn.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 190: g. Rosacear.

DC. 1818. Syst. I. p. 397: g. Delimacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 68. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 23.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 814; 1825. Syst. II. p. 629. n. 2005; 1830. Gen. I. p. 452. n. 2230: g. Dilleniear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 287.

HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 50: g. Dilleniacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 119. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 14. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 293. — Brongn. 1843. Én. gen. p. 96.

DC. 1824. Pr. I. p. 67: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4970; 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7266. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 414. — Endl. 1839. Gen. n. 4765. p. 843; 1841. Ench. p. 432. — Walp. 1846. Rep. V. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 62. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 37.

Synon. Tigarea Aubl.; Tigurea Scop.; Rhinium Schreb.; Euryandra Forst.; Euriandra Scop.; Assa Houtt.; Wahlbomia Thunb.; Serveria Neck.; Röhlingia Dennst.

Tetraceras Webb 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 135: nomen genericum pro *Tetraceratio DC.* indicatum.

Tetraceratium DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 230; 1821. Syst. II. p. 204; 1824. Prodr. I. p. 140: sect. Notoceratis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4794 *b.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 159.

= Tetracme Bunge.

Tetrachaete Klotzsch 1851. Linnaea XXV. p. 82: sect. Pernettyae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1110.

Tetracheilos Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 368: nov. g. Mimosear. (Acacia tetragonocarpa Meisn.)

Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 452: g. Acaciear.

Tetrachne Nees 1841. Gram. cap. p. 375: nov. g. Festucear. (Poa glomerata Thunb.) *Cf.* Flora 1842. Lit. p. 85.

Endl. 1842. Spl. II. p. 8. n. $876/_1$: g. Bromear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.

Steud. 1854. Glum. I. p. 299: g. Festucacear.

---

*) Vulgo ex Bertero *Tetilla* dictum.

**) *τέμνω*, [illegible]

***) *τετρα* (in compositis) quatuor.

†) Nomen ob quatuor capsulas fructus cornuum instar reflexas. (Ht. Cliff.)

Tetrachyron Schlechtend. 1847. Linnaea XIX. 6. p. 744: nov. g. Helianthear. An Heleniear.? (T. manicatum.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 416: g. Eubeleniear.

Tetracis Ehrhart olim in herb. (teste ipso Auctore in Beitr. III. p. 116 sub Georgia.)
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 118: sect. Tetraphidis.
= Tetracmis Brid.

Tetraclea A. Gray, Müll. vid. *seq.*

Tetracleis A. Gray 1853 in Sillim. journ. 2d. ser. XVI. p. 98 (Bot. Zeit. 1854. p. 38): nov. g. Verbenacear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 704 (*Tetraclea*).

Tetracme Bunge 1836. Del. sem. h. Dorp. (Linnaea 1838. Litt. p. 70); .... in Göb. Reise Kirgis. p. 236. t. 4: nov. g. Sisymbriear. (Erysimum quadricorne Steph.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4909. p. 875; 1841. Ench. p. 450; 1842. Spl. II. p. 108 (sphalm. (*Tetratome*); 1843. Spl. III. p. 87. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 193. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7027: g. Erysimear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
Synon. Tetraceratium DC.; Tetraceras Webb.

Tetracmis Brid. 1826. Bryol. I. p. 134: sect. Tetraphidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 596 *b.* — Endl. 1836. Gen. n. 497 *b.* p. 49; 1841. Ench. p. 30.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 182: sect. Georgiae. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 231.
Synon. Tetracis Ehrh.; Tetrapilis Hedw.

Tetracolium „Kunze mss." Link 1824. Spec. I. p. 125: nov. g. Hymenomycetum. (Torula Tuberculariae Nees.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 296.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Oidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 63: g. Bysseor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 185: g. Sporomycetum episporor.?
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 35: g. Torulaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 34. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495.
= Torula Pers.?

Tetracrypta Gardn. & Champion 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 314 in adnot.: nov. g. Parrotiear. (T. cinnamomoides.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 275.
Thwait. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 378: g. Hamamelidear.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 89: g. Hamamelear.
= Anisophyllea R. Brown.

Tetractinium A. Braun 1845. Alg. unicell. gen.: sect. Pediastri. (?)

Tetractinostigma Hasskarl 1857. Flora II. p. 533: nov. g. Euphorbiacear., Leiocarpo aff. (T. microcalyx.)
Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 27. 55: g. Phyllanthear.

Tetractis DC. 1824. Prodr. I. p. 16: g. Anemonear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 15. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3).
= Tetractys Spreng.

Tetractis „Blume" Endl. Gen. p. 419 et Ench. p. 239 in synon. Enhydrae: vid. *Tetraotis Reinw.*

Tetractys*) Spreng. 1822. N. Entd. III. p. 53: nov. g. Ranunculear. (T. capensis.)
Schult. 1827. Mant. III. p. 18. 349: g. Tetrandr. Tetragyn.
Synon. Tetractis DC.

Tetracyclus Ralfs .... Ann. and Mag. n. h. XII.; 1845. Trans. Edinb. soc. II. p. 13: nov. g. Diatomacear.
Kütz. 1844. Bacill. p. 127; 1849. Sp. Alg. p. 118. n. 71: g. Tabellariear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw. Diat.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Eutabellariear.

Tetradenia Benth. 1830. Bot. Regist. 15 ad calcem n. 1300; 1833. Labiat. p. 164: nov. g. Menthoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 714. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 168. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 403.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Menthear.
Endl. 1838. Gen. n. 3589. p. 612; 1841. Ench. p. 306: g. Elsholtziear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4051. — Walp. 1845. Rep. III. p. 584. 979. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 159.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Elsholtzidar.

Tetradenia Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 61; 1833. Progr. p. 19: nov. g. Daphnidior.
= Litsaea Juss.

Tetradenia Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 492: sect. Konigae.
= Ptilotrichum C. A. Meyer.

Tetradia R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. Pt. 3. p. 233: nov. g. Sterculiear. (T. Horsfieldii.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 103: g. Sterculiacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. $5319/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.

Tetradia „Petit-Thouars mss." Tulasne 1856 Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 137: nov. g. Lythrariear. (T. salicifolia.)

Tetradiclis**) Steven 1819 in Marsch.-Bieb. Fl. taur. cauc. III. suppl. p. 277. 648: nov. g. Myriophyllo aff.?
C. A. Meyer 1831. Verz. cauc. casp. Pfl. p. 226: g. „nulli familiae hucusque evulgatae adnumerandum."
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 88: g. Elatinear.? — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 248. — Meisn. 1838. Gen. p. 131 (96)?
Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95): g. Steudeliear.?
Endl. 1840. Gen. n. 6029. p. 1161; 1841. Ench. p. 614: g. Rutacear. — Par. Fenzl 1841. Linnaea XV. p. 289. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 492. — Walp. 1843. Rep. II. p. 825.
Bunge 1840. Linnaea XIV. p. 161: g. Ana-

---

*) τετρακτύς, quaternio.
**) δικλίς, porta duplex.

Tetradiclis Steven cont. tropear. *Cf.* Bunge 1842. Linnaea XVI. Litt. p. 102.
Meisn. 1843. Comm. p. 347: g. Rutear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 481: g. Elatinacear. *Synon.* Anatropa Ehrenb.

Tetradidymae Wahlenb. 1815. Nov. Act. Upsal. VII. p. 163: ordo plant., Filicibus proximus. Gen.: Equisetum?, Psilotum, Tmesipteris; Ophioglossum, Botrychium, Lycopodium; Isoëtes, Salvinia?, Pilularia?, Marsilea?
Agdh. 1822. Aphor. p. 111; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: class. Pseudocotyledonear. Ordines: Rhizocarpae, Lycopodineae, Ophioglosseae.

Tetradiospyros A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 222: sect. Diospyri.

Tetradium*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 91. Ed. Willd. p. 115: nov. g. Tetrandr. Tetragyn. (T. trichotomum.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 35. 495. n. 600.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 520: g. Rutacear.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 808.
DC. 1825. Pr. II. p. 88: g. Connaracear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3830. — Bartl. 1830. Ord. p. 395. (?) — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 228.
Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 297: g. Terebinthacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47): g. Zanthoxylacear.? et p. 76 (55) Spondiacear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5982. p. 1149; 1841. Ench. p. 609: g. Zanthoxylear. dubium.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7485: g. Xanthoxylear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.?

Tetradontium Angstr., Rabenh. vid. *Tetrodontium Schwägr.*

Tetradymia**) DC. 1837. Prodr. VI. p. 440: nov. g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2814. p. 460; 1841. Ench. p. 245; 1842. Spl. II. p. 47. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 447. Sect.: Eutetradymia, Lagothamnus. — Walp. 1843. Rep. II. p. 664. Sect. eaed.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31: g. Doronicear.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 415: g. Senecionidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3371: g. Senecionear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Tetradynamae Rchb. 1828. Consp. p. 181: fam. Crucifiorar. Divis.: Lomentaceae, Septatae, Coilocarpicae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 653. Trib.: Nucamentaceae et Lomentaceae, Septatae, Resedeae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 178. Divis.: Synclistae, Amphischistae, Acroschistae.

*) τετράδιον, quaternio: a quadruplicitate partium.
**) τετράδυμος, quatuor simul pariens.

Tetradynamia Linn. 1737 et porro in operibus systematicis: class. XV. plant. Ordines: Siliculosa, Siliquosa. — Par. omnes scriptores systema Linnaeanum sequentes.

Tetraëdron Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 129; 1849. Sp. Alg. p. 162. n. 119: nov. g. Desmidiear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.

Tetragamestus Rchb. f. 1854 in Seem. Bonplandia II. p. 21; 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 376: nov. g. Orchidear. (Scaphyglottis arundinacea H. Petrop.) — Par. Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 42. t. 19 (inter Poneram et Epidendrum).

Tetragastris Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 130. t. 109. f. 5 (ossea).
= Hedwigia Swartz.

Tetraglochin*) „Kunze mss." Pöppig 1833. Fragm. syn. p. 26: nov. g. ex typo Margyricarpi alati Gill.
Endl. 1840. Gen. n. 6376. p. 1244; 1841. Ench. p. 659: g. Sanguisorbear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 656.
Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6478: g. Poteriear.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Alchemillear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 562: g. Sanguisorbacear.

Tetragonanthos „Stell. Irc. 122 et Gmel. Ind. Irc. 351" Gmel. 1769. Fl. Sibir. IV. p. 113 in synon. Swertiae.
= Halenia Borckh.

Tetragoneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 527: subordo Tetragoniacear. Gen.: Tetragonia, Tetragonella, Aizoon, Galenia, Plinthus.

Tetragonella Miquel 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 235: nov. g. Aizoidear. (T. amplexicoma.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 53. n. 5166/1.
Walp. 1846. Rep. V. p. 783: g. Tetragoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Tetragonear.

Tetragonia**) Linn. 1737. Gen. p. 144. n. 406; 1737. Cliff. p. 188; 1748. Ups. p. 126: g. Icosandr. Tetragyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 128.
Linn. 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 249. n. 538: g. Polyandr. Tetragyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Linn. 1753. Sp. I. p. 480; 1759. Syst. ed. X. p. 1058. n. 551; 1762. Sp. ed. II. p. 687; 1764. Gen. ed. VI. p. 252. n. 627; 1767. Syst. ed. XII. p. 344: g. Icosandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 389; 1784. Syst. p. 467. — Reich. 1778. Gen. p. 257. n. 683. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 340. n. 859. — Pers. 1797. Syst. p. 501; 1807. Ench. II. p. 41. n. 1233. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1023. n. 993; 1809. En.

*) γλωχίν, acumen, angulus, arista.
**) Nomen ex Theophrasto.

Tetragonia Linn. cont.
p. 528. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 199. Ed. Schrank 1819. p. 218.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Gled. 1764. Syst. p. 279. n. 1149: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 695.
Hill 1769. Ht. kew. p. 378: g. Tetraphyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 220: g. Calycanthemar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 306. (T. expansa.) *Cf. Demidofia Medic.*
Juss. 1789. Gen. p. 317: g. Ficoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 270. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 147. — Link 1822. En. II. p. 40. — DC. 1828. Pr. III. p. 451. (genuinar.) Sect.: Tetragonoides, Tetragonocarpos. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 198. — Bartl. 1830. Ord. p. 309. — Endl. 1833. Norf. p. 72. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 151. Sect. ut DC. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 141. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 323. — Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 77.
Neck. 1790. El. II. p. 85. n. 743: g. Sarcodiphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 204. 483. t. 127. 179.
Gmel. 1791. Syst. p. 842: g. Polyandr. Pentagyn.
Batsch 1802. Tab. p. 38: g. Fimbriatar.
Cram. 1803. Disp. p. 27 in Triandr. Trigyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 844: g. Aizoidar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 526. n. 1859; 1830. Gen. I. p. 413. n. 2062: g. Aizoidear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 130.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Tetragoniacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 17.
Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 300: g. Ficoidar.
Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4407; 1832. Fl. exc. p. 586: g. Mesembryanthemear. Sect.: Tetragonioides, Tetragonocarpus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Mesembrynear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166. n. 6456: g. Tetragoniear. — Par. Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 287. — Endl. 1839. Gen. n. 5164. p. 947; 1841. Ench. p. 500. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 105. — Walp. 1843. Rep. II. p. 230. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 529. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 6.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Tetragonear.
Synon. Ludolfia Adans.; Tetragonocarpus Comm.; Demidofia Pall., Med.

Tetragoniaceae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LII: div. Aizoidear. Gen.: Adenogramma, Galenia, Nitraria, Glinus, Sesuvium, Tetragonia, Aizoon, Mesembryanthemum.
Link 1831. Hdb. II. p. 17: ordo 8 Perigynar. Gen.: Tetragonia, Aizoon.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: ordo Ficoidalium. Subord.: Tetragoneae, Sesuveae.

Tetragonieae Rchb. 1837. Handb. p. 240: sect. Ficoidear. Gen.: Tetragonia.
Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 287: trib. Portulacear. Gen. id. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 947; 1841. Ench. p. 500. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 440. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 166: subdiv. Aizoidear. Gen. id. et subsect.: Galenieae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 105: trib. Mesembryanthemear. Gen.: Theligonum, Tetragonia, Galenia, Trianthema, Sesuvium, Aizoon.

Tetragonioides Rchb. vid. *Tetragonoides DC.*

Tetragonocarpos DC. 1828. Prodr. III. p. 452: sect. Tetragoniae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 152.
Conf. seq.

Tetragonocarpus Commelyn 1703. Hort. Amstelod. II. t. 102. 103.
Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4407 *b*: sect. Tetragoniae.
= Tetragoniae Linn. pars.

Tetragonocarpus Hasskarl 1857. Flora I. p. 99: nov. g. Ceropegiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 503.

Tetragonoides DC. 1828. Prodr. III. p. 452: sect. Tetragoniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4407 *a (Tetragonioides)*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 151.

Tetragonolobus „Camer., Riv." Scopoli 1772. Fl. Carn. II. p. 87: nov. g. Diadelph. Decandr. (T. Scandalida.) — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 9. 53.
Roth 1788. Germ. I. p. 323. (Lotus maritimus et siliquosus L.)
Mönch 1794. Meth. p. 164: g. Thalamostemonis.
DC. 1805. Franç. IV. p. 553: sect. Loti. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1326.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 756: g. Diadelphistar. genuinar.
Link 1822. En. II. p. 264: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 282. n. 2583; 1831. Gen. II. p. 590. n. 2910.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Trifoliear. — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 215. — Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3875. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 199. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 230. — Koch 1836. Syn. p. 178. Ed. II. p. 198. — Meisn. 1837. Gen. p. 85(60). — Endl. 1840. Gen. n. 6515. p. 1269; 1841. Ench. p. 669. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 562. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. — Walp. 1843. Rep. II. p. 854. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 44. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 428.
Link 1831. Hdb. II. p. 176: g. Lotoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5703: g. Trigonellear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 529: g. Lotear.
Synon. Scandalida Scop.

Tetragonosperma Scheele 1849. Linnaea XXII. p. 166: nov. g. Heliopsidear., Tetragonothecae aff.

Tetragonospermae Tausch 1834. Flora I. p. 353: trib. Mericarpar. Subtrib. unica: Azorelleae.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: trib. Umbelliferar. Gen.: Azorella, Bolax, Huanaca, Bowlesia, Spananthe, Pozoa, Asteriscium, Homalocarpus, Horsfieldia, Actinanthus, Hohenackeria.

Tetragonotheca*) Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 378. t. 283. f. 365.
Linn. 1737. Gen. p. 259. n. 663; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 903; 1759. Syst. ed. X. p. 1226. n. 875; 1763. Sp. ed. II. p. 1273; 1764. Gen. ed. VI. p. 438. n. 976: g. Syngenes. Polygam. Superfl. (1767. Syst. p. 576 Polymniae injunctum.) — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2116. n. 1493. — Cram. 1803. Disp. p. 170. — Pers. 1807. Ench. II. p. 473. n. 1907. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 172.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 255. n. 1057: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.?
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.
Hill 1769. Ht. kew. p. 7: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 568; 1826. Syst. III. p. 606. n. 2831; 1831. Gen. II. p. 637. n. 3188. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 303.
Link 1822. En. II. p. 337: g. Corymbiferar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Coreopsidear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2622.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 319; 1830. v. 60. p. 576: g. Synedrellear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 552: g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2508. p. 408; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 303. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3140. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Bikera Adans.; Gonotheca Rafin.

Tetragyneia Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 184: sect. Hedyotidis. (H. rugosa.)

Tetrahit**) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 103. t. 3. 4: nov. g. plant.
Adans. 1763. Fam. II. p. 190: g. Labiatar.
Mönch 1794. Meth. p. 394: g. Petalostemonis. (Galeopsis Tetrahit et Ladanum L.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 378: sect. Galeopsidis. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 323.
= Galeopsidis Linn. pars.

Tetrahitum Link & Hoffmsg. 1809. Fl. portug. p. 66 (103?)
Presl 1826. Sicul. I. p. XXXVII: g. Labiatar.
= Olisia Benth.

Tetralepis Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 159: nov. g. Rhynchosporear. (T. australis.)

*) θήκη, loculus, capsula.
**) Nomen barbarum.

Tetralix*) Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 418: g. Dicotyledonum Diplostemonum. *Cf. Erica spuria Hall.*
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum.
Link 1829. Hdb. I. p. 613: subg. Ericae.
= Erica Tourn.

Tetralobus A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 667: nov. g. Lentibulariear.
= Polypompholyx Lehm.

Tetralyx Hill 1769. Hort. kew. p. 61: nov. g. Associatar. (Carduus eriophorus.)
= Cirsii Gärtn. sp.

Tetrameles R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 230 (Verm. bot. Schr. IV. p. 44): nov. g. Datiscear. (indicatum.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4486; 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. n. 6553. — Bartl. 1830. Ord. p. 419. — Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 79. t. 17. — Endl. 1839. Gen. n. 5015. p. 897; 1841. Ench. p. 459. — Meisn. 1841. Gen. p. 346 (256). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 293. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 726.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: g. Datiscacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 317.
Synon. Anictoclea Nimmo.

Tetrameris Naudin 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 120: nov. g. Lasiandralium. (Arthrostemmatis, Microliciae, Marcetiae et Chaetogastrae sp. DC.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 583.

Tetramerium Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 90. t. 196.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 373: g. Coffeacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 601. — Kunth 1824. Syn. III. p. 32. — Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2019.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 376: g. Rubiacear. (Char. emend.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 409. n. 402; 1830. Gen. I. p. 90. n. 446. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 307. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 456.
Schult. 1827. Mant. III. p. 6. 113: g. Tetrandr. Monogyn.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Pavettear.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 29: g. Psychotriacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 176: sect. Faramеae. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 496. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 578. — Endl. 1838. Gen. n. 3154 *b.* p. 534; 1841. Ench. p. 272. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 448. — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2804. 2.
Synon. Potima Pers.; Darluca Rafin.; Antoniana Tuss.

Tetramerium Nees 1844 in Benth. voy. Sulph. p. 147; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 467: nov. g. Dicliptercar.

Tetramicra Lindl. 1831. Orchid. gen. p. 119: nov. g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1383. p. 194; 1841. Ench. p. 110. — Rchb.

*) Nomen ex Theophrasto ac Plinio.

Tetramicra Lindl. cont. 1841. Nom. p. 52. n. 1979. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.

Tetramis Brid. Bryol. II. p. XLIII: sphalm. pro *Tetracmis*.

Tetramnus Gmel. vid. *Teramnus P. Browne*.

Tetramolopium*) Nees 1833. Gen. et sp. Aster. p. 202: nov. g. Asterum genuinor. (Aster tenerrimus Less.)
DC. 1836. Pr. V. p. 262: g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2312. p. 375; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31: g. Bellidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3299: g. Asterear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: g. Erigerear.

Tetramorphaea DC. 1833 in Guillem. Arch. bot. II. p. 331; 1837. Prodr. VI. p. 609: nov. g. Centauriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2873. p. 475; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. (?) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3657: g. Cnicear.?

Tetrandra A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 527: sect. Tournefortiae.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 928: g. Heliotropiear.

Tetrandria Linn. 1737. Gen. et in operibus sequentibus: class. IV. plantar. Ordines: Mono-, Di-, Tetragynia. Sequuntur Auctores permulti.

Tetranema Benth. 1845 in Lindl. Bot. Regist. n. ser. XVI. t. 52; 1846 in DC. Prodr. X. p. 331; 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 684: nov. g. Chelonear.
Walp. 1845. Rep. III. p. 251. 961: g. Digitalear.

Tetranema Aresch. 1850. Nov. Act. Upsal. XIV. p. 418: nov. g. Ulvear. (Conferva percursa Ag.)
= Schizogonii Kütz. spec.

Tetrantha Poiteau mss.
= Riencourtia Cass.

Tetranthera Jacq. 1797. Hort. Schönbr. I. p. 59. t. 113.
Roxb. 1798. Corom. II. p. 25. t. 147. 148: g. Dioec. Polyandr.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 225. t. 222. f. 2.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Laurinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 112. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 137. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120. — Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 178. — Hook. f. 1853. Fl. N. Zeal. I. p. 216.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 403. Ed. Nees p. 259: g. Laurinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 341; 1825. Syst. II. p. 266. n. 1522; 1830. Gen. I. p. 328. n. 1667. — D. Don 1825. Nepal. p. 65.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1909: g. Laurear.
Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 64; 1833. Progr. p. 18; 1836. Laurin. p. 508: g. Tetrantherear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2059. p. 322; 1841. Ench. p. 198. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1358. — Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473. — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2650. — Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 24. p. 370. Sect.: Glabraria, Tomingodaphne, Conodaphne, Anisanthera, Omphalodaphne. — Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 13. t. 1834—1836. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 944. Sect. ut Blume (exceptis 2 primis).
Roxb. 1832. Ind. III. p. 818: g. Dioec. Enneandr. (Lauror.)
Zucc. 1835 in Sieb. Fl. jap. I. p. 266. t. 87. t. 100. f. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
Conf. Glabraria Linn.; Litsea Lam.; Litsaea Pers.; Tomex Thunb.; Berrija Klein; Sebifera Lour.; Hexanthus Lour.; Fiwa Gmel.

Tetranthereae Nees 1833. Progr. p. 18: div. Laurear. Gen.: Cylicodaphne, Tetranthera, Polyadenia, Laurus.
Nees 1836. Laurin. p. 501: trib. Laurinar. Gen. ead. et Lepidadenia.
Endl. 1838. Gen. p. 322; 1841. Ench. p. 198: trib. Laurinear. Gen. ut Nees 1836. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473. Gen. ead.
Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239): trib. Laurear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 70: subdiv. Laurear. Gen. ead.

Tetranthus Swartz 1788. Prodr. p. 7. 115; 1806. Fl. Ind. occ. III. p. 1385. t. 27: nov. g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 592. n. 1354. — Gmel. 1791. Syst. p. 1280. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2402. n. 1584. — Pers. 1807. Ench. II. p. 500. n. 1971.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 548; 1826. Syst. III. p. 459. n. 2719; 1831. Gen. II. p. 617. n. 364: g. Eupatoriear.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 203: g. Tagetinear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143.
Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 308: g. Compositar. parum notum.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 343; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2358: g. Tagetear.
DC. 1836. Pr. V. p. 528: g. Ivear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2484. p. 404; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3916. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22: g. Ambrosiear.

Tetraodus Less. vid. *Tetrodus Cass.*

*) μώλωψ, vibex.

Tetraotis Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 8: nov. g. Compositar.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 892: g. Echinopsidear. (Lagasceae Cav. proximum.)
= Enydra Lour.

Tetrapasma*) G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 40: nov. g. Rhamnear. (Discaria australis Hook.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50) obscurum.
Endl. 1840. Gen. n. 5731 *b*. p. 1099; 1841. Ench. p. 581: sect. Discariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5604. 1.

Tetrapathaea DC. 1828. Prodr. III. p. 323: sect. Passiflorae.
Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3463: g. Granadillear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 772: g. Passiflorear. (verar.) — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 130. 138.
Conf. seq.

Tetrapathea DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 435: sect. Passiflorae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 47. — Endl. 1839. Gen. n. 5098 *a*. p. 926; 1841. Ench. p. 483. — Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5078. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 218.
Raoul 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 122: g. a Passiflora distinctum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 322: g. Papayacear.
= Tetrapathaea DC.

Tetrapeltis „Wallich mss." Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1522; 1833. Orchid. p. 212: nov. g. Vandear. (T. fragrans.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1468. p. 203; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2074. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Tetrapetalae Hill 1769. Hort. kew. p. 163: class. X. herbar. Typus: Oenothera.

Tetrapetalae cruciatae Hall. 1742. En. stirp. Helv. Praef. p. 34: ordo Dicotyledonum petalodear. Gen.: Isatis, Myagrum, etc.

Tetrapetalae incompletae Hill 1769. Hort. kew. p. 338: class. XXIV. herbar. Typus: Clematis.

Tetrapetalae irregulares Hill 1769. Hort. kew. p. 280: class. XVII. herbar. Typus: Lupinus.

Tetrapetalae uniformes Ray Hist. XVI. p. 777.
= Cruciferae Adans.

Tetraphideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Aplopogonor. Gen.: Tetraphis.
Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII: fam. Muscor. Gen.: Tetraphis, Tetrodontium.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: div. Bryacear. Gen. ead.
Bayrh. 1849. Taun. p. 16: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Tetraphis.
Conf. Georgiaceae Rabenh.

*) τετράς, quatuor; σκέπασμα, velum.

Tetraphis *) Hedw. 1782. Fund. II. p. 87; 1801. Spec. Musc. p. 45: nov. g. Muscor. (Mnium pellucidum L.) — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 454; 1800. III. p. 132. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 758. n. 1639. — Mönch 1794. Meth. p. 729. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 287. — Rebent. 1804. Neom. p. 255. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 30. — DC. 1805. Franç. II. p. 448. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 71. — Mart. 1817. Erlang. p. 116. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 717. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 149. n. 3299; 1831. Gen. II. p. 729. n. 3695. (frondosor.) — Leman 1828. Dict. v. 53. p. 309. Sect. ut Brid. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 117. (odontostomor.) Sect.: Tetrodontia, Tetracis. — Math. 1853. Belg. II. p. 67.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 30: g. Calyptrator.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 153; II. 1. p. 47; 1806. Spl. I. p. 83: g. Aploperistomator. — Par. Röhl. 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 79.
Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.
Palis. 1805. Pr. Aeth. p. 16; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 438: g. Apogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 218.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 36: g. Mitrocarpor.
Agdh. 1822. Aphor. p. 107: g. Valvatar.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 26: g. Peristomor. acrocarpor. — Par. Hüb. 1833. Musc. germ. p. 71.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 770: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 160.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 129: g. Acrocarpor. peristomor. Sect.: Tetrodontium, Tetraemis. (1827. ibid. II. p. XLIII: Grimmioideis aff.) — Par. Nees & Hornsch. 1827. Bryol. germ. II. 2. p. 1.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 231: g. Orthotrichoidear. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 596: g. Grimmiaceor. Sect. ut Brid.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Tetraphidear. — Par. Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92. — Bayrh. 1849. Taun. p. 16.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Endl. 1836. Gen. n. 497. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear. Sect. ut Brid.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 872: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XII. p. 533 (*Tetraphys*): g. Tetrodontear.
= Georgia Ehrh.

Tetraphyla Rchb. vid. *Tetraphyle Eckl. & Zeyh.*

*) „Nomen a graeco τετραφος (?), i. e. quod quatuor eminentias habet."

Tetraphylax DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 515: sect. Goodeniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4009. 2.
Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 164: g. Goodeniear. *Cf.* Griseb. in Arch. f. Nat. 1855. II. p. 392 et Müll. Ann. bot. V. p. 385.
= Tetrathylax G. Don.

Tetraphyle*) Ecklon & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. austr. III. p. 292: nov. g. Crassulacear. (Crassula pyramidalis L.)
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): sect. Crassulae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4610 c. p. 809; 1841. Ench. p. 405. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6177. 3 (*Tetraphyla*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 253.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1033: g. Sedear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 326 (*Tetraphylle*): subg. Crassulae.

Tetraphyllae Hill 1769. Hort. kew. p. 337: class. XXXI. herbar. Typus: Petiveria.

Tetraphylle Lemaire vid. *Tetraphyle Eckl. & Z.*

Tetraphys Mont. vid. *Tetraphis Hedw.*

Tetrapilis Hedwig Spec. t. 7. f. 1 a. (*Tetrapitis* ex Wittst.)
= Tetracmis Brid.

Tetrapilus **) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 611. Ed. Willd. p. 749: nov. g. Dioec. Diandr. (T. brachiatus.)
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 200: g. Oleinear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 256 (166). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 258. (?)
Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 311: g. Jasminear.?
Endl. 1838. Gen. n. 3357. p. 573; 1841. Ench. p. 287: g. dubium Oleacear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 299.
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5243: g. Oleinar.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617: g. Olear.

Tetrapitis Wittst. Etym. Handw. p. 872: vid. *Tetrapilis Hedw.*

Tetraplandra ***) Baillon 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 200; 1858. Ét. Euphorb. p. 549: nov. g. Anthostemidear. (T. Leandri.)

Tetraplasandra †) A. Gray 1853. Char. n. gen. 11 (Proc. Amer. Ac. III. p. . . .); 1854. Bot. Wilkes p. 727. t. 94; 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 178; 1855. Un. St. expl. exp. p. 727: nov. g. Araliacear. *Cf.* Flora 1855. p. 622. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 82.

Tetraplasium Kunze 1831. Flora p. 378.
= Tetilla DC.

Tetrapleura Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 345: nov. g. Adenantherar. (Adenanthera tetraptera Schum.)
Walp. 1842. Rep. I. p. 861; 1846. V. p. 581: g. Adenantherear.

Tetrapleura Benth. cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Mimosear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.

Tetrapleura Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 191: sect. Desmidii.

Tetrapleura „Parlatore" Webb 1849 in Hook. Niger Fl. p. 131: nov. g. Tetrapleurear. (T. insularis.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 714.
= Tornabenea Parlat.

Tetrapleureae Parlatore 1849 in Hook. Niger Fl. p. 131: trib. Umbelliferar. Gen.: Tetrapleura. *Cf.* Walp. Ann. bot. II. p. 714.

Tetraploa Berkeley & Broom 1850. Ann. nat. hist. V. p. 459: nov. g. Phragmidiaceor., Sporidesmio aff.

Tetraplodon Bruch & Schimp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 23. 24: nov. g. Splachnacear. (Spl. angustatum.) — Par. C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 129. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 90.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90: sect. Splachni.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XII. p. 534: g. Splachnear.
Synon. Pycnapophysium Rchb.; Cryptodon R. Brown.

Tetrapodiscus Ehrenb. 1840. Leb. Kreideth.
= Eupodiscus Ehrenb. pt.

Tetrapogon Desfont. 1799. Fl. atl. II. p. 389. t. 255.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 898. n. 1860: g. Polygam. Monoec.
Hedw. 1806. Gen. p. 44. n. 207: g. Triandr. Digyn. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 160.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 179: g. Saccharinar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 323. n. 327: g. Graminear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 312.
Endl. 1837. Gen. n. 839 *e.* p. 93; 1841. Ench. p. 58: sect. Chloridis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1313. 5.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163: g. Chloridear. — Par. Parlat. 1850 in Webb Phyt. Canar. III. p. 397.

Tetrapoma Turczan. 1834 in Fisch. & Mey. Ind. sem. h. Petr.; 1835. ibid. p. 39: nov. g. Cruciferar. (Camelina barbareaefolia DC.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 337 et Linnaea X. Litt. p. 104; XI. Litt. p. 127.
Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11): g. Alyssinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4883. p. 870; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 161. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 201.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: g. Nasturtiear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 515: g. Siliculosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 654.
Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7013: g. Roripear.
Turczan. 1842. Bull. soc. Mosc. p. 264: g. Tetrapomear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 86. n. 4883.

---

*) φυλή, ordo.
**) πῖλος, cucullus.
***) Nomen a numero antherae loculorum.
†) τετραπλάσιος, quadruplex.

Tetrapoma Turczan. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 92: g. Camelinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Tetrapomidar.
Synon. Tetracellion Turcz.

Tetrapome Duchart. vid. *Tetratome Pöpp.*

Tetrapomeae Turczan. 1842. Bull. soc. Mosc. p. 264: trib. Cruciferar. Gen.: Tetrapoma, Holargidium.
Endl. 1843. Spl. III. p. 86: trib. Pleurorhizear. Gen. ead.

Tetrapomidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: trib. Pleurorhizear. Gen.: Holargidium, Tetrapoma.

Tetrapora Schauer 1843. Flora p. 407; 1843. Linnaea XVII. p. 238: nov. g. Bäckear. (T. Preissiana.) *Cf.* Walp. 1846. Rep. V. p. 734.
Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 107: g. Bäckeear.

Tetrapterigium Dietr. vid. *Tetrapterygium Fisch. & M.*

Tetrapteris Cavan. 1790. Diss. IX. p. 433. t. 260—262: nov. g. Monadelph. (T. inaequalis, etc.)
Gis. 1792. Prael. p. 357: g. Trihilatar.
Pers. 1805. Ench. I. p. 508. n. 1129: g. Malpighiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 332. n. 1309. — Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 481. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 168. — Kunth 1824. Syn. III. p. 185. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 313. — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — A. Juss. 1832 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 5. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 142.
DC. 1823. Pr. I. p. 587: g. Banisteriear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 207. n. 5369; 1837. Hdb. p. 299. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 643. — Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39). — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 231. Sect.: Pachytorus, Stenantaeris, Platyphyllarion.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: g. Banisteriar.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 371: g. Pleuropterygiar.
Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 75: g. Hiraeacear. Sect.: Eutetrapteris, Pentapteris, Stauropteris, Schizopteris.
Synon. Tetrapterys A. Juss.

Tetrapterygium Fischer & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. p. 39: nov. g. Cruciferar., Isatidi aff. *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 338 et Linnaea X. Litt. p. 104.
Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13): g. Isatidear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 258; 1841. Nom. p. 179. n. 6897. — Endl. 1839. Gen. n. 4937. p. 880; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 209. — Walp. 1846. Rep. V. p. 43.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Carcerulosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 632 (677 *Tetrapterigium*): g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Isatidar.

Tetrapterys A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 261; 1843. Arch. Mus. III. p. 517. t. 18: g. Hircar. Sect.: Pentapterys, Tetrapterys. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Endl. 1840. Gen. n. 5574. p. 1061; 1841. Ench. p. 557; 1842. Spl. II. p. 84: g. Pleuropterygiar. Sect. (1842): Pentapterys, Eutetrapterys.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7850: g. Triopteridear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 300: g. Hiraeear. Sect. ut A. Juss.
= Tetrapteris Cav.

Tetrapterys A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 261; 1843. Arch. Mus. III. p. 519: sect. Tetrapterydis. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 300.
= Eutetrapterys Endl.

Tetraraphis Miers 1853. Linn. Trans. XXI. 2. p. 141. t. 17.
= Oxytheca Nutt.

Tetrarhena Agardh vid. *Tetrarrhena R.Brown.*

Tetraria Palis. 1816. Mém. Inst. Année 1812. 2e part. p. 54: nov. g. Cyperear. (T. Thuarii.) — Par. Lestib. 1819. Ess. Cypér. (*cf.* Flora 1821. I. p. 23 et Schult. Mant. II. p. 5.) — Rchb. 1828. Consp. 56. n. 1104.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. p. 119; 1841. Ench. p. 64: inter genera Cyperacear. penitus dubia. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1496: g. Cyperoidear. dubium.
= Caustis R. Brown? (Meisn. Comm. p. 315.)

Tetrarrhena R. Brown 1810. Prodr. I. p. 209. Ed. Nees p. 65: nov. g. Graminear. (Ehrhartae sp. Lab.) — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 61. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 318.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1830. Gram. p. 9; 1833. Agrost. p. 15: g. Oryzear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 152 (*Tetrarhena*). — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 955; 1841. Nom. p. 36. n. 1258. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Endl. 1836. Gen. n. 737. p. 79; 1841. Ench. p. 56. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 233. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 100. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 34. 485. n. 596: g. Tetrandr. Digyn. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 195. — Schult. 1827. Mant. III. p. 17.

Tetrasperma G. Don ex Steud. Nomencl. II. p. 673: g. Rhamnear. (T. juncea.) Quid?

Tetraspermae Batsch 1802. Tab. affin. p. 187: ordo Monopetalar. Familiae: Asperifoliae, Verticillatae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 588: class. Phanerocotyledonear. discigynar. monopetalar. Ord.: Boragineae, Myoporinae, Pedalinae, Verbenaceae, Labiatae.

Tetraspis Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 77: sect. Cynoglossi. (C. laevigatum, glastifolium, etc.)
= Rindera Pall.

Tetraspora Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 9: novum genus pro Ulvis Vaucherii propositum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 332.

Desv. .... Fl. Anger. p. 17.

Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 414: sect. Ulvae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 479 *c*. — Endl. 1836. Gen. n. 86 *c*. p. 7; 1841. Ench. p. 6.

Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXII. 188: g. Ulvacear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 176. — Endl. 1843. Spl. III. p. 18. n. 54. — Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XII. p. 537.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 7: g. Myxophysalidum.

Menegh. 1838. Cenni p. 36: g. Ulvear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 691. (genuinar.)— Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465.) — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 60.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Palmellear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phyc. gener. p. 175; 1845. Phyc. germ. p. 152; 1849. Sp. Alg. p. 225. n. 170. — Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 61. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 62. — Math. 1853. Belg. II. p. 522.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 51: p. Coccochloridear.

Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 71: g. Tetrasporear.

Synon. Pexisperma Rafin.?; Tetrasporella Gaill.; Monostroma Thuret.

Tetrasporeae Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 63: div. Palmellacear. Gen.: Pleurococcus, Gloeocystis, Tachygonium, Palmella, Apiocystis, Palmodactylon, Hydrurus, Porphyridium, Tetraspora, Dictyosphaerium, Oocardium, Stichococcus, Hormospora, Hormocytium, Mischococcus, Rhaphidium, Inoderma, Polyedrium.

Tetrasporella Gaillon 1833. Aperç. d'hist. nat.

= Tetraspora Link. (Trevis.)

Tetrasporidei Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 133: ordo 1 Exosporor. Fam.: Agaricini, Polyporei, Auricularini, Phalloidei.

Tetrastemon DC. 1828. Prodr. III. p. 172: sect. Tetrazygiae. (Melastoma tetrandra Sw.) An genus proprium? *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 872 (*Tetrastemum*). — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 783. — Endl. 1840. Gen. n. 6244 *a*. p. 1218; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6752. 1.

Tetrastemon Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 317: nov. g. Leptospermear. (T. loranthoides.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 872 (*Tetrastemum*).

= Myrrhinium Schott.

Tetrastemon G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 608: sect. Hemimeridis. (H. diffusa et unilabiata.)

Tetrastemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 51 etc.: vid. *Plantae All.*

Tetrastemum „Hook. & Arn." Wittst. vid. *Tetrastemon Hook. & Arn.*

Tetrastemum „DC." Wittst. vid. *Tetrastemon DC.*

Tetrataenium DC. 1830. Prodr. IV. p. 191: sect. Heraclei. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 341. — Endl. 1839. Gen. n. 4477 *a*. p. 782 (*Tetratenium*); 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5476. 6. — Walp. 1843. Rep. II. p. 415.

Tetratenium Endl., Walp. vid. *praeced.*

Tetratheca Smith 1793. Nov. Holl. I. p... t. 2. (Exot. Bot. t. 20—22.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 333.

Willd. 1799. Sp. II. p. 321. n. 737: g. Octandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 419. n. 960. — Hedw. 1806. Gen. p. 267. n. 1075.

Labill. 1804. Nov. Holl. I. p. 95. t. 122. 123.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 544 (Verm. bot. Schr. I. p. 29): g. Tremandrear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 343. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208. n. 5422; 1841. Nom. p. 175. n. 6792. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. — Bartl. 1830. Ord. p. 256. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 793. n. 4111. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 371. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (20). — Spach 1839. Vég. phan. IV. p. 154. — Endl. 1840. Gen. n. 5644. p. 1077; 1841. Ench. p. 567; 1850. Spl. V. p. 80. — Steetz 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 211; 1847. II. p. 233. Sect.: Eutetratheca, Ditheca, Tremandropsis. — Walp. 1846. Rep. V. p. 68. Sect. eaed. — Steetz 1853. Fam. Tremandr. *Cf.* Flora 1853. p. 642. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 241.

Juss. 1815. Mém. Mus. I. p. 387: g. Polygalear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 739; 1825. Syst. II. p. 214. n. 1434. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1268. (?)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 274: g. Tremandracear.

Schuch. 1853. Syn. Tremandr. (Flora 1854. p. 474): g. Tetrathecear. Sect.: Melanerythrotheca, Xanthotheca.

Tetratheceae Schuch. 1853. Syn. Tremandr. (Flora 1854. p. 474): cohors Tremandrear. Gen.: Tetratheca, Platytheca.

Tetrathylacium Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 34. t. 240: nov. g. Violariear. (T. macrophyllum.)

Meisn. 1843. Comm. p. 342: g. Alsodinear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 89. n. 5047/$_1$.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339: g. Alsodear.

Synon. Edmonstonia Seem.

Tetrathylax*) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 725: sect. Goodeniae. (G. quadrilocularis R. Br.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3043 *b*. p. 507; 1841. Ench. p. 261.

Synon. Tetraphylax DC.

*) θύλαξ, cellula.

Tetratome Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 46. t. 163: nov. g. Monimiacear. (T. triflora, latifolia et lepidota.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 299. — Crüger 1847. Linnaea XX. p. 114. Char. ampliat. — Duch. 1849 in Orb. VIII. p. 312 (*Tetrapome*).
Endl. 1841. Spl. I. n. 2017/₁. p. 1378; 1841. Ench. p. 195: g. Monimiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 324 (236). — Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2592.
= Mollinedia Ruiz & Pav.

Tetratome „Bunge" Endl. vid. *Tetracme Bunge*.

Tetraulacium *) Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. p. . . . : nov. g. Veronicear. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 265 et Flora 1844. p. 120. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 455. 968.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 379; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear.

Tetrazygia „Rich." DC. 1828. Prodr. III. p. 172: nov. g. Miconiear. Sect.: Tetrastemon, Octostemon. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 783. Sect. eaed. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6244. p. 1218; 1841. Ench. p. 647. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6752. Sect.: Tetrastemon, Tetrazygia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 33.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4632: g. Blakeacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 309. n. 1582: g. Melastomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 330.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1276: g. Melastomacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 118.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 342: g. Clidemiear.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 216: sect. Miconiae.

Tetrazygos Rich. mss.
= Charianthus Don.

Tetrodonteae Montagne 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen.: Tetraphis, Tetrodontium.

Tetrodontia Wallr. vid. *seq.*

Tetrodontium Schwägr. 1824. Suppl. II. Vol. I. 2. p. 102. t. 128: nov. g. Muscor. frondosor. (T. repandum, ovatum et Brownianum.)
Brid. 1826. Bryol. I. p. 130: sect. Tetraphidis. — Par. Nees & Hornsch. 1827. Bryol. germ. II. 1. p. 5. — Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 596 *a*. — Leman 1828. Dict. v. 53. p. 310. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 117 (*Tetrodontia*). — Endl. 1836. Gen. n. 497 *a*. p. 49; 1841. Ench. p. 30.
Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII: g. Tetraphidear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92 (*Tetradontium*).
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 181: sect. Georgiae. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 230 (*Tetradontium*).
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Tetrodontear.

*) αὖλαξ, sulcus.

Tetrodus Cassini 1828. Dict. v. 55. p. 264. 272; 1830. v. 60. p. 575: nov. g. Heleniear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 520 (*Tetraodus*); 1832. Syn. p. 240: g. Galardiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 666: sect. Helenii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2603 *b*. p. 424; 1841. Ench. p. 240. — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 384. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 385. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3196.1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 628.
Synon. Mesodetra Rafin.; Mesotetra Wittst.

Tetroncium Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 17: nov. g. Dioec. Hexandr. (Triglochin reflexum Vahl.)
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1289: g. Triglochinar.?
Bartl. 1830. Ord. p. 73: g. Juncaginear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1038. p. 127; 1841. Ench. p. 72; 1843. Spl. III. p. 58. (Hook. Ic. t. 354.) — Kunth 1841. Enum. III. p. 142. — Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 10.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 163. n. 1389: g. Juncear.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1142: g. Scheuchzeriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 144: g. Naiadacear.
Synon. Cathanthes Rich.

Tetrorchidium Pöppig 1842. Nov. gen. III. p. 23. t. 227: nov. g. Crotonear. (T. rubrivenium.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 89. n. 5818/₁. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1843. Comm. p. 369: g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 439: g. Dysopsidear.

Tetrorhiza „Ren." Endl. in synon. Gentianae: vid. *Tretorrhiza Ren.*

Tetrorrhiza Wittst. vid. *praeced.*

Teucridium Hook. f. 1854. Fl. New-Zeal. I. p. 203. t. 49: nov. g. Verbenacear. (T. parvifolium.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 704.

Teucrieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Labiatar. Subtrib.: Ajugeae, Collinsoniae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189: subdiv. Trachyschizocarpicar. Gen.: Ajuga, Amethystea, Trichostemma, Teucrium, Phleboanthe, Cymaria, Lophanthus, Hyssopus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 107. Gen.: Ajuga, Teucrium, Amethystea, Trichostemma, Scorodonia, Leucosceptrum; Cymaria; Hoslundia?

Teucris „Ging. mss." Benth. 1835. Labiat. p. 665; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 575: sect. Teucrii. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 862. — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *c*. p. 631; 1841. Ench. p. 308. — Walp. 1845. Rep. III. p. 904. — Webb . . . Canar. III. p. 108. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 442. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 708.

Teucrium *) Tourn. 1700. Inst. p. 207. t. 98: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 214. Ed. Hall. 1745. p. 219: g. pl. class. IX.
Adans. 1763. Fam. II. p. 188: g. Labiatar.
Schreb. 1774. Vertic. gen. p. 19: sect. Teucrii. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 515.
Mönch 1794. Meth. p. 382: g. Petalostemonis.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167: g. Ajugoidear.
= Teucrii Linn. pars.

Teucrium Linn. 1737. Gen. p. 167. n. 467; 1737. Cliff. p. 301; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 159; 1753. Sp. II. p. 562; 1759. Syst. ed. X. p. 1094. n. 625; 1763. Sp. ed. II. p. 786; 1764. Gen. ed. VI. p. 287. n. 706; 1767. Syst. ed. XII. p. 387: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 418. — Murr. 1774. Syst. p. 438; 1784. Syst. p. 525. — Reich. 1778. Gen. p. 292. n. 764. — Lour. 1790. Coch. II. p. 362. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 384. n. 960. — Gmel. 1791. Syst. p. 892. — Pers. 1797. Syst. p. 562. — Willd. 1800. Sp. III. p. 13. n. 1093; 1809. En. p. 595. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 26. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 3.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 183. n. 752: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Schreb. 1774. Verticill. gen. p. 17. (unilabiatar.) Sect.: Teucrium, Chamaedrys, Scorodonia, Polium. — Scop. 1777. Intr. p. 164. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 363.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 112. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 331. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 257. — DC. 1805. Franç. III. p. 515; 1815. V. p. 395. Sect. ut Schreb. (excepta Scorodonia.) — Pers. 1807. Ench. II. p. 110. n. 1372. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 305. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 477 (*Germandrée*.) — Link 1822. En. II. p. 99. — Kunth 1823. Syn. II. p. 83. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 706. n. 2073; 1831. Gen. II. p. 469. n. 2309. — D. Don 1825. Nepal. p. 108 (sphalm. *Teuctrium*). — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 827. — Link 1829. Hdb. I. p. 454. Divis.: Chamaedrys, Polium, Marum. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 395.
Hill 1769. Ht. kew. p. 252: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 473: g. Labiacear.
Neck. 1790. El. I. p. 323. n. 509: g. Corythophytor.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 343: g. Pericarpiferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 57: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 434: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2851. Sect.: Chamaedrys, Polium. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Tausch 1828. Flora I. p. 322. Sejunguntur Scorodonia et Phleboanthe.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 122: g. Ajugear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 148. Sect. 4 ex Benth. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 574. Sect. ut antea. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 442. Sect. ex Benth. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 708. Sect. 5 ex Benth. — Müll. 1857. Ind. bat. II. p. 990.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 2. 15: g. Bilabiatar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 314: g. Bugulear. Sect. ut Link 1829 et Scordium.
Benth. 1835. Labiat. p. 660: g. Ajugoidear. Sect.: Leucosceptrum, Teucropsis, Teucris, Pycnobotrys, Stachyobotrys, Scorodonia, Scordium, Chamaedrys, Polium. — Par. Koch 1837. Syn. p. 576. Ed. II. p. 662. (Sectiones 4 ultimae Benthamianae.) — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 861. Sect. fere ut Benth. — Endl. 1838. Gen. n. 3679. p. 631; 1841. Ench. p. 308. Sect. ut Benth. — Kunth 1838. Berol. II. p. 118. — Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 466. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. III. p. 903. 991. Sect. eaed. — Webb .... Canar. III. p. 108. Sect.: Teucris, Pseudo-Scordium. — G. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 204 (*Germandrée*). — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 203.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4160: g. Teucriear. Sect.: Scordium, Chamaedrys, Polium, Stachyobotrys, Pycnobotrys, Teucropsis, Teucrium.
Synon. Scorodonia Ray; Teucrium, Chamaedrys, Scordium et Polium Tourn.; Marum et Ajuga Rupp.; Poliodendron Webb.

Teucrium Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 249: g. Gymnospermar., Bugulam includens.

Teucropsis „Ging. mss." Benth. 1835. Labiat. p. 664; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 575: sect. Teucrii. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 862. — Endl. 1838. Gen. n. 3679 *b*. p. 631; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4160 *b*. — Walp. 1845. Rep. III. p. 904.
Synon. Poliodendron Webb.

Teuctrium D. Don vid. *Teucrium Linn.*

Teutliopsis Dumort. 1827. Fl. belge p. 20.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 92: sect. Atriplicis. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 717.
Synon. Schizotheca Meyer; Atriplex Nees.

Tevetia Linn. 1751 vid. *Thevetia Linn.*

Texiera Jaub. & Spach 1842. Ill. pl. or. I. p. .... t. 1: nov. g. Cruciferar. (Peltaria glastifolia DC.)
Meisn. 1843. Comm. p. 341: g. Isatidear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 88. n. $4941/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355 (*Texieria*): g. Isatidar.
Synon. Glastaria Boiss.

Texieria Lindl. vid. *praeced.*

*) Nomen ex Plinio: herba a Teucro reperta.

Teysmannia Miquel .... Versl. en Meded. k. Ac. Wet. VI. p. 194; 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 465: nov. g. Echitear. (Vallaris laxiflora Bl.)

Teyssmania Rchb. & Zolling. 1856. Linnaea XXVIII. p. 657: nov. g. Palmar., Coryphae aff. (T. altifrons.) *Cf.* Miquel Fl. Ind. bat. III. p. 749 *(Teysmannia)*.

Thacla*) Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 259: nov. g. Calthinear. (Caltha natans Pall.)
= Populaginis DC. pars.

Thaelaebolus Pers. vid. *Thelebolus Tode.*

Thaelaephora Roth, Gmel., GMS. vid. *Thelephora Dill.*

Thalamanthae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LV; 1828. Consp. p. 181; 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 178: class. VIII. plant. (1832. Fl. exc. p. 651. 653 div. Phylloblastar.) Ordines: Thylachocarpicae, Schizocarpicae, Idiocarpicae.

Thalamanthae Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): class. VI. plant. Ord.: Cyathinae, Personatae, Pyrenaceae, Tetracarpae, Luridae, Picrochyleae, Ataxae.

Thalamaulia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: ordo Unitegmiae. Fam.: Smilaceae, Asparagineae, Hemerocallideae, Liliaceae, Asphodeleae, Colchicaceae, Melanthideae, Juncaceae, Restiaceae.

Thalamia**) Spreng. 1817. Anleit. II. p. 218: nov. g. Taxear. (Podocarpus asplenifolia Labill.)
Spreng. 1826. Syst. III. p. 763. 890. n. 3151; 1831. Gen. II. p. 700. n. 3533: g. Coniferar.
= Phyllocladus Rich.

Thalamicae Schleiden 1843. Grundz. II. p. 107: sect. Gamicar. Divis.: Mono-, Dicotyledoneae.

Thalamiflorae DC. 1818. Syst. I. p. 125; 1819. Théor. élém. p. 243; 1824. Prodr. I. p. 1: prima subclassis Dicotyledonear. Ordines 1—54.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I: subdiv. Polypetalar. Ordines 68.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 21: series II. Dicotyledonear. Class.: Disciflorae, Sertiflorae, Columniflorae.

Thalamifloria Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64: ordo Bitegmiae (4). Fam.: Nymphaeaceae, Hydropeltideae, Melanojae, Palmeae.

Thalamisertia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: ordo Bitegmiae (3). Fam.: Armeriaceae, Paronichieae, Stellineae, Linaceae, Oxalideae, Impatineae, Geranidiae, Sarmentaceae, Meliaceae, Cedreleae, Camellidiae, Ternstromeae, Hesperideae, Elaeocarpeae, Guttineae, Hypericineae, Malpighidiae, Sapindaceae, Byttneridieae, Chlenaceae, Malvaceae, Tiliaceae, Hermannidieae, Diosmeae, Tribulineae, Rutaceae.

Thalamitegmia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: ordo Solitegmiae. Fam.: Urticeae, Monimiae, Buxaceae, Sanguisorbeae, Ulmaceae, Thymelaeae, Proteaceae, Myristiceae, Laurineae, Atripliceae, Polygoneae.

Thalamitubia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: ordo Bitegmiae (3). Fam.: Iliceae, Ophiospermeae, Hilospermae, Jasmineae, Colubrineae, Apocineae, Gentianidieae, Bignonidiae, Polemonaceae, Convolvuleae, Solaneae, Verbascineae, Rhinanthideae, Polygaleae, Acanthineae, Orobancheae, Myoporineae, Pyrenaceae, Boragineae, Labiatae, Lentibulariae, Montiariae, Primulaceae, Plantagineae, Plumbagineae.

Thalamo-Mallonandria Medic. 1786. Theod. spec. p. 27 not.: class. XII. plant.

Thalamopetalae Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): class. IX. plant. Ord.: Caryophylleae, Violariae, Rutariae, Trihilatae, Columniferae, Hesperideae, Sarmentaceae, Cruciflorae, Multisiliquosae.

Thalamo-Polyandria Medic. 1786. Theod. spec. p. 27 not.: class. XIV. plant.

Thalamostemon Mönch 1794. Meth. p. 4. 13. 44; 1798. Einleit. p. 228: class. I. plant.

Thalamostemonis Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. 1751. p. 112. 122; 1764. Syst. p. XXXIII. 1: class. I. plant. Divis.: Mon-, Di-, Tri-, Tetr-, Pent-, Hex-, Hept-, Oct-, Enne-, Decanthera, Symphyostemones.

Thalamungulia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: ordo Bitegmiae (3). Fam.: Simarubeae, Ochnaceae, Berberideae, Menispermeae, Anonaceae, Magnoliaceae, Dilleniaceae, Ranunculaceae, Paeonidiae, Cistineae, Violaceae, Droseraceae, Resedaceae, Capparideae, Cruciferae, Fumariaceae, Papaveraceae.

Thalasium Spreng. vid. *Talasium Spreng.*

Thalassia*) „Soland.“ Konig 1806. Ann. of bot. II. p. 96: nov. g. pro Zosterae sp. Forsk. conditum.
Pers. 1807. Ench. II. p. 563. n. 2084: g. Monoec. Polyandr.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 271. n. 1528; 1830. Gen. I. p. 329. n. 1671: g. Enneandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 43. n. 755: g. Zosterear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272).
Bartl. 1830. Ord. p. 72: g. Najadear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1658. p. 230; 1841. Ench. p. 125. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 64. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 227.
Kunth 1841. Enum. III. p. 120: g. Posidoniear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 14.
Rchb. 1841. Nom. p. 31. n. 1075: g. Zosteracear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 145.

Thalassiophyllum Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 11: nov. g. Agaroidear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 28. n. 110: g. Laminariear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97. — J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 138. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XII. p. 543.

*) Anagr. nominis Calthae.
**) θάλαμος, receptaculum.

*) θάλασσα, mare.

Thalassiophyllum Post. & Rupr. cont.
Kütz. 1843. Phyc. gener. p. 347; 1849. Sp. Alg. p. 581. n. 389: g. Agarear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Laminaridar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: g. Myriotremear.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 96: g. Laminariacear.

Thalassiophyta Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 21. Ordines: Fucaceae, Florideae, Dictyoteae, Ulvaceae, Alcyonidieae, Spongodieae. *Cf.* Isis 1825. p. 437.
Guill. 1820. Essai sur l' étude des Thalassiophytes.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 350: class. plant. Divis.: Symphysisteae, Diaphysisteae.

Thalassiophytae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 317: fam. Algar. Divis.: Ceramideae, Hutchinsideae, Corallideae, Zonarideae, Ulvoideae, Linkideae, Alcyonideae, Spongidiae, Florideae, Fucoideae.

Thalesia Martius mss.
= Leptolobium Vogel.

Thalesia Bronner 1857. Wilde Traub. d. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. II.

Thalia*) Linn. 1737. Gen. p. 362. n. 1906; 1742. Gen. ed. II. p. 522. n. 1010; 1753. Sp. II. p. 1193: g. pl. incertae sedis, pro *Cortusa Plum.* propositum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: g. Scitaminum.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 843. n. 8; 1762. Sp. ed. II. p. 3; 1764. Gen. ed. VI. p. 4. n. 8; 1767. Syst. ed. XII. p. 51: g. Monandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 50; 1784. Syst. p. 51. — Reich. 1778. Gen. p. 4. n. 8. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 6. n. 10. — Gmel. 1791. Syst. p. 9. — Pers. 1797. Syst. p. 51. — Willd. 1797. Sp. I. p. 15. n. 13; 1809. En. p. 6. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 1.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Scitaminear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 93. — Gis. 1792. Prael. p. 188. — Batsch 1802. Tab. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 14.
Gled. 1764. Syst. p. 148. n. 613: g. Petalostemonum.
Rottb. 1775. Soc. med. Havn. Coll. II. p. 245.
Juss. 1789. Gen. p. 63: g. Cannar. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 1. 17.
Neck. 1790. El. III. p. 141. n. 1482: g. Cratoophytor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 156: g. Amomear. Par. Hedw. 1806. Gen. p. 3. 343. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 407.
R. Brown 1818. Prodr. I. p. 307. Ed. Nees p. 163: g. Cannear. — Par. Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 275. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 274; 1825. Syst. I. p. 8. n. 4; 1830. Gen. I. p. 4. n. 4. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXV; 1841. Nom. p. 56. n. 2203. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 24.
Link 1821. En. I. p. 2: g. Cannacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 182. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1605. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 62. — Endl. 1837. Gen. n. 1641.

*) Gicat. Joh. Thallo, medico, Northusano.

Thalia Linn. cont.
p. 226; 1841. Ench. p. 121. — A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 148. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 543.
Nees 1831. Linnaea VI. p. 337: g. Marantacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 169.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 24. t. 132. 133.
Meisn. 1842. Gen. p. 389 (292): g. Marantear. *Synon.* Cortusa Plum.; Peronia DC.

Thaliana Rchb. 1841. Nomencl. p. 182. n. 7028. 1: sect. Conringiae.

Thalictreae Rchb. 1837. Handb. p. 276; 1841. Nomencl. p. 190: sect. Anemonear. Gen.: Thalictrum, Syndesmon et 1841 Cyrtorhyncha.

Thalictrella A. Rich. 1826. Dict. class. IX. p. 34.
= Olfa Adans.

Thalictroides Endl. 1839. Gen. n. 4772 *c* *α*. p. 845; 1841. Ench. p. 434: subsect. Euthalictri.

Thalictrum*) Tourn. 1700. Inst. p. 270. t. 143: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 62. Ed. Hall. 1745. p. 69: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 164. n. 461; 1737. Cliff. p. 226; 1740. Syst. p. 25; 1753. Sp. I. p. 545; 1759. Syst. ed. X. p. 1085. n. 617; 1762. Sp. ed. II. p. 767; 1764. Gen. ed. VI. p. 280. n. 697; 1767. Syst. ed. XII. p. 377: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 389. — Murr. 1774. Syst. p. 426; 1784. Syst. p. 513. — Reich. 1778. Gen. p. 285. n. 755. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 377. n. 951. — Lour. 1790. Coch. I. p. 346. — Gmel. 1791. Syst. p. 874. — Pers. 1797. Syst. p. 549; 1807. Ench. II. p. 100. n. 1359. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1295. n. 1084; 1809. En. p. 583. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 21. — Elliott 1821. Sketch II. p. 49. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 671.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 307: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 122. n. 502: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 297.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 105. — Gis. 1792. Prael. p. 376. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 357.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 459.
Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 63 (*Talictrum*): g. Polystemonum polystylar. (class. V.);
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 192: g. Polyantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 340: g. Tetrapetalar. incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 482: g. Ranunculear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 486. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 731 (verar.); 1825. Syst. II. p. 670. n. 2046; 1830. Gen. I. p. 461. n. 2274.

*) Nomen vetustum, quod a *θαλέω*, floreo, vireo deducitur.

Thalictrum Tourn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 258: g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 355. t. 74. f. 7 (sibiricum).
Juss. 1789. Gen. p. 232: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 56. — DC. 1805. Franç. IV. p. 874; 1815. V. p. 633. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 38. — Link 1822. En. II. p. 91. — Kunth 1824. Syn. III. p. 112. — D. Don 1825. Nepal. p. 192. — Lois. 1826. Dict. v. 40. p. 290 (*Pigamon*). — Gaud. 1828. Helv. III. p. 421. 500. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 343. Sect.: Tripterium, Euthalictrum. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 337.
Neck. 1790. El. II. p. 316. n. 1095: g. Acascophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 47: g. Multisiliquosar.
Cram. 1803. Disp. p. 121 in Dodecandr. Polygyn. et p. 202 in Dioec. Polyandr.
DC. 1818. Syst. I. p. 168; 1824. Pr. I. p. 11: g. Anemonear. Sect.: Tripterium, Physocarpum, Thalictrum (1824 Euthalictrum). — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 726. — — Presl 1826. Sicul. I. p. 5. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 11. Sect. ut DC. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 727. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 451. — Koch 1836. Syn. p. 3. Ed. II. p. 3. Sect. ut C. A. Meyer. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Kunth 1838. Berol. I. p. 5. — Endl. 1839. Gen. n. 4772. p. 845; 1841. Ench. p. 434. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 5. Sect. eaed. — Walp. 1842. Rep. I. p. 10; 1843. II. p. 737. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 300. Sect. ut Koch. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 26. Sect. eaed. et Homothalictrum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 427. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 4. Sect. ut DC. 1824. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 165 (*Pigamon*). — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 12. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 9.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 253.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Isopyrear.
Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4953: g. Helleborear. Sect.: Tripterium, Physocarpidium, Thalictrum.
Link 1831. Hdb. II. p. 389: g. Anemonidear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 2: g. Ranunculinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7227: g. Thalictrear. Sect. ut 1828.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 37: g. Cimicifugear.
Synon. Praticola Ehrh.

Thalictrum DC. 1818. Syst. I. p. 172: sect. Thalictri. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4953 *c*; 1841. Nom. p. 190. n. 7227. 1.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 235: g. Anemoninear.
= Euthalictrum DC.

Thalliana „Lour.“ Steud. Nom. II. p. 677 (gen. fam. incertae): vid. *Tralliana Lour.*

Thallisphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 90: g. Sphaeriear. (Sphaeria byssacea, epigaea, etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74 (*Thallosphaera*): g. Stigmaspherar.

*Thallobrya**) Rchb. 1837. Handb. p. 135: formatio Muscor. Fam.: Homalophyllea, Jungermanniacea, Marchantiacea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. Fam.: Ricciaceae, Jungermanniaceae, Marchantiaceae.
= Hepaticae Juss.

Thallogenae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 5: class. I. plant. Nixus: Algales, Fungales, Lichenales.

Thalloidima Massalongo 1853. Mem. Lich. p. 95: nov. g. Lichenum. (Lecidea vesicularis, candida, etc.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 178: g. Psorinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 331: sect. Biatorae.
Arnold 1858. Flora p. 336: g. Psorear.
= Lepidoma Achar., Gray.

Thallophyta Endl. 1836. Gen. p. 1; 1841. Ench. p. 1: regio prima plantar. Sectiones: Protophyta, Hysterophyta. — Par. Unger 1838. Aphor. p. . . . Sect. eaed.
Synon. Anandrae Link; Acotyledoneae Agdh.; Homonemea Fries; Aphyllae Lindl.; Cryptophyta Link.

Thallopsorae Rchb. 1841. Nomencl. p. 15: ordo 3 Lichenum. Subordines: Gasteropsorae, Apotheciopsorae. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 30. Fam.: Lecanorinae, Umbilicarieae, Parmeliaceae.

Thallosphaera Dumort. vid. *Thallisphaera Dumort.*

Thallosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 77: class. (21) Gliosporar. Ord.: Ulvarieae, Confervarieae, Nostocharieae, Diatomarieae.

Thalomostemonis Gleditsch in Mém. Ac. Berl. 1751. p. 112: sphalm. pro *Thalamostemonis.*

Thalycrania Ledeb. vid. *Thelycrania Endl.*

Thalysia Linn. 1735. Syst. nat.; 1736. Fund. bot. p. 244.
= Zea Linn. (Ht. Cliff. p. 437.)

Thamarix Reich. vid. *Tamarix Linn.*

Thamnacantha**) DC. 1837. Prodr. VI. p. 611: sect. Kentrophylli. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3874 *c.* p. 475; 1841. Ench. p. 247.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3895. 3: sect. Centrophylli.

Thamnea „Soland.“ R. Brown 1818. Pl. Abel. Chin. p. 3 (Verm. bot. Schr. I. p. 562): g. Bruniaceae. (Nomen.) — Par. Brongn. 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 386. t. 38. f. 3. — Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4229. — Bartl. 1830. Ord. p. 374. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 49. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 476. — Meisn. 1837.

*) θαλλός, ramus, germen, surculus.
**) θάμνος, frutex.

Thamnea Soland. cont.
Gen. p. 72 (52). — Endl. 1839. Gen. n. 4606. p. 807; 1841. Ench. p. 403. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 159. n. 6208: g. Bruniear.

Thamnia P. Browne 1756. Jamaic. p. 245. t. 25. f. 2: nov. g. Polyandr. Monogyn.
= Laetia Löfl.

Thamnidium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 31: nov. g. Gastromycor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 410.
Nees 1816. Syst. p. 81; 1817. Überbl. p. 21: g. Mucedinum. (vesiculiferor.) — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 80.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Ascophorar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 560: g. Mucoridear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 81: g. Mucorear. — Par. Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 532.
Link 1824. Spec. I. p. 96: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 324. (entosporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 177: g. Mucoreor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 138.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Aspergillacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Mucorinear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 777. n. 4002: g. Mucorum. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 125.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 239: g. Mucoroideor.
= Mucor Mich.?

Thamnium Vent. 1799. Tabl. II. p. 35: nov. g. Algar. (Lichen rangiferinus, roccella etc.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 21.
= Cenomyce Achar., etc.

Thamnium Fries 1825. Pl. homon. p. 234: sect. Usneae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 410 *a*. (ibid. p. 22 n. 409 *a*: sect. Everniae.)

Thamnium Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 223: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 708: sect. Coilostigmatis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4298 *b*. 752; 1841. Ench. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4900. 1.

Thamnium Schimp. 1852. Bryol. eur. V. (Fasc. 48): nov. g. Hypnacear. (Hypnum alopecurum.)
= Flabellaria C. Müll.

Thamnoblasti Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. XX. 1: ordo Lichenum heteromericor. Fam.: Usneaceae, Cladoniaceae, Ramalineae, Sphaerophoreae.

Thamnocarpus Kütz 1843. Linnaea XVII. p. 107; 1843. Phycol. gener. p. 450; 1849. Sp. Alg. p. 886. n. 593: g. Plocamiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XII. p. 544: g. Delesseriear.
Synon. Plocamium Harv.

Thamnocarpus Harvey 1844. Lond. journ. bot. (Hook. Ic. III. P. 2. t. 662.)
= Carpothamnion Kütz.

Thamnocaula Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 203: subg. Gesnerae. (G. tricolor.)

Thamnochorthus Spach vid. *seq.*

Thamnochortus Berg. 1767. Fl. cap. p. 353. t. 5.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 186; 1825. Syst. I. p. 187. n. 210: g. Restiacear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 271. — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41 (*Tamnochortus*). — Endl. 1837. Gen. n. 1019. p. 122; 1841. Ench. p. 67; 1842. Spl. II. p. 11. — Kunth 1841. Enum. III. p. 428. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1509. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 258.
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Restionear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1139. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. — Bartl. 1830. Ord. p. 36. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139 (*Thamnochorthus*).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 47. n. 219: g. Restiear.

Thamnoclonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 392; 1849. Sp. Alg. p. 793. n. 535: nov. g. Chaetangiear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108.
Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 56: g. Sphaerococcoidear.
Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 185: g. Polyphacear.?
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 696: g. Chondriear.

Thamnolia Achar. 1819 in litt. ad Schärer.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 103: sect. Everniae.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 243 in App.: g. Lichenum fruticulosor.
Massal. 1856. Flora I. p. 231: g. Cladoniacear.
= Pycnotheliae Dufour pars. (Rabenh. Krypt. II. 1. p. 110.)

Thamnomyces Ehrenb. 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 79. t. 17. f. 1: nov. g. Sphaeriar. *Cf.* Flora 1821. II. p. 518.
Fries 1821 in Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Sphaerophoror.
Fries 1825. Pl. homon. p. 297: g. Rhizomorphear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 778. n. 4009.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 136. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 382. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. — Bonord. 1851. Hdb. p. 268. — Bail 1858. Syst. p. 53. t. 17. (stromaticor.)
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 416. n. 3467: g. Myelomycetum desciscent.
Leman 1828. Dict. v. 53. p. 411: g. Hypoxylear.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 97: g. Rhizomorpheor.

Thamnomyces Ehrenb. cont.
Fries 1830. Linnaea V. p. 534: g. Pyrenomycetum.
Mont. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 75. t. 4. f. 4.
Endl. 1836. Gen. n. 389. p. 33; 1841. Ench. p. 19: g. Strigulinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 294.
Math. 1853. Belg. II. p. 223: g. Sphaeriacear.

Thamnophora Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 225 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. Alg. p. XXXIV. 240: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 412. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 332. — A. Cuningh. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 329. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 400. — Menegh. 1838. Cenni p. 38.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 334. n. 3404; 1831. Gen. II. p. 750. n. 3801: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 96. p. 8; 1841. Ench. p. 6. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 54.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 495: g. Sphaerococcear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 86: g. Chromatophycoidear.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 9; 1842. Alg. medit. p. 68: g. Delesseriear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 52. n. $122/_{84}$. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 193. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XII. p. 545.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 742: g. Plocamiear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 107; 1843. Phyc. gen. p. 450; 1849. Sp. Alg. p. 887. n. 594. (restrict.) — Nägeli 1847. Alg. Syst.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Thamnophorear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Delesseriar.

Thamnophoreae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Ptilota, Plocamium, Alsidium, Thamnophora.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear. (*Flocamieae Kütz.* 1843.)

Thamnopteris Presl 1836. Pterid. p. 105: sect. Asplenii.
Endl. 1841. Spl. I. n. 630 *a α*. p. 1348; 1841. Ench. p. 36: subsect. Asplenii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1015. 1 *α*.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
= Neottopteris Smith.

Thamnopteris Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 84: g. Caulopteridear., Osmundae regali aff.

Thamnosma Torr. & Frem. report. App. C. p. 313 (Duchartre Rev. bot. II. p. 53): nov. g. Xanthoxylo aff.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 160: g. Zanthoxylear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 101. n. $5971/_{1}$.

Thamnosycea Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 453: sect. Ficus. (F. nemoralis Wall.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 723.

Thamnoxys Endl. 1840. Gen. n. 6058 *l*. p. 1172; 1841. Ench. p. 624: sect. Oxalidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7728. 11.

Thamnus Link vid. *Tamnus Tourn.*

Thamnus Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 235: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.
Endl. 1839. Gen. p. 752. n. 4302 *b*: sect. Simochili.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 703: sect. Simocheili. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4302 *b*. p. 1411; 1841. Ench. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4896. 2.
Synon. Thoracosperma Klotzsch.

Thanatophyton Gray vid. *seq.*

Thanatophytum*) Nees 1816. Syst. p. 148; 1817. Überbl. p. 38: stirps Sclerotii.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 590 (p. 588 *Thanatophyton*): g. Sclerotidear.
Fries 1828. Elench. II. p. 45: trib. Rhizoctoniae.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 97: g. Orthomycetum.
Endl. 1836. Gen. n. 289 *b*. p. 24; 1841. Ench. p. 16: sect. Rhizoctoniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 325. 2.

Thapsandra Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 40: nov. g. Euscrophularinear., pro Celsia cretica et affinibus indicatum.
= Arcturus Benth.

Thapsia**) Tourn. 1700. Inst. p. 321. t. 171: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 80. n. 229; 1737. Cliff. p. 105; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 261; 1759. Syst. ed. X. p. 962. n. 323; 1762. Sp. ed. II. p. 375; 1764. Gen. ed. VI. p. 144. n. 361; 1767. Syst. ed. XII. p. 216. n. 358: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 239; 1784. Syst. p. 290. — Reich. 1778. Gen. p. 146. n. 391. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 193. n. 493. — Gmel. 1791. Syst. p. 489. — Pers. 1797. Syst. p. 307. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1464. n. 557; 1809. En. p. 320.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 57. n. 235: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 101. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 322. n. 717.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Crantz 1767. Cl. Umb. p. 63. — Scop. 1777. Intr. p. 113. — Juss. 1789. Gen. p. 220. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 13. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 467. — DC. 1805. Franç. IV. p. 342. — Hedw. 1806. Gen. p. 203. n. 835. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 90. (Divis. 1.) — Link 1821. En. I. p. 283. — Lois. 1828. Dict. v. 53. p. 413. — Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Adans. 1763. Fam. II. p. 100: g. Pastinacar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 88. t. 21. f. 6 (villosa).
Neck. 1790. El. I. p. 181. n. 304 (*Tapsia*): g. Scadiophytor.

*) *θάνατος*, mors.
**) Nomen ex Plinio, a Thapso insula.

Thapsia Tourn. cont.
Spreng. 1813. Umbell. prodr. p. 17.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 643; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIX. 611; 1825. Syst. I. p. 917. n. 1088; 1830. Gen. I. p. 227. n. 1189: g. Selinear.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 74: g. Thapsiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3692; 1832. Fl. exc. p. 451; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142. n. 5494. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — DC. 1830. Pr. IV. p. 202. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 349. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). — Endl. 1839. Gen. n. 4490. p. 784; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 974. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 113. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 679. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 545.
Link 1829. Hdb. I. p. 326: g. Pimpinellear.
Tausch 1834. Flora I. p. 346: g. Laserpitiear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Thapsidar.

Thapsia Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 184: g. Umbellatar.
= Cymopterus Rafin.

Thapsiae Endl. Gen. p. 784: vid. *Thapsieae Koch.*

Thapsidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: trib. Apiacear. Gen. Thapsiear. DC.

Thapsieae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 73: trib. 1 Umbelliferar. Gen.: Laserpitium, Thapsia, Melanoselinum, Artedia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIV: div. Umbelliferar. Gen. ead. et Siler.
Rchb. 1828. Consp. p. 142: subdiv. Umbelliferar. genuinar. alatar. Gen.: Palimbia, Siler; Laserpitium, Prangos, Thapsia, Melanoselinum; Artedia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: trib. Pterospermar. Gen.: Thapsia, Laserpitium, Melanoselium.
DC. 1830. Pr. IV. p. 202: trib. Orthospermar. Gen.: Thapsia, Cymopterus, Laserpitium, Lophosciadium, Melanoselinum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 349. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 310. Ed. II. p. 340. (Gen.: Laserpitium.) — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). Gen. ut DC. — Endl. 1839. Gen. p. 784; 1841. Ench. p. 379. Gen. ead. Accedit 1850. (Spl. V. p. 12) Polylophium. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. ead.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 449; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142: sect. Platyspermar. Gen. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 113: trib. Orthospermear. Gen.: Thapsia, Laserpitium.

Thapsium Rchb., Dietr., Walp. vid. *Thaspium Nutt.*

Thapsus Gaudin 1828. Fl. Helvet. II. p. 115: sect. Verbasci. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 383. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 48. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 225. — Ledeb. 1849. Ross. p. 193. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 719. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 548.

Thaspium*) Nuttall 1818. Gen. Amer. I. p. 196: nov. g. Umbellatar. (Smyrnium atropurpureum Lam.) — Par. Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 415.
DC. 1830. Pr. IV. p. 153: g. Seselinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 315. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220 (*Thapsium*); 1841. Nom. p. 140. n. 5430. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4438. p. 776; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; 1840. II. p. 958 (*Thapsium*). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 615. — Walp. 1843. Rep. II. p. 403 (*Thapsium*).
Tausch 1834. Flora p. 345: g. Angelicear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Thaumaleocystis**) Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 79: nov. g. Coccochloridear. (Coccochloris deusta Men.) *Cf.* Flora 1849. II. p. 612.

Thaumaleorhabdium***) Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: nov. g. Striatellear. (Fragilaria unipunctata Lyngb.)

Thaumasia†) Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXIII. 195: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1828. Dict. p. 53. p. 416.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 243. n. 3408: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 103. p. 9; 1841. Ench. p. 6.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 a. n. 490 b: g. Sphaerococcear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 86: g. Chromatophycoidear.
Menegh. 1838. Cenni p. 40: g. Thaumasiear. (?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 751.
Endl. 1843. Spl. III. p. 50. n. $122/_{78}$: g. Algar. penitus dubium. (Sp. prima: Th. ovalis, vix planta est, altera: Th. flava, Dictyuro affinis vel congener.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Anomalophyllear.?
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Claudeinear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XII. p. 546: inter Florideas dubiae affinitatis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 888: utramque speciem regno animali adscribit.

Thaumasia Harvey . . . . in Hook. Ic. pl. t. 518.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 888: g. dubium Algar.

Thaumasieae Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 40: fam. Algar.? Gen.: Thaumasia.
Rchb. 1841. Nom. p. 21: subdiv. Polyidear. Gen. id.

Thaumatopteris††) Göppert 1841. Gatt. foss. Pfl. I. p. 1. t. 1—3: nov. g. Filicum foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 80.

---

*) „Nomen ab insula Thaspia, ob affinitatem cum Thapsio Auct.“
**) *θαυμαλέος*, mirabilis; *κύστις*, vesica.
***) *ῥαβδίον*, virgula.
†) *θαυμάσιος*, mirabilis.
††) *θαῦμα*, prodigium.

Thaumatopteris Göppert cont.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 76; 1846. Chlor. prot. p. XLIII: g. Pecopteridum.
Synon. Phlebopteris Münst.

Thaumuria Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 502: nov. g. Parietariear. (Parietaria cretica L.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2499. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25.
Endl. 1837. Gen. n. 1885 c. p. 285; 1841. Ench. p. 170: sect. Parietariae. — Par. Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 210. — Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 250.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear.

Thea*) Linn. 1737. Gen. p. 154. n. 434; 1737. Cliff. p. 204; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 515; 1759. Syst. ed. X. p. 1076. n. 593; 1762. Sp. ed. II. p. 734; 1764. Gen. ed. VI. p. 269. n. 668; 1767. Syst. ed. XII. p. 365: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 412; 1784. Syst. p. 495. — Reich. 1778. Gen. p. 274. n. 726. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 361. n. 911. — Lour. 1790. Coch. I. p. 338. — Gmel. 1791. Syst. p. 821. — Pers. 1797. Syst. p. 531; 1807. Ench. II. p. 73. n. 1306. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1180. n. 1047.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 137: g. pl. class. V.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 116. n. 478: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Coadunatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 453.
Letts. 1772. Monogr. (Lond. 4.)
Scop. 1777. Intr. p. 264: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 262: g. Aurantiis et Meliis aff. — Simil. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 37.
Neck. 1790. El. III. p. 393. n. 1839: g. Catizophytor.?
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 83. t. 95.
Mönch 1794. Meth. p. 455: g. Petalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 158: g. Hesperidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 53.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. Déc. p. 382: g. Theacear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 442. — D. Don 1825. Nepal. p. 224. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 417. — Nees 1833 in Sieb. Nipp. Arch. II. p. 12. *Cf.* Flora Litt. IV. p. 143.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 803: g. Sidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: g. Camellidiar.
DC. 1824. Pr. I. p. 530: g. Camelliear. — — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 603. n. 1942; 1830. Gen. I. p. 437. n. 2163. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1837. Hdb. p. 302; 1841. Nom. p. 209. n. 7932. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 578. — Endl. 1840. Gen. n. 5426. p. 1023; 1841. Ench. p. 532. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 262. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 546.
Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 415: g. Ternströmiacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 41 (31). — Brongn. 1843. En. genr. p. 75. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5399: g. Ternströmiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 335: g. Camelliacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 347. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 90.
Synon. Tsia Adans.; Theaphylla Rafin.

Theaceae Mirbel 1813. Bull. soc. philom. Déc. p. 381: fam. ab Aurantiis Juss. disjuncta. Gen.: Thea, Camelia.
Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 442; 1828. Dict. v. 53. p. 431: ordo plant. Gen.: Thea, Camellia.
Nees 1833 in Sieb. Nippon Arch. II. p. 12: fam. Ternströmiaceis aff. Gen. ut Juss. et Sasanqua. *Cf.* Flora Lit. IV. p. 142.
Conf. Camellieae DC.

Theaceae D. Don 1825. Fl. Nepal. p. 224: ordo plant. Gen.: Camellia, Thea, Ternströmia, Gordonia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV: fam. Capsularium. Divis.: Ternströmieae, Gordonieae, Camellieae, Chlaenaceae.
Rchb. 1828. Consp. p. 207; 1832. Fl. exc. p. 826; 1837. Hdb. p. 300; 1841. Nom. p. 207: fam. Tiliiflorar. Divis.: Hippocrateae, Celastreae, Ternströmieae.

Theales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 19: nixus Calycosar. Ordo unicus: Ternströmiaceae.

Theaphylla*) Rafin. 1832 in Loud. Gard. Mag. VIII: novum nomen pro *Thea* propositum. (Linnaea VIII. Litt. p. 71.)

Thebesia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 313. n. 1089: nov. g. Acascophytor., ab Adonide L. sejunctum.
= Knowltonia Salisb.?

Thecacoris**) A. Juss. 1824. Euphorb. p. 12. t. 1: nov. g. Euphorbiacear. (Acalypha glabrata Vahl.) *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 147. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 433.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5090; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7439: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5871. p. 1123; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 605: g. Wielandiidear.

Thecanthes Wikström 1818. Act. Holm. p. 271.
Agdh. 1826. Aphor. p. 233: g. Thymelear.

---

*) Nomen barbarum, sed servatum quia e graeco derivari potest, cum haec herba divina facta sit fere omnibus nationibus. (Ht. Cliff.)

*) folium divinum.

**) „Nomen a loculis antherarum distinctis." (χωρίς, separatim.)

Thecanthes Wikström cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1772 (*Thecanthus*): g. Daphnear.
Bartl. 1830. Ord. p. 115 (*Thecanthus*): g. Thymelaear.
Endl. 1838. Gen. n. 2098 *a*. p. 331; 1841. Ench. p. 209: sect. Pimeleae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2429. 1. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. p. 496.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 60. n. 2093 *A*. *α*: subsect. Calyptridii.

Thecanthus Rchb., Bartl. vid. *praeced.*

Thecaphora Fingerh. 1835. Linnaea X. p. 230: nov. g. Fungor. (Th. hyalina, aurantiaca et pallescens.)
L. R. & Ch. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 107 (Flora 1849. I. p. 270): g. Ustilaginear. verar.
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 373 (Flora 1849. p. 278); 1849 in Orb. Dict. XII. p. 787: g. Uredinear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 516: g. Ustilagineor.

Thecaria Fée 1824. Ess. crypt. écorc. p. 97: nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 434.
Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 536: g. Endocarpear.

Thecaspermae Link 1841. Fil. hort. Berol. p. 4. 152: div. quarta Filicum. Ordo: Hymenophylleae.

Thecasporei Léveillé (1846. Consid. mycol.) 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: div. II. Fungor. Subdivis.: Ectotheci, Endotheci.
Bail 1858. Syst. Pilz. p. 4. 41: series Fungor. Ordines: Gymnothecamycetes, Discomycetes, Pyrenomycetes, Gasteromycetes.

Thecaspori Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 39: class. Fungor. Fam.: Pezizoidei, Sphaeriacei.

Thecocarpus Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 93: nov. g. Echinophorear. (Th. meifolius.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 13. n. $4522/_1$.
Walp. 1846. Rep. V. p. 913: g. Smyrnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.

Thecostele Rchb. 1857. Bonplandia V. p. 37: nov. g. Orchidear.

Thedenia Fries (mss.?): novum nomen pro Jungermannia Blyttii Mörk propositum. *Cf.* Angstr. 1844. Nov. Act. Ups. XII. p. 380.
= Pallavicinius Gray.

Thedenia Schimp. 1852. Bryol. eur. Fasc. 49: nov. g. Hypnacear., serius Pylaisaeacear.
Schimp. 1853. Nya Botan. Notiser p. 49: g. inter Leskeam et Pylaisaeam ordinandum.

Theinae Link 1822. Enum. II. p. 73.
= Camellieae DC.

Theis Salisb. mss.
= Anthodendron Rchb.

Theka „Rheede Malab. IV. p. 57. t. 27" Adans. 1763. Fam. II. p. 445: g. Cistor. *Cf.* Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 184.
Juss. 1789. Gen. p. 108: g. Viticum.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 248: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 441 (*Teck*).
= Tectona Thunb.

Thela*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 119. Ed. Willd. p. 146: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Th. coccinea et alba.) — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 129. n. 645. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 622.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 482: g. Plumbaginear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIV. 490. n. 790. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 668. n. 725. (?) — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 436.
Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1918: g. Dentellariear.?
= Plumbago Tourn.?

Thelactis Martius 1821. Nov. Act. Leop. X. p. 506.' t. 46. f. 4—7: nov. g. Fungor., Mucori aff. *Cf.* Flora 1822. p. 428 et Leman 1828. Dict. v. 53. p. 437.
Link 1824. Spec. I. p. 97: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 532: g. Mucorear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Aspergillacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 240: g. Mucoroideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 17; 1842. Mycol. p. 69: g. Mucoroidear. (verar.) — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 139.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 487: subg. Mucoris?
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493 (*Theleactis*): g. Mucorineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 125: g. Mucorum.

Thelaia Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 33: nov. g. Pyrolear. Subgen.: Radia, Euthelaia.
= Orpheus Gray.

Thelasis**) Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 385. f. 75: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 253: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1506. p. 208; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2111. — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 186. Subgen.: Phreatia. — Miq. 1858. Ind. bot. III. p. 700.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Synon. Euphrobosces Griff.

Theleactis Lév. vid *Thelactis Mart.*

Thelebolei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 403: div. Perisporiaceor. Gen.: Thelebolus, Dacryobolus.

Thelebolideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 531 (p. 508 *Theleobilideae*): div. Sarcothalamear. Gen.: Thelebolus.

Thelebolus Tode 1790. Meckl. I. p. 41. t. 5. f. 56: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 440. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1461 (*Theleobolus*).
Pers. 1797. Tent. p. 16 (*Thaelaebolus*) et p. 58: g. Sarcothecii.

---

*) θηλή, papilla: a calyce papilloso.
**) θηλάζω, sugo.

Thelebolus Tode cont.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 116: g. Sarcocarpor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46 (*Telebolus*).
DC. 1805. Franç. II. p. 271: g. Angiocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 319; 1817. Überbl. p. 85: g. Myelomycor.
Mart. 1817. Erlang. p. 498: g. Myelomycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 531: g. Thelebolidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83 (*Telebolus*): g. Sphaeriacear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 81; 1829. Anal. fam. p. 74: g. Carpobolear. — Par. Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 561.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 305; 1825. Pl. homon. p. 132; 1828. Elench. II. p. 50: g. Carpobolor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 214. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 26; 1842. Mycol. p. 106. — Bonord. 1851. Hdb. p. 231.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 519. n. 3496; 1831. Gen. II. p. 770. n. 3950: g. Geogasterum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 764: g. Pyrenomycetum sphinctrostomor.
Endl. 1836. Gen. n. 338. p. 29; 1841. Ench. p. 17: g. Carpoboleor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 402. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 304. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Nidulariaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 403: g. Theleboleor.
Math. 1853. Belg. II. p. 397: g. Carpobolinear.

Thelecarpaea DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 27: sect. Proustiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3790. 3.
= Leucoryphe Endl.

Thelenella Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 15: nov. g. Endocarpear. (Verrucaria sphaeroides Wallr.?) *Cf.* Flora 1854. p. 236.

Theleobilideae Gray vid. *Thelebolideae.*

Theleobolus Gmel. vid. *Thelebolus Tode.*

Theleophyton Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 279: sect. Atriplicis. (A. crystallina Hook.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 875 (*Theleophytum*).
Endl. 1847. Spl. IV. p. 39: g. Atriplicear.? — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 115.

Theleophytum Wittst. vid. *praeced.*

Thelephium Mirbel Élém. II. p. 898: vid. *Telephium.*

Thelephora Ehrh. . . . . Crypt. p. 178.
Roth 1788. Fl. germ. I. p. 538 (*Thaelaephora*): g. Fungor. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1440 (*Thaelaephora*). — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 26. 352 (*Thaelaephora*).

Thelephora Ehrh. cont.
— Link 1809. Berl. Mag. III. p. 39 (primae seriei).
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 565: g. Gymnodermatum. Sect.: Craterella, Stereum, Corticium. — Par Rebent. 1804. Neom. p. 379. — Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105 (*Telephora*).
DC. 1805. Franç. II. p. 193; 1815. V. p. 31: g. Gymnocarpor. Sect. ut Pers.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 51: g. Hymenothecior.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 150; 1818. II. p. 275. Sect.: Otites, Corticium.
Nees 1816. Syst. p. 236; 1817. Überbl. p. 62: g. Pileator. Sect.: Omphalia, Pleuropus, Apus, Resupinata. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 457. — Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Fries 1821. Syst. myc. I. p. 428; 1828. Elench. I. p. 156. Trib.: Mesopus, Pleuropus, Merisma, Apus, Resupinatus. Subgen.: Stereum, Phylacteria, Lejostroma, Himantia. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 966. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 484; 1831. Gen. II. p. 764. n. 3905. Sect.: Mesopus, Pleuropus, Merisma, Stereum, Resupinata, Himantia.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 18: g. Pezizar.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 110: g. Thelephoreor. Sect.: Polypilus, Phylacteria, Epibryus, Stereum, Corticium. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182. — — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: g. Papillariar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 577: g. Agaricear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 81; 1838. Epicr. p. 534; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 330: g. Auricularinor. Tribus: Mesopus, Pleuropus, Merisma, Apus, Phylacteria. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 437. p. 38; 1841. Ench. p. 21. Sect.: Leiostroma, Terana, Himantia, Coniophora, Phellina, Auricularia, Phylacteria, Stereum, Merisma, Craterella. — Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 51; 1842. V. p. 41. 82; 1842. Mycol. p. 175. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 375. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 386. Sect.: Leiostroma, Himantia, Apodum, Auricularia, Stereum, Thelephora. — Fries 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 136. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 152. — Bonord. 1851. Hdb. p. 161 (*Telephora*). Sect.: Himantia, Stereum; Polypilus; Phylacteria. — Bail 1858. Syst. p. 21. t. 28.
Leman 1828. Dict. v. 53. p. 442: g. Sarcomycor. Sect. ut Pers. 1822.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 327: g. Auricularior. Sect. ut Fries 1825.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Thelephorear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 561: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 462: g. Hydneor.

Thelephora Ehrh. cont.
Math. 1853. Belg. II. p. 313 (*Telephora*): g. Auricularinear. Sect.: Leiostroma, Phylacteria, Stereum, Corticium.
Synon. Zonaria Rouss.; Hyphoderma Wallr.; Actinostroma Klotzsch.

Thelephoreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73 (sph. *Terephoreae*): trib. Agaricinear. Gen.: Thelephora, Coniophora, Phlebia.

Thelephorei Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 109: div. Sarcomycor. Gen.: Thelephora, Coniophora, Merisma.
Link. 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: div. Sarcomycetum. Gen.: Thelephora, Stereum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: sect. Idiomycetum. Gen.: Craterellus, Thelephora, Leptochaete, Hymenochaete, Coniophora, Hypochnus, Cladoderris, Cora, Cyphella.

Thelephorideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 598. 652: div. Hymenothecear. Gen.: Craterella, Stereum, Corticium, Merisma.

Thelepogon*) „Roth mss." Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 46. 788. n. 354: nov. g. Triandr. Digyn., Rottbölliae aff. (Th. elegans.) — Par. Roth 1821. Nov. spec. p. 62.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 299. n. 312: g. Graminear.
Rchb. 1828. Consp. 52. n. 975: g. Saccharinar. (et p. 47. n. 827 inter Ophiureas.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31 (et p. 29 inter Hordeaceas).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 66. n. 321: g. Graminum.
Kunth 1833. Agrost. p. 519: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 953. p. 108; 1841. Ench. p. 60. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141 (*Telopogon*). 414. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1334. — Meisn. 1843. Gen. p. 429 (328). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.

Thelepora Fries 1847 in Hornsch. skand. Beitr. II. p. 338: nov. g. Hymenomycetum, inter Polyporum et Hydnum intermedium. (Bot. Zeit. 1848. p. 340.)
Conf. seq.

Theleporus Fries 1849. Kongl. Vet. Handl.; 1850. Flora I. p. 124: nov. g. Hymenomycetum, Merulio aff. (Griseb. Jahresber. p. 349.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 325: g. Polyporeor.

Thelesperma Lessing 1831. Linnaea VI. p. 511: nov. g. Helianthear. (Th. scabiosoides.)
Less. 1832. Syn. p. 234: g. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 633. — Endl. 1838. Gen. n. 2569. p. 418; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3175. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19: g. Coreopsidear.

*) θηλή, papilla; πώγων, barba.

Thelesperma Lessing cont.
A. Gray 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 252. Sect.: Thelesperma, Cosmidium.
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 109. Nova sect.: Abuceros.

Thelia Sullivant 1856. Musc. Un. St. p....: nov. g. Theliear.
= Anomodon Hook. pt.

Thelichiton Duch. vid. *Thelychiton Endl.*

Thelidium Massalongo 1855. Framm. lich. p. 15: nov. g. Lichenum.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 353: g. Verrucariear. — Par. Arnold 1858. Flora II. p. 554.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 383: sect. Verrucariae.

Thelieae Sullivant 1856. Musc. Un. St. p....: fam. Muscor. Gen.: Thelia, Myurella.

Thelignya Massalongo 1855. Framm. lich. p....: nov. g. Phylliscear., a Körber (1855. Syst. Lich. Germ. p. 395) Collemaceis (exoticis) et (p. 425) Porocypheis adscriptum.

Theligoneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. Urticariear. Gen.: Theligonum.

Theligonis „Hofer" Reuss 1802. Rep. comm. II. p. 21. 194: lege *Theligonum.*

Theligonium Hill vid. *seq.*

Theligonum*) Linn. 1737. Gen. p. 357. n. 893: nov. g. pro *Cynocrambe T.* institutum.
Linn. 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 456. n. 864; 1753. Sp. II. p. 993; 1759. Syst. ed. X. p. 1271. n. 947; 1763. Sp. ed. II. p. 1411; 1764. Gen. ed. VI. p. 494. n. 1098; 1767. Syst. ed. XII. p. 629: g. Monoec. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 716; 1784. Syst. p. 857. — Reich. 1778. Gen. p. 491. n. 1166. — Pers. 1797. Syst. p. 901.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 123. n. 510: g. Thalamostemonum.
Hofer 1755. Act. Helv. II. p. 14.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Amentaceis aff.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Scabridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593.
Hill 1769. Ht. kew. p. 368 (*Theligonium*): g. Monophyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 101: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 405: g. Urticear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 540. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 310. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 110.
Neck. 1790. El. III. p. 117. n. 1454: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 745: g. Dodecandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
DC. 1805. Franç. III. p. 399: g. Chenopodear.
Agdh. 1825. Aphor. p. 220: g. Amaranthacear.
Lois. 1828. Dict. v. 53. p. 452: g. Atriplicear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 611. Ed. II. p. 703.

*) Nomen ex Plinio: θηλύγονον, a θῆλυς, femineus, γόνυ, genu, quare bene correxit Schreber.

Theligonum Linn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Theligonear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 105: g. Tetragoniear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 219: g. Cynocrambear. (Urticeis aff.)
Synon. Cynocrambe Tourn.; Thelygonum Schreb. et Auct.; Theligonis Reuss.

Theliphyllum C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 468: sect. Hypni. Subsect.: Anomodon, Tamariscella.

Thelira Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 72 in Römer Collect. bot. p. 212: nov. g. Rosacear.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 433 (Verm. bot. Schr. I. p. 205): g. Chrysobalanear.
Conf. Thelyra DC.

Thelocalyx Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 92. 189: sect. Droserae. (D. sessilifolia, Burmanni.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 69.

Thelocarpon Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 15. 338 (Flora 1854. p. 236): g. Endocarpear. (*Sphaeropsis Flot.*)

Thelochroa Massalongo. (Nomen pro *Montinia Mass.* substitutum.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 334: g. Verrucariear. (Th. Flotoviana Hepp.)

Thelochroëae Arnold 1858. Flora p. 556: trib. Verrucariacear. Gen.: Porina.

Thelotrema*) Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXII. 130: nov. g. Coenothalamor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 453. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 298.
Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 4. Char. emend.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 43: g. Angiocarpor.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 62. 312; 1814. Syn. Lich. p. 113: g. Phymatoideor.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Verrucariar. — Par. Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 15.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 494: g. Porinidar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Pyrenulatar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 269: g. Limborinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 370.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Verrucariear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 14. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 384.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 742. n. 3760: g. Myelocarpor.
Fries 1831. Lich. eur. p. 7. 427: g. Endocarpor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 392. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 162; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XII. p. 551. — Bayrh. 1849. Taun. p. 95.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 318: g. Pyrenocymatior.
Endl. 1836. Gen. n. 141. p. 13; 1841. Ench. p. 10: g. Limboriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 549.

*) θηλή, verruca; τρῆμα, foramen.

Thelotrema Achar. cont.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Pertusariear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 109: g. Parmeliacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Limboridar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 225: g. Pertusarior.
Math. 1853. Belg. II. p. 153: g. Lichenear. sect. 5.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13 (Flora 1854. p. 235): g. Lecanorear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 330: g. Hymeneliear.
Synon. Hymenoria Ach.; Volvaria DC.; Antrocarpum Meyer; Antrocarpium Link; Anthrocarpum Spreng.; Antrocarpon Rchb.; Pyrenula Fée?; Ascidium Fée?

Thelychiton *) Endl. 1833. Prodr. fl. Norfolk. p. 32: nov. g. Arethusear. (Th. brachypus et macropus.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Endl. 1837. Gen. n. 1616. p. 220; 1841. Ench. p. 114: g. Orchidear. dubiae affinitatis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2191.
Meisn. 1843. Gen. p. 383 (287): g. Euarethusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 169 (*Thelichiton*).

Thelycrania Endl. 1839. Gen. n. 4574 c. p. 798; 1841. Ench. p. 397: sect. Corni. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 378 (*Thalycrania*). — Walp. 1846. Rep. V. p. 932. — C. A. Meyer 1849. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. p. 191 (1844).
Synon. Microcarpium Spach.

Thelygoñum Schreb. 1791. Gen. II. p. 644. n. 1444: g. Monoec. Polyandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 420. n. 1690; 1809. En. p. 973. — Pers. 1807. Ench. II. p. 565. n. 2094.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 314; 1826. Syst. III. p. 866. n. 3130; 1831. Gen. II. p. 696. n. 3513: g. Chenopodear.
Link 1822. En. II. p. 396: g. Atriplicinar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Talinear.
Link 1831. Hdb. II. p. 426: g. Urticear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 588: g. Cliffortiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 243; 1841. Nom. p. 167. n. 6488: g. Cynocrambear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1888. p. 285; 1841. Ench. p. 171. — Meisn. 1841. Gen. p. 345 (256).
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Urticeis aff.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 328: g. Urticacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
= Theligonum Linn.

Thelymitra Forst. 1776. Char. gen. p. 97. t. 49: nov. g. Gynandr. Diandr.
Scop. 1777. Intr. p. 91: g. Satyrior.
Juss. 1789. Gen. p. 65: g. Orchidear. — Par. Swartz 1800. Act. Holm. p. 228. t. 3; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 56. t. 1. f. L.

*) θῆλυς, foemineus, debilis.

Thelymitra Forst. cont.
— St. Hil. 1805. Expos. I. p. 162. — Pers. 1807. Ench. II. p. 511. n. 1986. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 314. Ed. Nees p. 170; 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 198. (Verm. bot. Schr. II. p. 21.) — Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 419. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 710. n. 2962; 1831. Gen. II. p. 661. n. 3329. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 457. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 243.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 79. n. 1599: g. Gynandr. Monandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 294: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1418; 1841. Nom. p. 55. n. 2153. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1586. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 518; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Thelymitridar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1585. p. 113; 1842. Spl. II. p. 21; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 13. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 736.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Thelymitridear.

Thelymitridae Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 442. 518; 1847. Veg. kingd. p. 183: div. Neottear. Gen.: Thelymitra, Epiblema. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.
Endl. 1841. Ench. p. 113; 1842. Spl. II. p. 21: div. Neottiear. Gen. ead.

Thelymitrideae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 387 (289): subtrib. Neottiear. Gen.: Thelymitra, Epiblema.

Thelypodium Endl. 1839. Gen. n. 4915. p. 876; 1841. Ench. p. 450: g. Sisymbriear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 172. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7029: g. Erysimear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
Synon. Pachypodium Nutt. (Non Webb & Berth.)

Thelypogon Spreng., Bartl. vid. *Telipogon HBK.*

Thelypteris*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 322. Ed. Hall. 1745. p. 342: g. Epiphyllospermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 134: g. Filicum. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 20.
= Pteris Linn.?

Thelypteris Presl 1836. Pterid. p. 76: sect. Lastraeae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 639 *c. β.* p. 3149; 1841. Ench. p. 37: sect. Dryopteridis. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1027. 3 *b.*
„Schott" Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Thelyra „Petit-Thouars" DC. 1825. Prodr. II. p. 527: g. Chrysobalanear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4519; 1841. Nom. p. 178. n. 6879. — Bartl. 1830. Ord. p. 406. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 479. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 369. — Meisn. 1837. Gen. p. 102 (72). — Endl. 1840. Gen. n. 6412. p. 1252; 1841. Ench. p. 664.
Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 458: g. Rosacear.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XI. 70: g. Hexandr. Monogyn.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 543: g. Chrysobalanacear.
= Thelira Petit-Thouars.

Thelysia Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 303: nov. g. Iridear. (Iris scorpioides Desf.)
Synon. Scorpiris Spach.

Thelythamnos Spreng. 1828. Tent. suppl. p. 25: nov. g. Syngenesiae. *Cf.* Flora Lit. p. 111 et Wittst. Etym. Handw. p. 876 (*Thelythamnus*).
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2567: g. Amelloidear.?
= Sphenogyne R. Brown.

Thelythamnos Lessing 1832. Syn. Compos. p. 243: subg. Sphenogynes.
DC. 1836. Pr. V. p. 683: subsect. Thelythamni. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2626 *αβ.* p. 427; 1841. Ench. p. 240.

Thelythamnos DC. 1836. Prodr. V. p. 681: sect. Sphenogynes. Subsect.: Anthemoides, Thelythamnos. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2626 *α.* p. 427; 1841. Ench. p. 240. Subsect. eaed.

Thelythamnus Wittst. vid. *Thelythamnos Spreng.*

Themeda*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 178: nov. g. Polygam.
Scop. 1777. Intr. p. 77: g. Graminum legitimor.
Juss. 1780. Gen. p. 447: g. Graminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 157. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 10. 265. n. 206. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 459.
Gmel. 1791. Syst. p. 149: g. Triandr. Monogyn.
= Antisthiria Linn.

Themistoclesia**) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 41: nov. g. Vacciniear. (Ceratostema buxifolium Gardn.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1090.

Thenardia***) HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 209. t. 240: nov. g. Apocynear. (verar.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 285. — Poir. 1828. Dict. v. 53. p. 459. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 146. n. 729.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 636. n. 688: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 653.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3524; 1841. Nom. p. 133. n. 5154: g. Echitear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3415. p. 584; 1841. Ench. p. 295. —

*) Nomen ex Plinio: θηλυπτερίς, i. q. filix femina.

*) *Thaemed* Arabum.
**) Themistocles dux Atheniensium.
***) Dicat. L. J. Thenard, chemico.

Thenardia HBK. cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (173). — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 425. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 473.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 80: g. Echitiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Thenardia Fl. mexic. ic. ined. teste DC. Prodr. III. p. 108.
= Rhynchantherae DC. spec.

Theobroma*) Linn. 1737. Gen. p. 351. n. 881; 1740. Syst. p. 28: g. Polyadelph. Decandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 513. n. 1215. — Gmel. 1791. Syst. p. 1151. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1422. n. 1388.
Linn. 1737. Cliff. p. 379; 1742. Gen. ed. II. p. 367. n. 734; 1753. Sp. II. p. 782; 1759. Syst. ed. X. p. 1183. n. 806; 1763. Sp. ed. II. p. 1100; 1764. Gen. ed. VI. p. 391. n. 900; 1767. Syst. ed. XII. p. 508: g. Polyadelph. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 580; 1784. Syst. p. 696. — Reich. 1778. Gen. p. 388. n. 972. — Pers. 1797. Syst. p. 735.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 236. n. 973: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Malvar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 284. — Gis. 1792. Prael. p. 453.
Juss. 1789. Gen. p. 276: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 194. — Desportes 1804. Dict. v. 6. p. 30 (*Cacaoyer*). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 68. — Pers. 1807. Ench. II. p. 238. n. 1619. — Link 1822. En. II. p. 271.
Neck. 1790. El. II. p. 434. n. 1263: g. Comizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 20: g. Festivar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 808; 1826. Syst. III. p. 332. n. 2610; 1831. Gen. II. p. 601. n. 2966: g. Büttnerear.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 315: g. Büttneriacear. (verar.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 267. — Link 1831. Hdb. II. p. 351.
DC. 1824. Pr. I. p. 484: g. Byttneriear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 521. — — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 64. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 477. — Boit. 1849 in Orb. Dict. III. p. 4 (*Cacoyer*).
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 147: g. Buttneriear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: g. Byttneriacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5298; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7718: g. Theobromear.
Bartl. 1830. Ord. p. 342: g. Büttneriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 32 (26). — Endl. 1840. Gen. n. 5333. p. 998; 1841. Ench. p. 519. — Walp. 1842. Rep. I. p. 339.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 183: g. Büttneriar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Byttnerear.
Synon. Cacao Tourn.

Theobromeae Rchb. 1828. Consp. p. 204 (1832. Fl. exc. p. 775): subdiv. Byttneriear. Gen.: Ayenia, Byttneria, Commersonia, Glossostemon, Guazuma, Abroma, Theobroma, Maranthus?
Rchb. 1837. Hdb. p. 292: subdiv. Büttnerear. Gen.; Commersonia, Guazuma, Glossostemon, Abroma, Theobroma.
Rchb. 1841. Nom. p. 202: subdiv. Büttneriear. Gen. ut 1837 et Actinophora?, Pentaglottis?

Theodora*) Medicus 1786. Theod. spec. p. 16: nov. g. e familia Mimosar. (Guajacum afrum L.)
Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 261: g. Cassiear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 91.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear.
Endl. 1841. Gen. n. 6785 *a*. p. 1317; 1841. Ench. p. 674 (*Theodorea*): sect. Schotiae.
Synon. Schotia (sect.) DC.

Theodorea**) Cassini 1818. Bull. soc. philom. p. 168: subg. Saussureae. (S. amara DC.)
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 500. 513; 1828. v. 53. p. 463; 1830. v. 60. p. 570: g. Stähelinear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Carlinear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 536: sect. Saussureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2853 *c*. p. 468; 1841. Ench. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3893. 3. — Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 18.

Theodorea Endl. vid. *Theodora Medic.*

Theodoria Necker 1790. Elem. bot. II. p. 286. n. 1048: g. Synathrophytor.
= Ivira Aubl.

Theophrasta***) Linn. 1737. Gen. p. 45. n. 127; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 149; 1759. Syst. ed. X. p. 920. n. 190; 1762. Sp. ed. II. p. 212; 1764. Gen. ed. VI. p. 84. n. 207; 1767. Syst. ed. XII. p. 153: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 165; 1784. Syst. p. 196. — Reich. 1778. Gen. p. 86. n. 221. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 110. n. 271. — Gmel. 1791. Syst. p. 333. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 58. (Char. emend.) — Pers. 1797. Syst. p. 203. — Willd. 1797. Syst. p. 203. — Willd. 1797. Sp. I. p. 824. n. 307. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 27.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 207. n. 863: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 230: g. Anagallidum.
Scop. 1777. Intr. p. 178: g. Speciosar.

---

*) *βρῶμα τῶν θεῶν*, cum fructus basin sternat potioni delicatissimae, saluberrimae, maxime nutrienti, etc. (Ht. Cliff.)

*) Dicat. Carolo Theodoro, electori Palatinatus.
**) Dicat. Theod. de Saussure.
***) Consecrat. Theophrasto Eresio.

Theophrasta Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 150: g. Apocineis aff. (emend.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 337.
Neck. 1790. El. II. p. 22. n. 640: g. Darinyphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 203: g. Colubrinar.
Pers. 1805. Ench. I. p. 265. n. 601: g. Apocynear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVIII. 187. n. 673.
Hedw. 1806. Gen. p. 99. n. 446: g. Apocinear. — Par. Tussac 1818. Dict. v. 10. p. 333 (*Coquemollier*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 496: g. Carissear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: g. Colubrinear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 670. n. 736; 1830. Gen. I. p. 157. n. 784: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 690.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3607; 1841. Nom. p. 125. n. 4864: g. Theophrastear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 165. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 26. — Endl. 1839. Gen. n. 4229. p. 737; 1841. Ench. p. 359. — Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 378. — A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 143. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 70. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 279.
D. Don 1831. Edinb. n. phil. journ. X. p. 233: g. Myrsinear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 204.
Lindl. 1835. Botan. Regist. XXI. n. 1764: g. Theophrastacear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 145: g. Clavijear.

Theophrastaceae D. Don 1835 in Lindl. Bot. Regist. XXI. n. 1764.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 144: ordo (123) Corolliflorar. Subord.: Theophrasteae, Monotheceae.

Theophrasteae Rchb. 1828. Consp. p. 136: subdiv. Ardisiacear. Gen.: Jacquinia, Theophrasta, Clavija, Leonia.
Bartl. 1830. Ord. p. 165: div. Ardisiacear. Gen.: Jacquinia, Theophrasta, Oncinus.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 225.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 24: ordo Corollaeflorar. Gen. ut Rchb. et Oncinus.
Endl. 1839. Gen. p. 737; 1841. Ench. p. 359: trib. Myrsinear. Gen.: Jacquinia, Theophrasta, Clavija. Accedit 1843 (Spl. III. p. 80) Edgeworthia. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161). Gen. ut Endl. 1839 et Oncinus?, Corynocarpus. — J. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 552. Gen. ut Endl. 1841.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374: trib. Ardisiacear. Gen. ut G. Don.
Rchb. 1841. Nom. p. 125: subdiv. Jacquiniear. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 70: fam. Primulinear. Gen. ead.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 145: subordo Theophrastacear. Trib.: Clavijeae, Jacquinieae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648: trib. Myrsinacear. Gen. Jacquiniear. et Clavijear. DC. et Monotheca, Reptonia, Corynocarpus?

Theophrasteae Rchb. cont.
Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 273: subordo Myrsinear. Gen. ut Endl. 1839.

Theopyxis*) Griseb. 1856. Abh. Gött. Ges. VI. p. 126: nov. g. Primulacear. (Th. chilensis.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 461.

Theorhodon**) Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 470: sect. Magnoliae. (M. grandiflora L.)

Therebintaceae Cassel Nat. Fam. p. 32: vid. *Terebintaceae Juss.*

Therebinthaceae Link vid. *praeced.*

Therebinthineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXIII. 83: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Rutaceae, Diosmeae, Ochnaceae, Simarubeae, Zanthoxyleae, Anacardiaceae, Connaraceae, Burseraceae.

Theresa Clos 1849 in Gay Fl. Chil. IV. p. 496: nov. g. Scutellarinear. (Th. valdiviana).
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 262: g. Stachydear.?

Theresia C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 232: nov. g. Tulipacear. (Fritillaria persica L.) — Par. Boiss. 1853. Diagn. pl. or. II. Nr. 13. p. 20.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 628: g. Liliear.

Theriophonum***) Blume 1835. Rumphia I. p. 127: nov. g. Euaroidear. (Typhonium crenatum Schott.) — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 27. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1370. n. 1678/1 (in Ench. p. 128. Sauromato Schott subjunctum). — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 38.
Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1090: g. Aroidear. genuinar.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 21: g. Arinar. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 196.

Thermia†) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 282: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 348. n. 1644; 1830. Gen. I. p. 364. n. 1836: g. Leguminosar. = Thermopsis R. Brown.

Thermocoelium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phycol. gener. p. 322; 1849. Sp. Alg. p. 529. n. 337: g. Lemaniear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: inter Phycoideas dubias.

Thermophyllum Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 246: sect. Potentillae. (P. Fragariastrum, alba.)
Conf. Fragariastrum Ser.; Geoides et Lupinoides Tausch.

Thermopsis††) R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 3 (Verm. bot. Schr. II. p. 453): nov. g. Leguminosar. (Podalyria lupinoides W.) — Par. Link 1821. En. I. p. 401. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 270. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1501.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 742: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 99. — Rchb. 1828.

*) Nomen ob affinitatem cum Dodecatheo.
**) ῥόδον, rosa.
***) θηριοφόνος, animalia necans.
†) θερμός, calidus.
††) θέρμος, lupinus.

Thermopsis R. Brown cont.
Consp. p. 154. n. 4084. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 111. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 113. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 165. — Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57).
D. Don 1825. Nepal. p. 239: g. Papilionacear.
Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 66: g. Eupodalyriear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6420. p. 1254; 1841. Ench. p. 667. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 510. — Walp. 1842. Rep. I. p. 562. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 431. Sect.: Euthermopsis, Baptisioides. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 387: g. Podalyriear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 126.
Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5913: g. Podaliriear.
Synon. Thermia Nutt.; Scolobus Rafin.

Thermutis*) Fries 1825. Pl. homon. p. 302: nov. g. Coenogonear. (Collema velutinum Ach.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 54. p. 271.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 86: g. Coenogoneor.
Mont. 1842 in Orb. Dict. II. p. 792; 1849. ibid. VII. p. 351; 1849. ibid. XII. p. 554: g. Coenogoniear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 122.
Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 150. 170: g. Byssear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 393: status evol. Ephebes.

Therogeron**) DC. 1836. Prodr. V. p. 283: nov. g. Erigerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2331. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3266: g. Erigeronear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.

Thesanomitrion Math. vid. *Thysanomitrion Schwägr.*

Thesidium Sonder 1857. Flora p. 364: nov. g. Santalacear. (Thesium fragile L. f.)
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 673: g. Thesiear.
Synon. Hagnothesium A. DC.

Thesieae Rchb. 1837. Handb. p. 167: sect. Osyridear.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): trib. Santalacear. Gen.: Quinchamalium, Thesium, Comandra, Octarillum, Myoschilos, Nanodea, Glischrocaryon, Choretrum, Leptomeria, Fusanus, Osyris.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 624: subtrib. Santalear. Gen.: Quinchamalium, Arjona, Myoschylos, Pyrularia, Henslowia, Osyris, Rhoiacarpos, Osyridicarpos, Comandra, Thesium, Thesidium, Nanodea, Choretrum, Leptomeria, Omphacomeria.

Thesiosiris Endl. vid. *seq.*

Thesiosyris Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. 404; 1828. Consp. p. 80. n. 1708 *c*; 1831. Fl. exc. p. 157; 1841. Nom. p. 62. n. 2345. 2: sect. Thesii. (Th. elegans Roch.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2072 *b*. p. 326; 1841. Ench. p. 207 (*Thesiosiris*). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 323.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Santalear.

Thesium*) Linn. 1737. Gen. p. 60. n. 173; 1737. Cliff. p. 41; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 307; 1759. Syst. ed. X. p. 943. n. 258; 1762. Sp. ed. II. p. 301; 1764. Gen. ed. VI. p. 114. n. 292; 1767. Syst. ed. XII. p. 188. n. 289: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 207; 1784. Syst. p. 249. — Reich. 1778. Gen. p. 118. n. 315. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 160. n. 410. — Gmel. 1791. Syst. p. 428. — Pers. 1797. Syst. p. 261; 1805. Ench. I. p. 211. n. 480. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1211. n. 469; 1809. En. p. 273. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 96. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. L. 578. n. 1061. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 12. 235.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 183: g. ord. 3 class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 266. n. 1097: g. Calycostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 75.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Veprecular. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 38: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 371: g. Monophyllar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. p. 485: g. Passerinatar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 113: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 41.
Scop. 1777. Intr. p. 345: g. Seminudar.
Neck. 1790. El. II. p. 208. n. 937: g. Syscllophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 233: g. Elaeagnoidear.
Hayne 1800 in Schrad. Journ. I. p. 28.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Elaeagnear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 351; 1815. V. p. 366. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 271.
Cram. 1803. Disp. p. 22 in Triandr. Monogyn. (Th. alpinum.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 175: g. Eleagnor. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 176. n. 738.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 352. Ed. Nees p. 208: g. Santalacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 155. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 264. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 646. — Agdh. 1825. Aphor. p. 230. — Bartl. 1830. Ord. p. 113. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 157. Sect.: Thesiosyris, Thesium. — Koch 1837. Syn. p. 622. Ed. II. p. 716. — Endl. 1838. Gen. n. 2072. p. 325; 1841. Ench. p. 207. Sect. ut Rchb. 1828. — Kunth 1838. Berol. II. p. 170. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 115. — Webb . . . . Canar. III.

*) „Nomen filiae Pharaonis, Mosen ex aqua tollentis."
**) θέρος, aestas; γέρων, senex.

*) Nomen ex Plinio: θήσιον.

Thesium Linn. cont.
p. 232. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 539. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 65.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 321; 1825. Syst. I. p. 829. n. 946; 1830. Gen. I. p. 205. n. 1044: g. Santalear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 274. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 876. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 322. Sect.: Euthesium, Thesiosyris.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 149: g. Vepreculis proximum.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1708; 1841. Nom. p. 62. n. 2345: g. Osyridear. Sect.: Thesium, Frisea, Thesiosyris.
Link 1829. Hdb. I. p. 372: g. Osyrinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 167: g. Thesiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 338 (240). — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 638. Sect.: Chrysothesium, Euthesium, Aetheothesium, Discothesium, Frisea, Psilothesium.
A. DC. 1857. Esp. nouv. du genre Thes. Sect.: Euthesium, Aetheothesium, Hagnothesium, Discothesium, Frisea. *Cf.* Sonder 1857. Flora p. 353. 401.
Synon. Linosyris Rupp.; Linophyllum Pont.; Rhinostegia Turcz.

Thesium Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1708 *a*; 1831. Fl. exc. p. 157; 1841. Nom. p. 62. n. 2345. 1: sect. Thesii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2072 *a*. p. 325; 1841. Ench. p. 207.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Santalear.
= Euthesium Griseb.

Thespesia*) „Soland. mss.“ Correa 1807. Ann. Mus. IX. p. 290. t. 8. f. 2: nov. g. ex typo Hibisci populnei. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 273 (*Thespezia*).
DC. 1824. Pr. I. p. 455: g. Malvacear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 96. n. 2437; 1831. Gen. II. p. 555. n. 2714. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 486. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 54.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII; 1828. Consp. p. 203. n. 5275: g. Hibiscear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23). — Endl. 1840. Gen. n. 5284. p. 984; 1841. Ench. p. 512. — Walp. 1842. Rep. I. p. 312. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370.
Bartl. 1830. Ord. p. 346: g. Malvear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 387.
Rchb. 1837. Hdb. p. 288; 1841. Nom. p. 200. n. 7650: g. Thespesiear.
Synon. Malvaviscus Gärtn.

Thespesieae Rchb. 1837. Handb. p. 288: sect. Ketmiear. Gen.: Thespesia, Parita, Decaschista.
Rchb. 1841. Nom. p. 200: subdiv. Hibiscear. Gen. ead.

Thespezia Poir. vid. *Thespesia Corr.*

Thespis**) DC. 1833 in Guillem. Arch. bot. II. p. 517; 1836. Prodr. V. p. 375: nov. g. Euconyzear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2401. p. 389; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128).
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3578: g. Conyzear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

*) θεσπέσιος, divinus. (?)
**) „Nomen alludit ad heroëm mythologicum, qui filias 50 protulit.“

Thevenotia*) DC. 1833 in Guillem. Arch. Bot. II. p. 331; 1837. Prodr. VI. p. 551: nov. g. Carlinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2861. p. 470; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 225 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3660: g. Atractylidear.

Thevetia Linn. 1737. Gen. p. 50. n. 143: g. Pentandr. Monogyn.
= Genipa Plum.

Thevetia**) Linn. 1737. Gen. p. 62. n. 177; 1737. Hort. Cliff. p. 75; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 91. n. 214: g. Pentandr. Monogyn., serius Cerberae injunctum. *Cf.* Duchesne 1804. Dict. v. 1. p. 332 (*Ahouaï*) et Juss. 1828. Dict. v. 54. p. 275.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31 (*Tevetia*): g. Contortor.
Juss. 1810. Ann. Mus. XV. p. 346.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3557; 1841. Nom. p. 134. n. 5205: g. Rauwolfiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 205.
Endl. 1838. Gen. n. 3387. p. 580; 1841. Ench. p. 204: g. Ophioxylear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 514. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 51.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 343: g. Thevetiear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 467. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 405.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Carissear.
Synon. Ahouai Tourn.; Ahovai Ludw.; Cerbera Scop.?, Juss.

Thevetia Adans. 1763. Fam. II. p. 171: g. Apocynor.
Scop. 1777. Intr. p. 153: g. Monocarpiar.
Neck. 1790. El. I. p. 264. n. 422: g. Campylophytor.?
= Cerbera Linn.?

Thevetia Flor. Flum. I. t. 151: g. Tetrandr. Monogyn. (pinnata) ex Steud. Nom. II. p. 680.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 54 inter genera nondum descripta.

Thevetieae A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 342: subtrib. Carissear. Gen.: Thevetia.

Theyodis***) Rich. 1847. Fl. abyssin. I. p. 364: nov. g. Hedyotidear. (indescriptum.) Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 772.

Thezera DC. 1825. Prodr. II. p. 72: sect. Rhois. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3850 *d*; 1841. Nom. p. 146. n. 5668. 5. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 75. —

*) Dicat. peregrinatori De Thevenot.
**) Dicat. primo descriptori Thevet, Gallo.
***) Nomen anagr. Hedyotidis.

Thezera DC. cont.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 221. — Endl. 1840. Gen. n. 5905 *d*. p. 1131; 1841. Ench. p. 599.

Thibaudia*) „Ruiz & Par. vol. IV. ined." Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 362: nov. g. Ericar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 321. n. 1265.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 268. t. 254—256: g. Ericear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 322. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 294. n. 1553; 1830. Gen. I. p. 335. n. 1696. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 859. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 276. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1392.
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1974: g. Vaccinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 154: g. Vacciniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 860. — Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 5. t. 9. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 560. — Endl. 1839. Gen. n. 4333. p. 758; 1841. Ench. p. 370. Sect. (1841): Agapetes, Chupalon, Symphysia. — Meisn. 1839. Gen. p. 243 (151). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 522. — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4924. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Walp. 1843. Rep. II. p. 723; 1852. Ann. bot. II. p. 1089. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 39. (restrict.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 758: g. Vacciniacear.
Synon. Chupalon Adans.; Hornemannia Vahl.

Thiebaudia „Colla" Wittst. vid. *seq*.

Thiebautia Colla 1824. Hort. Ripul. (Linnaea IX. Litt. p. 54): nov. g. ex typo Limodori purpurei. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 877 (*Thiebaudia*).
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 278: g. Orchidear.
= Bletia Ruiz & Pav.

Thieleodoxa**) Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 251: nov. g. Gardeniacear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 524.
Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115): g. Gardeniear.
Endl. 1838. Gen. n. 3319. p. 564 (*Thileodoxa*); 1841. Ench. p. 275: g. Rubiacear. dubiae tribus. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2978 (*Thileodoxa*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765 (*Thileodoxa*): g. Gardenidar.

Thiga Molin ...
= Pavonia Ruiz.

Thilachium***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 342. Ed. Willd. p. 417: nov. g. Polyandr. Monogyn. (Th. africanum.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 279.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 475: g. Capparidear.
Synon. Beautia Comm. *Conf. Thylachium et Thylacium.*

*) Dicat. Thibaud de Chauvalon, botanico gallico.
**) Dicat. Frid. Leop. Thiele.
***) *θυλάκιον*, folliculus; a calyce floris folliculari.

Thilco Feuillé Obs. III. p. 64. t. 49. *Cf. Tilco Adans.*
= Fuchsia Spach.

Thileodoxa Endl., Rchb., Lindl. vid. *Thieleodoxa Cham.*

Thimus Neck. vid. *Thymus Linn.*

Thinogeton*) Benth. 1844. Bot. voy. Sulph. p. 142.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 615 (*Trinogeton*): g. Solanear.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166: g. Hyoscyamear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 483: g. Lycinear.
Miers . . . . Ill. South-Am. II. 52—55. Char. reform. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 573.
Synon. Streptostigma Regel.

Thiodia Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 192 in adnot.: nov. g. Flacourtianear. (Prockia serrata W.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 5072/1. p. 1421; 1841. Ench. p. 479: g. Prockiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7199.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 589: g. Bixacear.
Meisn. 1843. Comm. p. 342: g. Bixinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Prockear.
Synon. Aphloia DC.; Lightfootia Swartz.

Thisantha**) Ecklon & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. austr. III. p. 302: nov. g. Crassulacear. (Crassula glomerata L.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Umbilicear.
Endl. 1839. Gen. n. 4612. p. 810; 1841. Ench. p. 405: g. Rochear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6179. — Walp. 1846. Rep. V. p. 792.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1034: g. Sedear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346: g. Crassulear.

Thismia***) Griffith 1845. Ann. and Mag. XV; .... Linn. Trans. XIX. (Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 347): novum gen. inter Tacceas et Burmanniaceas. (Th. Brunoniana.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 813.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 92: g. Cytinacear.
Miers 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: g. Thismiear.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 615: g. Thismiacear.

Thismiaceae Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 615: ordo Monocotyledonum. Gen.: Thismia.

Thismieae Miers 1847. Gard. Chron. Nr. 19 (Bot. Zeit. 1847. p. 735); 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: trib. Burmanniacear. Gen.: Thismia, Ophiomeris.
Planch. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 319. Nov. gen.: Stenomeris.

Thladiantha †) Bunge 1831. En. pl. Chin. bor. p. 29; 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p.

*) *θίν* s. *θίς*, cumulus, desertum arenosum.
**) *θίς*, cumulus.
***) Anagr. nominis Thomae Smith.
†) *θλαδίας*, compressus.

Thladiantha Bunge cont.
103: nov. g. Cucurbitacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5151. p. 940; 1841. Ench. p. 491. (penitus dubium.) *Cf.* Walp. 1846. Rep. V. p. 763. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 19. 109.
Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91): g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3971 (dubium).

Thlaspi*) Tourn. 1700. Inst. p. 212. t. 101: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 76. Ed. Hall. 1745. p. 85: g. pl. class. IV.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 123. t. 6.
Neck. 1790. El. III. p. 90. n. 1415: g. Brachytophytor.
Medic. 1792. Pflanzengatt. I. p. 76; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 43: g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen*).
Mönch 1794. Meth. p. 268: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 110: g. Alyssoidear.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 486: g. Siliculosar. — Par. Gaud. 1829. Helv. IV. p. 187. 218. Sect.: Hutchinsia, Thlaspi. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 656.
DC. 1805. Franç. IV. p. 709: sect. Thlaspios. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 691.
R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 80 (Verm. bot. Schr. V. p. 14): g. Cruciferar. Excluditur Aethionema. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 167. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 325.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 234; 1821. Syst. II. p. 373; 1824. Pr. I. p. 175: g. Thlaspidear. Sect.: Pachyphragma, Carpoceras, Nomisma, Neurotropis, Pterotropis. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 61. Sect.: Nomisma, Pterotropis. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 91. Sect. ut DC. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 190. Sect. eaed. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 657. Sect.: Thlaspi, Pterotropium. — Koch 1837. Syn. p. 68. Ed. II. p. 73. — Kunth 1838. Berol. I. p. 49. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 113. — Endl. 1839. Gen. n. 4885. p. 870; 1841. Ench. p. 449. Sect. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6918. Sect.: Nomisma, Carpoceras, Neurotropium, Thlaspi. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 161. Sect ut DC. et Apterygium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 91. — Walp. 1846. Rep. V. p. 37. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 557. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 201.
Link 1822. En. II. p. 153: g. Tetradynam. Siliculos.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. ibid. II. p. 1100. 1113; 1828. Consp. p. 182. n. 4742: g. Thlaspidiear. Sect. in Mössl. ut Presl, in Consp. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Biscutellear.

*) Nomen ex Dioscoride et Plinio, a θλάω, frango.

Thlaspi Tourn. cont.
Link 1831. Hdb. II. p. 288: g. Lepidinear.
Meisn. 1837. Gen. p. 12 (11): g. Iberidear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 259.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 279: g. Angustiseptar. Sect.: Nomisma, Neurotropis, Noccaea.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.

Thlaspi Linn. 1737. Gen. p. 193. n. 530; 1737. Cliff. p. 330; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 645; 1759. Syst. ed. X. p. 1128. n. 719; 1762. Sp. ed. II. p. 901; 1764. Gen. ed. VI. p. 334. n. 802; 1767. Syst. ed. XII. p. 434: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 490; 1784. Syst. p. 587. — Reich. 1778. Gen. p. 335. n. 866. — Lour. 1790. Coch. II. p. 395. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 437. n. 1078. — Gmel. 1791. Syst. p. 973. — Pers. 1797. Syst. p. 604. — Willd. 1800. Sp. III. p. 442. n. 1227; 1809. En. p. 666. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 64.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 544: sect. Nasturtii.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 63. n. 256: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir. III. p. 253. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 241. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 507. — DC. 1805. Franç. IV. p. 707. (ampliat.) Sect.: Nasturtium (Vent.), Capsella, Thlaspi. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 691. Sect.: Thlaspi, Capsella. — Lois. 1828. Dict. v. 52. p. 84 (*Tabouret*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 421: g. Thlaspium.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 21: g. Siliculosar. (includens Iberidem, etc.) — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 172[13]. — Scop. 1772. Carn. II. p. 16; 1777. Intr. p. 319. — Pers. 1807. Ench. II. p. 189. n. 1554. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 719; 1825. Syst. II. p. 878. n. 2300; 1831. Gen. II. p. 518. n. 2546. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 348. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 404.
Rebent. 1804. Neom. p. 151: g. Hexandr. Monogyn.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 142: g. Iberidear. Sect.: Nomisma, Pterotropis, Iberidella, Capsella.
= Thlaspi Dill., Capsella Medic., etc.

Thlaspi Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 336.
= Capsella Medic. et Aethionema R. Brown.

Thlaspi Adans. 1763. Fam. II. p. 421: sect. 3 Cruciferar. Gen.: Cochlearia, Soria, Hiericontis, Carrichtera, Thlaspi, Nasturtium, Iberis, Arabis, Kandis, Thlaspidium.

Thlaspidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: trib. Pleurorhizear. Gen. Thlaspidear. Endl. 1843 et Lyrocarpa, Dithyrea, Crenularia, Moriera.

Thlaspideae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 234; 1821. Syst. II. p. 148. 372; 1824. Prodr. I. p. 175: trib. Pleurorhizear. Gen.:

Thlaspideae DC. cont.
Thlaspi, Capsella, Hutchinsia, Teesdalia; Iberis, Biscutella, Megacarpaea, Cremolobus, Menonvillea. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 190. Gen. ead. et Platyspermum, Thysanocarpus. — Meisn. 1837. Gen. p. 12 (11). Subtrib.: Iberideae, Biscutellatae. — Endl. 1839. Gen. p. 870; 1841. Ench. p. 449. Gen.: Thlaspi, Teesdalia, Iberis, Cynocardamum, Biscutella, Diastrophis, Megacarpaea. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 107) Zygopeltis, 1843 (Spl. III. p. 87) Didymophysa, Brossardia, Heldreichia et 1850 (Spl. V. p. 35) Dithyraea, Lyrocarpa, Chartoloma.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 657: div. Siliculosar. Vid. *Thlaspidieae Rch.*

Koch 1836. Syn. p. 68. Ed. II. p. 73: trib. Angustiseptar. Gen.: Thlaspi, Teesdalia, Iberis, Biscutella.

Rchb. 1837. Hdb. p. 259: subdiv. Amphischistar. Sect.: Iberideae, Biscutelleae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 179. Sect.: *genuinae* (gen.: Thlaspi, Pachyphragma, Teesdalia, Hornungia, Cynocardanum; Iberis, Discovium?), Biscutelleae, Cremolobeae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 91: trib. Cruciferar. Gen. ex DC.

Thlaspidieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182: sect. Siliculosar. Gen.: Thlaspi, Capsella, Hutchinsia, Teesdalia, Iberis, Biscutella, Megacarpaea, Cremolobus, Menonvillea.

Thlaspidium Tourn. 1700. Inst. p. 214. t. 101: g. pl. class. V.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 259. Ed. Hall. 1745. p. 270: g. pl. class. XI.

Adans. 1763. Fam. II. p. 422: g. Thlaspium. = Biscutella, Iberis, etc.

Thlaspidium Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 192; 1792. Pflanzengatt. p. 29; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 38: g. Cruciflorar. (Biscutella apula L.)

Mönch 1794. Meth. p. 218: g. Thalamostemonis.

DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 409; 1824. Pr. I. p. 181: sect. Biscutellae. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 68. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1117; 1828. Consp. p. 182. n. 4745 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 196. — Endl. 1839. Gen. n. 4889 *b*. p. 871; 1841. Ench. p. 419. — Walp. 1842. Rep. I. p. 157. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 135.

Thlaspidium Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 694: sect. Lepidii. (L. ruderale, campestre, hirtum, sativum.)

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 556: g. Siliculosar.

= Lepidii sect. Cardamon, Lepia et Dileptium.

Thliphthisa Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 161: sect. Galii. (G. rupestre Vis. et suberosum Sm.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 13.

Thlipsocarpus *) Kunze 1846. Flora II. p. 695: nov. g. Hyoseridear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 732.

Thoa**) Aublet 1775. Guian. II. p. 874. t. 336: nov. g. Monoec. Polyandr. (Th. urens.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 650. n. 1454. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 476. n. 1704. — Pers. 1807. Ench. II. p. 573. n. 2113.

Scop. 1777. Intr. p. 265: g. Polyandrar.

Juss. 1789. Gen. p. 406: g. Urticis aff.

Gmel. 1791. Syst. p. 826: g. Polyandr. Monogyn.

Batsch 1802. Tab. p. 178: g. Scabridar.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 312: g. Urticeis aff.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 361: g. Urticear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 280.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 461. n. 1786; 1830. Gen. I. p. 396. n. 1989: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 26.

Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Thoacear.

Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1958: g. Chloranthear.

Blanco 1837. Filipin. p. 764: g. Monoec. Decandr.

Endl. 1847. Syn. Conif. p. 251: sect. Gneti. = Gnetum Linn.

Thoaceae Agardh 1825. Aphor. p. 204: trib. Urticear. Gen.: Gnetum, Thoa.

Thomasia*) Gay 1821. Diss. p. 20; 1821. Mém. Mus. VII. p. 450. t. 6. 7: nov. g. Lasiopetalear. (Lasiopetalum purpureum Ait., etc.) — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 312. — DC. 1824. Pr. I. p. 489. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 776. n. 847; 1830. Gen. I. p. 185. n. 937. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 204. n. 5301; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7711. — Bartl. 1830. Ord. p. 342. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 527. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 497. — Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 830. — Endl. 1840. Gen. n. 5324. p. 996; 1841. Ench. p. 519. — Walp. 1842. Rep. I. p. 336. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.

Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 282: g. Büttneriacear. — Par. Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preis. I. p. 230.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Lasiopetalar.

Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 318: g. Thomasiear.

Synon. Ditomostrophe Turcz.

Thomasieae Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 318: subtrib. Lasiopetalear. monocarpar. Gen.: Guichenotia, Thomasia, Rhynchostemon, Leucothamnus.

Thommasinia Steud. Nom. II. p. 312. 681: vid. *Tommasinia Bertol.*

---

*) *θλίψις*, pressio.
**) Nomen caribaeum *Thoa*.
***) Dicat. Petro et Abrahamo Thomas, Helvetis.

Thompsonia*) R. Brown 1820. Linn. Trans. XIII. p. 222 adnot. (Verm. bot. Schr. II. p. 640): nov. g. Passiflorear., Deidamiae simile, modo indicatum. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 271. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 257. — Endl. 1839. Gen. n. 5096. p. 925; 1841. Ench. p. 483. (verar.) — Meisn. 1843. Comm, p. 356.

Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3466: g. Granadillear.

Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5076: g. Deidamiear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 130. 138.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.

Thompsonia „Wall." Steud. vid. *seq.*

Thomsonia Wallich 1830. Pl. As. rar. I. p. 83. t. 99: g. Aroidear. (Th. napalensis.) *Cf.* Isis 1831. p. 591. — Par. Mart. 1831. Flora II. p. 459. — Steud. 1841. Nom. II. p. 682 (*Thompsonia*).

Blume 1835. Rumphia I. p. 149: g. Thomsoniear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 39.

= Pythonium Schott.

Thomsonieae Blume 1835. Rumphia II. p. 138: trib. Aroidear. Gen.: Amorphophallus, Thomsonia, Aglaonema.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 38: trib. Callacear. Gen. ead.

Thonningia**) Vahl 1810. Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 124. t. 1: nov. g. Cynomorio aff. (T. sanguinea.)

Spreng. 1831. Gen. II. p. 704. n. 3546: g. Dioec. Monandr.

= Langsdorffia Mart.?

Thora Hall. 1845 in Rupp. Fl. jen. p. 67: g. pl. class. IV.

DC. 1824. Pr. I. p. 30: sect. Ranunculi. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 732. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 29. — Endl. 1839. Gen. n. 4783 *c*. p. 847; 1841. Ench. p. 434. — Rchb. 1841. Nom. p. 190. n. 7221. 3.

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 207: subg. Ranunculi.

Thoracosperma***) Klotzsch 1834. Linnaea IX. p. 350; 1838. ibid. XII. p. 229: nov. g. Ericear. (Erica paniculata Thunb.) — Par. Endl. 1839. Gen. p. 753. n. 4308 (dubium). — Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.

= Thamnus Klotzsch.

Thorea†) Bory 1808. Ann. Mus. XII. p. 126; 1808. Berl. Mag. II. p. 226: nov. g. Confervar. *Cf.* Desv. 1808. Journ. bot. I. p. 121 et J. Agardh 1841. Linnaea XV. p. 451.

Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXXVI; 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear.

Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 53: g. Phycoidator.

Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 183: g. Hydrophytar. loculatar.

*) Dicat. detectori plantae in insula Medagascar.
**) Dicat. Petro Thonning, botanico danico.
***) θώραξ, lorica.
†) Dicat. Dr. Thore, Dax.

Thorea Bory cont.

Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXIV. 56: g. Batrachospermear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 343. — Leman 1828. Dict. v. 54. p. 308. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78. — Menegh. 1838. Cenni p. 28. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 120. — Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 603. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329. (Flora 1843. p. 93.) — Trevis. 1842. Prosp. Fl. Eug. (Flora 1843. p. 466.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 22. n. 77. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XII. p. 561.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: g. Nostochinar.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 370. n. 3440: g. Tremelloidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.

Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 230: g. Diphysar.

Agdh. 1828. Sp. Alg. II. 1. p. 123: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 65. p. 6; 1841. Ench. p. 4.

Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 436: g. Thoreacear.

Duby 1830. Bot. gall. II. p. 977: g. Confervear. *Cf.* Duby 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 16.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 757. n. 3857: g. Tremellacear.

Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 133: g. Chordariear.?

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phyc. gen. p. 326; 1845. Phyc. germ. p. 262; 1849. Sp. Alg. p. 534. n. 343: g. Chaetophorear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 2. — Math. 1853. Belg. II. p. 498.

Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. ...: g. Thorear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Batrachospermidar.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 94: g. Rivulariear.

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ...: g. Chantransiear.

Synon. Polycoma Palis.

Thoreaceae Rchb. 1828. Consp. p. 26: subdiv. Batrachospermear. Gen.: Thorea, Batrachospermum, Draparnaldia, Myxonema.

Thoreae Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. ....: trib. Algar. filiformium. Gen.: Thorea.

Thorinia Bory 1822. Dict. class. II. p. 226.

Math. 1853. Belg. II. p. 497: sect. Batrachospermi.

= Batrachospermi Roth pars.

Thorntonia*) Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5262: g. Lavaterear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 287: g. Pavoniear.

= Malache Trew.

Thorwaldsenia Liebm. 1844 in Lindbl. Bot. Notiser: nov. g. Orchidear. (Bot. Zeit. 1846. p. 396.)

*) Dicat. Rob. John Thornton, botanico anglico.

Thottea*) Rottböll 1783. Danske Vid. Selsk. Skrift. nye Saml. II. p. 530. t. 2: nov. g. plant. (Th. quadriflora.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 311.

Gmel. 1791. Syst. p. 798: g. Polyandr. Monogyn.

Agdh. 1826. Aphor. p. 244: g. Asarinar.

Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1861: g. Asarinar. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14. — Bartl. 1830. Ord. p. 82. — Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246). — Griff. 1845. Linn. Trans. XIX. p. 325. (Ann. sc. nat. 2e sér. VII. 1847. p. 328.)

Endl. 1838. Gen. n. 2164. p. 345; 1841. Spl. I. p. 1379; 1841. Ench. p. 218; 1847. Spl. IV. p. 95: g. Aristolochiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560. — Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2581. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1068.

Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 45 in adnot. Char. ampliat. ex Königii mss.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 794: g. Aristolochiacear.

Thouarea Kunth 1833. Agrost. p. 173: g. Panicear. — Par. Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 186. — Endl. 1837. Gen. n. 790. p. 86; 1841. Ench. p. 75. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 133. 299. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1298. — Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 112.

Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 473: g. Eupanicear.

= Thuarea Pers.

Thouarsia Vent. mss.

= Psiadia Jacq.

Thouina Schreb. Gen. I. p. 25: vid. *Thouinia Thunb.*

Thouina Schreb. Gen. II. p. 793: vid. *Thouinia Smith.*

Thouinia **) „Thunb." Linn. f. 1781. Suppl. p. 9. n. 1353: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 73. — Swartz 1788. Prodr. p. 1. 15. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 25. n. 55 (*Thouina*). — Gmel. 1791. Syst. p. 49. — Pers. 1797. Syst. p. 73.

= Linociera Swartz.

Thouinia Smith 1789. Icon. ined. I. p. 7. t. 7.

Schreb. 1791. Gen. II. p. 793. n. 1731 (*Thouina*): g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 935. n. 339.

= Humbertia Comm.

Thouinia Dombey mss.

= Lardizabala Ruiz & Pav.

Thouinia Poiteau 1804. Ann. Mus. III. p. 70: nov. g. Sapindor.

Pers. 1805. Ench. I. p. 413: g. Octandr. Monogyn.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 211: g. Saponacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 272. n. 1097.

Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 198. t. 56: g. Sapindear. — Par. Spreng. 1818.

Thouinia Poiteau cont.

Anl. II. 2. p. 698; 1825. Syst. II. p. 221. n. 1457; 1830. Gen. I. p. 312. n. 1594. — DC. 1824. Pr. I. p. 612. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 311. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 30. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 671. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 40. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). — Endl. 1840. Gen. n. 5618. p. 1071; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1846. Rep. V. p. 355. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.

Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 477: g. Sapindacear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 123. (verar.) — Kunth 1824. Syn. III. p. 160. (verar.) — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 384. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1279. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 224.

Tratt. 1825. Gen. nov. pl. I. nr. 6: g. Acerinar.

Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5215; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7598: g. Cupaniear.

Synon. Thyana Hamilt.; Vargasia Bert.?

Thouinieae Blume 1850. Rumphia III. p. . . .: trib. Sapindacear. Gen.: Atalaya.

Thrasia Kunth, Poir. vid. *seq.*

Thrasya*) HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 120. t. 39: nov. g. Panicear. (Th. paspaloides.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 156. — Kunth 1822. Syn. I. p. 191 (*Thrasia*); 1830. Gram. p. 29. t. 102; 1833. Agrost. p. 70. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 93. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Endl. 1837. Gen. n. 766. p. 83; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 252 (*Trasya*). — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1267. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.

Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 49. 802. n. 367: g. Graminear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 301. n. 315. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 315 (*Thrasia*).

Trin. 1820. Fund. p. 179: g. Triandr. Digyn. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 22.

Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 893: g. Paspalacear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 63. n. 307: g. Graminum.

Steud. 1854. Glum. I. p. 55 (praeced. Trinio) Panici sect. Harpostachydi injungit.

Thraupalos**) Endl. 1847. Syn. Conif. p. 248 (p. 255 *Thraupalus*); 1847. Gen. Suppl. IV. p. 11. n. 1816/3. 2 α: subsect. Plagiopyles.

Threlkeldia***) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 409. Ed. Nees p. 265: nov. g. Chenopodear. (Th. diffusa.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 310; 1825. Syst. I. p. 181. n. 203; 1830. Gen. I. p. 46. n. 213. — Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828.

---

*) Dicat. Ott. comiti de Thott.

**) Dicat. Andr. Thouin, hortulano botan. Paris.

*) In memoriam Thrasyae, rhizotomi Mantinensis.

**) *θραύω*, frango, tero. (?)

***) Dicat. Caleb Threlkeld, syn. stirp. hibern. auctori.

Threlkeldia R. Brown cont.
Consp. p. 164. n. 4346. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Schult. 1822. Mant. I. p. 252: g. Triandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 181.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 316: g. Atriplicear.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Endl. 1837. Gen. n. 1920. p. 295; 1841. Ench. p. 181: g. Camphorosmear. — Par. Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 101. — Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6373. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 635.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 127: g. Panderiear.

Thrica Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 414. 428: g. Cichoracear.
= Thrincia Roth.

Thrichoderma Link vid. *Trichoderma Pers.*

Thricholea Dumort. 1822. Comment. bot. p. 113: nov. g. Jungermanniacear. *Cf. Thricolea Dumort.*
= Trichocolea Nees.

Thrichostema „Gron.“ Linn. vid. *Trichostema Gron.*

Thrichothecium Link, Rchb. vid. *Trichothecium Link.*

Thricolea Dumort 1831. Syll. Jungerm. p. 24. 28. 66: g. Jungermanniear. *Cf. Thricholea Dumort.*
= Trichocolea Nees.

Thridax Beckmann Lex. bot. p. 214: vid. *Tridax Linn.*

Thrinax*) (Linn. f. 1781?) Swartz 1788. Prodr. p. 4. 57; 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 613. t. 13: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 570. — Willd. 1799. Sp. II. p. 202. n. 668. — Pers. 1805. Ench. I. p. 382. n. 844.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 772. n. 1686: g. Palmar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 42. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 96. — Hedw. 1806. Gen. p. 247. n. 1002. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 20. n. 1164; 1830. Gen. I. p. 255. n. 1329. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 316. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1091.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 203: g. Coryphear.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 8; .... Palm. p. 254: g. Sabalinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1651; 1841. Nom. p. 58. n. 2291. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXVII. 1300. — Endl. 1837. Gen. n. 1762. p. 253; 1841. Ench. p. 136. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (267).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Sabalinear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424.
Kunth 1841. Enum. III. p. 252: g. Coryphinar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 16: g. Coryphinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 62.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.
Synon. Trinax Dietr.

*) θρῖναξ s. τρίναξ, tridens.

Thrincia*) Roth 1796 in Röm. Arch. I. p. 36; 1797. Catal. I. p. 97: nov. g. plant.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1554. n. 1409; 1809. En. p. 821: g. Syngenes. Aequal. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 368. n. 1769. — Link 1822. En. II. p. 284.
Rebent. 1804. Neom. p. 93: g. Pentandr. Monogyn.
DC. 1805. Franç. IV. p. 51: g. Cichoracear. Par. Link 1829. Hdb. I. p. 791. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 3. 49. — Math. 1853. Belg. I. p. 320.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 577; 1826. Syst. III. p. 665. n. 2895; 1831. Gen. II. p. 646. n. 3253: g. Cichorear.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 65; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Less. 1832. Syn. p. 131. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 99. Sect.: Euthrincia, Streckera. — Endl. 1838. Gen. n. 2989. p. 496; 1841. Ench. p. 250. — Kunth 1838. Berol. I. p. 376. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3686. Sect.: Thrincia, Streckera. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 777. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 296.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 441.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 317: g. Semiflosculosar.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2134; 1831. Fl. exc. p. 251: g. Crepidear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
Koch 1837. Syn. p. 417. Ed. II. p. 479: g. Leontodontear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 260: g. Liguliflorar.
Mérat 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 367.
Synon. Colobium Roth; Thrica Gray.

Thrincia Schultz Bip. 1834. Flora I. p. 478: .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 467: g. restrict. Fideliear. (Thrincia hispida Roth.)
Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3686. [1]: sect. Thrinciae.
= Euthrincia DC.

Thrixidium Wittst. vid. *Trixidium DC.*

Thrixis Wittst. vid. *Trixis Swartz.*

Thrixspermum**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 519. Ed. Willd. p. 634: nov. g. Gynandr. Monandr. (Th. centipeda.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 320.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 19 (Linnaea II. p. 532): g. Orchidear. tribus incertae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1581; 1841. Nom. p. 56. n. 2196. — Endl. 1837. Gen. p. 220; 1841. Ench. p. 114. — Meisn. 1842. Comm. p. 276.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 183: g. Orchidacear. minus notum.

*) θριγκός, pinna, s. corona muralis.
**) θρίξ, pilus; σπέρμα, semen.

Thrombium*) Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 287: g. Pyrenocymatior. *Cf. Obryzum Wallr.*
= Pyrenothea Fries, Nostoc Vauch. et Botrydina Bréb.

Thrombium Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 23: g. Limboriear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 98.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 222: g. Verrucarior.
Arnold 1858. Flora II. p. 541: g. Verrucariear.
= Verrucaria Wigg. (Körb.)

Thryalis St. Hil. vid. *Thryallis Linn.*

Thryallis**) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 554; 1764. Gen. ed. VI. p. 213. n. 533; 1767. Syst. ed. XII. p. 296. n. 528: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 334; 1784. Syst. p. 402. — Reich. 1778. Gen. p. 219. n. 581. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 289. n. 733. — Gmel. 1791. Syst. p. 684. — Pers. 1797. Syst. p. 429; 1805. Ench. I. p. 465. n. 1047. — Willd. 1799. Sp. II. p. 570. n. 582.
Linn. 1764. Ord. nat. (*Triallis*): g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474.
Scop. 1777. Intr. p. 323: g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 251: g. Aceribus et Malpighiis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 356. n. 1159: g. Cyrtosiphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 17 (*Thryalis*): g. Aceracear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 309. n. 1228.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 482: g. Malpighiacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 322. — Bartl. 1830. Ord. p. 359.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 690: g. Samydear.
DC. 1824. Pr. I. p. 583: g. Hiptagear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 640. — Rchb. 1837. Hdb. p. 299.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 329. n. 1605: g. Malpighiear. *Cf.* Spreng. 1830. Gen. I. p. 377 sub *Galphimia.*
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5374: g. Banisteriear.
Synon. Vorstia Adans.
= Galphimia Cavan.? *Cf.* A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 70.

Thryallis Martius 1829. Nov. gen. III. p. 77. t. 230. 231: g. Malpighiacear. emend.
Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39): g. Malpighiear. — Par. A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 321; 1843. Arch. Mus. III. p. 350. t. 10. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7863. (genuinar.) — Walp. 1846. Rep. V. p. 198. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 373. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 33.
Endl. 1840. Gen. n. 5583. p. 1063; 1841. Ench. p. 557: g. Notopterygiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Malpighear.

Thrycocephalum Steud. Nom. II. p. 682: leg. *Thryocephalon.*

*) θρόμβιον, grumus.
**) θρυαλλίς, ex Plinio.

Thryocephalon*) Forst. 1776. Char. gen. p. 129. t. 65: nov. g. Polygam. Monoec.
Scop. 1777. Intr. p. 77: g. Graminum legitimor.
Hedw. 1806. Gen. p. 361 (*Tryocephalum*): g. Cyperacear.
= Kyllingia Linn. f.

Thryocephalum**) Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 322.
Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 68: g. Cyperacear.
= praeced.

Thryonachis Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I (Linnaea VIII. Litt. p. 84): sect. Scirpi. (Scirpi veri.)

Thryptomene Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 192; 1840. Gen. n. 6277. p. 1225; 1841. Ench. p. 650 (sph. *Thrytomene*): nov. g. Chamaelauciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6829. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 354. — Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 102 in adnot. (olim *Astrea Schauer.*)
Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 232: g. Euchamaelauciear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 157 (*Tryptomene*); 1846. V. p. 732.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.

Thryptopterides Rchb. 1828. Consp. p. 37 (1832. Fl. exc. p. L): formatio Filicum. Fam.: Marsiliaceae, Polypodiaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 135. Fam.: Salviniaceae, Marsiliaceae, Pteroideae.
Rchb. 1841. Nom. p. 27: subordo Filicum. Fam.: Salviniaceae, Marsiliaceae, Polypodiaceae.

Thrysanthus „Ell." Leman 1828. Dict. v. 54. p. 323: vid. *Thyrsanthus Ell.*

Thrytomene Endl. vid. *Thryptomene Endl.*

Thuarea***) Pers. 1805. Ench. I. p. 110. n. 200: g. Triandr. Digyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 43. n. 201 (*Thuaria*): g. Graminear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 197. Ed. Nees p. 53. — Palis. 1812. Agrost. p. 127. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 51. 807. n. 375. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 297. n. 310. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 323. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 135.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71: g. Paniceear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 156. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149. — Bartl. 1830. Ord. p. 30.
Trin. 1820. Fund. p. 184: g. Graminum. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 65. n. 316.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 895: g. Paspalacear.
Synon. Microthouarea Pet.-Th.; Thouarea Kunth.

Thuaria Hedw. f. vid. *praeced.*

Thuia†) Scopoli 1777. Introd. p. 353: g. Coniferar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 888. n. 3148; 1831. Gen. II. p. 700. n. 3530.

*) „θρύος, crispus." (??)
**) θρύον, Juncus.
***) Dicat. Aubert du Petit-Thouars.
†) Nomen ex Theophrasto et Plinio: θύα et θυία.

Thuia Scopoli cont.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 266: g. Monadelph. Tetrandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 215: g. Juniperear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVII.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1720: g. Cupressinar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 472.
Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2365: g. Cupressinear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 565.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 50; 1847. Gen. Spl. IV. p. 3. n. 1796: g. Thuiopsidear. = Thuya Tourn.

Thuiaecarpus Trautvett. 1844. Plant. imag. t. 11. f. 6: nov. g. pro Junipero oblonga MB. propositum. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 1545.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear.

Thuidium Schimp. 1852. Bryol. eur. V: nov. g. Hypnacear. (H. tamariscinum, abietinum.) = Tamariscella Müll. pt.

Thuiopsideae Endl. 1847. Syn. Conif. p. 6; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 1: div. Cupressinear. Gen.: Biota, Thuia, Thuiopsis.

Thuiopsis Zuccar..... in Sieb. Fl. jap. II. p. 32. t. 119. 120: nov. g. ex typo Thuiae dolabratae Thunb.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 53; 1847. Spl. IV. p. 3. n. 1797: g. Thuiopsidear.
Conf. Thujopsis Endl.

Thuioxylon Endl. vid. *Thuyoxylum Unger.*

Thuites Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXVIII: nov. g. Dicotyledonum foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 345.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 275; 1847. Spl. IV. p. 12. n. $1816/_{12}$: g. Cupressinear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 120.
Synon. Thuya et Thuytes Brongn.; Thuyites Endl.

Thuja Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 449; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 289; 1753. Sp. II. p. 1002; 1759. Syst. ed. X. p. 1274. n. 957; 1763. Sp. ed. II. p. 1421; 1764. Gen. ed. VI. p. 500. n. 1078; 1767. Syst. ed. XII. p. 633: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 719; 1784. Syst. p. 861. — Reich. 1778. Gen. p. 496. n. 1176. — Lour. 1790. Coch. II. p. 580. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 651. n. 1457. — Pers. 1797. Syst. p. 905. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 209. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 508. n. 1712; 1809. En. p. 990. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 224.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Coniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 586. — Pers. 1807. Ench. II. p. 579. n. 2132. — Link 1822. En. II. p. 410. — Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 20. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 231.
Gled. 1764. Syst. p. 144. n. 603: g. Thalamostemonum.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 186; 1789. Phil. Bot. I. p. 30.
Gmel. 1791. Syst. p. 1006: g. Monadelph. Tetrandr.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 61. t. 91.

Thuja Linn. cont.
Mönch 1792. Meth. p. 691: g. Calycostemonis.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. 121: g. Galbuliferar.
Bartl. 1830. Ord. p. 95: g. Cupressinar. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 258. n. 1790.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 161: g. Juniperear.
Endl. 1841. Ench. p. 139: g. Cupressinear. Sect.: Euthuja, Biota, Cyparissa. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 135.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear. = Thuya Tourn.

Thujopsis Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 24. n. 1792: g. Cupressinar.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Cupressinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear.
Conf. Thuiopsis Zucc.

Thujoxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 169. 190: g. foss. Cupressinear. (Elate austriaca Ung.)
= Elate Endl.?

Thumbergia Dumort. vid. *Thunbergia Retz.*

Thunbergeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 679: subordo Acanthacear. Gen. Thunbergiear. Endl.

Thunbergia Montin. 1773. Vetensk. Ac. Handl. p. 288. t. 11: nov. g. plant.
= Gardenia Ellis.

Thunbergia*) Retz. 1776. Physiogr. Sällsk. Handl. (Act. Lund.) I. p. 163: nov. g. plant.
Thunb. 1781. Nov. gen. I. p. 21; 1800. Prodr. II. p. 106. 192: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 46. n. 1407. — Murr. 1784. Syst. p. 558. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 426. n. 1058. — Gmel. 1791. Syst. p. 934. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 47. t. 67. — Pers. 1797. Syst. p. 595. — Willd. 1800. Sp. III. p. 388. n. 1203; 1809. En. p. 659.
Juss. 1789. Gen. p. 103: g. Acanthor.
Neck. 1790. El. I. p. 379. n. 588: g. Plasyrgophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Cram. 1803. Disp. p. 99 in Enneandr. Monogyn.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 22. t. 183.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 236: g. Acanthacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 132. — D. Don 1825. Nepal. p. 120. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 806. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 325. — Bartl. 1830. Ord. p. 185.
Pers. 1807. Ench. II. p. 179. n. 1527: g. Acanthoidear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 408; 1825. Syst. II. p. 828. n. 2222; 1831. Gen. II. p. 501. n. 2465: g. Acanthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3131.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23 (*Thumbergia*): g. Thunbergiear. — Par. Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 77; 1841. Linnaea XV. p. 351; 1847 in DC. Pr. XI. p. 54. — Rchb. 1837. Hdb. p. 191; 1841. Nom. p. 110. n. 4303. — Endl. 1839. Gen. n. 4027. p. 697; 1841. Ench. p. 343. —

*) Dicat. Car. Petro Thunberg, prof. Upsal.

Thunbergia Retz. cont.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 147. — Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 582. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 63. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 767.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Thunbergear.
Synon. Flemmingia Hamilt.; Diplocalymma Spreng.; Diplocalymna Choisy.

Thunbergieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23 (sph. *Tumbergieae*): trib. Acanthidear. Gen.: Thumbergia.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 74; 1841. Linnaea XV. p. 351: trib. Acanthacear. Gen.: Thunbergia. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 697; 1841. Ench. p. 343. Gen. ut Rchb. 1837 et Mendozia. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 143. Gen. ut Endl. — Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202). Gen. ead. et Clistax, Heptas. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 63. Gen.: Thunbergia, Hexacentris. — Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 9. Gen.: Mendozia, Clistax.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190: sect. Acanthariar. Gen.: Thunbergia, Meyenia, Hexacentris.
Rchb. 1841. Nom. p. 110: div. Acanthear. Gen. ut Endl.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 49: trib. Anechmatacanthear. Gen.: Mendoncia, Engelia, Thunbergia, Meyenia, Hexacentris, Clistax. (*Synon. Thunbergieae et Mendozieae Meisn.*)

Thunia Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 764: nov. g. Orchidear. (Phajus albus Lindl.)

Thuraria Molina 1782. Saggio p. 159: nov. g. plant.
Gmel. 1791. Syst. p. 703: g. Decandr. Digyn.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 326: g. Solaneis aff.
Endl. 1839. Gen. n. 4254. p. 743; 1841. Ench. p. 363: g. Ebenaceis aff.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 417: g. Styracear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5277. (genuinar.)
Conf. Turaria Mol., Spreng.

Thurberia A. Gray 1854. Mem. Amer. Ac. n. ser. V. p. 308: nov. g. Malvacear. *Cf.* Flora 1855. p. 586.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 307: g. Hibiscear.

Thuretia Decaisne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 234: nov. g. Algar., Rhodoplexiae aff. (Th. quercifolia.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Spongiocarpidar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Claudeinear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XII. p. 565: g. Thureticar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 673. n. 446: g. Callithamniear.

Thureticae Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: trib. Floridear. (An post Haloplegmeas collocanda?) Gen.: Thuretia.

Thurnhausera Steud. Nom. II. p. 683: vid. *seq.*

Thurnheissera *) Pohl mss.
= Schübleria Mart.

Thurnheyssera Martius mss.
= Symmeria Benth. (Meisn. in DC. Pr. XIV. 1. p. 185.)

Thurya *) Boissier & Balansa 1856. Diagn. pl. or. III. Ser. 2. Nr. 5. p. 63; 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 302. t. 12: nov. g. Scleranthear. anomalum. (Th. capitata.)

Thuya Tourn. 1790. Inst. p. 586. t. 358: g. pl. class. XIX.
Linn. 1737. Gen. p. 378. n. 935: g. Cupresso aff.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 465. n. 882: g. Monoec. Monadelph. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 653.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 182: g. Amentacear.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Coniferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 413. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 581. — Batsch 1802. Tab. p. 165. — St. Hil. 1805. Expos II. p. 328. — Schoub. & Mirb. 1812. Bull. soc. philom. p. 121. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 327.
Neck. 1790. El. III. p. 267. n. 1658: g. Lepyrophytor.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 298: g. Cupressinar. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 212.
A. Rich. 1826. Conif. p. 139. t. 7. 8.: g. Cupressinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 337.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 17. t. 220.
Synon. Thya Rupp.; Thuja Linn.; Thuia Scop.; Euthuja Endl.

Thuya Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 112: g. foss. Coniferar.
= Thuites Sternb. pt.

Thuyites „Sternb. Vers. t. 32. 35. etc." Endl. 1837. Gen. n. 1813. p. 263; 1841. Ench. p. 147: g. Coniferar. foss.
Endl. 1842. Spl. II. p. 25. n. $1796/_2$: g. Cupressinar. foss.
= Thuites Sternb.

Thuyoxylum Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 25. n. $1796/_6$; 1842. Chlor. protog. p. 31 (1846. p. LXXIII); 1845. Syn. pl. foss. p. 195: g. Cupressinear. foss. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 281; 1847. Spl. IV. p. 12. n. $1816/_{18}$ (*Thuioxylon*).

Thuytes Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 113: g. foss. Coniferar.
Unger 1841. Chlor. prot. I. p. 11. t. 2 (1846. p. LXXII); 1845. Syn. pl. foss. p. 190: g. Cupressinear. foss.
= Thuites Sternb.

Thwaitesia Montagne 1838. Fl. Alger. p. 175; 1849 in Orb. Dict. X. p. 52; 1849. ibid. XII. p. 575: nov. g. Zygnemear. *Cf.* Mont. 1846. Rev. bot. I. p. 469.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 448. n. 279: g. Zygnemacear.

---

*) Dicat. Leonh. Thurnheisser, medico Basil.

*) Dicat. prof. Thury, Genev.

Thya Rupp. 1718. Fl. jen. p. 315: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 336 in class. XVI.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 480: g. Pinuum. = Thuya Tourn.

Thyana *) Hamilt. 1825. Prodr. fl. Ind. occ. p. 36: g. Octandr. Monogyn. = Thouinia Poit.

Thylacantha **) Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 45: nov. g. Personatar., ab Angelonia sejunctum.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 15: g. Hemimeridear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 609: g. Calceolariear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 251: sect. Angeloniae.
Synon. Phylacanthus Benth.; Tylacantha Endl.

Thylacanthus ***) Tulasne 1844. Arch. Mus. IV. p. 175: nov. g. Amherstiear. (Th. ferrugineus.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 566. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

Thylachium „Lour. emend." DC. 1824. Prodr. I. p. 254: g. Capparear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4876. — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 286. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296. — Endl. 1839. Gen. n. 4994. p. 892; 1841. Ench. p. 456. — Walp. 1846. Rep. V. p. 53.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 185. n. 7115: g. Morisoniear.
Conf. Thilachium Lour.; Thylacium Spreng.

Thylachocarpicae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LX: ordo Thalamanthar. Series: Amphispermae, Cistiflorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 181; 1832. Fl. exc. p. 651. 653; 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 178. Formationes: Cruciflorae, Cistiflorae.

Thylacites Griseb. 1839. Gent. gen. p. 295; 1844. Rumel. II. p. 64; 1845 in DC. Pr. Pr. IX. p. 115: sect. Gentianae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 20: subg. Gentianae.
= seq.

Thylacithis (θυλακιϑις) Renealm. 1611. Spec. hist. pl. p. 70. ic. p. 68.
Synon. Megalanthe Gaud.; Thylacites Griseb.

Thylacium „Lour. emend." Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 776: g. Capparidum.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 606. n. 1953; 1830. Gen. I. p. 442. n. 2188: g. Capparidear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 212 (*Thylaucium*). 269.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358: g. Capparear.
Conf. Thilachium Lour.; Thylachium DC.

Thylacopterides Perleb 1838. Clav. class. (Isis 1838. p. 811): ordo Filicinar. Fam. 28—30. (Marsileaceae.)

*) Nomen ol Thouiniam Sw. propositum; ϑύα, arbor quaedam odorata.
**) „Nomen a ϑύλακος, saccus et ἄνϑος, flos."
***) „Nomen florem involutum significans." (ϑυλαξ, saccus.)

Thylacosperma Lindl. vid. *seq.*

Thylacospermum Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5233. p. 967; 1841. Ench. p. 505: g. Arenariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7784: g. Möhringiear.
Meisn. 1843. Comm. p. 343: g. Alsinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498 (*Thylacosperma*).
Synon. Periandra et Flourensia Camb.

Thylaucium Dietr. vid. *Thylacium Spreng.*

Thylax Noronh. A. B. v. 66. = Badiera DC.

Thylloneja Rchb. vid. *Phylloneja DC.*

Thymbra *) Tourn. 1700. Inst. p. 197: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 229: g. pl. class. IX.
Linn. 1753. Sp. II. p. 569; 1759. Syst. ed. X. p. 1096. n. 627; 1763. Sp. ed. II. p. 795; 1674. Gen. ed. VI. p. 288. n. 708; 1767. Syst. ed. XII. p. 389: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 441; 1784. Syst. p. 529. — Reich. 1778. Gen. p. 293. n. 766. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 385. n. 962. — Gmel. 1791. Syst. p. 898. — Pers. 1797. Syst. p. 563. — Willd. 1800. Sp. III. p. 46. n. 1095.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 115. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 344. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 266. — DC. 1805. Franç. III. p. 525. — Pers. 1807. Ench. II. p. 114. n. 1375. — Link 1822. En. II. p. 101. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 700. n. 2060; 1831. Gen. II. p. 466. n. 2293. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 338.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 162. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
Gled. 1764. Syst. p. 187. n. 775: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 246: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1790. El. I. p. 312. n. 490: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 440: g. Melissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXV; 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4115. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Meisn. 1840. Gen. p. 285 (194). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 240.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2825: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 127.
Benth. 1834. Labiat. p. 413: g. Melissinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 789. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 420. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. — Walp. 1845. Rep. III. p. 744. 983.
Endl. 1838. Gen. n. 3621. p. 620; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar.
Synon. Abulfali Adans.

*) Nomen ex Plinio. (ϑύμβρα, satureia.)

Thymeae Bartl. 1830. Ord. p. 183: div. Labiatar. Gen.: Dracocephalum, Prasium, Phryma, Cleonia, Prunella, Trichostemma, Melissa, Horminum, Thymus, Calamintha, Gardoquia, Thymbra, Lepechinia, Stenarrhena, Clinopodium, Melittis, Lumnitzera, Ocimum, Plectranthus, Scutellaria, Chilodia, Prostanthera, Cryphia, Perilomia.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 114: trib. Labiatar. Gen.: Origanum, Thymus, Satureja, Micromeria, Acinos, Melissa, Clinopodium, Thymbra.

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 149: div. Satureiear. Gen.: Cunila; Zataria, Bystropogon, Pycnanthemum, Monardella, Origanum, Thymus.

Thymelaceae Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (65) Apetalar.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 194; 1847. Veg. kd. p. 530: ordo Daphnalium. Gen.: Dirca, Daphne, Cryptadenia, Edgworthia, Hargasseria, Piptochlamys, Chlamydanthus, Nordmannia, Arthrosolen, Lygia, Mezereum, Scopolia, Daphnopsis, Schoenobiblos, Peddiea, Dais, Passerina, Diarthron, Drapetes, Pimelea, Struthiola, Jenkinsia, Enkleia, Gnidia, Lachnaea, Thymelina, Lasiosiphon, Linostoma, Eriosolena, Diplomorpha, Coleophora?, Wikströmia, Lagetta, Funifera, Exocarpus. App.: Hernandieae.

Thymelaea *) Tourn. 1700. Inst. p. 594. t. 366: g. pl. class. XX. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 54. p. 339.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 187: g. Apetalar. Diplostemonum.

Adans. 1763. Fam. II. p. 285: g. Thymelaear.

Scop. 1772. Carn. I. p. 277: g. Octandr. Monogyn.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 188. t. 39. f. 4 (Mezereum).

Mönch 1794. Meth. p. 635: g. Petalostemonis.

= Daphne Linn.

Thymelaea Gärtn., Meyer & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 8. 32: g. Octandr. Monogyn. (Daphne Cneorum.)

= Daphnanthes Meyer.

Thymelaea „All., Bertol." Rchb. 1841. Nomencl. p. 65. n. 2437: g. Daphnoidear.

= Tartonraira C. A. Meyer.

Thymelaea Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 440: sect. Daphnes. (D. alpina et altaica.)

= Eudaphnes Endl. pars.

Thymelaea C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 359: sect. Chlamydanthi.

= Euthymelaea Endl.

Thymelaea Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 65. n. 2105: g. Euthymelear. Sect.: Piptochlamys, Chlamydanthus.

Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 551: g. Daphnear. diplostemonear. Sect. eaed. et Lygia.

Synon. Chlamydanthus Griseb.; Piptochlamys Meyer.

*) *θυμελαία*, quasi tithymalaea, ex tithymalo et olea mixta facie. (Bauh.)

Thymelaeaceae Rchb. 1841. Nomencl. p. 64: fam. Ambiguar. Divis.: Penaeeae, Aquilarinae, Daphnoideae.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 568: fam. Dicotyledonear. apetalar. perigynar. Gen. Daphnoidear. Endl.

Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 61. Gen. bras.: Schoenobiblus, Daphnopsis, Funifera, Goodallia, Lasiadenia, Coleophora, Linostoma.

Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 493: ordo (167) Monochlamydear. Subord.: Thymeleae, Aquilarinae.

Thymelaeae Adans. 1763. Fam. II. p. 278: fam. 40 plant. Gen. 1: Statice, Limonium, Eriocaulon, Brabeium, Conocarpus, Lepidocarpus, Serraria, Brunia, Globularia, Vormia, Rombut. §. 2: Belvala, Dessenia, Sanamunda, Stellera, Lachnaea, Dofia, Thymelaea.

Thymelaeae Juss. 1789. Gen. p. 76: ordo 2 class. VI. Gen.: Dirca, Lagetta, Daphne, Passerina, Stellera, Struthiola, Lachnea, Dais, Gnidia, Nectandra, Quisqualis. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 223.

Batsch 1802. Tab. p. 181: fam. Nuciferar. Gen. ut Juss. et Pimelea.

DC. 1805. Franç. III. p. 355: fam. (30) Dicotyledonum. Gen.: Daphne, Passerina, Stellera.

Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. XIV: fam. Exorhizar.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 358. Ed. Nees p. 214: ordo Dicotyledonum apetalar. Gen.: Pimelea, Daphne.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 323: fam. 30 plant. Gen.: Daphne, Lagetta, Passerina, Lachnaea, Stellera, Dais, Dirca, Gnidia, Struthiola, Pimelea, Salvadora; Elaeagnus, Hippophaë; Bucideae.

DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 265: fam. Monochlamydear. Gen.: Daphne.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: fam. Thalamitegmiae.

Juss. 1828. Dict. v. 54. p. 339: ordo plant. Gen.: Dirca, Cansjera, Lagetta, Daphne, Passerina, Pimelea, Stellera, Struthiola, Lachnea, Dais, Drapetes, Gnidia, Arjona.

Link 1829. Hdb. I. p. 375: ordo (10) Perigoniatar. Gen.: Pimelia, Struthiola, Dirca, Daphne, Passerina, Gnidia.

Bartl. 1830. Ord. p. 114: ordo (80) Proteinar. Gen.: Dirca, Lagetta, Daphne, Schoenobiblus, Passerina, Struthiola, Nectandra, Lachnaea, Dais, Gnidia, Thymelina, Pimelea, Thecanthus, Drapetes; Darwinia, Cansiera.

Kunth 1830. Linnaea V. p. 667. Char. fam. Distinguuntur Penaeaceae.

Lindl. 1833. Nix. p. 23: ordo Daphnalium.

Mart. 1835. Consp. p. 14: ordo 79.

Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 385. Nov. gen.: Cryptadenia.

Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242): ordo Daphnoidear. Trib.: Daphneae, Gnidieae, Lagetteae.

Conf. Daphnoideae Vent.

Thymelaeae Endl. 1837. Gen. p. 313; 1841. Ench. p. 194: class. (27) Acramphibryor. Apetalor. Ordines: Monimiaceae, Laurineae, Gyrocarpeae, Santalaceae (Grubbiaceae, Nyssaceae, Anthoboleae, Pseudantheae, Helwingiaceae), Daphnoideae (Hernandezieae), Aquilarineae, Elaeagneae, Penaeaceae (Geissolomeae 1841), Proteaceae.

Thymeleaceae Rchb. 1828. Consp. p. 82; 1837. Handb. p. 169: fam. Ambiguar. Divis.: Darwinieae, Daphneae, Aquilarinae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 163. Gen.: Stellera, Passerina, Daphne.

Thymeleae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 47 plant. Gen.: Thesium, Stellera, Passerina, Lachnaea, Dirca, Daphne, Gnidia, Osyris, Hippophaë, Elaeagnus, Conocarpus, Nyssa.

Mirb. 1815. Élém. II. p. 873: fam. Dicotyledonum apetalar. Gen.: Daphne, Passerina.

Agdh. 1825. Aphor. p. 233; 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Epichlamydear. Gen.: Thecanthes, Pimelea, Struthiola, Drapetes, Cansiera, Dirca, Lagetta, Daphne, Passerina, Gnidia, Dais, Cervantesia.

Koch 1837. Syn. p. 620. Ed. II. p. 714: ordo Monochlamydear. Gen. ut Mirb.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 434: fam. (170) Proteinear. Gen. Daphnoidear. Endl. 1838.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 120: fam. Daphnoidear. Gen.: Lagetta, Dais, Thymelina, Gnidia, Struthiola, Pimelea, Lachnea, Passerina, Daphne, Dirca.

Endl. 1847. Spl. IV. p. 59: div. Daphnear. Subdivis.: Euthymeleae, Eudaphneae.

Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 496: subordo Thymelaeacear. Trib.: Daphneae, Gnidieae.

Thymelina Hoffmansegg .... Verz. I. p. 198. f. 2.

Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1775: g. Daphnear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Thymelinear.

Bartl. 1830. Ord. p. 115: g. Thymelaear.

Endl. 1838. Gen. p. 331. n. 2101: g. Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2444.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436: g. Thymelear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 120.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.

= Lachnaea Linn.

Thymelinae Link 1821. Enum. I. p. 356.

= Daphnoideae Vent.

Thymelinae Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 59: trib. Daphnoidear. Subtrib.: Passerineae, Daphneae.

Thymelineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 18: fam. Protearicar. Gen.: Days, Daphne, Passerina, Stellera, Struthiola, Lachnaea, Thymelina, Gnidia, Pimelea.

= Thymelaeaceae Meisn.

Thymnophylla Rchb. vid. *seq.*

Thymophylla Lagasca 1816. Nov. gen. et spec. p. 25: nov. g. Corymbiferar. (T. setifolia.) — Par. Leman 1828. Dict. v. 54. p. 340.

Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: g. Tagetinear. (1829 Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 446. n. 2694; 1831. Gen. II. p. 613. n. 3032: g. Eupatorinar.

Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2365 (*Thymnophylla*); 1841. Nom. p. 83. n. 3214: g. Tagetear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 647. — Endl. 1838. Gen. n. 2581. p. 420; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Thymopsis Jaubert & Spach 1843. Ill. pl. or. I. p. 72. t. 37: nov. g. Hypericinear.

Walp. 1846. Rep. V. p. 142: g. Hypericear.

Thymus*) Tourn. 1700. Inst. p. 196. t. 93: g. pl. class. IX.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 228. Ed. Hall. 1745. p. 233: g. pl. class. IX.

= Thymi Linn. pars.

Thymus Linn. 1737. Gen. p. 168. n. 468; 1737. Cliff. p. 305; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 160; 1753. Sp. II. p. 590; 1759. Syst. ed. X. p. 1103. n. 646; 1763. Sp. ed. II. p. 825; 1764. Gen. ed. VI. p. 297. n. 727; 1767. Syst. ed. XII. p. 399: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 424. — Murr. 1774. Syst. p. 452; 1784. Syst. p. 541. — Reich. 1778. Gen. p. 301. n. 785. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 394. n. 982. — Gmel. 1791. Syst. p. 913. — Pers. 1797. Syst. p. 578. — Willd. 1800. Sp. III. p. 138. n. 1117; 1809. En. p. 623. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 38. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 334.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 654: g. Gymnotetraspermar.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 187. n. 774: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 406 (emissis Acino et Köllia).

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 161. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 377.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 194. — Juss. 1789. Gen. p. 115. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 343. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 266. — DC. 1805. Franç. III. p. 559; 1815. V. p. 402. Sect.: Thymus, Calamintha. — Pers. 1807. Ench. II. p. 130. n. 1405. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 315. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 382. — Link 1822. En. II. p. 115; 1829. Hdb. I. p. 481. — Kunth 1823. Syn. II. p. 90. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 695. n. 2058; 1831. Gen. II. p. 466. n. 2291. — D. Don 1825. Nepal. p. 112. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 389. — Math. 1853.

*) θύμον s. θύμος Veterum.

Thymus Linn. cont.
Belg. I. p. 418. Sect.: Serpyllum, Acynos, Calamintha.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 245: g. Gymnospermar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 277.

Hill 1769. Ht. kew. p. 243: g. Monopetalar. irregular.

Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 475 (*Thimus*): g. Labiacear.

Neck. 1790. El. I. p. 308. n. 482: g. Corythophytor.

GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 373: g. Pericarpiferar.

Rebent. 1804. Neom. p. 65: g. Tetrandr. Monogyn.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 440: g. Melissear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXV; 1828. ibid. II. p. 990. 1043. Sect.: Serpyllum, Acinos, Calamintha. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4114. Sect. (1841) Benthamianae et Thymus.

Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2819: g. Salviear. Sect.: Zygis, Serpyllum.

Gaud. 1829. Helv. IV. p. 4. 80: g. Bilabiatar.

Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 116. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 197. Sect.: Serpyllum, Pseudothymbra. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 344. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 656.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 312: g. Satureinar.

Benth. 1834. Labiat. p. 340: g. Satureinear. Sect.: Mastichina, Serpyllum, Pseudothymbra. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 767. Sect. eaed. — Koch 1837. Syn. p. 557. Ed. II. p. 640. — Kunth 1838. Berol. I. p. 96. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 191. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 409. — Brongn. 1843. En. genr. p. 67. — Webb .... Canar. III. p. 68. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 567.

Endl. 1838. Gen. n. 3610. p. 617; 1841. Ench. p. 307: g. Origanear. Sect. ut Benth. 1834. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). — Walp. 1845. Rep. III. p. 697. 982.

C. Koch 1843. Linnaea XVII. p. 294: g. Saturejinar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Origanidar.
Synon. Serpillum et Pepolina Caesalp.; Thymus et Serpillum Tourn.; Serpyllum Pers.

Thyrantha Hook. 1843. Ic. pl. II. t. 590: nov. g. .... (Th. subulata.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 680.

Thyrea Massalongo 1855. Symmict. lich. p. 58: nov. g. Omphalariear. *Cf.* Massal. 1856 in Flora p. 210. — Par. Arnold 1858. Flora I. p. 192.

Thyreomycetes Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 224: fam. Sphaeronemeor. Gen.: Leptostroma, Leptothyrium, Actinothyrium, Microthyrium.

Thyridostachium Wittst. vid. *seq.*

Thyridostachyum *) Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 379. (*Thyridostachium* ex Wittst. Etym. Handw. p. 880.)
= Mnesithea Kunth.

Thyrophora Necker 1790. Elem. bot. II. p. 13. n. 625: nov. g. Darinyphytor., a Gentiana L. disjunctum.
= Cyclostigma Griseb.

Thyrsacanthus **) Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 97; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 323: nov. g. Gendarussear.
Synon. Odontonema Nees.

Thyrsanthema Necker 1790. Elem. bot. I. p. 6. n. 5: nov. g. Actinophytor., a Tussilagine L. sejunctum.

Thyrsanthus Schrank 1814. Münchn. Denkschr. f. 1813. p. 75: nov. g. pro Lysimachia thyrsiflora L. conditum.

Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3327 *b*: sect. Lysimachiae.

Link 1829. Hdb. I. p. 406: g. Primulacear.

Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 346: g. Anagalleidar.
= Naumburgia Mönch.

Thyrsanthus Elliott 1818. Journ. ac. Philad. I. Nr. 13. p. 371: nov. g. a Glycine sejunctum. (Th. frutescens.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 164.

? Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: g. Phaseolear. (Nomen absque auctore.)
= Wisteria Nutt.

Thyrsanthus Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 245: nov. g. Plumeriear. (Th. Schomburgkii.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 56. n. 3399/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 366.

DC. 1844. Pr. VIII. p. 386: g. Tabernaemontanear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Thyrsanthus „Lind." Lehm. 1844. Pl. pug. oct. ex Flora 1844. II. p. 494: vid. *Thysananthus Lind.*

Thyrsine Gleditsch 1764. Syst. p. 286. n. 1168 (Verm. Abh. p. 199): g. Stylostemonum dodecantherar. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 54. p. 341.
= Cytinus Linn.

Thyrsodium „Salzm. mss." Benth. 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 17: nov. g. Burseracear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 448.

Thyrsopterideae Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 330. 346: ordo Helicogyratar. Gen.: Thyrsopteris.

Fée 1852. Gen. Fil. p. 39. 345. 354: trib. Helicogyratar. Gen. id.

Thyrsopteris Kunze 1834. Linnaea IX. p. 507: nov. g. Cyatheacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 650. p. 63; 1841. Spl. I. p. 1350; 1841. Ench. p. 37. — Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1045. — Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 107.

Presl 1836. Pterid. p. 66: g. Peranemacear.

*) θυρίς, fenestra.
**) θύρσος, thyrsus.

Thyrsopteris Kunze cont.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 41: g. Davalliacear.
J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 436: g. Dicksoniar.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 64: g. Eudicksoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Cyathear.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. V. p. 346: g. Thyrsopteridear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 354.
Synon. Panicularia Colla; Chonta Molina?

Thysamus Rchb. vid. *Thysanus Lour.*

Thysanachne*) Presl 1829. Thys. nov. pl. gen.; 1830. Symb. bot. I. p. 11. t. 6: nov. g. Bromeacear. (Th. scoparia.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 50 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 359.
Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . .: g. Avenariar. *Cf.* Flora 1830. II. Erg. Bl. p. 98.
= Ischaemum Linn.

Thysananthes Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 16. 97: sect. Trichosanthis. (T. amara L.)

Thysananthus Lindenb. 1845 in Nees syn. Hepat. p. 286: nov. g. Jubulear. *Cf. Thyrsanthus „Lind., Lehm.“*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59 (*Physananthus*): g. Jubulidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 572: g. Jungermanniear.

Thysanella A. Gray . . . . Pl. Lindheim. p. 24; 1847. Bost. journ. V. p. 232: nov. g. Rumicear. (Polygonum fimbriatum Ell.) — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 82.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 54. n. $1993/_2$: g. Polygonear. verar. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 293.

Thysanocarpus Hook. 1829. Fl. bor. am. I. p. 69. t. 18 A: nov. g. Isatidear., Tauscheriae aff. (T. curvipes.) *Cf.* Trautv. Bull. Ac. Pet. VIII. 22. p. 342. — Par. Fisch. & Meyer . . . . Ind. sem. h. Petr. II. p. 50. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Rchb. 1837. Hdb. p. 258; 1841. Nom. p. 179. n. 6894. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 117. — Endl. 1839. Gen. n. 4940. p. 881; 1841. Ench. p. 450. — Walp. 1842. Rep. I. p. 183.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 195: g. Thlaspidear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Carcerulosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 661: g. Siliculosar.

Thysanocladia Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 44. n. $122/_{55}$ c: sect. Bonnemaisoniae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Lomentarear. (*Synon. Delisea Lamx.*)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 769. n. 513: g. Gelidiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Lomentariear.
Sonder 1852. Linnea XXV. p. 689: g. Sphaerococcoidear.

*) θύσανος, fimbria; ἄχνη, palea.

Thysanocladia Endl. cont.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. Bot. p. 36: g. Rhodophycear.
= Callophycus Trevis.

Thysanolaena Nees . . . . in Edinb. n. phil. journ. XVIII. p. 180.
Endl. 1841. Spl. I. n. $776/_1$. p. 1353; 1841. Ench. p. 57: g. Panicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1278. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 119 (*Thyssanolaena*).
Walk.-Arn. & Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 180: g. Tristeginar.
Synon. Agrostis Roxb.

Thysanomitrion Schwägr. 1823. Suppl. II. 1. p. 61. t. 118: nov. g. Muscor. *Cf.* Flora 1825. II. Erg. Bl. p. 17 et Leman 1828. Dict. v. 54. p. 342. (*Conf. Thysanomitrium.*) — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 58 (*Thesanomitrion*).
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 262: g. Dicranoidear.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Grimmioidear.
Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 15: g. Bryacear.
= Campylopus Brid.

Thysanomitrium Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIII: g. Campylopodum.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 598: g. Campylopodior.
Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 115: g. Weissiacear.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 149: g. Dicranacear.
= praeced.

Thysanopyxis Cesati 1850. . . .; 1851 in Rabenh. Herb. viv. myc. Cent. XV: nov. g. Tuberculariear. *Cf.* Bot. Zeit. 1851. p. 179.

Thysanospermum Champion & Benth. 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 168: nov. g. Cinchonear.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 118: g. Hedyotidear.

Thysanothecium Montagne & Berkeley 1846. Lond. journ. bot. V. p. 257: nov. g. Lichenum, Ramalinae aff. (Th. Hookeri.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349; 1849. ibid. XII. p. 573: g. Usneear.

Thysanothus Poir. vid. *seq.*

Thysanotus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 282. Ed. Nees p. 138: nov. g. Asphodelear., Arthropodio proximum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 227; 1825. Syst. II. p. 89. n. 1244; 1830. Gen. I. p. 268. n. 1396. — Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 343 (*Thysanothus*). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXIII. 435. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1152. — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 36.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1397: g. Abamear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Anthericear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1150. p. 149; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1806. — Meisn. 1842. Gen. p. 400

Thysanotus R. Brown cont. (304). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 613. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 382. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Synon. Chlamysporum Salisb.

Thysanus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 284. Ed. Willd. p. 348: nov. g. Decandr. Tetragyn. (Th. Palala), a Willd. ibid. in adnot. ad Ailanthum revocatum.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 258: g. Terebintaceis aff. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 91 (minus notum).
Hedw. 1806. Gen. p. 333. n. 1313: g. Terebintacear.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 520: g. Rutacear.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 807.
Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5134 (sph. *Thysamus*): g. Zanthoxylear.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 342: g. Terebinthacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47): g. Zanthoxylacear.?, an Connaracear.?, et p. 76 (55) Spondiacear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5951. p. 1140; 1841. Ench. p. 604: g. Connaracear. dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 468.
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5624: g. Connarear.?

Thyselinum Wittst. vid. *Thysselinum Adans.*

Thyssanolaena Steud. vid. *Thysanolaena Nees.*

Thysselinum „Moris., Herm." Tourn. 1700. Inst. p. 319: g. pl. class. VII.
Mönch 1794. Meth. p. 84: g. Thalamostemonis.
Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 153: g. Umbelliferar. (Selinum palustre Jacq.) — Par. Spreng. 1818. Sp. Umbell. p. 70 (injuncta Callisace). — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 518.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 637; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XL. 463; 1830. Gen. I. p. 224. n. 1163: g. Smyrniear.
Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 380: sect. Peucedani. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 448; 1828. Consp. p. 142. n. 3674 *b*. — DC. 1830. Pr. IV. p. 179. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 332. — Endl. 1839. Gen. n. 4462 *c*. p. 779; 1841. Ench. p. 379. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 310. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 690.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 16. 331: g. Umbellatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Peucedanear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 453; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5455. — Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Koch 1836. Syn. p. 306. Ed. II. p. 336. — Kunth 1838. Berol. I. p. 278.
Synon. Thysselium Riv., Hall.

Thysselinum Adans. 1763. Fam. II. p. 100: g. Sphondylior. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 881 (*Thyselinum* a θυσανος).
= Selinum Hoffm.

*) Nomen ab involucro seminis fimbriato.

Thysselium Rivin. 1699. Pentap. irr. t. 19. 20. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 276: g. pl. class. XII.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 895. n. 1062: g. Smyrniear.
A. Spreng. 1848. Fl. Hall. p. 139. 178: g. Peucedanear.
= Thysselinum Hoffm.

Tiaranthus*) Herbert 1837. Amaryll. p. 75. 202: sect. Pancratii, an genus? (P. malabathricum, verecundum, etc.) — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 16. 180.

Tiarella Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 17; 1753. Sp. I. p. 405; 1759. Syst. ed. X. p. 1027. n. 495; 1762. Sp. ed. II. p. 580; 1764. Gen. ed. VI. p. 223. n. 560; 1767. Syst. ed. XII. p. 305. n. 555: g. Decandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 345; 1784. Syst. p. 415. — Reich. 1778. Gen. p. 228. n. 609. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 301. n. 765. — Gmel. 1791. Syst. p. 708. — Pers. 1797. Syst. p. 444; 1805. Ench. I. p. 491. n. 1112. — Willd. 1799. Sp. II. p. 659. n. 888; 1809. En. p. 462. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 285.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Gled. 1764. Syst. p. 271. n. 1116: g. Calycostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 191: g. Pentapetalar.
Juss. 1789. Gen. p. 309: g. Saxifragar.
Neck. 1790. El. II. p. 114. n. 785: g. Plyrontophytor. Disjungitur Blondia.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 278: g. Saxifragear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 29. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 131. — Hedw. 1806. Gen. p. 328. n. 1291. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 647; 1825. Syst. II. p. 361. n. 1692; 1830. Gen. I. p. 375. n. 1892. — Link 1821. En. I. p. 411; 1831. Hdb. II. p. 41. — Haw. 1821. Saxifr. en. p. 58. — D. Don 1825. Nepal. p. 210. — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4200. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 354. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — DC. 1830. Pr. IV. p. 50. Sect.: Eutiarella, Pseudastilbe. — Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 55. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 238. t. 77. 81. (verar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 228. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 64. (verar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100). — Endl. 1839. Gen. n. 4643. p. 816; 1841. Spl. I. p. 1416; 1841. Ench. p. 409. Sect. (1841) ut Torr. & Gr. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1538. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 587. Sect.: Eutiarella, Anthonema. — Walp. 1843. Rep. II. p. 372. Sect. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 229.
Bartl. 1830. Ord. p. 312: g. Heucherear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 157. n. 6144: g. Mitellear. Sect.: Tiarella, Anthonema.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.
Synon. Blondia Neck.

*) τιάρα, tiara.

Tiaridium Lehm. 1818. Asperif. I. p. 13: nov. g. Asperifoliar. (Heliotropium indicum L.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. V. 735. n. 625 a. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 568. n. 603; 1830. Gen. I. p. 127. n. 634. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 610.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 894: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2959.
Link 1821. En. I. p. 163; 1829. Hdb. I. p. 571: g. Borraginear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 845. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 347.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 452; 1830. ibid. V. p. 115: g. Heliotropiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24 (*Triaridium*). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31. — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4360. Sect.: Tiaridium, Hieranthemum. — Brongn. 1843. En. genr. p. 56.
Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Heliotropear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 364. — Endl. 1839. Gen. n. 3752. n. 646; 1841. Ench. p. 320. Sect.: Hieranthemum, Eutiaridium. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653.
Rchb. 1837. Hdb. p. 193: g. Heliotropicear.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 551: sect. Heliophyti. (*Synon. Eutiaridium Endl.*)

Tibouchina Aublet 1775. Guian. I. p. 445. t. 177: nov. g. Decandr. Monogyn. (T. aspera.)
Juss. 1789. Gen. p. 329: g. Melastomar.
St. Hil. 1805. Expos. p. 173 (*Tibuchina*): g. Melastomear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 315. n. 1247 (*Tibuchina*). — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 508. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 350. — Bartl. 1830. Ord. p. 329. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 337. n. 1705 (*Tibuchina*).
DC. 1828. Pr. III. p. 143: g. Osbeckiar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 761.
Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4597; 1841. Nom. p. 173. n. 6722: g. Osbeckiear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 248. — Meisn. 1838. Gen. p. 116 (83). — Endl. 1840. Gen. n. 6214. p. 1213; 1841. Ench. p. 646. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1376. 1444. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 153 (*Tibuchina*): sect. Lasiandrae.
Synon. Savastania Scop.

Tibuchina St. Hil., Hedw., Spreng., Naud. vid. *praeced.*

Ticanto Adans. 1763. Fam. II. p. 319: g. Cassiar.
Medic. 1786. Theod. spec p. 51: g. Enneandr. Dioic.? (Guilandina Nuga L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4149 *d*: sect. Caesalpiniae?
Synon. Nugaria DC.

Tichocarpus *) Rupr. .... Alg. Ochot. §. 18; 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 46: g. Rhodophycear.

*) τεῖχος, murus.

Tichothecieae Massalongo 1856. Miscell. lich. Arnold 1858. Flora p. 701: trib. Pseudolichenum. Gen.: Tichothecium.

Tichothecium Flotow 1850. Bot. Zeit. p. 361: nov. g. a Sagedia sejunctum.
Massal. 1854. Neagenea Lich. p. 8.
Massal. 1856. Miscell. lich. p. 27 (Flora 1857. p. 490): g. Tichotheciear. — Par. Arnold 1858. Flora p. 701.
= Microtheliae Körb. pars.

Ticorea Aublet 1775. Guian. II. p. 689. t. 277: nov. g. Monadelph. Pentandr. (T. foetida.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1009.
Scop. 1777. Intr. p. 286: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 264: g. Meliar.
Cavan. 1789. Diss. VII. p. 362. t. 206.
Neck. 1790. El. II. p. 427. n. 1251: g. Comizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 43: g. Meliacear. — Par. Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 519.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 34): g. Diosmear. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 495. — Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45).
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 144; 1824. Pr. I. p. 730: g. Cuspariear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 157. n. 2478; 1831. Gen. II. p. 536. n. 2631. — Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5142; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 197. n. 7530. — Bartl. 1830. Ord. p. 389. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 799. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 355. — Endl. 1840. Gen. n. 5993. p. 1152; 1841. Ench. p. 611. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
A. St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 289; 1825. Fl. Bras. I. p. 91: g. Rutacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 351.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 152: g. Fraxinellar.
Synon. Ozophyllum Schreb.; Sciuris Nees & Mart.; Costa Fl. Flum.

Tidemannia Walp. vid. *seq.*

Tiedemannia *) DC. 1829. Coll. diss. p. 51. t. 12; 1830. Prodr. IV. p. 187: nov. g. Peucedanear. — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 347. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 337. — Meisn. 1838. Gen. p. 146 (106). — Rchb. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 141. n. 5470. — Endl. 1839. Gen. n. 4471. p. 781; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 630 (*Tiedmannia*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 414 (*Tidemannia*).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 792. n. 4107: g. Selinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Oxypolis Rafin.

Tiedmannia Torrey & Gray vid. *praeced.*

Tigarea Aublet 1775. Guian. II. p. 917. t. 350. 351: nov. g. Dioec. Polyandr. (T. aspera et dentata.)
Scop. 1777. Intr. p. 216 (*Tigurea*): g. Calycanthemar.

*) Dicat. prof. Tiedemann, Heidelb.

Tigarea Aublet cont.
Juss. 1789. Gen. p. 339: g. Prockiar.
Gmel. 1791. Syst. p. 813: g. Polyandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 190: g. Rosacear.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 355: g. Dilleniacear.
= Tetracera Linn.

Tigarea Pursh 1814. Fl. bor. Am. I. p. 33. t. 15.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 302: g. Icosandr. Monogyn.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 47: g. Rosacear.
= Purshia DC.

Tiglium Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 418: nov. g. Crotonear. (Croton Tiglium L.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 98. n. 5827/1.
Baill. 1858. Euphorb. p. 361: sect. Crotonis.

Tigrida Dumort. vid. *seq.*

Tigridia Juss. 1789. Gen. p. 57: nov. g. Iridum. (Ferraria pavonia L.)
Vent. 1799. Tabl. II. p. 190: g. Iridear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 144. — Hedw. 1806. Gen. p. 27. 354. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 344. 495. n. 144. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 259; 1825. Syst. I. p. 169. n. 175; 1831. Gen. II. p. 527. n. 2591. — Link 1822. En. II. p. 178; 1829. Hdb. I. p. 216. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Ker 1827. Irid. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 128. — Endl. 1837. Gen. n. 1229. p. 166; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 151. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1567. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. En. genr. p. 22. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 581.
Batsch 1802. Tab. p. 143: g. Ensatar. — Par. Gawl. 1805. Ann. of bot. I. p. 246.
Pers. 1805. Ench. I. p. 50. n. 105: g. Triandr. Monogyn.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 309: g. Witsenear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 325. — Kunth 1822. Syn. I. p. 317.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1180: g. Ferrariear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57 (*Tigrida*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 5.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.

Tigurea Scopoli vid. *Tigarea Aubl.*

Tilachlidium Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 126: nov. g. Polyactidear. (T. pinnatum).
Bonord. 1851. Hdb. p. 284. 296: g. Isaricor.

Tilago Hassk. vid. *Filago.*

Tilco Adans. 1763. Fam. II. p. 498: g. Onagrar. (Feuill. I. 3, 47.) *Cf. Thilco Feuill.*

Tildenia Miquel 1842. Diar. Inst. Batav. scient.; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 483: nov. g. Peperomiear. (Piper globosum Poir.)
Miq. 1843. Syst. Piperac. p. 69; 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 413; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 8: sect. Peperomiae.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 15. n. 1821 *c a*: subsect. Peperomiae.

Tileae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 372: subordo Tiliacear. Trib.: Sloanidae, Grewidae.

Tilesia*) G. F. W. Meyer 1818. Esseq. p. 252: nov. g. Corymbiferar., Anthemidi aff. (T. capitata.) *Cf.* Bull. soc. philom. 1820. p. 7.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 398. 404: g. Rudbeckiear. (verar.?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2665. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20.
DC. 1836. Pr. V. p. 549: g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2503. p. 407; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3134. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Tilesia „Thunb. Act. Ups." Steud. Nom. II. p. 686. (T. incarnata et spiralis.) Quid?

Tilia Tourn. 1700. Inst. p. 611. t. 381: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 89. Ed. Hall. 1745. p. 100: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 156. n. 440; 1737. Cliff. p. 204; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 514; 1759. Syst. ed. X. p. 1075. n. 587; 1762. Sp. ed. II. p. 733; 1764. Gen. ed. VI. p. 267. n. 660; 1767. Syst. ed. XII. p. 363: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 373. — Murr. 1774. Syst. p. 410; 1784. Syst. p. 493. — Reich. 1778. Gen. p. 271. n. 717. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 355. n. 894. — Gmel. 1791. Syst. p. 815. — Pers. 1797. Syst. p. 528. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1161. n. 1028; 1809. En. p. 565. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 3. — Elliott 1821. Sketch II. p. 1. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 418. 439.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 357: g. Multilocularium. — Par. Crantz 1767. Stirp. Austr. p. 96.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 113. n. 464: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 67.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 382.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 453.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 179: g. Polyantherar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 484: g. Tiliatar.
Scop. 1777. Intr. p. 273: g. Polyandrar.
Medic. 1789. Vorles. IV. p. 288; 1789. Phil. Bot. I. p. 137.
Juss. 1789. Gen. p. 292: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 215. — Batsch 1802. Tab. p. 62. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 95. — DC. 1805. Franç. IV. p. 825; 1824. Pr. I. p. 512. — Pers. 1807. Ench. II. p. 66. n. 1270. — Spreng. 1818. Anl. II. 1. p. 816; 1825. Syst. II. p. 577. n. 1897; 1830. Gen. I. p. 426. n. 2116. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 636. — Link 1822. En. II. p. 71; 1831. Hdb. II. p. 349. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 334. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 374. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830.

*) Dicat. W. G. Tilesius v. Tilenau, peregrinatori.

Tilia Tourn. cont.
Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 552. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 15. — Koch 1836. Syn. p. 132. Ed. II. p. 145. — Kunth 1838. Berol. I. p. 89. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 239. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 441. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 237. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 156. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 76. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 285. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 584 (*Tilleul*).
Neck. 1790. El. II. p. 249. n. 996: g. Dapsilophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 150. t. 113.
Vent. Ann. XI. Mém. Inst. p. 105. (Monogr.) *Cf.* Konig Ann. of bot. I. p. 207.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5449; 1832. Fl. exc. p. 828: g. Tiliear. Sect. (1828): Tilia, Lindnera. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28).
Spach 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 331. t. 15. Revisio generis. (Spec. 9.)
Courtois 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 1. (De speciebus europaeis.)
Endl. 1840. Gen. n. 5373. p. 1008; 1841. Ench. p. 523: g. Grewiear. Sect. ut Rchb. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 357; 1843. II. p. 799.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.

Tilia Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5449 *a*: sect. Tiliae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5373 *a*. p. 1009; 1841. Ench. p. 523.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Tiliariar. genuinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7951: g. Tiliear. genuinar.

Tiliaceae Juss. 1789. Gen. p. 289: ordo 19 class. XIII. Gen. §. 1: Waltheria, Hermannia, Mahernia. §. 2: Antichorus, Corchorus, Heliocarpos, Triumfetta, Sparmannia, Sloanea, Apeiba, Muntingia, Flacurtia, Oncoba, Stewartia, Grewia, Tilia. §. 3. *Affinia*: Bixa, Laetia, Banara. (*Cf.* Cassel 1810. Nat. Fam. p. 144 et Juss. 1828. Dict. v. 54. p. 365.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 204. Gen. fere ead.
Batsch 1802. Tab. p. 62: fam. Multisetariar., a Jussieui ordine disjuncto §. 1. discrepans. Gen.: Muntingia, Flacurtia, Oncoba, Microcos, Grewia, Tilia, Aubletia, Sloanea, Sparrmannia, Triumfetta, Heliocarpus, Corchorus, Antichorus.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 90. t. 88: ordo pl. Gen. ut Juss. Accedunt in §. 2: Patrisia, Tricuspidaria, Colonna.
DC. 1805. Franç. IV. p. 824: fam. (83) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Tilia. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 893.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 815: fam. 89 plant. Gen.: Tilia, Grewia, Colona, Flacourtia, Oncoba, Rumea, Muntingia, Aubletia, Sloanea, Sauravia, Ventenatia, Triumfetta, Sparrmannia, Heliocarpus, Corchorus, Antichorus; Elaeocarpus, Aristotelea, Laetia, Banara; *Hermannieae; Chlaenaceae.*
DC. 1819. Theor. élém. p. 244; 1824. Pr. I. p. 503: ordo (27) Thalamiflorar. Gen.:

Tiliaceae Juss. cont.
Sparmannia, Abatia?, Heliocarpus, Antichorus, Corchorus, Honckenya, Triumfetta, Grewia, Columbia, Tilia, Diplophractum, Muntingia, Apeiba, Sloanea. *Affinia*: Ablania, Gyrostemon, Christiana, Alegria, Luhea, Vatica, Espera, Wikströmia, Berrya. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 540. Gen. ut DC. et Entelea, Porpa, Microcos, Vincentia, Brownlowia, Microstemma, Esenbeckia, Mollia, Euthemis, Xeropetalum.
Kunth 1821 in HBK. Nov. gen. V. p. 334. (1822. Malvac. p. 14.) Gen.: Corchorus, Heliocarpus, Triumfetta, Apeiba, Muntingia.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 636: fam. Thalamiflorar. Gen: Tilia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Columniferar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 338. Divis.: *genuinae* (gen.: Sparmannia, Heliocarpus, Entelea, Antichorus, Corchorus, Honckenya, Triumfetta, Porpa, Grewia, Columbia, Tilia, Diplophractum, Sloanea, Apeiba, Muntingia, Christiania, Alegria, Lühea), Elaeocarpeae. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36. 438 (28). Trib.: Tilieae, Elaeocarpeae. — Endl. 1840. Gen. p. 1004; 1841. Ench. p. 521. Subordines: *verae* (trib.: Sloaneae, Grewieae), Elaeocarpeae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV: fam. Capsularium. Divis.: Tremandreae, Elaeocarpeae, Tilieae.
Rchb. 1828. Consp. p. 208; 1832. Fl. exc. p. 828: fam. Tiliiflorar. Divis. eaed. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 302. Divis.: Tiliariae, Elaeocarpeae, Dipterocarpeae. — Rchb. 1841. Nom. p. 209. Divis.: Elaeocarpeae, Tilieae, Dipterocarpeae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 46: fam. Malvariear. Gen.: Tilia, Sparmannia, Grewia, Heliocarpus, Sloanea, Corchorus, Triumfetta, Apeiba, Muntingia, Gyrostemon, Berrya.
Link 1831. Hdb. II. p. 348: ordo 23 Allostemonum. Gen.: Sparrmannia, Corchorus, Grewia, Tilia.
Lindl. 1833. Nix. p. 20; 1847. Veg. kd. p. 371: ordo Malvalium. Subord.: Tileae, Elaeocarpeae.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 1: fam. (52) Columniferar. Trib.: *Tiliaceae* (gen.: Entelea, Sparmannia, Heliocarpus, Antichorus, Corchorus, Honckneya, Triumfetta, Porpa, Grewia, Columbia, Tilia, Diplophractum, Sloanea, Apeiba, Muntingia, Christiania, Luhea, Mollia), Elaeocarpeae. *Affinia*: Brownlowia, Ablania, Hasseltia, Vatica, Espera, Berrya, Trilix, Gluta, Decadia, Vateria.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 76: fam. Malvoidear. Gen. ex Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 582: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Subfam. ut Endl.

Tiliacora *) Colebrooke 1821. Linn. Trans. XIII. 1. p. 67: nov. g. a Menispermo sejunctum, a pluribus Cocculo insertum. *Cf.* Isis 1825. n. 969.
Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1895: g. Menispermear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 243 (desciscens). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 103. 109. — Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7).
Miers 1851. Ann. and Mag. 2d ser. VII. p. 36: g. Tiliacorear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 186: g. Cocculear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 126.
Synon. Bagalatta Roxb.

Tiliacoreae Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 36: trib. Menispermacear. Gen.: Tiliacora, Abuta?

Tiliae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 42 plant. Gen.: Heliocarpus, Triumfetta, Tilia, Grewia, Thea, Tribulus, Corchorus, Bixa, Helicteres, Liriodendrum, Magnolia.
Adans. 1763. Fam. II. p. 378: fam. 48 plant. Gen. §. 1: Urucu, Trilopus, Heliocarpus, Triumfetta, Sloana, Isora, Corchorus, Tilia, Guazuma, Grewia, Muntingia. §. 2: Hippocastanum, Acer, Rulac.

Tiliariae Rchb. 1837. Handb. p. 303: div. Tiliacear. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Tilia, Lindnera, etc.), Corchoreae, Sparmannieae.

Tiliatae Neck 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 484: ordo plant. Gen.: Tilia.

Tilieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209 (1832. Fl. exc. p. 828): div. Tiliacear. Gen.: Triumfetta, Porpa, Blumea, Honckenya, Sparmannia, Entelea; Hasseltia, Ablania, Houmiria, Abatia?, Heliocarpus?, Antichorus, Corchorus, Grewia, Dodecadia?, Columbia, Tilia, Diplophractum, Muntingia, Apeiba, Sloanea, Espera, Christiania, Lühea, Alegria, Vatica, Wickströmia, Berrya, Trilix, Oncoba? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. Subdivis.: Sloaneae, *genuinae* (gen. Grewiear. Endl. [emissis Sparmannieis] et Lindnera, Damina, Euryanthe?, Psammocorchorus, Ganja), Sparmannieae.
Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28): trib. Tiliacear. Gen.: Tilia, Clappertonia, Antichorus, Corchorus, Cotylephora?, Entelea, Foveolaria, Sloanea, Vatica?, Triumfetta, Xeropetalum, Brownlowia, Sparrmannia, Lühea, Mollia, Berrya, Columbia, Espera?, Diplophractum, Apeiba, Porpa, Laplacea?, Muntingia, Trilix?, Vincentia, Grewia, Heliocarpus, Ablania?, Gyrostemon, Christiana, Abatia?, Hasseltia?

Tiliiflorae Rchb. 1828. Consp. p. 206; 1832. Fl. exc. p. 651. 782; 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 204: formatio Idiocarpicar. Fam.: Caryophyllaceae, Theaceae, Tiliaceae.

Tilioides Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 53: nov. g. pro Tilia americana L. propositum. = Lindnera Rchb.

Tillaea **) Linn. 1737. Gen. p. 20. n. 57; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 36. n. 83: g. Triandr. Trigyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 26.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 26. n. 105: g. Thalamostemonum.
Linn. 1753. Sp. I. p. 128; 1759. Syst. ed. X. p. 902. n. 163; 1762. Sp. ed. II. p. 186; 1764. Gen. ed. VI. p. 68. n. 177; 1767. Syst. ed. XII. p. 132: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 142; 1784. Syst. p. 180. — Reich. 1778. Gen. p. 71. n. 189. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 93. n. 237. — Gmel. 1791. Syst. p. 289. — Pers. 1797. Syst. p. 176; 1805. Ench. I. p. 153. n. 346. — Willd. 1797. Sp. I. p. 720. n. 272. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 110. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p.866.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 307.
Adans. 1763. Fam. II. p. 249: g. Sedor.
Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar.
Neck. 1790. El. II. p. 302. n. 1077: g. Synathrophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 273: g. Succulentar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 27. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 110.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 123: g. Crassulear. — Par. Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 374. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 557. Sect.: Tillaea, Bulliarda. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6172. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 10.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 10. Ed. Schrank 1819. p. 10: g. Tetrandr. Monogyn.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 43: g. Crassulacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 355. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 277. Sect. ut Torr. & Gray. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 75.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Sedear. Sect.: Bulliarda, Helophytum, Tillaea.
Endl. 1839. Gen. n. 4607. p. 809; 1841. Ench. p. 405: g. Eucrassulear. Sect. ut Meisn. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 791.
Synon. Tillea Mich., Linn.

Tillaea DC. 1801. Bull. soc. philom. p. 2; 1805. Fl. franç. IV. p. 385: g. Crassulacear., sejuncta Bulliarda restrict. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 539. — Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Link 1831. Hdb. II. p. 18. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 546. — Koch 1836. Syn. p. 256. Ed. II. p. 282. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 73. — Webb .... Canar. I. p. 174. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 616.
Hedw. 1806. Gen. p. 84. n. 388: g. Crassulear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 381. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 98.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 36. 499. n. 606: g. Sempervivor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 856; 1825. Syst. I. p. 364. n. 369; 1830. Gen. I. p. 78. n. 383: g. Sedear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4173. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 416.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Sempervivear.

*) *Tilia-kora* nomen Bengalense.
**) Dicat. Mich. Aug. Tilli, Pisano.

Tillaea DC. cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): sect. Tillaeae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4607 *a*. p. 809; 1841. Ench. p. 405. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 557.

Tillandsia *) Linn. 1737. Gen. p. 100. n. 283; 1737. Cliff. p. 129; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 286; 1759. Syst. ed. X. p. 974. n. 357; 1762. Sp. ed. II. p. 409; 1764. Gen. ed. VI. p. 158. n. 396; 1767. Syst. ed. XII. p. 232. n. 392: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 259; 1784. Syst. p. 314. — Reich. 1778. Gen. p. 161. n. 428. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 212. n. 541. — Gmel. 1791. Syst. p. 530. — Pers. 1797. Syst. p. 332; 1805. Ench. I. p. 345. n. 767. — Willd. 1799. Sp. II. p. 11. n. 604. — Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 39. t. 265—271. (reform.) — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 195 (*Tilliandsia*). — Nutt. 1818. Gen. I. p. 208.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 219. n. 911: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Muricatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283.
Scop. 1777. Intr. p. 96: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 50: g. Bromeliar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 139. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 255.
Neck. 1790. El. III. p. 147. n. 1492: g. Cratoophytor.
Juss. 1804. Dict. v. 5. p. 347: g. Bromeliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 123. — Hedw. 1806. Gen. p. 219. n. 891. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 290. — Kunth 1822. Syn. I. p. 294. — Agdh. 1823. Aphor. p. 175. — Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. n. 1068; 1847. Veg. kd. p. 148. — Link 1829. Hdb. I. p. 207. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 185; 1843. En. genr. p. 24. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXVI. 1199. — Bartl. 1830. Ord. p. 47. — Endl. 1837. Gen. n. 1306. p. 183; 1841. Ench. p. 106. — Beer 1854. Flora p. 349. Sejungitur Diaphoranthema.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 270: g. Bromelear.
Tussac 1817. Dict. v. 7. p. 17 (*Caragate*): g. Narcissoidear.
Link 1821. En. I. p. 308: g. Bromelinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 23. n. 1170; 1830. Gen. I. p. 248. n. 1296: g. Bromeliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1056.
Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1275; 1841. Nom. p. 45. n. 1621: g. Tillandsiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. — Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298). — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.
Beer 1857. Bromel. p. 24. 151: g. Tillandsiar. (restrict.)
Synon. Renalmia Plum.; Renealmia Linn. 1737; Strepsia Nutt.; Amalia Hort. Hispan.

*) Dicat. memoriae Eliae Tillandsii, botanici quondam in Finlandia florentis. (Ht. Cliff.)

Tillandsiae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 23. 24: div. Diaphoranthemear.

Tillandsieae Rchb. 1828. Consp. p. 62: div. Bromeliacear. Gen.: Guzmannia, Caraguata, Tillandsia, Bonapartea, Pourretia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: trib. Bromeliacear. Gen.: Tillandsia, Pitcarnia, Bonapartea, Guzmannia, Pourretia. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. Gen.: Tillandsia, Renealmia, Billbergia, Guzmannia, Pourretia. — Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298). Gen.: Puya, Encholirium, Tillandsia, Caraguata, Bonapartea, Navia, Cottendorfia, Dyckia, Guzmannia, Dasylirion, Roulinia, Hechtia. — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740. Gen.: Tillandsia, Caragnata, Guzmannia, Bonapartea, Navia, Cottendorfia, Dyckia, Encholirium, Pourretia, Weldenia?
Rchb. 1837. Hdb. p. 151; 1841. Nom. p. 45: subdiv. Bromeliear. Gen. ut 1828 et Navia, Cottendorfia, Dyckia, Encholirium, Dasylirion, Hechtia; Brocchinia, Pitcairnia.

Tillea *) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 22. t. 20: g. pl. class. VI.
Linn. 1748. Ups. p. 24: g. Triandr. Trigyn.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
= Tillaea Linn.

Tilletia L. & Ch. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 112 (Flora 1849. I. p. 271): nov. g. Tilletiear. (Uredo caries DC.)
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 372; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 787: g. Uredinear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 516: g. Ustilagineor.

Tilletieae L. & Ch. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 112 (Flora 1849. I. p. 271): div. Ustilaginear. Gen.: Tilletia.

Tilliandsia Michx. vid. *Tillandsia Linn.*

Tilmadoche Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 454: nov. g. Physarear. (Physari sp.)

Tiloblasteae **) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phycol. gener. p. 178: subordo Eremospermear. Divis.: Gloeosipheae, Dermatosipheae. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 155; 1849. Sp. Alg. p. 235. Divis.: Oscillarinae, Confervinae.

Tilocnide ***) Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 210: sect. Böhmeriae.

Tilopteris Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 462. n. 284: g. Ectocarpear.
Synon. Trichopteris Kütz.

Tiloxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 137. 190: g. Abietinear.? foss. (Peuce Lindleyana With.)

Timandra †) Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 197: nov. g. Crotonear. (T. serrata, erythroxyloides et dichotoma.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 90. n. 5828/6. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.

*) Dicat. Mich. Aug. Tillio.
**) κνίδη, urtica.
***) τίλος, fibra, floccus; βλαστός, germen.
†) τιμή, pretium.

Timandra Klotzsch cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 368: sect. Crotonis.

Timbuleta Steud. Nom. I. p. 84; II. p. 688: vid. *Simbuleta Forsk.*

Timmia *) Hedwig 1787. Descr. Musc. frond. I. p. 83. t. 31; 1801. Spec. Musc. p. 176: nov. g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Röm. & Ust. Mag. Bot. IV. p. 162 et Leman 1828. Dict. v. 54. p. 384. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 761. n. 1652. — Roth 1800. Germ. III. p. 254. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 304. — DC. 1805. Franç. II. p. 497. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 35. — Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 84. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 195. n. 3339; 1831. Gen. II. p. 736. n. 3734. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 234. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 30.
Brid. 1797. Musc. rec. I. p. 176. II. 3. p. 53; 1817. Suppl. III. p. 96: g. Diploperistomator.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 38: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 122: g. Peristomor. acrocarpor.
Palis. 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 468: g. Diplopogonor. *Cf.* Desv. 1825. ibid. III. p. 224.
Hessl. 1822. De Timmia, musc. frond. gen. (Götting.)
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 730: g. Bryoideor.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 286: g. Bryoidear.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 68: g. Acrocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV Timmiar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 660: g. Conostomeor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69. g. Bryear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401; 1849. ibid. XII. p. 586.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 512: g. Acrocarpor. diploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 559. p. 54; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 367. — Bruch, Schimp. 1851. Bryol eur. Fasc. 46. 47.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 937: g. Calyptrobryor.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 88: g. Bryinear.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 188: g. Mniacear.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 232: g. Timmiacear.
Synon. Omphalophora Brid.

Timmia Gmel. 1791. Syst. p. 538: g. Hexandr. Monogyn.
= Cyrtanthus Ait.

Timmia Willd. 1799 in Schrad. Journ. II. p. 14: g. Muscor. frondosor. (Meesia longiseta Hedw.)
= Meesia Hedw.

Timmiaceae Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 231: subsect. Mnioidear. Gen.: Timmia.

Timmiae Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: div. Mnioideor. Gen.: Timmia.

*) Dicat. Joh. Ch. Timm, botanico mecklenb.

Timonius Rumph. 1743. Amboin. III. p. 216. t. 140.
DC. 1830. Pr. IV. p. 461: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 554. — Meisn. 1838. Gen. p. 166 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2847. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3197. p. 541; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
Synon. Bobea Gaudich.; Bobaea A. Rich.; Burneya Cham. & Schl.; Erithalis Forst.

Timutia Rchb. vid. *seq.*

Timutua DC. 1824. Prodr. I. p. 327: sect. Polygalae. (P. Timoutou Aubl.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3029 *a* (*Timutia*); 1841. Nom. p. 175. n. 6779. 5. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 354. — Endl. 1840. Gen. n. 5647 *e*. p. 1078; 1841. Ench. p. 568.

Tina *) Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXII. 414. n. 984: g. Sapindor. (*Gelonium Pet.-Th.*)
DC. 1824. Pr. I. p. 614: g. Sapindear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 364. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38).
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5211: g. Cupaniear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 669: sect. Cupaniae.
= Cupania Plum.?

Tinaea Garzia Relaz. degli anni 3. et 4. della Accademia de' zelanti di Aci Reale p. 24.
= Lamarkia Mönch.

Tinantia Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Moraeacear., pro „*Cyphella Herb.* non *Fries*" propositum.
= Cypella Herb.

Tinantia Scheidweiler 1839 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 46. p. 365: nov. g. Commelinacear. (T. fugax.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1533: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 100. *Cf.* Schltd. 1852. Linnaea XXV. p. 184.
Synon. Tinnantia Endl.

Tinantia **) Mart. & Galeotti 1844. Bull. Ac. Brux. XI. 1. p. 240: g. Nyctaginear. (antea *Lindenia.*)
Choisy 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 457: g. Boerhaaviear.
Synon. Lindenia Mart. & Gal.; Senkenbergia Schauer.

Tinda „Rheede" Rchb. 1841. Nomencl. p. 67. n. 2546: g. Artocarpear.?

Tinea Spreng. 1821. Neue Entd. II. p. 65: g. Tiliacear.
= Prockiaria DC.

Tinea ***) Bivona-Bernardi ....
= Neotinea Rchb.

Tinguarra †) Parlat. .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 157: nov. g. Seselinear. (Athamanta cervariaefolia DC.) — Par. Walp.

*) „*τίνα?* interrogamus, cum Gelonium Gärtn. et Pet.-Th. non sit satis notum."
**) Dicat. Tinant, botanico Belg.
***) Dicat. prof. Tineo, Panorm.
†) „Tinguarrus heros erat Nivariensis patriae benemerens".

Tinguarra Parlat. cont. 1846. Rep. V. p. 867. — Endl. 1850. Spl. V. p. 6. n. $4439/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Tiniaria Meisn. 1826. Polygon. p. 62; 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 62; 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 135: sect. Polygoni. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 4291 *f*; 1841. Nom. p. 163. n. 6317. 2. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 81; 1851. Ross. III. p. 527. — Endl. 1837. Gen. n. 1986 *h*. p. 307; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 49. — Kunth 1838. Berol. II. p. 163.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 574: subsect. Polygoni.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236: g. Persicariear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521: g. Polygonear. — Par. Webb . . . . Canar. III. p. 221.
Synon. Helxine Linn.; Bilderdykia Dumort.

Tinnantia Endl. 1841. Spl. I. n. $1031/_1$. p. 1356; 1841. Ench. p. 71: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188.
Meisn. 1842. Gen. p. 407 (311): g. Tradescantiear.
= Tinantia Scheidw.

Tinomiscium Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 37: nov. g. Heteroclinear.?
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 205: g. Menispermacear. dubiae tribus. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 134.

Tinòspora Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 35. 38: nov. g. Heteroclinear. (Cocculus cordifolius DC.)
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 182: g. Tinosporear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 124.

Tinosporeae Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 179: trib. Menispermacear. Gen.: Aspidocarya, Parabaena, Tinospora, Anamirta.

Tinus***) Tourn. 1700. Inst. p. 607. t. 377: g. pl. class. XX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 39. Ed. Hall. 1745. p. 41: g. pl. class. I.
Vaill. 1722. Act. Ac. Paris. p. 199: g. Dipsacear.
Linn. 1737. Gen. p. 85. n. 243; 1737. Cliff. p. 109; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 126. n. 291: g. Pentandr. Trigyn.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Dumosar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 136.
Borckh. 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 20. Char. emend.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 315: g. Viburninear.
= Viburni Linn. pars.

Tinus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 222. t. 103.
= Badula Juss. ?

Tinus Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1010. 1367. n. 1133; 1762. Sp. ed. II. p. 530; 1764. Gen. ed. VI. p. 200. n. 504; 1767. Syst. ed. XII. p. 281. n. 499: g. Enneandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 388. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 318; 1784. Syst. p. 384. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 364. — Reich. 1778. Gen. p. 205. n. 547. —

*) Plinio species lauri.

Tinus Linn. cont.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 270. n. 689. — Gmel. 1791. Syst. p. 652. — Pers. 1797. Syst. p. 411.
Gled. 1764. Syst. p. 227. n. 937: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 200: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 264: g. Meliar.
Neck. 1790. El. II. p. 65. n. 715: g. Arcythophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 41: g. Meliacear.
= Clethra Linn. (Swartz Obs. bot. p. 153.)

Tipalia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. pl. Typus: *Mouli-Ira Rheede* V. t. 34.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7476. 6. (*Typalia*): sect. Xanthoxyli.
= Rhetsa Wight & Arn.

Tiparium Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 825: subsect. Azanzae.

Tiphogeton Ehrhart 1780. Phytophyl. nr. 13; 1789. Beitr. IV. p. 146.
= Isnardia Linn.

Tipularia*) Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 195: nov. g. Gynandr. Monandr. (Orchis discolor Pursh.)
Spreng. 1826. Syst. III. p. 733. n. 3018; 1831. Gen. II. p. 671. n. 3387: g. Orchidear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 397.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 252: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1501.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Calanthidar.
= Anthericlis Rafin.

Tipularia Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 58; 1826. Fl. Par. I. p. 344: nov. g. Fungor. Liceae aff.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 218: g. Trichodermacear. subsphaericar.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 19; 1842. Mycol. p. 76: g. Physareor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Liceor.
Synon. Halterophora Endl.

Tiquilia Pers. 1805. Ench. I. p. 157. n. 350: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 90. n. 410.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 403: g. Borraginear.
Endl. 1839. Gen. n. 3749 *b*. p. 646; 1841. Ench. p. 320: sect. Coldeniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4367. 2. — DC. 1845. Pr. IX. p. 558. (?)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32: g. Tournefortiear.

Tiraseckia Sweet ex Steud. Nom. II. p. 689 pro *Jirasekia*.

Tirenzia „Neck.“ Meisn. Comm. p. 186 in synon. Cordiae: vid. *Firensia Neck.*

Tiresias Bory 1822. Dict. class. I. p. . . . .: nov. g. Arthrodiear. (Zoocarpear.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 593.

*) Nomen ob similitudinem floris cum Tipulis, insectorum genere.

Tiresias Bory cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 340: g. Ulvacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 462: g. Zygnemear.
Leman 1828. Dict. v. 54. p. 406; 1829. v. 59. p. 356: g. Zoocarpear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 15. n. 37: g. Confervear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Confervidar.
= Oedogonium Link, etc.

Tissa Adans. 1763. Fam. II. p. 507: g. Spergular.
= Spergulariae Pers. pars.

Tita Scopoli 1777. Introd. p. 219. n. 967: g. Calycanthemar.
= Cassipourea Aubl.

Titanephlium*) Nardo „1828“ 1834 in Oken Isis XXVII. p. 674: nov. g. Titanophytor. (T. Corallina.)
„Nardo 1828 in Nacc. Alg.“ E. B. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 596: g. Corallinear.
= Corallina Tourn.

Titanephyllum „Nardo“ Endl. Spl. III. p. 48 in synon. Corallinae: vid. *praeced.*

Titanoideae Nardo 1835. Consid. gen. Alghe (Isis 1837. p. 91): ordo 5 Algar. Fam.: Articulatae, Incrustantes, Fungimorphae.

Titanophyta Nardo 1834 in Oken Isis XXVII. p. 674: ordo Algar. Sect.: *articulata* (pleraeque Auctorum Corallinae), *incrustantia* (Nulliporae).

Titania Endl. 1833. Prodr. fl. Norfolk. p. 31: nov. g. Malaxidear. (T. miniata.)
Endl. 1837. Gen. n. 1331. p. 188; 1841. Ench. p. 109: g. Pleurothallear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1918. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Liparidar.

Tithonia „Desfont.“ Juss. 1789. Gen. p. 189: nov. g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 417.
Gmel. 1791. Syst. p. 1259: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2246. n. 1535. — Pers. 1807. Ench. II. p. 476. n. 1915.
Desfont. 1802. Ann. Mus. I. p. 49. *Cf.* Konig Ann. of bot. II. p. 166.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 571; 1826. Syst. III. p. 619. n. 2855; 1831. Gen. II. p. 641. n. 3213: g. Radiatar.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348: g. Helleniear.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 397. 399; 1828. v. 54. p. 454; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. (1827 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2666. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 150.
Link 1829. Hdb. I. p. 771: g. Coreopsidear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 229. — DC. 1836. Pr. V. p. 584. — Endl. 1838. Gen. n. 2537. p. 412; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (132). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3602. — Walp. 1843. Rep. II. p. 616. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.

*) τίτανος, calx: φλοιός, cortex. (?)

Tithymaleae Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 493: ordo plant. Gen.: Euphorbia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae. Gen.: Euphorbia, Jatropha.
Rchb. 1828. Consp. p. 194 (1832. Fl. exc. p. 755): subdiv. Euphorbiacear. Gen.: Pedilanthus, Euphorbia, Hendecandra, Anthostemma, Dalechampia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 280. Gen. ead. et Monotaxis loco Dalechampiae.
Rchb. 1841. Nom. p. 193: sect. Euphorbiear. Gen. ut 1828 (excepta Hendecandra).

Tithymali Adans. 1763. Fam. II. p. 346: fam. 45 plant. Gen. §. 1: Mançanilla, Bestram, Mercurialis, Schorigeram, Cicca, Tithymalus, Argythamnia, Cupania, Buxus, Clusia, Cascarilla, Hernandia. §. 2: Niruri, Altora, Curcas, Jatropha, Cupameni, Tournesol, Bernardia, Manihot, Sapium, Ricinus, Dalechampia, Pluknetia, Cavalam, Hura, Caapeba, Duchola, Papaya, Ertela, Polygala, Elsota.

Tithymalites Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. III. t. 224. 225.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 205. t. 53. f. 1—6: g. Euphorbiacitum.
= Artisia Sternb.

Tithymaloideae Vent. 1799. Tabl. III. p. 483: ordo 1 class. XV. Gen. §. 1: Mercurialis, Euphorbia, Phyllanthus, Kiggellaria, Clutia, Andrachne, Agyneja, Buxus, Adelia, Ricinus, Jatropha, Hevea, Aleurites, Croton, Acalypha. §. 2: Tragia, Stillingia, Sapium, Hippomane, Hura, Omphalea, Plukenetia, Dalechampia.
= Euphorbiaceae R. Brown.

Tithymaloides Tourn. 1700. Inst. p. 654 in App.
= Pedilanthus Neck.

Tithymalus*) Tourn. 1700: Inst. p. 85. t. 18: g. pl. class. I.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 223. t. 104. 105.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 189: g. Apetalar. Polystemonum.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 236: g. Tricoccar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 355: g. Tithymalor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172³: g. Tetrapetalar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 332: g. Decandr. Trigyn.
Med. 1789. Phil. Bot. I. p. 90. *Cf. Euphorbia Medic.*
Mönch 1794. Meth. p. 665: g. Calycostemonis.
= Euphorbia Linn.

Tithymalus Necker 1790. Elem. bot. II. p. 354. n. 1157: g. Cyrtosiphytor., ab Euphorbia L. sejunctum.

Tithymalus Pers. 1807. Ench. II. p. 10: sect. Euphorbiae. — Par. Link 1822. En. II. p. 10. — Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5012 *d*; 1832. Fl. exc. p. 755. Subsect. (1832): Galarrhoeus, Keraselma. — Koch 1837. Syn. p. 627. Ed. II. p. 723. — Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 2. Subsect.: Galarrhoeus, Esula. — Webb ..... Canar. III. p. 244. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. 721. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 558. — Baill. 1858. Euphorb. p. 284.
Synon. Helioscopia Röp.

*) Tithymalus s. Tithymallus Veterum.

Tithymalus Haworth 1812. Syn. succ. p. 137 (ed. Schrank 1819. p. 150); 1819. Suppl. p. 67: g. Dodecandr. Trigyn., ab Euphorbia L. disjunctum. (E. Tirucalli L.)

Tittelbachia *) Klotzsch 1855. Begon. p. 225: nov. g. Pritzeliear. (Begonia fuchsioides Hook.)
Adoptat Hassk. 1858. Ht. Bogor. I. p. 341.

Tittmannia**) Rchb. 1824. Ic. exot. I. p. 26. t. 38.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 800. n. 2172; 1831. Gen. II. p. 490. n. 2416: g. Scrofularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3153: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4598: g. Gratiolear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 413: sect. Vandelliae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 691.
= Vandelliae Linn. pars.

Tittmannia Brongn. 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 385. t. 38. f. 2: nov. g. Bruniacear. (T. lateriflora.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 49. — Endl. 1839. Gen. n. 4603. p. 807; 1841. Ench. p. 403. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Synon. Mösslera Rchb.

Tium Medic. (Vorles. II. p. 373) 1789. Vorles. IV. 1. p. 346; 1789. Phil. Bot. I. p. 203: nov. g. ex typo Astragali sulcati L.
Mönch 1794. Meth. p. 161: g. Thalamostemonis.

Tjongina Adans. 1763. Fam. II. p. 234: g. Salicariar.
= Bäckea Linn.

Tmeseopteris Kunze 1850. Linnaea XXIII. p. 295: nomen emendatum pro sequente.

Tmesipteris ***) Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 131: nov. g. Filicum agyratar. (Lycopodium tannense Spr.)
Swartz 1806. Syn. Fil. p. 187: g. Lycopodinear. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 113. — Grev. & Hook. 1831. Bot. Misc. II. p. 363. — Spring 1843. Bull. Ac. Brux. X. 1. p. 234.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 44: g. Agyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 28: g. Maschalocarpor.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 164. Ed. Nees p. 20: sect. Psiloti. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 695 *a*. p. 69; 1841. Ench. p. 47. — Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2316. 2.
Willd. 1810. Sp. V. p. 56. n. 1938: g. Stachyopteridum.
Desv. 1813. Bull. soc. philom. Juin p. 286; 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 192: g. Lycopodiacear. — Par. Leman 1828. Dict. v. 54. p. 467. — Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1677. — Bartl. 1830. Ord. p. 20. — Endl. 1833. Norf. p. 6. — Spring 1838. Flora I. p. 148. — Meisn. 1843. Gen. p. 436 (338). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 70.

*) Dicat. hortul. Tittelbach, nunc Kewensi.
**) Dicat. Joh. Aug. Tittmann, botanico Dresd.
***) τμῆσις, sectura, sectio.

Tmesipteris Bernhardi cont.
— Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 51. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 122.
Wahlenb. 1815. Nov. Act. Ups. VII. p. 178: g. Tetradidymar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 109: subg. Lycopodii.
Synon. Tmeseopteris Kunze.

Toanabo „Aubl.“ DC. Prodr. I. p. 528 in synon. Ternströmiae: vid. *Taonabo Aubl.*

Tobaphes „Philippi Fl. Atacam. ined.“ Bot. Zeit. 1857. p. 681: vid. *Jobaphes Phil.*

Tobera Kämpf. Amoen. exot. p. 797: vid. *Tobira Kämpf.*

Tobinia *) Desvaux 1825 in Hamilt. Pr. fl. Ind. occ. p. 56: nov. g. Dioec. Triandr. (Fagarae et Zanthoxyli sp.)
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5588: inter genera vix cognita.
Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46): sect. Zanthoxyli. — Par. Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 189.
= Fagara Lam. (Endl.)

Tobira Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 796 c. ic. (ubi *Tobera*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 449: g. Cistor.

Tobira Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1147: sect. Evonymi. (E. subtriflorus et Thunbergianus Bl.)

Tococa*) Aublet 1775. Guian. I. p. 437. t. 174: nov. g. Decandr. Monogyn. (T. guianensis.)
Scop. 1777. Intr. p. 211: g. Dumosar.
Juss. 1789. Gen. p. 330: g. Melastomar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 173: g. Melastomear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 316. n. 1249. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 508. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 339. n. 1714. — Bartl. 1830. Ord. p. 300.
D. Don 1823. Mem. Wern. Soc. IV. 2. p. 303: g. Melastomacear. (Injungitur Maieta Aubl.) — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 146. t. 277—279.
DC. 1828. Pr. III. p. 165: g. Miconiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 774. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 254. — Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6232. p. 1216; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1376. 1454. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6740. — Walp. 1846. Rep. V. p. 711. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4624: g. Blakeacear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 303. Sect.: Epiphysca, Hypophysca, Anaphysca.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 88: g. Clidemiear. Sect.: Eutococae, Pterophorae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 696.
Synon. Happia Neck.

Tocoyena Aublet 1775. Guian. I. p. 131. t. 50: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. longiflora.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 330.

*) Dicat. Jacobo Webbe Tobin, botanophilo in insula Nevisia Ind. occid.
**) Nomen caribaeum *Tococo*.

Tocoyena Aublet cont.
Juss. 1789. Gen. p. 201; 1820. Mém. Mus. VI. p. 390: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 439. — Hedw. 1806. Gen. p. 146. n. 628. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVI. 228. n. 917. — Kunth 1824. Syn. III. p. 60. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 980. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 469.
Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 57. t. 190. f. 2.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 411: g. Gardeniacear.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82 (sph. *Jocayena*): g. Genipariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2075: g. Cinchonear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 247: g. Gardeniar. Injungitur Posoqueria.
DC. 1830. Pr. IV. p. 374: g. Gardeniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 492. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 406. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2966. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3309. p. 562; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 521.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 25. t. 229.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Synon. Ucriana Willd.

Todaroa *) Parlatore .... in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 125: nov. g. Seselinear. (Peucedanum aureum Sol.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 864. — Endl. 1850. Spl. V. p. 6. n. 4430/$_2$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Todaroa Rich. & Galeotti 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 28: nov. g. Vandear. (T. micrantha.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.?

Todda-Pana Adans. 1763. Fam. II. p. 25: g. Palmar.
= Todda-panna Rheede.

Todda-panna Rheede 1682. Hort. Malab. III. p. 9. t. 13—21.
= Cycas Linn.

Toddalia **) Juss. 1789. Gen. p. 371: g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 253. — Hedw. 1806. Gen. p. 160. n. 681.
Pers. 1805. Ench. I. p. 249. n. 560: g. Pentandr. Monogyn.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIV. 322. n. 948: g. Terebinthacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 235. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 472. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 186. n. 942. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 830.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 356 (Gen. Tereb. p. 24): g. Pteleacear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 83.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 508: g.

Toddalia Juss. cont.
Zanthoxylear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5129. — Bartl. 1830. Ord. p. 386. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 805. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 149. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 368. — Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46). — Endl. 1840. Gen. n. 5975. p. 1147; 1841. Ench. p. 609. — Walp. 1842. Rep. I. p. 522. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 84.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7473: g. Xanthoxylear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 249: g. Xanthoxylacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473.
Synon. Scopolia Smith; Cranzia Schreb.; Rubentia Boj. (Steud.)

Todea*) Willd. 1802. Schr. Ac. Erf. p. 14: nov. g. Filicum. (exannulatar.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 54. p. 474. — Par. Swartz 1806. Syn. Fil. p. 162. (spurie gyratar.)
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 41: g. Agyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 33: g. Agyrator.
Willd. 1810. Sp. V. p. 76. n. 1947: g. Schismatopteridum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 105.
Agdh. 1822. Aphor. p. 116: g. Polypodiacear.
Link 1822. En. II. p. 455: g. Osmundinar.
Kaulf. 1824. Enum. p. 42: g. Osmundacear. — Par. Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 293. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. VI. p. 198. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 252. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. — Grev. & Hook. 1833. Bot. Misc. III. p. 231. — Endl. 1836. Gen. n. 666. p. 65; 1841. Ench. p. 41. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 22. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (336). — J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 390. — Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 329. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 117.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 25. n. 3225; 1831. Gen. II. p. 718. n. 3616: g. Osmundear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 739; 1841. Nom. p. 30. n. 1053. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 61. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.

Toffieldia „Smith" Schrank, Endl. vid. *seq.*

Tofielda Pers., Spach vid. *seq.*

Tofieldia*) Hudson 1778. Fl. angl. Ed. II. p. 175: nov. g. Hexandr. Trigyn. (Anthericum calyculatum L.) *Cf.* Schrank 1814. Münchn. Denkschr. f. 1813. p. 94 (*Toffieldia*). — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 399. n. 890 (*Tofielda*). — Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 27; 1809. En. p. 401. n. 450. — Elliott 1817. Sketch I. p. 424. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 235. Sect.: Tofieldia, Triantha. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 470. 594.
DC. 1805. Franç. III. p. 193: g. Colchicacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 172. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 480. —

*) Dicat. Augustino Todaro, botanico siculae egregio cultori.
**) *koka-toddali* Malabarensium.

*) Dicat. Henr. Jul. Tode, mycologo Schwerin.
*) Dicat. dom. Tofield.

Tofieldia Hudson cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 52. — Koch 1837. Syn. p. 724. Ed. II. p. 836. — Kunth 1838. Berol. II. p. 273.
Hedw. 1806. Gen. p. 251. n. 1018: g. Liliacear.?
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 267: g. Colchicear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 275.
Sternb. & Hoppe 1815. Denkschr. Regensb. Ges. I. p. 148.
Smith 1817. Linn. Trans. XII. 1. p. 205. t. 8. (Historia.) *Cf.* Isis 1825. p. 962.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 191; 1825. Syst. II. p. 143. n. 1361: g. Juncear.
Link 1821. En. I. p. 348; 1829. Hdb. I. p. 146: g. Melanthacear. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 225. — Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 511. 621. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 288. n. 1490. — Schult. 1830. Syst. VII. p. CIII. 1570. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1208.
Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 97. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 131. — Endl. 1837. Gen. n. 1062. p. 134; 1841. Ench. p. 79. Sect. (1841): Eutofieldia, Triantha. — Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235 (*Tofielda*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 209 (*Tofjeldia*). — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 173.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1293: g. Heloniear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.
A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 133; 1837. Melanth. Am. sept. rev.: g. Melanthear. Subgen.: verae, Triantha. — Simil. Endl. 1841. Spl. I. p. 1356 (*Tofieldia*). — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1691. Sect.: Tofielda, Triantha.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 165: g. Tofieldiear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 65 (*Tofjeldia*): g. Nartheciacear.
Synon. Anthericum Linn. (gen. 1737); Narthecium Gerard; Helonias Willd.; Heriteria Schrank; Isidrogalvia Ruiz & Pav.; Hebelia Gmel.; Conradia et Leptilix Rafin.

Tofieldia Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 235: sect. Tofieldiae. — Simil. A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 133. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1691 1 (*Tofielda*).
= Eutofieldia Endl.

Tofieldieae Kunth 1843. Enum. pl. IV. p. 165: trib. Melanthacear. Gen.: Tofieldia, Pleea.

Tofjeldia Fries, Ledeb. vid. *Tofieldia Huds.*

Tolasium Rchb. vid. *Talasium Spreng.*

Tollatia*) Endl. 1838. Gen. n. 2631. p. 428; 1841. Ench. p. 240: g. Madiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3034.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Sphenogynear.
Synon. Oxyura DC.

Tolmiaea D. G. vid. *seq.*

Tolmica A. Juss. vid. *Tolmiea Torr. & Gray.*

*) Dicat. J. Tollat de Vochenberg, prof. Vindobon.

Tolmiea*) Hook. 1834. Fl. bor. Am. II. p. 44: nov. g. Monotropear. (T. occidentalis.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. III. 1835. p. 113.
Meisn. 1839. Gen. p. 247 (155): g. Clethrear. = Cladothamnus Bong.

Tolmiea Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 582: nov. g. Saxifragear. (Heuchera Menziesii Hook.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4639/$_1$. p. 1416; 1841. Ench. p. 409. — Meisn. 1843. Comm. p. 357. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 398 (*Tolmica*) et D.G. 1849. ibid. XII. p. 599 (*Tolmiaea.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6140: g. Mitellear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.

Tolpideae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 398 (p. 397 *Hieracieae*): div. Hieraciear. Gen.: Tolpis, Arnoseris.

Tolpidium Schultz Bip. mss.
= Ascaricidae Less. pars. (Walp. Rep. II. p. 947.)

Tolpis Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
Lam. Illustr. t. 651.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 371. t. 60: g. Ligulatar.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 220: g. Petalostemonis. (Crepis barbata L.)
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1608. n. 1414; 1809. En. p. 829: g. Syngenes. Aequal. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 377. n. 1775. — Link 1822. En. II. p. 291.
Bertol. 1809 in Römer Collect. bot. p. 105.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2151; 1831. Fl. exc. p. 255: g. Crepidear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Less. 1832. Syn. p. 129: g. Hyoseridear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2979. p. 495; 1841. Ench. p. 294. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 328. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 287.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7: g. Hieraciear.
Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3681. 1: sect. Tolpidis.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 259: g. Liguliflorar.
Synon. Drepania Juss.; Swertia All.; Chatelania Neck.; Eutolpis Schultz Bip.

Tolpis Bivona-Bernardi 1809. Monogr. Tolpidis: g. ampliat.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 578; 1826. Syst. III. p. 670. n. 2902; 1831. Gen. II. p. 647. n. 3260: g. Cichorear.
Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 81. Sect.: Drepania, Polychaetia.
Link 1829. Hdb. I. p. 810: g. Cichoracear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 85: g. Hyoseridear. Sect.: Drepania, Schmidtia. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3681. Sect.: Tolpis, Schmidtia.

*) Dicat. Tolmie, botanico.

Tolpis Bivona-Bern. cont.
Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 397: g. Tolpidear. Sect.: Eutolpis, Schmidtia.
= Tolpis Adans. et Schmidtia Mönch.

Toluifera *) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 182. n. 413; 1753. Sp. I. p. 384; 1759. Syst. ed. X. p. 1019. n. 470; 1762. Sp. ed. II. p. 549; 1764. Gen. ed. VI. p. 210. n. 524; 1767. Syst. ed. XII. p. 293. n. 518: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 331; 1784. Syst. p. 398. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 282. n. 713. — Gmel. 1791. Syst. p. 677. — Pers. 1797. Syst. p. 425; 1805. Ench. I. p. 462. n. 1034. — Willd. 1799. Sp. II. p. 545. n. 828.
Gled. 1764. Syst. p. 92. n. 379: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 372: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 449. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 255. — Hedw. 1806. Gen. p. 298. n. 1184.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 485 (*Tolu*): g. Leguminosar.
Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4091 *b*; 1841. Nom. p. 154. n. 6045. 2: sect. Myrospermi.
= Myroxylon Mutis.

Toluifera Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 262. Ed. Willd. p. 321: g. Decandr. Monogyn. (T. cochinchinensis.)
= Loureira Meisn.

Tolustoma Ritg. vid. *Tulostoma*.

Tolypangium **) Endl. 1838. Gen. n. 3093 *a*. p. 520; 1841. Ench. p. 269: sect. Stylidii. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 332. — Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 15. — Walp. 1843. Rep. II. p. 704 (sph. *Polypangium*); 1847. VI. p. 367. — Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 370.

Tolypanthus Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 18: sect. Loranthi. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *q*. p. 803; 1841. Ench. p. 399. — Walp. 1843. Rep. II. p. 444.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2793: g. Psittacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791: g. Loranthacear.

Tolypella A. Braun 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 199: subg. Nitellae.
A. Braun 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 338: g. Characear.

Tolypeuma E. Meyer mss.
= Nesaea Comm.

Tolypomyria Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 726: nov. g. Polyactidear. (T. prasina.)

Tolypothrix Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 88; 1843. Phycol. gener. p. 227; 1845. Phycol. germ. p. 181: g. Calothrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 34. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 599.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. ...: g. Calothricear.

Tolypothrix Kütz. cont.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 312. n. 214: g. Scytonemear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 265: g. Oscillatoriear.

Tomaiosperma *) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 378: sect. Malouetiae.

Tomanthea **) DC. 1837. Prodr. VI. p. 564: nov. g. Centauriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2869. p 472; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3653: g. Zoëgeear.
= Phaeopappus DC.?

Tomasellia Massalongo 1856. Flora p. 283: nov. g. Lichenum. (Arthopyrenia arthonioides.)

Tomentella Pers. .... Obs. myc. II. p. 18: nov. g. Fungor., serius ab Auctore Telephorae injunctum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 54. p. 495.
= Coniophora DC.

Tomentilla Linn. 1764. Ord. nat.: sphalm. pro *Tormentilla*.

Tomex ***) Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 114: nov. g. plant.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 24. n. 59 (Nov. gen. zeyl. p. 4. n. 1038); 1753. Sp. I. p. 118; 1759. Syst. ed. X. p. 897. n. 140; 1762. Sp. ed. II. p. 172; 1764. Gen. ed. VI. p. 60. n. 151; 1767. Syst. ed. XII. p. 125: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 260. †)
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Dumosar.
Gled. 1764. Syst. p. 25. n. 96: g. Thalamostemonum.
= Callicarpa Linn. (Pers.)

Tomex Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 52.
Scop. 1777. Intr. p. 236: g. Nomadear.
= Doberia Juss.

Tomex Thunb. 1783. Diss. nov. gen. III. p. 65; 1784. Fl. jap. p. 10: nov. g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 441. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 315. n. 802. — Pers. 1797. Syst. p. 473. — Willd. 1799. Sp. II. p. 839. n. 926. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 370.
Juss. 1789. Gen. p. 440: inter genera incertae sedis.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Laurinear.
Link 1822. En. II. p. 1: g. Laurinar.
= Tetranthera Jacq.

Tomingodaphne Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 24. p. 375: sect. Tetrantherae.
Synon. Tomex Thunb.

---

*) Nomen a balsamo de Tolu s. Tolutano.
**) *τολύπη*, glomus.

*) *τομαῖος*, sectus.
**) *τομή*, sectio, segmen.
***) Latinis restis est ex Cannabi impolito leviter torta.
†) In Murr. Syst. 1774 in Indice indicatum p. 135, nec in textu p. 135, neque in synopsi generum Tetrandriae obvium.

Tomiophyllum Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 310: sect. Scrophulariae. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 219. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 709.

Tommasinia *) Bertol. 1839. Fl. ital. III. p. 414: nov. g. Pentandr. Digyn. (Angelica verticillaris L.) *Cf.* Flora Lit. X. p. 107.
Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5458: g. Peucedanear. — Par. Koch 1843. Syn. ed. II. p. 336. — Walp. 1846. Rep. V. p. 881.
Endl. 1850. Spl. V. p. 7. n. $4455/_1$: g. Angelicear.
Synon. Imperatoria Koch; Angelium Rchb.; Angelicoides DC.; Pteroselinum Rchb. 1827 pt.; Thommasinia Steud.

Tomogynia „Rich." Schlechtend. 1823. Fl. Berol. I. p. . . . : ordo Didynamiae. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 1.
= Gymnospermia Linn.

Tonabea Juss. 1789. Gen. p. 262: g. Aurantiis et Meliis aff. (*Taonabo Aubl.*)
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 37 (*Tonobea*): g. Hesperideis et Meliaceis aff.
= Ternströmia Mutis.

Tonca Rich. 1811. Anal. d. fruit p. 84.
= Bertholletia Humb. & Bonpl.

Tondin „Schilling de lepra t. 1" Gmel. 1791. Syst. p. 635: g. Octandr. Digyn. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 691. Quid?

Tonguea Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 4905. p. 1419; 1841. Ench. p. 449: g. Sisymbriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 183. n. 7034. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
Synon. Pachypodium WB.

Tonina Aublet 1775. Guian. II. p. 856. t. 330: nov. g. Monoec. Hexandr. (T. fluviatilis.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 884 (*Toninia*). — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 385.
Scop. 1777. Intr. p. 334: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 443: inter genera incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 189. n. 908: g. Aclithrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 570: g. Hexandr. Monogyn.
„Palis. mss." Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. 48. t. 6. f. 4: g. Eriocaulonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1023. p. 123; 1841. Ench. p. 68. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1517. — Steud. 1855. Glum. II. p. 283.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272: g. Restiacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 498.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1146: g. Xyridear.
Bartl. 1830. Ord. p. 36: g. Eriocaulear. — Par. Mart. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 7. 15. t. 4. f. II. — Kunth 1841. Enum. III. p. 494. — Meisn. 1842. Gen. p. 407

*) Dicat. Mutio Tommasini, Tergestino.

Tonina Aubl. cont.
(312.) — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 140.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 122: g. Eriocaulacear.
Körn. 1856. Linnaea XXVII. p. 571: g. Paepalanthear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 921.
Synon. Hyphydra Schreb.

Toninia Massalongo 1853. Mem. lich. p. 107: nov. g. Lichenum. (Lecidea cinereovirens, etc.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 182: g. Psorinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 337: sect. Biatorae.
Arnold 1858. Flora p. 473: g. Psorear.

Toninia Wittst. vid. *Tonina Aubl.*

Tonningia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 165. n. 1514: nov. Ymnodiphytor., a Tradescantia L. sejunctum. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 54. p. 503.

Tonobea St. Hilaire vid. *Tonabea Juss.*

Tonsella Schreb. 1789. Gen. I. p. 34. n. 74: g. Triandr. Monogyn. — Par. Vahl 1791. Symb. II. p. 17; 1806. Enum. II. p. 29. n. 81. — Gmel. 1791. Syst. p. 106. — Willd. 1797. Sp. I. p. 194. n. 90. — Pers. 1805. Ench. I. p. 41. n. 93. — Hedw. 1806. Gen. p. 30. 357. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 347. 545. n. 161.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 176. n. 194: g. Hippocratear. Sect.: Tontelea, Anthodon.
Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40): g. Hippocrateacear.
= Tontelea Aubl.

Tontalea Scopoli vid. *Tontelea Aubl.*

Tontanea Aublet 1775. Guian. I. p. 108. t. 42: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (T. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 280. — Pers. 1805. Ench. I. p. 134. n. 276.
Juss. 1789. Gen. p. 199; 1820. Mém. Mus. VI. p. 394: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 435. — Hedw. 1806. Gen. p. 64. n. 303. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 506.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2094.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82 (*Jontanea*): g. Genipariae.
= Coccocypselum Swartz.

Tontelea *) Aublet 1775. Guian. I. p. 31. t. 10: nov. g. Triandr. Monogyn. (T. scandens.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 341.
Scop. 1777. Intr. p. 325 (*Tontalea*): g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 436: inter genera incertae sedis.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 486; 1821. Dict. v. 21. p. 180: g. Hippocraticear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 688: g. Samydear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 176: sect. Tonsellae.

*) Nomen caribaeum: *Ravoua-Tontelle.*

Tontelea Aublet cont.
Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 506: g. Hippocrateear.
Endl. 1840. Gen. n. 5701. p. 1091; 1841. Ench. p. 576: g. Hippocrateacear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 400. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 585.
Rchb. 1841. Nom p. 208. n. 7907; g. Salaciear.
Synon. Sicelium P. Browne; Tonsella Schreb.; Custinia Neck.; Anthodon Ruiz & Pav.; Anthodus Mart.; Salacia Camb.; Raddisia Leand.; Clercia Fl. Flum.

Tooldia „Lehm.“ Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 884. Quid?

Toona Endl. 1840. Gen. n. 5556 *b.* p. 1055; 1841. Ench. p. 553: sect. Cedrelae.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 131. 139: g. Cedrelear.
Synon. Surenus Rumph.; Cuveracea Jones.

Topeinostemon Müll. vid. *Tapeinostemon Benth.*

Tophora Fries 1825. Pl. homon. p. 313: nov. g. Byssacear. (spuriar. — p. 305 Racodiacear.?) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 54. p. 521. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 1; 1842. Mycol. p. 3.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 56: g. Byssaceor. (germinatorior.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 83. (destructorior.)
Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15: g. Rhizomorpheor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Synon. Plegmatium Fries; Phlegmatium Rchb.

Topobaea Juss., Poir. vid. *seq.*

Topobea Aublet 1775. Guian. I. p. 476. t. 189: nov. g. Dodecandr. Monogyn. (T. parasitica.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 754.
Scop. 1777. Intr. p. 214: g. Dumosar.
Juss. 1789. Gen. p. 329: g. Melastomar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 172: g. Melastomear. — Par. Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 508 (*Topobaea*). — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 521.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 145: g. Pyxidanthear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 793i
= Blakea Linn.?

Topospora Fries 1835. Fl. Scan.; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 415: nov. g. Sphaeropsidear. (Sphaeria uberiformis et proboscidea.)
Fries 1849. Kongl. Vet. Ac. Handl. f. 1848; 1850. Flora p. 128. Char. emend.
Synon. Mastomyces Mont.

Tordyliaceae C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 362: trib. Umbelliferar. Gen.: Zosimia, etc.

Tordylieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: trib. Homalospermar. Gen.: Tordylium, Condylocarpus, Hasselquitia.

Tordylinae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 452: div. Platyspermar. Gen.: Tordylium.
= seq.

Tordylineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 85: trib. 7 Umbelliferar. Gen.: Krubera, Condylocarpus, Tordylium, Hasselquistia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIV.: div. Umbelliferar. Gen. ead.
DC. 1830. Pr. IV. p. 196: g. Orthospermar. Gen.: Hasselquistia, Tordylium, Tordyliopsis? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 345. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141: sect. Amminear. Gen.: Tordylium, Hasselquistia et 1841 Tordyliopsis.
Endl. 1839. Gen. p. 782 (praeced. Rchb. Consp.) Peucedaneis inserit.

Tordylioides Wallich mss.
= Tordyliopsis DC.

Tordyliopsis DC. 1830. Prodr. IV. p. 199: g. Tordylinear.? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 243. 346 (*Tordylopsis*). — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5489.
Tausch 1834. Flora I. p. 347: g. Peucedanear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4483. p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Tordylioides Wall.

Tordylium *) Tourn. 1700. Inst. p. 320. t. 170: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 261. Ed. Hall. 1745. p. 274: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 71. n. 203; 1737. Cliff. p. 90; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 58; 1753. Sp. I. p. 239; 1759. Syst. ed. X. p. 954. n. 293; 1762. Sp. ed. II. p. 345; 1764. Gen. ed. VI. p. 130. n. 330; 1767. Syst. ed. XII. p. 204. n. 327: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 227; 1784. Syst. p. 275. — Reich. 1778. Gen. p. 134. n. 361. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 181. n. 463. — Gmel. 1791. Syst. p. 472. — Pers. 1797. Syst. p. 290. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1381. n. 527; 1809. En. p. 302.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 448: g. Umbelliferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Crantz 1767. Umb. class. p. 55; 1769. Stirp. Austr. p. 153. — Scop. 1772. Carn. I. p. 194; 1777. Intr. p. 112. — Juss. 1789. Gen. p. 224. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 32. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 477. — DC. 1805. Franç. IV. p. 335. — Hedw. 1806. Gen. p. 194. n. 799. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 92. (Divis. I. Injungitur Hasselquistia.) — Link 1821. En. I. p. 264. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 521. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 533.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 53. n. 208: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 77.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 96. — Gis. 1792. Prael. p. 508. Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 313. n. 695.

*) Nomen ex Plinio.

Tordylium Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 99: g. Daucor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 85. t. 21. f. 3 (syriacum).
Neck. 1790. El. I. p. 177. n. 297: g. Scadiophytor.
Spreng. 1833. Prodr. Umb. p. 11.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 636; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XL. 459; 1825. Syst. I. p. 895. n. 1061; 1830. Gen. I. p. 224. n. 1162: g. Smyrniear.
Link 1829. Hdb. I. p. 354: g. Selinear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 197: g. Tordylinear. Sect.: Eutordylium, Condylocarpus. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 345. Sect. eaed. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5488. Sect. ut 1832. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106).
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 452: g. Tordylinar. Sect.: Condylocarpus, Tordylium.
Tausch 1834. Flora I. p. 347: g. Peucedanear. — Par. Koch 1836. Syn. p. 309. Ed. II. p. 339. Sect. ut DC. — Endl. 1839. Gen. n. 4482. p. 782; 1841. Ench. p. 379. Sect. eaed. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 973. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Walp. 1843. Rep. II. p. 417; 1846. V. p. 895. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 330. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 697.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 379: g. Diclidospermar. Sect. ut DC.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Tordylium et Condylocarpus Hoffm.

Tordylium Hoffm. 1816. Umbell. ed. II. p. 198. t. 3. f. 3. 4: g. Umbelliferar., sejuncto Condylocarpo restrict. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 87: g. Tordylinear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 365.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 16. 322: g. Umbellatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3686: g. Peucedanear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Tordyliear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 452; 1841. Nom. p. 142. n. 5488. 1: sect. Tordylii.
= Eutordylium DC.

Tordylopsis G. Don vid. *Tordyliopsis DC.*

Torenia *) Linn. 1751. Amoen. acad. III. Ed. 1787. p. 25; 1753. Sp. I. p. 619; 1759. Syst. ed. X. p. 1113. n. 672; 1763. Sp. ed. II. p. 862; 1764. Gen. ed. VI. p. 311. n. 754; 1767. Syst. ed. XII. p. 413: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 468; 1784. Syst. p. 559. — Reich. 1778. Gen. p. 312. n. 812. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 407. n. 1011. — Gmel. 1791. Syst. p. 935. — Pers. 1797. Syst. p. 596. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 32. t. 161; 1832. Ind. III. p. 95. — Willd. 1800. Sp. III. p. 265. n. 1149.

*) Dicat. Olof Toreen, navigatori sueco.

Torenia Linn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 173. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 364. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 281. — Poir. 1828. Dict. v. 54. p. 535.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor.
Gled. 1764. Syst. p. 173. n. 703: g. Petalostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 122: g. Scrophulariis aff.
Neck. 1790. El. I. p. 346. n. 540: g. Chasmatophytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 29. t. 184.
Pers. 1807. Ench. II. p. 166. n. 1492: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3151. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24. — Bartl. 1830. Ord. p. 171.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 440. Ed. Nees p. 296: g. Scrophularinar. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 86. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 754.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 396; 1825. Syst. II. p. 799. n. 2169; 1831. Gen. II. p. 489. n. 2411: g. Scrofularinar.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
Benth. 1835. Scroph. ind. p. 38; 1835. Scroph. rev. p. 4: g. Gratiolear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 550. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4597. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3953. p. 684; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269 (*Torrenia*). — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 521. — Walp. 1845. Rep. III. p. 294. 965.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 409; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Linderniear. Sect.: Tridens, Nortenia, Craterostigma. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 687. Sect.: Tridens, Nortenia.
Synon. Caëla Adans.; (Caeta Steud.); Nortenia Pet.-Th.; Dunalia R. Brown.

Torenioides Benth 1846 in DC. Prodr. X. p. 413: sect. Vandelliae. — Par Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 690 (*Torenoides*).

Torenoides Miquel vid. *praeced.*

Toresia Pers. 1807. Ench. II. p. 534. n. 2034: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 63.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Avenacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1038. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63.
= Torresia Ruiz & Pav.

Toricellia *) DC. 1830. Prodr. IV. p. 257: nov. g. Araliacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 388. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — Endl. 1839. Gen. n. 4557. p. 794; 1841. Ench. p. 393. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781 (*Torricellia*).
Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5548: g. Araliear.

*) Dicat. physico Toricelli.

Torilis Adans. 1763. Fam. II. p. 99: g. Daucor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 82. t. 20. f. 6 (nodosa, Anthriscus, macrocarpa).
Mönch 1794. Meth. p. 102: g. Thalamostemonis.
DC. 1805. Franç. IV. p. 332: sect. Caucalidis. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 313.
Spreng. 1813. Comm. Gotting. II. p. 7: g. Umbelliferar. (emend.) — Par. Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 49. — Link 1821. En. I. p. 255. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 95. (Divis. 1.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 499. — Bartl. 1820. Ord. p. 336.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 637; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLI. 482; 1825. Syst. I. p. 898. n. 1065; 1830. Gen. I. p. 224. n. 1164: g. Caucalinar. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 447; 1837. Hdb. p. 219.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 166: g. Umbellatar.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 80; 1836. Syn. p. 313. Ed. II. p. 344: g. Caucalinear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 361. — Rchb. 1828. Consp. p. 141. n. 3667; 1841. Nom. p. 139. n. 5371. Sect. (1841): Torilis, Trichocarpaea. — DC. 1830. Pr. IV. p. 218. Sect.: Eutorilis, Trichocarpaea. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 361. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 374. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Kunth 1838. Berol. I. p. 283. — Endl. 1839. Gen. n. 4503. p. 786; 1841. Ench. p. 380. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 979. — Walp. 1843. Rep. II. p. 421; 1846. V. p. 903. — Brongn. 1843. En. genr. p. 113. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 342. — Parlat..... in Webb Canar. II. p. 165. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 675. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 743.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Caucalidear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 346. — Tausch 1834. Flora I. p. 344. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363: g. Caucalear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 384: g. Acanthospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Caucalinidar.
Synon. Caucalis Scop.; Anthriscus Pers.

Tormentilla *) Tourn. 1700. Inst. p. 298. t. 153: g. pl. class. VI. (a Hall., Nestl., Lehm., DC., Bluff etc. Potentillae insertum).
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 61. Ed. Hall. 1745. p. 67: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 147. n. 416; 1737. Cliff. p. 194; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 500; 1759. Syst. ed. X. p. 1065. n. 560; 1764. Sp. ed. II. p. 716; 1764. Gen. ed. VI. p. 256. n. 635; 1767. Syst. ed. XII. p. 352: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 399; 1784. Syst. p. 479. — Reich. 1778. Gen. p. 260. n. 691. — Pers. 1797. Syst. p. 515; 1807. Ench. II. p. 56. n. 1242. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1112. n. 1001; 1809. En. p. 555.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 341: sect. Potentillae. — Par. Tausch 1823. Ht. Canal. fasc. I. — Endl. 1840. Gen. n. 6363*a*. p. 1242; 1841. Ench. p. 659. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 445.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat. (sph. *Tomentilla*): g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 327.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 187. — Link 1822. En. II. p. 65. — Lois. 1828. Dict. v. 54. p. 537. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 194.
Gled. 1764. Syst. p. 277. n. 1144: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 660.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[5]: g. Tetrapetalar.
Juss. 1789. Gen. p. 337: g. Potentillar.
Neck. 1790. El. II. p. 94. n. 758: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 860: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 228.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 346: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 454. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 561. — Koch 1836. Syn. p. 220.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4435; 1832. Fl. exc. p. 588; 1841. Nom. p. 168. n. 6499: g. Potentillear. (genuinar.) — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 190.
= Potentillae pars Auct.

Torminalis Med. 1789. Phil. Bot. I. p. 134. 155: nov. g. pro Crataego torminali L. propositum.
= Torminariae DC. pars.

Torminaria DC. 1825. Prodr. II. p. 636: sect. Pyri. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4470 *d*; 1841. Nom. p. 169. n. 6540. 5. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 647. — Endl. 1840. Gen. n. 6342 *d*. p. 1237; 1841. Ench. p. 656. — Ledeb. 1844. Ross. p. 98.
Römer 1847. Fam. nat. III. p. 101. 130: g. Pomacear.
Synon. Torminalis et Hahnia Medic.

Tornabenea *) Parlatore 1849. Niger Fl. p. . . .; 1850 in Hook. Kew gard. misc. II. p. 370: novum nomen pro *Tetrapleura Parl.*, nec Benth.

Tornabenia Massalongo . . . . *Cf.* Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 90. (g. Lichenum thamnoblastor.: T. chrysophthalma.)

Tornabona Caesalp. 1583. De plant. lib. 8. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 17.)
= Nicotiana Tourn.

Torochlamydae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 59: class. (13) Chlamydanthar. Ord.: Liliariear, Colchicarieae; Veratrarieae, Potamogetarieae, Nayarieae, Marathrarieae, Juncarieae.

*) Nomen, quod radicis pulvis cum alumine cavis dentium inditus dentium tormentum sive cruciatum sedet. (Bauhin.)

*) Dicat. F. Tornabene, prof. Catanensi.

Torocoronae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 19: class. (4) Coronanthar. Ord.: Nyctaginarieae; Globularieae, Labiarieae, Pinguicularieae, Polygalarieae, Rhinantharieae; Solanarieae, Boraginarieae, Convolvularieae, Asclepiarieae, Jasminarieae, Primularieae, Ericarieae.

Toropetalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 42: class. (8) Petalanthar. Ord.: Rutarieae, Geranarieae, Malvarieae, Hypericarieae, Citrarieae, Sapindarieae, Stellarieae; Resedarieae, Cistarieae; Ranuncularieae, Berberarieae; Cruciferarieae, Papaverarieae, Podophyllarieae.

Torosepalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 14: class. (3) Sepalanthar. Ord.: Nepentharieae, Laurrainieae, Callitricharieae, Monimiarieae, Ambrosarieae, Ficarieae, Urticarieae, Anthobolarieae, Chenopodarieae, Amaranthariеae, Polygonarieae; Protearieae, Samydarieae, Sanguisorbarieae, Scleranthariеae.

Torotepalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 53: class. (9) Tepalanthar. Ord.: Nymphaearieae, Paridarieae.

Torpesia*) Endl. 1840. Gen. n. 5541c. p. 1051; 1841. Ench. p. 551: sect. Trichiliae? (Portesia mucronata Cav.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8077. 3.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 86. 116: g. Trichiliear.

Torrenia Spach vid. *Torenia Linn.*

Torrentia Arrab. ex Steud. Nomencl. II. p. 693: g. Vernoniacear.? (T. quinquenervis).

Torresia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 125; 1798. Syst. p. 251: nov. g. Monoec. Triandr. *Cf. Toresia Pers.* et *Auct.*
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 79: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 29. 515. p. 285. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. II. p. 372.
= Hierochloë Gmel.

Torreya***) Rafin. 1818. Amer. monthl. mag. ex Journ. Phys. LXXXIX. p. 259: nov. g. ex typo Lamii hispiduli Michx.
= Synandra Nutt.

Torreya Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 105: nov. g. ex typis Cyperi caespitosi et diandri Torr.
Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1471: g. Cyperear.
= Cyperus Linn.

Torreya Spreng. 1821. Neue Entd. II. p. 221; 1825. Syst. I. p. 504. 583. n. 627; 1830. Gen. I. p. 161. n. 810: g. Nyctaginear. *Cf.* Endl. Gen. p. 312. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 110. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 715. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 516 (dubium).
Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1847: g. Allioniacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 174: g. Pisoniear.
= Clerodendron R. Brown.

*) Anagramma nominis Portesia.
**) Dicat. Hieronymo de la Torre, Madrit.
***) Dicat. John Torrey, prof. Novi Eboraci.

Torreya Arnott 1838. Ann. nat. hist. I. p. 126: nov. g. Taxinear. (Taxus montana Nutt.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 62. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1798/1. p. 1373; 1841. Ench. p. 144; 1842. Spl. II. p. 27. n. 1808; 1847. Syn. Conif. p. 240; 1847. Spl. IV. p. 10. n. 1816. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 297. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 181.
Rchb. 1841. Nom. p. 61. n. 2336: g. Taxear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 231: g. Taxacear.
Hook. 1854. Bot. Mag. t. 4780. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 801.
Synon. Caryotaxus Zuccar.; Struvea Rchb.

Torreya Croom mss.
= Croomia Torr.

Torricellia Lindl. vid. *Toricellia DC.*

Torrubia Flor. Flum. III. t. 150 (opposita). *Cf.* Steud. Nom. II. p. 693 (*Torrulia*): g. Hexandr. Monogyn.
= Pisonia Plum.

Torsellia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 412: nov. g. Cytisporeor. (Sphaeria sacculus Schwein.)

Tortella C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 599: sect. Barbulae.

Tortilia Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. I. Fasc. 33—36: sect. Hymenostomi.

Tortula Hedw. 1782. Fund. p. 92; 1801. Spec. Musc. p. 122: g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 13. — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 461; 1800. III. p. 200. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 760. n. 1647. — Mönch 1794. Meth. p. 733. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 11. 89. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 295. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 33. — DC. 1805. Franç. II. p. 481; 1815. V. p. 223. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 73. Sect.: Tortula, Barbula. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 722. — Math. 1853. Belg. II. p. 47.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 164; II. 1. p. 182; 1806. Spl. I. p. 245: g. Aploperistomator.
Palis. 1805. Pr. Aeth. p. 27; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 455: g. Entopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 222.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 37: g. Mitrocarpor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: g. Barbulear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 761: g. Bryoideor.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 267: g. Dicranoidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Dicranear.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 35; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 615: g. Tortulear.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 93: g. Trichostomear. Sect.: Syntrichia, Barbula, Aloideae. — Par. Orb. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 69.

Tortula Hedw. cont.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 374: g. Trichostomacear.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: subg. Barbulae. (B. rigida, etc.)
= Barbula Hedw. et Syntrichia Web. & Mohr.

Tortula „Roxb." Willd. 1800. Spec. III. p. 359. n. 1192: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Roth 1821. Nov. spec. p. 299.
= Priva Adans.

Tortula Rebent. 1804. Fl. Neom. p. 257: sect. Barbulae.
Schwägr. 1811. Suppl. I. 1. p. 135: g. Muscor. frondosor. restrictum.
= Syntrichia Web. & Mohr.

Tortula Hook. & Grev. 1824. Edinb. journ. I. p. 294.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 512: g. Muscor. Acrocarpor.
= Hyophiladelphus Müll.

Tortula Ritgen 1831 in Schr. Marb. Ges. II. p. 91: g. Spondylomycetum. („Nees fig. CCXVII", quae Boletum cristatum monstrat.)

Tortuleae „Hook." Montagne 1840 in Webb Phyt. Canar. IV. p. 35: trib. Muscor. Gen.: Tortula.

Torula Pers. 1795 in Usteri n. Ann. IX. p. 25; 1796. Obs. myc. I. p. 25: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 20.
Pers. 1797. Tent. p. 75: g. Nematothecii.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIX. 693: sect. Moniliae.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 21: g. Mucedinum.
Nees 1816. Syst. p. 72. f. 69; 1817. Überbl. p. 20: g. Byssor. solidor.
Mart. 1817. Erlang. p. 357: g. Inomycetum. (aëreor.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 556. n. 3566; 1831. Gen. II. p. 782. n. 4050.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: g. Moniliar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 557: g. Byssidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.
Pers. 1824. Mycol. eur. I. p. 20: g. Trichomycor. Sect.: Menilia, Torula, Hormiscium.
Link 1824. Spec. I. p. 128: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 543: g. Moniliear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 311: g. Byssear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Oidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 63b: g. Byssor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear. (et denuo inter Moniliaceas.)
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 495: g. Sporodesmieor.
Duby 1835. Mém. Genèv. VII. 1. p. 215: g. Cladosporiear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 471.

Torula Pers. cont.
Endl. 1836. Gen. n. 189. p. 17; 1841. Ench. p. 13: g. Sporodermeor. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 245.
Corda 1837. Ic. fung. I. p. 8; 1838. II. p. 7; 1839. III. p. 5; 1840. IV. p. 23; 1842. V. p. 5. 50; 1842. Mycol. p. 18: g. Torulacear. Sect. (1842): Chalara, Cylindrosporium, Antennaria, Torula. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 104. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 5.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 37: g. Torulaceor. Sect.: Chalara, Torula. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 9. t. 5. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495. — Bonord. 1851. Hdb. p. 71.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 296: g. Coniomycetum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 505: g. Toruleor.
Conf. Alternaria Nees; Syncollesia Agdh.; Hormiscium Kunze; Xenodochus Schltd.; Tetracolium Kunze? Sacharomyces Meyen.

Torula (cerevisiae) Turpin.
= Cryptococcus Kütz.

Torula Corda 1829 in Sturm Flora. Fung. II. p. 71. t. 33—48: g. Torulacear., complectens Acrosporium, Alysidium, Antennariam, Hormiscinm, Moniliam, Sphondylocladium, Tetracolium et Torulam. *Cf.* Flora Lit. II. p. 45.

Torulaceae Corda 1829 in Sturm Flora. Fung. II. p. 71: fam. Fungor. Gen.: Torula, Alternaria, Siridium, Phragmotrichum. *Cf.* Flora. Lit. II. p. 45.
Corda 1837. Ic. Fung. p. 8; 1821. II. p. 7; 1839. III. p. 5; 1840. IV. p. 23: fam. Coniomycetum. Sect.: *verae* (gen.: Torula, Speira, Gyrocerus, Helicomyces), Phragmotrichiaceae. — Par. Corda 1842. Ic. V. p. 5; 1842. Mycol. p. LV. 18. Gen.: Siridium, Torula, Speira, Gyrocerus, Helicomyces. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 104. Gen.: Torula, Cylindrisporium, Gongromeriza.

Torulacei Rchb. 1841. Nom. p. 2: sect. Uredineor. Gen.: Tetracolium, Speira, Torula, Helicomyces, Gyrocerus, Septonema, Alternaria, Conoplea, Bispora, Trimmatostroma, Phragmotrichum. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 34. Gen. ead. et Seiridium, Chalara, Diplosporium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: subordo Coniomycetum. Gen.: Torula, Conoplea, Ceratospora, Clasterispora, Speira, Dictyosporium, Gyrocerus, Helicomyces, Bispora, Septonema, Trimmatostroma, Alternaria, Dicoccum, Sporidesmium, Coniothecium, Hymenopodium, Echinobotrys, Spilocaea.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: trib. Hormiscineor. Gen.: Torula, Tetracolium, Cylindrosporium, Sporendonema, Speirea, Gongylocladium?, Helicomyces.
Bonord. 1851. Hdb. p. 70: fam. Hyphomycetum. Gen. §. 1: Torula, Oidium, Clado-

Torulacei Rchb. cont.
sporium, Siridium, Helicosporium, Alternaria, Gongromeriza. §. 2: Sporodum, Helicoma, Gonatorrhodum. §. 3: Briarea, Penicillium, Rhodocephalus, Monilia, Coprotrichum, Hormodendron, Cladotrichum, Dendryphium.

Torularia Bonnemais. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 97: nov. g. Epidermear. (Conferva atra Roth, etc.)
= Batrachospermum Roth.

Torulei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 504: div. Sporidesmiaceor. Gen.: Dendryphium, Polytrinchium, Septonema, Alternaria, Torula, Xenodochus.

Torulinium Desvaux 1825 in Hamilt. Pr. fl. Ind. occ. p. 15: nov. g. Cyperacear. (T. confertum et Cyperus ferox Rich.)
Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1106: g. Cyperear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
= Schoenus Lestib.

Torva Nees 1834. Linn. Trans. XVII. p. 51: sect. Solani. (S. ferox, torvum, etc.)

Torvaria Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 258: subsect. Leptostemoni.

Torvum G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 430: sect. Solani. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 78.

Torymenes Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 283: nov. g. Zingiberear. (Amomum granum paradisi L.)

Tosagris Palis. (ubi?)
= Trichochloa DC. (Spreng. Syst. I. p. 261.)

Touchardia Gaudich. Bot. voy. Uran. t. 94.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 191 (Flora 1855. p. 519): g. Lecanthear.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 379: g. Sarcochlamydear.

Touchiroa*) Aublet 1775. Guian. I. p. 384. t. 148: nov. g. Decandr. Monogyn. (T. aromatica.)
Bronn 1822. Diss. p. 135 (*Touchiroua*): g. Intsiear.
Hassk. 1855. Retzia I. p. 202: g. Caesalpiniear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 611.
= Crudia Schreb.

Touchirou L. C. Rich. mss.
= praeced.

Touchiroua Bronn vid. *Touchiroa Aubl.*

Toulichiba Adans. 1763. Fam. II. p. 326: g. Phaseolor.
= Ormosia Jacks.

Toulicia**) Aublet 1775. Guian. I. p. 359. t. 140: nov. g. Octandr. Trigyn. (T. guianensis.)
Scop. 1777. Intr. p. 323: g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 248: g. Sapindor.
Neck. 1790. El. II. p. 229. n. 970: g. Eredophytor.
St. Hil. 1806. Expos. II. p. 11: g. Saponacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 284. n. 1140.
DC. 1824. Pr. I. p. 612: g. Sapindear. —

*) Nomen caribaeum *Moutouchiraou*.
**) Nomen caribaeum *Toulici*.

Toulicia Aublet cont.
Par. Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 663. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 40. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). — Endl. 1840. Gen. n. 5601. p. 1068; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1846. Rep. V. p. 360. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5214; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7586: g. Cupaniear.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 47: g. Cupaniae injungendum?
Synon. Ponaea Schreb.; Dicranopetalum Presl.

Touloucouna*) Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 88. 123: nov. g. Xylocarpear. (Carapa guineensis A. Juss.)
= Carapae Aubl. pars.

Tounatea**) Aublet 1775. Guian. I. p. 549. t. 218: nov. g. Polyandr. Monogyn. (T. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 820 (*Tunatea*). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 375 (*Tunatea*).
Juss. 1789. Gen. p. 440 inter genera incertae sedis.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear. (pars Swartziae.)
DC. 1825. Pr. II. p. 424: sect. Swartziae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 380. — Vogel 1837. Linnaea XI. p. 175. — Endl. 1841. Gen. n. 6814 *a*. p. 1322; 1841. Ench. p. 681. — Walp. 1842. Rep. I. p. 841.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 49: g. Leguminosar. — An Possirae injungendum?
Synon. Swartzia Schreb.; Gynanthistrophe Poit.

Touretia Lam. . . .
= Tourrettia Domb. (DC. Pr. IX. p. 236 not.)

Tourneforteae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 653: trib. Ehretiacear. Gen.: Ehretia, Menais, Cortesia, Amerina, Rhabdia, Tournefortia, Rotala, Coldenia, Halgania.

Tournefortia Ponted. .... Epist. p. 11. (ex Gärtn.)
= Anthospermum Linn.

Tournefortia ***) Linn. 1737. Gen. p. 55. n. 156; 1737. Cliff. p. 48; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 140; 1759. Syst. ed. X. p. 916. n. 176; 1762. Sp. ed. II. p. 201; 1764. Gen. ed. VI. p. 78. n. 192; 1767. Syst. ed. XII. p. 149: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 161; 1784. Syst. p. 191. — Reich. 1778. Gen. p. 80. n. 205. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 104. n. 253. — Lour. 1790. Coch. I. p. 122. — Gmel. 1791. Syst. p. 324. — Pers. 1797. Syst. p. 197; 1805. Ench. I. p. 165. n. 366. — Willd. 1797. Sp. I. p. 791. n. 288; 1809. En. p. 188. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 24.

*) Nomen vernaculum arboris.
**) Nomen caribaeum *Tounou*.
***) De nomine pro Pittonia Plum. proposito conf. Linn. Hort. Cliff. p. 49.

Tournefortia Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 212. n. 886: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 480.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Asperifoliar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 157. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 452. (anomalar.)

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 129. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 297. — Hedw. 1806. Gen. p. 122. 378. n. 539. — Link 1821. En. I. p. 162. — Poir. 1826. Dict. v. 41. p. 174 *(Pittone)*.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 365. t. 76. f. 2 (volubilis et cymosa).

Neck. 1790. El. I. p. 274. n. 431: g. Trachytophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 383: g. Sebestenar.

Cram. 1803. Disp. p. 175: in Syngenes. Monogam.

Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2982: g. Hydrophyllear.

Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear.

D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Heliotropear.
= Tournefortiae R. Brown pars.

Tournefortia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 496. Ed. Nees p. 352: g. Boraginear., injuncta Messerschmidia dilatatum. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 78. Sect.: Messerschmidtiae, Pittoniae. — Röm. & Schult. 1818. Syst. IV. p. LI. 533. n. 813. Sect.: Tournefortia, Heliotropoides, Messerschmidiae antiquae. — Kunth 1823. Syn. II. p. 199. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 844.

Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 4: g. Pentandr. Monogyn.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 643. n. 705; 1830. Gen. I. p. 134. n. 670: g. Asperifoliar. Sect. (1825): Messerschmidia, Pittonia. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 235. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 627.

Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 138: g. Ehretiacear.

Cham. 1829. Linnaea IV. p. 465: g. Tournefortiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4363. — Endl. 1839. Gen. n. 3747. p. 646; 1841. Ench. p. 320. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (186). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Ehretiear. — Par. A. DC. 1845. Pr. IX. p. 513. Sect.: Mallota, Arguzia, Pittonia, Tetrandra, Messerschmidia. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 555. — Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 16 (ubique *Tournifortia*). t. 1386. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 97.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 365: g. Heliotropear. Sect.: Pittonia, Messerschmidtiae antiquae, Heliotropioides.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653: g. Tournefortear.

Tournefortia R. Brown cont.
Miq. 1857. Ind. II. p. 926: g. Heliotropiear. Sect.: Mallota, Pittonia. — Par. Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 48.
Synon. Tournefortia et Messersmidia Linn.; Messerschmidia B. Juss.; Pittonia Plum.

Tournefortieae Chamisso 1829. Linnaea IV. p. 465: div. Boraginear. Gen.: Tournefortia.

Bartl. 1830. Ord. p. 197: div. Borraginear. Gen.: Cordia, Patagonula, Cordiopsis, Rhabdia, Ehretia, Beureria, Messerschmidia, Tournefortia, Preslea, Tiaridium, Heliotropium.

Rchb. 1837. Hdb. p. 193: subdiv. Idiocarpicar. Gen.: Messerschmidia, Tournefortia, Rhabdia, Beurreria, Ehretia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. Gen. ut Endl. 1841.

Endl. 1839. Gen. p. 645: trib. Ehretiacear. Gen.: Ehretia, Rhabdia, Grabowskya, Beurreria, Tournefortia, Messerschmidtia, Coldenia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1402 et Ench. p. 320) Amerina, Halgania. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186). Gen.: Rotula?, Cortesia, Menais, Amerina, Halgania, Ehretia, Grabowskia, Tournefortia, Messerschmidtia, Rhabdia, Coldenia.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32: sect. Ehretiacear. Gen. ut Endl. et Tiquilia.

A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 657: subtrib. Ehretiear. Gen. ut Spach.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 55: trib. Borraginear. Gen. ex Endl.

Tournesol Magnol. 1720. Char. plant. lib. 3. p. 4. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 399 = Croton.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 356: g. Tithymalor.
= Chrozophora Neck.

Tournesolia Scopoli 1777. Introd. p. 243. n. 1097: g. Tricoccar.
= Chrozophora Neck.

Tournifortia Wight vid. *Tournefortia R. Brown.*

Tournonia *) Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 225: nov. g. Basellear.

Touroubea „Aubl." Steud. Nom. II. p. 694: err. pro *Souroubea Aubl.* (a Steud. p. 613 etiam recepta)?

Touroulia **) Aublet 1775. Guian. I. p. 492. t. 194: nov. g. Icosandr. Monogyn. (T. guianensis.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 372 (*Turulia*).

Juss. 1789. Gen. p. 434: inter genera incertae sedis.

Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5501: g. Lecacear.?

Spreng. 1830. Gen. I. p. 434. n. 2151: g. Polyandr. Monogyn.

Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109): g. Araliacear.? — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4565. p. 796; 1841. Ench. p. 393 (dubium). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 260. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781.

---

*) Dicat. D. J. Tournon, florae Tolosan. auct.
**) Nomen caribaeum *Tourouli*.

Touroulia Aublet cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 154 (111): g. Caprifoliacear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5556: g. Araliear.
Synon. Robinsonia Schreb.

Tourretia*) „Dombey mss." Fougeroux 1787. Hist. Ac. Paris. 1784. p. 205. t. 1 (*cf.* Röm. & Ust. Mag. Bot. IV. p. 180): nov. g. Didynam. Angiosperm. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 406. n. 1009. — Gmel. 1791. Syst. p. 940.
Juss. 1789. Gen. p. 139: g. Bignoniar.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 407: g. Bignonear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 318.
Pers. 1807. Ench. II. p. 174. n. 1517: g. Bignoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 416: g. Bignoniear. (anomalar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3267.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 89: g. Tourretiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 231. — Endl. 1839. Gen. n. 4111. p. 710; 1841. Ench. p. 346. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4543. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 567.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Sesamear.
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123: g. Catalpear.
= Tourrettia Willd.

Tourretieae D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 88: sect. Bignoniacear. Gen.: Tourretia, Eccremocarpus, Calampelis. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 153. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. Gen. unicum: Tourretia.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 215. 231: trib. Bignoniacear. Gen. ut D. Don.
Endl. 1839. Gen. p. 710; 1841. Ench. p. 346: subordo Bignoniacear. Gen.: Tourretia.
Rchb. 1841. Nom. p. 117: subsect. Bignoniear. pterospermar. Gen. id.

Tourretta Batsch vid. *seq.*

Tourrettia „Domb. ex DC." Willd. 1800. Sp. III. p. 263. n. 1147: g. Didynam. Angiosperm.
Batsch 1802. Tab. p. 192 (*Tourretta*): g. Personatar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 837. n. 2233; 1831. Gen. II. p. 504. n. 2477: g. Bignoniear. (descisc.) — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 109 (*Turretia*).
Meisn. 1840. Gen. p. 301 (209): g. Catalpear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 236.
Synon. Tourretia Domb.; Touretia Lam.; Dombeya L'Herit.

Toutousi Duch. vid. *Tsutsusi Kämpf.*

Tovara Adans. 1763. Fam. II. p. 276: g. Persicariar.
= Persicaria Tourn.

*) Dicat. M. A. L. Claret de la Tourrette.

Tovaria Necker 1790. Elem. bot. III. p. 190. n. 1552: nov. g. Gonoophytor., a Convallaria L. disjunctum.
= Smilacina Desfont.

Tovaria*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 49. t. 8; 1802. Fl. Peruv. III. p. 73. t. 306: nov. g. Heptandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 402. n. 903.
Hedw. 1806. Gen. p. 256. n. 1038: g. Primulacear.?
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 389: g. Primulear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 167. n. 1399; 1830. Gen. I. p. 296. n. 1525: g. Meliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1224. 1225.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 112: g. Octandr. Monogyn.
D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 49: g. Capparidear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 133.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 385: g. Capparear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 17 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296. (?) — Endl. 1839. Gen. n. 5006. p. 894; 1841. Ench. p. 456. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7116: g. Cadabear.

Tovomia Pers. vid. *seq.*

Tovomita**) Aublet 1775. Guian. II. p. 956. t. 364: nov. g. Polygam. Tetragyn. (T. guianensis.)
Juss. 1789. Gen. p. 256: g. Guttiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 38. — Pers. 1807. Ench. II. p. 68. n. 1279 (*Tovomia*). — Poir. 1828. Dict. v. 55. — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 314. t. 64; 1828. Mém. Mus. XVI. p. 419. — — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 286.
Gmel. 1791. Syst. p. 808: g. Polyandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 89: g. Guttaeferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5488: g. Clusiear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 617. — Meisn. 1837. Gen. p. 42 (31). Sect.: Marialvea, Micranthera, Ochrocarpos. — Endl. 1840. Gen. n. 5433. p. 1025; 1841. Ench. p. 534. — Walp. 1842. Rep. I. p. 392; 1843. II. p. 810. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.
Bartl. 1830. Ord. p. 294: g. Garciniear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 309.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Tovomitear.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8028: g. Clusiariar.
Synon. Marialva Vand.; Marialvaea Mart.; Marialvea Spreng.; Beauharnoisia Rz. & Pav.; Micranthera Choisy; Bertolonia Spreng.; Ochrocarpos Pet.-Th.; Ochrocarpus Juss.

Tovomiteae Rchb. 1837. Handb. p. 311: sect. Clusiear. Gen.: Verticillaria, Tovomita.

Townsendia***) Hook. 1833. Fl. bor. Am. II. p. 16. t. 119: nov. g. Asterear. (Aster?

*) Dicat. Simoni Tovario, medico hispanico.
**) Nomen caribaeum *Votomité.*
***) Dicat. David Townsend, West Chester, Pennsylvaniae.

Townsendia Hook. cont.
exscapus Rich.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. III. 1835. p. 112. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3286. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 272: g. Euasterear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Endl. 1841. Spl. I. n. 2304/₁. p. 1380; 1841. Ench. p. 234. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 185. Sect.: Townsendia, Urophorus, Nanastrum. — Walp. 1843. Rep. II. p. 575. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 304: g. Asterinear. Subgen.: Townsendia, Urophorus, Nanodia.

Toxanthes*) Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXIV. p. 176: nov. g. Bellidear. (T. perpusillus et major.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 187.
= Anthocerastes et Scyphocoronis A. Gray. (Sond. in Linnaea XXV. p. 480.)

Toxica Link 1822. En. II. p. 82: sect. Aconiti.

Toxicaria Aepnel teste Steud. Nomencl. II. p. 694.
= Ipo Pers.

Toxicodendron **) Tourn. 1700. Inst. p. 610. t. 381: g. pl. class. XXI. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 115.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 101: g. pl. class. V.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 156. (Rhus Toxicodendron L.)
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 489; 1841. Nom. p. 146. n. 4668. 4: sect. Rhois.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 72: subsect. Rhois. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1131. n. 5905 *c β*.
Synon. Vernix Adans.; Pocophorum Neck.; Toxicodendrum Mönch.

Toxicodendron Spreng. vid. *Toxicodendrum Thunb.*

Toxicodendrum Catesb. 1731. Hist. nat. Carol. I. p. 40. t. 40.
= Elemifera Linn.

Toxicodendrum Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 207. t. 44. f. 5 (T. Cobbe).
= Schmidelia Linn.

Toxicodendrum Mönch 1794. Meth. p. 73: g. Thalamostemonis.
Endl. 1841. Ench. p. 599. n. 5905 *c β*: subsect. Rhois.
= Toxicodendron Tourn.

Toxicodendrum Thunb. 1796. Act. Ac. Holm. p. 188. t. 7; 1798. Nov. gen. VIII. p. 124; 1800. Prodr. II. p. 191: g. Dodecandr. Trigyn.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 821. n. 1823: g. Dioec. Dodecandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 367 (*Toxicodendron*): g. Euphorbiear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 460. n. 1781 (*Toxicodendron*): g. Tricoccar.?
= Hyaenanche Lamb.

Toxicophlaea*) Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 24: nov. g. Apocynacear., Arduinae aff. (Cestrum venenatum Thunb.)
Meisn. 1843. Comm. p. 365: g. Carissear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 74. n. 3372/₁. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601 (*Toxicophloea*)?
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 336: g. Eucarissear.
Synon. Acokanthera G. Don; Acocanthera Endl.

Toxicophloea Lindl. vid. *praeced.*

Toxocarpus Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 61: nov. g. Asclepiadear. — Par. Hook. & Arn. 1836. Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 200. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 889.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 160: g. Secamonear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3442. p. 589; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5054. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 474.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 504: g. Secamonar.

Toxophoenix**) Schott 1822. Bras. Nachr. II. App. p. 12; 1823. Isis p. 1045: nov. g. Palmar. (T. aculeatissima.)
= Astrocaryum Meyer.

Toxostigma Rich. 1850. Fl. Abyss. II. p. 86: nov. g. Boraginear., Echio aff. (T. luteum et purpurascens.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 127: g. Anchusear.

Toxotropis Turczan. 1846. Bull. soc. Mosc. XIX. p. 506: nov. g. Corynellae aff. *Cf.* Flora 1848. I. p. 301 et Bot. Zeit. 1848. p. 356.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 232: g. Galegear.

Tozzettia***) Savi 1798. Mem. soc. ital. VIII. p. 477; 1800 in Ust. n. Ann. XVIII. p. 49: nov. g. Triandr. Digyn. (Phalaris utriculata Scop.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 116.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 944: g. Phalaridear.
Endl. 1836. Gen. n. 747c. p. 80; 1841. Ench. p. 56: sect. Alopecuri. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1228. 1.

Tozzettia Parlat. 1854. Nuovi gen. monoc. p. 11: nov. g. Liliear. (Fritillaria persica L.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 103.

Tozzia†) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 19. t. 16: g. pl. class. III.
Linn. 1737. Gen. p. 181. n. 504; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 607; 1759. Syst. ed. X. p. 1108. n. 663; 1763. Sp. ed. II. p. 844; 1764. Gen. ed. VI. p. 306. n. 745; 1767. Syst. ed. XII. p. 406: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p.

*) τόξον, arcus, sagitta.
**) τοξικόν, venenum.

*) φλοιός, cortex.
**) τόξον, arcus; φοῖνιξ, palma.
***) Dicat. Ott. Targioni-Tozzetti.
†) Dicat. Brunone Tozzi, botanico Italo.

Tozzia Micheli cont.
461; 1784. Syst. p. 551. — Reich. 1778. Gen. p. 308. n. 803. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 403. n. 1002. — Gmel. 1791. Syst. p. 925. — Pers. 1797. Syst. p. 587; 1807. Ench. II. p. 154. n. 1461. — Willd. 1800. Sp. III. p. 202. n. 1136. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 767. n. 2139.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 609: g. Dymeizonum.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 178. n. 729: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 173. — Gis. 1792. Prael. p. 487. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 8. 125.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 200: g. Verbenar.

Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 305: g. Angiospermar.

Juss. 1789. Gen. p. 97: g. Lysimachiis aff.

Neck. 1790. El. I. p. 350. n. 546: g. Chasmatophytor.

Vent. 1799. Tabl. IV. p. 12: g. ordinis incerti.

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 104. t. 198.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 224: g. Primulaceis aff.

DC. 1805. Franç. III. p. 487: g. Rhinanthacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 539. Ed. II. p. 720.

St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 17: g. Scrophularinear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7 (incertae sedis).

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 420: g. Myoporear.

St. Hil. 1826. Bull. soc. philom. p. 191; 1827. Mém. Mus. XIV. p. 94: g. Scrophularinar. Char. reform. *Cf.* Flora 1827. II. p. 545.

Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321: g. Rhinanthear. (?) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 172. — Endl. 1839. Gen. n. 4019. p. 694; 1841. Ench. p. 340. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Meisn. 1840. Gen. p. 313 (223). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 554. — Walp. 1845. Rep. III. p. 436. 972.

Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 116: g. Primulacear.

Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3072: g. Melampyrear. — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 584.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Melampyracear.

Link 1829. Hdb. I. p. 509: g. Monospermar.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 482. n. 2381: g. Verbenear. descisc.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 357: g. Pedicularinar.

D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 113: g. Obolariear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 635.

Rchb. 1837. Hdb. p. 197; 1841. Nom. p. 115. n. 4455: g. Tozziear.

Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.

Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 622: g. Scrophulariacear.

Tozzieae Rchb. 1837. Handb. p. 197; 1841. Nomencl. p. 115: subdiv. Rhinanthear. Gen.: Tozzia.

Trabecularia Bonorden 1857. Bot. Zeit. p. 209: nov. g. Fungor, Laschiae Fr. aff.

Tracheanthera Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 96: sect. Chironiae. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 8.
= Orphium E. Meyer.

Trachelanthus Kunze 1850. Bot. Zeit. p. 665: nov. g. Borraginear. (Solenanthus cerinthoides Boiss.)

Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 141: g. Cynoglossear.

Trachelanthus Klotzsch 1856. Begon. p. 202: nov. g. Begoniacear.

Trachelium*) Tourn. 1700. Inst. p. 130. t. 50: g. pl. class. II.

Linn. 1737. Gen. p. 47. n. 132; 1737. Cliff. p. 66; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 41; 1763. Sp. I. p. 171; 1759. Syst. ed. X. p. 928. n. 204; 1762. Sp. ed. II. p. 243; 1764. Gen. ed. VI. p. 89. n. 221; 1767. Syst. ed. XII. p. 163. n. 220: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 177; 1784. Syst. p. 212. — Reich. 1778. Gen. p. 91. n. 237. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 119. n. 293. — Gmel. 1791. Syst. p. 358. — Pers. 1797. Syst. p. 220; 1805. Ench. I. p. 194. n. 433. — Willd. 1797. Sp. I. p. 926. n. 332; 1809. En. p. 215. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 31.

Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 201. n. 832: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 187.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Campanular. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 134.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 150. — Gis. 1792. Prael. p. 393.

Hill 1769. Ht. kew. p. 130: g. Monopetalar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 155. t. 31. f. 4 (caeruleum).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 213.

Juss. 1789. Gen. p. 165: g. Campanulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 471. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. VII. 158. n. 878. — Link 1821. En. I. p. 218; 1829. Hdb. I. p. 635. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 118. — Bartl. 1830. Ord. p. 152. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 567.

Neck. 1790. El. I. p. 235. n. 381: g. Sygolliphytor.

Batsch 1802. Tab. p. 212: g. Campanulatar.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 368: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 140. n. 603. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 524; 1825. Syst. I. p. 738. n. 789; 1830. Gen. I. p. 168. n. 847. — A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 352; 1839. Pr. VII. 2. p. 491. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 779. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4020. (genuinar.) — Endl. 1838. Gen. n. 3087. p. 518; 1841.

*) Nomen a τράχηλος, collum, quod in colli affectionibus commendatur. (Bauhin.)

Trachelium Tourn. cont.
Ench. p. 267. — Meisn. 1839. Gen. p. 242 (150). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 742. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2794: g. Phyteumear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30.

Trachelospermum Lemaire .... Jard. fl. sub t. 61. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 498.
= Rhyncospermum A. DC.

Trachilia Endl., Lindl. vid. *Trachylia Fries.*

Trachinga Endl. 1838. Gen. n. 2495 *b.* p. 406; 1841. Ench. p. 238: sect. Alarçoniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3125. 2.

Trachisciadium Endl. vid. *Trachysciadium DC.*

Trachodes *) D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 182: nov. g. Lactucear. (Sonchus paniculatus S. & M.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 170. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 191. — Endl. 1838. Gen. n. 3004. p. 498; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3728: g. Picridiear.

Trachyandra **) Kunth 1843. Enum. pl. IV. p. 573: nov. g. Anthericear. (Anthericum hispidum L., etc.) — Par. Schltd. 1845. Bot. Zeit. p. 627. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 372. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.

Trachycarion Baill. vid. *Trachycaryon Klotzsch.*

Trachycarpus DC. 1837. Prodr. VI. p. 438: sect. Brachyrhynchi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2812 *b.* p. 460; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3367. 2.

Trachycaryon Klotzsch 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 175: nov. g. Crotonear. (Croton quadripartitum Labill.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 406 (*Trachycarion*): sect. Adrianiae.
= Adriania Gaudich.?

Trachycaryum A. DC. 1846. Prodr. V. p. 173: sect. Trichodesmatis.

Trachydium Lindl. 1835 in Royle Himal. p. 232.
Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105): g. Seselinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4443. p. 776; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 7. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5436. — Walp. 1846. Rep. V. p. 869.
Decne 1844 in Jacquem. voy. Bot. p. 69.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Trachylia Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: nov. g. Lecidear. *Cf.* Flora 1824. I. Beil. p. 87 et Leman 1828. Dict. v. 55. p. 123.

*) *τραχώδης*, scaber.
**) *τραχύς*, asper, durus.

Trachylia Fries cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 276: g. Coniothalamor.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 352: g. Coniocarpicar.
Fries 1831. Lich. eur. p. 7. 402; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 118: g. Caliciear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. III. p. 46; 1849. ibid. VII. p. 350; 1849. ibid. XII. p. 628.
Endl. 1836. Gen. n. 128. p. 12; 1841. Ench. p. 9 (*Trachilia*): g. Calyciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 14. n. 509.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Sclerophorear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50 (*Trachilia*): g. Calycidar.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 10 (Flora 1854. p. 233): g. Calicioidear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 299: g. Arthoniear.

Trachylobium Hayne 1827. Flora II. p. 743 (Arzneigew. XI. t. 17—19): nov. g. pro Hymenaea verrucosa Lam. conditum.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 458: g. Cassiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70).
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Amherstiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 846. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1473: sect. Hymenaeae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6788 *b.* p. 1317; 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6090. 2.
Synon. Tanroujou Juss.

Trachyloma Brid. 1827. Bryol. II. p. 277: nov. g. Pleurocarpor. peristomor. (Neckera planifolia Hedw.)
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Climacior.
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 556: g. Climacioideor.
Endl. 1836. Gen. n. 586. p. 56; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 964: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399; 1849. ibid. XII. p. 629: g. Hypnear.?
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 103: g. Neckeracear.
= Leiophyllum (subsect.) C. Müll.

Trachyloma Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 174 adnot.: nov. g. Sclericar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Sclerear.
= Scleriae Berg. pars.

Trachymarathreae Tausch 1834. Flora I. p. 344: subtrib. Acanthospermar. Gen.: Trachymarathrum.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134: sect. Acanthospermear. Gen. id.

Trachymarathrum *) Tausch 1834. Flora I. p. 344: nov. g. Trachymarathrear. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IV. 1835. p. 46. — — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134.
= Lophocachrys DC.

Trachymene Rudge 1811. Linn. Trans. X. p. 300: nov. g. Umbelliferar. — Par. Spreng.

*) *μάραθρον*, foeniculum.

Trachymene Rudge cont.
1818. Umbell. sp. p. 8. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 124. — Bartl. 1830. Ord. p. 236. (descisc.)
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXII. 357; 1825. Syst. I. p. 879. n. 1036; 1830. Gen. I. p. 220. n. 1136: g. Hydrocotylinar.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 143: g. Hydrocotylinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3760 b: g. Hermadear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Didiscospermar.
Lindl. 1829. Bot. Regist. XV. n. 1225. Char. emend.
DC. 1830. Pr. IV. p. 72: g. Hydrocotylear. Sect.: Platymene, Dendromene. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 257. Sect. eaed. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5509. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Endl. 1839. Gen. n. 4362. p. 764; 1841. Ench. p. 377. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 931. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 137. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 110. — Walp. 1843. Rep. II. p. 385. Sect. ut DC. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 286.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.
Synon. Azorella Labill.; Fischera Spreng.; Catepha Lesch.

Trachymitrium Brid. 1826. Bryol. I. p. 159: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Weissioideis aff.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 124.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 611: g. Weissiaceor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849 ibid. XII. p. 629: g. Syrrhopodontear.
= Syrrhopodon Schwägr.

Trachynia Link 1827. Hort. Berol. I. p. 42; 1829. Hdb. I. p. 18: g. Triticear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 19.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 851: g. Secalinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
= Brachypodium Palis.

Trachynotea Rchb. vid. *seq.*

Trachynotia*) Michx. 1803. Fl. bor. Am. I. p. 63: nov. g. Graminum. (Dactylis cynosuroides L.)
DC. 1805. Franç. III. p. 74; 1815. V. p. 279: g. Graminear.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 858 *a* (*Trachynotea*): sect. Spartinae.
= Spartina Schreb.

Trachy-Oogaster „Corda 1846" Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 72. t. 17: sect. Oogasteris. (Tuber brumale Vitt.)

Trachyozus**) Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 836: g. Cenchrinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Endl. 1837. Gen. n. 784. p. 85; 1841. Ench. p. 57: g. Panicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1292. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 294 (sph. *Trechyozus*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 111.
Synon. Trachys Pers. (non Zool.); Trachystachys Dietr.

Trachyphyllum Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 208: sect. Saxifragae. (S. aspera DC.) — Par. Koch 1836. Syn. p. 270. Ed. II. p. 297. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6155. 2. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 207.
Grenier 1853 in Billot Fl. Gall. exs. Cent. XI: subsect. Saxifragae.

Trachyphytum „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 533: sect. Mentzeliae. (Bartonia aurea Lindl.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 160. n. 6242. 2.
= Macrosperma Endl.

Trachypleurum Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3739: nov. g. Smyrniear. (Bupleurum granulosum, glaucum, etc.)
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 479; 1844. Fl. sax. p. 266: sect. Bupleuri. (B. tenuissimum L.) *Cf. Agostana Gray.*
Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5403: g. Amminear. genuinar.
= Bupleuri Tourn. pars.

Trachypodium Brid. .... *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 125.
= Lepidopilum Brid.

Trachypogon Nees 1829. Agrost. Bras. p. 341: nov. g. Saccharinear. (Andropogon Montufari Kunth.)
Endl. 1833. Norf. p. 19: g. Graminear.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 255: g. Andropogineor.
Endl. 1837. Gen. n. 950 *b*. p. 108; 1841. Ench. p. 60: sect. Andropogonis. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 368.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Andropogonear.
Synon. Schizachyrium Nees; Pithecurus Willd.; Sorghum Pers.; Blumenbachia Köl.

Trachypus Reinw. & Hornsch. 1829. Nov. Act. Leop. XIV. 2. p. 708: nov. g. Muscor. frondosor. *Cf.* Flora Lit. I. p. 313. — Par. Schwägr. 1842. Suppl. IV. t. 318.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400; 1849. ibid. XII. p. 630: g. Neckerear.
= Cyrtopus Brid.

Trachyrhynchium Nees in Herb. Meyen. (*Trachyrhyngium* Steud. Nom. II. p. 695.)
= Baumea Gaudich.

Trachyrhyngium Steud. vid. *praeced.*

Trachys Pers. 1805. Ench. I. p. 85. n. 160: nov. g. Triandr. Digyn. (Cenchrus mucronatus L.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 127. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 38. n. 173. — Trin. 1820. Fund. p. 171.
Palis. 1812. Agrost. p. 107: g. Graminear.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1830. Gram. p. 52; 1833. Agrost. p. 168: g. Panicear. — Par. Trin. 1833. Mém. Ac. Pet.

*) νῶτος, dorsum.
**) ὄζος, articulum, ramus.

Trachys Pers. cont.
6e sér. I. (1835.) p. 188. — Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160.

Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 472: g. Eupanicear.

= Trachyozus Rchb.

Trachyschizocarpicae Rchb. 1837. Handb. p. 189; 1841. Nomencl. p. 107: div. Labiatar. Subdivis.: Teucrieae, Scutellarieae, Prostanthereae.

Trachysciadium DC. 1830. Prodr. IV. p. 106: sect. Helosciadii. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 283. — Endl. 1839. Gen. n. 4397 c. p. 770 (*Trachisciadium*); 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5381. 3.

Trachysperma Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 171 (New-York med. rep. II. Hex. V. p. 356): nov. g. pro Menyanthe trachysperma Michx. propositum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 127 (*Trachyspermum*).

= Villarsia Vent.

Trachyspermum Link 1821. Enum. I. p. 267: g. Umbelliferar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236.

Rchb. 1828. Consp. p. 212 ^{b}. n 3718 ^{b}: g. Amminear.

Link 1829. Hdb. I. p. 349: g. Caucalidear.

DC. 1830. Pr. IV. p. 108: sect. Ptychotidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 284. — Endl. 1839. Gen. n. 4400 *b.* p. 770; 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5384. 2.

Synon. Ammios Mönch; Bunium Lag.

Trachyspermum Leman vid. *Trachysperma Rafin.*

Trachyspermum Ecklon & Zeyh. 1837. En. pl. afr. austr. p. 341: g. Amminear. (Conium rigens L.)

= Conopodium DC.?

Trachystachys Dietr. .... Sp. plant. II. p. 15.

= Trachyozus Rchb.

Trachystella Steud. vid. *Trachytella DC.*

Trachystemma Nonnullor. ex Meisn. Comm. p. 188.

= seq.

Trachystemon D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 239: nov g. Boragear. (Borago orientalis.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 309.

Endl 1839. Gen. n. 3777. p. 649; 1841. Ench. p. 321: g. Anchusear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 280 (188). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 56.

Spach 1839. Vég. phan. IX. p. 31[illegible]: g. Asperifoliear.

Rchb. 1841. Nom. p. 111. n. 4341: g. Borraginear.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 102: sect. Borraginis.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.

Synon. Psilostemon DC.; Nordmannia Ledeb.; Trachystemma Auct.

Trachytella *) DC. 1818. Syst. I. p. 410: nov. g. Delimacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 72. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4).

DC. 1824. Pr. I. p. 70: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4976. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.

Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 128: g. Dilleniacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4766. p. 843; 1841. Ench. p. 432 (dubium).

Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 192. n. 7293: g. Doliocarpear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413.

Steud. 1841. Nom. II. p. 695 (*Trachystella*): g. Ranunculacear.

Synon. Actaea et Calligonum Lour.

Trachytophytum **) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 270: gen. 12 plant. Spec. nat.: Montalbania, Tournefortia, Ehretia, Bourreria, Borellia, Firensia, Cordia, Varronia, Hydrophyllum, Schoebera, Heliotropium, Patagonula, Messerschmidia, Melanotis, Phlox, Cerinthe, Onosma, Coldenia, Ellisia, Anchusa, Myosotis, Lycopsis, Lithospermum, Asperugo, Cynoglossum, Pulmonaria, Symphytum, Borrago, Echium, Rindera.

Tradescantia ***) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 55. Ed. Hall. 1745. p. 61: g. pl. class. III.

Linn. 1737. Gen. p. 98. n. 277; 1737. Cliff. p. 127; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 73; 1753. Sp. I. p. 288; 1759. Syst. ed. X. p. 975. n. 360; 1762. Sp. ed. II. p. 411; 1764. Gen. ed. VI. p. 159. n. 398; 1767. Syst. ed. XII. p. 233. n. 394: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 260; 1784. Syst. p. 314. — Reich. 1778. Gen. p. 162. n. 430. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 213. n. 543. — Lour. 1790. Coch. I. p. 193. — Gmel. 1791. Syst. p. 532. — Pers. 1797. Syst. p. 333; 1805. Ench. I. p. 346. n. 770. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 5. t. 107—109; 1832. Ind. ed. Wall. III. p. 118. — Willd. 1799. Sp. II. p. 16. n. 607; 1809. En. p. 347. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 63. Ed. Schrank 1819. p. 67. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 209.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 68. n. 282: g. Thalamostemonum.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 47. — Juss. 1789. Gen. p. 45.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170.

Hill 1769. Ht. kew. p. 160: g. Tripetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 82: g. Liliacear.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 51. t. 15. f. 2 (virginiana).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 233; 1789. Phil. Bot. I. p. 80.

Neck. 1790. El. III. p. 165. n. 1515: g. Ymnodiphytor. Sejungitur Tonningia.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 153: g. Juncacear.

Batsch 1802. Tab. p. 125: g. Ephemeror.

---

*) *τραχύτης*, asperitas.
**) *τραχύτης*, scabrities; *φυτόν*, planta.
***) Dicat. Joh. Tradescant, Musaeo proprio claro.

Tradescantia Rupp. cont.
Cram. 1803. Disp. p. 3 in Monandr. Monogyn. et p. 23 in Triandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 112: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 219. n. 893.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 272: g. Commelinear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 261. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 253; 1825. Syst. II. p. 115. n. 1287; 1830. Gen. I. p. 247. n. 1290. — Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 122. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 47 (*Éphémerine*). — Link 1821. En. I. p. 307; 1829. Hdb. I. p. 151. — Kunth 1822. Syn. I. p. 269. — Agdh. 1823. Aphor. p. 168. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55. — Blume 1830. En. pl. Jav. p. 5. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXIII. 1155. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 129. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1052. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 543.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1171: g. Ephemerear. Sect.: Craterostegia, Phyllostegia.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear. — Par. Mart. & Gal. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 374. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 126. — Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 247.
Endl. 1837. Gen. n. 1031. p. 126; 1841. Ench. p. 71: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 631. — Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 152.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1532: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 80; 1844. Abh. Berl. Ak. (1846) p. 72. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 13.
Meisn. 1842. Gen. p. 406 (311): g. Tradescantiear.
Schltd. 1852. Linnaea XXV. p. 186.
Synon. Ephemerum Tourn.

Tradescantieae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 406 (311): trib. Commelinacear. Gen.: Spironema, Tradescantia, Cyanotis, Campelia, Dichorisandra, Cartonema, Forrestia, Tinnantia.

Traevia Necker vid. *Trewia Linn.*

Tragacantha*) Tourn. 1700. Inst. p. 417. t. 237: g. pl. class. X.
Linn. 1737. Gen. p. 215. n. 570; 1737. Cliff. p. 361; 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 359. n. 719: g. Diadelph. Decandr.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Papilionacear., serius Astragalo insertum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 324: g. Astragalor.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 33: g. Leguminosar.
Medic. (Vorles. II. p. 375) 1789. Phil. Bot. I. p. 210.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 513: subsect. Astragali.

*) τράγος, hircus; ἄκανθα, spina.

Tragacantha Tourn. cont.
Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 107: sect. Astragali. (A. lagurus W., etc.) — Par. Fisch. 1853. Bull. soc. Mosc. XXVI. Nr. 3. p. 316. (Synops. specier.)
= Astragali Linn. pars.

Tragacanthoides Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 234: sect. Ciceris.

Tragacanthoides Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 158: sect. Ebeni. (E. tragacanthoides, horrida, etc.)

Tragantha Wallr. mss. ex Endl.
= Eupatorium Tourn.

Traganthes Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 456 not.: nov. g. ex typo Artemisiae tenuifoliae W., a Cassini (1838. Dict. v. 55. p. 129) Mikaniae injunctum.
= Eupatorium Tourn. (foeniculaceum β Willd.)

Traganthus Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 188; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 46: nov. g. Acalyphear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 88. n. $5782/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 469. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 503: g. Dysopsidear.

Traganum **) Delile 1813. Fl. Aegypt. p. 312. t. 22. f. 1; 1824. Descr. de l'Eg. XIX. p. 230: g. Pentandr. Digyn.
Schult. 1820. Syst. VI. p. XXIII. 243: g. Atriplicear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 816. n. 921; 1830. Gen. I. p. 198. n. 1008: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 865.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4328: g. Chenopodear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. V. p. 278.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 215; .... in Webb Canar. III. p. 211: g. Salsolear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Endl. 1837. Gen. n. 1943. p. 298; 1841. Ench. p. 182: g. Halimocnemidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6396.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 149: g. Halimocnemidum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 171: g. Sodear.

Tragatraphaxis Jaub. & Spach 1846. Ill. pl. or. II. p. 14. t. 110: subg. Atraphaxidis. (Flora 1847. I. p. 291.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 55. n. 1995 *b*: sect. Atraphaxidis. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 555. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 76.

Tragia*) Plumier 1703. Gen. p. 14. t. 12. (Ic. t. 252.)
Linn. 1737. Gen. p. 282. n. 709; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 980; 1759. Syst. ed. X. p. 1264. n. 930; 1763. Sp. ed. II. p. 1390; 1764. Gen. ed. VI. p. 483. n.

*) τραγανόν, cartilago.
**) Dicat. Hieronymo Trago, vulgo Bock.

Tragia Plumier cont.
1048; 1767. Syst. ed. XII. p. 619: g. Monoec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 707; 1784. Syst. p. 846. — Reich. 1778. Gen. p. 479. n. 1140. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 627. n. 1410. — Pers. 1797. Syst. p. 891; 1807. Ench. II. p. 549. n. 2042. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 322. n. 1646; 1809. En. p. 963. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 206. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 575.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 7. n. 20: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 390.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 241. — Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 833. n. 3091; 1831. Gen. II. p. 688. n. 3471.
Rüling 1774. Ord. nat. p. 33: g. Urticas et Euphorbias conjungens.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 242; 1789. Phil. Bot. I. p. 89.
Neck. 1790. El. II. p. 342. n. 1135: g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 94: g. Triandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 14; 1818. Fl. cap. I. p. 158.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 498: g. Tithymaloidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 286: g. Euphorbiacear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 91. — Kunth 1822. Syn. I. p. 408. — Link 1822. En. II. p. 383. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 47. t. 15. Sejungitur Microstachys. — Poir. 1828. Dict. p. 55. p. 132.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 371: g. Euphorbicar.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 629: g. Crotonear.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5030; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 194. n. 7351.: g. Acalyphear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 522. — Endl. 1840. Gen. n. 5782. p. 1111; 1841. Ench. p. 587. — Meisn. 1841. Gen. p. 338 (252). — Brongn. 1843. En. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 20. t. 223.
Baill. 1858. Euphorb. p. 459: g. Dysopsidear.
Synon. Schorigeram Adans.; Chamaelaea (sp.) Burm.?

Tragium Spreng. 1813. Umbell. prodr. p. 26: nov. g. Umbelliferar. — Par. Hoffm. 1814. Umb. gen. p. 91. — Link 1821. En. I. p. 285. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 104. (Divis. 1.) — Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 137.
DC. 1815. Franç. V. p. 501 in adnot.; 1830. Pr. IV. p. 120: sect. Pimpinellae. — Par. Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 436. — Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3738 *b*; 1841. Nom. p. 140. n. 5397. 2. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 292. — Endl. 1839. Gen. n. 4410 *b*. p. 772; 1841. Ench. p. 378. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 317. — Walp. 1843. Rep. II. p. 395. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 256. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 738.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 632; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXV. 391; 1825. Syst. I. p. 529. 884. n. 1043; 1830. Gen. I. p. 221. n. 1144: g. Pimpinellear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 321.
Synon. Ledeburia Link; Ledebouria Rchb.; Eupimpinella Wight & Arn.

Tragoceras Spreng. 1826. Syst. III. p. 576. n. 2795: g. Radiatar.
Less. 1832. Syn. p. 220: g. Parthenicar. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 533. Sect.: Eutragoceras, Skirroglyphis. — Endl. 1838. Gen. n. 2491. p. 405; 1841. Ench. p. 237. Sect. eaed. (Skirhoglyphis). — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3043. Sect.: Tragoceras, Scirrhoglyphis. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20: g. Helianthear. verar.
= Tragoceros Kunth.

Tragoceros HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 248: nov. g. Helianthear. (T. zinnioides.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 489. — Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17. (Archetypar.) — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2641. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 139: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 634. n. 3161.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 139; 1830. v. 60. p. 576: g. Verbesinear.
Conf. Tragoceras Spreng.

Tragopogon*) Tourn. 1700. Inst. p. 477. t. 270: g. pl. class. XIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 202. Ed. Hall. 1745. p. 208: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 202: g. Cichoracear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 758. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 270. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 489. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 377. — DC. 1805. Franç. IV. p. 63. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 431. — D. Don 1825. Nepal. p. 162. — Link 1829. Hdb. I. p. 779. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 2. 15. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 633. — Math. 1853. Belg. I. p. 319.
Linn. 1737. Gen. p. 235. n. 608; 1737. Cliff. p. 382; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 243; 1753. Sp. II. p. 789; 1759. Syst. ed. X. p. 1191. n. 810; 1763. Sp. ed. II. p. 1109; 1764. Gen. ed. VI. p. 398. n. 905; 1767. Syst. ed. XII. p. 518: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 592; 1784. Syst. p. 709. — Reich. 1778. Gen. p. 397. n. 984. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 525. n. 1229. — Gmel. 1791. Syst. p. 1168. — Pers. 1797. Syst. p. 748; 1807. Ench. II. p. 359. n. 1758. — Willd. 1803.

*) πώγων, barba. Nomen ex Dioscoride ac Plinio.

Tragopogon Tourn. cont.
Sp. III. 3. p. 1492. n. 1400; 1809. En. p. 812. — Link 1822. En. II. p. 277.

Gmel. 1749. Sibir. II. p. 1: g. Semiflosculosar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 94; 1777. Intr. p. 121. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 141. — Batsch 1802. Tab. p. 250. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 480. — Poir. 1827. Dict. v. 47. p. 143 (*Salsifis*).

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 214. n. 988: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 538.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.

Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 41: g. Ligulatar. Injungitur Geropogon.

Neck. 1790. El. I. p. 55. n. 99: g. Glossariphytor. Excluduntur Urospermum et Adopogon.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 386. t. 59 (excl. fig. 2. 3.): g. Tubulosar.

Rebent. 1804. Neom. p. 89: g. Pentandr. Monogyn.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 581; 1826. Syst. III. p. 662. n. 2891; 1831. Gen. II. p. 646. n. 3250: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 157.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 64; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2179; 1831. Fl. exc. p. 277; 1841. Nom. p. 94. n. 3692. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307. — Less. 1832. Syn. p. 133. — Koch 1837. Syn. p. 422. Ed. II. p. 485. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 112. — Endl. 1838. Gen. n. 2995. p. 497; 1841. Ench. p. 250. — Kunth 1838. Berol. I. p. 380. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 784. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. p. 93. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 310.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 444.

Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.

Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 476: g. Tragopogonear.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 264: g. Liguliflorar.

Schultz Bip...... in Webb Canar. II. p. 469: g. Eutragopogonear.

Tragopogoneae Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 476: subtrib. Cichoracear. Gen.: Geropogon, Tragopogon, Scorzonera, Podospermum. — Par. Schultz Bip..... in Webb Canar. II. p. 469. Divis.: Eutragopogoneae, Scorzonereae, Geropogoneae.

Tragopogonoides Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 204: g. Cichoracear. (*Tragoponoides*).
= Urospermum Scop.

Tragopyron Wittst. vid. *seq.*

Tragopyrum*) Marsch.-Bieb. 1819. Fl. Taur. Cauc. III. p. 284 (Ledeb. ic. t. 422. 426): nov. g. Octandr. Trigyn. (Polygonum frutescens L.), a Meisn. (Comm. p. 228) Polygonellae Michx. insertum. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 888 (*Tragopyron*).

Link 1821. En. I. p. 384: g. Polygonear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 251. n. 1506; 1830. Gen. I. p. 323. n. 1648. — Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 346. — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4290. (genuinar.) — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 73. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Endl. 1837. Gen. n. 1994. p. 309; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 54. (verar.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1326. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 100. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Rumicear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6313. — C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Petersb. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 144. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 514.

Jaub. & Spach 1846. Ill. pl. or. II. p. 13. t. 10: subg. Atraphaxidis.

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 555: sect. Atraphaxidis. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 77.

Tragoriganum Benth. 1834. Labiat. p. 354; 1848 in DC. XII. p. 211: sect. Satureiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 772. — Endl. 1838. Gen. n. 3611 *b.* p. 617; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4055. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 709.

Tragoselinum Tourn. 1700. Inst. p. 309. t. 163: g. pl. class. VII.

Hall. 1742. En stirp. Helv. II. p. 428: g. Umbelliferar. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 220.

Adans. 1763. Fam. II. p. 95: g. Careor.

Mönch 1794. Meth. p. 99: g. Thalamostemonis.

DC. 1830. Pr. IV. p. 119: sect. Pimpinellae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 478. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 291. — Koch 1836. Syn. p. 287. Ed. II. p. 316. — Endl. 1839. Gen. n. 4410 *a.* p. 772; 1841. Ench. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 254. — Walp. 1846. Rep. V. p. 854.
Synon. Saxifragia Herm.; Pimpinella Spreng.

Tragothymum Webb & Berth...... Phytogr. Canar. III. p. 71: subsect. Piperellae. (Micromeria varia Benth., etc.)

Tragularia König mss. ex Roxb.
= Pisonia Plum.

Tragus Hall. 1768. Helvet. n. 1413.

Scop. 1777. Intr. p. 73: g. Graminum (legitimor.) — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 66. 174.

Mönch 1794. Meth. p. 53: g. Thalamostemonis.

---

*) πυρός, frumentum.

Tragus Hall. cont.
DC. 1805. Franç. III. p. 12: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 23. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 17. 378. n. 232.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71: g. Panicear. — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 369. 724. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 286. — Koch 1837. Syn. p. 771. Ed. II. p. 891. — Brongn. 1843. En. genr. p. 11. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 436. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 455.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Cenchrear.
Synon. Nazia Adans.; Lappago Schreb.

Tragus Panzer 1824. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 296: g. Graminum emendat. (Bromus inermis, Festuca pinnata, gracilis, elatior, pratensis, unioloides, loliacea, varia, pumila, etc.)

Traillia „Lindl. in Chesney voy. ined.“ Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 4349/1. p. 1419; 1841. Ench. p. 450: nov. g. Isatidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6892. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Isatidar.

Tralliana*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 157. Ed. Willd. p. 194: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. scandens.) — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 142.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 268: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 168. n. 706. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIII. 275. n. 942.
DC. 1825. Pr. II. p. 11: g. Evonymear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49)? — Rchb. 1837. Hdb. p. 301.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5396: g. Celastrear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 697 (et p. 677 *Thalliana*).
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 12: g. Euonymear.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 407: g. dubium Celastrinear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5694. p. 1089; 1841. Ench. p. 575.
Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7902: g. Elaeodendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588: g. Celastracear. dubium.

Trametes**) Fries 1838. Epicr. p. 488; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 322; 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 94 (*cf.* Flora 1852. II. p. 683): nov. g. Polyporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 481. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43; 1842. Mycol. p. 181. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 415. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 172. — Bail 1858. Syst. p. 26. t. 31.

Transitorii Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 2: sect. Tubercularior. Gen.: Apotemnoum. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 41.

Trapa*) Linn. 1737. Gen. p. 359; 1737. Ht. Cliff. p. 483: nov. g. pro *Tribuloide Tourn.* institutum.
Linn. 1740. Syst. p. 18; 1742. Gen. ed. II. p. 50. n. 115; 1753. Sp. I. p. 120; 1759. Syst. ed. X. p. 898. n. 146; 1762. Sp. ed. II. p. 175; 1764. Gen. ed. VI. p. 62. n. 157; 1767. Syst. ed. XII. p. 126: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 136; 1784. Syst. p. 162. — Reich. 1778. Gen. p. 63. n. 165. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 84. n. 208. — Lour. 1790. Coch. I. p. 86. — Gmel. 1791. Syst. p. 265. — Pers. 1797. Syst. p. 168; 1805. Ench. I. p. 147. n. 312. — Willd. 1797. Sp. I. p. 681. n. 243; 1809. En. p. 168. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 29. t. 234; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 449; ed. 1832. I. p. 428. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 821. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 376. 451.
Adans. 1763. Fam. II. p. 84: g. Onagrar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 446. n. 472. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 149.
Gled. 1764. Syst. p. 27. n. 109: g. Thalamostemonum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 116: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 168: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 127. t. 26. f. 5 (natans).
Juss. 1789. Gen. p. 68: g. Hydrocharidum. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 100.
Neck. 1790. El. II. p. 132. n. 812: g. Coryphophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 309: g. Epilobianar.
Batsch 1802. Tab. p. 161: g. Inundatar.
Juss. 1804. Ann. Mus. III. p. 316: g. Onagrariar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 151. — DC. 1805. Franç. IV. p. 418. — Hedw. 1806. Gen. p. 69. n. 331. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 18. 306. n. 510. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 337.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 270: g. Nymphaeear.
Link 1821. En. I. p. 141; 1831. Hdb. II. p. 54: g. Hydrocaryum. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 63. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 700. — Koch 1836. Syn. p. 243. Ed. II. p. 269. — Meisn. 1838. Gen. p. 121 (87). — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 114.
Agdh. 1822. Aphor. p. 127: g. Hydrocharidear.
Lois. 1823. Dict. v. 27. p. 524 (*Macre*): g. Onagrear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Isnardiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4479: g. Hydrobiar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Trapacear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 633. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 588.

---

*) Dicat. antiquo Alexandro Tralliano.
**) *τράμη s. τράμις, perinaeum.(?)*

*) Nomen e voce germanica *Trappe* fictum dicitur.

Trapa Linn. cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 100. n. 503: g. Hydrocaryar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 505.
Bartl. 1830. Ord. p. 315: g. Halorageаr. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 114. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 117. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 635 (abludens).
Ritg. 1831. Marb. II. p. 112: g. Trapear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6554. — Endl. 1840. Gen. n. 6140. p. 1197; 1841. Ench. p. 641. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 539 (*Macre*).
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 443: g. Hygrobiear.
Kunth 1838. Berol. I. p. 169: g. Onagrariear.
Synon. Tribuloides Tourn.; Shringata Jones.

Trapaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Onagrariear. Gen.: Trapa.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 633: div. Onagrear. Gen. id.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 588: trib. Halorageаr. Gen. id.

Trapaeolum Gled. vid. *Tropaeolum.*

Trapaulos „Rafin." Rchb. vid. *Iraupalos Rafin.*

Trapeae Ritgen 1831 in Schr. Marb. Ges. II. p. 12: trib. Hydrocharidum. Gen.: Trapa, Lemna.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170: div. Onagracear. Gen.: Trapa.
Endl. 1840. Gen. p. 1197; 1841. Ench. p. 641: fam. Halorageis aff. Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723: trib. Haloragacear. Gen. id.

Trasia Bartl. vid. *Trasus Palis.*

Trasus Palis. 1819 in Lestib. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 21 et Schult. Mant. II. p. 4: *Trasi*): nov. g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1093 (*Trasi*).
Bartl. 1830. Ord. p. 33 (*Trasia*): g. Cyperinar.
= Elynanthus Palis.

Trasus Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 53: nov. g. Caricear. (Carices stigmatibus 3 instructae.)
= Caricis Linn. pars.

Trasya Dietr. vid. *Thrasya HBK.*

Trattenikia Pers. 1807. Ench. II. p. 403. n. 1825: g. Syngenes. Aequal.
= Marshallia Schreb.

Trattinickia *) Willd. 1805. Spec. IV. p. 975. n. 1884: g. Polygam. Monoec.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 583. n. 628; 1830. Gen. I. p. 161. n. 811: g. Terebinthacear. (in Pentandr. Monogyn.) — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 92. t. 239.
DC. 1825. Pr. II. p. 89: g. Terebinthaceis aff., minus notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 77.

*) Dicat. Leop. Trattinick, botanico Vindobon.

Trattinickia Willd. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5140: g. Zanthoxylear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (54): g. Cassuviear.?
Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 715: g. Pentandr. Monogyn.
Endl. 1840. Gen. n. 5934. p. 1137; 1841. Ench. p. 602: g. Burseracear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 470 (*Trattinickya*).
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5640: g. Burserear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.
Didrichs. 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . . Char. emend.

Trattinickia Weber & Mohr mss.
= Padina Adans.

Trattinickya A. Juss. vid. *Trattinickia Willd.*

Traunsteinera *) Rchb. 1841. Nomencl. p. 50. n. 1850; 1844. Fl. saxon. p. 87: nov. g. Ophrydear. (Orchis globosa L.)

Trautvetteria Fischer & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. I. p. 22: nov. g. Ranunculacear. (Actaea palmata DC.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 335 et Linnaea X. Litt. p. 82.
Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4): g. Paeoniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4798. p. 850; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 741. — Walp. 1842. Rep. I. p. 59. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7254: g. Actaeariar.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 37: g. Cimicifugear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 233: g. Anemoninear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428: g. Actaeear.

Trechonaetes **) Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 350: nov. g. Solanear. (Jaborosa laciniata Miers.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 615. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 661 (*Treconaetes*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Jaborosear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 467: g. Atropinear.

Trechyozus Hassk. vid. *Trachyozus Rchb.*

Treconaetes A. Juss. vid. *Trechonaetes Miers.*

Treculia „Decaisne mss." Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 108: nov. g. Euartocarpear. (T. africana.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 658.

Treisia Haworth 1812. Syn. succul. p. 131 (Ed. Schrank 1819. p. 143); 1819. Suppl. p. 65: nov. g. Dodecandr. Trigyn. (Euphorbia clava W.)
Link 1822. En. II. p. 9 (*Treysia*): sect. Euphorbiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 6. — Baill. 1858. Euphorb. p. 284.

*) Dicat. Jos. Traunsteiner, botanico tyrol.
**) „τρηχω, locus asper; ναίτης, incola."

Trelotra *) Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 425: sect. Rottlerae. (R. japonica Spr.)

Trema **) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 562. Ed. Willd. p. 688: nov. g. Monoec. Pentandr. (T. cannabina.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 159.

Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 58: g. Celtidear. (*Synon. Sponia Comm.*)

Tremadoton Arnott vid. *Trematodon Rich.*

Tremandra R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 544 (Verm. bot. Schr. I. p. 29): nov. g. Tremandrear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 344. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208. n. 5423; 1841. Nom. p. 175. n. 6793. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. — Bartl. 1830. Ord. p. 256. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 794. n. 4116. (Decandr. Monogyn.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 372. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (20). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 155. (sph. *Pleurandra R. Br.*) — Endl. 1840. Gen. n. 5645. p. 1077; 1841. Ench. p. 567; 1850. Spl. V. p. 81. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1407. — Steetz 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 222 (II. p. 234); 1853. Fam. Tremandr. *Cf.* Flora 1853. p. 643. — Walp. 1846. Rep. V. p. 70.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 109; 1847. Veg. kd. p. 374: g. Tremandracear.

Schuch. 1853. Syn. Tremandr. (Flora 1854. p. 475): g. Eutremandrear.

Tremandra Payer . . .
= Platytheca Steetz.

Tremandraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43 (p. 47 *Tremandreae*): fam. Malvariear.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 109; 1847. Veg. kd. p. 374: ordo Sapindalium. Gen.: Tetratheca, Tremandra, Platytheca.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 639; fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ead.
= Tremandreae R. Brown.

Tremandreae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 544 (Verm. bot. Schr. I. p. 29): ordo novus plant. Gen.: Tetratheca, Tremandra. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 160.

DC. 1824. Pr. I. p. 343: ordo (19) Thalamiflorar. Gen. ead. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 371. Gen. ead.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: ordo Aridifoliar.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208 (1832. Fl. exc. p. 828): div. Tiliacear. Gen. ead. et 1828 Godoya.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47 (p. 43 *Tremandraceae*): fam. Malvariear. Gen. ut R. Brown.

Bartl. 1830. Ord. p. 255: ordo (143) Rhoeadear. Gen. ut R. Br.

Lindl. 1833. Nix. p. 20: ordo Rhamnalium.

Meisn. 1837. Gen. p. 22 (20): ordo 21 plant. (p. 438 Polygalinar.) Gen. ead.

Tremandreae R. Brown cont.

Rchb. 1837. Hdb. p. 250; 1841. Nom. p. 175: subdiv. Polygalear. Gen. ead.

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 153: fam. (104) Rhoeadear. Gen.: Tetratheca, Pleurandra.

Endl. 1840. Gen. p. 1076; 1841. Ench. p. 566: ordo (232) Polygalinar. Gen. ut R. Brown. Accedit 1850 (Spl. V. p. 81) Platytheca.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 81: fam. Polygalinear.?

Steetz 1853. Fam. Tremandr. (Hamb.): ordo Lasiopetaleis aff. Gen. Browniana et Platytheca. *Cf.* Flora 1853. II. p. 649 et Griseb. 1854. Arch. f. Naturg. II. p. 380.

Schuch. 1853. Syn. Tremandr. (*cf.* Flora 1854. p. 473.) Cohortes: Tetratheceae, Eutremandreae.

Conf. Tremandraceae Lindl.

Tremandropsis Steetz 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 219: sect. Tetrathecae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 69.

Tremanthus Pers. 1805. Ench. I. p. 467. n. 1060: g. Meliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 301. n. 1194.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 685: g. Meliear.
= Strigilia Cavan.

Trematocarpus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 410; 1849. Sp. Alg. p. 785. n. 520: nov. g. Sphaerococcear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubias.

Trematodon Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 289: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 161. — Par. Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 343. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 162. n. 3310 (frondosor., 1831. Gen. II. p. 730 Weisiae insertum). — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 142. (odontostomor.)

Brid. 1822. Meth. musc. p. 51: g. Peristomor. acrocarpor.

Palis. 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 444 (*Trematodum*): g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. ibid. III. p. 221.

Brid. 1826. Bryol. I. p. 385: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Dicranoideor.) — Par. Nees & Hornsch. 1831. Bryol. germ. II. 2. p. 198.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 251 (*Tremadoton*): g. Dicranoidear.

Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 616: g. Dicraneor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Dicranear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 95. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401; 1849. ibid. XII. p. 640. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 69.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.

Hüb. 1833. Musc. germ. p. 749: g. Aploperistomor.

Endl. 1836. Gen. n. 526. p. 51; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 10.

Genth 1836. Nass. I. p. 168: g. Bryoideor.

*) Anagramma nominis Rottlerae.

**) τρῆμα, foramen: a nucula foraminibus pertusa.

Trematodon Rich. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 904: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 655: g. Trematodontear.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: g. Dicranacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 135. — Bayrh. 1849. Taun. p. 4.
C. Müll. 1848. Syn. musc. I. p. 456: g. Leptotrichacear.

Trematodonteae C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 655: trib. Muscor. Gen.: Trematodon.

Trematodum Palis. vid. *Trematodon Rich.*

Trematosycea Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 451: sect. Ficus. (F. villosa Bl.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 722.

Trematoxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 187. 190: nov. g. Abietinear. foss. (T. Leunisii.)

Trembleya *) DC. 1828. Prodr. III. p. 125: nov. g. Rhexiear. Sect.: Jacobia, Abrahamia, Erioleuca. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4591; 1841. Nom. p. 173. n. 6714. Sect. eaed. (1841 Trembleya loco Abrahamiae.) — Leman 1828. Dict. v. 55. p. 164. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 749. Sect. ut DC. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 231. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6206. p. 1212; 1841. Ench. p. 646. Sect. ut DC. (Eriolema loco Erioleucae.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1436. — Walp. 1846. Rep. V. p. 699. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Mart. 1829. Nov. gen.. III. p. 103. t. 249. 250: g. Melastomacear. — Par. Cham. 1834. Linnaea IX. p. 428.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 338. n. 1708: g. Melastomear. (Decandr. Monogyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 329.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 264: g. Microlicialium.

Tremella **) Dillen. 1741. Hist. Musc. p. 41: nov. g. Muscor.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1157; 1759. Syst. ed. X. p. 1344. n. 1067; 1763. Sp. ed. II. p. 1625; 1764. Gen. ed. VI. p. 567. n. 1204; 1767. Syst. ed. XII. p. 714: g. Algar. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Scop. 1772. Carn. II. p. 401. — Murr. 1774. Syst. p. 810; 1784. Syst. p. 965. — Reich. 1778. Gen. p. 562. n. 1320. — Thunb. 1784. Fl. japon. p. 345. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 768. n. 1669. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Mönch 1794. Meth. p. 770. — Pers. 1797. Syst. p. 1004. — Roth 1800. Germ. III. p. 547. — Rebent. 1804. Neom. p. 282.
Adans. 1763. Fam. II. p. 3: g. Byssor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 6.
Gled. 1764. Syst. p. 299. n. 1204: g. Algacear. (nudar.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 449.
Scop. 1777. Intr. p. 363: g. Fungoidear.
Wigg. 1780. Holsat. p. 95: g. Aspermar.
Roth 1788. Germ. I. p. 554: g. Fungor. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1446. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 18. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 27. 370. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 8. — Mart. 1817. Erlang. p. 393. (aëreor.) Sect.: Gyrariae, Corynae.
Neck. 1790. El. III. p. 351. n. 1778: g. Athrosophytor.
Pers. 1797. Tent. p. 31: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVIII. 622: g. Helvelloideor.
Batsch 1802. Tab. p. 267: g. Algoideor.
DC. 1805. Franç. II. p. 90; 1815. V. p. 28: g. Gymnocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 34: g. Gastromycor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45: g. Hypepidermidocarpor.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 33: g. Mucedinum. (Tremelloidear.)
Nees 1816. Syst. p. 155; 1817. Überbl. p. 39: g. Sarcoideor. Stirpes: Gyraria, Coryne, Hygromitra.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Tremellar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 593: g. Tremellidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 82: g. Tremellinar. — Par. Fries 1823. Syst. myc. II. p. 210; 1828. Elench. II. p. 32 (subgen.: Coryne, Phyllopta); 1838. Epicr. p. 588 (sect.: Mesenteriformes, Cerebrinae, Coryne, Phyllopta). — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 167. (restrict.)
Fries 1821. Syst. myc. I. p. LV; 1838. Epicr. p. 608: g. Tremellinor. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 768. n. 3930. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Bail 1858. Syst. p. 16. t. 22.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 98: g. Tremelloideor. Sect.: Encephalium, Gyraria, Tremiscus, Agyria, Coryne, Acrospermum, Leioderma. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181. (restrict.)
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: g. Tremellinear. — Par. Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 569. — Math. 1853. Belg. II. p. 264.
Fries 1825. Pl. homon. p. 93: g. Tremelleor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 288. — Endl. 1836. Gen. n. 403. p. 35; 1841. Ench. p. 20. Sect.: Phyllopta, Coryne, Cerebrina, Mesenterium. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 420. Sect. eaed. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 310. Sect. eaed. — Lév. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 640.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 994: g. Hymenomycorum anomalor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 534. n. 3528: g. unicum Sarcogasterum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Tremellacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 525: g. Hymenomycetum gymnosporor.

---

*) Dicat. Jacobo, Johanni et Abrah. Trembley.
**) Appellatio a tremulo motu, quem plures hujus generis species ob substantiae teneritatem contrectatae subeunt. (Dill.)

Tremella Dillen. cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 341: g. Tremellineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 151: g. Hymeniophoror.
Synon. Nostoc Vaill.

Tremella Bulliard 1780. Herb. d. l. France t. 84; p. 38. t. 2. f. 1.
= Nostoc Vauch.

Tremellaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Tremellariear. Gen.: Tremella, Exidia, Dacrymyces, Cyphella, Agyrium, Merisma.
Corda 1837. Icon. Fung. II. p. 25: fam. Hyphomycetum. (Gen.: Naematelia.)

Tremellae Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 15: cohors Fungor. Gen.: Encephalium, Tremella.

Tremellaria Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: fam. Algar. Gen.: Nostochium, Gonycladon, Granularia.
= Tremella Linn.

Tremellariae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 229: fam. Chaodinear.

Tremellarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: ordo Hymenosporar. Fam.: Tremellaceae.

Tremellei Fries 1825. Pl. homon. p. 93; trib. Tremellinor. Gen.: Tremella, Naematelia, Dacrymyces, Pyrenium. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 34; 1841. Ench. p. 20. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 12: div. Tremellinor. Gen. ead. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 10. Gen.: Hymenula, Pyronema, Agyrium; Pyrenium, Dacrymyces, Naematelia, Tremella, Hyperomyxa. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 309. Gen. ut Fries. (Hyperomyxa loco Dacrymycetis.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: sect. Idiomycetum. Gen.: Tremella, Naematelia, Myxacium, Dacrymyces, Exidia, Guepinia, Tremiscus, Laschia, Lemalis?, Hirneola? Phyllopta, Pyrenium.
Conf. Tremellini Fries 1821.

Tremellideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 588. 593: div. Sarcotheceear. Gen.: Tremella, Gyraria, Coryne.

Tremellinae Agardh 1817. Syn. Alg. p. XXXVII. 126: sect. Algar. Gen.: Mesogloia, Chaetophora, Rivularia, Alcyonidium, Nostoc.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 796: div. Algar. aquaticar. Gen.: Rivularia, Nostoc.

Tremellinae Agardh 1821. Aphor. p. 84; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Fungor. Gen.: Agyrium, Dacrymyces, Tremella, Auricularia, Gymnosporangium.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 207; 1838. Epicr. p. 587: ordo Hymenomycetum. Gen.: Tremella, Exidia, Naematelia, Dacrymyces, Agyrium, Hymenella.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 34; 1839. III. p. 34: fam. Hymenomycetum. Gen.: Coryne, Hyperomyxa, Naematelia, Exidia.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. CII. 166: fam. Basidiophoror. Gen.: Coryne, Myxarium, Hyperomyxa, Myxomphalos, Tremella, Naematelia, Hirneola, Lemalis, Exidia.

Tremellineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70. 83: fam. Nudigraniae. Gen.: Tremella, Auricularia, Dacryomyces?, Epichrysium?
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 568: trib. Fungor. Gen.: Hymenella, Dacrymyces, Agyrium, Encephalium, Acrospermum, Tremella, Exidia. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 260. Gen.: Hymenella, Agyrium, Pyrenium, Dacrymyces, Acrospermum, Tremella, Exidia, Cyphella.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Tremelloidear. Sect.: Agyrea, Tremellinea.

Tremellinei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 340: ordo Hymenomycetum. Gen.: Collyria, Hirneola, Exidia, Femsjonia, Tremella, Phyllopta.

Tremellini Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LV: ordo Hymenomycetum. Gen.: Agyrium, Dacrymyces, Tremella, Hygromitra. — Par. Fries 1838. Epicr. p. 608. Gen.: Tremella, Exidia, Naematelia, Dacrymyces, Agyrium, Hymenula.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 768: div. Fungor. Gen.: Tremella, Guepinia, Exidia, Naematelia, Dacryomyces, Agyrium, Leioderma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: subordo Hymenocetum. Gen.: Tremella, Coryne, Exidia, Naematelia, Dacrymyces, Lemalis, Hymenula.
Bail 1858. Syst. p. 16: fam. Hymenomycetum. Gen.: Tremella, Exidia, Dacrymyces, Guepinia, Calocera.
= Tremellei Fries.

Tremellini Fries 1825. Pl. homon. p. 91: ordo Hymenomycetum. Trib.: Pileolares, Cupulares, Tremellei, Hymenuli.
Rchb. 1828. Consp. p. 12 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Hymenomycetum. Divis. eaed. et Hydrotremellini.
Endl. 1836. Gen. p. 34; 1841. Ench. p. 20: subordo Hymenomycetum. Tribus ut Fries.
Rchb. 1841. Nom. p. 10: div. Hymeninor. Subdivis.: Tremellei, Exidiei, Helotiei. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 308. Subdivis. eaed. et Hymenuli.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 240: fam. Monosporideor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 147: ordo Fungor. Fam.: Myxonemei, Hymeniophori.

Tremellino-Fucoideae Agardh 1820. Spec. Alg. I: div. Fucoidear. Gen.: Chordaria.

Tremellodon Pers. 1825. Mycol. [eur. II. p. 172: sect. Hydni. (H. gelatinosum.)
Math. 1853. Belg. II. p. 324: subsect. Hypnoidis.

*Tremelloidata**) Lyngbye 1819. Tent. hydr. dan. p. XXXII. 187: sect. 6 Hydrophytor. Gen.: Batrachospermum, Draparnaldia, Mesogloia, Chaetophora, Linckia, Nostoc, Alcyonidium, Palmella, Echinella.

---

*) „Tremella ex τρέμω, tremo et εἶδος, species."

Tremelloideae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 314: fam. Algar. Gen.: Draparnaldia, Batrachospermum, Thorea, Mesogloea, Chaetophora, Linckia, Nostoc, Coccochloris, Hydrocoryne.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 85: trib. Spondylydronematum. Gen. ead.
Tremelloideae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): ordo Homorganor. rhizosporor. Fam.: Tubercularineae, Tremellineae, Nostochineae.
Tremelloidei Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 95: div. Sarcomycor. Gen.: Mycoderma, Auricularia, Tremella.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: fam. Mycetum. Gen.: Coccosphaerium, Allosphaerium, Tremella, Encephalium, Dacrydium.
Tremiscus Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 103: sect. Tremellae. (T. fimbriata et rufa.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Tremelleor.
Tremula Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. tot. nat. Wet. I: nov. g. Salicinear., a Populo sejunctum.
Trendelenburgia*) Klotzsch 1855. Begon. p. 172: nov. g. Begoniacear. (T. fruticosa Kl.)
Trentepohlia**) Roth 1794 in Usteri n. Ann. IV. p. 52: nov. g. Miscellanear.
Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. p. 17. t. 4: g. Calyptrator.
= Bryi sect. Stenodyction Müll. (sp.)
Trentepohlia Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 251: nov. g. Inomycetum aëreor. (Byssus aurea L.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 176.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXII. 36: g. Lichenoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 65: g. Bysseor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 510: g. Asporomycetum helicomorphor.
Suhr 1839. Flora I. p. 73.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 188: g. Byssoidear.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 118: g. Ceramiear. (T. pulchella.) — Par. „Aresch." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127. (Callithamnii sp. Auct.) — Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 337.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93): g. Batrachospermear.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg.: g. Callithamnear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 122: sect. Byssi.
„Ag." Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: g. Batrachospermear. ?
= Chroolepus Agdh. et Callithamnion Lyngb. (sp.)
Trentepohlia Roth .... Nov. spec. p. 325. = Heliophila Burm.

*) Dicat. E. A. Trendelenburg, prof.
**) Dicat. Trentepohl, botanico Oldenburg.

Trentepohlia Böckeler 1858. Bot. Zeit. p. 249: nov. g. Ficiniear.
Trepnanthus „Nees & Mart." Steud. Nom. II. p. 698. Delendum! Vid. *Terpnanthus.*
Trepocarpus*) „Nuttall" DC. 1829. Coll. diss. V. p. 56. t. 14; 1830. Prodr. IV. p. 201: nov. g. Cuminear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 348. — Tausch 1834. Flora I. p. 344 (*Treptocarpus*). — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). — Endl. 1839. Gen. n. 4489. p. 783; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 974. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 634. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5444. — Walp. 1843. Rep. II. p. 417.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 791. n. 4104: g. Scandicinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219: g. Amminear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Cuminidar.
Tripposa Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: nov. g. Ulvar. (Ulva indica L.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 512 (*Treposa*) et Leman 1828. Dict. v. 55. p. 178.
= Ulvae Lamx. pars.
Treptacantha**) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 353; 1849. Spec. Alg. p. 599. n. 407: nov. g. Cystosirear.
Treptocarpus Tausch vid. *Trepocarpus Nutt.*
Tresanthera***) Karsten 1858. Fl. Columb. I. p. 37. t. 19: nov. g. Rondeletiear.
Tretorhiza Adans. vid. *seq.*
Tretorrhiza (*Τρητοῤῥιζα*) Renealm. 1611. Spec. hist. pl. p. 74. c. ic. p. 73. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 873 (*Tetrorrhiza*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 503 (*Tretorhiza*): g. Apocynor. (Gentiana Cruciata L.)
Griseb. 1839 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 60; 1839. Gent. gen. p. 301; 1845 in DC. Pr. IX. p. 117: sect. Gentianae. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 69.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130. **2 c**: subsect. Gentianae.
Synon. Cruciata Gaud.
Trevauxia Steud. vid. *Trevouxia Scop.*
Treverania G. Don vid. *Trevirana Willd.*
Trevesia Visiani 1842. Mem. Ac. Torin. Ser. 2. IV. p. 157: nov. g. Araliacear. (Gastonia palmata Roxb.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 390. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Walp. 1846. Rep. V. p. 926. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 747.
= Heptapleurum Gärtn.?
Trevia Linn. Spec. II. p. 1193: vid. *Trewia Linn.*
Trevirana †) Willd. 1809. Enum. p. 637. n. 694: nov. g. Didynam. Angiosperm. (Cyrilla pulchella.)
Link 1822. En. II. p. 138: g. Personatar.

*) *τρέπω*, verto.
**) *τρεπτός*, torsus.
***) *τρῆσις*, perforatio, foramen.
†) Dicat. Lud. Christ. Trevirano, prof. tandem Wratislaw.

Trevirana Willd. cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 546: g. Scrofularinar.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 645 (*Treverania*): g. Gloxiniear.
Endl. 1839. Gen. n. 4166. p. 722; 1841. Ench. p. 349; 1843. Spl. III. p. 80: g. Eugesnerear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258: g. Gesneriear.
Synon. Cyrilla L'Herit.; Trevirania Spreng.

Trevirana Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 8. t. 107.
= Diastema Benth.

Trevirania Roth 1810 in Web. Beitr. Naturk. II. p. 123: nov. g. Vandelliae proximum. (T. Gratiolae = Gratiola gardenifolia Ht. Hafn.)

Trevirania Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 400; 1825. Syst. II. p. 812. n. 2195; 1831. Gen. II. p. 495. n. 2438: g. Scrofularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3235: g. Gesnerear. — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 65. — Regel 1848. Flora I. p. 251.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Digitalidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 171: g. Antirrhinear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 61: g. Gesneriear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 568.
= Trevirana Willd.

Trevoa*) Miers 1830 in Hook. Bot. Miscell. I. p. 158. t. 45 B: nov. g. Rhamnear. (T. quinquenervia et trinervia.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 35. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50).
= Talguenea Miers.

Trevouxia Scopoli 1777. Introd. p. 152. n. 575: g. Cucurbitacear. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 180 et Steud. Nom. II. p. 698. 724 in synonymis Turiae (*Trevauxia*).
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 14. 65: g. Momordicear.
= Luffa Tourn.

Trewia**) Linn. 1737. Gen. p. 152. n. 430; 1740. Syst. p. 24; 1767. Syst. ed. XII. p. 362. n. 1239: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 409; 1784. Syst. p. 492. — Reich. 1778. Gen. p. 270. n. 712. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 354. n. 890. — Gmel. 1791. Syst. p. 813. — Pers. 1797. Syst. p. 527. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 180.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 122. n. 505: g. Thalamostemonum.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1193 (*Trevia*); 1759. Syst. ed. X. p. 1356. n. 1104; 1763. Sp. ed. II. p. 1661 (*Trevia*); 1764. Gen. ed. VI. p. 580. n. 1239: g. incertae classis.
Scop. 1777. Intr. p. 264: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 442: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 268. n. 1023 (*Tracvia*): g. Catizophytor.
Willd. 1805. Spl. IV. p. 834. n. 1833: g. Dioec. Polyandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 629. n. 2275. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 906. n. 3195; 1831. Gen. II. p. 710. n. 3583. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 837.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 886: g. Linozostear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 194: g. Euphorbiacear. — Par. Klotzsch 1841. Arch. f. Nat. I. p. 254 (normalium, Rottlerae et Plukenetiae aff.) Char. emend.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 612: g. Crotonear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 98. n. $5819/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Rchb. 1828. Consp. p. 212[d]. n. 5589: inter genera vix cognita.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 174: g. Trewiacear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 345 (256).
Baill. 1858. Euphorb. p. 408: g. Crotonidear.
Synon. Canschi Rheede, Adans.; Rottlera Willd.

Trewiaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 174: ordo Urticaceis aff.
Meisn. 1841. Gen. p. 345 (256): ordo Juliflorar.? Gen.: Trewia.

Trewoa „Gill." Endl. Gen. p. 1100 in synon. Talgueneae: vid. *Trevoa Miers.*

Treysia Link vid. *Treisia Haw.*

Triachne Cassini 1813. Bull. soc. philom. Janv. p. 11; 1818. ibid. Mars p. 48; 1825. Dict. v. 34. p. 207; 1828. v. 55. p. 181; 1830. v. 60. p. 584: nov. g. Nassauviear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2288; 1841. Nom. p. 96. n. 3775. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1830. Linnaea V. p. 3; 1832. Syn. p. 397. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 50. — Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. (verar.)
Endl. 1838. Gen. n. 2946. p. 490; 1841. Ench. p. 248: g. Nassaviear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Triachyrum Hochstett. in Schimp. pl. Abyss. sect. 1. nr. 81 ex Flora 1841. Int. Bl. p. 19.
A. Braun 1841. Flora II. p. 712: g. Agrostidear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 419 (321). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1173: g. Agrostear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 176.

Triacma Van Hass. herb.
= Sperlingia Vahl. (Miq.)

Triadanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9: div. Exoxylar. Sect.: Tepalanthae, Chlamydanthae, Spathanthae.

Triadenia Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 370; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 172. 354. t. 4. 5: nov. g. Elodeinear. (Hypericum aegyptiacum L.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308: g. Elodeinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5465 c. p. 1034; 1841. Ench. p. 539: sect. Elodeae.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8004. 3: sect. Helodeae.

*) *Trebu* s. *Treuo* nomen vernaculum.
**) Dicat. archiatro Chr. Jac. Trew.

Triadenia Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 458: nov. g. Echitear. (Tabernaemontana verrucosa Bl.)

Triadenium Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5472: g. Ascyrear. *Cf. Triadenum Raf.*
Bartl. 1830. Ord. p. 292: g. Hypericinear.
= Elodea Pursh.

Triadenoides Walp. 1843. Repert. II. p. 808: sect. Hyperici. (H. cuneatum Poir.

Triadenum Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 171 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 350): nov. g. pro Hyperico virginico L. indicatum. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 183.
= Elodea Pursh.

Triadica *) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 610. Ed. Willd. p. 748: nov. g. Dioec. Diandr. (T. cochinchinensis et sinensis.)
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 93. n. 118.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 183: g. Euphorbiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5026; 1837. Hdb. p. 281: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 30. n. 136: g. Diandr. Monogyn.
Baill. 1858. Euphorb. p. 511: sect. Stillingiae.
= Stillingia Gard.

Triaena **) HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 178. t. 61: nov. g. Chloridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 171. — Kunth 1822. Syn. I. p. 235; 1830. Gram. p. 170 (dubium); 1833. Agrost. p. 284. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Endl. 1837. Gen. n. 853. p. 95; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 336. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1327. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 23. 421. n. 254: g. Graminear. — Par. Leman 1828. Dict. v. 55. p. 184.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Cynodonear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 55. n. 271: g. Graminum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.

Triaenacanthus Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 100: g. Ruelliear. *Cf. seq.*

Triaenanthus Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 169 (et in Ind.): nov. g. Ruelliear. (p. 100 *Triaenacanthus.)*

Triallis Linn. 1764. Ord. nat.: vid. *Thryallis Linn.*

Trianaea Planchon 1853 in Lind. Catal. pl. exot.: nov. g. Polemoniacear., Cobaeae aff. (Bot. Zeit. 1853. p. 717.)

Triandria Linn. 1737 et porro in operibus systematicis: class. III. plant. Ordines: Mono-, Di-, Trigynia.

*) τριάδικος, ternarius: a numero partium.
**) τρίαινα, tridens.

Trianea *) Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 424: nov. g. Hydrocharidear. tribus novae. (T. bogotensis.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 15.

Trianoptiles „Fenzl Gen. Cyper.“ Endl. 1837. Gen. n. 969. p. 113; 1841. Ench. p. 63: g. Rhynchosporear. (verar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1451. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.
Synon. Ecklonea Steud.; Ecklonia Schrad.

Trianosperma Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 540: sect. Bryoniae. (B. Boykinii.)
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 11. 45: g. Eubryoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Cucurbitear. *(Synon. Alternasemina Manso.)*
= Bryoniae Linn. pars.

Triantha Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 335: sect. Tofieldiac. — Simil. A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 137; 1837. Melanth. Am. sept. rev. p. ... — Endl. 1841. Spl. I. n. 1062 *b.* p. 1356; 1841. Ench. p. 79. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1691. 2.

Trianthaea DC. 1836. Prodr. V. p. 23: sect. Vernoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2204 *f.* p. 358 *(Trianthea)*; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3868. 6. — Walp. 1843. Rep. II. p. 945.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Synon. Pollalesta Kunth; Oliganthes Cass.

Trianthea Endl. vid. *Trianthaea DC.*

Trianthema Sauvag. 1751. Meth. fol. p. 127.
Linn. 1753. Sp. I. p. 223; 1759. Syst. ed. X. p. 949. n. 278; 1762. Sp. ed. II. p. 325: g. Pentandr. Digyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 63.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 214. n. 537; 1767. Syst. ed. XII. p. 297. n. 531: g. Decandr. Monogyn. *Cf.* Linn. Mant. 1767 (et 1777). Add. p. 22. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 111.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Gled. 1764. Syst. p. 45. n. 174: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 383: g. Pentaphyllar.
Murr. 1774. Syst. p. 342; 1784. Syst. p. 410: g. Decandr. Digyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 227. n. 606. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 300. n. 762. — Gmel. 1791. Syst. p. 703. — Pers. 1797. Syst. p. 439; 1805. Ench. I. p. 486. n. 1109. — Willd. 1799. Sp. II. p. 635. n. 885; 1809. En. p. 458. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 102. Ed. Schrank 1819. p. 111. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 444.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Seda et Epilobia conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 224: g. Nomadear.

*) Dicat. Dr. J. Triana.

Trianthema Sauv. cont.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 255. *Cf. Portulacastrum.*
Juss. 1789. Gen. p. 314: g. Portulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 263. — Batsch 1802. Tab. p. 36. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 141. — Hedw. 1806. Gen. p. 326. n. 1286. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 841; 1825. Syst. II. p. 381. n. 1698; 1830. Gen. I. p. 376. n. 1895. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIII. 524. n. 1031. — Link 1821. En. I. p. 413. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1137. — DC. 1828. Pr. III. p. 351. Sect.: Zaleya, Rocama. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 187. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 354. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 72. Sect. ut DC. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1539. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 618.
Neck. 1790. El. II. p. 379. n. 1190: g. Ypsoophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 700: g. Calycostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 60 in Pentandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 243: g. Portulacacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Trianthemear.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4310: g. Talinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 309: g. Ficoidear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 109.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: g. Portulacellar. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94).
Rchb. 1837. Hdb. p. 237; 1841. Nom. p. 163. n. 6337: g. Sesuviear. — Par. Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 289. — Endl. 1839. Gen. n. 5168. p. 948; 1841. Ench. p. 501. Sect. ut DC. — Walp. 1843. Rep. II. p. 232. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1058. Sect. eaed.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 105: g. Tetragoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Sesuvear.
Synon. Zaleya Burm.; Rocama et Papularia Forsk.; Portulacastrum Medic.

Trianthemeae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LI: div. Portulacear. Gen.: Trianthema, Limeum, Gisekia, Neurada.

Trianthocytisus Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 9: sect. Cytisi. (C. triflorus L'Her.)

Trianthus Hook. f. 1846. Antarct. voy. II. p. 320 adnot.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 321: g. Nassauviear.

Triaridium Dumort. vid. *Tiaridium Lehm.*

Triarista C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 422: sect. Bromi. (B. Danthoniae Trin.)

Trias Lindl. 1830. Orchid. gen. p. 60: nov. g. Dendrobiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1354. p. 191; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1944. — Meisn. 1842. Gen. p. 370 (278). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar.

Triaspis Burchell 1824. Trav. II. p. 280. f. 290.
A. Juss. 1837 in Deless. Ic. sel. III. p. 21. t. 36: g. Malpighiacear. (T. odorata.)
Endl. 1840. Gen. n. 5569. p. 1059; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar.
A. Juss 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 267; 1843. Arch. Mus. III. p. 504. t. 17: g. Hirear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7849. 4: sect. Hiraeae.
Meisn. 1843. Comm. p. 347: g. Banisteriear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 295: g. Hiraeear.
Synon. Flabellaria Cavan.

Triathera Jaume St. Hilaire 1810. Bull. soc. philom. Déc.; 1813 in Desv. Journ. bot. III. p. 67: nov. g. Graminear. (T. americana.) *Cf.* Isis 1823. p. 699. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 39. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 23. 421. n. 255. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 189.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1830. Gram. p. 96; 1833. Agrost. p. 283: g. Chloridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 848. p. 94; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 336. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1322. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (223). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 217.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): sect. Eutrianae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Cynodonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.

Triathera Roth mss.
= Danthonia Palis.

Tribachia Dumort. vid. *Tribrachia Lindl.*

Tribdilium Dumort. vid. *Triblidium Rebent.*

Triblemma Martius mss. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 190.
„R. Brown 1822“ Spreng. 1830. Gen. I. p. 342. n. 1730: g. Melastomear.
= Bertolonia Raddi.

Triblidium *) Rebentisch 1805. Ind. pl. Berol. p. 40. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 191.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 17: g. Hysterior.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 331: g. Helvelloideor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83 (err. *Tribdilium*): g. Acetabulear.?
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 183: trib. Cenangii, 1828 in Elench. II. p. 20. 130 ad Phacidium Fr. reducta.
Fries 1825. Pl. homon. p. 115: subg. Cenangii.
Leman 1826. Dict. v. 39. p. 376: g. Pezizoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 260 *b*: sect. Cenangii. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 271.

*) τρυβλίον, parvum poculum. (?) — τρεῖς, βέλος, telum. (? Wittst.)

Triblidium Rebentisch cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 369.
Bonord. 1851. Hdb. p. 201: g. Cenangiaceor. *Conf.* Tryblidium Ehrenb., Wallr.
Tribonanthes*) Endl. 1839. Nov. stirp. Dec. I. p. 27; 1841. Gen. Suppl. I. n. 1259/₁. p. 1360; 1841. Ench. p. 100; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 27: nov. g. Haemodoracear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1664: g. Lanariear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153: g. Conostylear.
Tribrachia Lindl. 1825. Coll. bot. t. 41 A; 1826. Bot. Regist. XII. t. 963: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 306; 1831. Gen. II. p. 669. n. 3380. — Leman 1828. Dict. v. 55. p. 190.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1571. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67 (*Tribachia*).
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear. = Bolbophyllum Pet.-Thouars.
Tribrachya Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 254: nov. g. Morindear. (T. morindaeformis.) *Cf.* Flora 1851. p. 538. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 247.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 752: g. Coffeear.?
Tribula Hill 1769. Hort. kew. p. 91: nov. g. Umbellatar. (Seseli Turbith.)
Synon. Libanotis Scop.; Turbith Tausch.
Tribulastrum B. Juss. mss.
= Neurada Linn.
Tribuleae Rchb. 1828. Consp. p. 199; 1832. Fl. exc. p. 768; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198: subdiv. Zygophyllear. Gen.: Tribulus, Kallströmia?, Ehrenbergia (1841 exclusa).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Zygophyllear. Gen.: Cneorum, Tribulus. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 305. Gen. ut Rchb. 1828. — Endl. 1840. Gen. p. 1162; 1841. Ench. p. 616. Gen.: Tribulus, Kallströmia.
Bartl. 1830. Ord. p. 391: div. Zygophyllear. Gen. ut Rchb.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 212: trib. Zygophyllacear. Gen.: Kallströmia. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 275. Gen. ead.
Tribulineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamisertiae. Gen.: Tribulus.
Tribuloides Tourn. 1700. Inst. p. 655. t. 431 in App.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 468: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 62: g. pl. class. IV.
= Trapa Linn.
Tribulopis R. Brown 1849. App. to Sturt's exp. p. 70 (*cf.* Ann. and Mag. 1849. III. p. 57): nov. g. Tribulo aff.

*) τρίβων, pallium.

Tribulus Tourn. 1700. Inst. p. 265. t. 141: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 128. n. 360; 1737. Cliff. p. 160; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 103; 1753. Sp. I. p. 386; 1759. Syst. ed. X. p. 1021. n. 476; 1762. Sp. ed. II. p. 553; 1764. Gen. ed. VI. p. 213. n. 532; 1767. Syst. ed. XII. p. 296. n. 527: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 334; 1784. Syst. p. 401. — Reich. 1778. Gen. p. 219. n. 580. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 289. n. 732. — Lour. 1790. Coch. I. p. 270. — Gmel. 1791. Syst. p. 683. — Pers. 1797. Syst. p. 428. — Willd. 1799. Sp. II. p. 566. n. 848; 1809. En. p. 448. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 277. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 60. 67.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 226. t. 106. f. 1.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 99. n. 409: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 221.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Succulentar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 507: g. Zizyphor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.
Hill 1769. Ht. kew. p. 209: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 253: g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 335. t. 69. f. 2 (terrestris).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 195; 1789. Phil. Bot. I. p. 41.
Juss. 1789. Gen. p. 296: g. Rutacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 224. — Batsch 1802. Tab. p. 55. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 102. — Pers. 1805. Ench. I. p. 464. n. 1038. — DC. 1805. Franç. IV. p. 731. — Hedw. 1806. Gen. p. 307. n. 1217. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 675; 1825. Syst. II. p. 324. n. 1589; 1830. Gen. I. p. 350. n. 1767. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 102 (*Herse*). — Link 1821. En. I. p. 399. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1422.
Neck. 1790. El. II. p. 328. n. 1117: g. Acascophytor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: g. Tribulinear.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 11: g. Zygophyllear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 332. — DC. 1824. Pr. I. p. 703. (verar.) — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 451. t. 14. f. 1. — Presl 1826. Sicul. I. p. 213. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 106. — Link 1831. Hdb. II. p. 228. — — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 769. (verar.) — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 144. — Koch 1836. Syn. p. 144. Ed. II. p. 158. — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 317. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 132. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 82. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 327.
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5191; 1832. Fl. exc. p. 768; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. n. 7547: g. Tribulear. — Par. Dumort. 1829. Anal. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 391. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 305. — Endl. 1840. Gen. n.

Tribulus Tourn. cont. 6030. p. 1162; 1841. Ench. p. 616. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 486. — Walp. 1842. Rep. I. p. 493. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 644. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 403.
Bunge 1847. Reliq. Lehm. I. p. 196: g. Biebersteiniear.

Tricalysia A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 224: nov. g. Cordierear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 445. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 543. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). — Endl. 1838. Gen. n. 3221. p. 545; 1841. Ench. p. 273. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374 (*Trycalysia*). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2871.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.

Tricamphora Lév. vid. *Trichamphora Jungh.*

Tricanthera A. Juss. vid. *Trichanthera Ehrenb.*

Tricarium *) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 557. Ed. Willd. p. 681: nov. g. Monoec. Tetrandr. (a Willd. Argythamniae comparatum. — T. cochinchinense.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 551. n. 2051.
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar.
Spreng. 1818. Anl. II. 3. p. 886: g. Euphorbiear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear. — Par. Leman 1828. Dict. v. 55. p. 194.
= Cicca Linn.? (*Conf. Tricaryum Spreng.*)

Tricarpellites Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 79.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 253; 1846. Chlor. prot. p. LXXXVIII: g. incertae sedis.

Tricaryum Spreng. 1826. Syst. III. p. 848. n. 3105; 1831. Gen. II. p. 690. n. 3479: g. Tricoccar.?
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5074: g. Phyllanthear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486.
= Tricarium Lour.

Tricentrum **) DC. 1828. Prodr. III. p. 123: nov. g. Rhexiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 747. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 205. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6204. p. 1211; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6712. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 307. n. 1569: g. Melastomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 329.
Cham. 1834. Linnaea IX. p. 401: g. Melastomacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1273.

Tricephalum DC. 1837. Prodr. VI. p. 218: sect. Stenoclines. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2744 *a.* p. 447; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3487. 1.

*) *τρίς*, ter; *κάρυον*, nux: a triplice nuce pericarpii.
**) „Nomen a connectivo basi tricalcarato."

Tricera Schreb. 1791. Gen. II. p. 630. n. 1416: g. Monoec. Tetrandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 338. n. 1658. — Pers. 1807. Ench. II. p. 551. n. 2054.
Swartz 1797. Ind. occ. p. 331. t. 7: g. Tetrandr. Trigyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 368: g. Euphorbiear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 194: g. Euphorbiacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 194.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5093; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7430: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5868. p. 1123; 1841. Ench. p. 589; 1850. Spl. V. p. 93 (sphalm. *Triura*). — Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 690. n. 3482: g. Tricoccar.
Baill. 1858. Euphorb. p. 667: g. Buxacear.
Synon. Crantzia Swartz; Cranzia Gmel.

Triceraia Willd. 1819 in Röm. & Schult. Syst. IV. p. 803. n. 797a: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. tinifolia.)
= Lacepedea HBK.

Triceras „Andrzej." Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4797: g. Arabidear. Sect.: Pinaria, Acinotum.
Bartl. 1830. Ord. p. 265: g. Siliquosar.
= Matthiolae R. Rrown pars.

Triceras Lobarzewski 1840. Linnaea XIV. p. 272. t. 5. f. 3: nov. g. Desmidiacear., Staurastro aff. (T. paradoxus.)
= Phycastrum Kütz.?

Triceras Wittst. vid. *Triceros Lour.*

Tricerastes Presl 1836. Reliq. Hänk. II. p. 88. t. 64.
Endl. 1839. Gen. n. 5017. p. 898; 1841. Ench. p. 459: g. Datiscear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 346 (256). — Rchb. 1841. Nom. p. 169. n. 6551. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 293.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 317: g. Datiscacear.

Triceratia A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. I. p. 614. t. 44: nov. g. Triceratiar., Sicyo aff. (T. bryonioides.)

Triceratiae A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. I. p. 614: trib. Cucurbitacear. Gen.: Triceratia.

Triceraticae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 96: sect. Biddulphiear. Gen.: Triceratium.

Triceratium Ehrenb. 1840. Kreideth. p. 79; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 217: g. Bacillarior.
Kütz. 1844. Bacill. p. 139; 1845. Phyc. germ. p. 117; 1849. Sp. Alg. p. 139. n. 97: g. Angulatar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Triceratiear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 645: g. Diatomear.

Tricerma Liebm. 1853. Nov. gen. mex. dec. Nr. 5. p. 97: nov. g. Celastrinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 423.

Triceros*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 184. Ed. Willd. p. 230: nov. g. Pentandr. Trigyn. (T. cochinchinensis.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 892 (*Triceras*). — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXV. 685. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 196.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 253: g. Terebintacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 206. n. 847. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 231. n. 1217. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1007.
DC. 1825. Pr. II. p. 89: g. Terebinthaceis aff., minus notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 77.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 947. n. 1130: g. Hippocratear.
Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5139: g. Zanthoxylear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56): g. Burseracear. (?) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5945. p. 1138; 1841. Ench. p. 602 (vix notum). Moritzi 1846. Syst. Verz. p. 15.
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5652: g. Burserear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.?

Trichacanthus**) Zolling. 1846. Nat. Arch. Neerl. Indie II. p. 572; 1847. Flor. II. p. 598: nov. g. Acanthacear. (T. exiguus.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 541.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 819: g. Acanthear.

Trichachne***) Nees 1829. Agrost. Bras. p. 85: g. Panicear. (*Synon. Acicarpa Raddi.*)
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 130: g. Graminear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 97: sect. Panici.
= Panici Linn. pars.

Trichadenia Thwaites 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 196: nov. g. Pangiacear. (T. zeylanica.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 229: g. Pangiear.

Trichaegum Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 15. t. 4. f. 217. 218; 1842. V. p. 10; 1842. Anl. Mycol. p. 38: nov. g. Helminthosporiacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 35. t. 18; 1851. Linnaea XXIV. p. 115.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 205: g. Dematieor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 115: g. Rhacodieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 503: g. Myxothriceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Helminthosporeor.

Trichaeta Palis. 1812. Agrost. p. 86: nov. g. Graminear. (Bromus ovatus Cav.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 38. 633. n. 324. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 196. — Link 1829. Hdb. I. p. 79.
Trin. 1820. Fund. p. 149: g. Triandr. Digyn.
Link 1827. Hort. I. p. 121: g. Avenacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 994: g. Festucacear.

*) τρίς, ter; κέρας, cornu: a bacca tricorni.
**) θρίξ, τριχός, capillus.
***) ἄχνη, gluma.

Trichaeta Palis. cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 72. n. 348: g. Graminum.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Endl. 1837. Gen. n. 863 c. p. 96; 1841. Ench. p. 58: sect. Triseti. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1212. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.

Trichamphora Junghuhn 1839. Verhand. Bat. Genootsch.; 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 308: nov. g. Gasteromycetum. (T. pezizoidea.) An Physari species?
Endl. 1842. Spl. II. p. 103. n. 316: g. Physareor.? — Par. Corda 1842. Mycol. p. 197. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 454. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489 (*Tricamphora*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.

Trichandrum Necker 1790. Elem. bot. I. p. 84. n. 152: nov. g. Siphoniphytor., a Xeranthemo L. sejunctum. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 197.
= Euhelichrysum DC.?

Trichantha Hook. 1844. Ic. pl. rar. III. P. 2. t. 666. 667: nov. g. Gesneriear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 395.
Lindl. 1847. Veg. kd. p 672: g. Gesnerear.
Hanst. 1854. Linnaea XXVI. p. 195: g. Rhytidophyllear.?

Trichantha Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 437: nov. g. Convolvulear. (T. ferruginea.)

Trichanthera HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 242 in adnot.: nov. g. Acanthacear.
Meisn. 1840. Gen. p. 295 (203): g. Ruelliear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 62. n. 4059/1. — Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 218.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.

Trichanthera Ehrenb. 1829. Linnaea IV. p. 401: nov. g. Zygophyllear. (T. modesta.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 774. (spuriar.) — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — Endl. 1840. Gen. n. 6037. p. 1164; 1841. Ench. p. 616. (verar.) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 275 (*Tricanthera*).
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7552: g. Guajacear.
Planch. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. III. p. 292: ad Maherniam refert.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 325: g. Hermanniear.
= Eurynema Endl.

Trichanthera Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 197: sect. Banisteriae.

Trichanthodium Sonder & F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 489: nov. g. Angianthear. (T. skirrophorum.)

Trichanthus Philippi 1857. Bot. Zeit. p. 722: sect. Jaborosae. An genus?

Tricharia Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIV sect. Parmeliae.

Tricharia Fée 1824. Crypt. cort. t. 3. f. 18. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 646.
Leman 1828. Dict. v. 55. p. 198: g. Hypoxylor.?
= Meliola Fries.

Trichasma Walpers 1839. Linnaea XIII. p. 510; 1842. Rep. I. p. 630: nov. g. Genistear. (Dichili et Chasmones sp.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6502. p. 1266; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5860. (genuinar.) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 518. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 5. (1844 ibid. II. p. 494 ad Argyrolobium reductum.) — A. Juss 1849 in Orb. Dict. VII. p. 269 (*Trichosma*).

Trichaster Czerniaiew 1845. Bull. soc. Mosc. III. p. . . . : nov. g. Lycoperdinear. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 130 et Flora 1847. I. p. 194.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 441: g. Diplodermeor.

Trichasterophyllum Willd. herb. (hyssopifolium). *Cf.* Link Jahrb. III. p. 69 et Steud. Nom. II. p. 699. (= Helianthemum glomeratum Lag.)
Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7190. 6: sect. Helianthemi.
= Lecheoides Dunal.

Trichaurus*) Arnott 1834 in Wight Prodr. I. p. 40 (Wight Ic. t. 23): nov. g. Tamariscinear. (Tamarix ericoides Rottl. & W.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5483. p. 1039; 1841. Ench. p. 543. — Walp. 1843. Rep. II. p. 115.
Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93): g. Tamaricacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 342.
Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6471: g. Tamariscear.

Trichelostyles Rchb. vid. *seq.*

Trichelostylis Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. p. 25 et Schult. Mant. II. p. 2): nov. g. Scirpear. — Par. Nees 1834. Linnaea IX. p. 290; 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 226 (sphalm. *Triclelostylis*); 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 84. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Schltd. 1852. Linnaea XXV. p. 167.
Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1116; 1829 ap. Mössl. III. p. 1805 (*Trichelostyles*): g. Fimbristylear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 999 *b*. p. 118; 1841. Ench. p. 64: sect. Isolepidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1478. 2.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 201: g. Cyperacear.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 78: g. Ficiniear.
Synon. Dichostylis Palis.

Trichera Schrad. 1814. Ind. sem. Götting. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 1. 54. n. 407: g. Dipsacear. — Par. Schult. 1827. Mant. III. p. 2. — Link 1829. Hdb. I. p. 679.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 746: sect. Scabiosae. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 318.
DC. 1830. Pr. IV. p. 651: sect. Knautiae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 687. — Endl. 1838. Gen. n. 2193 *c*. p. 354; 1841. Ench. p. 229. — Griseb. 1834. Rumel. II. p. 178. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 450.
Synon. Scabiosa Lagasc.

Tricheroides DC. 1830. Prodr. IV. p. 650: sect. Knautiae. — Par. G. Don 1844. Gen. syst. III. p. 686. — Endl. 1838. Gen. n. 2193 *b*. p. 354; 1841. Ench. p. 229. — — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 176.
Synon. Tricheropsis Rchb.?

Tricheropsis Rchb. 1841. Nomencl. p. 72. n. 2689. 1: sect. Scabiosae.
= Tricheroides DC.?

Trichia Hall. 1768. Helvet. III. p. 114: g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 199. — Par. Pers. 1796. Obs. myc. p. 59. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 14. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 21. 265. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 5. — Palis. 1805. Dict. v. 6. p. 501 (*Capilline*).
Pers. 1797. Tent. p. 9: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIV. 176: g. Trichospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 347. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 48.
DC. 1805. Franç. II. p. 250: g. Angiocarpor. Sect.: Sphaerocarpus, Arcyria, Cribraria.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 28: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 117; 1812. Überbl. p. 31: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 377.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Cribrariar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 574: g. Trichiadear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Trichosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 555: g. Trichiacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74.
Fries 1825. Pl. homon. p. 143 (sph. *Tricria*); 1829. Syst. myc. III. 1. p. 182: g. Trichiaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 188; 1841. Nom. p. 9. n. 352. Sect. (1841): Trichia, Hemiarcyria. — Endl. 1836. Gen. n. 308. p. 26; 1841. Ench. p. 16. Sect.: Goniosporum, Hemiarcyria. — Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 21; 1840. IV. p. 34; 1842. V. p. 21; 1842. Mycol. p. 83. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 259. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 457. Sect. ut Endl. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. — Bonord. 1851. Hdb. p. 216.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 1027: g. Trichogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 530. n. 3518; 1831. Gen. II. p. 772. n. 3963: g. Trichogasterum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 378: g. Angiogasterum.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 22: g. Coniogasterum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Math. 1853. Belg. II. p. 391: g. Trichiear.
Synon. Sphaerocephalos Hall.?

*) ἄθυρον, aurum. (?)

Trichiaceae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 553: div. Lycoperdacear. verar. Gen.: Onygena, Physarum, Cionium, Diderma, Didymium, Trichia, Leocarpus, Leangium, Craterium, Cribraria, Dictydium, Arcyria. Stemonitis, Cirrolus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Lycoperdariear. Gen.: Licea, Perichaena, Trichia, Arcyria, Cribraria, Dictydium, Stemionitis, Diachea, Craterium, Leangium, Physarum, Didymium, Diderma, Lycogala.
Schulz 1831. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): fam. Gasterosporar. Sect.: Physarea, Trichiacea, Aethalinea.

Trichiacei Fries 1825. Pl. homon. p. 142: subordo Trichospermor. Gen.: Trichia, Arcyria, Diachea, Stemonitis, Dictydium, Cribraria, Cirrholus. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 9. Gen ead.
Endl. 1836. Gen. p. 26; 1841. Ench. p. 16: trib. Myxogasterum. Gen.: Cirrholus, Licea, Perichaena, Trichia, Arcyria.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 21; 1839. III. p. 16; 1840. IV. p. 34: fam. Myelomycetum. Gen.: Trichia etc.
Rchb. 1841. Nom p. 9: sect. Myxogasterum. Gen.: Arcyria, Trichia, Triptotrichia, Perichaena, Licea, Cirrolus, Cribraria, Dictydium, Stemonitis, Diachea, Enerthema. — Simil. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 257. Gen. ead. (emissis 6 ultimis) et Tubulina.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 21; 1842. Mycol. p. LXXVIII. 83: fam. Dermatogasterum. Gen.: Trichia.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 456: div. Myxogastrum. Gen.: Arcyria, Trichia, Lachnobolus, Perichaena.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: sect. Coniogastror. Gen.: Trichia, Arcyria, Cirrholus?
Bonord. 1851. Hdb. p. 216: fam. Myxogasterum. Gen.: Trichia, Arcyria.

Trichiadeae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 565. 574: div. Gasteromycear. Gen.: Trichia, Arcyria.

Trichieae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 385: div. Lycoperdear. Gen.: Onigena, Cribraria, Arcyria, Craterium, Stemonitis, Didymium, Trichia, Perichaena, Physarum, Lycogala, Tubulina.

Trichila Wittst. vid. *seq.*

Trichilia P. Browne 1756. Jamaic. p. 278: g. Monadelph. sect. 3. *Cf.* Wittst. Et. Handw. p. 892 (*Trichila*).
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1020. 1368. n. 1134; 1762. Sp. ed. II. p. 550; 1764. Gen. ed. VI. p. 211. n. 528; 1767. Syst. ed. XII. p. 294. n. 521: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 332; 1784. Syst. p. 399. — Reich. 1778. Gen. p. 216. n. 573. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 285. n. 721. — Gmel. 1791. Syst. p. 679. — Pers. 1797. Syst. p. 426. — Willd. 1799. Sp. II. p. 552. n. 840.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Trihilatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 357.

Trichilia P. Browne cont.
Gled. 1764. Syst. p. 138. n. 583: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 232: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 265: g. Meliar.
Neck. 1790. El. II. p. 433. n. 1261: g. Comizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
Cram. 1803. Disp. p. 92 in Octandr. Monogyn., p. 156 in Monadelph. Octandr. et p. 158 in Monadelph. Decandr.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 44: g. Meliacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 468. n. 1062. — Hedw. 1806. Gen. p. 302. n. 1199. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 214; 1825. ibid. VII. p. 226. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 519. — Kunth 1824. Syn. III. p. 215. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 202. — A. Juss. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 76. — Bartl. 1830. Ord. p. 356. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 299. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 86.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 683; 1826. Syst. III. p. 67. n. 2391; 1831. Gen. II. p. 543. n. 2660: g. Meliear.
DC. 1824. Pr. I. p. 622: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 212. n. 5512. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 235. Sect.: Trichilia, Portesia. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 681. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 194. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (36). — Endl. 1840. Gen. n. 5541. p. 1051; 1841. Ench. p. 551. Sect.: Eutrichilia, Portesia, Torpesia? — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8077. Sect. ut A. Juss. et Torpesia? — Walp. 1842. Rep. I. p. 432; 1843. II. p. 817; 1846. V. p. 375. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 389.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 306: g. Tiliacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Heyneear.
Synon. Mafureira Bert.

Trichilia A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 235: sect. Trichiliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8077 1.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 86. 110: g. Trichiliear.
= Eutrichilia Endl.

Trichilieae DC. 1824. Prodr. I. p. 622: trib. Meliacear. Gen.: Trichilia, Ekebergia, Guarea, Heynea. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 163. Nova gen.: Sandoricum, Lansium, Aphanamixis, Epicharis, Chisocheton. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. Gen. ut DC. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 681. Gen.: Trichilia, Milnea, Gonioscheton, Dysoxylum, Ekebergia, Guarea, Epicharis, Didymocheton, Aphanamixis, Heynea, Chisocheton, Carapa, Calpandria, Odontandria. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180. 186. Gen. ut Juss. — Meisn. 1837. Gen. p. 48. Gen.: Goniocheton, Carapa, Xylocarpus, Synoum, Lansium, Nemedra, Aphanamixis, Aglaja, Milnea, Disoxylum, Chisocheton, Hartighsea, Epicharis, Cabralea, Didymocheton, Sandoricum,

Trichilieae DC. cont.
Guarea, Moschoxylon, Trichilia, Heynea, Ekebergia, Walsura, Odontandra?, Geruma?, Stemmatosiphon?, Calpandria? — Endl. 1840. Gen. p. 1048; 1841. Ench. p. 551. Gen.: Aglaia, Milnea, Lansium, Nemedra, Amoora, Dysoxylon, Schizochiton, Synoum, Hartighsea, Epicharis, Cabralea, Didymochiton, Goniochiton, Sandoricum, Ekebergia, Walsura, Heynea, Trichilia, Moschoxylum, Guarea, Carapa, Xylocarpus; Calpandria?, Odontandra? — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 81. 97. Gen. ead. (exclusis 5 ultimis) et Sphaerosacme, Aphanamixis, Prasoxylon, Cambania, Odontosiphon, Surwala, Portesia, Torpesia, Elcaja, Heynichia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 80. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: subdiv. Meliacear. Gen.: Trichilia, Guarea.
Rchb. 1828. Consp. p. 212: subdiv. Meliear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 313. Sect.: Xylocarpeae, *genuinae* (subsect.: Guareeae, Gerumeae, Heyneeae), Calpandrieae. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. Gen. ut Endl.
A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 223: div. Meliacear. Gen.: Nemedra, Aphanamixis, Disoxylum, Chisocheton, Synoum, Hartighsea, Epicharis, Cabralea, Didymocheton, Goniocheton, Sandoricum, Lansium, Ekebergia, Heynea, Trichilia, Moschoxylum, Guarea, Carapa, Xylocarpus. *Affinia*: Calpandria, Aglaia.

Trichiniopsis Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 295: sect. Trichinii.

Trichinium *) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 414. Ed. Nees p. 270: nov. g. Amaranthacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIV. 535. n. 1037. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 28.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 315; 1825. Syst. I. p. 816. n. 924; 1830. Gen. I. p. 198. n. 1005: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 864.
Mart. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 317: g. Amarantacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 249.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4377: g. Achyranthear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Amaranthear.
Endl. 1837. Gen. n. 1963. p. 302; 1841. Ench. p. 185: g. Aërvear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6428. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 626. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 283. Sect.: Eutrichinium, Trichiniopsis.

Trichipteris Presl 1822. Delic. prag. p. 172: nov. g. Polypodiacear. (T. excelsa.) *Cf.* Isis 1823. p. 377 et Leman 1828. Dict. v. 55. p. 205.

Trichipteris Presl cont.
Endl. 1841. Spl. I. n. 652 *d*. p. 1351; 1841. Ench. p. 37: sect. Alsophilae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Cyathear.
Synon. Trichopteris Spreng.; Chnoophora Kaulf.

Trichlis Hall. 1743. Hort. Götting. p. 26.
= Mollugo Linn. et Polycarpon Löfl.

Trichoa Pers. 1807. Ench. II. p. 634. n. 2292: g. Dioec. Monadelph.
DC. 1824. Pr. I. p. 103: g. Menispermear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1888; 1841. Nom. p. 70. n. 2622 [*Trichon*]. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 243. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 113. — Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7). — Endl. 1839. Gen. n. 4691. p. 826; 1841. Ench. p. 415. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7. — Walp. 1842. Rep. I. p. 95.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 309: g. Menispermacear.
Synon. Batschia Thunb.; Abuta Pöpp.

Trichobactris Örsted 1858. Palm. Centroam. p. 43: subg. Bactridis. (B. bifida.)

Trichoballia Presl 1830. Symb. bot. I. p. 9 (sub Lepisia): nov. g. pro Schoeno involucrato, thermali et dactyloide indicatum.

Trichobasis A. DC. 1846. Prodr. X. p. 13: sect. Echii.

Trichobasis Léveillé 1849 in Orb. Dict. XII. p. 785: nov. g. Uredinear. (Uredo vera DC., linearis Pers., etc.)

Trichobasis Turczan. 1852. Bull. Ac. Petersb. X. p. 336: nov. g. Callistemonear., Kunzeae aff. (T. aurea.)

Trichoblasteae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phycol. gener. p. 370; 1845. Phycol. germ. p. 283; 1849. Spec. Alg. p. 638: ordo Paracarpear. Fam.: Callithamnieae, Ceramieae.
Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 8: div. Eremospermear. Subdivis.: Dermatosipheae, Gloeosipheae.

Trichocalymma Zenk. mss.
= Trichothemelium Kunze.

Trichocarpaea DC. 1830. Prodr. IV. p. 220: sect. Torilidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 362. — Endl. 1839. Gen. n. 4503 *b*. p. 786; 1841. Ench. p. 380. — Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5371. 2.

Trichocarpus Schreb. 1789. Gen. I. p. 366. n. 923: g. Polyandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 834. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1224. n. 1058.
= Ablania Aubl.

Trichocarpus Necker 1790. Elem. bot. II. p. 70. n. 718: g. Sarcodiphytor., ab Amygdalo L. sejunctum.
= Persica Tourn.

Trichocarya Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 357: nov. g. Chrysobalanear. (T. splendens.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 640.

Trichocentrum Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 11. t. 115: nov. g. Orchidear. (T. pulchrum.)
Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1951: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1410.

---

*) τρίχινος, capillaceus. (?)

Trichocentrum Pöpp. cont.
p. 197; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2015. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Ionopsidar.
Synon. Acoidium Lindl.

Trichocephalum Koch 1836. Synops. p. 171. Ed. II. p. 189: sect. Trifolii. (T. subterraneum L.) — Par. Webb 1846. Canar. II. p. 75.
= Calycomorphum Presl.

Trichocephalus Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 374. t. 17. f. 1: nov. g. Rhamnear. (Phylica stipularis L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 40. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 466. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50).
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3803: g. Ceanothear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 87 (*Tricocephalus*): g. Phylicear.
= Walpersia Reiss., Endl.

Trichoceras Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 291: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 732. n. 3011; 1831. Gen. II. p. 668. n. 3374: g. Orchidear. (Gynandr. Monandr.)
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
= Trichoceros HBK.

Trichoceras Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 680. n. 452: nov. g. Ceramiear. (Chaetoceras? villosum Kütz.)

Trichoceros HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 337. t. 76: nov. g. Epidendrear. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 211. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 327.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 174: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1538; 1841. Nom. p. 53. n. 2038. — Endl. 1837. Gen. n. 1432. p. 200; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.
Synon. Trichoceras Spreng.

Trichochaeta Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 155: nov. g. Rhynchosporear. (T. tenuis.)

Trichochila Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 347. 353: sect. Disae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1537 *b ϑ*. p. 1365; 1841. Ench. p. 112: subsect. Calodisae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1882. 2 *h*.

Trichochloa DC. 1813. Cat. h. Monsp.; 1813. Bull. soc. philom. Mai p. 279: novum gen. Graminear., ex Agrostidis speciebus et Stipa capillari conditum. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 18. 383. n. 238.

Trichochloa Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 117: nov. g. Triandr. Digyn. Sect.: Stenocladium, Acroxis.
Agdh. 1823. Aphor. p. 147: g. Agrostidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.

Trichochloa Trinius cont.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 676): sect. Mühlenbergiae.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 261: sect. Agrostidis. (*Synon. Tosagris Raf.*)
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 905: g. Cinnear. Sect. ut Trin.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 213: g. Graminear.
= Mühlenbergia Schreb.?

Trichocisti Nees 1816. Syst. p. 110; 1817. Überbl. p. 29: semicirculus II. Aërogasterum. Gen.: Didymium, Diderma, Cionium, Physarum, Leangium, Leocarpus; Trichia, Arcyria, Cribraria, Dictydium; Stemonitis, Craterium; Onygena.
Mart. 1817. Erlang. p. 373: sect. Aërogasterum. Gen. ead. excepto Cionio.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. L: sect. Trichospermor. Gen. ut Nees (exceptis Leangio et Onygena) et Diachea.

Trichocladeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: fam. Mucediniae. Gen.: Chloridium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: trib. Mucedinear. Gen.: Chloridium, Circinotrichum.

Trichocladia „Harv." Rchb. 1841. Nomencl. p. 20. n. 712: g. Ceramiear.

Trichocladus Pers. 1807. Ench. II. p. 597. n. 2174: g. Dioec. Monandr. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 899. n. 3161.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 215: g. Urticear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212d. n. 5590: inter genera vix cognita.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 11. n. 37: g. Monandr. Monogyn.
DC. 1830. Pr. IV. p. 269: g. Hamamelear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 397. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (110)? — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 128.
Endl. 1839. Gen. n. 4590. n. 804; 1841. Ench. p. 401; 1850. Spl. V. p. 19: g. Euhamamelear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 434.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 78: g. Hamamelidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2639.
Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323: g. Parrotiear.
Synon. Dahlia Thunb.

Trichocline Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 13; 1817. Dict. v. 8. p. 395: nov. g. Mutisiear. (Doronicum incanum Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2256; 1841. Nom. p. 88. n. 3427. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Less. 1830. Linnaea V. p. 286; 1832. Syn. p. 117. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35.
Cass. 1824. Dict. v. 33. p. 464; 1828. v. 55. p. 215; 1830. v. 60. p. 584: g. Gerberiear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 20: g. Eumutisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2923. p. 485; 1841. Ench. p. 248. — Meisn. 1839. Gen. p. 229 (141). — Walp. 1843. Rep. II. p. 680.
Synon. Eurytis Don.

Trichocolea Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 101. 103; 1838. IV. p. XXV: g. Ptilidior. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 651. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/15. p. 1341; 1841. Ench. p. 28.
Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 827: g. Ptilidiear. — Par. Nees 1845. Syn. Hepat. p. 236. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 24. — Bayrh. 1849. Taun. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Ptilidar.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 153: g. Hepatiear. foliosar.
Synon. Thricholea, Tricholea et Tricolea Dumort.

Trichocoma DC. 1837. Prodr. VI. p. 507: sect. Berkheyae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2844 *f.* p. 466; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3645. 6.

Trichocoma Junghuhn 1839. Verh. Bat. Genootsch.; 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 308: nov. g. Hymenomycetum, Graphiolae aff? (Tr. paradoxum.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 103. n. 372/1: g. Phacidiicor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 446 (*Trichocome*): g. Trichocomeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 448.
Synon. Trichoskytale Corda; Trichoscytale Lindl.

Trichocome Fries vid. *praeced.*

Trichocomei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 446: div. Trichodermaceor. Gen.: Trichocome, Institale.

Trichoconium Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 73. t. 37: nov. g. Fungor. (T. glutinatum.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 54: g. Stilbosporeor.

Trichocoronis A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV. P. 1) p. 65 adnot. (Flora 1850. II. p. 708): nov. g. Eupatorinear., Phalacraeae aff. (T. Wrightii et rivularis.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 813: g. Eupatoriear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 152.

Trichocrater Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 395: sect. Mappiae.

Trichocrepis Visiani 1826. Stirp. Dalmat. p. 18. t. 7; .... Fl. Dalm. II. p. 115. (Genus Cichoracear. *Cf.* Walp. Ann. bot. I. p. 463.)
Endl. 1838. Gen. n. 3019 *b.* p. 500; 1841. Ench. p. 250: sect. Lagoseridis.
Boiss. 1856. Diagn. pl. nov. III. Ser. 2. Nr. 3. p. 98: sect. Pterothecae.
Synon. Crepinia Rchb.; Intybellia Cass.; Myoseris Link.

Trichocystis Kütz. 1846. Tab. phyc. p. 20; 1849. Spec. Alg. p. 230. n. 173: nov. g. Palmellear.

Trichoderma Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 99: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 223. — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 23. 282.
Pers. 1797. Tent. p. 12: g. Dermatocarpi.

Trichoderma Pers. cont.
Pers. 1801. Syn. p. XV. 230: g. Gymnospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 358. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 50.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 23: g. Gastromycor.
Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 18 (*Thrichoderma*): g. ex typo Tr. viridis emendat.
DC. 1815. Franç. V. p. 13: g. Gymnocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 80; 1817. Überbl. p. 21: g. Nematomycorum tegentium.
Mart. 1817. Erlang. p. 360: g. Nematomycetum.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Sporotrichor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 560: g. Trichodermidear.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLV: g. Trichodermatum.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Gasteromycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 550: g. Fuliginear. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167. — Math. 1853. Belg. II. p. 396.
Fries 1825. Pl. homon. p. 152: g. Myrothecior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 164.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 1031: g. Mucoroideor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 555. n. 3565: g. Byssoideor.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 215: g. Trichodermear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 769. n. 3943.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Spumariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 245: g. Sporomycetum perisporor.
Endl. 1836. Gen. n. 297. p. 25; 1841. Ench. p. 16: g. Trichodermeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 373. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 286. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 447. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 652.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 22; 1842. Mycol. p. 87: g. Trichodermacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 141.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: inter genera Fungalium minus nota.
Bonord. 1851. Hdb. p. 145: g. Trichodermaceor.

Trichoderma Link 1829 vid. *Trichodesma R. Brown.*

Trichodermaceae Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 200: ordo Gasteromycetum. Divis.: *submitratae* (Spadonia, Pilacre), *subcapitatae* (Asterophora, Onygena, Institale), Trichodermeae, *subsphaericae* (Tipularia, Dichosporium, Aegerita).
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): fam. Gasterosporar. Sect.: Myrotheceа, Pilacrea.

Trichodermaceae Fries cont.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 21; 1842. Mycol. p. LXXIV. 86: fam. Dermatogasterum. Gen.: Hyphelia, Trichoderma, Ostracoderma. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 141. Gen.: Trichoderma.

Trichodermacei Fries 1825. Pl. homon. p. 144: ordo Gasteromycetum. Trib.: Aethalini, Trichodermei, Pilacrini, Myrothecii. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 446. Divis.: Onygenei, Trichocomei, Trichodermei.
Rchb. 1828. Consp. p. 8: div. Trichophacellor. Subdivis. ut Fries 1825.
Endl. 1836. Gen. p. 24; 1841. Ench. p. 16: subordo Gasteromycetum. Trib.: Aegeritei, Trichodermei, Onygenei.
Rchb. 1841. Nom. p. 9: subdiv. Trichomycetum. Sect. ut Endl. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 285. Sect. eaed.
Bonord. 1851. Hdb. p. 145: fam. Mycetinor. Gen.: Trichoderma, Hyphelia.

Trichodermata Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLV: sect. Mucedinum. Gen.: Myrothecium, Trichoderma.

Trichodermeae Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 202: div. Trichodermacear. Gen.: Hyphelia, Ostracoderma, Trichoderma, Myrothecium.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 769: div. Fungor. Gen.: Spadonia, Pilacre, Asterophora, Onygena, Batarrea, Hyphelia, Trichoderma, Myrothecium.

Trichodermei Fries 1825. Pl. homon. p. 148: trib. Trichodermaceor. Gen.: Hyphelia, Amphisporium, Ostracoderma, Institale. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 25; 1841. Ench. p. 16. Gen.: Myrothecium, Asterothecium, Trichoderma, Hyphelia, Ostracoderma.
Rchb. 1828. Consp. p. 9: subdiv. Trichodermaceor. Gen. ut Fries et Synconis. — Par. Rchb. 1841. Nom p. 9. Gen. ut Endl. et Cylichnium.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 286: subsect. Trichodermaceor. Gen.: Asterothecium, Trichoderma, Hyphelia.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen.: Trichocoma, Pilacre, Trichoderma, Ostracoderma, Institale, Hyphelia?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 447: div. Trichodermaceor. Gen. ut Endl. (Hyphoderma loco Asterothecii.)

Trichodermia Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. t. 10: g. Fungor. Hymenocarpor. (T. rosea.)

Trichodermideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 560: div. Nematomycear. Gen.: Trichoderma.

Trichodes DC. 1837. Prodr. VI. p. 507: sect. Berkheyae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2844 *e*. p. 466; 1841. Ench. p. 245.
Synon. Acanthodontia Rchb.

Trichodesma R. Brown 1810. Prodr. I. p. 496. Ed. Nees p. 352: nov. g. Boragear. (Borago zeylanica L.) — Par. D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 239.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 448: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2961.

Trichodesma R. Brown cont.
Lehm. 1818. Asperif. p. 1. 192: g. Asperifoliar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. VIII. 68. n. 636. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 563. n. 599; 1830. Gen. I. p. 126. n. 630. (Pentandr. Monogyn.) Bartl. 1830. Ord. p. 193. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 607.
Link 1821. En. I. p. 173; 1829. Hdb. I. p. 588 (*Trichoderma*): g. Borraginear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVII. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 226. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 932.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 451: g. Nuculatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Cynoglossear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 192; 1841. Nom. p. 112. n. 4357. Sect. (1841): Trichodesma, Pilodesma. — Endl. 1839. Gen. n. 3779. p. 650; 1841. Ench. p. 321. Sect.: Cynoglossoides, Borraginoides. — A. DC. 1846. Pr. X. p. 171. Sect.: Leiocaryum, Friederichsthalia, Trachycaryum, Ommatocaryum.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 311: g. Rinderear.
Meisn. 1840. Gen. p. 281 (190): g. Lithospermear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 56: g. Anchusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.
Synon. Borraginoides Boerh.; Cynoglossoides Isn.; Pollichia Medic.

Trichodesmium Chevall. 1826. Fl. Paris. p. 382. t. 11. f. 1.
= Graphiola Poit.

Trichodesmium Ehrenb. 1830. Poggend. Ann. p. 506. *Cf.* Mont. 1848. Ann. sc. nat. Déc.; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 652.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Oscillatoridar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 286. n. 201: g. Nostocear.

Trichodictyon Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 153; 1849. Spec. Alg. p. 230. n. 172: nov. g. Palmellear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 63.

Trichodium *) Michx. 1803. Fl. bor. Am. I. p. 41: nov. g. Graminum. (Cornucopiae hyemalis Walt.) — Par. Link 1821. En. I. p. 69.
Pers. 1805. Ench. I. p. 73. n. 142: g. Triandr. Digyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 39. n. 182. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 198. — Willd. 1809. En. p. 97. — Elliott 1817. Sketch I. p. 99. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 42.
Palis. 1812. Agrost. p. 5: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. II. p. 12. 276. n. 211. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 219.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63.

---

*) θρίξ, capillus; εἶδος, forma.

Trichodium Michx. cont.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 676): sect. Agrostidis. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 259; 1830. Gen. I. p. 58. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 178. — Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 902 *b*; 1830. Fl. exc. p. 25. — Link 1829. Hdb. I. p. 31. — Koch 1837. Syn. p. 782. Ed. II. p. 903. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 461; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 439. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 380. — Math. 1853. Belg. I. p. 596. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 483.
= Agrostidis Linn. pars.

Trichogalium DC. 1830. Prodr. IV. p. 599: subsect. Eugalii.
Endl. 1831. Gen. n. 3100 *l*. p. 523; 1841. Ench. p. 271: sect. Galii. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 457. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 411. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 469.

Trichogamila P. Browne 1756. Jamaic. p. 218: nov. g. Decandr. Monogyn.
= Strigilia Cavan.

Trichogasteres Spreng. 1827. Syst. IV. p. 379: div. Gastromycetum. Gen.: Diphtherium, Cribraria, Arcyria, Trichia, Dictydium, Stemonitis. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 771. Gen.: Diderma, Didymium, Physarum, Craterium, Arcyria, Trichia, Cribraria, Dictydium, Diachea, Stemonitis.
Endl. 1836. Gen. p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Trichospermeor. Trib.: Cenococcei, Podaxidei, Sclerodermei, Lycoperdei.
Rchb. 1841. Nom. p. 9: subdiv. Trichomycetum. Sect. ut Endl. — Simil. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 289. Subsect. eaed. (exceptis Podaxideis.)
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 243: ordo Gasteromycetum. Gen.: Geaster, Tulostoma, etc.

Trichogastres Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 919: subdiv. Gasteromycor. Gen.: Lycoperdon, Tulostoma, Geastrum, Scleroderma, Stemonitis, Arcyria, Cribraria, Trichia, Physarum, Diderma, Lycogala, Licea, Spumaria, Aethalium.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 3: subordo Trichospermor. Divis.: Lycoperdei, Sclerodermei, Podaxidei, Cenococcei.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: subordo Gasteromycetum. Gen.: Batarrea, Tulostoma, Lycoperdon, Scolecotrichum, Phellorinia, Broomeia, Geaster, Plecostoma, Myriostoma, Diploderma, Bovista, Hippoperdon, Mycenastrum, Scleroderma, Polysaccum, Polyangium, Ciliciocarpus, Arachnion, Polygaster, Mitremyces, Cenococcum, Pilacre. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 240. Fam.: Hymenogasterei, Sclerodermacei, Lycoperdacei, Podaxidei, Geastridei, Phalloidei, Clathracei.

Trichogloea Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 53: nov. g. Algar. (Batrachospermum Requienii Mont.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Batrachospermear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XII. p. 654.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 544. n. 353: g. Mesogloeacear.

Trichoglottis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 369: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 213: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1470. p. 204; 1841. Ench. p. 111. Sect.: Trichoglottis, Atrichoglottis. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2076. Sect. eaed. — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 683.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Trichogonia DC. 1836. Prodr. V. p. 126: sect. Kuhniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2268 *b*. p. 368; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3843. 2.
Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 459: g. Eupatoriacear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 704: g. Adenostylear.

Trichogonium DC. 1830. Prodr. IV. p. 195: sect. Heraclei. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 344. — Endl. 1839. Gen. n. 4477 *f*. p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5476. 5.

Trichogonum „Palis." Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 123: nov. g. Trichomatar.
= Lemanea Bory.

Trichogramme Fisch. & Meyer .... Sert. Petrop. I. t. 6 adn. (Walp. Ann. bot. III. p. 100): sect. Nemophilac. (N. atomaria et liniflora.)

Trichogyne Lessing 1831. Linnaea VI. p. 231: nov. g. Gnaphaliear. (Seriphium laricifolium Lam.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27.
Less. 1832. Syn. p. 359: g. Antennariear.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729. 745: g. Filaginear.
Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3471. 1: sect. Trichogynes.
= Eutrichogyne DC.

Trichogyne DC. 1837. Prodr. VI. p. 264: g. ampliat. Antennariear. Sect.: Eutrichogyne, Ifloga. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2763. p. 450; 1841. Ench. p. 243. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3471. Sect. similes. — Walp. 1843. Rep. II. p. 648. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Tricholaena Schrad. 1824 in Schult. Mant. II. p. 8. 163: nov. g. Triandr. Digyn. (Saccharum Teneriffae.)
Link 1829. Hdb. I. p. 91: g. Graminear.
Nees 1835. Ind. sem. h. Vratisl. (Linnaea XI. Litt. p. 127.)
Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319): g. Paniceear.
Parlat. 1850 in Webb Canar. III. p. 425: g. Andropogonear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 92: sect. Panici.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265: g. Paspalear.
= Saccharophorum Neck.?

Tricholea Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Jungermanniear.
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 101: g. Ptilidior.

Tricholea Dumort. cont.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 20: g. Tricholear.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 92: g. Lejeunear.
= Trichocolea Nees.

Tricholeae Dumort. 1835. Rec. obs. Jung. p. 20: trib. Jungermanniotypar. Gen.: Tricholea.

Tricholechia Massalongo . . .
= Byssoloma Trevis.

Tricholeconium Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 17. t. 4. f. 239: nov. g. Psiloniacear. (T. roseum.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 76.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 114: g. Psiloniaceor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 13. 52; 1842. Mycol. p. 50: g. Ceratocladior. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 76.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Sepedonieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Myrothecicor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 143: g. Hymenularior.

Tricholepis DC. 1833 in Guillem. Arch. bot. II. p. 331; 1837. Prodr. VI. p. 563: g. Centauriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2868. p. 472; 1841. Ench. p. 246. Sect.: Eutricholepis, Ochanopappus, Anaphalantias. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 106.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3652: g. Zoëgeear. Sect. fere ut Endl.
Synon. Achyropappus M.Bieb.

Tricholobus Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 15. p. 237: nov. g. Connaracear., Eurycomae Jack aff. (T. fulvus et ferrugineus.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 304: g. Connarear.

Tricholoma Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 36; 1825. Pl. homon. p. 66; 1828. Elench. I. p. 5: trib. Leucospori.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *H f*; 1841. Nom. p. 13. n. 502. 6 *f*: subsect. Leucospori. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453 *VII. h.* p. 41; 1841. Ench. p. 22. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 554. — Math. 1853. Belg. II. p. 374.
Fries 1836. Epicr. p. 25; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 274: subg. Leucospori. — Par. Bail 1858. Syst. p. 40. t. 38.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Tricholoma Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 425: nov. g. Sibthorpiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.

Tricholophus Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 114: nov. g. Polygalear. verar. (Polygala monspeliaca L).
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 381: subg. Polygalae.

Trichomaneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: trib. Filicum. Gen.: Trichomanes, Hymenophyllum, Feea.
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 417; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 429:

Trichomaneae Dumort. cont.
sect. Dicksoniear. Gen.: Trichomanes, Hymenostachys, Hymenophyllum.
Presl 1843. Hymenoph. p. 102: sect. Trichomanoidear. Gen.: Feea, Hymenostachys, Lecanium, Cardiomanes, Trichomanes, Ragatelus, Cephalomanes, Neurophyllum, Microgonium, Abrodictyum. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 577.

Trichomanes*) Tourn. 1700. Inst. p. 539. t. 315: g. pl. class. XVI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 325. Ed. Hall. 1745. p. 346: g. Epiphyllospermar.
= Asplenii Linn. sp.

Trichomanes Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 476; 1737. Coroll. p. 20. n. 991; 1740. Syst. p. 32; 1742. Gen. ed. II. p. 504. n. 947; 1753. Sp. II. p. 1097; 1759. Syst. ed. X. p. 1329. n. 1045; 1763. Sp. ed. II. p. 1560; 1764. Gen. ed. VI p. 560. n. 1181; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 696: g. Filicum. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Hill 1769. Ht. kew. p. 429. — Murr. 1774. Syst. p. 791; 1784. Syst. p. 941. — Reich. 1778. Gen. p. 556. n. 1298. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 339. — Juss. 1789. Gen. p. 16. — Lour. 1790. Coch II. p. 681. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 758. n. 1635. — Gmel. 1791. Syst. p. 1318. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Pers. 1797. Syst. p. 981. — Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 301. — Smith 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 105. (dorsiferar.) — Vent. 1799. Tabl. II. p. 66. — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 7. 95 (annulatar.); 1806. Syn. p. 141. (gyratar.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 47. — Willd. 1810. Sp. V. p. 498. n. 1981. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 128. n. 3282; 1831. Gen. II. p. 726. n. 3676. (desciscent.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. VI. p. 325. — Leman 1828. Dict. v. 55. p. 228.
Gled. 1764. Syst. p. 289. n. 1174: g. Filicinar.
Scop. 1777. Intr. p. 63: g. Dorsiferar.
Neck. 1790. El. III. p. 313. n. 1713: g. Sphaeroophytor. Sejungitur Achomanes.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 17: g. Helicogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 32: g. Gyrator.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 159. Ed. Nees p. 15: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 25. — Agdh. 1822. Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. Enum. p. 260. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 68. — D. Don 1825. Nepal. p. 11. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 223. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) *Cf.* Kunze in Bot. Zeit. 1847. p. 276.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 18: g. Cyathear.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 376: g. Hymenophyllear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 675 (sect.: Feea, Hymenostachys); 1841. Nom. p. 27. n. 983. — Endl. 1833. Norf. p. 16; 1836. Gen. n. 658, p. 64; 1841. Ench. p. 40. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 152. — Meisn. 1843. Gen.

*) *μανός*, rarus.

Trichomanes Linn. cont.
p. 435 (336). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 655. — Webb 1850. Canar. III. p. 447. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 16. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 112. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 286.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Trichomanear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 417; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 429. (restrict.)
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Kunze 1834. Linnaea IX. p. 102: g. Trichomanoidear.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 113: g. Eudicksoniear. Subgen.: Hymenostachys, Feea, Eutrichomanes.
= Trichomanes Presl, Feea Bory, Hymenostachys Bory, etc.

Trichomanes Presl 1843. Hymenoph. p. 105: g. restrict. Trichomanear. Sect.: Achomanes, Eutrichomanes, Pachychaetum.
Synon. Eutrichomanes Hook.

Trichomanidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 60: trib. Jungermannear. Gen.: Physiotium, Herpetium, Lepidozia, Mastigobryum, Calypogeia.

Trichomanites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 174. 263; 1841. Gatt. foss. Pfl. I. p. 57: g. Sphenopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 71; 1846. Chlor. prot. p. XLII.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 69: g. Filicum foss.

Trichomanoideae Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 101: subtrib. 4 Jungermanniear. Gen.: Mastigophora, Herpetium, Calypogeia. — Par. Nees 1838. ibid. IV. p. XXIII. Gen.: Calypogeia, Herpetium, Physiotium. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. Gen. ead. — Nees 1845. Syn. Hepat. p. 197. Gen.: Calypogeia, Lepidozia, Mastigobryum, Micropterygium, Physiotium. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 548. Gen. ead. — Bayrh. 1849. Taun. p. 49.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1342; 1841. Ench. p. 28: trib. Jungermanniacear. Gen. ut Nees 1838.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 24: sect. Jungermanniear. foliosar. Gen.: Physiotium, Mastigobryum, Lepidozia, Calypogeia.

Trichomanoideae Kunze 1834. Linnaea IX. p. 102: div. Cyatheacear. Gen.: Trichomanes, Hymenophyllum.
= Hymenophyllaceae Presl.

Trichomanoideae Presl 1843. Hymenoph. p. 102: trib. Hymenophyllacear. Sect.: Trichomaneae, Didymoglosseae. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 577.

Trichomatae (*Trichomates*) „Palis." Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: sect. Algar. Gen.: Diadenus, Trichogonum, Chantransia, Conferva, Vaucheria, Erineum, Coniophorus.

Trichomema Gray vid. *Trichonema Gawl.*

Trichomitrium Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 565: g. Leucodontinor.
= Lasia Brid.

Trichomycetes *) Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 363: series Mucorum. Fam.: Cephalotrichi, Sarcocephali.
Rchb. 1841. Nom. p. 9: div. Lycoperdaceor. Subdivis.: Myxogasteres, Trichodermacei, Trichogasteres. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 252. Subdivis. eaed.

Trichomyci Nees 1817. Syst. Überbl. p. 12: series Mucedinum liberar. Gen.: Collarium, Geotrichum, Oidium, Sporotrichum, Byssocladium, Aleurisma.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLIV: subsect. Mucedinum. Gen.: Aleurisma, Sporotrichum, Macrosporium, Collarium.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. I.: ordo Fungor. Gen.: *A.* Erineum, Fumago, Conoplea, Dematium, Helminthosporium, Helicosporium, Circinotrichum, Gonotrichum, Campsotrichum, Alternaria, Torula. *B.* Mucedines. *C.* Byssi fibrilliformes. *D.* Byssoidei veri.
Fries 1825. Pl. homon. p. 184: trib. Mucedinum. Gen.: Sporotrichum, Trichothecium, Sepedonium, Epochnium, Fusiporium, Dendrina.
Rchb. 1828. Consp. p. 6: subdiv. Mucedineor. Gen. ut Fries 1825.

Trichon Rchb. vid. *Trichoa Pers.*

Trichonema Bell.-Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 224: nov. g. Ensatar. (Ixia Bulbocodium.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 233.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 316: g. Gladiolear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 252; 1825. Syst. I. p. 149. n. 152; 1830. Gen. I. p. 37. n. 164: g. Spathacear.
Link 1821. En. I. p. 49: sect. Ixiae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 193. 195 (*Trichomema*): g. Iridear. — Par. Ker 1827. Gen. Irid. p. 79. — Link 1829. Hdb. I. p. 220. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1247. p. 169; 1841. Ench. p. 98. — Koch 1837. Syn. p. 698. Ed. II. p. 805. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 159. — Meisn. 1842. Gen. p. 392 (293). — Brongn. 1843. En. genr. p. 23. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 372. — Webb 1850. Canar. III. p. 312. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 238.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 408: g. Triandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1202; 1830. Fl. exc. p. 83; 1841. Nom. p. 44. n. 1588: g. Ixiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 99.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Romulea Mar.; Nemostylis Nutt.?; Gelasine Herb.?

Trichonemata Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 51: subdiv. Dermatonematum. Gen.: Calothrix, Baggia, Lyngbya, Sphaeroplea, Scytonema, Vaucheria, Lemanea, Bryopsis, Scytosiphon.

---

*) *μύκης*, fungus.

Trichoneura Anders. 1853 in V. Ak. Handl. p. 148 (Müll. Ann. bot. VI. p. 1006): nov. g. Avenacear. (Calamagrostis pumila Hook.)

Trichoon*) Roth 1798 in Römer Arch. I. 3. p. 37 (Catal. II. p. 2): nov. g. ab Arundine separatum. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 234.

Pers. 1805. Ench. I. p. 102. n. 182: g. Triandr. Digyn. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 107.

Hedw. 1806. Gen. p. 39. n. 184: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 26 (obscurum). — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 18. 382. n. 235.

Agdh. 1823. Aphor. p. 150: g. Avenacear.
= Arundo Linn.

Trichopeplus Körnicke 1856. Linnaea XXVII. p. 599: subg. Eriocaulonis. (E. griseum Körn.)

Trichopetalum Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1535: nov. g. Asphodelear. (T. gracile.)

Endl. 1837. Gen. n. 1148. p. 148; 1841. Ench. p. 84: g. Anthericear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1804. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (304). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 601. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Synon. Bottionaea Colla.

Trichophacelli **) Rchb. 1828. Consp. p. 8: subfam. Lycoperdaceor. Divis.: Trichodermacei, Trichospermi.

Trichophora Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 176: nov. g. Hydrophytar. loculatar.
= Oscillaria Bosc.

Trichophorum Pers. 1805. Ench. I. p. 69. n. 124: nov. g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 33. — Elliott 1817. Sketch I. p. 91. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 36.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 53: g. Scirpear. — Par. Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 26 et Schult. Mant. II. p. 2.) — Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1122. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 293. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 79: g. Scirpidear.

Link 1821. En. I. p. 48; 1827. Hort. I. p. 328; 1829. Hdb. I. p. 109: g. Cyperoidear.

Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 452: sect. Eriophori. — Par. Koch 1837. Syn. p. 745. Ed. II. p. 859. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1476. 1.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 214. n. 224: g. Cyperacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 234. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 207.

Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 49. n. 233: g. Cyperear.
Synon. Leucocoma Ehrh.

Trichophorus „Palis." Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: g. Iliodear. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 236.
= Oscillaria Bosc et Tolypothrix Kütz.

Trichophyllum Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 41; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Scirpus acicularis L.)
= Scirpidium Nees.

Trichophyllum Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 166: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (Actinella lanata Pursh.)

Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 17; 1828. v. 55. p. 263; 1830. v. 60. p. 575: g. Helenicar. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2599. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 315. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17.

Leman 1828. Dict. v. 55. p. 237: g. Corymbiferar.

Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.

Less. 1831. Linnaea VI. p. 519; 1832. Syn. p. 238: g. Galardicar.
= Bahiae DC. pars.

Trichopilia Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1863: nov. g. Vandear. (T. tortilis.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1451. p. 202; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2055. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.

Trichoplacia Massalongo . . .
= Bacidia Not. (Trevis.)

Trichopodium Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1543: g. Aristolochiar.

Endl. 1838. Gen. n. 2165. p. 345; 1841. Ench. p. 218: g. Aristolochiear. (minus notum.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2582.

Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246): g. Asarinear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560 (minus notum).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 794: g. Aristolochiacear.
Synon. Trichopus Gärtn.

Trichopodium Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 482: nov. g. Galegear. (Dalea diffusa Moric.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 229.

Trichopteris Necker 1790. Elem. bot. I. p. 110. n. 192: g. Psydomorphytor., a Knautia L. sejunctum.

Trichopteris Parker . . .
= Metaxya Presl.

Trichopteris „Presl" Spreng. 1827. Syst. IV. p. 124. n. 3275; 1831. Gen. II. p. 725. n. 3669: g. Filicum verar.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.

Presl 1836. Pterid. p. 58: g. Cyatheacear. — (Alsophila excelsa Mart.) — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 35. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 5; 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.

J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 668: g. Cyathear.

Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 35: subg. Alsophilae.

---

*) θρίξ, villus; ᾠόν, ovum.
**) φάκελλος, fasciculus.

Trichopteris Presl cont.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. V. p. 340: g. Alsophilacear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 347: g. Alsophilear.
Conf. Trichipteris Presl.

Trichopteris Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 166: nov. g. Algar. (Ectocarpus Mertensii Ag.)
= Tilopteris Kütz.

Trichopterya Endl., Rchb., Lindl., vid. *seq.*

Trichopterys Wittst. vid. *seq.*

Trichopteryx Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 449; 1841. Fl. afr. austr. I. p. 339. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 895 (*Trichopterys*).
Endl. 1837. Gen. n. 868. p. 97; 1841. Ench. p. 58 (*Trichopterya*); 1842. Spl. II. p. 7: g. Avenacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1219 (*Trichopterya*). — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116 (*Trichopterya*): g. Avenear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 244: sect. Danthoniae.

Trichopus Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 44. t. 14. f. 3: nov. g. plant. (*Bempul* Zeylonens.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 239.
= Trichopodium Lindl.

Trichopus Bartl. & Wendl. 1824. Diosm. p. 105 (*Trichopodes*): sect. Barosmae. (Diosma latifolia L., etc.)

Trichormus *) Allman 1843. Ann. and Mag. n. h. XI. p. 161: nov. g. Nostochinar.
Hass. 1846. Brit. freshw. Alg. p. ...: g. Nostochinear.
= Anabaina Bory.

Trichorrhiza Lindl. ex Steud. Nom. I. p. 461; II. p. 702 (teretifolia).
= Cymbidium triste Willd.

Trichosacme Zuccar. 1845. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 2. p. 11: nov. g. Asclepiadear. *Cf.* Flora 1846. II. p. 425. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 507.

Trichosandra Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 625: nov. g. Gymnemar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Trichosantha „Ehrh." Steud. vid. *Trichosathera.*

Trichosanthes **) Linn. 1737. Gen. p. 295. n. 735; 1737. Cliff. p. 450; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 1008; 1759. Syst. ed. X. p. 1277. n. 966; 1763. Sp. ed. II. p. 1432; 1764. Gen. ed. VI. p. 505. n. 1089; 1767. Syst. ed. XII. p. 638 (*Trichosanthus*): g. Monoec. Syngenes. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 725; 1784. Syst. p. 867. — Reich. 1778. Gen. p. 503. n. 1190. — Lour. 1790. Coch. II. p. 588. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 661. n. 1476. — Pers. 1797. Syst. p. 911. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 701.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 280. n. 1150: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32 (*Trichosanthus*); 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 151. — Juss. 1789. Gen. p. 396. — Gis. 1792. Prael. p. 439. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 518. — Batsch 1802. Tab. p. 221. — Pet.-Th. 1804. Dict v. 2. p. 144 (sph. *Trichosenthes*). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 297. — Pers. 1807. Ench. II. p. 592. n. 2158. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 593; 1826. Syst. III. p. 17. n. 2334; 1831. Gen. II. p. 532. n. 2609. — Link 1822. En. II. p. 403. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 932. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. — Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Brongn. 1843. En. genr. p. 116.
Adans. 1763. Fam. II. p. 139: g. Bryoniar.
Hill 1767. Ht. kew. p. 141: g. Monopetalar.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 322: g. Syngenes. Monogam.
Neck. 1790. El. I. p. 243. n. 395: g. Sygolliphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 102: g. Triandr. Monogyn.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 598. n. 1738; 1809. En. p. 997: g. Monoec. Monadelph.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25; 1828 in DC. Pr. III. p. 313: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2758. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 38. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 349. Subgen.: Eutrichosanthes, Involucraria. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 192. — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 277. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 269. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 658.
Endl. 1839. Gen. n. 5140. p. 939; 1841. Ench. p. 491: g. Cucumerinar. Sect. ut Wight & Arn. et Ceratosanthes. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3961. Sect. ut Endl. — Walp. 1843. Rep. II. p. 202. Sect. eaed. — Miq. 1858. Ind. bat. I. p. 674.
Synon. Anguina Mich.; Ceratosanthes Juss.

Trichosanthes Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 405: g. restrict. Cucurbitear.
Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3961. 2: sect. Trichosanthis.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 16. 94: g. Cucumerinar. Sect.: Lobospermum, Kalayara, Eutrichosanthes, Decagonocarpus, Thysananthes.
= Eutrichosanthes Wight & Arn.

Trichosanthus Linn. 1751. 1767 vid. *Trichosanthes Linn.*

Trichosathera Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 91; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Stipa capillata L.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 702 (*Trichosantha*).

Trichoscytale Lindl., Berk. vid. *Trichoskytale Corda.*

Trichosenthes Pet.-Thouars vid. *Trichosanthes Linn.*

Trichoseris Schultz Bip. mss.
= Lagoseris M. Bieb.

*) ϑρίξ, ὅρμος, catena, collare.
**) Quasi flos pilosus dicitur, cum nota essentialis generica in pilis consistat. (Linn. H. Cliff. p. 450.)

Trichosiphon Endl. 1840. Gen. n. 5320 *e.* p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 5.
Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. 5328 *b α*: subsect. Gymnochitonis.
= Trichosiphum Schott & Endl.

Trichosiphum Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 34: nov. g. Sterculiear. (Tr. australe.) — Par. Meisn. 1836. Gen. p. 30 (25).
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 518: g. Sterculiacear.
Rchb. 1837. Hdb. 291: g. Southwelliear.
Conf. Trichosiphon Endl.

Trichoskytale*) Corda 1842. Anl. Mycol. p. 196: g. Physarcor., Cionio aff.? (*Trichocoma Jungh.*, non DC.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42 (*Trichoscytale*): g. Myxogastrum.
Berk. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 189 (*Trichoscytale*): g. Fungor., Geastro aff.

Trichosma Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 21: nov. g. Epidendrear. (Coelogyne coronaria Lindl. 1841.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 61. n. 1392/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 371. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Coelogynidar.

Trichosma A. Juss. vid. *Trichasma Walp.*

Trichosorus Liebm. 1849. Mexico's Bregner p. 129: nov. g. Filicum. (Alsophila pruinata Kaulf.)
= Lophosoria Presl. (Kunze.)

Trichosperma Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 47: div. Dermatocarpor. Gen. Trichospermor. Pers. 1801 et Onygena, Pisolithus.

Trichospermei Endl. 1836. Gen. p. 25; 1841. Ench. p. 16: subordo Gasteromycetum. Sect.: Myxogasteres, Trichogasteres.

Trichospermi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIII: div. Dermatocarpor. Gen.: Batarrea, Tulostoma, Geastrum, Bovista, Lycoperdon, Scleroderma, Lycogala, Fuligo, Spumaria, Diderma, Physarum, Trichia, Arcyria, Stemonitis, Cribraria.
Leman 1817. Dict. v. 8. p. 106: sect. Angiocarpor. Gen. ead. (excepta Fuligine) et Reticularia, Uperhiza, Polysaccum, Callostoma, Plecostoma, Podaxis.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLIX: subordo Uterinor. veror. Sect.: Liceoidei, Fuliginoidei, Trichocisti, Lycoperdinei.
Fries 1825. Pl. homon. p. 133: ordo Gasteromycetum. Subord.: Sclerodermei, Lycoperdinei, Physarei, Trichiacei. — Par. Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 1. Subord.: Trichogastres, Myxogastres.
Rchb. 1828. Consp. p. 9: div. Trichophacellor. Subdivis. ut Fries 1825.

Trichospermum Palis. mss. ex Cass. (*Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 240.)
= Parthenium Linn.

*) σκυτάλη, baculus, truncus.

Trichospermnm Blume 1825. Bijdr. Nr. 2. p. 56: nov. g. Bixinear. *Cf.* Linnaea I. p. 645. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4931. — Bartl. 1830. Ord. p. 282. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 295. — Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 115. — Endl. 1839. Gen. n. 5063. p. 918; 1841. Ench. p. 478. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 271.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 202: g. Polyandr. Digyn.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 445. n. 2201: g. Bixear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7216. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328. — Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 265.
Rchb. 1837. Hdb. p. 274: g. Ludiear.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 588: g. Bixacear.

Trichosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 88: g. Sphaeriear. (Sphaeria Hystrix, Carpini, etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Dryinospherar.

Trichosphaeria Benth. 1833. Labiat. p. 95; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 97: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 693. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *i.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 9. — Walp. 1845. Rep. III. p. 537.

Trichospira HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 27. t. 312: nov. g. Echinopsidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 367.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 673. n. 2913; 1831. Gen. II. p. 649. n. 3276: g. Compositar. desciscent.
Poir. 1828. Dict. p. 55. p. 241: g. Flosculosar.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 343; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2346. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — DC. 1836. Pr. V. p. 90. — Endl. 1838. Gen. n. 2236. p. 363; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Less. 1829. Linnaea IV. p. 342: g. Vernoniear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 690; 1832. Syn. p. 150: g. unicum Trichospirear.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3933: g. Lagascear.

Trichospireae Lessing 1831. Linnaea VI. p. 690; 1832. Syn. Comp. p. 150: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Trichospira.

Trichosporae Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 759: sect. Bignoniacear. Gen.: Tromsdorffia, Trichosporum, Lysionutus, Agalmyla.

Trichosporeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 80: fam. Tectigraniae. Gen. §. 1: Didymium, Leangium, Cionium, Stemionitis. §. 2: Arcyria, Cribraria, Dyctidium, Craterium, Leocarpus, Trichia, Lycogala?

Trichosporeae Nees 1825. Flora I. p. 143: trib. Cyrtandracear. Gen.: Trichosporum, Lysionotus.

Trichosporeae Nees cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 656: subtrib. Cyrtandracear. Gen.: Tromsdorffia, Aeschynanthus, Lysionotus, Agalmyla.

Trichosporei Léveillé (1846. Consid. mycol.) 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: div. V. Fungor. Subdivis.: Aleurinei, Phycocladei, Sclerochaetei.

Trichosporei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 492: div. Mucedinum. Gen.: Trichothecium, Trichosporum, Ramularia, Perenospora.

Trichospori Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 70: class. Fungor. (Gen.: Botrytis.)

Trichosporium Leman vid. *Trichosporum Fries.*

Trichosporum D. Don 1823. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 85; 1825. Fl. Nepal. p. 124: nov. g. Didymocarpear. (Incarvillea parasitica Roxb.)
Nees 1825. Flora I. p. 43: g. Trichosporear.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 763: g. Trichosporar.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 242: g. Bignoniear.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3227: g. Gesnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 185: g. Cyrtandrear.
= Aeschynanthus Jack.

Trichosporum Fries 1825. Pl. homon. p. 306: nov g. Racodiacear. (Sporotrichi spec. plur.) — Par. Leman 1828. Dict. v. 55. p. 242 (*Trichosporium*).
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 74: g. Racodiaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 492: g. Trichosporeor.

Trichostegia J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 666: sect. Alsophilae. (A. glauca Bl., etc.)

Trichostegia Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXIV. 2. p. 81: nov. g. Helichrysear. (T. asteroides). — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 274.

Trichostema*) „Gronov.“ Linn. 1737. Ht. Clift. p. 493; 1737. Coroll. p. 10. n. 963 (sphalm. *Thrichostema*); 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 265. n. 559; 1753. Sp. II. p. 598; 1759. Syst. ed. X. p. 1106. n. 652; 1763. Sp. ed. II. p. 834; 1764. Gen. ed. VI. p. 300. n. 733; 1767. Syst. ed. XII. p. 403: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Gron. 1743. Fl. virg. I. p. 64. — Murr. 1774. Syst. p. 456; 1784. Syst. p. 546. — Reich. 1778. Gen. p. 304. n. 791. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 397. n. 988. — Gmel. 1791. Syst. p. 918. — Pers. 1797. Syst. p. 583. — Willd. 1800. Sp. III. p. 170. n. 1123. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 39. — Elliott 1821. Sketch II. p. 94.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 188. n. 780: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Verticillatar.

*) στέμα, stamen.

Trichostema Gronov. cont.
— Par. Scop. 1777. Intr. p. 162. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 116. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 347. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 269. — Pers. 1807. Ench. II. p. 135. n. 1417. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 694. n. 2057; 1831. Gen. II. p. 466. n. 2290. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 243.
Hill 1769. Ht. kew. p. 244: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1790. El. I. p. 302. n. 473: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 441: g. Melissear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Ajugear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 861: g. Ajugoidear. Sect.: Streptopodium, Orthopodium.
= seq.

Trichostemma Linn. 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 495.
Link 1822. En. II. p. 120: g. Labiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2818: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Benth. 1835. Labiat. p. 658: g. Ajugoidear. Sect.: Streptopodium, Orthopodium. — — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3678. p. 631; 1841. Ench. p. 308. Sect. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 465. Sect. eaed. — Walp. 1825. Rep. III. p. 902. 991. Sect. eaed.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4162: g. Teucriear. Sect.: Trichostemma, Orthopodium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ajugear. — Par. Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 573: Sect. ut antea.
Synon. Trichostema Gron.

Trichostemma Cassini 1827. Dict. v. 46. p. 399. 419: nov. g. Heliopsidear.
= Cyathophorae DC. pars?

Trichostemma R. Brown 1814 in Salt Abyssin. p. LXIV (Verm. bot. Schr. I. p. 250): nov. g. Syngenes. non descriptum. (T. fructicosum). *Cf.* Steud. Nom. II. p. 665 (*Teichostemma*).
Endl. 1841. Spl. I. p. 1391; 1841. Ench. p. 251 inter genera Compositar. nondum descripta.

Trichostephium Cassini 1834. Opusc. phyt. II. p. 59.
= Trichostemma Cass.

Trichostephus Cassini 1830. Dict. v. 60. p. 618: g. Heliopsidear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21: g. Rudbeckiear.
= praeced.

Trichostigma A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. I. p. 627: nov. g. Rivinar. (Rivina octandra L.)

Trichostigmeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: ser. 3 Compositar. Trib.: Chaenanthae, Jacobaceae, Helianthideae.

Trichostoma „Corda“ Wittst. vid. *Trichostroma Corda.*

Trichostomaceae Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. 18—20. (II. p. III.) Gen.: Barbula, Trichostomum, Didymodon, Ceratodon.

Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 374: trib. Acrocarpor. Gen.: Tortula, Didymodon, Trichostomum, Distichium.

Trichostomea Rchb. 1828. Consp. p. 35: sect. Dicranoideor. Gen.: Trichostomum, Didymodon, Pilopogon, Plaubelia, Desmatodon, Leucoloma, Zygotrichia.

Trichostomeae Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 93: div. Bryacear. Gen.: Tortula, Desmatodon, Trichostomum.

Rabenh. 1845. Krypt. II. 3. p. 99: subsect. Desmatodontear. Gen.: Desmatodon, Didymodon, Barbula, Trichostomum.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen.: Trichostomum, Tortula, Desmatodon, Leucoloma, Ceratodon, Aschistodon, Distichium, Brucea, Orthotheca.

Bayrh. 1849. Taun. p. 8: fam. Muscor. frondosor. Gen. ut Rabenh. et Distichum, Syntrichia.

Trichostomoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Trichostomum, Didymodon, Pilopogon, Plaubelia, Desmatodon. *Affinia*: Leucoloma, Zygotrichia.

Trichostomum Hedwig 1782. Fund. p. 90; 1801. Spec. Musc. p. 107: nov. g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 245. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 760. n. 1645. — Mönch 1794. Meth. p. 736. — Roth 1800. Germ. III. p. 188. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 11. 88. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 296. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 32. — DC. 1805. Franç. II. p. 465; 1815. V. p. 215. — Mart. 1817. Erlang. p. 91. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 739. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 169. n. 3315; 1831. Gen. II. p. 731. n. 3707. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 170. (odontostomor.) Sect.: Leptomitrium, Rhacomitrium. — Math. 1853. Belg. II. p. 60. Sect.: Racomitrium, Campylopus.

Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 161; II. 1. p. 120; 1806. Spl. I. p. 229: g. Aploperistomator.

Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.

Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 21; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 446: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 220.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 37: g. Mitrocarpor.

Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 73: sect. Trichostomi.

Brid. 1822. Meth. musc. p. 82: g. Peristomor. acrocarpor.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 750: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 197.

Brid. 1826. Bryol. I. p. 488: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV; g. Trichostomoideor.)

Trichostomum Hedwig cont.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 244: g. Grimmoidear.

Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 628: g. Trichostomeor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Grimmiear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 44.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Desmatodontoidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 83.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.

Hüb. 1833. Musc. germ. p. 291; g. Aploperistomor.

Endl. 1836. Gen. n. 529. p. 51; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 16.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 907: g. Calyptrobryor.

Bruch & Schimp 1843. Bryol. eur. Fasc. 18—20: g. Trichostomacear. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 378.

Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 94: g. Trichostomear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 113. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401; 1849. ibid. XII. p. 659. — Bayrh. 1849. Taun. p. 9. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 71.

Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 114: g. Pottiacear. — Par. C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 567 (emend.) Sect.: Pycnophyllum, Leptodontium, Eutrichostomum, Desmatodon.

Synon. Swartzia Hedw.; Plaubelia Brid.; Leptomitrium Wallr.

Trichostomum Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 73: g. Muscor. ampliat. Sect.: Cynontodium, Didymodon, Trichostomum.

Trichostroma Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 175. 181: g. Sphaeriaceor., Dematio aff. (brasil.)

= ?

Trichostroma Corda 1830 in Sturm Flora. Fung. II. p. 131. t. 62: nov. g. Fungor. (T. purpurascens.) *Cf.* Flora Lit. II. p. 48 et Wittst. Etym. Handw. p. 896 (*Trichostoma*).

Spreng. 1831. Gen. II. p. 780. n. 4026: g. Byssoideor.

Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 17; 1842. V. p. 12; 1842. Mycol. p. 47: g. Psiloniacear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 76. — Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 45. t. 23; 1851. Linnaea XXIV. p. 120.

Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 116: g. Psiloniaceor.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Menisporeor. ?

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: g. Podosporeor.

= Vermiculariae Tode pars ? (Endl.)

Trichostylae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: ser. 1 Compositar. Trib.; Cichorieae, Vernoniaceae.

Trichostylium Corda 1835 in Sturm Jungerm. p. 116: nov. g. Hepaticinar., Monocleae aff.
Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 475; 1838. IV. p. XXVIII: g. Aneurear.? — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/1. p. 1338; 1841. Ench. p. 27. — Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 835.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Aneuridar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549: g. Frondosar.?
= Aneura Dumort.

Trichostylus Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 145; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 59: sect. Erythraeae.

Trichothalamus Lehm. 1821. Nov. Act. Leop. X. p. 585: nov. g. ex typo Potentillae lignosae.
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4436 *c*: sect. Potentillae.
= Potentilla Linn.

Trichothallae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 99: subordo Ulvacear. Divis.: Oscillarinae, Confervinae.

Trichothallae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: div. Gymnothalamar. Subdivis.: Ectosporeae, Cryptosporeae.

Trichothamnion Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phycol. gener. p. 415; 1845. Phycol. germ. p. 312; 1849. Spec. Alg. p. 800. n. 542: g. Dasyear. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 660 (*Trichothamnium*).
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 157: g. Rhodomelear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Synon. Stichocarpus Harv.; Asperocaulon Grev.; Ellisius Gray pt.

Trichothamnium Bréb. vid. *praeced.*

Trichothecii Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLIV: subsect. Mucedinum. Gen.: Trichothecium, Scolicotrichum.
Fries 1825. Pl. homon p. 181: trib. Mucedinum. Gen.: Campsotrichum, Actinocladium, Chloridium, Scolicotrichum, Macrosporium, Circinotrichum.
Rchb. 1828. Consp. p. 7: subdiv. Mucedineor. Gen. ut Fries 1825 et Chaetopsis.

Trichothecium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 18; 1809 in Schrad. n. Journ. III. p. 18 (*Thrichothecium*); 1816. Berl. Mag. VII. p. 37: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 248. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 337. — Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 426. — Endl. 1836. Gen. n. 221. p. 19; 1841. Ench. p. 14.
Nees 1816. Syst. p. 46; 1815. Überbl. p. 11: g. Sporomycor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Sporotrichor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 550: g. Mucedinear.
Link 1824. Spec. I. p. 28: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 284. (episporor.)
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 538: g. Sporotrichear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 185: g. Trichomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 112 (*Thrichothecium*).

Trichothecium Link cont.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 552. n. 3551; 1831. Gen. II. p. 781. n. 4038: g. Byssoidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Gonosporear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 12; 1838. II. p. 10; 1842. V. p. 9; 1842. Mycol. p. 32: g. Bactridiacear. Subgen. (1838): Anodotrichum, Acrothecium.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 134: g. Bactridiaceor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 86: g. Sporotricheor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 492: g. Trichosporeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cladobotryeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 99: g. Dendrinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 460 (*Tricothecium*): g. Botrydear.
Synon. Diplosporium Link; Macrotrichum Grev.; Cladotrichum Corda; Dimera Fries.

Trichothemelium*) Kunze 1851. Linnaea XXIV. p. 251: subg. Grammitidis. (Trichocalymma parasiticum Zenk.)

Trichotosia**) Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 342. f. 11: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1831. Orchid. p. 131: g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1394. p. 195; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 1993. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.?
Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 183: subg. Eriae.
Lindl. .... Journ. Proc. Linn. soc. III. p. 56: sect. Eriae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 658.

Trichulius „Schmid. Ic. et Anal. pl. ed. sec. I. p. 91" Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 20; 1842. Anl. Mycol. p. 80: g. Physarcor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. — Bonord. 1851. Hdb. p. 213 (Torulaceis analogum).

Tricladia Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 337 (Flora 1843. p. 93): nov. g. Caulerpear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 17. n. 43. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 494. n. 311. — Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 144.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Caulerpidar.

Triclelostylis Nees vid. *Trichelostylis.*

Tricliceras DC. .... Pl. rar. hort. Genev. p. 96.
= Wormskioldia Schum.

Triclinium Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 79.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 251: g. Araliacear.
= Sanicla DC.

*) θεμέλιον, fundamentum.
**) τριχωτός, pilosus.

Triclinium Fée 1824. Crypt. écorç. p. 147. t. 34. f. 1. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 252.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 288: g. Cephalotricheor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Aleurineor. ?
= Hypochnus Fries.

Triclisperma Rafin. 1814. Specch. I. p. 117: nov. g. ex typo Polygalae paucifoliae. (Rafin. in Journ. Phys. LXXXIX. p. 258.
= Chamaebuxus Dill.

Tricocca Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: ordo 47 plant. Gen.: Cambogia, Euphorbia, Dalechampia, Clutia, Andrachne, Phyllanthus, Osyris, Croton, Tragia, Acalypha, Cneorum, Jatropha, Ricinus, Cliffortia, Mercurialis, Hernandia, Sterculia, Carica, Hura.

Tricoccae Morison 1680. Hist. pl. II. lib. 3. sect. 10: ordo 13 plant. herbacear. Gen.: Tithymalus, Ricinus.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 226: class. VIII. plant. Gen.: Euphorbia, Tithymalus, Osyris.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 38 plant. Gen.: Cambogia, Dalechampia, Plukenetia, Euphorbia, Clutia, Andrachne, Phyllanthus, Adelia, Croton, Triallis, Excoecaria, Cupania, Tragia, Acalypha, Jatropha, Ricinus, Hernandia, Guettarda, Sterculia, Hippomane, Hura, Carica, Cliffortia, Mercurialis, Solandra, Cneorum, Buxus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474. Gen. ead. et Xylophylla, Alchornea, Cometes, Cicca, Argythamnia, Nephelium, Agyneia, Aegopricon, Gymnanthes, Siphonia, Sapium, Stillingia, Aleurites?, Acidoton.
Scop. 1777. Intr. p. 238: trib. XXI. plant. Gentes: 1. *Flore perfecto.* Gen.: Cneorum, Cometes, Eraclyssa. 2. *Flore imperfecto.* Gen. §. 1: Sapium, Stillingia, Phyllanthus, Hernandia, Tragia, Omphalea, Argythamnia, Andrachne, Buxus, Cicca; Plukenetia, Acalypha, Hippomane, Jatropa, Tournesolia, Croton, Ricinus, Sterculia, Dalechampia. §. 2: Caturus, Mercurialis, Antidesma, Cissampelos, Begonia, Clutia, Adelia; Euphorbia.
Batsch 1802. Tab. p. 168: fam. unica Cocciferar. Gen.: Mercurialis, Euphorbia, Argythamnia, Cycca, Xylophylla, Phyllanthus, Nymphanthus, Kirganelia, Kiggelaria, Clutia, Andrachne, Agyneja, Buxus, Securinega, Adelia, Mabea, Ricinus, Jatropha, Siphonia, Dryandra, Aleurites, Croton, Acalypha, Cladodes, Phyllaurea, Tridesmis, Carica, Triphaca, Vernicia, Cathetus, Mallotus, Homonoja, Caturus, Commia, Excoecaria; Tragia, Stillingia, Sapium, Hippomane, Aegopricon, Hura, Omphalea, Plukenetia, Dalechampia, Tricarium, Triadica.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 363: fam. 35 plant. Ord.: Euphorbieae, Linozosteae.
Bartl. 1830. Ord. p. 367: class. (58) Gymnoblastor. Ordines: Stackhouseae, Euphorbiaceae, Empetreae, Bruniaceae, Rhamneae, Aquifoliaceae, Pittosporeae, Celastrineae, Hippocrateaceae, Staphylaeaceae.

Tricoccae Morison cont.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 391: class. III. Dicotyledoneor. Fam. ut Bartl.
Endl. 1840. Gen. p. 1105; 1841. Ench. p. 584: class. (56) Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Empetreae, Stackhousiaceae, Euphorbiaceae.
Meisn. 1841. Gen. p. 336. 442 (248): class. 35 Monochlamydear. Ordines ut Endl. et Begoniaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 90: ordo Choristopetalar. Fam.: Celastrineae, Aquifoliaceae, Rhamneae, Euphorbiaceae.

Tricocephalus A. Juss. vid. *Trichocephalus Brongn.*

Tricomaria „Gillies mss." Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 157. t. 101: nov. g. Banisteriae aff. (T. Usillo.)
Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39): g. Banisteriear. — Par. A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 272; 1843. Arch. Mus. III. p. 481. t. 15. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7854.
Endl. 1840. Gen. n. 5584. p. 1063; 1841. Ench. p. 557: g. Notopterygiar.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1587: g. Malpighiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Banisterear.

Tricondylus*) Knight & Salisb. 1809. Prot. p. 121.
= Eulomatia Endl.

Tricoryne R. Brown 1810. Prodr. I. p. 278. Ed. Nees p. 134: nov. g. Asphodelear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 88. n. 1243; 1830. Gen. I. p. 268. n. 1395. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 254. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXIV. 452. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1643. 1151. — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 35.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1382: g. Abamear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Anthericear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1153. p. 149; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1809. — Meisn. 1842. Gen. p. 400 (304). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 612. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Hassk. 1851. Flora p. 481: g. Melanthacear. (opponente Griseb. Jahresber. p. 415.)

Tricostularia „Nees mss." Lehm. 1844. Nov. pl. pugill. oct. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 448.
Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 83: g. Cladiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Cyperacear. dubium.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 904: g. Rhynchosporear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 160.

Tricothecium Math. vid. *Trichothecium Link.*

Tricratus „L'Herit." Willd. 1797. Spec. I. p. 807. n. 295: g. Pentandr. Monogyn.
Schrank 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 81.

---

*) κόνδυλος, articulus.

Tricratus L'Herit. cont.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 378; 1825. Syst. I. p. 536. n. 571: g. Nyctaginear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 110.
Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1842: g. Allioniacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 174: g. Boerhaaviear. = Abronia Juss.

Tricria Fries vid. *Trichia Hall.*

Tricuspidaria*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 64. t. 36; 1798. Syst. p. 112: nov. g. Dodecandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 255.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 94: g. Tiliacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 520: g. Elaeocarpear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5428; 1837. Hdb. p. 304. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 561. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4. — Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372.
Endl. 1840. Gen. n. 5390. p. 1012; 1841. Ench. p. 523: g. Tricuspidariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7941.
Synon. Tricuspis Pers.

Tricuspidarieae Endl. 1840. Gen. p. 1012; 1841. Ench. p. 523: trib. Elaeocarpear. Gen.: Vallea, Tricuspidaria, Crinodendron. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 583 (*Cuspidarieae*).
Rchb. 1841. Nom. p. 209: sect. Elaeocarpear. genuinar. Gen. ead.

Tricuspis Pers. 1807. Ench. II. p. 9. n. 1185: g. Dodecandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 449. n. 1753; 1830. Gen. I. p. 392. n. 1969: g. Elaeocarpear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 21.
= Tricuspidaria Ruiz & Pav.

Tricuspis Palis. 1812. Agrost. p. 77: nov. g. Graminear. (Poa caerulescens Michx.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 256.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. verar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 150: g. Festucacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1025: g. Poacear.
Synon. Tridens Röm. & Schult.; Windsoria Nutt.

Tricycla Cavan. 1801. Icon. VI. p. 78. t. 598 (Anal. cienc. nat. V. p. 63. t. 40): nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. spinosa.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 475.
Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 275; 1806. ibid. VII. p. 481: g. Nyctaginear. *Cf.* Konig Ann. of bot. II. p. 284. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 214. — Hedw. 1806. Gen. p. 108. n. 484. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 380; 1825. Syst. I. p. 536. n. 572; 1830. Gen. I. p. 121. n. 601. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. I. 2. n. 614. — Bartl. 1830. Ord. p. 110. — Endl. 1837. Gen. n. 2007. p. 312; 1841. Ench. p. 193. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 590. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 516.

Tricycla Cavan. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII; 1837. Hdb. p. 174: g. Pisoniear.
Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1849: g. Allioniacear. (1841 in Nom. omissum et [Synon. p. 116] ad Clerodendrum relatum.)
Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230): g. Mirabilear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 507: g. Nyctaginacear.
Choisy 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 436: g. Bougainvillear.

Tricyrtis Wallich 1826. Tent. fl. Nepal. II. p. 61. t. 46: nov. g. intermedium inter Uvulariam et Fritillariam. *Cf.* Schult. Syst. VII. p. 1614.
Endl. 1837. Gen. n. 1081. p. 137; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1713: g. Uvulariear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306).
Kunth 1843. Enum. IV. p. 278: g. Liliaceis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.
Synon. Compsoa Don; Compsanthus Spreng.

Tridactylina DC. 1837. VI. p. 61: sect. Pyrethri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2670 *d.* p. 435; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3069. 4. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. p. 558.

Tridactylina Schultz Bip. 1844. Üb. Tanac. p. 48; . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 245; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 208: g. Euchrysanthemear.

Tridactylites Haworth 1821. Saxifr. enum. p. 21: nov. g. Saxifragear. (Saxifraga tridactylites.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 694; 1828. Consp. p. 159. n. 4203 *a*; 1841. Nom. p. 158. n. 6155. 1: sect. Saxifragae. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 335.
= Dactylites Tausch pt.

Tridaps Comm. ex Endl. Gen. Suppl. IV. p. 67 in synon. Artocarpi: vid. *Iridaps Comm.*

Tridax Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 418; 1737. Coroll. p. 15. n. 979; 1740. Syst. p. 29; 1742. Gen. ed. II. p. 411. n. 797; 1753. Sp. II. p. 900; 1759. Syst. ed. X. p. 1225. n. 872; 1763. Sp. ed. II. p. 1268; 1764. Gen. ed. VI. p. 435. n. 972; 1767. Syst. ed. XII. p. 567: g. Syngenes. Polygam. Superfl. (*Cf.* Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 263.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 647; 1784. Syst. p. 778. — Reich. 1778. Gen. p. 432. n. 1054. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 568. n. 1314. — Gmel. 1791. Syst. p. 1254. — Pers. 1797. Syst. p. 819; 1807. Ench. II. p. 469. n. 1889. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2214. n. 1521.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 257. n. 1064: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.?

---

*) Nomen a petalis tricuspidatis.

*) *θρίδαξ*, lactuca, quare scribendum: *Thridax*. (Beckmann Lex. bot. p. 214.)

Tridax Linn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 190. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 536. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 419.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.
Scop. 1777. Intr. p. 132: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 16. n. 28: g. Actinophytor.
R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. 1. p. 103. (Verm. bot. Schr. II. p. 540.) Injungitur Balbisia.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 561; 1831. Gen. II. p. 629. n. 3130: g. Radiatar.
Less. 1830. Linnaea V. p. 156: g. Coreopsidear.
Less. 1832. Syn. p. 246: g. Galinsogear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3116. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
DC. 1836. Pr. V. p. 679: g. Eugalinsogear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2622. p. 426; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Heleniear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 40.
Synon. Balbisia Willd.; Bartolina Adans.?

Tridens Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 34. 599. n. 306: g. Graminear. (*Tricuspis Palis.*) — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 69.
Link 1821. En. I. p. 89: g. Graminum.
Link 1827. Hort. I. p. 171: g. Glycerinar.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 475: g. Festucear.
= Tricuspis Palis. (Windsoria Nutt.)

Tridens Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 409: sect. Toreniae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 688.

Tridentaria Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 74: nov. g. Torulacear. (T. alba.)

Tridentea Haworth 1812. Syn. succ. p. 34 (Ed. Schrank 1819. p. 36); 1819. Suppl. p. 10: nov. g. Pentandr. Digyn., a Stapelia L. disjunctum.
Schult. 1820. Syst. VI. p. 31 (*Tridentae*): sect. Stapeliae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *g*; 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 4. — Endl. 1838. Gen. n. 3524 *d.* p. 598; 1841. Ench. p. 300. — Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 656.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Stapeliear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 118.

Tridesmeae Rchb. 1837. Handb. p. 308; 1841. Nomencl. p. 211: sect. Vismiear. Gen. Tridesminear. Spach et 1841 subsectio: Carpodonteae.

Tridesmineae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 340. 357; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 351: sect. Desmostemonear., Gen.: Eliaea, Tridesmis, Ancistrolobus, Cratoxylon.

Tridesmis *) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 576. Ed. Willd. p. 706: nov. g. Monoec. Polyandr. (T. hispida et tomentosa.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 565. n. 2092.
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 285: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 194.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 888: g. Linozostear.
= Croton Linn.

Tridesmis Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 358; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 351. t. 6. f. a: nov. g. Tridesminear. (Elodea formosa Jack.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8006: g. Tridesmear.
Endl. 1840. Gen. n. 5471. p. 1035; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406. — Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 18.
Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Carpodontear.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 363: g. Hypericinear.
Synon. Tridesmos Choisy.

Tridesmos Choisy 1824 in DC. Prodr. I. p. 546: sect. Hyperici. (H. biflorum Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5471 c. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 603.
= Tridesmis Spach.

Tridesmus „Lour." Rchb. Consp., Endl. Gen. etc. in synon. Crotonis: vid. *Tridesmis Lour.*

Tridia Korthals 1836 in Hoev. & Vriese Tijdschr. III. p. 17. t. 1: nov. g. Lineis aff. (T. frankenioides.) *Cf.* Isis 1840. p. 364.
Endl. 1840. Gen. n. 5478. p. 1037; 1841. Ench. p. 451: g. Elatinear. (dubium.) — — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6634. — Meisn. 1843. Comm. p. 357.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 481: g. Elatinacear.?

Tridontium Hook. . . . . Ic. pl. rar. III. t. 248.
Endl. 1841. Spl. n. $505/_2$. p. 1345; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 882: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403: g. Muscor. minus cognitum.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 648: g. Pottiacear.

Tridophyllum Necker 1790. Elem. bot. II. p. 93. n. 757: nov. g. Sarcodiphytor., a Spiraea L. disjunctum.
= Potentillae Linn. sp.

Tridynia Rafin. . . . ex Steud. 1841. Nomencl. II. p. 84 (sph. *Tridyra*). 704: nov. g. pro Lysimachia quadrifolia L. et stricta Ait.
Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 348: subsect. Lysimiae. Typi iid.

Tridyra Raf. Steud. Nom. II. p. 84 in synon. Lysimachiae: vid. *praeced.*

Trientaleae Rchb. 1828. Consp. p. 136: subdiv. Ardisiacear. Gen. unicum: Trientalis.
Rchb. 1841. Nom. p. 124: sect. Anagallidear. Gen. id.

Trientalis *) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 20. Ed. Hall. 1745. p. 20: g. pl. class. I.

---

*) τρεῖς, tres; δεσμίς, fasciculus: ob ternos stylorum fasciculos.

*) Nomen a foliorum specie.

Trientalis Rupp. cont.
Linn. 1737. Gen. p. 109. n. 309; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 344; 1759. Syst. ed. X. p. 995. n. 419; 1762. Sp. ed. II. p. 488; 1764. Gen. ed. VI. p. 183. n. 461; 1767. Syst. ed. XII. p. 259. n. 456: g. Heptandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 290; 1784. Syst. p. 352. — Reich. 1778. Gen. p. 185. n. 496. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 244. n. 626. — Gmel. Syst. p. 595. — Pers. 1797. Syst. p. 376; 1805. Ench. I. p. 402. n. 900. — Willd. 1799. Sp. II. p. 282. n. 712; 1809. En. p. 403. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 242. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 1.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 225. n. 932: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Rotacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 229. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 96.
Adans. 1763. Fam. II. p. 231: g. Anagallidum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 116: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 153: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 187: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 227. t. 50. f. 1 (europaea).
Neck. 1790. El. II. p. 36. n. 668: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 288: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 221. — Hedw. 1806. Gen. p. 256. n. 1037. — DC. 1815. Franç. V. p. 382. — Link 1821. En. I. p. 354; 1829. Hdb. I. p. 408. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 301. — Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 282. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Koch 1837. Syn. p. 580. Ed. II. p. 666. — Kunth 1838. Berol. II. p. 133. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343.
Batsch 1802. Tab. p. 208: g. Anagallidear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 409.
Cram. 1803. Disp. p. 77: in Hexandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 389; 1825. Syst. II. p. 166. n. 1392; 1830. I. p. 295. n. 1521: g. Primulear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1224. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 59. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 24.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX: g. Lysimachiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4208. p. 732; 1841. Ench. p. 356. — Meisn. 1839. Gen. p. 255 (164). — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 465.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3597; 1841. Nom. p. 124. n. 4834: g. Trientalear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Ardisiacear.
Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 346: g. Anagalleidar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.

Trifoliastrum Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 26. t. 25: g. pl. class. X.
= Trifolii Linn. pars.

Trifoliastrum Mönch 1794. Meth. p. 123: nov. g. Thalamostemonis. (Trifol. Melil. coerul. L.)
= Grammocarpus Ser.

Trifoliastrum Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 598: sect. Trifolii. (T. repens L.) — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 198. — Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 2869 *f*; 1832. Fl. exc. p. 496; 1841. Nom. p. 147. n. 5694. 4. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 187. — Koch 1836. Syn. p. 172. Ed. II. p. 190. — Kunth 1838. Berol. I. p. 230. — Endl. 1840. Gen. n. 6511 *f*. p. 1268; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 552. — Webb 1846. Canar. II. p. 74.
Synon. Amoria et Micranthemum Presl; Brachydontium Rchb. pt.

Trifoliatae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 597: sect. Leguminosar. Gen.: Trifolium, Melilotus, Medicago, Trigonella, Lotus, Glycyrrhiza.

Trifolieae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 132: subtrib. Curvembryar. diadelphar. Gen.: Trifolium, Melilotos, Trigonella, Medicago, Tetragonolobus, Lotus, Dorycnium.
DC. 1825. Pr. II. p. 171: subtrib. Lotear. Gen.: Medicago, Trigonella, Pocockia, Melilotus, Trifolium, Dorycnium, Lotus, Tetragonolobus, Cyamopsis. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVI. Gen. ead. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. Gen. fere ead. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 96. 167. Gen. ut DC. et Hymenocarpus, Acropodium, Hosackia, Carmichaelia. — Koch 1836. Syn. p. 159. Ed. II. p. 175. Gen.: Medicago, Trigonella, Melilotus, Trifolium, Dorycnium, Bonjeania, Lotus, Tetragonolobus. — Meisn. 1837. Gen. p. 85 (60). Gen. ut DC. et Podolotus, Hemispadon, Xerocarpus, Bonjeania, Syrmatium, Hosackia, Leobordea. — Endl. 1840. Gen. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. Gen. ut DC. (exclusa Cyamopside) et Dorycnopsis, Bonjeania, Hosackia, Syrmatium, Parochetus, Podolotus, Melinospermum. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. Gen.: Dorycnium, Dorycnopsis, Lotus, Tetragonolobus, Bonjeania, Trifolium, Melilotus, Pocockia, Trigonella, Medicago, Botryolotus, Meristotropis, Hymenocarpus, Cornicina, Physanthyllis, Anthyllis, Cytisopis, Ononis, Hosackia, Drepanolobus, Parochetus, Podolotus, Goodia? — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 269. Gen. ut Endl. et Diploprion?
Rchb. 1828. Consp. p. 148; 1832. Fl. exc. p. 490: subdiv. Lotear. Gen. ut DC. et Acropodium. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 409. Gen. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. 216. Gen. ead.

Trifolieae Rchb. 1837. Handb. p. 226; 1841. Nomencl. p. 147: subdiv. Lotear. Sect.: *genuinae* (gen.: Trifolium), Trigonelleae, Galegeae.

Trifolium Tourn. 1700. Inst. p. 404. t. 228: g. class. X, ab auctoribus varie circumscriptum.

Trifolium Tourn. cont.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 246. Ed. Hall. 1745. p. 254: g. pl. class. XI. Sejunguntur Lagopus et Lupulinum.
Linn. 1737. Gen. p. 229. n. 603; 1737. Cliff. p. 372; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 222; 1753. Sp. II. p. 764; 1759. Syst. ed. X. p. 1176. n. 802; 1763. Sp. ed. II. p. 1077; 1764. Gen. ed. VI. p. 387. n. 896; 1767. Syst. ed. XII. p. 501: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 78. — Murr. 1774. Syst. p. 571; 1784. Syst. p. 687. — Reich. 1778. Gen. p. 384. n. 968. — Lour. 1790. Coch. II. p. 444. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 509. n. 1211. — Gmel. 1791. Syst. p. 1140. — Pers. 1797. Syst. p. 425; 1807. Ench. II. p. 348. n. 1750. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1352. n. 1383; 1809. En. p. 790. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 106. — Elliott 1822. Sketch II. p. 200. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 388.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 580: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 19. — Scop. 1777. Intr. p. 303. — Juss. 1789. Gen. p. 355. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 398. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 220. — DC. 1805. Franç. IV. p. 519; 1815. V. p. 554. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 762; 1826. Syst. III. p. 208. n. 2527; 1831. Gen. II. p. 576. n. 2815. — Link 1822. En. II. p. 260. — Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 151 (*Trèfle*). — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 433. 571. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 255.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 135. n. 566: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 111.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 404. Sect.: Meliloti, Lotoidea, Lagopoda, Lupulina, Vesicaria. — Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 501. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 126. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 465.
Adans. 1763. Fam. II. p. 322: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 302: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 489: g. Papilionatar.
Neck. 1790. El. III. p. 7. n. 1302: g. Cyteophytor. Distinguitur Melilotus.
Rebent. 1804. Neom. p. 195: g. Decandr. Monogyn.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 597: g. Trifoliatar. Sect.: Trifoliastrum, Trifolium (pratense), Lagopodium, Lupulinum.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Trifoliear. — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 189. Sect.: Lagopus, Phleastrum, Eutriphyllum, Trifoliastrum, Vesicastrum, Lupinaster, Chronosemium. — Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3869. Sect. eaed. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 490. Sect.: Trifolium, Lotophyllum. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 179. Sect. ut Ser. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 223. Sect.: vera, Lotophylla. — Koch 1836. Syn. p. 167. Ed. II. p. 184. Sect.: Lagopus, Trichocephalum, Fragifera, Lupinaster, Trifoliastrum, Chronosemium. — Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61). — Rchb. 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 147. n. 5694. (genuinar.) Sect.: Calycomorphum, Vesicastrum, Paramesus, Trifoliastrum, Trifolium, Lupinaster. — Kunth 1838. Berol. I. p. 227. Sect. ex Koch. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 312. Sect.: Trifolium, Involucrarium, Chasmalobus. — Endl. 1840. Gen. n. 6511. p. 1268; 1841. Ench. p. 668. Sect.: Lagopus, Calycomorphum, Fragifera, Vesicastrum, Lupinaster, Trifoliastrum, Chronosemium, Paramesus. — Trautv. 1842. Flora II. Beibl. p. 121. Char. emend. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 539. Sect. ex Endl. — Walp. 1842. Rep. I. p. 639; 1843. II. p. 850; 1846. V. p. 512. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 19. Sect.: Lagopus, Paramesus, Lotoides, Calycomorphe, Fragifera, Vesicastrum, Lupulina. — Webb 1846. Canar. II. p. 68. Sect.: Lagopus, Trifoliastrum, Trichocephalum, Fragifera, Vesicastrum, Lupulinus. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 403. Sect.: Eutriphyllum, Lagopodium, Calycomorphum, Galearia, Mystyllus, Paramesus, Lotoides, Chronosemium. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 638 (*Trèfle*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 319. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 474.
Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. Novum subg.: Perisaema.
Synon. Trifoliastrum Mich.; Lagopus et Lupulinum Rupp.; Eutrifolium et Chasmalobus Nutt.

Trifolium Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 226. t. 106. f. 2.
= Stylosanthes Swartz.

Trifolium Presl 1830. Symb. I. p. 48: g. emissis Parameso, Amareno, Lupinastro, Amoria, Micrantheo, Mistyllo, Galearia et Calycomorpho restrict. *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 11, et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 364.
Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. austr. II. p. 223: g. Trifoliear.
= Lagopus Koch.

Trifolium Rchb. 1832. Fl. exc. p. 490: sect. Trifolii. Subsect.: Vesicastrum, Brachydontium, Phleastrum, Lagopodium, Lupinaster, Trifoliastrum.

Trifurcaria Herbert .... Bot. Mag. n. 3779 ex Endl. Gen. p. 1359.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
= Cypella Herb.?

Trifurcaria G. Don vid. *seq.*

Trifurcarium DC. 1828. Prodr. III. p. 138: sect. Arthrostemmatis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4595 *d.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 757 (*Trifurcaria*). — Endl. 1840. Gen. n. 6211 *d.* p. 1213; 1841. Ench. p. 646.

Trifurcia „Herb." Meisn. Comm. p. 294.
Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1566: g. Iridear. genuinar.
Synon. Trifurcaria Herb., Endl.

Trigemma „Salisb." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 655: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d.* 28. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4. b.

Trigenea Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 54; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 181: nov. g. Rhodomelear. (T. australis.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XII. p. 667: g. Floridear. dubiae affinitatis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 841. n. 549: g. Polysiphoniear., an Callithamniear.?

Triglochia Rchb. Consp. p. 63: vid. *Triglochin Linn.*

Triglochim Rupp. 1718. Fl. jen. p. 54. 366: g. pl. class. III.
= Triglochin Linn.

Triglochin *) Linn. 1737. Gen. p. 106. n. 302; 1740. Syst. p. 22; 1742. Vet. Ac. Handl. p. 146; 1753. Sp. I. p. 338; 1759. Syst. ed. X. p. 991. n. 409; 1762. Sp. ed. II. p. 482; 1764. Gen. ed. VI. p. 179. n. 453; 1767. Syst. ed. XII. p. 256. n. 448: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 264. — Murr. 1774. Syst. p. 286; 1784. Syst. p. 348. — Reich. 1778. Gen. p. 181. n. 488. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 239. n. 616. — Gmel. 1791. Syst. p. 587. — Pers. 1797. Syst. p. 370; 1805. Ench. I. p. 396. n. 879. — Willd. 1799. Sp. II. p. 264. n. 702; 1809. En. p. 400. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 346. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 237. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 470. 598.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 258: g. Graminibus adfine.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 59: g. pl. class. III.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 72: g. Lilior.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 68. n. 284: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 47.
Adans. 1763. Fam. II. p. 471: g. Arorum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tripetaloidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 167. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 226.
Hill 1769. Ht. kew. p. 161: g. Tripetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462: g. Liliatar.
Scop. 1777. Intr. p. 82: g. Liliacear. — Par. Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 17.
Neck. 1790. El. III. p. 193. n. 1557: g. Gonoophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 26. t. 84.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 160: g. Alismoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 152: g. Juncear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 190; 1825. Syst. II. p. 145. n. 1366. — Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 489 (*Troscart*). — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 61.

Triglochin Linn. cont.
Cram. 1803. Disp. p. 80 in Hexandr. Hexagyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 114: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 253. n. 1027.
DC. 1805. Franç. III. p. 191: g. Alismacear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 343. Ed. Nees p. 199. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1213. — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 53.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 267: g. Potamogetear.
Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365: g. Juncaginear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 244. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 219. — Kunth 1822. Syn. I. p. 258; 1838. Berol. II. p. 291; 1841. Enum. III. p. 142. — Bartl. 1830. Ord. p. 73. — Schult. 1830. Syst. VII. p. CIV. 1582. — Koch 1837. Syn. p. 671. Ed. II. p. 773. — Endl. 1837. Gen. n. 1039. p. 127; 1841. Ench. p. 72. — Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 10. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 103. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 707 (*Troscart*). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 35. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 309.
Link 1821. En. I. p. 347: g. Alisminar.
Agdh. 1822. Aphor. p. 126: g. Juncaginum. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 113.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1288 (*Triglochia*); 1830. Fl. exc. p. 96: g. Triglochinar.
Link 1829. Hdb. I. p. 145: g. Melanthacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Triglochinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 290. n. 1504: g. Alismear.
Rchb. 1841. Nom p. 33. n. 1139: g. Scheuchzeriear. Sect.: Tristemon, Triglochin.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 210: g. Juncaginacear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 235: g. Naiadacear.
Synon. Juncago Tourn.; Triglochim Rupp.; Tristemon Rafin.

Triglochinae Rchb. 1828. Consp. p. 63; 1830. Fl. exc. p. 96: div. Juncacear. Gen.: Triglochin, Tetroncium?
Rchb. 1837. Hdb. p. 144: subdiv. Alismear.

Triglochineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Veratrariear. Gen.: Triglochin, Scheuchzeria.

Triglossae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 248: sect. 7 Graminear. Gen.: Ludolfia.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 520; sect. Bambusear. Gen.: Orthocladia, Arundinaria, Merostachys.

Triglossum Fisch. 1812. Catal. Gorenk. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 289.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 55. 846. n. 389: g. Graminear. (T. bambusinum.)
= Arundinaria Rich.

Triglyphium Fresen. 1852. Beitr. z. Mykol. II. 2 (Flora 1854. p. 696): g. Fungor.

*) γλωχίν, cuspis teli.

Trigonea Parlatore 1839. (Occhio) Novello gen. della fam. delle Liliacee: nov. g. Liliacear.
= Nectaroscordium Lindl. (teste ipso Parlat. Pl. nov.)

Trigonella*) Linn. 1737. Gen. p. 351. n. 880; 1737. Cliff. p. 378; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 229; 1753. Sp. II. p. 776; 1759. Syst. ed. X. p. 1179. n. 804; 1763. Sp. ed. II. p. 1093; 1764. Gen. ed. VI. p. 388. n. 898; 1767. Syst. ed. XII. p. 505: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 576; 1784. Syst. p. 692. — Reich. 1778. Gen. p. 385. n. 970. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 510. n. 1213. — Gmel. 1791. Syst. p. 1145. — Pers. 1797. Syst. p. 731; 1807. Ench. II. p. 355. n. 1755. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1398. n. 1386; 1809. En. p. 799. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 120. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 389.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 135. n. 563: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 24. — Scop. 1777. Intr. p. 304. — Juss. 1789. Gen. p. 356. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 400. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 222. — DC. 1805. Franç. IV. p. 549; 1815. V. p. 570. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 756; 1826. Syst. III. p. 282. n. 2584; 1831. Gen. II. p. 591. n. 2911. — Link 1822. En. II. p. 266. — Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 290. — — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 434. 616. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 252.
Hill 1769. Ht. kew. p. 304: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 7. n. 1301: g. Cyteophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 332. t. 152.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 606: g. Trifoliatar.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Trifoliear. — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 181. Sect.: Grammocarpus, Foenumgraecum, Buceras, Falcatula. — Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3872 (sect. eaed.); 1832. Fl. exc. p. 500. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 173. Sect. ut Ser. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 220. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 195. — Koch 1836. Syn. p. 165. Ed. II. p. 181. Sect. ut Ser. (excepto Grammocarpo.) — Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61). — Endl. 1840. Gen. n. 6508. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. Sect. ut Ser. — Trautv. 1842. Flora II. Beibl. p. 124. Char. emend. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 530. Sect. ut Ser. — Walp. 1842. Rep. I. p. 636; 1843. II. p. 847. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 39. Sect. ex Ser. — Webb 1846. Canar. II. p. 66. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 397. Sect.: Foenum-graecum, Buceras. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 319.
Link 1831. Hdb. II. p. 163: g. Lotoidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 147. n. 5698: g. Trigonellear. Sect.: Falcatula, Buceras, Trigonella, Grammocarpus.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 669: g. Lotear.
Synon. Foenum graecum Tourn.; Fenugraecum et Kentia Adans.

Trigonelleae Rchb. 1837. Handb. p. 226: sect. Trifoliear. Gen.: Trifoliear. Rchb. 1828 (excepto Trifolio) et Lotophyllum, Bonjeania. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 147. Gen. ead. (exceptis Acropodio et Cyamopside) et Dorycnopsis, Hosackia, Syrmatium, Parochetus, Podolotus, Melinospermum.

Trigonelloides Jaub & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 50: sect. Argyrolobii. (A. trigonelloides Jaub. & Sp.)

Trigonia Aublet 1775. Guian. I. p. 387. t. 149. 150: nov. g. Decandr. Monogyn. (T. villosa et laevis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 673. — Pers. 1805. Ench. I. p. 467. n. 1057.
Scop. 1777. Intr. p. 292: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 253: g. Malpighiis aff.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 493. n. 1178: g. Diadelph. Decandr. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 921. n. 1328.
Vahl 1798. Eclog. II. p. 52. Char. emend.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 21: g. Malpighiaceis aff.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 773; 1826. Syst. III. p. 328. n. 2608; 1831. Gen. II. p. 596. n. 2945: g. Leguminosar. (anomalar.)
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 141: g. Hippocrateacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 172. — DC. 1824. Pr. I. p. 571. (spuriar.) — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 112. t. 105. — Bartl. 1830. Ord. p. 380. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 629. (spuriar.) — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 399. (?) — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40)?
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5387: g. Hippocratear.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 298: g. Malpighiacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20): g. Polygalear.? — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 240.
Rchb. 1837. Hdb. p. 302; 1841. Nom. p. 208. n. 7910: g. Trigoniear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 87.
Endl. 1840. Gen. n. 5659. p. 1080; 1841. Ench. p. 571: g. Trigoniacear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 248; 1843. II. p. 769. — Griseb. 1849. Linnaea XVII. p. 28.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378: g. Polygalacear.
Synon. Höffnagelia Neck.; Mainea Fl. Flum.

*) Nomen a corolla trigona, (Linn. Phil, bot, p. 166,)

Trigoniaceae Martius 1835. Consp. p....: fam. Malpighinar.
Endl. 1840. Gen. p. 1080; 1841. Ench. p. 570: fam. Polygaleis aff. Gen.: Trigonia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 670: fam. Sapindaceis aff. Gen. id.
Griseb. 1849. Linnaea XXII. p. 27: fam. inter Polygaleas et Euphorbiaceas media. Gen. id.

Trigonidium Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1923: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1406. p. 197; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2008. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Schiede 1840. Bot. Regist. App. p. 58.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Trigonieae Rchb. 1837. Handb. p. 302; 1841. Nomencl. p. 208: subdiv. Hippocratear. Gen.: Trigonia, Lacepedea.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 87: appendix Sapindacear. Gen.: Trigonia.

Trigonis*) Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 102: nov. g. Octandr. Monogyn. (T. tomentosa.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 610.
Juss. 1789. Gen. p. 248: g. Sapindor.
St. Hil 1805. Expos. II. p. 12: g. Saponacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 613: sect. Cupaniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5212 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 667.
= Cupaniae Plum. pars.

Trigonocapsa Blume 1831. Flora II. p. 491: sect. Sonerilae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 775. — Endl. 1840. Gen. n. 6192 *b*. p. 1210; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6700. 2 (*Trigonocarpa*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 123.

Trigonocarpa Rchb. vid. *praeced.*

Trigonocarpaea Steud. 1841. Nomencl. II. p. 710: novum nomen pro *Trigonocarpo Wall.* (nec Alior.) propositum.

Trigonocarpum Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 137; 1828. Prodr. p. 137: g. Monocotyledonar. foss.
Endl. 1837. Gen. n. 1653. p. 229; 1841. Ench. p. 123: g. Scitaminear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. p. 173; 1846. Chlor. prot. p. LXVIII.

Trigonocarpus Fl. Flum. IV. t. 15 (racemosus) ex Steud. Nom. II. p. 710.
= Cupania Plum.

Trigonocarpus Bertero mss.
= Chorizanthe R. Brown.

Trigonocarpus Wallich 1831. Catal. n. 6520: g. Bignoniacear. (non descriptum). — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677 (dubium).
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123: g. Bignoniear. (Nomen.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4575. (?)
Synon. Trigonocarpaea Steud.

*) „Nomen ob petala inversum triangulum isosceles formantia."

Trigonocystis Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 352.
= Phycastrum Kütz.

Trigonophyllum Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 89: sect. Saxifragae. (S. Vandellii Sternb.)
= Aizoniae Tausch pars.

Trigonopterum Steetz .... in Anders. om Galap. Öarnes veg. p. 183: nov. g. Macraeae proximum. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 218 inter Heliopsideas.

Trigonosciadium Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 344: nov. g. Peucedanear. (T. tuberosum.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 895. — Endl. 1850. Spl. V. p. 10. n. 4478/2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Trigonospermum Lessing 1832. Syn. Compos. p. 244; 1834. Linnaea IX. p. 267: nov. g. Millleriear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 508. — Endl. 1838. Gen. n. 2467. p. 400; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3008. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Trigonostemon Blume 1828. Fl. jav. Prael. p. VIII, antea *Trigostemon*: g. Crotonear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 898 (*Trigonostemum*). — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5835. p. 1118; 1841. Ench. p. 588. — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7391. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (254): g. Jatrophear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 340: g. Jatrophidear.

Trigonostemum Wittst. vid. *praeced.*

Trigonotheca Hochstett. 1841. Flora II. p. 662: nov. g. Hippocrateacear. (*Cf.* Bernh. 1846. Allg. Thür. Gartenz. Nr. 25.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 86. n. 5700/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 347. — Walp. 1846. Rep. V. p. 146. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 585.
= Catha Forsk.

Trigonotis Steven 1851. Bull. soc. Mosc. Nr. 2. p. 603: nov. g. Asperifoliar. (Eritrichium pedunculare et radicans.)
Synon. Myosotidis sect. Endogonia Turcz.

Trigostemon Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 600: nov. g. Crotonear.
= Trigonostemon Blume.

Triguera *) Cavan. 1785. Diss. I. p. 41. t. 11: g. Sidae aff. (T. acerifolia.)
Cram. 1803. Disp. p. 149: g. Monadelph. Pentandr.
= Laguna Cavan.

Triguera Cavan. 1786. Diss. II. App. I. p. 1: nov. g. Solanacear. (T. ambrosiaca et inodora.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 218. n. 500. — Bartl. 1830. Ord. p. 194. (desc.) — Endl. 1839. Gen. n. 3874. p. 668; 1841. Ench. p. 332 (dubium). — Walp. 1845. Rep. III. p. 124. 956.

*) Dicat. dom. Candido Mariae de Trigueros, botanico et poëtae.

Triguera Cavan. cont.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 114. n. 282: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 338. — Willd. 1797. Sp. I. p. 839. n. 319.
Juss. 1789. Gen. p. 125; 1827. Dict. v. 49. p. 408: g. Solanear. (sect. 2.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 287. — Hedw. 1806. Gen. p. 127. n. 557. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 457; 1825. Syst. I. p. 661. n. 715; 1830. Gen. I. p. 139. n. 694. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LVI. 698. n. 838. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 308. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 637. — Miers 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 65; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179. Char. emend.
Gis. 1792. Prael. p. 384: g. Luridar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 196.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3277: g. Nolanear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 480: g. Nolaniear.
Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183): g. Daturear.?
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 174: g. Solanaceum anomalum.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 21: g. Triguerear.

Triguereae Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 21: subtrib. Solanear. Gen.: Triguera.

Trigula „Noronha mss." Leman 1828. Dict. v. 55. p. 309: g. Rubiacear., a DC. 1818. Syst. I. p. 151 et 1824. Pr. I. p. 6 ad Clematidem Noronhianam relatum.

Trigynaea Schlechtend. 1834. Linnaea IX. p. 328: nov. g. Anonacear. (imperfecte cognitum.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 497. — Endl. 1839. Gen. n. 4627. p. 834; 1841. Ench. p. 423 (*Trigynea*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7321 (*Trigyneia*): g. Uvariear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 308: g. Anonear.
= Uvaria Linn.

Trigynea Endl. vid. *praeced.*

Trigyneia Rchb. vid. *praeced.*

Trihilatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: ordo 50 plant. Gen.: Cardiospermum, Paullinia, Sapindus, Staphylaea, Malpighia, Bannisteria, Begonia, Acer, Triopteris, Aesculus, Berberis?
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 23 plant. Gen. §. 1: Melia, Trichilia. §. 2: Malpighia, Banisteria, Triopteris, Acer, Aesculus. §. 3: Staphylea, Sapindus, Paullinia, Cardiospermum, Tropaeolum. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 357. Gen. ead. et ad §. 1: Guarea, Turraea, Leea, Ticorea, Sandoricum, Strigilia, Portesia, Quivisia, ad §. 2: Hiraea, Tetrapteris, Molina, Flabellaria, Swietenia.
Batsch 1802. Tab. p. 51: fam. Adonariar. Gen.: Aesculus, Tropaeolum, Malpighia, Gärtnera, Triopteris, Banisteria, Acer, Trigonia, Erythroxylon, Elaeocarpus, Hippocratea, Thryallis, Bembyx, Rhizobolus, Cupania, Enurea, Ephielis, Cossignia, Molinaea, Ponaea, Melicocca, Scytalia, Ornitrophe, Schmiedelia, Aporetica, Dodonaea, Sapindus, Paullinia, Cardiospermum.
Agardh 1825. Class. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: class. Phanerocotyledonear. completar. discigynar. polypetalar. Ord.: Tropaeoleae, Hippocastaneae, Hippocrateaceae, Erythroxyleae, Malpighiaceae, Acerinae, Rhamnoideae, Rhizoboleae, Meliaceae, Sapindaceae, Terebinthaceae.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Thalamopetalar. Fam. 283—291.

Trikalis Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 47.
= Suaeda Forsk.

Trilepis Nees .1834. Linnaea IX. p. 305; 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 267; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 197: nov. g. Elynear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 960. p. 111; 1841. Ench. p. 63. Sect.: Dilepis, Trilepis. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1441. Sect. eaed. — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Kunth 1837. Cyper. p. 534: g. Caricinear.
Steud. 1855. Glum. II. p. 246: g. Caricinar.

Trilepis Endl. 1837. Gen. n. 960 *b*. p. 111; 1841. Ench. p. 63: sect. Trilepidis. (*Synon. Fintelmannia Kunth.*) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1441. 2. .

Trilepisium Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 74 in Römer Collect. bot. p. 212 (*Trilepsium*): nov. g. Rosacear. (p. 217 *Trilepisium* in Icosandr. Monogyn.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 309 et Steud. Nomencl. ed. I (*Trilipsium*).
DC. 1825. Pr. II. p. 639: g. Rosaceis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4474: g. Rosacear.? minus cognitum.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 481: g. Chrysobalanear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 101 (72). — Endl. 1840. Gen. n. 6416. p. 1253; 1841. Ench. p. 664. — Rchb. 1841. Nom. p. 178. n. 6883 (dubium). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 124.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 543: g. Chrysobalanacear.?

Trilipsium Steud. olim (Nomencl. ed. I?) ex Steud. Nom. II. p. 710: vid. *praeced.*

Trilisa*) Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 140: subg. Liatridis. (L. odoratissima W.)
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 10: g. Eupatoriear.
Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 228; 1828. v. 55. p. 310; 1830. v. 60. p. 586: g. Liatridear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2239: g. Eu-

*) Anagramma nominis Liatris.

Trilisa Cassini cont.
patorinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
DC. 1836. Pr. V. p. 131: sect. Liatridis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2260 c. p. 368; 1841. Ench. p. 233. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 76. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3839. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 551.

Trilix Linn. 1771. Mant. II. p. 153. n. 1313: g. Polyandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 311. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 405; 1784. Syst. p. 487. — Reich. 1778. Gen. p. 265. n. 697. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 347. n. 873. — Gmel. 1791. Syst. p. 805. — Pers. 1797. Syst. p. 521; 1807. Ench. II. p. 72. n. 1303. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1129. n. 1008. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 374. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 422. n. 2098. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 220.
Scop. 1777. Intr. p. 268: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 435: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 265. n. 1017: g. Catizophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 868: g. Rosaceis aff.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 568. n. 1884: g. Rosacear. ?
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5461; 1841. Nom. p. 209. n. 7950: g. Tiliear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 38 (28)?
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4: g. Tiliaceis aff.
Endl. 1840. Gen. n. 5381. p. 1010; 1841. Ench. p. 523: g. Grewiear.
Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 215 genus a Prockia non diversum declarat. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 108.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Prockear. (et p. 372 Grewidar.)
Synon. Jacquinia Mutis.

Trilliaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 218: ordo Dictyogenar. Gen.: Paris, Demidovia, Trillium, Medeola?

Trillidium Kunth 1850 in Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 31: nov. g. Smilacinear. (Trillium Govianum Wall.)
Kunth 1850. Enum. V. p. 120: g. Paridear.

Trillium*) „Mill." Linn. 1753. Sp. I. p. 339; 1759. Syst. ed. X. p. 992. n. 412; 1762. Sp. ed. II. p. 484; 1764. Gen. ed. VI. p. 180. n. 456; 1767. Syst. ed. XII. p. 256. n. 451: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 287; 1784. Syst. p. 349. — Reich. 1778. Gen. p. 182. n. 491. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 240. n. 620. — Pers. 1797. Syst. p. 371; 1805. Ench. I. p. 398. n. 885. — Willd. 1799. Sp. II. p. 271. n. 706; 1809. En. p. 401. — Elliott 1817. Sketch I. p. 426. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 239 (sph. *Trillum*).
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor.

Trillium Mill. cont.
Gled. 1764. Syst. p. 68. n. 283: g. Thalamostemonum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 149. n. 1376; 1830. Gen. I. p. 290. n. 1503. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XCV. 1497. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1212.
Hill 1769. Ht. kew. p. 161: g. Tripetalar.
Juss. 1789. Gen. p. 42: g. Asparagor.
Neck. 1790. El. III. p. 195. n. 1562: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 144: g. Asparagoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 134: g. Melanojor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 104: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 253. n. 1026. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 222. — Agdh. 1823. Aphor. p. 161. — Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1317.
Rafin. 1820. Journ. Phys. XCI. p. 72. Sejunguntur Phyllantherum et Delostylis.
Link 1821. En. I. p. 349: g. Asparaginar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64: g. Melanojar.
Poir. 1825. Dict. v. 37. p. 547 (*Parisiole*): g. Asparaginear.
Link 1829. Hdb. I. p. 277: g. Paridear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1177. p. 153; 1841. Ench. p. 88. — Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1725. — Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 37; 1850. Enum. V. p. 121. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 227. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 676. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 121.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 18: g. Asparagear.
Lindl. 1847. Veg. kd. g. 218: g. Trilliacear.
Synon. Phyllantherum et Delostylis Rafin.; Irillium Rafin. (Steud.)

Trillum Nuttall vid. *praeced.*

Trilophopteris Griseb. 1849. Linnaea XXII. p. 24: sect. Hiraeae. (Mascagniae §. 2 A. Juss.)

Trilophus Fischer mss.
= Menispermum Tourn.

Trilophus Meisn. Comm. p. 291 in synon. Kämpferiae et Lindl.: vid. *Tritophus Lestib.*

Trilopus Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 219: nov. g. (Tetrandr. Digyn.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 381: g. Tiliar.
= Hamamelis Linn. (Linn. Amoen. ac. III. p. 9.)

Trimatium Fröhl. mss.
= Coscinodon Spreng.

Trimatopteris*) Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 291: sect. Psaronii.

---

*) Sic dictum, quoniam omnes species habent folia terna.

*) *τρίμμα*, tritum.

Trimeranthes Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 115: subg. Sigesbeckiae.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 237; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 496: sect. Siegesbeckiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2451 *b*. p. 398; 1841. Ench. p. 237. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3101. 1.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22: g. Milleriear.
Synon. Schkuhria Mönch.

Trimeria Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 417: nov. g. Homalinear. (T. trinervis.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 5089/$_1$. p. 1421; 1841. Ench. p. 481; 1850. Spl. V. p. 48. n. 5901/$_1$ (dubium). — Meisn. 1843. Comm. p. 349.
Rchb. 1841. Nom. p. 177. n. 6870: g. Acomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 743: g. Homaliacear.

Trimeris *) Presl 1836. Pr. mon. Lobel. p. 46: nov. g. Delisseacear. (T. oblongifolia.) — Par. Endl. 1838. Gen. p. 513. n. 3070. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148).
Rchb. 1837. Hdb. p. 186: g. Delisseear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 357: sect. Lobeliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3987. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 706.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572: g. Delissear.
Endl. 1841. Ench. p. 263. n. 3057/$_2$: g. Lobeliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.

Trimerisma **) Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 503: nov. g. Saxifragacear. (Weinmannia trifoliata Thunb.)
= Platylophus Don.

Trimeriza ***) Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. adnot. ad t. 1543: nov. g. Aristolochiar. (T. piperina.) — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 711 (*Trimerizia*).
Endl. 1838. Gen. p. 345. n. 2166: g. Aristolochiear. minus notum.
Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2580. 1: sect. Bragantiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 794: g. Aristolochiacear.
= Bragantia Lour.

Trimeriza „Salisb. Hort. Trans. I. 280" Endl. Gen. p. 165 in synon. Cipurae: vid. *Trimeza Salisb.*

Trimerizia Steud. vid. *Trimeriza Lindl.*

Trimetra „Moç. Fl. mex. ined." DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 262: g. Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3032/$_8$. p. 1390; 1841. Ench. p. 251. — Walp. 1843. Rep. II. p. 702 (*Trinetra*).
Meisn. 1839. Gen. p. 182 (125): g. Ecliptear.? [et p. 201 (131) Heliopsidear.?] — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3094.

Trimeza Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 308: nov. g. Iridear. (Iris martinicensis L.) An *Trimeriza* in editione prima?
= Cipurae Aubl. pars.

*) μερίς, pars.
**) μέρισμα, pars.
***) μερίζω, divido, distribuo.

Trimezia „Herb." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 161: g. Iridacear.

Trimmatospora Lév. vid. *seq.*

Trimmatostroma Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 9. t. 2. f. 148: nov. g. Phragmotrichiacear. (T. Salicis.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 44: g. Torulaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 5; 1842. Mycol. p. 21: g. Septonemear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 496 (*Trimmatospora*): g. Septonemeor.

Trimorpha Cassini 1816. Dict. v. 3. spl. p. 65; 1817. Bull. soc. philom. Sept. p. 137: nov. g. Asterear. (Erigeron acre L.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 466: g. Corymbiferar.
= Trimorphaea Cass.

Trimorphaea Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 462; 1828. v. 55. p. 323; 1830. v. 60. p. 582: g. Erigerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2545.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1466; 1831. Fl. exc. p. 239; 1841. Nom. p. 84. n. 3263. 2: sect. Erigerontis. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 290. — Endl. 1838. Gen. n. 2332 *b*. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 311.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Synon. Trimorpha Cass.

Trimundia Endl. 1840. Gen. n. 5651 *b*. p. 1079; 1841. Ench. p. 568: sect. Mundiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6784. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 245.

Trinacrium Riess 1852 in Fresen. Beitr. z. Mykol. H. 2. (Flora 1854. p. 696): nov. g. Fungor.

Trinacte Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 415: nov. g. Tubulosar. (Jungia ferruginea L.)
= Jungia Linn. f.

Trinax D. Dietr. ex Steud. Nom. II. p. 682. 711.
= Thrinax Swartz.

Trinchinettia *) Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1383. n. 2605/$_1$; 1841. Ench. p. 240: g. Euheleniear. (*Schomburghia DC.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3199: g. Heleniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
= Geissopappus Benth.

Trinciatella Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
= Hyoseris Linn.

Trinetra Walp. vid. *Trimetra Moç.*

Trineuria Presl 1846. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 560: nov. g. ab Aspalatho sejunctum. (A. linarifolia DC.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 215: g. Genistear.

Trineuron Hook. f. 1845. Antarct. voy. p. 23; 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 130: nov. g. Compositar., Scleroleimae et Abrotanellae aff. (T. pusillum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Hippiear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 226.

*) Dicat. Trinchinetti, Milanensi.

Trinia*) Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 92: nov. g. Umbelliferar. (Pimpinella dioica.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 327. — Par. Link 1821. En. I. p. 285. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 512. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.

MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 244: g. Pentandr. Digyn.

Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 126; 1836. Syn. p. 283. Ed. II. p. 311: g. Amminear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 399. — Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3724; 1832. Fl. exc. p. 473; 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5380. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 356; 1845. Ross. II. p. 243. — DC. 1830. Pr. IV. p. 103. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 281. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4396. p. 769; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 941. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Brongn. 1843. En. genr. p. 111. — Walp. 1842. Rep. II. p. 392. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 737.

Gaud. 1828. Helv. II. p. 22. 411: g. Umbellatar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Pimpinellear.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 341: g. Pleurospermar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Synon. Apinella Neck.; Spielmannia Guss.

Trinis „Don" Flora Lit. III. p. 151: sphalm. pro *Trixis*.

Trinitaria Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 216. t. 24. f. 2: nov. g. Hydrophytor. sedis dubiae. (Sporochnus medius Agdh.?)

= Desmarestia Lamx.

Trinitas Caesalp. 1583. De plant. lib. 14. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 29.)

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 320: g. Gymnopolyspermar.

= Hepatica Rupp.

Triniusa Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 328: nov. g. Festucacear. (Bromus Danthoniae Trin.)

Trinogeton Walp. vid. *Thinogeton Benth.*

Triodallus „Rafin." Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4022. 2: sect. Specularíae.

= Dysmicodon Endl. (Endl. Ench. p. 267.)

Triodea „Rafin." Endl. et Meisn. in synon. Caricis: vid. *seq.*

Triodex Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: subg. Caricis s. genus. (Utriculus bi- vel tridentatus, stylus trifidus, stigm. 3.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 328.

Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1071 *b*: sect. Caricis.

Triodia**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 182. Ed. Nees p. 38: nov. g. Graminear. (T. pungens, procera, etc. „Huc forsan pertinet Danthonia decumbens DC.") — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 34. 597. n. 305. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 330. n. 335. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 328. — Link 1829. Hdb. I. p. 52.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 111. — Bartl. 1830. Ord. p. 28.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 163: g. Festucacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 150.

Trin. 1820. Fund. p. 147: g. Triandr. Digyn. (T. decumbens.) — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 675.

Link 1821. En. I. p. 89: g. Graminum. — Par. Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 65. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 75. n. 366.

Link 1827. Hort. I. p. 134: g. Avenacear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 108; 1833. Agrost. p. 319. — Endl. 1837. Gen. n. 873. p. 98; 1841. Ench. p. 59. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138 (*Trioidia*). 347. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1224. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Poëar. — Par. Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 400.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 451: g. Festucear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 77: g. Airear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.

Steud. 1854. Glum. I. p. 249: g. inter Avenaceas et Festucaceas intermedium.

Synon. Lechlera Steud.; Relchela Steud.

Triodia Jacq. f. 1811. Eclog. t. 16.

= Windsoria Nutt.

Triodia Palis. 1812. Agrost. p. 76: g. Graminear.

Koch 1837. Syn. p. 798. Ed. II. p. 923: g. Avenacear.

= Sieglingia Bernh.

Triodia HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 155. t. 47. 48: g. Festucacear. verar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 218.

= Diplocea Rafin.

Triodia Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1017; 1830. Fl. exc. p. 41: g. Melicacear. Sect. (1828): Graphephorum, Sieglingia.

= Graphephorum Desv. et Sieglingia Bernh.

Triodon Rich. ex Pers. Ench. I. p. 60. n. 48.

= Spermodon Palis.

Triodon G. F. W. Meyer . . . .

= Sieglingia Bernh.

Triodon DC. 1830. Prodr. IV. p. 566: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 626. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119). — Endl. 1838. Gen. n. 3124. p. 528; 1841. Ench. p. 271.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 481: g. Rubiacear.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Synon. Ebelia Rchb.

*) Dicat. C. B. de Trinius, academico Petropolit.
**) τριοδία, trivium.

Trioidia Dietr. vid. *Triodia R. Brown.*

Triolena Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 328: nov. g. Sonerilear. (T. scorpioides.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 885.

Trionastrum Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 177: sect. Hibisci. (H. sororius L.)

Trionella DC. 1824. Prodr. I. p. 493: sect. Hermanniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5306 *b.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 532.

Trionum*) Linn. 1737. Gen. p. 207. n. 563; 1737. Cliff. p. 349; 1740. Syst. p. 27; 1742. Gen. ed. II. p. 333. n. 682: g. Monadelph. Polyandr., serius Hibisco insertum.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 618.

Medic. 1787. Malv. p. 46: g. Malvar. (Hibiscus trionum L.)

Pers. 1807. Ench. II. p. 258: sect. Hibisci. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 453. — Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5273 *f*; 1841. Nom. p. 200. n. 7642. 1. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 483. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 48. — Koch 1839. Deutschl. Fl. V. p. 44. — Endl. 1840. Gen. n. 5277 *c.* p. 982; 1841. Ench. p. 512. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 438. — Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 824.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370: g. Hibiscear.

Synon. Bammia Riv., Rupp.

Trionychion C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 460: sect. Phelipaeae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 631. — Endl. 1839. Gen. n. 4183 *a.* p. 726; 1841. Ench. p. 353. — Walp. 1845. Rep. III. p. 457. — Reut. 1847 in DC. Pr. XI. p. 4. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 310 (*Trionychium*).

Synon. Trionychon Wallr.; Kopsia Dumort.

Trionychium Ledeb. vid. *praeced.*

Trionychon Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 314; 1825. Orob. gen. p. 58: sect. Orobanches. (O. comosa, ramosa, etc.) — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1057; 1828. Consp. p. 121. n. 3055 *b.* — Link 1829. Hdb. I. p. 508. — Koch 1837. Syn. p. 538. Ed. II. p. 619. — Math. 1853. Belg. I. p. 384.

= Phelipaeae Desf. pars.

Triopterideae Rchb. 1841. Nomencl. p. 206: sect. Malpighiear. alatar. Gen.: Jubelina, Diplopterys, Hiraea, Tetrapterys, Triopterys, Hiptage.

Triopteris **) Linn. 1737. Gen. p. 343. n. 860; 1737. Cliff. p. 169; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 428; 1759. Syst. ed. X. p. 1035. n. 510; 1762. Sp. ed. II. p. 612; 1764. Gen. ed. VI. p. 228. n. 574; 1767. Syst. ed. XII. p. 315. n. 570; 1771. Mant. II. p. 151. n. 1308: g. Decandr. Trigyn.

*) Nomen ex Theophrasto.

**) Nomen est Plukenetii, a triplice ala, ut in semine plantae, dictum. (Ht. Cliff.)

Triopteris Linn. cont.

— Par. Murr. 1774. Syst. p. 356; 1784. Syst. p. 427. — Reich. 1778. Gen. p. 233. n. 624. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 307. n. 782; 1791. II. p. 805. — Gmel. 1791. Syst. p. 725. — Pers. 1797. Syst. p. 458. — Willd. 1799. Sp. II. p. 743. n. 905.

Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 99. n. 414: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Trihilatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 357. — Batsch 1802. Tab. p. 51.

P. Browne 1756. Jamaic. p. 191: g. Hexandr. Monogyn.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Geranior.

Adans. 1763. Fam. II. p. 344: g. Pistaciar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 222: g. Hexapetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 248: g. Polycarpiar.

Juss. 1789. Gen. p. 253: g. Malpighiar.

Neck. 1790. El. II. p. 313. n. 1108: g. Acascophytor.

Cavan. 1790. Diss. IX. p. 431. t. 259: g. Monadelph. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 161. (Decandr.)

Vent. 1799. Tabl. III. p. 139: g. Malpighiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 20. — Pers. 1805. Ench. II. p. 508. n. 1128. — Hedw. 1806. Gen. p. 332. n. 1308. — Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 481. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 167. t. 451. — Kunth 1824. Syn. III. p. 184. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 332. — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 141.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 692; 1825. Syst. II. p. 388. n. 1708; 1830. Gen. I. p. 378. n. 1905: g. Malpighiear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1348. 1589.

DC. 1824. Pr. I. p. 586: g. Banisteriear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 207. n. 5368; 1837. Hdb. p. 299. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 642. — Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39). — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 182.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: g. Banisteriar.

Synon. Triopterys A. Juss.

Triopteris Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 32. t. 160: g. Decandr. Trigyn. (Tr. indica.)

= Aspidopterys A. Juss.

Triopterys A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 265; 1843. Arch. Mus. III. p. 514. t. 18: g. Hirear. — Par. A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 261. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.

Endl. 1840. Gen. n. 5573. p. 1060; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar.

Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7851: g. Triopteridear.

Walp. 1846. Rep. V. p. 299: g. Hiraeear.

= Triopteris Linn.

Trioptolemea „Martius mss." Benth. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 102: nov. g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6718. p. 1304; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 6010.

= Semeionotis Schott. (*Cf. Triptolemea Mart.*)

Triorchis Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 298: g. pl. class. XIV.
= Spiranthes Rich.

Triosteae Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 11: subtrib. Lonicerear. Gen.: Triosteum.

Triostemum Dietr. vid. *seq.*

Triosteon Adans. vid. *Triosteum Linn.*

Triosteospermum Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 394. t. 293. f. 378.
= Triosteum Linn.

Triosteum*) Linn. 1753. Sp. I. p. 176; 1759. Syst. ed. X. p. 930. n. 211; 1762. Sp. ed. II. p. 250; 1764. Gen. ed. VI. p. 94. n. 234; 1767. Syst. ed. XII. p. 166. n. 233: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 180; 1784. Syst. p. 217. — Reich. 1778. Gen. p. 96. n. 251. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 128. n. 320. — Gmel. 1791. Syst. p. 369. — Pers. 1797. Syst. p. 225. — Willd. 1797. Sp. I. p. 990. n. 362; 1809. En. p. 222. — Elliott 1817. Sketch I. p. 269. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 139. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 180; ed. 1832. I. p. 538.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 157 (p. 500 *Triosteon*): g. Caprifolior. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 147. — Juss. 1789. Gen. p. 211. — Batsch 1802. Tab. p. 239. — Hedw. 1806. Gen. p. 148. n. 635. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 619; 1825. Syst. I. p. 757. n. 810; 1830. Gen. I. p. 172. n. 869. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XIV. 221. n. 903.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 528.
Gled. 1764. Syst. p. 203. n. 840: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 144: g. Monopetalar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 129. t. 26. f. 8 (perfoliatum).
Neck. 1790. El. I. p. 135. n. 232: g. Sphanidophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 596: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 455. — Link 1821. En. I. p. 223. — Bartl. 1830. Ord. p. 214. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 328.
Pers. 1805. Ench. I. p. 214. n. 487: g. Caprifoliar. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570 (*Triostemum*). 780.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: g. Triostiniae.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1937: g. Scabiosear.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 337: g. Caprifoliear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 329: g. Lonicerear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 443. — Meisn. 1838. Gen. p. 155 (111). — Endl. 1838. Gen. n. 3338. p. 569; 1841. Ench. p. 282. — Walp. 1843. Rep. II. p. 450. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 11: g. Triostear.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2737: g. Linnaeacear.
Synon. Triosteospermum Dill.

Triostinia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: subfam. Gitonanthiae. Gen.: Triosteum, Ovieda.

Tripetalae Hill 1769. Hort. kew. p. 159: class. IX. herbar. Typus: Tradescantia.

Tripetalae incompletae Hill 1769. Hort. kew. p. 337: class. XXIII. herbar. Typus: Xyris.

Tripetalae irregulares Hill 1769. Hort. kew. p. 279: class. XVI. herbar. Typus: Costus.

Tripetaleia Sieb. & Zuccar. 1843. Abh. phys. math. Cl. Ak. Münch. III. p. 731: nov. g. Olacinear.? — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 95. n. 5497. — Walp. 1846. Rep. V. p. 139. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 14. 25 (dubium).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: g. Olacacear. dubium.

Tripetalodeae Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: ordo 6 plant. Gen.: Butomus, Alisma, Sagittaria.

Tripetaloideae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 5 plant. Gen.: Calamus, Flagellaria, Aphyllanthes, Juncus, Triglochin, Scheuchzeria, Butomus, Alisma, Sagittaria. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 167. Gen. ead.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXX: ordo 8 Monocotyledonear. Divis.: Hydrocharides, Potamophilae, Juncagines.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: div. Petaloidear. Ordines: Butomeae, Alismaceae, Commelineae, Xyrideae, Hydrocharideae, Bromeliaceae, Scitamineae, Marantaceae.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Ternariar. Fam. 47—56.

Tripetelus*) Lindl. .... in Mitch. East-Austr. ex Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 63.
Endl. 1842. Spl. II. p. 54. n. 3341/1: g. Sambucear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 360. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767.

Tripethelium Dumort., Endl., Lindl. vid. *Trypethelium Spreng.*

Tripha Nor. A. B. V. 67.
= Cupania Plum.

Triphaca**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 577. Ed. Willd. p. 707: nov. g. Monoec. Polyandr. (T. africana.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 565. n. 2091. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 351.
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 285: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 194.
DC. 1824. Pr. I. p. 483: g. Sterculiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5286. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 32. — Meisn. 1837. Gen. p. 30 (25).

---

*) Decurtatio nominis Dilleniani.

*) πέτηλον = πέταλον.
**) φακή, legumen: a tribus leguminibus pericarpii.

Triphaca Lour. cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 498. n. 1839: g. Icosandr. Monogyn., serius (Gen. p. 552) ad Sterculiam reductum.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: g. Sterculiacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 518. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 501.
Rchb. 1828. Consp. p. 212[d]. n. 5591 inter genera vix cognita.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Triphacear.
= Chichaea Presl.

Triphaca Rchb. vid. *Triphasia Lour.*

Triphaceae Rchb. 1837. Handb. p. 291: sect. Sterculiear. Gen.: Heritiera, Pterygota, Biasolettia, Chichaea, Triphaca.

Triphane Rchb. Icon. t. 207. 208: vid. *Tryphane Fenzl.*

Triphasia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. 1. p. 152. Ed. Willd. p. 189: g. Pentandr. Monogyn. (T. aurantiola), a Willd. (ibid. not. p. 90) ad Limoniam L. reductum.
Correa 1805. Ann. Mus. VI. p. 383: g. Aurantior. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 791; 1825. Syst. II. p. 133. n. 1319. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 205. — Kunth 1824. Syn. III. p. 208.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 34: g. Hesperidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 149. n. 641. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXI. 269. n. 935.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. p. 380: g. Aurantiacear. — Par. Juss. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 129 (*Tryphasia*). — DC. 1824. Pr. I. p. 535. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 131. *Cf.* Linnaea I. p. 663. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVIII. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 342. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 393. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 241. n. 1262. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 583. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 251. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1050. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 230. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 85. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 458.
Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5523 (sphalm. *Triphaca*): g. Aurantiear.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XIII. 76: g. Hexandr. Monogyn.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 91: g. Limonear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 46 (34). — Endl. 1840. Gen. n. 5500. p. 1044; 1841. Ench. p. 548. — Walp. 1843. Rep. II. p. 804.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314: g. Triphasiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8098: g. Limoniear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 31. 37.

Triphasieae Rchb. 1837. Handb. p. 314: sect. Limoniear. Gen.: Triphasia.

Triphelia „R. Brown mss." Endl. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 48; 1840. Gen. n. 6287. p. 1226; 1841. Ench. p. 650: g. Chamaelauciear.

*) τριφάσιος, triplex: a forma ternaria foliorum, corollae et calycis.

Triphelia R. Brown cont.
Walp. 1843. Rep. II. p. 153: g. Euchamaelauciear.
= Actinodium Schauer.

Triphocoma Wittst. vid. *Triplocoma La Pyl.*

Triphora*) Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 192: nov. g. Gynandr. Monandr. (Arethusa pendula W.)
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 343: g. Orchidear.
= Pogoniae Juss. pars.

Triphragmium**) Link 1825. Spec. II. p. 84: nov. g. Gymnomycetum. (Puccinia Ulmariae DC.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 344.
Fries 1825. Pl. homon. p. 366: g. Hypodermior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 11.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Uredineor.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 18: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 28. — Bonord. 1851. Hdb. p. 50. — Tul. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 181. *Cf.* Flora 1855. p. 743.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 22; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 17: g. Phragmidiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Pucciniaeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 513: g. Puccinieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
= Puccinia Pers.?

Triphyllae Hill 1769. Hort. kew. p. 376: class. XXX. herbar. Typus: Sparganium.

Triphyllidia Rchb. 1841. Nomencl. p. 167. n. 6489. 3: sect. Cliffortiae. (Cliff. §. 4 DC.)

Triphylloides „Ponted." Mönch 1794. Meth. p. 509: g. Petalostemonis. (Trifolium pratense L.)
= Lagopus Koch.

Triphyllon Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 377: sect. Potentillae. (P. nivea, frigida, minima, grandiflora, Tormentilla, nemoralis.)

Triphyllum Medic. (Vorles. II. p. 383) 1789. Phil. Bot. I. p. 202: nov. g. ex typo Trigonellae platycarpae L.
= Falcatula Brot.

Triphysaria Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. sem. h. Petr. p. 52: nov. g. Rhinanthacear. (T. versicolor.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1836. 2e sér. V. p. 301, Linnaea 1837. Litt. p. 122 et Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 10.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 627: g. Rhinanthiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Antirrhinear.
Endl. 1840. Gen. n. 4006. p. 692; 1841. Ench. p. 340: g. Rhinanthear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 543. — Walp. 1845. Rep. III. p. 397. 971.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4468: g. Pedicularinar.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 535: sect. Orthocarpi.

*) „Nomen abbreviatum ex Plukenetii: *trianthophoros.*"
**) φράγμα, sepimentum.

Tripinna*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 391. Ed. Willd. p. 476: nov. g. Didynam. Angiosperm. (T. tripinnata.)
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum.
= Tripinnaria Pers.

Tripinnaria Pers. 1807. Ench. II. p. 173. n. 1514: g. Bignoniacear. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 345.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 416: g. Bignoniear. anomalar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 842. n. 2244: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3221: g. Caprariacear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 506. n. 2487: g. Baccatar.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 233: g. Crescentiear. — Par. DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123; 1845. Pr. IX. p. 248. — Endl. 1839. Gen. n. 4173. p. 723; 1841. Ench. p. 350. — Meisn. 1840. Gen. p. 301 (211)? — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4726. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 568.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674: g. Crescentiacear.
Seem. 1853. Fl. panam. p.....: g. Tanaeciear.
Synon. Tripinna Lour.

Triplachne Link 1833. H. R. Berol. II. p. 241: nov. g. Agrostidear. (Agrostis nitens Juss.) — Par. Parlat. 1850 in Webb Canar. III. p. 391.

Tripladenia D. Don 1839. Proc. Linn. Soc.; 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 282: nov. g. Disporo aff. (T. Cunninghamii.)
= Kreysigia Rchb.

Triplandron Benth. 1844. Bot. voy. Sulph. p. 73. t. 28.
Walp. 1846. Rep. V. p. 145: g. Clusiacear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 68. n. 5438/1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402: g. Clusiear.

Triplareae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 504: trib. Polygonacear. Gen. Triplaridear. Meyer.

Triplarideae C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 147: trib. Polygonacear. verar. Gen.: Podopteris, Triplaris, Ruprechtia.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 171: subtrib. Apterocarpar. Gen. ead.

Triplaris**) „Löfl." Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 881. 1360. n. 1111; 1762. Sp. ed. II. p. 130; 1764. Gen. ed. VI. p. 41. n. 103; 1767. Syst. ed. XII. p. 103: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 110; 1784. Syst. p. 128. — Reich. 1778. Gen. p. 43. n. 109. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 57. n. 135. — Pers. 1797. Syst. p. 133.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.

*) Nomen a foliolis tripinnatis.
**) Nomen aevi serioris, fere idem ac triplex.

Triplaris Löfl. cont.
— Par. Juss. 1789. Gen. p. 83; 1826. Dict. v. 42. p. 346. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 194. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 182. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 306; 1825. Syst. II. p. 273. n. 1533; 1830. Gen. I. p. 329. n. 1675. — Campd. 1819. Mon. Rum. p. 18. — Kunth 1822. Syn. I. p. 470. — Link 1822. En. II. p. 429. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 346. — Cham. 1828. Linnaea III. p. 55; 1833. ibid. VIII. p. 136. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Endl. 1837. Gen. n. 1997. p. 309; 1841. Ench. p. 188; 1842. Spl. II. p. 35; 1847. Spl. IV. p. 55. Sect. (1842): Eutriplaris, Rupprechtia. — Schomb. 1838. Ann. nat. hist. I. p. 264. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 522. — Meisn. 1841. Gen. p. 317 (229). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 100.
Adans. 1763. Fam. II. p. 276: g. Persicariar.
Gled. 1764. Syst. p. 8. n. 26: g. Thalamostemonum.
Aubl. 1775. Guian. II. p. 910. t. 347: g. Dioec. Dodecandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 814. n. 135. — Cram. 1803. Disp. p. 200.
Scop. 1777. Intr. p. 344: g. Seminudar.
Neck. 1790. El. II. p. 215. n. 950: g. Sysellophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 767: g. Dodecandr. Trigyn.
Batsch 1802. Tab. p. 176: g. Vaginalium.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 812. n. 1816: g. Dioec. Enneandr. — Par. Pers. 1807. Ench. p. 626. n. 2256.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4299; 1837. Hdb. p. 236: g. Coccolobear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18.
= Triplaris Meyer et Ruprechtia Meyer.

Triplaris C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 147: g. Triplaridear. restrict. — Par. Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 47; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 171.
Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6330: g. Coccolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504: g. Triplarear.
Synon. Blochmannia Weig.; Vellasquezia Bert.; Magonia Fl. Flum.; Eutriplaris Endl.

Triplasia Agardh vid. *seq.*

Triplasis*) Palis. 1812. Agrost. p. 81: nov. g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 36. 615. n. 314. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 347.
Trin. 1820. Fund. p. 148: g. Triandr. Digyn.
Agdh. 1823. Aphor. p. 150 (*Triplasia*): g. Festucacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1005.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 73: sect. Avenae.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Kunth 1833. Agrost. p. 285: g. Chloridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 854. p. 94; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 337. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n.

*) τριπλάσιος, trifarius.

Triplasis Palis. cont.
1328. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 217.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.

Triplateia Bartl. 1830. Reliq. Hänk. II. 1. p. 11. t. 50; 1830. Ord. p. 305: nov. g. Alsinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (21). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5228. p. 965; 1841. Ench. p. 505: g. Eualsinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7778: g. Minuartiear.
Synon. Hymenella Moç. & Sess.

Triplathera**) Endl. 1837. Gen. n. 847 *d.* p. 94; 1841. Ench. p. 58: sect. Eutrianae.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1321. 4: sect. Atheropogonis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.

Triplectrum „Don mss." Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 324: nov. g. Melastomacear.
Meisn. 1838. Gen. p. 113 (80): g. Miconiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6237. p. 1217; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6745. — Walp. 1846. Rep. V. p. 712. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1443: g. Osbeckiear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 298: g. Dissochaetear.

Tripleura Lindl. 1832 in Wall. Catal. n. 7391; 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 215. n. 1572. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2139. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 452; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 115. n. 1551; 1842. Spl. II. p. 19.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Cranichidear.

Tripleurospermum Schultz Bip. 1844. Üb. Tanac. p. 31; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 196: nov. g. Chrysanthemear. (Chrysanthemum inodorum L.) Sect. (1847): Rhyditospermum, Leiospermum.
Koch 1845. Syn. ed. II. p. 1026: g. Anthemidear.
Synon. Dibothrospermum Knaf.

Triplima Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: subg. Caricis s. genus. (Utriculus integer; stylus trifidus; stigm. 3.)
Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1017 *a*: sect. Caricis.
= Caricis Linn. pars.

Triplinervium Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 116: sect. Saxifragae. (S. tridactylites, hypnoides, caespitosa, etc.) — Par. Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 11.
= Dactylites Tausch.

**) *τριπλόος*, ternarius.

Triplocarpaea DC. 1837. Prodr. VI. p. 73: sect. Dimorphothecae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2672 *h.* p. 436; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 2085. 8.

Triplocentron Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1828. v. 55. p. 348: nov. g. Calcitrapear. verar. (Centaurea melitensis L.)
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
= Mesocentron DC. pt.

Triplocoma Bachelot de la Pylaie .... in Desv. Journ. V. p. 7: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 351 et Wittst. Etym. Handw. p. 900 (*Triphocoma*).
= Dawsonia R. Brown.

Triplolepis Turczan. 1848. Bull. Mosc. XXI. 1. p. 251: nov. g. Periplocear. (T. Cumingii.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 705. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 48. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 468.

Triplopappus Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 182: sect. Diplopappi. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 577.
Synon. Eudiplostephium DC.

Triplorhiza Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 96; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Satyrium albidum L.)
= Gymnadenia R. Brown.

Triplosperma G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 134: nov. g. Hoyacear. (Stapelia cochinchinensis Lour.)
= Ceropegia Linn.

Triplosporites R. Brown 1848. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. I. p. 376: nov. g. foss., Lepidodendro aff.

Triplostegia „Wallich mss." DC. 1830. Prodr. IV. p. 642 (1832. Mém. VII. p. 19. t. 4): nov. g. Valerianear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 680. — Rchb. 1837. Hdb. p. 178; 1841. Nom. p. 72. n. 2699. (genuinar.) — Endl. 1838. Gen. n. 2188. p. 352; 1841. Ench. p. 227. (anomalar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (121). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 304. (?)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 698: g. Valerianacear.

Tripodanthera Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 11. 48: nov. g. Eubryoniear. (Bryonia cochinchinensis Lour.)
= Bryoniae Linn. pars.

Tripodion Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 219: nov. g. ex typo Anthyllidis tetraphyllae L.

Tripodisceae Kützing. 1844. Bacill. p. 136; 1845. Phycol. germ. p. 115: fam. Diatomear. Gen.: Tripodiscus.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: subtrib. Lysigoniear. Gen. id.
= Eupodisceae Kütz.

Tripodiscus Ehrenb. 1840. Leb. Kreideth. p. 79; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 217: g. Bacillarior.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 115: g. Tripodiscear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 686: g. Diatomear.
= Eupodiscus Ehrenb. pt.

Tripogon *) „Roth“ Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 34. 600. n. 307: nov. g. Graminear. (Festuca mysorensis Heyne.)
Roth 1821. Nov. spec. p. 79: g. Triandr. Digyn., Festucae aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1023: g. Poacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324)? — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Jaub. & Spach 1852. Ill. pl. or. IV. t. 332: g. Chloridear. restitutum, Eutrianae aff.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 389: g. Eleusinear.

Tripolium **) Nees 1833. Gen. Aster. p. 152: nov. g. Asterum genuinor. (Aster Tripolium L.)
Hook. 1833. Fl. bor. am. Ill. p. 15: g. Asterear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 257. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3283. (genuinar.) Sect.: Tripolium, Oxytripolium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
DC. 1836. Pr. V. p. 253: g. Euasterear. Sect.: Tripolia vera, Oxytripolia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2302. p. 374; 1841. Ench. p. 234. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 477.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 295: g. Asterinear.
Synon. Aster Adans.; Eurybia Gray.

Triposporium ***) Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 16. t. 4. f. 220; 1842. V. p. 10; 1842. Anl. Mycol. p. 39: nov. g. Helminthosporiacear. (T. elegans.) — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 116.
Corda 1839. Prachtfl. p. 21. t. 10 (elegans).
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 209: g. Dematieor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 116: g. Rhacodieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Botrytideor. (p. 495 Helminthosporeor.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 85: g. Acmosporiaceor.

Tripotrichia Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 22. t. 6: nov. g. Coniogasterum. (T. elegans.)
Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 353 (*Triptotrichia*): g. Trichiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 261. (?)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 20; 1842. Mycol. p. 80: g. Physareor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.

Tripsaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Panicear. Gen.: Tripsacum, Anthephora, Manisuris, Peltophorus, Pariana.

Tripsacineae Presl 1830 in Reliq. Hänk. I. p. . . . : subtrib. Saccharinar. Gen.: Tripsacum.

Tripsacum *) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1261. 1379. n. 1167; 1763. Sp. ed. II. p. 1378; 1764. Gen. ed. VI. p. 481. n. 1044; 1767. Syst. ed. XII. p. 615: g. Monoec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 702; 1784. Syst. p. 842. — Reich. 1778. Gen. p. 476. n. 1134. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 622. n. 1404. — Pers. 1797. Syst. p. 885. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 201. n. 1367; 1809. En. p. 953. — Trin. 1820. Fund. p. 201.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 30. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 102. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 79. — Pers. 1807. Ench. II. p. 533. n. 2030. — Palis. 1812. Agrost. p. 118. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 304. n. 319. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 355. — Link 1829. Hdb. I. p. 95.
Gled. 1764. Syst. p. 21. n. 84: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 208.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 76. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Link 1822. En. II. p. 377. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 66. n. 322.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 3. t. 1. f. 4 (hermaphroditum).
Neck. 1790. El. III. p. 230. n. 1615: g. Achyrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 178: g. Triandr. Digyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 24. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 85.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71: g. Panicear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 155. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149.
Link 1827. Hort. I. p. 250: g. Diclinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 834: g. Cenchrinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Tripsacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Presl 1830. Reliq. Hänk I. p. . . . : g. Tripsacinear.
Kunth 1830. Gram. p. 155; 1833. Agrost. p. 468: g. Rottbölliacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 930. p. 106; 1841. Ench. p. 60. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 397. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Steud. 1854. Glum. I. p. 362.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 251: g. Andropoginear.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1368: g. Rottböllicar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 10: g. Andropogonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Rottböllear.
Synon. Digitaria Adans.

Tripterella **) Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 19: nov. g. Triandr. Monogyn., Burmanniae aff. (Vogelia capitata Gmel.?) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 39. n. 79. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 341. — Vahl 1806. Enum. II. p. 42. n. 92. — Hedw.

*) τρίς, tres, ter: πώγων, barba.
**) Nomen ex Plinio.
***) τρίπος, s. τρίπους, tripes.

*) Tripsaca herba apud Theodorum Priscianum.
**) τρεῖς, tres; πτερόν, ala.

Tripterella Rich. cont. 1806. Gen. p. 31. 359. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 340. 366. n. 122. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 21. — Elliott 1821. Sketch I. p. 42.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 261: g. Iridear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 172. (spuriar.) — Ritg. 1831. Marb. II. p. 128 (sph. *Triptorella*).
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 357: g. Bromeliacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1210: g. Burmanniear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Tripterellear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 119: g. Burmanniacear.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 56: sect. Burmanniae.
= Burmannia Linn.

Tripterelleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. 55: fam. Bromeliariar. Gen.: Burmannia, Tripterella, Maburnia.
Nuttall .... Act. Philad. VII. p. 23.

Tripteris Lessing 1831. Linnaea VI. p. 95: 1832. Syn. Compos. p. 90: nov. g. Calendulear. (Calendula arborescens Jacq.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 456. — Endl. 1838. Gen. n. 2824. p. 462; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 15. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3028. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Tripterium DC. 1818. Syst. I. p. 169; 1824. Prodr. I. p. 11: sect. Thalictri. — Par. Link 1822. En. II. p. 91. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 723. — Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4953 *a*; 1841. Nom. p. 190. n. 7227. 3. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 11. — Koch 1836. Syn. p. 3. Ed. II. p. 3. — Endl. 1839. Gen. n. 4772 *a*. p. 845; 1841. Ench. p. 434. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 5. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 300. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 5.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 237: g. Anemoninear.

Tripterocarpus Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 52 (37): g. Sapindear.
= Bridgesia Bert. (Nomen ob Bridgesiam Hook. 1831 et Hook. & Arn. 1833 [quae conferantur] perperam mutatum.)

Tripterococcus Endl. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 17: nov. g. Stackhousiear., a R. Brown indicatum. (T. Brunonis.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. n. 7468.
Endl. 1840. Gen. n. 5764. p. 1107; 1841. Ench. p. 586: g. Stackhousiacear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). — Bunge 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 181. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 589. — Schuch. 1853. Linnaea XXVI. p. 27.

Tripterospermum Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 849: nov. g. Gentianear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 358. — Endl. 1838. Gen. n. 3563. p. 605; 1841. Ench. p. 303 (dubium). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. (?)
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 306; 1845 in DC. Pr. IV. p. 121: g. Swertiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5123: g. Erythraeariar. ?

Triptilion Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 102. t. 22: nov. g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1626. n. 1425. — Pers. 1807. Ench. II. p. 379. n. 1784.
Lag. 1811. Amen. nat. I. p....: g. Chaenanthophorar.
Cass. 1817. Dict. v. 8. p. 395; 1825. v. 34. p. 207; 1830. v. 60. p. 584; g. Nassauviear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2287; 1841. Nom. p. 96. n. 3776. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1830. Linnaea V. p. 3; 1832. Syn. p. 397. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 50. — Meisn. 1838. Gen. p. 231 (142). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. (verar.). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 35.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 558; 1826. Syst. III. p. 506. n. 2758; 1831. Gen. II. p. 625. n. 3101: g. Perdiciear.
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 219: g. Trixidear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 173.
Endl. 1838. Gen. n. 2947. p. 490; 1841. Spl. I. p. 1386; 1841. Ench. p. 248: g. Nassaviear. Sect.: Eutriptilion, Strongyloma (1838 Acanthophyllum). — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Synon. Triptilium DC.

Triptilium DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 67 (Mém. Labiatifl. p. 9. t. 3. f. 3): g. Labiatiflorar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 21: g. Barnadesiar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 362.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Nassauviear.
= Triptilion Ruiz & Pav.

Triptilodiscus Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXIV. 2. p. 66: nov. g. Solenogynear. (T. pygmaeus.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 196.

Triptolemaea Walp., Lindl. vid. *seq.*

Triptolemea Martius 1837. Flora II. Beibl. p. 122. *Cf. Trioptolemea.*
Walp. 1842. Rep. I. p. 800 (*Triptolemaea*): g. Dalbergiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555 (*Triptolemaea*).
= Semeionotis Schott.

Triptorella Ritg. vid. *Tripterella Rich.*

Triptotrichia Rchb. vid. *Tripotrichia Corda.*

Triquetra Medic. (Vorles. II. p. 376) 1789. Phil. Bot. I. p. 210: nov. g. ex typo Astragali baetici L.)

Triraphis Palis. 1812. Agrost. p. 83: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 37. 617. n. 318. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 359.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Chloridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 172. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151.

Triraphis Palis. cont.
Trin. 1820. Fund. p. 165: g. Triandr. Digyn.
Kunth 1830. Gram. p. 83; 1833. Agrost. p. 253: g. Pappophorear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 327. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Steud. 1854. Glum. I. p. 199.
Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 92: sect. Pappophori.
= Trirhaphis R. Brown.

Trirhaphis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 185. Ed. Nees p. 41: nov. g. Graminear. (T. pungens et mollis.)
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 931 (*Trirrhaphis*): g. Panicariar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 73. n. 354: g. Graminum.
Bartl. 1830. Ord. p. 30 (*Trirrhaphis*): g. Panicear.
Endl. 1837. Gen. n. 829. p. 91; 1841. Ench. p. 58: g. Pappophorear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1303. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Synon. Triraphis Palis.

Trirrhaphis Rchb., Bartl. vid. *praeced.*

Trisanthus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 175. Ed. Willd. p. 218: nov. g. Pentandr. Digyn. (Pes equinus Rumph. Amboin. t. 169. f. 1.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 360.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3767: g. Hydrocotylear.?
= Hydrocotyle Tourn. (abbreviata Rich.)

Trischidium**) L. R. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 141; 1844. Arch. Mus. IV. p. 193: nov. g. Caesalpiniear., Allaniae Benth. aff. (T. vestitum.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 565: g. Swartziear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Synon. Dithyria Benth.

Trisecus „Willd. mss.“ Schult. 1820. Syst. VI. p. LXI. 641. n. 1227: nov. g. Pentandr. Trigyn. (T. frangulaefolius.)
Endl. 1841. Gen. n. 6894. p. 1333; 1841. Ench. p. 685: inter genera dialypetala minus cognita.
Meisn. 1841. Comm. p. 250: g. Euphorbiacear.?

Trisepalae Bartling 1830. Ord. p. 243: class. (42) Gymnoblastor. Ordines: Myristiceae, Anonaceae.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 491: class. (20) Dicotyledoneor. Fam. ut Bartl.

Trisetaria Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 27: nov. g. Triandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 177.
Scop. 1777. Intr. p. 74: g. Graminum legitimor.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1044; 1841. Nom. p. 36. n. 1210: g. Avenacear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 100; 1833. Agrost. p. 294. — Endl. 1837. Gen. n. 861. p. 96; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 339. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Hochst. 1855. Flora I. p. 282.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Hochst. 1856. Flora I. p. 17: g. Deyeuxiae inserit.
Synon. Anomalotis Steud.

Trisetarium Steud. vid. *seq.*

Trisetastrum Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 416: sect. Avenae. (A. striata Mich.) — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 235 (*Trisetarium*).

Triseteae (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 435. 521: trib. Graminear. Gen.: Trisetum, Holcus, Köleria, Catabrosa.

Trisetum Pers. 1805. Ench. I. p. 97. n. 174: g. Triandr. Digyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 43. n. 203. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 61. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 91.
Palis. 1812. Agrost. p. 88: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 39. 657. n. 327. — R. Brown 1824. Parry's voy. App. XI. p. CCXCII. (reform.) Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 360. — Link 1829. Hdb. I. p. 65.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 161: g. Avenacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 128. — Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Link 1827. Hort. I. p. 120. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 36. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 390.
Gaud. 1828. Helv. I. p. 335: sect. Avenae. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 73. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 50. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 454 (A. tenuis, flavescens); 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 413.
= Trisetaria Forsk. et Trisetum Kunth.

Trisetum Kunth 1830. Gram. p. 102; 1833. Agrost. p. 295; 1838. Fl. Berol. II. p. 379: g. emendat. Avenacear. — Par. Trin. 1835. Linnaea X. p. 300 in adnot. — Endl. 1837. Gen. n. 863. p. 96; 1841. Ench. p. 58. Sect.: Colobanthus, Rostraria, Trichaeta, Acrospelion. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 339. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1212. Sect. eaed. (Trisetum loco Acrospelii.) — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (323). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 102; 1850 in Webb Canar. III. p. 398. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 224.
Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 59: g. Graminum. Sect.: Acrospelion, Rostraria, Colobanthus?
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 18: g. Avenaceor.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 78: g. Avenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 301: g. Graminear.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 521: g. Trisetear.

*) τρίς, ter: ob 3 flores eodem calyce cupulatos.
**) σχίδιον, fragmentum, ob calycem tripartito-[illegible].

Trisiola Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 104: nov. g. ab Uniola sejunctum. *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 85 et Steud. Glum. I. p. 280.
= Uniola Linn.

Trismegista*) Endl. 1840. Gen. n. 5786 *b*. p. 1111; 1841. Ench. p. 587: sect. Mercurialis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7346. 2.
= Adenocline Turcz., etc.

Trismeria Fée 1852. Gen. Fil. p. 164: nov. g. Hemionitidear. (Acrostichum trifoliatum, etc.)

Tristachya Nees 1829. Agrost. Bras. p. 458: nov. g. Avenacear. (T. leiostachya.) — Par. Kunth 1833. Agrost. p. 308. — Endl. 1837. Gen. n. 866. p. 97; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 344. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1217. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 237.
Kunth 1830. Gram. p. 453. t. 140. 141: g. sedis dubiae, Arrhenathero aff.?
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. (1835.) p. 336: g. Panicear.
A. Braun 1841. Flora II. p. 713: sect. Loudetiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Synon. Monopogon Presl.

Tristagma**) „Kunze mss." Pöppig 1833. Fragm. synops. p. 8.
Endl. 1837. Gen. n. 1108. p. 142; 1841. Ench. p. 83: g. Agapanthear. — Par. Pöpp. 1838. Nov. gen. II. p. 128. t. 140. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1835.
Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302): g. Hemerocallidear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 474: g. Alliear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.

Tristania***) R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 417 (Verm. bot. Schr. II. p. 492): nov. g. Myrtacear. (Melaleuca laurina W.) — Par. Link 1822. En. II. p. 273. — Schott 1830. Wien. Zeitschr. III. p. 772. Char. reform. *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 54. — Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1839.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 853; 1826. Syst. III. p. 337. n. 2620; 1831. Gen. II. p. 598. n. 2950: g. Myrtear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 365.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Calothamnear.
DC. 1828. Pr. III. p. 210: g. Melaleucear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 813. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 113. — Meisn. 1837. Gen. p. 107 (76).
Rchb. 1828. Consp. 176. n. 4668: g. Chamaelauciear.
Bartl. 1830. Ord. p. 331: g. Leptospermear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6290. p. 1227;

*) τρισμέγιστος cognomen Mercurii.
**) στάγμα, gutta.
***) Dicat. Jules de Tristan.

Tristania R. Brown cont.
1841. Ench. p. 650. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 122. — Walp. 1843. Rep. II. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 397.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 176. n. 6835: g. Bäkeear.
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 127. t. 27. (T. obovata.)

Tristania Poir. ex Steud. Nom. II. p. 714 (arundinacea).
= Spartina Schreb.

Tristeca „Palis." Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 39: g. Licopodacear. (T. nuda.)
= Psilotum Swartz.

Tristegia Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1248 *b*: sect. Haemanthi. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 8. 33.

Tristegia „Nees" Meisn. Comm. p. 319 in synon. Melinis: vid. *Tristegis Nees*.

Tristeginae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 230: fam. Graminear. Gen.: Acratherum, Tristegis.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 177: trib. Graminear.

Tristegineae Nees 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 237: trib. Graminear. Gen.: Arundinella.

Tristegis Nees 1820. Hor. phys. Berol. p. 47. t. 7: nov. g. Graminear. (Agrostis glutinosa Fisch.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 514 et Leman 1828. Dict. v. 55. p. 366. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 88.
Link 1821. En. I. p. 71: g. Graminum.
Schult. 1824. Mant. II. p. 11. 203: g. Triandr. Digyn.
Link 1827. Hort. I. p. 231: g. Tristeginar.
= Melinis Palis.

Tristellaria Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5373: g. Banisteriear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 299: g. Hiptagear.
= seq.

Tristellateia Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 47 in Römer Collect. bot. p. 206: nov. g. Malpighiar.
DC. 1824. Pr. I. p. 583: g. Hiptagear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 639. — Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39).
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 367: g. Malpighiacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 359. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 124.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 269; 1843. Arch. Mus. III. p. 494. t. 16: g. Hirear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Endl. 1840. Gen. n. 5571. p. 1060; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7849. 5: sect. Hiraeae.
Walp. 1846. Rep. V. p. 290: g. Hiraeear.
Synon. Zymum Nor.; Tristellaria Rchb.; Platynema Wight & Arn.

Tristemma Juss. 1789. Gen. p. 329: nov. g. Melastomar.
Gmel. 1791. Syst. p. 693: g. Decandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 712: g. Melastomear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 476. n. 1077. — Hedw. 1806. Gen. p. 314.

Tristemma Juss. cont
n. 1242. — Vent. 1807. Mém. Inst. I. p. 15. — Spreng. 1818. Anl. II. p. 859; 1825. Syst. II. p. 305. n. 1557; 1830. Gen. I. p. 338. n. 1706. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 508. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1079. — Rchb. 1827 ap. Mössl. p. LIV. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 367. — Bartl. 1830. Ord. p. 329.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 435 (Verm. bot. Schr. I. p. 209): g. Melastomacear.
DC. 1828. Pr. III. p. 144: g. Osbeckiar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 761.
Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4598; 1841. Nom. p. 173. n. 6724: g. Osbeckiear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 116 (83). — Endl. 1840. Gen. n. 6216. p. 1213; 1841. Ench. p. 646. — Walp. 1843. Rep. II. p. 132. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Benth. 1849. Niger Fl. p. 353.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 297: g. Lasiandralium. Distinguitur Melastomastrum.

Tristemon Rafin. 1819. Monthl. Mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 262: nov. g. ex typo Triglochinis triandri et palustris.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1139. 1: sect. Triglochinis.
= Triglochin Linn. pt.

Tristemon Klotsch 1838. Linnaea XII. p. 245: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.
Endl. 1839. Gen. p. 751. n. 4296 *a*: sect. Omphalocaryi.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 709: sect. Scyphogynae. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 369. n. 4296 *a*. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4902· 1.

Tristemon Scheele 1848. Linnaea XXI. p. 586: nov. g. Cucurbitacear., Cucurbitae, Lagenariae etc. aff. (T. texanum.)

Tristemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 50, etc.: vid. *Plantae All.*

Tristerix*) Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 17: sect. Loranthi. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *m*. p. 802; 1841. Ench. p. 399. — Walp. 1843. Rep. II. p. 444.
Mart. 1830. Flora I. p. 108: g. Loranthear. *Cf.* DC. Pr. IV. p. 671 et Schult. Syst. VII. p. 1613.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 418: g. Loranthacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2721: g. Psittacanthear.

Tristicha Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 8 in Römer Collect. bot. p. 197: nov. g. Naiadum.
Agdh 1822. Aphor. p. 125: g. Podostemear.? — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 111. — Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 12.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 22. n. 50: g. Hydrocharidum?

*) Nomen a bracteis 3.

Tristicha Petit-Thouars cont.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272 (*Tristycha*): g. Restiacear.
Presl 1827. Reliq. Hänk. I. p. 86 (*Tristichia*): g. Najadear.
Leman 1828. Dict. v. 55. p. 368: g. Juncor.
Rchb. 1828. Consp. p. 77. n. 1674; 1841. Nom. p. 60. n. 2313: g. Podostemonear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 14. n. 52: g. Najadum. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 27.
Endl. 1837. Gen. n. 1835. p. 270; 1841. Ench. p. 155: g. Podostemmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 483: g. Podostemacear. — Par. Gardn. .... Journ. nat. hist. VII. *Cf.* Flora 1850. p. 39. — Wight 1852. Ic. fl. Ind. V. 2. p. 35. t. 1920.
Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 111; 1855 in Fl. Bras. fasc. XIII. p. 271: g. Tristichear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 442.
Tul. 1852. Arch. Mus. VI. p. 179: g. Eutristichear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 790.
Synon. Dufourea Bory; Philocrena Bong.

Tristicheae Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 110: subtrib. Eupodostemear. Gen.: Tristicha, Lawia, Weddellina. — Par. Tul. 1852. Arch. Mus. VI. p. 179. Sect.: Eutristicheae, Weddellineae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 773. 790. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 442. Gen.: Tristicha, Mnianthus, Weddellina.
Tul. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 271: trib. Podostemacear. Gen.: Tristicha.

Tristichia Presl vid. *Tristicha Pet.-Thouars.*

Tristichis Wittst. vid. *seq.*

Tristichitis Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 59; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Mnium triquetrum L.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 369 et Wittst. Etym. Handw. p. 903 (*Tristichis*).
= Meesia Hedw.

Tristimex Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 83): subg. Caricis. (Stigm. 3; fructus triqueter.)
= Caricis Linn. pars.

Tristycha Juss. vid. *Tristicha Pet.-Thouars.*

Tristylium Turczan. 1858. Bul. soc. Mosc. XXXI. p. 247: nov. g. Caraipae aff. (T. mexicanum.)

Tritaenicum Turczan., Walp. vid. *seq.*

Tritaenium Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 169 (sphalm. *Tritaenicum*, emend. 1848. ibid. XXI. 1. p. 591): nov. g. Mulinear. — (*Cf.* Flora 1848. I. p. 317 et Bot. Zeit. 1848. p. 437.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 342.
= Dipterygia Presl.

Tritamidium Endl. 1838. Gen. n. 3073 *b*. p. 515; 1841. Ench. p. 266: sect. Cephalostigmatis. — Par. A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 421. — Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4032. 2.

Tritaxis Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 342: nov. g. Jatrophidear. (T. Gaudichaudii.)

Triteleia „Douglas mss.“ Lindl. 1829. Bot. Regist. XV. n. 1293 not.; 1835. XX. t. 1685.
Benth. .... Hortic. trans. n. ser. I. p. 413. t. 15.

Triteleia Douglas cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1107. p. 142; 1841. Ench. p. 83 (*Triteleja*): g. Agapanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1834.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 28. t. 139.
Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 186: g. Asphodelear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1116.
Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302): g. Hemerocallidear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 20.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 465: g. Alliear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 136: g. Liliacear.

Tritheca Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 305: subg. Ammanniae.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 614: g. Lythrear.
= Euammanniae Endl. pars.

Trithomanthe Wittst. vid. *Tritomanthe Link*.

Trithrinax Martius.... Palm. Bras. p. 149. t. 104; .... Palm. gen. p. 274: nov. g. Sabalinar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1760. p. 253; 1841. Ench. p. 136. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2292. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (267).
Kunth 1841. Enum. III. p. 247: g. Coryphinar.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 62: g. Coryphinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.
Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424: g. Sabalinear.

Tritica Adans. 1763. Fam. II. p. 35: sect. 5 Graminum. Gen.: Lolium, Triticum, Secale, Aegicon, Sitospelos, Hordeum.

Triticeae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 22: fam. Graminear. Gen.: Secale, Triticum, Agropyrum, Brachypodium, Trachynia, Gaudinia, Oreochloa, Catopodium, Wangenheimia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: trib. Scobiflorar. Subtrib.: Hordeaceae, Frumentaceae, Loliaceae.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 19: div. Graminear. Gen.: Gaudinia, Oreochloa, Catapodium, Trachynia, Brachypodium, Agropyrum, Triticum, Secale.
Rchb. 1837. Hdb. p. 146; 1841. Nom. p. 38: subdiv. Festucacear. Sect.: Rottbölliaceae, Loliaceae, Hordeaceae.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 160: trib. Graminear. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 436. 598. Gen. §. 1: Secale, Triticum, Agropyrum, Brachypodium. §. 2: Lolium, Gaudinia, Nardurus.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 422: subtrib. Poacear. Gen.: Nardus, Psilurus, Lepturus, Phacelurus, Aegilops, Hordeum, Elymus, Triticum, Brachypodium, Lolium.
Math. 1853. Belg. I. p. 627: trib. 6 Graminear. Sect.: *verae* (gen.: Triticum, Secale, Elymus, Hordeum, Gaudinia), Nardeae.

Triticum Tourn. 1700. Inst. p. 512. t. 292. 293: g. pl. class. XV, ab auctoribus varie modificatum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 285: g. pl. class. XIV.
Linn. 1737. Gen. p. 16. n. 44; 1737. Cliff. p. 24; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 21; 1753. Sp. I. p. 85; 1759. Syst. ed. X. p. 880. n. 94; 1762. Sp. ed. II. p. 126; 1764. Gen. ed. VI. p. 40. n. 99; 1767. Syst. ed. XII. p. 102: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 108; 1784. Syst. p. 126. — Reich. 1778. Gen. p. 41. n. 105. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 55. n. 130. — Gmel. 1791. Syst. p. 199. — Pers. 1797. Syst. p. 131; 1805. Ench. I. p. 109. n. 198. — Willd. 1797. Sp. I. p. 476. n. 152; 1809. En. p. 133. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 65; III. 2. t. 11. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 389. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 88. — Trin. 1820. Fund. p. 151. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 695. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 359; ed. 1832. I. p. 359.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 207: g. Graminum. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 118. — Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1802. Gram. austr. II. p. 17. t. 21—27; 1805. ibid. III. p. 18. t. 26—33. — Link 1821. En. I. p. 96. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 77. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 71. 356. Sect.: Triticum, Agropyrum, Micropyrum. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 112. Sect.: Eremopyrum, Agropyrum. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 70. n. 339.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 20. n. 81: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 174.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 405. — Juss. 1789. Gen. p. 32. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 106. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 83. — DC. 1805. Franç. III. p. 80; 1815. V. p. 281. — Hedw. 1806. Gen. p. 47. 364. — Palis. 1812. Agrost. p. 103. Distinguitur Agropyron. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 44. 761. n. 348. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 421 (*Froment*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 323. n. 328. — Link 1829. Hdb. I. p. 9. — Endl. 1833. Norf. p. 21. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 310.
Adans. 1763. Fam. II. p. 36: g. Triticor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 83: sect. Bromi.
Neck. 1790. El. III. p. 226. n. 1607: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 179; 1822. Syn. I. p. 235; 1830. Gram. p. 143; 1833. Agrost. p. 438: g. Hordeacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 173. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 97. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 445. Sect.: Triticum, Agropyrum. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Koch 1837. Syn. p. 823. Ed. II. p. 950. Sect.: Cerealia, Agro-

Triticum Tourn. cont.
pyra. — Endl. 1837. Gen. n. 913. p. 103; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Spelta, Agropyrum, Brachypodium. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 46. — Kunth 1838. Berol. II. p. 406. Sect.: legitima, Agropyra, Brachypodia. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 387. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1375. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 237. Subgen. ut Koch. — Steud. 1854. Glum. I. p. 341.
Link 1827. Hort. I. p. 23: g. Triticear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 21. — Link 1843. Linnaea XVII. p. 394. Sect.: genuina, Ctenopyrum, Agropyrum. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 427 (sect.: Cereale, Agropyrum); 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 335 (sect. eaed. et Eremopyrum, Anisopyrum). — Math. 1853. Belg. I. p. 630. (verar.) Sect.: Siligo, Agropyrum, Brachypodium. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 598. Sect.: Pseudo-secale, Eutriticum, Aegilops.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 854: g. Secalinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Frumentacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Hordear.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 426: g. Bromacear. (restrict.)
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 401: g. Hordeinear. Sect.: legitima, Agropyrum, Brachypodium.

Tritoma*) Ker 1805. Bot. Mag. t. 744. 758. 764.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 235; 1825. Syst. II. p. 74. n. 1220; 1830. Gen. I. p. 258. n. 1343: g. Liliacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1109.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Hyacinthear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1745: g. Asphodelear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 20: g. Aloinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Hemerocallear.
= Kniphofia Mönch.

Tritomanthe Link 1821. Enum. I. p. 333: g. Liliacear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 904 (*Trithomanthe*). — Par. Eckl. 1827. Verz. p. 2.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1405: g. Aletrinear.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XL. 629: g. Asphodelear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 347.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Yuccear.
= Kniphofia Mönch.

Tritomepterys A. Juss. vid. *Tritomopterys*.

Tritomium Link 1829. Handb. I. p. 170: g. Hyacinthinar. (Aloë Uvaria L.)
= Kniphofia Mönch.

*) τρίτομος, trisectus.

Tritomodon Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 584: nov. g. Ericacear. tribus incertae. (T. japonicus.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 713.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1114: g. Andromedear.
= Meisteria Sieb. & Zucc.

Tritomophyllum Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 107: grex Philodendri. (Ph. tripartitum Sch.)

Tritomopteris Wittst. vid. *seq.*

Tritomopterys „A. Juss. mss." Endl. 1840. Gen. n. 5564 *a*. p. 1058; 1841. Ench. p. 567: sect. Gaudichaudiae. — Par. A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 252. (*Tritomepterys*); 1843. Arch. Mus. III. p. 590. — Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7842. 1. — Walp. 1846. Rep. V. p. 344. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 904 (*Tritomopteris*).

Tritonia Bellend. Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 227: nov. g. Ensatar. (Gladiolus striatus Jacq.) *Cf.* Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 399.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 319: g. Gladiolear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58.
Link 1821. En. p. 52; 1829. Hdb. I. p. 219: g. Iridear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 383. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 154.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 154. n. 156; 1830. Gen. I. p. 38. n. 171: g. Spathacear.
Eckl. 1827. Verz. p. 29: g. Ixiacear.
= Montbretia DC.

Tritophus Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: nov. g. Kämpferiear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 22. n. 1624 *b*: sect. Kämpferiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167 (*Trilophus*): g. Zingiberacear.

Triumfetta*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 40. t. 8.
Linn. 1737. Gen. p. 344. n. 864; 1737. Cliff. p. 210; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 529. n. 243; 1748. Ups. p. 148: g. Polyandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125 (*Triumpfetta*): g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.
Linn. 1753. Sp. I. p. 444: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 232.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 137. t. 111.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5433 *a*; 1841. Nom. p. 210. n. 7971. 1: sect. Triumfettae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Sparmanniear.
= Lappula DC.

Triumfetta Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1044. n. 529; 1762. Sp. ed. II. p. 637; 1764. Gen. ed. VI. p. 239. n. 600; 1767. Syst. ed. XII. p. 327: g. Dodecandr. Monogyn., injuncta Bartramia emendat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 369; 1784. Syst. p. 444. — Reich. 1778. Gen. p. 245. n. 655. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 321. n. 819. —

*) In memoriam Io. Bapt. Triumfetti, Bononiensis.

Triumfetta Linn. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 750. — Pers. 1797. Syst. p. 476; 1807. Ench. II. p. 5. n. 1172. — Willd. 1799. Sp. II. p. 853. n. 944; 1809. En. p. 947. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 41. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 462.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 382.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 452.
Gled. 1764. Syst. p. 105. n. 431: g. Thalamostemonum.
Gmel. 1768. Nov. Comm. Ac. Petrop. XII. p. 511.
Hill 1769. Ht. kew. p. 344: g. Pentapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 273: g. Polyandrar.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 41.
Juss. 1789. Gen. p. 290: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 209. — Batsch 1802. Tab. p. 62. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 92. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 819; 1825. Syst. II. p. 450. n. 1758; 1830. Gen. I. p. 389. n. 1952. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 341. — Link 1822. En. II. p. 5. — Poir. 1822. Dict. 25. p. 274 (*Lappulier*). — Kunth 1824. Syn. III. p. 278. — DC. 1824. Pr. I. p. 506. Sect.: Lappula, Bartramea. — D. Don 1825. Nepal. p. 227. — St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 283. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 544. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 73. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 3. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 200. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 76. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 5.
Neck. 1790. El. II. p. 277. n. 1040: g. Catizophytor.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5433: g. Tiliear. Sect.: Triumfetta, Bartramia. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28). — Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7971. (genuinar.) Sect.: Triumfetta, Philyranthe. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 692. Sect. ut DC.
Endl. 1840. Gen. n. 5372. p. 1008; 1841. Ench. p. 522: g. Grewiear. Sect. ut DC. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 355. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 330.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.

Triumfettaria Rchb. 1837. Handl. p. 303: g. Sparmanniear.
= Bartramea DC.

Triumpfetta Gled. vid. *Triumfetta Plum.*

Triura „Sw." Endl. vid. *Tricera Schreb.*

Triuraceae Gardn. 1842. Linn. Trans. XIX. p. 160 (Bot. Zeit. 1844. p. 100): nova tribus Monocotyledonear. Gen.: Triuris, Peltophyllum.

Triuriaceae Miers .... Linn. Trans. XXI. p. 43; 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 326: ordo plant., post Fluviales collocandus. Divis.: Triurieae, Sciaphileae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 915.

Triuridaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 213: ordo Dictyogenar. Gen.: Triuris, Peltophyllum.
Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 21. p. 321: ordo plant. Gen.: Sciaphila.

Triurideae Benth. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 8. (Novae species generis Sciaphilae.)

Triurieae Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 327: div. Triuriacear. Gen.: Triuris, Hexuris. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 916.

Triuris Miers 1841. Ann. and Mag. n. h. VII. p. 222; 1842. Linn. Trans. XIX. p. 78: nov. genus novae familiae inter Burmanniaceas et Fluviales intermediae.
Endl. 1842. Spl. II. p. 23. n. $1664/_3$: g. Najadear.
Gardn. 1842. Linn. Trans. XIX. p. 160: g. Triuracear.
Meisn. 1843. Comm. p. 380: g. Potamogetear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 213: g. Triuridacear.
Miers 1851. Ann. and Mag. 2d. ser. VII. p. 327: g. Triuriear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 916.

Trixaginella Rchb. 1831. Fl. exc. p. 360: sect. Trixaginis. (Euphrasia latifolia L.)
Conf. Parentucellia Viv.

Trixago*) Hall. 1768. Hist. p. 109.
Mönch 1794. Meth. p. 398: g. Petalostemonis. (Stachys arvensis L.)
Link & Hoffmsg. 1809. Fl. portug. p. 66.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 373: g. Labiatar.
Rchb. 1838. Consp. p. 116. n. 2879 *a*: sect. Stachydis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Prunellear.
= Stachyotypus Benth. pt.

Trixago Steven 1823. Mém. soc. Mosc. VI. p. 4: nov. g. Personatar. (Rhinanthus Trixago, maximus, etc., Euphrasia latifolia et Bartsia viscosa.)
Link 1822. En. II. p. 134: g. Rhinanthacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 545. Ed. II. p. 627.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3086; 1831. Fl. exc. p. 360; 1841. Nom. p. 115. n. 4459: g. Pedicularinar. Sect. (1831); Trixaginella, Trixago.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 612: sect. Bartsiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4013 *b*. p. 694; 1841. Ench. p. 340. — Walp. 1845. Rep. III. p. 408.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272: g. Rhinanthear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 12. — Webb .... Canar. III. p. 150. Sect.: Lasiopera, Parentucellia.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 543: g. Bartsiear. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 259.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.

---

*) Nomen ex Plinio.

Trixago Steven cont.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 610: g. Scrophulariacear.
Synon. Bellardia All.; Lasiopera Link & Hoffmsg.

Trixeuxis „Lindl." Linnaea II. p. 530 sphalm. pro *Trizeuxis Lindl.*

Trixideae Cassini 1825. Dict. v. 34. p. 205; 1830. v. 60. p. 583: div. Nassauviear. Gen.: Dumerilia, Jungia, Martrasia, Lasiorrhiza; Leucheria, Trixis, Platycheilus, Perezia, Clarionea, Homoianthus, Drozia; Panphalea. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33. Gen. ut DC. et Drozia, Alcithoë, Prionanthes, Holocheilus.
D. Don 1830. Linn. Trans. XXI. 2. p. 186: trib. Labiatiflorar. Gen.: Trixis, Cleanthes, Proustia, Acourtia, Clarionia, Homoianthus, Leuceria, Ptilurus, Triptilion. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 170.
Less. 1830. Linnaea V. p. 6; 1832. Syn. p. 400: subtrib. Nassauviacear. Gen. 1830: Pamphalea, Cephalopappus, Leuchaeria, Lasiorrhiza, Dumerilia, Perezia, Trixis, Jungia, Moscharia et 1832 Ptilurus, Pleocarphus. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 54. Gen.: Jungia, Ptilurus, Leuceria, Chabraea; Clarionea, Perezia, Homoianthus, Acourtia, Dumerilia, Trixis, Pleocarphus, Moscharia, Dolichlasium; Pamphalea, Cephalopappus. — Endl. 1838. Gen. p. 490; 1841. Ench. p. 249. Gen.: Pamphalea, Cephalopappus, Pleocarphus, Pentanthus, Jungia, Moscharia, Leukeria, Lasiorrhiza, Ptilurus, Dumerilia, Trixis, Dolichlasium, Perezia, Acourtia; Calopappus, Cadiscus?, Pogonura? Accedunt 1842 (Spl. II. p. 49) Caloseris et 1843 (Spl. III. p. 71) Bowmannia. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (142). Gen. ut DC. et Cadiscus?, Pogonura? — Brongn. 1843. Én. genr. p. 35. Gen.: Moscharia, Leuceria.
Rchb. 1841. Nom. p. 96: subdiv. Barnadesiear. Gen. ut DC.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: subtrib. Nassaviacear. Gen. ut Endl. 1843.

Trixidium DC. 1836. Prodr. V. p. 506: sect. Clibadii. (Trixis erosa Sw. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 879 (*Thrixidium*). — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2462 *c.* p. 400; 1841. Ench. p. 237. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3003. 3.
Synon. Baillieria Cass.

Trixis Mitchell 1748. Act. Nat. Cur. VIII. App. p. 220: g. plant. (Triandr. Trigyn.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 115. t. 24. f. 8 (palustris).
= Proserpinaca Linn. (Linn. Amoen. ac. III. p. 9.)

Trixis P. Browne 1756. Jamaic. p. 312: nov. g. Syngenes. sect. 1.
Gmel. 1791. Syst. p. 1271: g. Syngenes. Polygam. Necessar. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2337. n. 1555. — Pers. 1807. Ench. II. p. 491. n. 1940.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Lag. 1811. Amen. nat. I. p. 35: g. Chaenanthophorar.

Trixis P. Browne cont.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 66: g. Labiatiflorar.
Cass. 1817. Dict. v. 8. p. 395: g. Nassauviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2280. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 137.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 555; 1826. Syst. III. p. 501. n. 2740; 1831. Gen. II. p. 622. n. 3090: g. Perdiciear.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 206; 1828. v. 55. p. 391; 1830. v. 60. p. 584: g. Trixidear. — Par. D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. p. 106. Sect.: propriae, Alcithoë. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 170. — Less. 1830. Linnaea V. p. 24; 1832. Syn. p. 413. Subgen. (1832): Cleanthes, Oligophyllon, Polyphyllon, Trixis. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 67. Sect.: Eutrixis, Cleanthes. — Endl. 1838. Gen. n. 2960. p. 492; 1841. Ench. p. 249. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (143). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3764. Sect.: Trixis, Cleanthes. — Walp. 1843. Rep. II. p. 682. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Synon. Castra Arrab. (Steud.)

Trixis Swartz 1788. Prodr. p. 7. 115; 1806. Fl. Ind. occ. III. p. 1374: g. Syngenes. Necessar. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 879 (*Thrixis*). — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 581. n. 1336.
= Oswalda Cass. et Trixidium DC.

Trixis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 414: subg. Trixidis.
= Eutrixidis DC. pars.

Trixostis Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 85): nov. g. Graminear. (Aristida gracilis.)

Trizeuxis Lindl. 1823. Collect. t. 2: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 732. n. 3012; 1831. Gen. II. p. 670. n. 3381. — Leman 1828. Dict. v. 55. p. 398.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530: *Trixeuxis*); 1833. Orchid. p. 140: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1530; 1841. Nom. p. 53. n. 2003. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1402. p. 196; 1841. Ench. p. 110. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.

Trizygia Royle 1834. Ill. bot. Himal. mount. V. 1. p. 29.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 114; 1846. Chlor. prot. p. LIII: g. Marsilaeacear.

Trochantha*) Bunge 1829. Mém. soc. Mosc. VII. (1824.) p. 207. 253: sect. Gentianae. (G. carinthiaca, rotata, etc.)
= Pleurogyne Eschsch.

Trochera Rich. 1779. Journ. Phys. XIII. p. 225. t. 3. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 399.
Palis. 1812. Agrost. p. 61: g. Graminear.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Oryzear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p.

*) τροχός, turbo.

Trochera Rich. cont.
181. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 961. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Oryzacear.
= Ehrharta Thunb.

Trochetia*) DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100. 106: nov. g. Dombeyear. (T. uniflora et triflora.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 202. n. 7687. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
DC. 1824. Pr. I. p. 499: g. Dombeyacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5317. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 537. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 454. — Meisn. 1837. Gen. p. 34 (27). — Endl. 1840. Gen. n. 5351. p. 1003; 1841. Ench. p. 520. — Walp. 1846. Rep. V. p. 114.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 80. n. 2413: g. Pentapetear.
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 399: g. Büttneriacear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 549. n. 2690: g. Büttnerear.

Trochila Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 367: nov. g. Patellariaceor. (Sphaeria Craterium DC.)

Trochiscanthes**) Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 103; 1836. Syn. p. 297. Ed. II. p. 327: nov. g. Seselinear. (Ligusticum nodiflorum Will.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3706; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5431. — DC. 1830. Pr. IV. p. 154. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 315. — Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4439. p. 776; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 958. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 704.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 21. 401: g. Umbellatar.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 469: g. Seselinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
Synon. Podopetalum Gaud.; Schnizleinia Steud. olim.

Trochiscia Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 592 (Syn. Diat. p. 64): nov. g. Desmidiacear. liberar. (Heterocarpellae sp. Turp.)
Menegh. 1838. Cenni p. 34; 1840. Linnaea XIV. p. 238: g. Desmidiear. (nudar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 647.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Closteriear.
= Scenedesmi, Sphaerastri etc. sp. Kütz.

Trochiscia Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 129; 1849. Sp. Alg. p. 162. n. 118: g. reconditum Desmidiear., Trochiscias priores excludens.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.

Trochocarpa R. Brown 1810. Prodr. I. p. 548. Ed. Nees p. 404: nov. g. Epacridear. (Styphelia cornifolia Rudge.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLII. 484. n. 777. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 660. n. 713; 1830. Gen. I. p. 138. n. 691. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 637.
Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3333: g. Stypheliacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Stenantherear.
Bartl. 1830. Ord. p. 158: g. Stypheliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 781. — Endl. 1839. Gen. n. 4276. p. 748; 1841. Ench. p. 367. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 758. — Meisn. 1839. Gen. p. 248 (156). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 433. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4795. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.

Trochocephalus Mertens & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 756: sect. Scabiosae. (Sc. ucranica, graminifolia, etc.) — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 182. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 447.

Trochodendreae Rchb. 1841. Nomencl. p. 192: sect. Illiciear. Gen.: Trochodendron.

Trochodendron Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 83. t. 39. 40: nov. g. Winteranear. (T. aralioides.)
Endl. 1839. Gen. n. 4744. p. 839; 1841. Ench. p. 428: g. Illicieis aff. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 747.
Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7297: g. Trochodendrear.
Meisn. 1843. Comm. p. 439: g. Winterear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 310: g. Magnoliacear.
Synon. Gymnanthus Jungh.

Trochopteris*) Gardn. 1842. Lond. journ. bot. I. p. 73: nov. g. Schizaeacear., Anemiae proximum. *Cf.* Meisn. Comm. p. 372. — Par J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 388.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 115: sect. Aneimiae.

Trochoseris „Pöpp. & Endl. mss." Endl. 1838. Gen. n. 3018. p. 500; 1841. Ench. p. 250: g. Lactucear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3702. (genuinar.) — Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 56. t. 268. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Synon. Macrorhynchus Less. (non Zool.); Macrorhynchium Rchb.

Trochostigma Sieb. & Zuccar. 1843. Abh. phys. math. Cl. Ak. Münch. III. p. 726: nov. g. Ternströmiacear.? — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 94. n. $5415/_1$.
Walp. 1846. Rep. V. p. 131: g. Sauraujear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424: g. Dillenear.
= Actinidia Lindl.

Trodylium Giseke vid. *Tordylium.*

Trogia**) Fries 1838. Epicr. p. 402; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 315: nov. g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 486. (genuinor.) — Lindl. 1847.

*) Dicat. R. G. Joach. Du Trochet.
**) τροχίσκος, parva rota.

*) τροχός, rota; πτερίς, filix.
**) Dicat. Trog, qui fungos Helvetiae illustravit.

Trogia Fries cont.
Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 196.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: g. Agaricineor.

Trollieae Rchb. 1837. Handb. p. 277: subsect. Helleborear. genuinar. Gen.: Trollius, Gaissenia, Aphanostema.

Trollius*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 149. Ed. Hall. 1745. p. 162: g. pl. class. VII.
Linn. 1753. Sp. I. p. 556; 1759. Syst. ed. X. p. 1087. n. 620; 1762. Sp. ed. II. p. 782; 1764. Gen. ed. VI. p. 282. n. 1700; 1767. Syst. ed. XII. p. 380: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 401. — Murr. 1774. Syst. p. 431; 1784. Syst. p. 518. — Reich. 1778. Gen. p. 286. n. 758. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 378. n. 954. — Gmel. 1791. Syst. p. 881. — Pers. 1797. Syst. p. 555; 1807. Ench. II. p. 106. n. 1364. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1333. n. 1087; 1809. En. p. 591. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 22.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 458.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 134. — Gis. 1792. Prael. p. 376. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 341.
Gled. 1764. Syst. p. 121. n. 499: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 313.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 190: g. Polyantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 360: g. Polypetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 259: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 233: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 59. — DC. 1805. Franç. IV. p. 906. — Link 1822. En. II. p. 97. — D. Don 1825. Nepal. p. 195. — Lois 1828. Dict. v. 55. p. 408. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 422. 560. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 300. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 336.
Neck. 1790. El. II. p. 293. n. 1060: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 46: g. Multisiliquosar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 489: g. Ranunculear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 734 (descisc.); 1825. Syst. II. p. 658. n. 2039; 1830. Gen. I. p. 460. n. 2268.
DC. 1818. Syst. I. p. 311; 1824. Pr. I. p. 45: g. Helleborear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 713. — Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4962. Sect.: Gaissenia, Trollius. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 44. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Koch 1836. Syn. p. 19. Ed. II. p. 21. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Kunth 1838. Berol. I. p. 23. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 27. — Endl. 1839. Gen. n. 4787. p. 848; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 49. — Walp. 1842. Rep. I. p. 47; 1843. II. p. 740. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 40. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 701. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 41. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 29.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Calthear.
Link 1831. Hdb. II. p. 387: g. Aconitear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 744: g. Helleborinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7250: g. Trolliear. (restrict.)
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 296: g. Calthinear.
Synon. Gaissenia Rafin.

Trombetta*) Adans. 1763. Fam. II. p. 6: g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 430.
= Pezizae Dill. pars.

Tromera „Massal. in litt.“ Arnold 1858. Flora II. p. 507: nov. g. Sarcogynear. (Peziza myriospora Hepp.)

Trommsdorffia**) Martius 1826. Nov. gen. II. p. 40. t. 139; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 308: nov. g. Amarantacear. *Cf.* Flora 1827. I. p. 107 (*Tromsdorfia*). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 267. — Steud. 1841. Nom. II. p. 721 (*Tromsdorffia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4354; 1841. Nom. p. 165. n. 6422: g. Gomphrenear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1955. p. 301; 1841. Ench. p. 185 (*Trommsdorfia*). — Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 350: sect. Alternantherae.

Trommsdorffia Dietr. vid. *Tromsdorffia Blume.*

Trommsdorfia Endl. vid. *Trommsdorffia Mart.*

Tromotriche***) Haworth 1812. Syn. succ. p. 36 (ed. Schrank 1819. p. 38); 1819. Suppl. p. 10: g. Pentandr. Digyn., a Stapelia sejunctum.
Schult. 1820. Syst. VI. p. 34: sect. Stapeliae. — Par. Link 1821. En. I. p. 256. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 840; 1830. Gen. I. p. 208. — Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *f*; 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 5. — Endl. 1838. Gen. n. 3524 *e*. p. 598; 1841. Ench. p. 300. — Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 657.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Stapeliear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 119.

Tromsdorffia†) Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 762: nov. g. Trichosporar. *Cf. Morsdorffia Steud.*
Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 434: g. Bignoniear.

*) Nomen primum a Gesnero e voce vernacula derivatum.

*) Vox italica.

**) Dicat. J. B. Trommsdorff, apud Erfortenses chemiae prof.

***) τρόμος, tremor.

†) Dicat. J. B. Tromsdorff.

Tromsdorffia Blume cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 656: g. Trichosporear.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 116 (Flora 1842. p. 217): g. Cyrtandrear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257 (*Tromsdorfia*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 581 (*Trommsdorffia*).
Endl. 1839. Gen. p. 716. n. 4136: g. Didymocarpear.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (211): g. Incarvillear. = Liebigia Endl.

Tromsdorffia Steud. vid. *Trommsdorffia Mart.*

Tromsdorfia Spach vid. *Tromsdorffia Blume.*

Tronicena *) Steud. 1841. Nomencl. bot. II. p. 721: g. Bignoniacear., pro Centronia mirabili Blume propositum.
= Centronota DC.

Tropaeolaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 366: ordo Malvalium. Trib.: Tropaeoleae, Limnantheae.

Tropaeoleae Juss. 1817. Mém. Mus. III. p. 447. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 55. p. 438.
DC. 1824. Pr. I. p. 683: ordo (47) Thalamiflorar. Gen.: Tropaeolum, Magallana. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 746. Gen. ead.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: div. Sapindacear. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 203; 1832. Fl. exc. p. 775; 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201: subdiv. Geraniear. Gen. ut DC. et 1841 Chymocarpus.
Bartl. 1830. Ord. p. 366: ordo (215) Malpighinar. Gen. ut DC.
Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo Geranialium.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 3: fam. (32) Malpighinear. Gen. ead.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 139: subordo Balsaminacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42): ordo Geranioidear. Gen. ead.
Endl. 1840. Gen. p. 1174; 1841. Ench. p. 627: ordo (258) Gruinalium. Gen. ead. et Chymocarpus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 82: fam. Geranioidear. Gen.: Tropaeolum, Chymocarpus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 367: trib. Tropaeolacear. Gen. ut Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 703: fam. a Geraniaceis separata. Gen. ead.
Chatin 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 283: fam. Malpighiaceis aff.

Tropaeolineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 41: fam. Vochysariear. Gen.: Tropaeolum, Magallana.

Tropaeolum **) Linn. 1737. Gen. p. 114. n. 323; 1737. Cliff. p. 143; 1740. Syst. p. 22; 1748. Ups. p. 93; 1753. Sp. I. p. 345; 1759. Syst. ed. X. p. 998. n. 421; 1762. Sp. ed. II. p. 490; 1764. Gen. ed. VI. p. 186. n. 466; 1767. Syst. ed. XII. p. 263. n. 461: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 295; 1784. Syst. p. 357. — Reich. 1778. Gen. p. 189. n. 502. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 249. n. 634. — Gmel. 1791. Syst. p. 605. — Pers. 1797. Syst. p. 381; 1805. Ench. I. p. 405. n. 915. — Willd. 1799. Sp. II. p. 298. n. 727; 1809. En. p. 407.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 82. n. 336: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Corydalium?
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Capparidum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Trihilatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 357. — Batsch 1802. Tab. p. 51.
Hill 1769. Ht. kew. p. 313: g. Pentapetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 292: g. Columniferar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 380. t. 79. f. 1 (majus).
Juss. 1789. Gen. p. 269: g. Geraniis aff.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 178.
Neck. 1790. El. III. p. 65. n. 1388: g. Amorphophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 174: g. Geranioideis aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 53: g. Geraniaceis aff. — Par. Juss. 1805. Dict. v. 6. p. 526 (*Capucine*). — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 250. — Kunth 1824. Syn. III. p. 235.
DC. 1805. Franç. IV. p. 853: g. Geranieis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 263. n. 1060: g. Geraniear.
Juss. 1817. Mém. Mus. III. p. 447: g. Tropaeolear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 683. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 224. n. 1466; 1830. Gen. I. p. 313. n. 1601. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII; 1828. Consp. p. 203. n. 5277; 1832. Fl. exc. p. 775; 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7669. — Bartl. 1830. Ord. p. 367. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 746. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 4. — Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42). — Endl. 1840. Gen. n. 6063. p. 1175; 1841. Ench. p. 627. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1283. — Walp. 1842. Rep. I. p. 465. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 82. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 367. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 397.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 795: g. Geranior.
Link 1821. En. I. p. 382: g. Geranioidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: g. Calycratear.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 95: g. Geraniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Tropaeolinear.
Link 1831. Hdb. II. p. 326: g. Cardamindear.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 22. t. 35—38.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. III. p. 145 (*Capucine*): g. Tropaeolacear.
Synon. Cardamindum Tourn.

*) Anagramma nominis Centronia.

**) Sic dictum, quia Hortulani solent pyramidulum reticulatum exstruere per quem scandat planta, dum lepide veterum repraesentat tropaeos seu statuas victoriales, uti folia clypeos et flores galeas auratas sanguine tinctas, hastaque pertusas repraesentant. (Ht. Cliff.)

Trophianthus Scheidweiler 1844 in Otto's Gartenz. Nr. 28. p. 218 (Bot. Zeit. 1844. p. 781): nov. g. Orchidear. (T. zonatus.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.?

Trophideae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 797: trib. Moracear. Gen.: Trophis.

Trophis *) P. Browne 1756. Jamaic. p. 357. t. 37. f. 1: nov. g. Dioec. sect. 1.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1289. 1381. n. 1173; 1763. Sp. ed. II. p. 1451; 1764. Gen. ed. VI. p. 516. n. 1103; 1767. Syst. ed. XII. p. 650: g. Dioec. Tetrandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 739; 1784. Syst. p. 882. — Reich. 1778. Gen. p. 513. n. 1207. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 679. n. 1502. — Swartz. 1791. Obs. p. 372. — Pers. 1797. Syst. p. 925; 1807. Ench. II. p. 612. n. 2200. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 733. n. 1770. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 388. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 760.
Gled. 1764. Syst. p. 27. n. 108: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 340: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 442: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 185. n. 900: g. Aclithrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 27. n. 108: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 883; 1826. Syst. III. p. 901. n. 3172: g. Thymelaear.?
Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 489: g. Coenosanthear.
Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1806: g. Urticear.? — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 439. — Bartl. 1830. Ord. p. 106. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 706. n. 3557. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 224.
Endl. 1837. Gen. n. 1871. p. 281; 1841. Ench. p. 168: g. Artocarpear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2545. — Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261).
Rchb. 1837. Hdb. p. 172: g. Cecropiear.?
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 38: g. Artocarpidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 797: g. Trophidear.
Synon. Bucephalon Plum.; Achymus Sol.; Streblus Lour.

Trophis Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 146: g. Morear. restrict. (T. americana L.) *Cf.* Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 668.

Trophospermum Walp. vid. *Taphrospermum C. A. Meyer.*

Tropidia Lindl. 1831 in Wall. Catal. n. 7386; 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1565. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2132. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 497; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1575. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 746.

*) Num a τροφίς, bene nutritus, pinguis?

Tropidia Lindl. cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.
Synon. Ptychochilus Schauer.

Tropidice Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 299: sect. Statices. (St. sinuata L. et collina n. sp.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 716.
= Goniolimon Boiss.

Tropidocarpon Dietr. vid. *seq.*

Tropidocarpum Hook. 1836. Icon. I. t. 43. 52.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 94: g. Sisymbrear.
Endl. 1839. Gen. n. 4907. p. 875; 1841. Ench. p. 450: g. Sisymbriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7032. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 167 (*Tropidocarpus*). — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 634 (*Tropidocarpon*). 701: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.

Tropidocarpus Walp. vid. *praeced.*

Tropidolepis Tausch 1829. Flora p. 68.
= Chiliotrichum Cass.

Tropocarpa D. Don mss.
= Orites R. Brown. (Meisn. in DC. Pr. XIV. 1. p. 423.)

Tros Haworth 1831. Mon. Narciss. p. 5: nov. g. Narcissinear. (Narcissus poculiformis Sal.) *Cf.* Kunth Enum. V. p. 721.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 438: subg. Narcissi.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 205: sect. Queltiae.
= Queltiae Herb. pars.

Trotula Comm. mss.
= Eunesaea Endl.

Troximeria Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 432: sect. Stylopappi. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 58. n. 3018/3 b. — Walp. 1843. Rep. II. p. 695.

Troximon *) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 360: nov. g. Ligulatar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 360. n. 1759: g. Syngenes. Aequal.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 579; 1826. Syst. III. p. 633. n. 2876: g. Cichorear., serius (1831. Gen. II. p. 647) ad Krigiam relatum.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 65: g. Scorzonerear. (verar.?) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hyoseridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2131. — Endl. 1838. Gen. n. 2982. p. 495; 1841. Ench. p. 249. — Walp. 1843. Rep. II. p. 685. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Leman 1828. Dict v. 55. p. 519: g. Cichoracear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 722 (*Troximum*).
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
= Troximon Nutt. et Cynthia D. Don.

Troximon Nuttall 1813 in Fras. Catal.; 1818. Gen. Am. II. p. 127: g. Syngenes. Polygam. Aequal. emend. (T. glaucum.)

*) τρώξιμος, edulis.

Troximon Nuttall cont.
Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 300. t. 104: g. Cichoracear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 251: g. Hieraciear. Par. Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Brongn. 1843. En. genr. p. 32.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 433: g. Lactucear. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 489. — Spach 1841. Vég. X. p. 6. (verar.)
Synon. Agoseris Rafin.

Troximon D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 309: g. Taraxacear. (T. dandelion Gärtn., glaucus et cuspidatus Pursh.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 142.
= Troximon Nutt. et Adopogon Neck.

Troximum Steud. vid. *Troximon Gärtn.*

Trujanoa*) La Llave & Lexarza 1825. Nov. veg. descr. II. p. 1: nov. g. Pentandr. Monogyn. (T. pinnata.) — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 179. n. 903. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.
Endl. 1841. Gen. n. 6895. p. 1333; 1841. Ench. p. 685: inter genera dubiae sedis.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (254): g. Jatrophear.?

Trullula Cesati 1850 in Klotzsch Herb. viv. mycol. Cent. XVII: nov. g. a Blennoria separatum.

Truncaria DC. 1828. Prodr. III. p. 106: nov. g. Lavoisierear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 736. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 205. — Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81). — Endl. 1840. Gen. n. 6182. p. 1208; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6693. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4610: g. Meriäniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1431: g. Melastomacear.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 111: g. Clidemiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 780.

Tryblidium**) Ehrenb. 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 100: g. Hysterior.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 420: g. Hymenomycetum angiosporor.
= Triblidium Rebent.

Tryblionella Smith 1855. . . . . nov. g. Diatomacear.

Trycalysia Spach vid. *Tricalysia Rich.*

Trygonanthus***) Endl. 1839. Gen. n. 4586 *hβ*. p. 802; 1841. Ench. p. 399: subsect. Psittacanthi.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2718. 2: sect. Psittacanthi.

Trymalina Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 280: subg. Trymalii. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 270.

Trymalium†) Fenzl 1837. Enum. pl. Hügel. p. 20: nov. g. Rhamnear. (Ceanothus spathulata Labill.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 348. — Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 185. — Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 279; 1858. Linnaea XXIX. p. 270. Subgen.: Eutrymalium, Trymalina. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 270. Subgen. ead.
Endl. 1840. Gen. n. 5744. p. 1102; 1841. Ench. p. 581: g. Pomaderrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5585: g. Pomatoderrear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 122: g. Phylicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Trymatococcus*) Pöppig & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 30. t. 142: nov. g. Artocarpear., Olmediae aff. (T. amazonicus.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1863/1. p. 1375; 1841. Ench. p. 168. — Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2537. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 349 (260).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear.
Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 142: g. Brosimear. — Par. Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 107.

Trymenium Lindl. 1853. Fol. Orchid. 14 Oct.: sect. Odontoglossi.

Tryocephalon Endl. in synon. Kyllingiae: vid. *Thryocephalon Forst.*

Tryocephalum Hedw. vid. *praeced.*

Trypetheliaceae Eschweil. 1824. Syst. Lich. p. 17: cohors 3 Lichenum. Gen.: Arthonia, Porothelium, Medusula, Ophthalmidium, Trypethelium, Astrothelium, Glyphis, Chiodecton, Conioloma.
Fries 1825. Pl. homon. p. 261: trib. Gasterothalamor. Gen.: Trypethelium, Astrothelium, Porodothion, Segestria. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 549. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 14; 1841. Ench. p. 10. Gen. p. 14; 1841. Ench. p. 10. Gen.: Sphaeromphale, Mycoporum, Astrothelium, Trypethelium.
Rchb. 1828. Consp. p. 20 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Gasterosporar. Divis.: Limborinae, Verrucarinae, Trypethelinae.
Rchb. 1841. Nom. p. 15: div. Gasterothalamar. Gen. ut Endl. et Parmentiera, Laurera.

Trypethelidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: rrib. Gasterothalamear. Gen. Trypheteliacear. Endl.

Trypethelieae Montagne 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: trib. Angiocarpor. Gen.: Porodothion, Sphaeromphale, Astrothelium, Trypethelium.

Trypethelina Fée 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 428: ordo Trypethelii.

Trypethelinae Rchb. 1828. Consp. p. 20: div. Trypetheliacear. Gen.: Sphaeromphale, Popodothion, Astrothelium, Trypethelium.

Trypethelium**) Spreng. 1804. Anleit. ed. 1. III. p. 350. t. 10. f. 95: nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 549.

---

*) Dicat. Valerio Trujano, Axuchitlanensi.
**) τρυβλίον, vasculum.
***) τρυγών, turtur.
†) τρυμαλία, foramen.

*) τρῦπα, foramen.
**) τρύπα, foramen; θηλή, mamilla.

Trypethelium Spreng. cont.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 58. 306. t. 4. f. 8. 9: g. Heterogeneor.
Achar. 1814. Syn. Lich. p. 104: g. Hyperogeneor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Pyrenulatar.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: g. Verrucariar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 78: g. Globigerear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 18: g. Trypetheliacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 261. — Endl. 1836. Gen. n. 154. p. 14; 1841. Ench. p. 10 (*Tripethelium*). — Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 533. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 154.
Meyer 1825. Flecht. p. 329: g. Myelocarpor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 248. n. 3368; 1831. Gen. II. p. 743. n. 3764.
Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 377: g. Trypethelinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71 (*Tripethelium*): g. Verrucariear.
Fée 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 410. (Monogr.) Ordines: Trypethelina, Amorphalia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50 (*Tripethelium*): g. Trypethelidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 351; 1849. ibid. XII. p. 712: g. Trypetheliear.
Synon. Bathelium Achar.; Ophthalmidium Eschw.; Ocellularia Meyer.

Tryphane „Fenzl" Rchb. 1841. Nomencl. p. 205. n. 7769: g. Minuartiear. *Cf.* Rchb. Icon. Cent. XV. t. 207. 208.
Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 346; 1843 in Endl. Spl. III. p. 92. n. 5227. 3: sect. Alsines. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 200.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 434: sect. Sabulinae. (Arenaria caespitosa Ehrh.)

Tryphasia Juss. vid. *Triphasia Lour.*

Tryphera*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 549: nov. g. Amaranthacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 552. — Endl. 1841. Spl. I. n. 1978/$_1$. p. 1377; 1841. Ench. p. 185 (dubium).
Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235): g. Gisekiear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6439: g. Celosiear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 423: g. Amarantaceis aff.

Tryphia Lindl. 1835. Botan. Regist. n. ser. VII. n. 1701; 1835. Orchid. gen. p. 333; ..... Bot. Mag. Comp. II. p. 209: nov. g. Ophrydear. (Orchis secunda Thunb.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1530. p. 210; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. 50. n. 1873. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Holotrichidar.

*) τρυφερός, tener, debilis.

Trypothallus Hook. 1845. Crypt. antarct. II. t. 194.
= Palmodictyon Kütz.

Tryptomene Walp. vid. *Thryptomene Endl.*

Trysanthus „Lour." Endl. in Synon. Euhydrocotyles: vid. *Trisanthus Lour.*

Tschudia Spreng. vid. *seq.*

Tschudya*) DC. 1828. Prodr. III. p. 155 (Mém. p. 58. t. 9): nov. g. Miconiear. (in Endl. Gen. Clidemiae insertum.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 767. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206 (*Tchudya*). — Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1376. 1450. — Crüger 1847. Linnaea XX. p. 102.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4621: g. Blakeacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 330: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 339. n. 1711 (*Tschudia*).
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 91: g. Clidemiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 773.

Tsia Adans. 1763. Fam. II. p. 450: g. Cistor.
= Thea Linn.

Tsiana Gmel. 1791. Syst. p. 9: g. Monandr. Monogyn.
= Costus Linn.

Tsiem-tani Adans. 1763. Fam. II. p. 303: g. Zizyphor.
= Rumphia Linn.

Tsinoma „Hernand. 1651. Mexic. p. 434. f. 3" Endl. 1838. Gen. n. 2582 *a α*. p. 420; 1841. Ench. p. 239; subsect. Euporophylli. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3217. 1 *a*.

Tsiovanna Rheede 1686. Malab. VI. p. 81. t. 47.
= Ophioxylon Linn.

Tsjerucanirum Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor. (Hort. Malab. VII. t. 2.)
= Cansjera Juss.?

Tsjinkin Adans 1763. Fam. II. p. 401: g. Malvar.
= Lagerströmia Linn.

Tsubaki Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 851 c. ic. (p. 850 *Tsubakki*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 399: g. Malvar.
= Camellia Linn.

Tsuga Endl. 1847. Syn. Conif. p. 83; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 6. n. 1804 *A I*: sect. Sapini. (*Piceae desciscentes Link; Micropeuce et Peucoides Spach.*) Subsect.: Micropeuce, Peucoides.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 344: subg. Abietis.
Schltd. 1858. Linnaea XXIX. p. 329: g. Coniferar.

Tsuja „Zucc." Brongn. 1843. Énum. genr. p. 136: sect. Abietis.
= praeced.?

Tsutsugi Miquel vid. *seq.*

Tsutsusi Kämpf. 1712. Amoen. exot. Fasc. V. p. 845. c. ic. in p. 1846.
Adans. 1763. Fam. II. p. 164: g. Vaccinior.

*) Dicat. cl. de Tschudy, scriptori de Coniferis, ejusque filio.

Tsutsusi Kämpf. cont.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 845: sect. Rhododendri. (Azalea indica L.) — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 726. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 120 (*Toutousi*). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1059 (*Tsutsugi*).
= Anthodendron Rchb.

Tuba Spach vid. *Tula Adans.*

Tubaea Endl. vid. *Jubaea HBK.*

Tubanthera Commers. mss.
= Colubrina Rich.

Tubelina Griseb. vid. *Jubelina A. Juss.*

Tuber Caesalp. 1583. De plant. lib. 3. (Linn. 1747. Class. plant. p. 7.)
= Melia Linn.

Tuber Tourn. 1700. Inst. p. 565. t. 333: g. pl. class. XVII. — Par. Mich. 1729. Nov. pl. gen. p. 221. t. 102.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 14: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 8: g. Fungor. — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 552. — Juss. 1789. Gen. p. 3. — Gmel. 1791. Syst. p. 1481. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 12. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 20. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 4. — Mart. 1817. Erlang. p. 395. (hypogaeor.)
Scop. 1772. Carn. II. p. 491: sect. Lycoperdi.
Wigg. 1780. Holsat. p. 109: g. Fungoidear.
Pers. 1797. Tent. p. 15: g. Sarcocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 126: g. Sarcocarpor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46.
Batsch 1802. Tab. p. 270: g. Fungoideor.
DC. 1805. Franç. II. p. 278: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 33: g. Gastromycor. — Par. Grev. 1823. Mem. Wern. soc. IV. 2. p. 345.
Nees 1816. Syst. p. 160; 1817. Überbl. p. 41: g. Sphaeroideor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Pisocarpior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 592: g. Tuberidear. Sect.: Tuber, Tartufa.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69; 1829. Anal. fam. p. 74: g. Tuberacear. — Par. Fries 1823. Syst. myc. II. p. 289. — Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 25; 1842. V. p. 27. 68; 1842. Mycol. p. 111.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 564: g. Tuberear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 400.
Fries 1825. Pl. homon. p. 129: g. Tuberaceor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181. — Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 223. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491; 1849. ibid. XII. p. 708. — Bonord. 1851. Hdb. p. 275. — Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 75. Subgen.: Vittadinion, Tuber. — Bail 1858. Syst. p. 47.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 415. n. 3465; 1831. Gen. II. p. 762. n. 3889: g. Angiogasterum.
Leman 1828. Dict. v. 55. p. 520 (*Truffe*): g. Lycoperdacear. — Par. L. R. & Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 380.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Vittad. 1831. Tuberac. p. 31: g. Tubereor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 350. p. 30; 1841. Ench. p. 17. — Rchb. 1841. Nom.

Tuber Tourn. cont.
p. 8. n. 332. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 247. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 437.
Corda 1841 in Sturm Flora III. H. 19. 20. p. 37. t. 13.
Synon. Aschion Wallr.; Lycoperdi sp. Linn.

Tubera Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 288: sect. Dendrocollae.
Lindl. 1833. Orchid. p. 240: sect. Aëridis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1493 *b*. p. 206; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2098. 2. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 696.

Tuberaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 79: fam. Tectigraniae. Gen.: Tuber, Uperhiza, Rhizoctonia.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 289: subordo Angiogastrum. Gen.: Tuber, Rhizopogon, Polygaster, Endogone.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Tuberariear. Gen.: Tuber, Rhizopogon, Polygaster, Endogone.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): fam. Sclerosporangiar. Sect.: Tuberacea, Erysibea, Sclerotiacea.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 25: fam. Hyphomycetum. Gen.: Tuber.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 26; 1842. Mycol. p. LXXXII. 108: fam. Dermatogasterum. Gen.: Hysterangium; Genea, Sphaerozosma, Balsamia, Rhizopogon, Tuber; Hydnocaryon.
Brongn. 1843. En. genr. p. 2: fam. Gasteromycetum.

Tuberacei Fries 1825. Pl. homon. p. 129: trib. Angiogastrum. Gen.: Tuber, Rhizopogon, Polygaster, Endogone.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: div. Gastromycetum. Gen.: Tuber et affinia.
Rchb. 1828. Consp. p. 10: div. Angiogastrum. Gen. ut Fries.
Vittad. 1831. Tuberac. (Mediol. in 4.)
Endl. 1836. Gen. p. 29; 1841. Ench. p. 17: trib. Angiogasterum. Subtrib.: Tuberei, Hymenogasterei.
Rchb. 1841. Nom. p. 8: subdiv. Sclerotiaceor. Sect.: Tuberei, Hymenogasteres.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 245: sect. Sclerotiaceor. Subsect. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: subordo Ascomycetum. Gen.: Tuber, Choiromyces, Pachyphlaeus, Hydnobolites, Balsamia, Picoa, Genea, Sphaerosoma, Endogone, Elaphomyces, Mylitta.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491; 1849. ibid. XII. p. 713: sect. Angiosarcor. Gen. ut Lindl. (exceptis Endogone et Mylitta) et Delastria.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 435: ordo Gasteromycetum. Divis.: Hymenogastrei, Tuberei, Endogonei.
Bonord. 1851. Hdb. p. 275: fam. Pyrenomycetum. Gen.: Tuber, Elaphomyces, Genea, Balsamia, Rhizopogon, Sphaerozosma.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 50: fam. Myelomycetum. Subord.: Onygenei,

Tuberacei Fries cont.
Elaphomycei, Sphaerozosmatinei, *genuini* (gen.: Hydnocystis, Genea, Stephensia, Vittadinion, Ensaluta; Balsamia, Hydnobolites, Hydnotria, Picoa, Choiromyces, Pachyphloeus, Pachyphlodes, Oogaster, Tulasneinia, Tuber, Lespiaultinia, Delastreia).
Bail 1858. Syst. p. 42: fam. Gasteromycetum. Gen.: Hydnocystis, Genea, Balsamia, Hydnobolites, Hydnotria, Genabea, Stephensia, Pachyphloeus, Tuber, Picoa, Choeromyces, Terfezia, Delastria.

Tuberaria Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 270: sect. Helianthemi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 120. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915 *g*; 1841. Nom. p. 188. n. 7190. 5. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 304. — Koch 1837. Syn. p. 80. Ed. II. p. 85. — Endl. 1839. Gen. n. 5059 *e*. p. 905; 1841. Ench. p. 467. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 235. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 172.
Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 364: g. Helianthemoidear.
Bernh. 1838. Flora II. p. 688: g. Cistacear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 45: g. Cistinear. — Par. Webb .... Canar. I. p. 120.

Tuberarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: ordo Sarcosporar. Fam.: Tuberaceae, Sclerotideae.

Tuberarium Dunal 1852 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 31: subsect. Pachystemoni. Sect.: Potatoe, Pterophyllum.

Tubercularei Fries 1825. Pl. homon. p. 173: trib. Tubercularinor. Gen.: Tubercularia, Atractium, Fusarium.

Tubercularia Wiggers 1780. Prim. flor. Holsat. p. 87: g. Aspidoferar. (Lichen ericetorum et fungiformis Web., byssoides L.)
= Baeomyces Pers.

Tubercularia Tode 1790. Fung. Meckl. p. 18: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 2. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1482. — Pers. 1796. Obs. myc. p. 78. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 19. 251.
Pers. 1797. Tent. p. 61: g. Lytothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 111: g. Sclerocarpor.
Rebent. 1804. Neom. p. 362: g. Lytothecior. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 51.
DC. 1805. Franç. II. p. 275; 1815. V. p. 109: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 34: g. Gastromycor.
Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 207.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 31: g. Mucedinum.
Nees 1816. Syst. p. 35; 1817. Überbl. p. 8: g. Sphaeromycor. coniophytor.
Mart. 1817. Erlang. p. 329: g. Coniomycetum. (suffultor.) — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 79. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 564. n. 3584; 1831. Gen. II. p. 784. n. 4067. (suffultor.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Tuberculariar. — Par. Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLI.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 547: g. Tubercularidar.

Tubercularia Tode cont.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Sclerotacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 548: g. Isariear.?
Link 1825. Spec. II. p. 99: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 174: g. Tubercullareor.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Tubercularlaceor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1040: g. Pulveraceor.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 88: g. Tubercularior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 163. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 149.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 463: g. Tubercularinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 207. p. 18; 1841. Ench. p. 13. — Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 32; 1839. III. p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 67. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 53. — Bonord. 1851. Hdb. p. 134.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 237: g. Sporomycetum perisporor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 4: g. Caeomacear. (*Tubercularia* et *Agyria Fries.*)
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 67; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 361: g. Dermateor.
Math. 1853. Belg. II. p. 416: g. Tuberculariear.
Synon. Tremellae sp. Linn.

Tubercularia Tode 1790. Meckl. t. 4. f. 32—34.
= Ditiola Fries.

Tubercularia Schreb. 1791. Gen. II. p. 767: sect. Lichenis. (*Herpes Hall.*, *Verrucaria Wigg.*, *Hoffm.*)
= Verrucaria Wigg.

Tubercularia Stackh. 1816. Nereis brit. Ed. alt. (*cf.* Spreng. N. Entd. I. p. 98 et Leman 1828. Dict. v. 56. p. 3): nov. g. Algar.
= . . . ?

Tuberculariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 75: fam. Tuberculariear. Gen.: Tubercularia, Volutella, Fusarium, Coryneum, Dicoccum, Schizoderma, Nemaspora, Fusidium, Stilbospora, Melanconium, Conoplea, Torula.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Anl. Mycol. p. XCIX. 159: fam. Basidiophoror. Gen.: Hymenula, Myrothecium, Phymatostroma, Melanostroma, Gliostroma, Dermosporium, Chroostroma, Crocysporium, Epicoccum; Dacryomyces, Periola, Chaetostroma, Fusarium, Tubercularia, Ditiola. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 147. Gen.: Crocysporium, Chaetostroma, Fusarium, Tubercularia, Blennoria.

Tuberculariacei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: div. Epiphytor. Gen.: Tubercularia, Fusarium, Aegerita, Dermosporium, Epicoccum

Tuberculariae Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 12: div. Sarcopodior. Gen.: Fusarium, Aegerita, Dermosporium, Melanconium, Didymosporium, Epicoccum, Tubercularia, Atractium, Epichysium, Stilbum.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLI: ordo Coniomycetum. Gen.: Aegerita, Fusarium, Atractium, Tubercularia.

Tubercularidae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 547 (p. 533 *Tubercularideae*): div. Protomycear. Gen.: Tubercularia.

Tubercularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: ordo Sarcosporar. Fam.: Uredineae, Tuberculariaceae.
Math 1853. Fl. Belg. II. p. 415: trib. Uredinear. Gen.: Periconia, Isaria, Aegerita, Tubercularia, Fusarium.

Tuberculariei Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 67: fam. Stromatosporor. Gen.: Tubercularia, Stilbum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: sect. Sarcopsideor. Gen.: Tubercularia, Ditiola, Ceratopodium, Cilicipodium, Hymenula, Aegerita, Epicoccum, Conisporium, Sphaerosporium, Crocisporium, Fusarium, Sphacelia, Selenosporium, Stromateria, Seimatosporium, Chroostoma, Coccularia, Gymnosporium?, Chromosporium?, Amphisporium?, Echinobotryum?, Coniothecium?, Blennoria?

Tubercularii Rchb. 1828. Consp. p. 4: div. Tubercularinor. Gen.: Fusarium, Atractium, Tubercularia.
= Tuberculareі Fries.

Tubercularii Rchb. 1837. Handb. p. 129: fam. Blastomycetum.
= Tubercularini Fries 1825.

Tubercularii Rchb. 1841. Nomencl. p. 2: fam. Coniomycetum. Sect.: Transitorii, Stilbosporei, Tubercularini. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 40. Sect. eaed.

Tubercularineae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Tremelloidear. Sect.: Dermosporea, Scoriadea, Tubercularinea.

Tubercularini Fries 1825. Pl. homon. p. 169: ordo Coniomycetum. Trib.: Cephalotrichei, Scoriadei, Dermosporii, Tuberculareі.
Rchb. 1828. Consp. p. 4: fam. Blastomycetum. Divis. eaed. (Tubercularii.)

Tubercularini Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 458: ordo Coniomycetum. Gen.: Tubercularia, Volutella, Fusarium, Blennoria, Coryneum, Dicoccum, Schizoderma.
Endl. 1836. Gen. p. 18; 1841. Ench. p. 13: subordo Gymnomycetum. Gen. ead.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 30; 1839. III. p. 32: fam. Hymenomycetum. Gen. (1838): Periola, Chaetostroma, Myrothecium, Hymenula, Dacryomyces, Tubercularia, Ditiola.
Rchb. 1841. Nom. p. 2: sect. Tubercularior. Gen.: Schizoderma, Myrothecium, Hymenula, Fusarium, Dacryomyces, Tubercularia, Chaetostroma, Periola, Selenocarpium, Ditiola, Chroostroma, Melanostroma, Phymatostroma, Gliostroma, Stromateria, Crocysporium, Epicoccum. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 49. Gen. ead. (excepto Selenocarpio) et Hypodermium.
Bonord. 1851. Hdb. p. 130: fam. Mycetinor. Gen. §. 1: Epitea, Epicoccum, Exosporium, Coryneum. §. 2: Periola, Aegerita, Cylindrodochium, Fusarium, Chaetostroma, Ditiola; Asterophora, Medusula, Tubercularia, Atractium, Dendrodochium, Selenosporium, Cephalodochium, Achroomyces, Placentaria.

Tubereae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 563: div. Angiogastrum. Gen.: Endogone, Polygaster, Rhizopogon, Tuber. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 400. Gen.: Rhizopogon, Tuber.

Tuberei Vittadini 1831. Monogr. Tub. p. 12.
Endl. 1836. Gen. p. 29; 1841. Ench. p. 17: subtrib. Tuberaceor. Gen.: Endogone, Polygaster, Picoa, Rhizopogon, Choiromyces, Tuber, Balsamia, Genea. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 8. Gen. ead. et Sphaerozosma.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 245: subsect. Tuberaceor. Gen.: Endogone, Picoa, Rhizopogon, Tuber, Balsamia, Genea.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 437: div. Tuberaceor. Gen.: Tuber, Choiromyces, Pachyphloeus, Delastrea, Hydnobolites, Balsamia, Picoa, Hydnocystis, Genea, Sphaerosoma.

Tuberideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 588. 592: div. Sarcothecear. Gen.: Tuber.

Tuberosa Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 430; 1791. Phil. Bot. II. p. 74.
= Polianthes Linn.

Tuberostylis Steetz 1853 in Seem. Fl. panam. p. 142. t. 29: nov. g. Eupatorinear.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 151: g. Eupatorinear.

Tubicaulis Cotta 1832. Dendrolith. p. 19: nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora Lit. II. p. 125.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 171. 453: g. Filicum foss. *Cf.* Flora 1848. p. 513.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 108; 1846. Chlor. prot. p. LI: caudex Filicis foss.

Tubifera Gmel. 1791. Syst. p. 1472: g. Fungor. (Tubulifera arachnoidea Fl. dan.)
= Tubulina Pers.

Tubifera DC. 1836. Prodr. V. p. 386: sect. Conyzae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2405 c. p. 390; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3582. 3.

Tubiferae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXX: series Lobiflorar. Fam.: Labiatae, Asperifoliae, Convolvulaceae.
Rchb. 1828. Consp. p. 115 (*Tubiflorae*); 1831. Fl. exc. p. 187 (p. 305 *Tubiflorae*): formatio Lobiflorar. Fam.: Labiatae, Asperifoliaceae, Convolvulaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 177; 1841. Nom. p. 104: formatio Fauciflorar. Fam. eaed.

Tubiferae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 23: cohors Incompletar. Nixus: Santales, Daphnales, Proteales, Laureales, Penaeales.

Tubiflora Gmel. 1791. Syst. p. 27: g. Diandr. Monogyn.
= Elytraria Michx.

Tubiflorae Batsch 1802. Tab. affin. p. 148: fam. Coronalium. Gen.: Tulbagia, Massonia, Narcissus, Pancratium.

Tubiflorae Agardh 1825. Class. pl. p. 11; 1826. Isis p. 586: class. Phanerocotyledonear. completar. hypogynar. monopetalar. Ord.: Plantagineae, Plumbagineae, Jasmineae, Polemoniaceae, Convolvulaceae; Primulaceae, Lentibulariae, Solanaceae, Personatae, Gentianeae, Apocyneae.
Bartl. 1830. Ord. p. 187: class. (35) Gymnoblastor. Ord.: Polemoniaceae, Hydroleaceae, Convolvulaceae, Cuscuteae, Solanaceae, Hydrophylleae, Borragineae.
Endl. 1839. Gen. p. 651; 1841. Ench. p. 322: class. (36) Acramphibryor. Gamopetalor. Ordines: Convolvulaceae (Erycibeae, Cuscuteae, Nolanaceae), Polemoniaceae, Hydrophylleae, Hydroleaceae, Solanaceae (Desfontaineae, Retziaceae).
Meisn. 1840. Gen. p. 272. 441 (178): class. 30 Diplochlamydear. Ord.: Cuscuteae, Diapensiaceae, Polemoniaceae, Hydroleaceae, Hydrophylleae, Convolvulaceae, Solanaceae, Nolanaceae, Erycibeae, Cordiaceae, Ehretiaceae, Borragineae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 26: class. (30) Dicotyledoneor. monopetalor. Fam. ut Bartl.

Tubiflorae Rchb. Consp. p. 115; Fl. exc. p. 305: vid. *Tubiferae Rchb.*

Tubiflorae Rchb. 1837. Handb. p. 177; 1841. Nomencl. p. 72: ordo Synpetalar. Formationes: Aggregatae, Campanaceae.

Tubiflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 15: class. III. Corolliflorar. Fam.: Oleineae, Verbenaceae, Asclepiadeae, Gentianaceae, Solanaceae, Personatae, Lentibularieae, Primulaceae, Globularieae, Plantagineae, Plumbagineae.

Tubilium Cassini 1817. Bull. soc. philom. Oct. p. 153; 1822. Dict. v. 23. p. 565; 1827. v. 49. p. 224; 1828. v. 56. p. 19; 1830. v. 60. p. 580: nov. g. Inulear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2462. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Less. 1832. Syn. p. 197. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27.
DC. 1836. Pr. V. p. 480: sect. Pulicariae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2434 *b*. p. 395; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3386. 2.
Synon. Decachaeta Jaub. & Sp.

Tubipora Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. V. (1751) p. 135: g. Lithophytor.

Tubo-Avellana Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 106; 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 213: sect. Coryli. (C. tubulosa W.)

Tubocytisus DC. 1825. Prodr. II. p. 155: sect. Cytisi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4029 *d*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 155. — Koch 1836. Syn. p. 155. Ed. II. p. 170. — Endl. 1840. Gen. n. 6505 *a*. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. —

Tubocytisus DC. cont.
Ledeb. 1842. Ross. I. p. 519. — (Gren. &) Godr. 1848. Franc. I. p. 361.
Synon. Viborgia Mönch; Chamaecytisus Link.

Tubodiscus Sond. vid. *Tulodiscus DC.*

Tubulacia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: ordo Flosculaciae. Fam.: Astereae, Heliantheae, Carduaceae, Echinopsideae, Calycereae, Dipsaceae.

Tubularia Tourn. 1700. Inst. p. 575. t. 342: g. pl. class. XVII.
Rouss. 1806. Fl. Calvad. teste Desv. Journ. bot. III. p. 144. (Ulva intestinalis, etc.)
= Enteromorpha Link.

Tubularieae Lamx. 1816. Polyp. flex. p. 237. *Cf.* Duj. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 335 sub Liagora.

Tubulatae Hill 1769. Hort. kew. p. 27: class. II. herbar. Typus: Tanacetum.

Tubulatae Scopoli 1777. Introd. p. 180: trib. XVI. plantar. Gentes: Luridae, Speciosae.

Tubulifera „Gmel." Endl. in synon. Tubulinae: vid. *Tubifera Gmel.*

Tubuliflorae DC. 1836. Prodr. V. p. 8: subordo Compositar. Trib.: Vernoniaceae, Eupatoriaceae, Asteroideae, Senecionideae, Cynareae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 356; 1841. Ench. p. 232. Trib. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 174 (122). Trib. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: subordo Asteracear. Trib. eaed.

Tubuliflorae Rchb. 1841. Nomencl. p. 88: sect. Amphigynanthar. Divis.: Cotuleae, Gnaphalieae, Conyzeae.

Tubulina Pers. 1797. Tent. disp. p. 11: g. Dermatocarpi. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 31.
Pers. 1801. Syn. p. XV. 197: g. Gymnospermor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 49.
DC. 1805. Franç. II. p. 249: g. Angiocarpor.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 195: trib. Liceae.
Endl. 1836. Gen. n. 306 *c*. p. 26; 1841. Ench. p. 16: sect. Liceae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 355. 3.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 20; 1842. Mycol. p. 78: g. Physareor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 264: g. Trichiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Liceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 212: g. Liceaceor.
Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 140: g. Physariaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 393: g. Trichiear.
Synon. Tubulifera Fl. dan.; Tubifera Gmel.; Dermodium (Demordium) Link.

Tubulosae Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 375: div. Compositiflorar.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 146: trib. Compositar. Sect.: Cinarocephalae, Corymbiferae, Heliantheae.

Tubulosae Nardo 1835. Consid. gen. Alghe (Isis 1837. p. 90): fam. Ulvacear. Gen.: Vaucheria, etc.

Tuburcina Bonord. vid. *seq.*

Tuburcinia *) Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 439: nov. g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 216. p. 19; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 100.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 7; 1842. Mycol. p. 23: g. Sporotrichacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 497: g. Sepedoniaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 90 (*Tuburcina*): g. Psiloniaceor.
Synon. Rhizoctoniae et Sporotrichi sp. Auct.

Tuckermania Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 248: nov. g. Empetrear. (Empetrum Conradi Torr.)
= Oakesia Tuck.

Tuckermannia Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 363: nov. g. Coreopsidear. (T. maritima.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 43. n. 2529/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 355: g. Verbesinear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 156: g. Partheniear.

Tula Adans. 1763. Fam. II. p. 500: g. Aparinium.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXV. 355. n. 710: g. Pentandr. Monogyn.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 385: g. Rubiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2051: g. Cinchonear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 273.
DC. 1830. Pr. IV. p. 418: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 524. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Endl. 1838. Gen. n. 3242. p. 550; 1841. Ench. p. 273. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2877.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 273 (sph. *Tuba*): g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidear.

Tulasnea **) Naudin 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 142: nov. g. Melastomacear. (T. gracillima et foliosa.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 682: g. Lavoisierear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 276: g. Lasiandralium.

Tulasnea Wight Ic. pl. Ind. t. 1919. 1920 vid. *Dalzellia Wight.*

Tulasneinia Zobel 1854 in Corda Icon. Fung. VI. p. 64. t. 16: nov. g. Tuberaceor. (Tuber niveum Desf.)
= Terfezia Tul.

*) „Ut prioris species omnes cognitae Fungos, hujus radices fungosas tuburcinantur."
**) Dicat. L. R. Tulasne.

Tulasnodea *) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 440: nov. g. Diplodermeor. (*Tulostoma Pers.*)

Tulbachia Dietr. vid. *Tulbagia Linn.*

Tulbaghia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 188. n. 1549: g. Gonoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 274: g. Spathacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 242; 1825. Syst. II. p. 27. n. 1181. — Eckl. 1827. Verz. p. 5. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LVIII. 993.
Link 1821. En. I. p. 310: g. Narcissinar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 164: g. Asphodelear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 51 (desciscens). — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 350. Sect.: Tulbaghia, Sarcopetalon.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1381: g. Alliacear., serius (ibid. p. 212 a) ad Gilliesieas relatum.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 255. n. 1327: g. Liliacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Galanthear.
Endl. 1837. Gen. n. 1159. p. 150; 1841. Ench. p. 84: g. Tulbaghiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 154; 1841. Nom. p. 49. n. 1817. — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302).
Kunth 1843. Enum. IV. p. 480: g. Allieis aff.
Avé-Lallem. 1845. Bull. Ac. Pet. III. p. 201. (Expos. specierum.)
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255: g. Alliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Anthericear.
= Tulbagia Linn.

Tulbaghieae Endl. 1837. Gen. p. 150; 1841. Ench. p. 84: fam. Anthericeis aff. Gen.: Tulbaghia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 154: subdiv. Asphodelear. Gen.: Gilliesia, Miersia, Tulbaghia.
Rchb. 1841. Nom. p. 49: subsect. Anthericear. Gen.: Tulbaghia.
Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302): trib. Asphodelear. Gen. id.

Tulbagia Linn. 1771. Mant. II. p. 148. n. 1300: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 262; 1784. Syst. p. 316. — Reich. 1778. Gen. p. 163. n. 435. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 215. n. 549. — Gmel. 1791. Syst. p. 535. — Pers. 1797. Syst. p. 335; 1805. Ench. I. p. 349. n. 779. — Willd. 1799. Sp. II. p. 33. n. 615; 1809. En. p. 349. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 272.
Scop. 1777. Intr. p. 85: g. Liliacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1030. 1090 (*Tulbachia*).
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 57. t. 16. f. 3 (inodora).
Juss. 1789. Gen. p. 54: g. Narcissor.
Batsch 1802. Tab. p. 148: g. Tubiflorar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 136: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 231. n. 940.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 181: g. Narcissear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 40.

*) Dicat. fratribus Tulasne.

Tulbagia Linn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Alliacear.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 907 (*Tulboghia*): g. Coronariar.
Synon. Tulbaghia Auct.

Tulboghia*) Wittst. vid. *praeced.*

Tulipa Tourn. 1700. Inst. p. 373. t. 199. 200: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 135. Ed. Hall. 1745. p. 149: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 91. n. 261; 1737. Cliff. p. 118; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 82; 1753. Sp. I. p. 305; 1759. Syst. ed. X. p. 980. n. 376; 1762. Sp. ed. II. p. 438; 1764. Gen. ed. VI. p. 165. n. 415; 1767. Syst. ed. XII. p. 241. n. 411: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 242. — Murr. 1774. Syst. p. 270; 1784. Syst. p. 325. — Reich. 1778. Gen. p. 168. n. 448. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 320. n. 563. — Gmel. 1791. Syst. p. 547. — Pers. 1797. Syst. p. 346; 1805. Ench. I. p. 360. n. 797. — Willd. 1799. Sp. II. p. 96. n. 633; 1809. En. p. 365. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 328. — Gaud. 1828. Helv. II. n. 469. 502.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 73. n. 306: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 301.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Liliacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 83. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 118. — DC. 1805. Franç. III. p. 199; 1815. V. p. 313. — Hedw. 1806. Gen. p. 245. n. 996. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 232; 1825. Syst. II. p. 62. n. 1209; 1830. Gen. I. p. 268. n. 1398. — Link 1821. En. I. p. 323. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 173. — Juss. 1823. Dict. v. 26. p. 414. — Eckl. 1827. Verz. p. 1. — Lois. 1828. Dict. v. 56. p. 42. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1153.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 48. — Juss. 1789. Gen. p. 48.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283. — Agdh. 1823. Aphor. p. 165. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 32.
Hill 1769. Ht. kew. p. 356: g. Hexapetalar. incompletar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 64. t. 17. f. 2 (hortensis).
Neck. 1790. El. III. p. 179. n. 1532: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 167: g. Gloriosar.
Batsch 1802. Tab. p. 141: g. Tulipacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 312 a. n. 1355 b; 1830. Fl. exc. p. 103; 1841. Nom. p. 48. n. 1752. — Link 1829. Hdb. I. p. 177. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXX. 374. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Bernh. 1835. Flora II. p. 597. — Endl. 1837. Gen. n. 1091. p. 140; 1841. Ench. p. 82. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 20. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 382. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 729. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 225. Sect.: Lanigera, Leiobulbos. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 134.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 334: g. Lilear.
Bellerm. 1816. Berl. Mag. VII. p. 57. (Historia.)
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Koch 1837. Syn. p. 707. Ed. II. p. 816: g. Tulipear. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 219. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 259. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204. — Math. 1853. Belg. I. p. 537.
Reboul 1851. Giorn. bot. it. II. p. 57. Sect.: Tulipanum, Dulipanum.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 176: g. Discospermear.

Tulipaceae Batsch 1802. Tab. affin. p. 141: fam. Campanalium. Gen.: Tulipa, Fritillaria, Imperialis, Eucomis, Erythronium.
Rchb. 1828. Consp. p. 65; 1830. Fl. exc. p. 102: div. Coronariar. Gen.: Rhabdocrinum, Fritillaria, Petilium, Lilium, Tulipa. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 154. Subdivis.: Alströmerieae, Methoniceae, Tulipeae.
Link 1829. Hdb. I. p. 177: subordo Liliacear. Gen.: Tulipa, Erythronium, Fritillaria, Lilium, Alströmeria, Gloriosa. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 139; 1841. Ench. p. 82. Gen.: Erythronium, Tulipa, Orithyia, Gagea, Lloydia, Calochortus, Fritillaria, Rhinopetalum, Lilium, Methonica. Accedit 1842 (Spl. II. p. 13) Bulbillaria. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 368. Gen. ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Liliacear. (restricta.) Gen.: Tulipa, Yucca. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 20. Gen. ex Bernh. et Yucca.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: div. Asphodelear. Gen.: Rhabdocrinum, Fritillaria, Lilium, Tulipa.
Bernh. 1835. Flora II. p. 593. Gen.: Methonica, Lilium, Amblirion, Fritillaria, Calochortus, Lloydia, Gagea, Tulipa, Erythronium; Rhinopetalum?
Rchb. 1841. Nom. p. 48: div. Liliacear. Gen. ut Endl. 1837 et Bulbillaria, Cyclobothra, Petilium.
Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305): trib. Asphodelear. Gen.: Tulipa, Orithyia, Erythronium, Lilium, Rhinopetalum, Fritillaria, Calochortus, Methonica.

Tulipanum Reboul 1851. Giorn. bot. it. II. p. 57: sect. Tulipae.

Tuliparia Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 477: sect. Magnoliae. (M. auriculata Lam.)
= Magnoliastri DC. pars.

Tulipastrum Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 481: nov. g. Magnolinear. (Magnolia acuminata L.)
Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7289. 3: sect. Magnoliae.
= Magnoliae Linn. pars.

*) Dicat. Tulbogh, gubernatori batavo in Promontorio Bonae Spei.

Tulipeae Koch 1837. Syn. p. 707. Ed. II. p. 816: trib. Liliacear. Gen.: Tulipa, Fritillaria, Lilium, Lloydia. — Par. Bernh. 1840. Flora II. p. 425. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 216. Gen.: Erythronium, Tulipa, Orithyia, Cyclobothra, Calochortus, Gagea, Bulbillaria, Lloydia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204. Gen.: Erythronium, Tulipa, Orithya, Gagea, Bulbillaria, Iphigenia, Plecostigma, Hornungia, Lloydia, Calochortus, Cyclobothra, Eucrinum, Fritillaria, Rhinopetalum, Lilium, Cardiocrinum, Clinostylis; Gloriosa?

Rchb. 1837. Hdb. p. 154: subdiv. Tulipacear.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 253. 257: trib. Asphodelear. Sect.: Tulipeae (gen. ut Kunth), Lilieae.

Math. 1853. Belg. I. p. 537: sect. Liliacear. Gen. ut Koch (excepta Lloydia).

Tulipiferå Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. catal. p. 612 c. ic.

Adans. 1763. Fam. II. p. 365: g. Anonar.

Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 39.

= Liriodendron Linn.

Tulipiferae Vent. 1799. Tabl. III. p. 68: ordo 2 class. XIII. Gen.: Euryandra, Drymis, Illicium, Magnolia, Liriodendrum.

Tullia*) Leavensw. 1830 in Sillim. Am. journ. XX. p. 343. t. 5: nov. g. Labiatar., Pycnanthemo aff. (T. pycnanthemoides.) *Cf.* Linnaea VII. Litt. p. 50.

Benth. 1834. Labiat. p. 327; 1848 in DC. Pr. XII. p. 187: sect. Pycnanthemi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3605 *a*. p. 616; 1841. Ench. p. 307. — Walp. 1845. Rep. III. p. 689.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 762: sect. Pychnanthemi.

Synon. Pycnanthemum Rich.

Tulocarpus Hook. & Arn. 1841. Bot. Beech. voy. p. 298. t. 63. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 909 (*Tylocarpus*).

Endl. 1841. Spl. I. n. 2478/1. p. 1381; 1841. Ench. p. 237. n. 2479/1: g. Melampodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3017. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 149.

= Guardiola Cerv. (A. Gray.)

Tulodiscus DC. 1837. Prodr. VI. p. 296: sect. Erechtitis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2790 *c*. p. 455 (*Tylodiscus*); 1841. Ench. p. 244. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3549. 3 (*Tylodiscus*). — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 524 (*Tubodiscus*).

Tulostoma Pers. 1797. Tent. disp. p. 6: g. Dermatocarpi.

Pers. 1801. Syn. p. XIV. 139: g. Trichospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 343. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 47.

GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 20. 256: g. Fungor.

DC. 1805. Franç. II. p. 268: g. Angiocarpor.

*) Dicat. Will. Tully.

Tulostoma Pers. cont.

Link 1809. Berl. Mag. III. p. 31: g. Gastromycor.

Nees 1816. Syst. p. 137; 1817. Überbl. p. 36: g. Dermatogasterum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 388.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Lycoperdor.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 586: g. Tulostomidear.

Agdh. 1821. Aphor. p. 124: g. Gasteromycetum.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Geoperdinear.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 557: g. Lycoperdinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 384.

Fries 1825. Pl. homon. p. 139: g. Lycoperdineor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 198.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Lycoperdeor. — Par. Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 41. — Endl. 1836. Gen. n. 332. p. 28; 1841. Ench. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 395. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 296.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1024: g. Trichogastrum. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.

Leman 1828. Dict. v. 56. p. 60: g. Lycoperdacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Lycoperdear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 97 (sphalm. *Tolustoma*): g. Orthomycetum.

Mont. 1842. Pl. cell. cub. p. 317: g. Trichogasterum. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 143.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 23; 1842. Mycol. p. 92: g. Lycoperdaceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 254. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 15.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505: g. Tulostomeor.

Synon. Diplostoma Link; Schizostoma Ehrenb.; Tylostoma Spreng. Conf. Tulasnodea Fries.

Tulostomei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505: trib. Lycoperdacear. Gen.: Tulostoma, Schizostoma, Calostoma?, Mitremyces?

Tulostomideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 566. 586: div. Gasteromycear. Gen.: Tulostoma.

Tulpia (ornithogaloides) Fisch. (Bot. Zeit. 1844. p. 544 in synon. Plecostigmatis pauciflori Turcz.) lege *Tulipa ornithogaloides Fisch.*

Tuna Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 395. t. 294—297.

= Opuntia Tourn.

Tunatea Gmel., St. Hil. vid. *Tounatea Aubl.*

Tunga*) Roxb. 1820. Fl. Ind. ed. Wall. I. p. 187 (Spreng. n. Entd. III. p. 96); ed. 1832. I. p. 183: nov. g. Triandr. Monogyn.

*) Nomen vernaculum.

Tunga Roxb. cont.
(T. triceps, laevigata et diandra. „An = Hypaelyptum Vahl?") — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 6. 133.
= Lipocarphae R. Brown et Hypolytri Rich. spec.

Tunica Rupp. 1718. Fl. jen. p. 105. Ed. Hall. 1745. p. 117: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 381: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.
Scop. 1772. Carn. I. p. 298: g. Decandr. Digyn. (barbata, prolifera, carthusianorum, plumaria, saxifraga, caryophyllus, arenaria, virginea.) — Par. Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 182.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 802: sect. Gypsophilae. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1542.
Koch 1836. Syn. p. 93. Ed. II. p. 102: g. Silenear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 147. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 124. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 184. Sect.: Gypsophiloides, Kohlrauschia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Dianthear. (genuinar.) — Par. A. Braun 1843. Flora p. 384. Sect.: Pseudogypsophila, Pseudosaponaria, Pseudodianthus, Kohlrauschia.
Fisch. & Meyer 1837. Ind. quart. sem. h. Petrop. p. 48: g. a Gypsophila distinguendum. *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 170.
Endl. 1840. Gen. n. 5244 c. p. 971; 1841. Ench. p. 506; 1843. Spl. III. p. 92: sect. Dianthi. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 286. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 228.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7822: g. Tunicear.
Jaub. & Spach 1842. Ill. pl. or. (Flora 1842. Lit. p. 65.) Subgen.: Pachypleura, Leptopleura, Imperatia.
Willk. . . . . Ic. pl. Hisp. 25: sect. Pseudodianthi. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 264.
Conf. Imperatia Mönch; Petrorhagia Ser.

Tunicastrum Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 184: sect. Gypsophilae. (G. cretica Sm.)

Tuniceae Rchb. 1841. Nomencl. p. 206: subsect. Dianthear. genuinar. Gen.: Velezia, Fiedleria, Tunica, Kohlrauschia, Dianthus.

Tuomeya*) Harvey 1858. Ner. bor. am. III. p. 64: nov. g. Lemaniear. (T. fluviatilis.)

Tupa**) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 700: nov. g. Lobeliacear. (Lobelia Tupa L.)
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 391: g. Lobeliear. Sect.: Eutupa, Tylomium. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 578. — Endl. 1841. Ench. p. 264. n. 3058/1. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3988. Sect.: Tupa, Tylomium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 378.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.
Synon. Tylomium Presl.

*) Dicat. prof. Tuomey.
**) Nomen vernaculum apud Chilenses.

Tupeia*) Chamisso & Schlechtend. 1828. Linnaea III. p. 203: nov. g. Loranthear., Lorantho aff. (Viscum antarcticum Forst.)
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1963: g. Viscinar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 804. n. 4159: g. Dioec. Tetrandr.
Meisn. 1838. Gen. p. 154 (111): g. Loranthacear. (?) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4585. p. 801; 1841. Ench. p. 399. *Cf.* Spl. I. p. 1415. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234. — Walp. 1843. Rep. II. p. 439; 1846. V. p. 937. — Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 87. Char. emend. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791. — Molkenb. 1852. Pl. Jungh. II. p. 117. (descisc.) — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 100.
Korth. 1838. Diss. de Tupeia: g. Santalacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2713: g. Viscear.

Tupeicava**) Pison. Brasil. t. 108. f. 2.
= Scoparia Linn. (citantibus Auctoribus nonnullis.)

Tupelo Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor.
= Nyssa Gronov.

Tupha Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 354: nov. g. Spongidiar. (Spongiae sp. Auct.)

Tupidanthus Hook. f. & Thoms. 1856. Bot. Mag. t. 4908: nov. g. Araliacear. (T. calyptratus.)

Tupistra Ker 1814. Bot. Mag. t. 1655: nov. g. Aroidear. (T. squalida.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 118. n. 1292. — Steud. 1841. Nom. II. p. 724.
Link 1821. En. I. p. 304: g. Acorinar.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 81: g. Asphodelear.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 780: g. Taccear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 264. n. 1376: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1123.
Blume 1834 in Hoev. & Vriese Tijdschr. I. p. 82. t. 3. f. c: g. Asparaginear. *Cf.* Isis 1840. p. 341.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 365: g. Acoracear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 142; 1841. Nom. p. 33. n. 1125: g. Tupistrear.
Endl. 1837. Gen. n. 1190. p. 156; 1841. Ench. p. 90: g. Aspidistrear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 18. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 48; 1850. Enum. V. p. 315. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 569.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210: g. Asparagear.
Synon. Turpistra Steud.

*) Dicat. peregrinatori Taheitensi.
**) Nomen in opere Pisoniano non invenio.

Tupistreae Rchb. 1837. Handb. 142: subdiv. Taccacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 33: subdiv. Taccear. Gen.: Rhodea, Tupistra, Aspidistra.

Turanga Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 322; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 498: sect. Populi.

Turaria „Molin. Chil. p. 35" Spreng. 1825. Syst. II. p. 260. n. 1687; 1830. Gen. I. p. 373. n. 1882: g. Styracear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1524.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3653: g. Mimusopear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 215: g. Diospyrear.
= Thuraria Molin.

Turbinaria Lamx. 1825. Dict. class. VII. p. 161.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 116: g. Fucacear. — Par. Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 145. — J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 264. — Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 212; 1858. Ner. bor. am. III. p. 121.
Endl. 1836. Gen. n. 121 *b*. p. 10; 1841. Ench. p. 8: sect. Sargassi.
A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 327: g. Fucoidear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 43. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 793.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): g. Sargassear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gen. p. 363; 1849. Sp. Alg. p. 621. n. 420.
Endl. 1843. Spl. III. p. 32. n. 122/8: g. Cystoseirear. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 165.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 75: g. Cystosirear.

Turbinaria Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 130: sect. Hyptidis.

Turbith *) Tausch 1843. Flora I. p. 343: nov. g. Scandicinear. (Seseli Turbith L.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 46. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133.
Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105): g. Seselinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4441. p. 776; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5433.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
= Tribula Hill.

Turczaninovia **) DC. 1836. Prodr. V. p. 257: nov. g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2304. p. 374 (*Turczaninowia*); 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (126). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 481.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31: g. Bellidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3285: g. Asterear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951 (*Turczaninowia*): g. Erigerear.

Turczaninowia Endl., Rchb., Schultz Bip., Ledeb. vid. *praeced.*

Turetta „Arrab." Steud. vid. *Turretta Fl. Flum.*

Turgenia *) Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 59: nov. g. Umbelliferar. (Caucalis latifolia L.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 501.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 80; 1836. Syn. p. 313. Ed. II. p. 344: g. Caucalinear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 361. — Rchb. 1828. Consp. p. 141. n. 3666; 1841. Nom. p. 139. n. 5370. — DC. 1830. Pr. IV. p. 217. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 361. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Endl. 1839. Gen. n. 4502. p. 786; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 979. — Brongn. 1843. En. genr. p. 113. — Walp. 1843. Rep. II. p. 421; 1846. V. p. 901. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 341. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 673.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 309: sect. Caucalidis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Caucalidear. — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 344. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 447; 1837. Hdb. p. 219: g. Caucalinar.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363: g. Caucalear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 384: g. Acanthospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Caucalinidar.

Turgeniopsis Boissier 1844. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 53: nov. g. Caucalinear. (Turgenia foeniculacea Fenzl.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 902.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Caucalinidar.
= Glochidotheca Fenzl.

Turgosea *) Haworth 1821. Revis. pl. succ. p. 14. 201: nov. g. Pentandr. Pentagyn. (Crassula tomentosa Thunb., linguaefolia Haw., etc.)
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4177 *b*: sect. Crassulae.
= Purgosea Haw.

Turia ***) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 165: nov. g. Monoec. Pentandr.
Gmel. 1791. Syst. p. 403: g. Pentandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 221: g. Cucurbitacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 124. — — Bartl. 1830. Ord. p. 274.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Benincasear.
DC. 1828. Pr. III. p. 303: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2750.

*) Nomen arabicum.
**) Dicat. Nic. de Turczaninow, botanico rossico.

*) Dicat. Al. Turgeneff.
**) Nomen errore typographico ortum.
***) *Turia* arabum.

Turia Forsk. cont.
— G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 30. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (92). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 187.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 14. 67: g. Momordicear. Sect.: Turia, Gijefa.
= Luffa Tourn.?

Turinia A. Juss. vid. *Turpinia Vent.*

Turnera *) Plumier 1703. Gen. p. 15. t. 12: nov. g. plant.
Linn. 1737. Gen. p. 87. n. 249; 1737. Cliff. p. 112; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 271; 1759. Syst. ed. X. p. 965. n. 338; 1762. Sp. ed. II. p. 387; 1764. Gen. ed. VI. p. 149. n. 376; 1767. Syst. ed. XII. p. 220. n. 373: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 245; 1784. Syst. p. 296. — Reich. 1778. Gen. p. 152. n. 407. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 201. n. 514. — Gmel. 1791. Syst. p. 503. — Pers. 1797. Syst. p. 315; 1805. Ench. I. p. 329. n. 736. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1503. n. 576; 1809. En. p. 330. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 204. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 32.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 264. n. 1092: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 281.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Onagrar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 452.
Hill 1769. Ht. kew. p. 197: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 210: g. Dumosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 366. t. 76. f. 3 (ulmifolia).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 233; 1789. Phil. Bot. I. p. 79.
Juss. 1789. Gen. p. 313: g. Portulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 138. — Hedw. 1806. Gen. p. 208. n. 856.
Neck. 1790. El. II. p. 112. n. 781: g. Plyrontophytor.
Vent. 1799. Tabl. IV. p. 26: g. ordinis incerti.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 24; 1815. Mém. Mus. II. p. 203: g. Loasear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 848; 1825. Syst. I. p. 940. n. 1116. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIII. 674. — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 94. (?) — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 127. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1007. (?)
Link 1821. En. I. p. 293: g. Capparidear.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 123: g. Turneracear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 406. — DC. 1828. Pr. III. p. 346. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 212. t. 119—124. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. — Bartl. 1830. Ord. p. 272. — Link 1831. Hdb. II. p. 47. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 67. — Meisn. 1838. Gen. p. 123 (89). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 5056. p. 915; 1841. Ench. p. 476. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 537. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 109. — Walp. 1843. Rep. II. p. 228; 1846. V. p. 782. — — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 603. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 347.
Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4237; 1837. Hdb. p. 232; 1841. Nom. p. 160. n. 6233: g. Turnerear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 232. n. 1220: g. Loaseis aff.
Synon. Pumilea P. Browne; Bohadschia Presl.

Turneraceae HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 123: sect. Loasear. Gen.: Turnera, Piriqueta. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 406.
DC. 1828. Pr. III. p. 345: ordo (83) Calyciflorar. Gen. ead. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 66. Gen. ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 42: fam. Turnerariear. Gen. ead.
Bartl. 1830. Ord. p. 271: ordo (153) Peponiferar. Gen. ead. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 123 (89). Gen. ead.
Link 1831. Hdb. II. p. 47: ordo 14 Perigynar. Gen.: Turnera.
Lindl. 1833. Nix. p. 18: ordo Passionalium.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 150) 1847. Veg. kd. p. 347: ordo Violalium. Gen. ut HBK.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 249: fam. (94) Peponiferar. Gen. ut Kunth.
Endl. 1839. Gen. p. 914; 1841. Ench. p. 475: ordo (193) Parietalium. Gen. ead. et Wormskioldia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 109: fam. Passiflorinear. Gen.: Turnera.
Seem. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 53 ordinem Passifloreis injungit.

Turnerarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: ordo Calypetalar. Fam.: Tamariscineae, Turneraceae, Paropsiaceae.

Turnereae Rchb. 1828. Consp. p. 160; 1837. Handb. p. 232; 1841. Nomencl. p. 160: div. Loasear. Gen.: Turnera, Piriqueta et 1841 Wormskioldia.

Turpinia *) Vent. 1803. Choix p. 31. t. 31; 1807. Mém. Inst. sc. phys. I. p. 3: nov. g. Rhamnor. (*des nerpruns.*)
DC. 1825. Pr. II. p. 3: g. Staphyleacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 382. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 3. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 394. — Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48). — Endl. 1840. Gen. n. 5671. p. 1084; 1841. Ench. p. 573. — Walp. 1842. Rep. I. p. 529; 1843. II. p. 826; 1846. V. p. 401. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 381. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 803 (sph. *Turinia*).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: g. Celastrinear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 156.

*) Dicat. Gull. Turnero, Anglo, auctori historiae plantarum Angliae.

*) Dicat. P. J. F. Turpin, botanico et pictori.

Turpinia Vent. cont.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 137: g. Rhamnear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 187. n. 946. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 832.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5264: g. Staphylacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. n. 7562: g. Staphylaeear.
Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 296. Injungitur Lacepedea. (*Synon. Triceraia Willd.*)
Synon. Dalrymplea Roxb.
Turpinia Pers. 1807. Ench. II. p. 314. n. 1729: g. Diadelph. Decandr.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 323. n. 2600: g. Leguminosar.
= Poiretia Vent.
Turpinia Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 13. t. 33: nov. g. Corymbiferar.
Willd. 1807. Berl. Mag. I. p. 140: g. Syngenes. Segregat.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 110: g. Carlinear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 554: g. Eupatorinar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 42: g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 374.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 499: g. Barnadesiear.
= Fulcaldea Poir.
Turpinia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170: nov. g. a Rhoë separat.
= Lobadium Rafin.
Turpinia La Llave & Lexarza 1824. Nov. veg. descr. I. p. 24: T. tomentosa.
= Eremosis DC.?
Turpistra Steud. Nom. ed. I: vid. *Tupistra Ker.*
Turraea*) Linn. 1771. Mantissa II. p. 150. n. 1306: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 332; 1784. Syst. p. 399. — Reich. 1778. Gen. p. 217. n. 574. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 285. n. 722. — Gmel. 1791. Syst. p. 679. — Pers. 1797. Syst. p. 427. — Willd. 1799. Sp. II. p. 555. n. 841.
Scop. 1777. Intr. p. 285: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 264: g. Meliar.
Cavan. 1789. Diss. VII. p. 360. t. 204. 205.
Neck. 1790. El. II. p. 431. n. 1259: g. Comizophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 357: g. Trihilatar.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 162: g. Meliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 43. — Pers. 1805. Ench. I. p. 468. n. 1063. — Hedw. 1806. Gen. p. 302. n. 1197. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 518. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 145. — Bartl. 1830. Ord. p. 356.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
Cram. 1803. Disp. p. 159 in Monadelph. Decandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 683; 1826. Syst. III. p. 69. n. 2394; 1831. Gen. II. p. 543. n. 2664: g. Meliear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 620. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1837. Hdb. p. 313; 1841. Nom. p. 212. n. 8055. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 217. t. 12. f. 3. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 678. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 182. — Meisn. 1837. Gen. p. 50(36). — Endl. 1840. Gen. n. 5519. p. 1048; 1841. Ench. p. 550. — Walp. 1842. Rep. I. p. 426; 1846. V. p. 373. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 80. 91. (restrict.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 386.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5509: g. Strigiliear.
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 177. Revisio generis.
Synon. Rutaea et Scyphostigma Röm.
Turretia Poir. vid. *Tourrettia Willd.*
Turretta Flor. Flum. V. t. 115: g. Isocandr. Monogyn. (racemosa) ex Steud. Nom. II. p. 725: *Turetta.*
Endl. 1841. Gen. p. 1334; 1841. Ench. p. 686 (*Turreta*): inter genera indescripta.
Turrigera Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 590: nov. g. Oxypetalar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.
Turrita „Clus." Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 351 in adnot.: nov. g. Siliquosar. (Arabis Turrita L.)
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1158; 1832. Fl. exc. p. 681; 1841. Nom. p. 181. n. 6999. 4: sect. Arabidis.
Turritella C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 18. 23: sect. Arabidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4854 *b*. p. 864; 1841. Ench. p. 448. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 249. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 99.
= seq.
Turritina Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1155; 1832. Fl. exc. p. 679; 1841. Nom. p. 181. n. 6999. 3: sect. Arabidis. (A. auriculata, saxatilis, serpyllifolia, stricta, etc.)
Synon. Turritella Meyer.
Turritis Tourn. 1700. Inst. p. 223: g. pl. class. V. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 71. Ed. Hall. 1745. p. 78.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucar. (Arabis thaliana et turrita L.)
= Arabidis Linn. sp.
Turritis Dillen. 1719. Nov. gen. p. 120. t. 6: g. emend.
Linn. 1737. Gen. p. 198. n. 546; 1737. Cliff. p. 339; 1740. Syst. p. 27; 1753. Sp. II. p. 666; 1759. Syst. ed. X. p. 1135. n. 733; 1763. Sp. ed. II. p. 930; 1764. Gen. ed. VI. p. 341. n. 819; 1767. Syst. ed. XII. p. 443: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 502; 1784. Syst. p. 600. — Reich. 1778. Gen. p. 342. n. 883. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 444. n. 1095. — Gmel. 1791. Syst. p. 987. — Pers. 1797. Syst. p. 638. — Willd. 1800. Sp. III. p. 542. n. 1244; 1809. En. p. 685.

*) Dicat. Georgio Turra, prof. quondam Patavino.

Turritis Dillen. cont.
— Nutt. 1818. Gen. II. p, 71. — Link 1822. En. II. p. 164.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 360: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 66. n. 273: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 256.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir. III. p. 263. — Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 35. — Hill 1769. Ht. kew. p. 172. 20. — Scop. 1772. Carn. II. p. 33; 1777. Intr. p. 317. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 495. — Pers. 1807. Ench. II. p. 205. n. 1574. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 713; 1825. Syst. II. p. 893. n. 2314; 1831. Gen. II. p. 521. n. 2565. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 416. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 305. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 633. 688. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 251.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 238. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 501. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 108. (Verm. bot. Schr. V. p. 49.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 676. — Lois. 1828. Dict. v. 55. p. 80.
Neck. 1790. El. III. p. 76. n. 1400: g. Styridophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 297. t. 143.
Rebent. 1804. Neom. p. 154: g. Hexandr. Monogyn.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 230; 1821. Syst. II. p. 211; 1824. Pr. I. p. 141: g. Arabidear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 46. — Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4793; 1832. Fl. exc. p. 681; 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 7002. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 160. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 13. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 40. — Koch 1836. Syn. p. 37. Ed. II. p. 40. — Meisn. 1837. Gen. p. 10 (10). — Kunth 1838. Berol. I. p. 41. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 78. — Endl. 1839. Gen. n. 4853. p. 864; 1841. Ench. p. 448. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 116. — Walp. 1842. Rep. I. p. 129. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 90.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Cardaminear.
Gaud. 1829. Helv. IV. g. 300: sect. Arabidis. — Simil. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 101.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Arabidar.
Tursenia *) Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 461. 480; 1830. v. 60. p. 582: nov. g. Baccharidear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29.

*) Dicat. Erland Tursen, scriptori de Anandria.

Tursenia Cassini cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2541: g. Baccharear.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Asterear.
= Baccharidis Linn. pars.
Tursonia „Cass.“ DC. in synon. Baccharidis: vid. *praeced.*
Turulia St. Hil. vid. *Touroulia Aubl.*
Tussaca *) Rafin. 1814. Déc. somiol.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 261; . . . . Journ. bot. IV. p. 270: nov. g. Orchidear. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 178.
= Goodyera R. Brown.
Tussaca Rchb. vid. *seq.*
Tussacia Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXXVII (*Tussaca*); 1828. Consp. p. 125. n. 3231: g. Gesnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Besleriear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4683 (*Tussaca*): g. Episciear.
Örsted 1858. Gesn. centroam. p . . . .: g. Hypocyrtear.
= Alloplectus Mart.
Tussacia „Willd. mss.“ Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. X. 57: g. dubium Hexandr. Monogyn. (T. elegans.)
Beer 1857. Fam. Brom. p. 21. 99: g. Tussaciar.
Tussacia Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360. 361: g. Cyrtandrear. (T. villosa et rupestris.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 740: g. Besleriear.
Tussaciae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 9. 20. 21: div. Lepidanthear. Gen.: Tussacia.
Tussilagineae Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 173; 1821. Dict. v. 20. p. 381; 1830. v. 60. p. 584: trib. 15 Synantherear. Gen.: Tussilago, Nardosmia, Petasites. — Simil. Bartl. 1830. Ord. p. 136. Gen. ead. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35. 276. Gen. ead. et Adenocaulon.
Rchb. 1828. Consp. p. 100: subdiv. Eupatorinar. Gen. ut Cass. et Hoppea.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Eupatorinear. Gen.: Tussilago, Petasites, Farfara.
Less. 1832. Syn. p. 158: subtrib. Eupatoriaceear. Gen. ut Cass. et Homogyne, Adenocaulon. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 204. Divis.: Petasiteae, Eutussilagineae. — Endl. 1838. Gen. p. 370; 1841. Ench. p. 233. Divis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). Divis. eaed. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 382. Gen.: Homogyne, Tussilago, Petasites. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46. Gen. ut Cass. et Homogyne.
Koch 1837. Syn. p. 349: trib. Corymbiferar. Gen.: Homogyne, Tussilago, Petasites.
Rchb. 1841. Nom. p. 86: subdiv. Senecionear. Gen. Eutussilaginear. DC.
Tussilago Tourn. 1700. Inst. p. 487. t. 276: g. pl. class. VIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 164. Ed. Hall. 1745. p. 176: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1720. Act. Ac. Par. p. 290: g. Corymbiferar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 472. — Math. 1853. Belg. I. p. 266.

*) Dicat. O. Rich. de Tussac, botanico anglico.

Tussilago Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 588.
Adans. 1763. Fam. II. p. 124: g. Jacobear.
Hill 1769. Ht. kew. p. 6: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. t. 170. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 215.
Neck. 1780. Act. Theod. Pal. IV. p. 209.
Neck. 1790. El. I. p. 7. n. 8: g. Actinophytor. Distinguuntur Thyrsanthema, Petasites, Atasites.
DC. 1805. Franç. IV. p. 158: sect. Tussilaginis. — Par. Gaud. 1829. Helv. V. p. 271.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 190; 1830. v. 60. p. 585: g. Tussilaginear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2249. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Less. 1832. Syn. p. 159. — Koch 1837. Syn. p. 349. Ed. II. p. 383. — Kunth 1838. Berol. I. p. 327. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 93. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 276. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3341. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 91.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 240: g. Asterear.
DC. 1836. Pr. V. p. 208: g. Eutussilaginear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2288. p. 371; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (125). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 470. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 185: g. Eupatoriear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 742: g. Asteroidear.
Synon. Farfara DC.

Tussilago Linn. 1737. Gen. p. 252. n. 648; 1737. Cliff. p. 411; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 259; 1753. Sp. II. p. 865; 1759. Syst. ed. X. p. 1214. n. 856; 1763. Sp. ed. II. p. 1213; 1764. Gen. ed. VI. p. 423. n. 952; 1767. Syst. ed. XII. p. 550: g. Syngenes. Polygam. Superfl., injuncto Petasite dilatatum. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 629; 1784. Syst. p. 755. — Reich. 1778. Gen. p. 420. n. 1032. — Lour. 1790. Coch. II. p. 502. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 554. n. 1289. — Gmel. 1791. Syst. p. 1224. — Pers. 1797. Syst. p. 795; 1807. Ench. II. p. 455. n. 1863. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1962. n. 1483; 1809. En. p. 873. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 165.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 140: g. Compositar. ord. 4.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 156. — Juss. 1789. Gen. p. 181. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 540. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 400. — DC. 1805. Franç. IV. p. 157; 1815. V. p. 471. Sect.: Farfara, Tussilago, Petasites. — Link 1822. En. II. p. 324.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.

Tussilago Linn. cont.
Gled. 1764. Syst. p. 254. n. 1052: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar.
Cram. 1803. Disp. p. 169 in Syngenes. Polygam. Aequal.
Rebent. 1804. Neom. p. 108: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 551; 1826. Syst. III. p. 466. n. 2723; 1831. Gen. II. p. 618. n. 3068: g. Eupatorinar. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 53.
Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 350: g. Eupatorinear. Sect.: Farfara, Petasites.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 518: g. Radiatar. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 178. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1350. 1469. Sect.: Farfara, Petasites, Nardosmia. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 12. 271. Sect.: Tussilago, Homogyne, Petasites.
Link 1829. Hdb. I. p. 726: g. Elichrysear.
= Tussilago et Petasites Tourn., Homogyne, Nardosmia, etc.

Tussilago Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 909: g. Jacobear. (T. japonica L.)
= Senecionis sp.

Tweedia *) Hook. & Arn. 1834. Journ. bot. I. p. 291: nov. g. Metastelmati aff. (Cynanchum birostratum Hook. & Arn.)
Hook. 1838. Bot. Mag. n. 3630: g. Asclepiadear.
Endl. 1838. Gen. n. 3451. p. 590; 1841. Ench. p. 298: g. Metastelmear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5003.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 53.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Gonolobear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 585: sect. Oxypetali.

Tydaea **) Decaisne 1848. Revue hortic. IX. p. 468: nov. g. Gesneriar.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. ibid. XXVII. p. 702. 771: g. Achimenear.
Regel 1854. Gartenflora III. p. 73.
Örsted 1858. Gesn. Centroam. p. 9 (*Tydea*): g. Euachimenear.
Synon. Giesleria Regel.

Tydea Planch., Örsted: vid. *praeced.*

Tylacantha ***) Endl. 1839. Gen. n. 3884. p. 672; 1841. Ench. p. 338: g. Hemimeridear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 5402. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 484. — Walp. 1845. Rep. III. p. 178. 958.
= Thylacantha Nees & Mart.

Tylanthus Reissek 1840 in Endl. Gen. n. 5739. p. 1101; 1841. Ench. p. 581: nov. g. Phylicear., ex Arnott (in Hook. journ. bot. III. p. 254) a Phylica non separandum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5579.

---

*) Dicat. James Tweedie, peregrinatori.
**) A nomine mythologico Τυδεύς.
***) Τύλη s. Τύλος, callus.

Tylanthus Reissek cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnaceae.
Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 128: g. Rhamnear.
Synon. Phylicae sect. Ericoideae DC.

Tylloma*) D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 238. 301: nov. g. Chaetantherear. (T. limbatum.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 174.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 797. n. 4132: g. Perdiciear.
Less. 1832. Syn. p. 116: subg. Chaetantherae.
Endl. 1838. Gen. n. 2921 *e.* p. 485; 1841. Ench. p. 248: sect. Chaetantherae.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 32: g. Eumutisiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 229 (141).

Tylocarpeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 390. 411; 1845. Phycol. germ. p. 308; 1849. Sp. Alg. p. 788: fam. Periblastear. Gen.: Tylocarpus (1849 Gymnogongrus), Oncotylus, Pachycarpus, Phyllotylus, Coccotylus, Phyllophora, Acanthotylus.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 159: trib. Gigartinear. Gen.: Stenogramma, Phyllophora, Gymnogongrus, Ahnfeltia.

Tylocarpus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 411; 1845. Phyc. germ. p. 308: nov. g. Tylocarpear.
Nägeli 1847. Alg. Syst.: g. Phyllophoracear. = Gymnogongrus Mart.

Tylocarpus Wittst. vid. *Tulocarpus Hook. & Arn.*

Tylochilus Nees . . . . in Preuss. Gartenb. Verh. VIII. p. 191. t. 3.
= Cyrtopodium R. Brown.

Tylodiscus Endl., Rchb. vid. *Tulodiscus DC.*

Tyloglossa Hochstett. 1843. Flora I. p. 72: nov. g. Gendarussear. — Par. Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 115.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 389: sect. Adhatodae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 830.

Tylomium**) Presl 1836. Prodr. mon. Lobel. p. 31: nov. g. Lobeliear. (Lobelia assurgens L., etc.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 394: sect. Tupae. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 264. n. 3058/1 *b.* — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3988. 2.

Tylophora R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 28 (Verm. bot. Schr. II. p. 365); 1810. Prodr. I. p. 460. Ed. Nees p. 316: nov. g. Asclepiadear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. VIII. 52. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1061. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 209. n. 1068. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 198. (verar.) — Dcne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 273. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 892.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 843: sect. Hoyae.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 184: g. Apocynear.
Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3417: g. Pergularinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Pergulariear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540. — Brongn. 1843. En. genr. p. 53. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 485.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 128: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3500. p. 595; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5037.
Dcne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Gonolobear.
Dcne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 606: g. Pergulariar. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 491.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Stapeliar.

Tylophoreae Endl. 1838. Gen. p. 595: sect. Hoyear. Gen.: Belostemma, Tylophora, Hoya, Pterostelma, Physostelma, Tenaris, Heterostemma, Cosmostigma, Marsdenia, Dischidia, Leptostemma, Stephanotis, Pergularia; Baxtera. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1398 et Ench. p. 299) Centrostemma, Asterostemma, Fockea et 1843 (Spl. III. p. 76) Pterygocarpus. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). Gen. ut Endl. 1841. — Rchb. 1841. Nom. p. 130. Gen. ead.

Tylostoma Spreng. 1827. Syst. IV. p. 524. n. 3502; 1831. Gen. II. p. 771. n. 3957: g. Dermatogasterum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 398: g. Sphaerogasterum.
Lév. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 164: g. Lycoperdeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: g. Tylostomeor.
= Tulostoma Pers.

Tylostomei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen.: Tylostoma, Schizostoma, Calostoma?, Mitremyces?, Riella; Suspicante?

Tylostylis Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VI: g. Orchidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1390. p. 195; 1841. Ench. p. 110: g. Epidendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1989. (genuinar.) — — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. . . . . Journ. Proc. Linn. soc. III. p. p. 51: sect. Eriae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 662.
Synon. Callostylis Blume.

Tylotaea***) Vogel 1839. Linnaea XIII. p. 312: sect. Bauhiniae.
Endl. 1841. Gen. n. 6789 *b.* p. 1317; 1841. Ench. p. 674: sect. Caulotreti. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6091. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 852.

*) τύλος, callus; λῶμα, margo.
**) τύλωμα, callus.

***) τυλωτός: ob stigma margine callosum.

Tympananthe *) Hasskarl 1847. Flora II. p. 757: nov. g. Asclepiadear., Araujae et Schubertiae proximum. (T. suberosa.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 507.
= Dictyanthus Decne.

Tympanidei „Fries" Endl. 1836. Gen. p. 33; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Phacidiaceor. Gen.: Tympanis, Lecanidion, Stegilla. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 7. Gen. ead. et Cryptodiscus.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 336: div. Cupulator. Gen.: Tympanis, Solenia.

Tympanis Tode 1790. Fung. Meckl. I. p. 23. t. 4. f. 37: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 185. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1460.
Pers. 1797. Tent. p. 58: g. Lytothecii.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 173; 1828. Elench. II. p. 17: g. Dermear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 572: g. Pezizear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 154. — Math. 1853. Belg. II. p. 272.
Fries 1825. Pl. homon. p. 114: g. Patellareor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 991: g. Cupulator.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 262: g. Patellarior.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 767. n. 3924: g. Pezizoideor. — Par. Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 40.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 423: g. Hymenomycetum angiosporor.
Endl. 1836. Gen. n. 380. p. 33; 1841. Ench. p. 19: g. Tympanideor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 282. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 336.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 399: g. Dichaenaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Cenangieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 205: g. Pezizeor.
Bail 1858. Syst. p. 60. t. 19: g. Cenangiaceor.

Tympanophora Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. III. t. 170.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 258; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIX: g. foss. incertae sedis.

Tympanospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: series Umbellatar. Trib. unica: Coriandreae.

Tyndaridea Harv. 1841. Man. Brit. Alg. p. 141: g. Confervear. (*Cf. Tendaridea Bory.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 664 b: g. Zygnemear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 132. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 745.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328 (Flora 1843. p. 93): g. Synsporear.

Tyndaridea Harv. cont.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . . : g. Conjugatear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 263: g. Confervacear.
= Zygnema et Zygogonium Kütz.

Typalia „Dennst." Endl. in synon. Rhetsae et Rchb. Nomencl. p. 186: vid. *Tipalia Dennst.*

Typha *) Tourn. 1700. Inst. p. 530. t. 301: g. pl. class. XV. — Par. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 324.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 307: g. pl. class. XIV.
Linn. 1737. Gen. p. 281. n. 707; 1737. Cliff. p. 439; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 971; 1759. Syst. ed. X. p. 1260. n. 924; 1763. Sp. ed. II. p. 1377; 1764. Gen. ed. VI. p. 479. n. 1040; 1767. Syst. ed. XII. p. 614: g. Monoec. Triandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 214. — Murr. 1774. Syst. p. 702; 1784. Syst. p. 841. — Reich. 1778. Gen. p. 474. n. 1131. — Lour. 1790. Coch. II. p. 552. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 620. n. 1401. — Pers. 1797. Syst. p. 884. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 197. n. 1634; 1809. En. p. 951. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 202. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 2. 19. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 566.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 260: g. Graminibus adfine.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 133: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 78. (spurior.)
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 13. n. 47: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 295.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Inundatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 39: g. Maïdum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calamariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 129. — Batsch 1802. Tab. p. 154. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 580.
Hill 1769. Ht. kew. p. 412: g. Staminear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 8. t. 2. f. 1 (latifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 25: g. Typhar. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 338. Ed. Nees p. 194. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 333.
Neck. 1790. El. III. p. 246. n. 1636: g. Chortodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 147: g. Triandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1784. Prodr. I. p. 14. — Rebent. 1804. Neom. p. 20.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 88: g. Typhoidear. — Par. Link 1822. En. II. p. 382; 1827. Hort. I. p. 369; 1829. Hdb. I. p. 132.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 60: g. Typhacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 147; 1815. V. p. 302. — Pers. 1807. Ench. II. p. 532. n. 2027. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 40. — Lois. 1823. Dict. v. 29. p. 303 (*Massette*). — Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 790; 1830. Fl. exc. p. 11. — Bartl. 1830. Ord. p. 70. — Koch 1837.

---

*) *τύμπανον* s. *τύμπανος*, tympanum.

*) *τύφης* Dioscoridis.

Typha Tourn. cont.
Syn. p. 681. Ed. II. p. 785. — Endl. 1837. Gen. n. 1709. p. 241; 1841. Ench. p. 132. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (268). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 19. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 126. — Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 3. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 24 (*Massette*). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 1. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 173.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 82: g. Typhinar. (verar.) — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 132. — Agdh. 1823. Aphor. p. 139. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 115.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 127: g. Aroidear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 475. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 238.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 890. n. 3154: g. Aroideis aff. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 249.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XX; 1841. Nom. p. 43. n. 1540: g. Typhear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66.
Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 189: g. Typhinear. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 99. — Kunth 1833. Berol. II. p. 303; 1843. Enum. III. p. 90. — Webb 1850. Canar. III. p. 291.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 701. n. 3536: g. Monoec. Monadelph.
Dupont 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 57.

Typhaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 60. t. 11: fam. plant. Gen.: Typha, Sparganium.
DC. 1805. Franç. III. p. 147: fam. (14) Monocotyledonum phanerogamar. Gen. ead. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 745. Gen. ead.
DC. 1819. Théor. élém. p. 249: ordo Endodogenar. phanerogamar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 38: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Sparganium, Platanaria, Typha.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: fam. Spadiciae.
Rchb. 1828. Consp. p. 45; 1830. Fl. exc. p. 11: fam. Helobiar. Gen. unicum: Typha.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65. 66: fam. Typharicar. Trib.: Typheae, Sparganieae.
Bartl. 1830. Ord. p. 69: ordo (47) Aroidear. Gen. ut St. Hil.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.; 1836. ed. II. p. 335: ordo Spadicear.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo unicus Typhalium.
Mart. 1835. Consp. p. 5.
Endl. 1837. Gen. p. 241; 1841. Ench. p. 131: ordo (73) Spadiciflorar. Gen. ut St. Hil. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 360 (268). Gen. ead. — Unger 1845. Syn. p. 178. Gen. foss.: Aethophyllum, Echinostachys, Typhaeloipum.
Koch 1837. Syn. p. 681. Ed. II. p. 785: ordo Endogenear. Gen. ut St. Hil.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 14: fam. Aroidear. Gen. ead. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 18. Gen. ead.

Typhaceae Jaume cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 126: ordo Aralium. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: fam. Spadiciflorar.
Synon. Typhae Juss.; Typhoideae Vent.; Typhinae verae Kunth; Typhineae Rich.; Sparganioideae Link; Typheae Rchb.

Typhaceae Rchb. 1837. Handb. p. 148; 1841. Nomencl. p. 43: fam. Ensatar. Divis.: Typheae, Sparganieae, Pandaneae.

Typhae Juss. 1789. Gen. p. 25: ordo 2 class. II. Gen.: Typha, Sparganium.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 338. Ed. Nees p. 194: sect. Aroidear. Gen. ead.
= Typhaceae St. Hil.

Typhaeloipum*) Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 180; 1846. Chlor. protog. p. LXIX: g. Typhacear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 136.

Typhalaea A. Rich. vid. *seq.*

Typhalea Necker 1790. Elem. bot. II. p. 412. n. 1234: nov. g. Omoplephytor., ab Urena L. sejunctum.
DC. 1824. Pr. I. p. 442: sect. Pavoniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5261 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 472. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 125 (*Typhalaea*).
Endl. 1840. Gen. n. 5275 *a a*. p. 981; 1841. Ench. p. 511; 1850. Spl. V. p. 58 (*Typhlaea*): subsect. Pavoniae.

Typhales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 35: nixus Imperfectar. Ordo: Typhaceae.

Typharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: ordo Spadicatar. Fam.: Acorineae, Typhaceae, Pandaneae.

Typheae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XX: fam. Helobiar. Gen.: Typha, Chrysithrix, Posidonia.

Typheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: trib. Typhacear. Gen.: Typha.
Rchb. 1837. Handb. p. 149; 1841. Nomencl. p. 43: div. Typhacear. Gen. id.

Typhella Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 304: sect. Typhulae. (T. fuscipes, personata, filiformis.)

Typhinae HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 82: ordo plant. Sect.: *verae* (gen. Typha), Pandaneae. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 132.
Agdh. 1823. Aphor. p. 139; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Glumiflorar. Gen.: Typha. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 115.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXX: div. Calamariar. Gen.: Typha, Sparganium.

Typhineae Rich. 1808. Anal. d. fr. (Ed. Voigt 1811. p. XIV): fam. Endorhizar.
Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 188: ordo pl. Gen.: Typha, Sparganium.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 99. Gen.: Typha.
Kunth 1838. Berol. II. p. 202; 1841. Enum. III. p. 88: fam. Monocotyledonum. Gen. ut Juss.
= Typhaceae St. Hil.

---

*) λοιπά τῆς τύφης, residua typhae.

Typhlaea Endl. vid. *Typhalea Neck.*

Typhoderma Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 558: nov. g. Byssidear. (Conferva typhoderma, sanguinea, pallida, lactea Dillw.)
= Hygrocrocis Agdh.

Typhodium Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 175. 177. 180: g. Mycetum. (Sphaeria typhina Pers.)
= Dothidea Fries.

Typhoideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 87: ordo 3 class. II. Gen.: Typha, Sparganium.
Link 1822. En. II. p. 382; 1827. Hort. I. p. 359: sect. Cyperoideae. Gen. ead.
Link 1829. Hdb. I. p. 132: subordo Cyperoidear. restrict. Gen.: Typha.
Conf. Typhaceae St. Hil.

Typhoides Mönch 1794. Meth. p. 201: nov. g. Thalamostemonis. (Phalaris arundinacea L.)
= Baldingera GMS.

Typhonium Schott 1829. Wien. Zeitschr. III. p. 72: nov. g. Aroidear. (Arum trilobatum L.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 53. — Par. Mart. 1831. Flora II. p. 455. — Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 367. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1088. (genuinar.)
Schott 1832. Melet. p. 17: g. Euaroidear. — Par. Blume 1835. Rumphia I. p. 129. Sect.: Typhonium, Calyptrocoryna. — Endl. 1837. Gen. n. 1677. p. 235; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 25. Sect. ut Blume. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 38.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 14: g. Colocasiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Dracunculear.
Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 10: g. Dracunculinar.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 17: g. Arinar. Sect.: Eutyphonium, Allomormon, Heterostalis, Calyptrocoryne. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 192.

Typhula Pers. 1801. Syn. p. XVIII; 1822. Mycol. eur. I. p. 188: sect. Clavariae, pro spec. 56—62 instituta.
Fries 1818. Obs. myc. II. p. 296: g. a Clavaria sejunctum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 194.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 494; 1828. Elench. I. p. 235: g. Clavator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 765. n. 3915. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 575: g. Clavariear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 303. Sect.: Typhella, Penicillaria.
Fries 1825. Pl. homon. p. 90: g. Clavulator. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 299. — Endl. 1836. Gen. n. 413. p. 35; 1841. Ench. p. 20.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Clavariacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41; 1842. Mycol. p. 171. — Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 725.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 529: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Fries 1838. Epicr. p. 584: g. Clavarieor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 317. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 339: g. Clavarineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 165: g. Clavariaceor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 19. t. 27.
Synon. Chordostylum Tode?; Cnazonaria Corda.

Tyrbaea*) „Moç. & Sesse Icon. mexic. ined." A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 127; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 298; 1844. Prodr. VIII. p. 123: sect. Ardisiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 19. — Endl. 1839. Gen. n. 4222 *d.* p. 736; 1841. Ench. p. 359. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4857. 4.

Tyria Klotzsch 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 88. n. 5787/3: nov. g. Acalyphear.
Baill. 1858. Ét. Euphorb. p. 506: g. Dysopsidear.

Tyria**) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 21: nov. g. Vacciniear. (Ceratostemma Salapa Benth.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1080.

Tyrimmus Bartl. vid. *seq.*

Tyrimnus Cassini 1818. Bull. soc. philom. Nov. p. 168: subg. Cardui. (C. leucographus.)
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 314. 335; 1828. v. 56. p. 207; 1830. v. 60. p. 572: g. Carduinear. (Archetypar. verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 458. — Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 334. (legitimar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2337: g. Carduinar. genuinar.
Bartl. 1839. Ord. p. 144 (*Tyrimmus*): g. Carduacear.
Less. 1832. Syn. p. 11: g. Silybear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 617. — Endl. 1838. Gen. n. 2880. p. 476; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 227 (141). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3758. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 203.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 245: g. Cynarocephalar.

Tyrtamia Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11. 12: g. Vitium class. I.

Tytonia***) G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 719: nov. g. Balsaminear. (Impatiens natans W. et Balsamina Madagascariensis DC.)
= Hydrocera Blume.

---

*) τύρβη, turba.
**) Tyria uxor Aegypti.
***) Dicat. Arth. Tyton, hortulano eximio.

U.

Uapaca Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 595: g. Wielandiidear.
Synon. Gymnocarpus Pet.-Th.

Ubiaea Gay 1847 in Rich. Fl. Abyssin. I. p. 447: nov. g. ex typo Schnittspahniae Schimperi Sch.

Ubium Rumph. 1747. Amboin. V. p. 364. t. 129.
Gmel. 1791. Syst. p. 839: g. Polyandr. Tetragyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 106: g. Smilacear.
= Roxburghia Jones.

Ucacea Cassini 1823. Dict. v. 27. p. 9: g. a Melanthera et Lipotriche diversum. (*Ucacou Adans.*)
= Blainvillea Cass.

Ucacou Adans. 1763. Fam. II. p. 131: g. Bidentum.
= Synedrella Gärtn.

Ucantha Duch. vid. *Ulantha Hook.*

Ucria*) Targioni ex Römer Arch. p. 70.
= Ambrosinia Bassi.

Ucriana Willd. 1797. Spec. I. p. 961. n. 348: g. Pentandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 609.
Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 465: g. Rubiacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 761. n. 823; 1830. Gen. I. p. 176. n. 890. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 798.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
= Tocoyena Aubl.

Udani „Rumph. V. t. 38" Adans. 1763. Fam. II. p. (22): g. Thymelaear.
= Quisqualis Linn.

Udora Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 242: nov. g. Dioec. Enneandr. (Elodea canadensis Michx.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 228.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 170. n. 184: g. Hydrocharidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 76. — Rchb. 1832. Fl. exc. Add. p. 139. — Koch 1837. Syn. p. 668. Ed. II. p. 771. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 193. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 4. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 99.
Endl. 1837. Gen. n. 1206. p. 161; 1841. Ench. p. 95: g. Anacharidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1151. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 47.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142: g. Vallisnerear.
Babingt. & Planch. 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 81 Anacharidi injungunt.
Conf. Elodea Rich.

*) Dicat. Bernh. de Ucria, botanico Palermit.

Udotea Lamx. . . . . Expos. méth. p. 27.
Menegh. 1838. Cenni p. 35: g. Siphonear.
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 679: g. Corallinear.
Dcne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92); 1842. ibid. XVIII. p. 105: g. Halymedear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 17. n. 47: g. Udotear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Codiear. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 502. n. 316. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 26.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Lamarckiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XII. p. 752: g. Halimedear.
Synon. Flabellaria Lamx.; Rhipidion Targ.; Rhipozonium Kütz.

Udoteae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 17: subtrib. Halymedear. Gen.: Udotea, Avrainvillea.

Udrolea Adans. 1763. Fam. II. p. (24): g. incertae familiae.
= Hydrolea Linn.

Übelinia Hochstett. 1841. Flora II. p. 664: nov. g. Drypidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7798: g. Arenariear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 79. n. $5251/_1$: g. Lychnidear. — Par. A. Braun 1843. Flora p. 366.
Meisn. 1843. Comm. p. 343: g. Silenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.

Ugena *) Cavan. 1801 (Anal. cienz. nat. Oct.) Icon. VI. p. 73. t. 594. 595: nov. g. Filicum. (Ophioglossum flexuosum L.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 230. — Par. Blanco 1837. Filipin. p. 822.
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 360: sect. Lygodii.
= Lygodium Swartz.

Ugni Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 579: nov. g. Myrtacear. Chymocarpicar. (Myrtus Ugni Mol.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 711.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 626: g. Myrtear.
Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 484: g. Pimentoidear.

Ugola Adans. 1763. Fam. II. p. 5: g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 231.
= Pezizae Dill. spec.

Ugona Adans. 1763. Fam. II. p. (22): g. Geranior.
= Hugonia Linn.

Uhdea Kunth 1847. Ind. sem. h. Berol.; 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 316: nov. g. Actinomeridi aff. (Polymnia grandis Hort.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 412: g. Silphiear.

Ula Rheede 1688. Malab. VII. t. 22.
= Gnetum Linn.

*) Dicat. Emanuelo Munozio de Ugena.

Ulantha *) Hook. . . . . . Bot. Mag. t. 2990.
Endl. 1837. Gen. p. 213. n. 1549: g. Neottiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2216. — Spach 1846. Veg. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 498; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1576.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 173 (*Ucantha*).

Ulassium Rumph. 1743. Amboin. III. t. 42. f. 23.
Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7455: g. Euphorbiacear. imperfecte notum.
= Echinus Lour.?

Ulek „Baumg." Walp. Repert. II. p. 955 et in Ind. IV. p. 785: vid. *Telekia Baumg.*

Ulex **) Linn. 1737. Gen. p. 220. n. 583; 1737. Cliff. p. 356; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 212; 1753. Sp. II. p. 741; 1759. Syst. ed. X. p. 1167. n. 786; 1763. Sp. ed. II. p. 1045; 1764. Gen. ed. VI. p. 379. n. 881; 1767. Syst. ed. XII. p. 476: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 539; 1784. Syst. p. 648. — Reich. 1778. Gen. p. 368. n. 932. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 488. n. 1169. — Gmel. 1791. Syst. p. 1093. — Pers. 1797. Syst. p. 686; 1807. Ench. II. p. 289. n. 1693. — Willd. 1800. Sp. III. p. 969. n. 1338; 1809. En. p. 746.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 134. n. 556: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 289.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 23; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 304. — Juss. 1789. Gen. p. 352. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 384. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1804. Dict. v. 1. p. 412 (*Ajonc*); 1805. Expos. II. p. 212. — DC. 1805. Franç. IV. p. 492; 1815. V. p. 546. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 594. — Link 1822. En. II. p. 226. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 225. n. 2531; 1831. Gen. II. p. 578. n. 2827. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 428. 464.
Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 308: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 26. n. 1332: g. Cyteophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 330. t. 151.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 481. 505: g. Monadelph. Decandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 747: g. Spartiear.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 144. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4033; 1832. Fl. exc. p. 518; 1841. Nom. p. 150. n. 5858.

Ulex Linn. cont.
(genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 148. — Spach 1834. Veg. phan. I. p. 197; 1841 in Orb. Dict. I. p. 234 (*Ajonc*). — Koch 1836. Syn. p. 151. Ed. II. p. 165. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6495. p. 1265; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 515. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127. — Webb 1846. Canar. II. p. 30. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 344. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 464.
Link 1831. Hdb. II. p. 147: g. Genistoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
Planch. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 210: revisio generis. Injungitur Stauracanthus.
Webb 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 288: g. Ulicinear. Disjungitur Nepa.
Synon. Genista-Spartium Tourn.

Ulicineae Webb 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 280: div. Genistear. Gen.: Stauracanthus, Nepa, Ulex.

Ulloa Pers. 1805. Ench. I. p. 218. n. 498: g. Solanacear.
Hedw. 1806. Gen. p. 123. n. 543: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 698. n. 750; 1830. Gen. I. p. 158. n. 792: g. Solanear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 409. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 694. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 58.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 476: g. Daturear.
= Juanulloa Ruiz & Pav.

Ullobus Endl. vid. *Ulolobus DC.*

Ullucus Lozano 1809 in Seman. nov. Gran. p. 185. (*Ullucu* Quitensium.)
DC. 1828. Pr. III. p. 360: g. Portulacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 304. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 122. n. 606. (Pentandr. Monogyn.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 80. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 233. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 591.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4308: g. Talinear.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352; 1838. ibid. II. p. 298: g. Calandriniear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94). — Endl. 1839. Gen. p. 952; 1841. Ench. p. 501 (penitus dubium, an potius Boussingaultiae sp.?) — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 753.
Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6348: g. Montiear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 501: g. Portulacacear.?
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 462: g. Basellear.
Synon. Melloca Lindl.; Gandola Moq.

Ulmaceae Briss.-Mirbel 1815. Élém. II. p. 905: fam. Dicotyledonum apetalar. Gen.: Ulmus, Celtis. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 234.

---

*) οὖλος, crispus.
**) Nomen ex Plinio.

Ulmaceae Briss.-Mirb. cont.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 249: fam. Monochlamydear. Gen.: Ulmus.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: fam. Thalamitegmiae.
Agdh. 1825. Aphor. p. 225; 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Epichlamydear. Trib.: Ulmeae, Chailletieae, Aquilarinae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (79) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 100: ordo (71) Amentacear. Divis.: Celtideae, Chailletieae. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 415. Gen.: Ulmus.
Lindl. 1833. Nix. p. 25: ordo unicus Ulmalium.
Mart. 1835. Consp. p. 14: ordo 75.
Endl. 1837. Gen. p. 275; 1841. Ench. p. 162: ordo (90) Juliflorar. Gen.: Planera, Ulmus. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 29) Zelkowa, Microptelea, Euptelea. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 351 (262). Gen. ut Endl. 1837. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 220; 1846. Chlor. prot. p. LXXIX. Gen. foss.: Ulmus, Ulminium.
Koch 1837. Syn. p. 637. Ed. II. p. 734: trib. Urticear. Gen.: Ulmus. — Par. Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 244. Subtrib.: Ulmideae, Celtideae. *Cf.* Griseb. 1849. Arch. f. Nat. II. p. 435, Bot. Zeit. 1850. p. 388 et Walp. Ann. bot. III. p. 423.
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 46; 1842. Vég. phan. XI. p. 95: fam. Amentacear. Trib.: Ulmideae, Celtideae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 580: ordo Rhamnalium. Trib.: Celteae, Ulmeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 795: fam. Urticinear. Trib. ut Spach.
Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 169: subordo Urticinear. Trib. eaed.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 308: ordo Urticinear.

Ulmales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 25: nixus Rectembryar. Ordo: Ulmaceae.

Ulmaria*) Tourn. 1700. Inst. p. 265. t. 141: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 90. Ed. Hall. 1745. p. 101: g. pl. class. V.
Hill 1769. Ht. kew. p. 213: g. Pentapetalar.
Mönch 1794. Meth. p. 663: g. Calycostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 589: sect. Spiraeae. — Par. Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 238. 378. — DC. 1825. Pr. II. p. 545. — Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4449 *a*; 1832. Fl. exc. p. 626. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 520. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 444. — Koch 1836. Syn. p. 208. Ed. II. p. 231. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 416. — Endl. 1840. Gen. n. 6391 *c*. p. 1247; 1841. Ench. p. 660. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 95. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 16.
Wenderoth 1846. Fl. hass. p. 152: g. Spiraeacear.

*) A foliorum forma Gesnero sic dicta.

Ulmariae Vent. 1799. Tabl. III. p. 351: sect. Rosacear. Gen. unicum: Spiraea.
DC. 1805. Franç. IV. p. 477: ordo Rosacear. Gen. id.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 588: fam. Calyciflorar. Gen. id.

Ulmarieae Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 103 (72): subtrib. Spiraeacear. Gen.: Pyrenaria?, Spiraea, Neillia, Adenilema, Adenostoma, Keria, Purshia, Rhinanthera?, Anthodiscus?

Ulmeae Agardh 1825. Aphor. p. 225: trib. Ulmacear. Gen.: Planera, Ulmus, Celtis, Mertensia. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 580. Gen. Ulmacear. Endl.
Dumort. 1827. Fl. belg. p. 25.
Rchb. 1828. Consp. p. 84; 1831. Fl. exc. p. 180: div. Urticacear. Gen.: Ulmus, Abelicea, Planera, Celtis; Didymeles. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 172; 1841. Nom. p. 68. Divis.: *genuinae* (gen.: Ulmus, Abelicea, Planera), Celtideae, Lacistemeae (1841 exclusae).
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 46; 1842. Vég. phan. XI. p. 99: div. Ulmidear. Gen.: Ulmus, Microptelea. — Par. Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 259. Gen.: Holoptelea, Ulmus. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 596. Gen. ead. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 423. Gen. ead. et Chaetoptelea.
Math. 1853. Belg. I. p. 479: sect. Betulinear. Gen.: Ulmus.

Ulmideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. Urticariear. Gen.: Ulmus, Planera.
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 46; 1842. Vég. phan. XI. p. 99: trib. Ulmacear. Divis.: Ulmeae, Planereae. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 796. Divis. eaed. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 169.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 258: subtrib. Ulmacear. Sect. ut Spach. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 423.

Ulminium Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 101. n. 4: g. lignor. foss. e classe Juliferar. *Cf.* Neues Jahrb. f. Miner. 1842. p. 174.
Unger 1843. Chlor. prot. p. 97. t. 25 (1846. p. LXXX); 1845. Syn. p. 221: g. Ulmacear. foss. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 33. n. $1850/_3$.

Ulmites Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 33. n. $1850/_2$: g. Ulmacear. foss.
Synon. Ulmus Ung.

Ulmus Tourn. 1700. Inst. p. 601. t. 372: g. pl. class. XX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 312: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 330 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 68. n. 194; 1737. Cliff. p. 83; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 225; 1759. Syst. ed. X. p. 950. n. 281; 1762. Sp. ed. II. p. 327; 1764. Gen. ed. VI. p. 123. n. 316; 1767. Syst. ed. XII. p. 198. n. 313: g. Pentandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 175. — Murr. 1774. Syst. p. 219; 1784. Syst. p. 265. — Reich. 1778. Gen. p. 128. n. 345. —

Ulmus Tourn. cont.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 173. n. 443. — Gmel. 1791. Syst. p. 456. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 56. t. 78; 1832. Ind. II. p. 66. — Pers. 1797. Syst. p. 278; 1805. Ench. I. p. 290. n. 652. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1324. n. 505; 1809. En. p. 294. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 201. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 13. 262.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 167: g. ord. 3 class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 46. n. 177: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 333.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: g. Statuminatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Amentacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 408. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 553. — Batsch 1802. Tab. p. 163. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 316. — DC. 1805. Franç. III. p. 315. — Hedw. 1806. Gen. p. 187. n. 772. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 352; 1825. Syst. I. p. 930. n. 1099; 1830. Gen. I. p. 228. n. 1195. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XXVI. 298. — Link 1821. En. I. p. 248. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 162. — Lois. 1825. Dict. v. 36. p. 346 (*Orme*). — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 418. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 991.
Adans. 1763. Fam. II. p. 377: g. Castanear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Scabridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 105: g. Incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 336: g. Defloratar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 224. t. 49. f. 5 (americana).
Neck. 1790. El. II. p. 173. n. 876: g. Aclithrophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 43 in Tetrandr. Digyn. (U. suberosa) et p. 96 in Octandr. Digyn. (effusa.)
Mirb. 1815. Élém. II. p. 905: g. Ulmacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 249. — Link 1831. Hdb. II. p. 446. — Koch 1837. Syn. p. 637. Ed. II. p. 734. — Endl. 1837. Gen. n. 1850. p. 276; 1841. Ench. p. 162; 1842. Spl. II. p. 29. — Kunth 1838. Berol. II. p. 191. — Meisn. 1842. Gen. p. 351 (262). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 330. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 196 (*Orme*). — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 646. Sect. ut Spach 1841. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 105.
Agdh. 1825. Aphor. p. 225: g. Ulmear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1827; 1831. Fl. exc. p. 180; 1841. Nom. p. 68. n. 2550. — Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 46; 1842. Vég. phan. XI. p. 99. Sect. (1842): Dryonoptelea, Oreoptelea. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 580. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 259. 267. Subgen.: Oreoptelea, Dryoptelea, Microptelea. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 424. Subgen. ead. — Math. 1853. Belg. I. p. 479.
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 328: g. Acerinear.

Ulmus Tourn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Ulmidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 101: g. Celtidear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 99.
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 359: revisio generis. Sect.: Dryoptelea, Oreoptelea.

Ulmus Unger 1843. Chlor. protog. p. 91. t. 24. 25 (1846. p. LXXIX); 1845. Syn. pl. foss. p. 220: g. foss. Ulmacear.
= Ulmites Endl.

Ulnaria Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 75; 1849. Spec. Alg. p. 43: sect. Synedrae.

Ulocladium *) Preuss 1841. Linnaea XXIV. p. 111: nov. g. Bactridiacear. (U. botrytis.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 283. 292: g. Dendrinor.

Ulocodium Massalongo 1855. Symmicta lich. p. 62: nov. g. Coenogoniear. (Byssus odorata.) *Cf.* Flora 1855. p. 374.
Körb. 1855. Syn. Lich. Germ. p. 394: g. Byssaceor.

Ulodendron Rhode 1820. Beitr. t. 3. f. t.
Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. I. p. 22. t. 5. 6.
Endl. 1836. Gen. n. 701. p. 70; 1841. Ench. p. 48: g. Lepidodendrear. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 134; 1846. Chlor. prot. p. LVIII. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 91.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 185: g. Lycopodiacitum.

Ulolobus DC. 1830. Prodr. IV. p. 457: sect. Guettardae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 552. — Endl. 1838. Gen. n. 3192 c. p. 540 (*Ullobus*); 1841. Ench. p. 272. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2842. 3.
Synon. Laugeria Fl. Peruv.

Uloptera Fenzl 1843. Flora p. 460: nov. g. Angelicear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. $4457/_1$. — Walp. 1846. Rep. V. p. 873.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Angelicidar.
Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 8. n. $4458/_1$ *b*: sect. Ferulaginis.

Ulospermum Link 1821. Enum. I. p. 267; nov. g. Umbelliferar.
Link 1829. Hdb. I. p. 342: g. Caucalidear.
= Krubera Hoffm.

Ulostoma *) D. Don 1837 in G. Don Gen. syst. IV. p. 196: nov. g. Gentianear. verar. (U. filamentosa.)
= Gentianae Linn. pars.

Ulota Mohr .... in Weber Tab. syn. Musc.: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 236. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 108.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 112: g. Peristomor. acrocarpor.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 298: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII g. Orthotrichoideor.)

---

*) οὖλος, solidus.
**) οὖλος, crispus.

Ulota Mohr cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 622: g. Orthotricheor. Sect.: Dorcadion, Blankana.
Endl. 1836. Gen. n. 510. p. 50; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 888: g. Calyptrobryor.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 91: sect. Orthotrichi. — Par. C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 711.
Synon. Blankara Adans.; Leiotheca Brid.

Ulothriceae Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p.....: subfam. Monocystear. Gen.: Lyngbya.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: trib. Confervinar.
Math. 1853. Belg. II. p. 513: trib. 19 Algar. Gen.: Draparnaldia, Bangia.

Ulothricheae Kütz. 1843. Phycol. gener. p. 251; 1845. Phycol. germ. p. 196; 1849. Spec. Alg. p. 345: fam. Confervinar. Gen.: Hormospora, Ulothrix, Schizogonium, Microthamnion, Stigeoclonium, Draparnaldia, Goniotrichum, Bangia, Schizomeris.

Ulothrix Kütz. 1833. Flora II. p. 517: nov. g. Confervacear. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 189.
Menegh. 1838. Cenni p. 30: g. Cadmear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 630.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90: g. Ulotrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 24.
Kütz. 1843. Phyc. gener. p. 251; 1845. Phyc. germ. p. 196; 1849. Sp. Alg. p. 345. n. 237: g. Ulothrichear. Sect.: Ulothrix, Hormidium.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p.....: g. Lyngbyear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XII. p. 756: g. Draparnaldiear. — Par. Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 222.
Synon. Humida Gray?; Lyngbya Hass.; Myxonema, Naemathrix et Myxothrix Fries ex parte.

Ulotricheae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90: fam. Dermatosiphear. Gen.: Ulothrix, Stygeoclonium. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 23. (entospermeor.) Gen. ead.

Ulotrichum Bruch & Schimp. .... Bryol. eur. III. p. III: g. Orthotrichacear.

Ulozygodon C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 668; 1849. Syn. Musc. I. p. 680: sect. Zygodontis. (Anoectangium lapponicum Hedw.)

Ulricia Jacq. ex Steud. Nom. II. p. 25. 728 (pyramidata).
= Lepechinia Willd.

Uluxia *) Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 103; 1827. v. 48. p. 219; 1828. v. 56. p. 239: g. Scrophularinear., pro *Columellia* Fl. peruv. propositum.
= Columellia Ruiz & Pav.

*) *Ullux* nomen vernaculum speciei.

Ulva *) Linn. 1737. Gen. p. 326. n. 803; 1737. Cliff. p. 478; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1163; 1759. Syst. ed. X. p. 1346. n. 1069; 1763. Sp. ed. II. p. 1632; 1764. Gen. ed. VI. p. 567. n. 1206; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 719: g. Algar. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Scop. 1772. Carn. II. p. 404. — Murr. 1774. Syst. p. 817; 1784. Syst. p. 972. — Reich. 1778. Gen. p. 562. n. 1322. — Thunb. 1784. Fl. japon. p. 346. — Lour. 1790. Coch. II. p. 687. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 768. n. 1670. — Gmel. 1791. Syst. p. 1391. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 1011. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 31. — Roth 1800. Germ. III. p. 532. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 15. 158. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 18. — DC. 1805. Franç. II. p. 6.
Gled. 1764. Syst. p. 300. n. 1207: g. Algacear. (vesicularium.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 449.
Scop. 1777. Intr. p. 61: g. Fucor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 6.
Neck. 1790. El. III. p. 351. n. 177: g. Athrosophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 267: g. Algoideor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45: g. Hypepidermidocarpor.
= Varia.

Ulva Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 242: g. Cyperor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 496.
= Carex Linn.

Ulva Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 277: g. emendat. Ulvacear. — Par. Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 117. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 240. — Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 401. Sect.: Porphyra, Ulva, Tetraspora, Prasiola, Solenia. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72; 1829. Anal. fam. p. 77. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 386. n. 3436; 1831. Gen. II. p. 755. n. 3841. — Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 188. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 372. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 86. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406; 1841. Brit. Alg. p. 170; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 265. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 180; 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XII. p. 756. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 117; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327. (Flora 1843. p. 92.) — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 296; 1845. Phyc. germ. p. 244; 1849. Sp. Alg. p. 474. n. 296. — Endl. 1843. Spl. III. p. 19. n. 58. Sect.: Enteromorpha, Ulvastrum. — Math. 1853. Belg. II. p. 502. Sect.: Ilea, Ulvastrum.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXI. 40; 1821. Aphor. p. 99: g. Ulvoidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 342. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 899. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 24: g. Phycoidator.

*) Ulva herba palustris Virgilio et Ovidio.

Ulva Lamx. cont.
Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: fam. Algar. Gen.: Phylloma, Trepposa, Zonaria.
D'Orb. 1820. Mém. Mus. VI. p. 80: g. Algar. marinar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 336: g. Ulvear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 479. Sect.: Porphyra, Phylloma, Tetraspora, Prasiola. — Endl. 1836. Gen. n. 86. p. 7; 1841. Ench. p. 6. Sect.: Ilea, Ulvastrum, Tetraspora. — Menegh. 1838. Cenni p. 36. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 692. (genuinar.) — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 21. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465); 1848. Alghe coccot. p. 101. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. Subgen.: Prasiola. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 135. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ... — Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 410. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 58. Sect.: Phycoseris, Ulva.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 67: g. Dermatoplynthior.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 368: g. Chlorosporear.
Synon. Phascon et Splachnon Adans.; Ramularia, Rouss.; Halithridax Targ.; Phylloma, Zonaria et Trepposa Link; Ulvastrum DC.

Ulva Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXXII. 188: g. restrict. Ulvacear. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 16.
= Ulvastrum DC.

Ulvaceae Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 275: ordo Thalassiophytor. non articulator. Gen.: Asperococcus, Ulva, Bryopsis, Caulerpa.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 117: sect. 3 Algar. Gen. §. 1: Laminaria, Delesseria, Claudea, Champia, Caulerpa, Bryopsis, Asperococcus, Ulva; §. 2: Dyctiopteris, Dyctiota, Flabellaria.
Agdh. 1822. Sp. Alg. I. p. 2. p. 399: ordo Algar. Gen.: Anadyomene, Ulva, Valonia, Alysium, Caulerpa, Bryopsis, Codium, Vaucheria; Polyphysa, Amphibolis. — Par. Agdh. 1824. Syst. p. XXX. 171 (1825. Cl. pl. p. 5; 1825. Isis p. 583). Gen. ead. et Solenia, Tetraspora, Porphyra. — Nardo 1835. Consid. Alghe. (Isis 1837. p. 90.) Fam.: Tubulosae, Codiaceae, Planae. — Endl. 1836. Gen. p. 7; 1841. Ench. p. 5. Subord.: Siphoneae, Ulveae. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465.) Subord.: Siphonoideae, Ulvoideae, Confervoideae, Lyngbyoideae, Nostochinoideae, Desmidioideae. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98. Subord.: Schimatothallae, Coccothallae, Trichothallae, Hymenothallae, Siphonothallae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: fam. Fartiniae. Gen.: Ulva.
Fries 1825. Pl. homon. p. 355: ordo Hydrophycar. Trib. (p. 340): Ulveae, Vaucherieae, Conferveae, Zygnemeae.

Ulvaceae Lamx. cont.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 192: subordo Algar. Gen.: Enteromorpha, Zonaria.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 314: fam. Algar. Gen.: Ulva, Scythymenia. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 755. Gen.: Ulva, Porphyra, Halymenia, Bangia. — Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p..... (globuliferar.) Gen.: Ulva, Merismopedia, Tetraspora, Hydrurus, Enteromorpha, Botrydium. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 128. Series: Hemicarpideae, Syngonimicae, Scirogonimicae.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 186: fam. Florideor. Gen.: Ulva, Caulerpa.
Rchb. 1828. Consp. p. 27: div. Confervacear. Subdivis. ut Fries 1825.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 372: ordo Symphysistear. Gen.: Flabellaria, Ulva, Caulerpa, Ilea, Bryopsis, Spongodium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: fam. Ulvariear. Gen.: Ulva, Dumontia, Scytosiphon, Bryopsis, Ilaea, Caulerpa, Bangia, Schizonema.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 86: trib. unica Platyydronematum. Gen. ut Spreng. 1827.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Arthrosporar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 135: fam. Gongylophycar. Divis.: Vaucherieae, Ulveae, Caulerpeae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. Divis.: Vaucherieae, Corallineae, Ulveae.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 405: trib. Chlorospermear. Gen.: Porphyra, Ulva, Enteromorpha, Palmella, Nostoc, Protococcus. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 12. 169. Gen.: Porphyra, Ulva, Bangia, Enteromorpha, Tetraspora, Palmella, Hydrurus, Haematococcus, Protococcus.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 179: trib. Phycear. Gen.: Anadyomene, Ulva, Enteromorpha, Valonia.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 117; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327. 333 (Flora 1843. p. 92): trib. Zoosporear. Gen.: Bangia, Stigonema, Enteromorpha, Ulva.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 14: trib. Zoospermear. Gen.: Bangia, Enteromorpha, Ulva, Porphyra. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. Gen. ead. et Tetraspora, Phyllactidium, Stigonema, Phycoseris.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 2: fam. Zoosporear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 18: subordo Confervacear. Gen.: Tetraspora, Bangia, Stigonema, Zignoa, Ulva, Porphyra.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phycol. gener. p. 294: fam. Dermatoblastear. Gen.: Phyllactidium, Protoderma, Prasiola, Ulva. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 242; 1849. Sp. Alg. p. 471. Gen.: Merismopoedia, Prasiola, Ulva.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 123: fam. Gonidiophycear. Sect.: Siphoneae, Corallineae, Ulveae. (*Synon. Dermatoblasteae et Coeloblasteae Kütz.*)
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 224: fam. Chlorosporear.

Ulvaceae Lamx. cont.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 385: subclass. Phycear. Ord.: Syntamiidae, Siphoneae. — Par. Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 357. Ord.: Phaeosporeae, Chlorosporeae.
Math. 1853. Belg. II. p. 502: trib. 14 Algar. Gen.: Ulva, Merismopoedia.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 51: ordo Chlorospermear. Trib.: Phorphyreae, Ulveae.

Ulvarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: ordo Thallosporar. Fam.: Laminariaceae, Ulvaceae.

Ulvastrum DC. 1830. Bot. gall. II. p. 958: sect. Ulvae. — Par. Endl. 1836. n. 86 *b.* p. 7; 1841. Ench. p. 6; 1843. Spl. III. p. 19. n. 58 *b.* — Math. 1853. Belg. II. p. 503.
Synon. Ulva Agdh. 1824; Phascon et Splachnon Adans.; Halithridax Targ.; Ramularia Rouss.; Phylloma Wigg.; Trepposa Link.

Ulveae Fries 1825. Pl. homon. p. 340: trib. Ulvacear. Gen.: Caulerpa, Ulva, Ilea, Valonia. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 52. Gen.: Enteromorpha, Ulva, Tetraspora.
Rchb. 1828. Consp. p. 27; 1837. Hdb. p. 135: div. Ulvacear. Gen. ead. et Scinaia? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. Subdivis.: Caulerpeae, *genuinae* (gen.: Bangia, Prasiola, Ilea, Tetraspora, Ulva, Porphyra). — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. (Syngonimicar.) Gen.: Porphyra, Ulva, Tetraspora, Enteromorpha, Bangia.
Endl. 1836. Gen. p. 7; 1841. Ench. p. 5: subordo Ulvacear. Gen.: Caulerpa, Alysium, Valonia, Ulva.
Menegh. 1838. Cenni p. 36: fam. Algar. Gen.: Ulva, Porphyra, Ilea, Tetraspora, Prasiola, Bangia.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. p. 50: trib. Ulvoidear. Gen.: Porphyra, Ulva, Zignoa, Tetraspora, Prasiola, Bangia. *Cf.* Flora 1843. p. 465.
Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 131: sect. Ulvacear. Subsect.: Bangieae, Enteromorpheae, *genuinae* (gen.: Protoderma, Phyllactidium, Prasiola, Ulva, Porphyra, Phycoseris, Diplostromium).
Nägeli 1847. Alg. Syst. p....: trib. Bangiacear. Gen.: Prasiola, Porphyra, Phycoseris, Ulva, Enteromorpha, Zignoa.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: trib. Hymenothallar. Gen.: Protoderma, Hapalidium, Phyllactidium, Prasiola, Porphyra, Ulva, Heterophycus.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 403: fam. Syntamiidar. Gen. ut Fries 1846. (Tetranema loco Tetrasporae.)

Ulvina Kütz. (Alg. aq. dulc. Dec. XII) 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phycol. gener. p. 149; 1845. Phycol. germ. p. 119; 1849. Spec. Alg. p. 147. n. 103: g. Cryptococcear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 3. — Math. 1853. Belg. II. p. 532.
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 589: g. Nostochinar. genuinar.?

Ulvoideae Agardh 1817. Syn. Alg. p. XIX. 40: sect. Algar. Gen.: Amansia, Zonaria, Dictyopteris, Asperococcus, Ulva, Caulerpa, Bryopsis, Vaucheria, Codium.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 342: div. Thalassiophytar. Gen.: Asperococcus, Ulva, Scytosiphon, Palmella, Merrettia, Olivia.
Agdh. 1821. Aphor. p. 99: ordo Algar. Gen.: Vaucheria, Codium, Bryopsis, Caulerpa, Ulva, Anadyomene, Amansia. — Par. Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. tab. Gen. vid. *Ulvaceae Agdh.* 1822.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 796: div. Algar. aquaticar. Gen.: Ulva.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): subordo Ulvacear. Trib.: Ulveae, Percursarieae.

Ulvoideo-Fucoideae Agardh 1820. Spec. Alg. I. Introd.: div. Fucoidear. Gen.: Laminaria, Zonaria, Haliseris, Encoelium.

Ulvoidites Sternb. 1838. Vers. II. p. 20: subordo Algacitum. Gen.: Codites, Caulerpites.

Umari „Marcgr. Brasil. 121" Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.
= Geoffroya Jacq.

Umbellaceae Lindl. . . . . Key n. 11.
= Umbelliferae Hall.

Umbellales Lindl. 1833. Nix. pl. Ed. germ. p. 14: nixus Albuminosar. Ord.: Umbelliferae, Araliaceae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 772: nixus Exogenar. epigynar. Ord.: Apiaceae, Araliaceae, Cornaceae, Hamamelidaceae, Bruniaceae.

Umbellaria Benth. 1833. Labiat. p. 133: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 705. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *r.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 17. — Walp. 1845. Rep. III. p. 563.

Umbellarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: ordo Gynopetalar. Fam.: Umbellatae, Araliaceae.

Umbellatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: ordo 22 plant. Gen.: Eryngium, Arctopus, Hydrocotyle, Sanicula, Astrantia, Tordylium, Caucalis, Artedia, Daucus, Ammi, Bunium, Conium, Selinum, Athamanta, Peucedanum, Crithmum, Cachrys, Ferula, Laserpitium, Ligusticum, Angelica, Sium, Bubon, Sison, Oenanthe, Phellandrium, Cicuta, Coriandrum, Ethusa, Bupleurum, Scandix, Chaerophyllum, Seseli, Imperatoria, Heracleum, Thapsia, Pastinaca, Smyrnium, Anethum, Carum, Pimpinella, Aegopodium, Apium, Lagoecia.
Adans. 1763. Fam. II. p. 89: fam. 15 plant. Sect.: Carea, Chaerophylla, Cicutae, Dauci, Sphondylia, Pastinacae, Foenicula, Ginsen.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 45 plant. Gen. ut 1751 et Echinophora, Hasselquistia,

Umbellatae Linn. cont.
Cuminum. — Par. Gis. 1792. Pracl. p. 508. Gen. ead. et Hermas, Cussonia, Spananthe, Chamitis.
Hill 1769. Ht. kew. p. 83: class. VI. herbar. Typi tribuum et ordinum: Apium, Tribula, Sison, Angelica, Sium; Coriandrum, Scandix, Phellandrium; Carum, Aegopodium.
Batsch 1802. Tab. p. 41: fam. Umbraculariar. Gen. Linnaeana et Azorella, Exoacantha.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Link 1829. Hdb. I. p. 311: ordo (5) Vaginantium. Subord.: Capitatae, Hydrocotylinae, Bupleurinae, Pimpinelleae, Ammineae, Silerinae, Caucalideae, Chaerophylleae, Selineae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33. 34: fam. Umbellariear. Series: Monospermae, Acnospermae, Physospermae, Didiscospermae, Pleurospermae, Tympanospermae, Rhynchospermae, Echinospermae, Pterospermae, Homalospermae.

Umbellatae Wilbrand 1824. Flora I. Beil. p. 33: fam. plantar., Syngenesistas, Dipsaceas et Umbelliferas complectens.

Umbellateae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Fructunguliae.

Umbellati Linn. 1747. Class. plant. p. 413: ordo 4 methodus calycinae.
= Umbellatae Linn.

Umbelliferae Morison 1680. Hist. pl. II. lib. 3. sect. 9: ordo 12 plantar. herbacear. Gen.: Cachrys, Crithmum, etc.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 425: div. Dicotyledonum petalodear. Isostemonum. Gen. helv.: Hydrocotyle; Foeniculum, Meum, Apium; Podagraria, Carum, Tragoselinum; Seseli, Oenanthe, Phellandrium, Ethusa, Cicuta; Ligusticum, Sium, Bupleurum; Astrantia, Laserpitium; Peucedanum, Selinum, Angelica, Imperatoria; Pastinaca, Sphondylium, Tordylium; Caucalis, Sanicula; Daucus, Libanotis; Chaerophyllum, Myrrhis, Scandix; Eryngium.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 185: class. V. plant. Gen. sibir.: Eryngium, Daucus, Athamanta, Peucedanum, Ligusticum, Sium, Selinum, Oenanthe, Phellandrium, Bupleurum, Chaerophyllum, Seseli, Heracleum, Pastinaca, Aegopodium, Tragoselinum, Carum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 21 plant.
Crantz 1767. Class. Umbellif. p. 41; 1769. Stirp. Austr. p. 149: class. plant. Ordines: 1. *Alatae* (gen.: Tordylium, Heracleum, Selinum, Thapsia; Laserpitium). 2. *Costatae aut striatae* (gen.: Siler, Crithmum, Ferula, Smyrnium; Chaerophyllum, Ligusticum, Oenanthe, Bupleurum, Seseli; Coriandrum, Cicuta, Apium; Astrantia; Libanotis; Caucalis). 3. *Habitus deliquescentis* (gen.: Echinophora, Eryngium, Hydrocotyle, Lagoecia, Panax, Solandra, Aralia, Phyllis, Arctopus).
Scop. 1777. Intr. p. 111: trib. VIII. plant. Gentes: 1. *Umbellis compositis.* Gen. §. 1: Caucalis, Daucus, Artedia, Tordylium, Libanotis. §. 2: Laserpitium, Angelica, Imperatoria, Selinum, Anethum, Thapsia. §. 3: Peucedanum, Athamanta, Hasselquistia, Heracleum, Pastinaca, Ferula. §. 4: Ligusticum, Conium, Ammi, Bupleurum, Bunium, Sium, Oenanthe, Cachrys; Phellandrium, Aethusa, Myrrhis, Seseli; Aegopodium, Apium, Foeniculum, Pimpinella, Smyrnium. §. 5: Chaerophyllum, Kundmannia, Crithmum, Coriandrum. 2. *Umbellis simplicibus.* Gen.: Astrantia, Sanicula, Hydrocotyle, Eryngium.
Juss. 1789. Gen. p. 218: ordo 2 class. XII. Sect.: *verae* (gen. §. 1: Aegopodium, Pimpinella, Carum, Apium, Anethum, Smyrnium, Pastinaca, Thapsia. §. 2: Seseli, Imperatoria, Chaerophyllum, Scandix, Coriandrum, Aethusa, Cicutaria, Phellandrium. §. 3: Oenanthe, Gingidium, Cuminum, Bubon, Sison, Sium, Angelica, Ligusticum, Laserpitium, Heracleum, Ferula, Peucedanum, Cachrys, Crithmum, Athamantha, Selinum, Cicuta, Bunium, Ammi, Daucus, Caucalis, Tordylium, Hasselquistia, Artedia, Bupleurum, Hermas, Astrantia, Sanicula), *anomalae* (p. 225. Gen.: Arctopus, Echinophora, Eryngium, Bolax, Hydrocotyle, Azorella, Lagoecia). — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 5. Sect. eaed.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 465. t. 67. Gen. ut Juss. et in §. 2 Oliveria, in §. 4 Exoacantha, Chamitis.
DC. 1805. Franç. IV. p. 279: fam. (62) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Aegopodium, etc. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 889 (*Ombelliferae*). Typi sectionum: Anethum, Chaerophyllum, Daucus.
Spreng. 1813. Plant. Umbellif. prodr. (Hal.) et 1818 Spec. Umbell. (Hal.)
Hoffm. 1814. Gen. plant. Umbellif. (Mosq.) Nova gen.: Wylia, Orlaya, Turgenia, Trinia, Krubera, Drepanophyllum, Malabaila, Sphondylium, Wendia, Zosima, Oreoselinum, Melanoselinum, Cnidium.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 623: fam. 61 plant. Ord.: Aralieae, Hydrocotylinae, Bupleureae, Pimpinelleae, Smyrnieae, Caucalinae, Scandicinae, Amminae, Selineae, *anomalae* (gen.: Astrantia, Dondia, Sanicula, Eriocalia, Echinophora, Exoacantha, Arctopus, Eryngium, Lagoecia).
DC. 1819. Théor. élém. p. 246 (*Ombellifères*); 1830. Pr. IV. p. 55: ordo (92) Calyciflorar. Subord.: Orthospermae, Campylospermae, Coelospermae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 235. Subord. ut DC. — Koch 1836. Syn. p. 278. Ed. II. p. 307. Subord. iid.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXIX; 1825. Syst. I. p. 528; 1830. Gen. I. p. 218. Tribus: *Desciscentes, umbellae subcapitatae* (gen.: Arctopus, Eryngium, Exoacantha, Echinophora, Eriocalia, Sanicula, Dondia, Astrantia, Pozoa), Hydrocotylinae, Bupleurinae, Pimpinelleae, Smyrnieae, Caucalinae, Scandicinae, Amminae, Selineae.

Umbelliferae Morison cont.
Lagasca 1821. Amen. nat. II. p. 87; 1828. Ocios Esp. emigr. (Lond.) Divis.: 1. *Fructus bipartibilis pedunculatus*. 2. *Fructus sessilis bipartibilis*. 3. *Fructus indivisibilis*.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 493: fam. Calyciflorar. Gen.: Daucus, Sanicula, Torilis, Caucalis, Turgenia, Cerefolium, Anthriscus, Scandix, Myrrhis, Chaerophyllum, Drepanophyllum, Sium, Hydrocotyle, Cicuta, Phellandrium, Oenanthe, Echinophora, Crithmum, Pimpinella, Trinia, Aethusa, Conium, Bunium, Aegopodium, Carum, Meum, Ligusticum, Pseudospermum, Libanotis, Thysselinum, Imperatoria, Angelica, Archangelica, Sphondylium, Tordylium, Coriandrum, Peucedanum, Pastinaca, Silaus, Petroselinum, Apium, Foeniculum, Smyrnium, Bupleurum, Agostana, Eryngium.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 55. Trib.: Thapsieae, Daucineae, Caucalineae, Cumineae, Coriandreae, Silerineae, Tordylineae, Selineae, Angeliceae, Seselineae, Ammineae, Scandicineae, Smyrneae; Saniculeae, Hydrocotylineae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIII: fam. Parviflorar. Divis.: Coriandreae, Smyrnieae, Ammineae, Seselineae, Tordylineae, Peucedaneae, Angeliceae, Thapsieae, Scandicineae, Saniculeae, Bolaceae, Araliaceae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 141. Divis.: *genuinae* (subdivis.: 1. *Armatae* [Scandicineae, Caucalineae, Daucineae], 2. *Alatae* [Peucedaneae, Thapsieae, Angeliceae], 3. *Costatae* [Coriandreae, Ammineae, Smyrnieae]), Araliaceae, Viteae. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 439. Trib.: Coilospermae, Solenospermae, Platyspermae; Araliaceae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 217; 1841. Nom. p. 138. Divis.: *genuinae* (subdivis.: Coriandreae, Solenospermae, Platyspermae), Araliaceae, Cisseae.
Bartl. 1830. Or3. p. 234: ordo (131) Umbelliflorar. Divis.: *genuinae* (gen.: Laserpitium, Thapsia, Melanoselinum, Siler, Palimbia, Levisticum, Selinum, Angelica, Archangelica, Ostericum, Cymopterus, Artedia, Hasselquistia, Tordylium, Condylocarpus, Krubera, Ferula, Ferulago, Opopanax, Pastinaca, Heracleum, Zosimia, Imperatoria, Bubon, Capnophyllum, Peucedanum, Oreoselinum, Callisace, Anethum, Foeniculum, Meum, Trochiscanthes, Pachypleurum, Silaus, Ligusticum, Athamanta, Brignolia, Molopospermum, Cnidium, Soranthus, Seseli, Libanotis, Crithmum, Coenolophium, Critamus, Ammi, Conoselinum, Trachyspermum, Carum, Aegopodium, Sison, Helosciadium, Cicuta, Apium, Petroselinum, Aethusa, Rumia, Zizia, Ptychotis, Trinia, Pimpinella, Conopodium, Sium, Berula, Annesorrhiza, Oenanthe, Huanaca, Ottoa, Biforis, Coriandrum, Myrrhis, Chaerophyllum, Spermatura, Schultzia, Scandix, Anthriscus, Torilis, Caucalis, Platyspermum, Daucus, Oliveria, Cuminum, Conium, Pleurospermum, Physospermum, Cachrys, Prangos, Smyrnium, Heteromorpha, Bupleurum, Trachypleurum, Hermas), *descis*-

Umbelliferae Morison cont.
centes (gen.: Hügelia, Cogswellia, Hydrocotyle, Chondrocarpus, Crantzia, Erigenia, Spananthe, Bowlesia, Drusa, Micropleura, Pozoa, Trachymene, Bolax, Mulinum, Siebera, Fragosa, Pectophyllum, Lagoecia; Astrantia, Dondia, Petagnia, Sanicula, Arctopus, Exoacantha, Echinophora, Eriocalia, Alepidea, Eryngium).
Lindl. 1833. Nix. pl. Ed. germ. p. 14: ordo Umbellalium.
Tausch 1834. Flora p. 337. Subordines: Mericarpae, Monocarpae.
Meisn. 1838. Gen. p. 139 (102): ordo 100 plant. (p. 440 Umbelliflorar.) Subord. ut DC.
Endl. 1839. Gen. p. 762; 1841. Ench. p. 376: ordo Discanthar. Subord. ut DC. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 231; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII. Gen. foss.: Pimpinellites.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 127: fam. (119) Umbelliflorar. Trib.: Ceramospermeae, Rhynchospermeae, Acanthospermeae, Pterygospermeae, Diclidospermeae, Tetragonospermae, Disaspidospermeae, Apleurospermeae, Heterospermeae, *anomalae* (sect.: Actinoteae, Echinophoreae).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 100: fam. Umbellinear. Divis.: Orthospermeae, Campylospermeae.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 337: fam. Dicotyledonear. Series, Saniculeae, Pleurospermae, Diclidospermae, Pterygospermae, Acanthospermae, Coelospermae, Monospermae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 93 (*Ombellifères*). Subord. ut DC.
Conf. Umbellatae Linn.; Scadiophytum Neck.; Umbellaceae Lindl.; Apiaceae Lindl.

Umbelliflorae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 232: class. (40) Gymnoblastor. Ordines: Umbelliferae, Araliaceae, Hederaceae, Hamamelideae.
•Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 73: class. XXII. Dicotyledoneor. Fam.: Hamamelideae, Cornaceae, Araliaceae, Umbelliferae.
Meisn. 1843. Gen. p. 440: class. (20) Diplochlamydear. Ordines: Hamamelideae, Umbelliferae, Araliaceae, Corneae, Alangieae, Loranthaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 129: ordo Choristopetalar. Fam.: Hederaceae, Umbelliferae.

Umbellineae Brongn. 1843. Enum. genr. p. XXIX. 110: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Umbelliferae, Araliaceae, Corneae, Garryaceae?

Umbellularia Nees 1836. Syst. Laurin. p. 462: subg. Oreodaphnes.
Endl. 1838. Gen. n. 2052 *d.* p. 321; 1841. Ench. p. 198: sect. Oreodaphnes.
Synon. Menestrata Fl. Flum.?; Linharea Arr.?; Sciadiodaphne Rchb.

Umbilicaria Hoffm. 1789. Pl. lichen. I. p. 9. Schreb. 1791. Gen. II. p. 768: sect. Lichenis. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1375.
Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 20: g. fam. secundae plantar. lichenosar.

Umbilicaria Hoffm. cont.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 109: g. Scutellator.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 144: g. Lichenum. (foliaceor.) — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 17. 180. — DC. 1805. Franç. II. p. 408. — Pers. 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 19. — Leman 1828. Dict. v. 56. p. 248.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 323: g. Lichenacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 266: g. Pyxinear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 145. p. 13; 1841. Ench. p. 10. Sect. Lasallia, Gyrophora. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XII. p. 757.
Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 394: g. Gyrophorear. — Par. Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13. (Flora 1854. p. 235.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Umbilicariear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 47. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 93. — Bayrh. 1849. Taun. p. 87. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 330.
Fries 1831. Lich. eur. p. 147: g. inter Lecidinas et Graphideas medium.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 337: sect. Graphidis.
Schär...... in Ser. Mus. Helv. I. p. 113.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 123: g. Lecidinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 553: g. Gyrothalamar.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 117: g. Graphidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Pyxinidar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 23: g. Umbilicarior.
Math. 1853. Belg. II. p. 157: g. Lichenear.
Synon. Omphalaria Ach.; Scalopodora Ehrh.; Lasallia Mérat; Macrodictya Massal.

Umbilicaria Pers. 1805. Ench. I. p. 510. n. 1138: nomen perperam pro *Cotyledone* propositum.

Umbilicaria Fée 1825. Meth. p. 55; 1827. Dict. class. XII.
= Lasallia Mérat.

Umbilicaria Mérat 1813. Fl. Paris. p. 202.
= Gyrophora Achar.

Umbilicarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Gyrophora, Umbilicaria.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 45: fam. Thallopsorar. Gen. ead. et Omphalodium.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: fam. Lichenum heteromericor. amphiblastor. Gen. ead.
Bayrh. 1849. Taun. p. 87: fam. Lichenum. Gen.: Umbilicaria, Gyrophora.
Körb. 1855. Syst. Lich. germ. p. 92: fam. Phylloblastor. Gen. ut Bayrh.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 329: fam. Lecideacear. Gen. ead.

Umbilicarii Schärer 1850. En. Lich. eur. p. 23: fam. Lichenum discoideor. Gen.: Umbilicaria.

Umbiliceae Meisn. 1838. Gen. pl. vasc. p. 134 (98): trib. Crassulear. Gen.: Thisantha, Grammanthes, Curtogyne, Sphaeritis, Rochea, Echeveria, Cotyledon, Pistorinia, Umbilicus, Bryophyllum, Kalanchoë.
Endl. 1839. Gen. p. 810; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulear. diplostemonum. Gen.: Kalanchoë, Bryophyllum, Cotyledon, Pistorinia, Umbilicus, Echeveria. Accedit 1842 (Spl. II. p. 71) Pachyphytum.

Umbilicus Cam. epit. 858 (Endl. Gen. p. 811.)
= Cotyle DC.

Umbilicus DC. 1801. Bull. soc. philom. Nr. 49; 1805. Fl. franç. IV. p. 383: nov. g. Crassulacear. (Cotyledon Umbilicus L.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. n. 538. — Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Koch 1836. Syn. p. 264. Ed. II. p. 291. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 88. — Webb .... Canar. I. p. 175. Sect.: veri, Mucizonia. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 330. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 172. Nova sect.: Chiastophyllum. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 630.
DC. 1828. Pr. III. p. 399: g. Crassulear. Sect.: Rosularia, Mucizonia, Cotyle, Orostachys. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 111. Sect. eaed. et Pistorinioides. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 757.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4187: g. Sedear. Sect. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Cotyledonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6196. Sect. ut DC. (Umbilicus loco Cotyles.)
Meisn. 1838. Gen. p. 135 (98): g. Umbilicear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4620. p. 811; 1841. Ench. p. 405. Sect. eaed.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1626: sect. Cotyledonis. Subsect.: Rosularia, Mucizonia, Pistorinoides, Orostachys.
Synon. Cotyledon Gaud.

Umbracularia C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 146: sect. Splachni.
Conf. Sciadophysium Endl.

Umbraculariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 40: ordo Rosacear. Fam.: Umbellatae, Araliae, Hederaceae.

Umbraculariae Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Calycopetalar. Fam. 200—206.

Umsema Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170: nov. g. pro Pontederia cordata L. propositum.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1166 *b*: sect. Pontederiae.
Vid. Unisema Rafin.

Unannea Steud. vid. *seq.*

Unanuea Ruiz & Pav. Ic. sculp. ined. (*Unannea* Steud. Nom. II. p. 729: g. Tetrandr. Monogyn.?)
= Stemodia Linn. (Benth. in DC. Pr. X. p. 380.

Uncaria Schreb. 1789. Gen. I. p. 125. n. 311: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 370. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 125; ed. 1832. I. p. 517. Wall. Pl. As. rar. t. 170.

Uncaria Schreb. cont.
DC. 1830. Pr. IV. p. 347: g. Naucleear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 469. — Korth. 1839. Obs. de Naucl. ind. (Linnaea 1840. Litt. p. 179. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 141.
Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113): g. Naucleacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3280 *d*. p. 557; 1841. Ench. p. 274: sect. Naucleae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2918. 4 (p. 230 in Ind. correct. *Uncinaria*).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 381: subg. Naucleae.
Synon. Ourouparia Aubl.; Agylophora Neck.

Uncaria Burchell 1822. Trav. I. p. 536: nov. g. Martyniae aff. (U. procumbens.) *Cf.* Isis 1823. Litt. Anz. p. 167.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 281. 443.
Endl. 1839. Gen. n. 4178. p. 724; 1841. Ench. p. 351: g. Pedalinear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 625.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 249: g. Sesamear.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4534: g. Martyniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.
= Harpagophytum DC.

Uncinaria Rchb. 1841. Nomencl. p. 230: nomen propositum pro *Uncaria Schreb.*

Uncinia Pers. 1807. Ench. II. p. 534. n. 2237: nov. g. Scirpoidear. (Carex uncinata L.) *Cf.* Kunth in Wiegm. Arch. Naturg. II. p. 352.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 241. Ed. Nees p. 97: g. Cyperacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 254. — C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 233. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 285.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: g. Caricear. — Par. Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 17.) — Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1069; 1841. Nom. p. 40. n. 1437. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64. (genuinar.) — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 158. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 305; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 200. — Endl. 1837. Gen. n. 958. p. 111; 1841. Ench. p. 63. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 829. n. 3088; 1831. Gen. II. p. 687. n. 3464: g. Cyperear.
Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. p. . . . : g. Caricinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 33. — Steud. 1855. Glum. II. p. 243.
Kunth 1837. Cyperogr. p. 524: g. Caricinear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316).

Uncinula Léveillé 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 151: nov. g. Erysiphear. (Erys. adunca Fr., etc.)

Undina Fries 1825. Pl. homon. p. 348; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130: nov. g. Undinear. Cf. Leman 1828. Dict. v. 56. p. 258. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 421.

Undina Fries cont.
Endl. 1836. Gen. n. 30. p. 3; 1841. Ench. p. 3: g. Nostochinar.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326 (Flora 1843. p. 92): g. Nostochinear.
= Nostoc Vauch. (Endl. Spl. III. p. 12.)

Undineae Fries 1825. Pl. homon. p. 347: trib. Diatomear. Gen.: Undina, Leathesia, Rivularia, Chaetophora, Schizonema, Hydrurus, Palmella, Gloionema?
Rchb. 1828. Consp. p. 25: div. Nostochinar. Gen. ead. et Nostoc, Scythymenia?
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130: div. Ulvacear. Syngonimicar. Gen.: Hydrurus, Palmella, Undina, Rivularia.

Unedo Link & Hoffmsg. 1809. Fl. Portug. I. p. 415.
= Arbuti Linn. sp.

Ungeria *) Schott & Endl. 1832. Melet. p. 27. 31: nov. g. Reevesiear. (A. floribunda t. 4.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25). — Endl. 1840. Gen. n. 5317. p. 993; 1841. Ench. p. 516. — Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7736.
Endl. 1833. Norf. p. 76: g. Sterculiacear.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 414: g. Bombacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 294: g. Ungeriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361: g. Helicterear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615.

Ungerieae Rchb. 1837. Handb. p. 294: subdiv. Helicterear. Gen.: Ungeria.

Ungnadia **) Endl. 1834. Atakt. t. 36; 1839. Nov. stirp. decad. Nr. 86; 1840. Gen. n. 5640. p. 1075; 1841. Ench. p. 565; 1850. Spl. V. p. 80: nov. g. Hippocastanear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 346. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 684 (p. 253 err. *Ungnodia*): g. Hippocastanacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7579: g. Dodonaeear.

Ungnodia Torr. & Gray vid. *praeced.*

Unguacha Hochstett. in pl. Schimp.: nov. g. Apocynear.
Rich. 1850. Fl. Abyssin. II. p. 52: g. Loganiacear.

Unguellus Walch . . . . Naturg. d. Verstein. II. p. 119.
= Lepidodendron Sternb.

Unguicularia DC. 1825. Prodr. II. p. 400: sect. Dolichi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3940 *c*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 359.
Endl. 1841. Gen. n. 6675 *d*. p. 1297; 1841. Ench. p. 672 (err. *Otoptera*): sect. Vignae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5776. 4.

Unguis-Cati Benth. 1834. Lond. journ. bot. III. p. 197: sect. Pithecolobii. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 609. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 40.

*) Dicat. F. Unger, prof. Vindobon.
**) Dicat. Christ. Bar. Ungnad, scriptori de Malo persica 1757.

Unifolium „Dodon." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 82. Ed. Hall. 1745. p. 93: g. pl. class. IV.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 138. t. 7: g. herbae Bacciferae.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 288: g. Liliacear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 54: g. Hyacinthor.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 126.
= Majanthemum Wigg.

Unilobatae (*Les Unilobées*) De la Marck 1785. Act. Ac. Paris. p. 446: class. V. plant. Divis.: Fructiflorae, Thalamiflorae.

Uniola *) Linn. 1737. Gen. p. 353. n. 885; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 71; 1759. Syst. ed. X. p. 875. n. 79; 1762. Sp. ed. II. p. 203; 1764. Gen. ed. VI. p. 35. n. 85; 1767. Syst. ed. XII. p. 94: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 99; 1784. Syst. p. 116. — Reich. 1778. Gen. p. 37. n. 91. — Schreb 1789. Gen. I. p. 49. n. 116. — Gmel. 1791. Syst. p. 183. — Pers. 1797. Syst. p. 119; 1805. Ench. I. p. 92. n. 70. — Willd. 1797. Sp. I. p. 406. n. 136; 1809. En. p. 110. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 69. — Trin. 1820. Fund. p. 137.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 15. n. 51: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 75. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 70. — Link 1821. En. I. p. 84. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 357; 1838. ibid. IV. p. 54.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 32. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 86. — Hedw. 1806. Gen. p. 44. n. 209. — Palis. 1812. Agrost. p. 74. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 33. 594. n. 302. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 349. n. 346; 1830. Gen. I. p. 76. n. 371. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 275. — Link 1829. Hdb. I. p. 63.
Neck. 1790. El. III. p. 223. n. 1602: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 902. p. 101; 1841. Ench. p. 59. — Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1407. — Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 166: g. Festucacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Link 1827. Hort. I. p. 157. — Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1008. — Kunth 1830. Gram. p. 136; 1833. Agrost. p. 424. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 462. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 384. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Steud. 1854. Glum. I. p. 280.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Poëar.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 487: g. Festucear.

*) Ab unione glumarum ita dicta. (Linn. Phil. bot. p. 166.)

Uniola Linn. cont.
Rupr. 1842 in Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 234: g. Poacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Synon. Chasmanthium Link; Trisiola Rafin.; Neuroctola Rafin.

Unisema Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 261: nov. g. ex typo Pontederiar. monospermar. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 253 et D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 761 (*Unisemma*).
Endl. 1837. Gen. n. 1088 *a*. p. 138; 1841. Ench. p. 81: sect. Pontederiae. *Cf.* Endl. Spl. III. n. 1088 et 1088/$_1$. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1525. 1.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 24: g. Pontederiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 206: g. Pontederacear.
Synon. Umsema Rafin.

Unisemma D. G. vid. *praeced.*

Unitegmia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: stirps Decorticaliae. Ordines: Fructaulia, Thalamaulia.

Unjala Reinwardt 1823. Catal. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: g. Pentandr.

Unona Linn. f. 1781. Suppl. p. 44. 270. n. 1404: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 509. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 375. n. 947. — Gmel. 1791. Syst. p. 869. — Pers. 1797. Syst. p. 545; 1807. Ench. II. p. 96. n. 1355. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1271. n. 1080. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 87. t. 290; 1832. Ind. II. p. 668.
Juss. 1789. Gen. p. 283: g. Anonar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 118.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 80: g. Anonear. — Par. Juss. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 340. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 679; 1825. Syst. II. p. 637. n. 2024; 1830. Gen. I. p. 456. n. 2251. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 299.
Dunal 1817. Mon. Anon. p. 42. 94: g. Anonacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 485; 1824. Pr. I. p. 88. Sect.: Unonaria, Desmos, Melodorum. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 62. — Kunth 1824. Syn. III. p. 127. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 14; 1829. Fl. jav. Anon. p. 51. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 278. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 246. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 9. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 517. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 95.
Link 1822. En. II. p. 87: g. Annonacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI; 1828. Consp. p. 194. n. 5006: g. Unonear. Sect.: Unona, Desmos, Melodorum. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 93. Sect. ut DC.
A. DC. 1832. Mém. soc. Genèv. V. p.... (*cf.* Flora Lit. III. p. 105.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7323: g. Uvariear.
Endl. 1839. Gen. n. 4717 *b*. p. 833; 1841. Ench. p. 422: sect. Uvariae.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 130: g. Guatteriear. Sect.: Desmos, Dasymascha-

Unona Linn. cont.
lon, Pseudo-Unona. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 65. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 319. Sect. eaed.
Conf. Desmos et Melodorum Lour.; Krokeria Neck.; Marenteria Pet.-Th.

Unona Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5006 *a*: sect. Unonae.
= Unonaria DC.

Unonaria DC. 1818. Syst. I. p. 486; 1824. Prodr. I. p. 89: sect. Unonae. Subsect.: Marenteria, Oetania, Cananga. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 279. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 93. Subsect. eaed.

Unoneae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXI: subdiv. Anonacear. Gen.: Asimina, Porcelia, Uvaria, Unona, Xylopia, Guatteria.
Rchb. 1828. Consp. p. 193: subdiv. Magnoliear. Gen. ead. et Anaxagorea, Duguetia, Bocagea, Artabotrys, Monodora.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 91: div. Anonacear. Gen. ut Rchb. 1827 et Orophea, Duguetia, Bocagea, Mollinedia.

Unxia Linn. f. 1781. Suppl. p. 56. n. 1420: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 774.
Juss. 1789. Gen. p. 186: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 411.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 554. n. 1288: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1249. — Pers. 1797. Syst. p. 815.
Gis. 1792. Prael. p. 539: g. Discoidear.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2339. n. 1558: g. Syngenes. Necessar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 491. n. 1944.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 279: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 503. — Bartl. 1830. Ord. p. 141.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18; 1829. v. 59. p. 235; 1830. v. 60. p. 577: g. Milleriear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2725; 1841. Nom. p. 79. n. 3004. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — DC. 1836. Pr. V. p. 507. — Endl. 1838. Gen. n. 2463. p. 400; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 620. n. 2858; 1831. Gen. II. p. 641. n. 3216: g. Radiatar. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 285.
Less. 1830. Linnaea V. p. 159: g. Senecionear.
Less. 1832. Syn. p. 220: g. Baltimorear.
Steetz .... Fl. Isthm. Panam. p. 17. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 212 inter Melampodineas.

Upata Adans. 1763. Fam. II. p. 201: g. Verbenar.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 699; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 305: sect. Avicenniae.

Uperhiza Bosc 1811. Berl. Mag. V. p. 88. t. 6. f. 12: nov. g. Fungor. inter Lycoperdona et Tubera intermedium. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 287.

Uperhiza Bosc cont.
Nees 1816. Syst. p. 159; 1817. Überbl. p. 41: g. Sphaeroideor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Pisocarpior.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Tuberacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 135 (*Uperrhiza*): g. Sclerodermeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 210.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Conf. Hyperrhiza Spreng.

Uperrhiza Fries, Rchb. vid. *praeced.*

Upoxis Adans. 1763. Fam. II. p. (20): g. Cepar.
= Hypoxis Linn.

Urachne Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 109: nov. g. Triandr. Digyn. (Agrostis miliacea L.)
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 675): g. Agrostideor.
Link 1827. Hort. I. p. 92: g. Miliacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 915. Sect.: Achnatherum, Piptatherum.
Ledeb. 1829. Alt. I. p. 78: g. Graminum.
Link 1829. Hdb. I. p. 36: g. Graminear.
Bartl. 1830. Ord. p. 30: g. Panicear. — Par. Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 122.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 432: g. Stipacear. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 439.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 471; 1843 in Ledeb. Ross. IV. p. 445: sect. Milii.
Conf. Piptatherum Palis.

Urachne Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Petersb. 6e sér. V. (1849) p. 9: g. ampliat. Stipaceor. Sect.: Piptatherum, Oryzopsis, Eriocoma, Nassella, Piptochaetium.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 727: g. Stipacear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 121.

Uragoga Linn. 1737. Gen. p. 378. n. 934: nov. g. ex *Ipecacuanha Margr.* formatum. *Cf. Ouragoga Linn.*
= Cephaëlis Swartz ?

Uralepia Rchb. vid. *Uralepis DC.*

Uralepis *) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 62 (sphalm. *Uralepsis*): nov. g. Triandr. Digyn. (Aira purpurea Walt.) *Cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 244 et Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 289. — Par. Elliott 1821. Sketch I. p. 580 (*Uralepsis*). — Schult. 1824. Mant. II. p. 19. 364.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1015: g. Meliceaear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Poëar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 69: sect. Airae.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.
Kunth 1830. Gram. p. 108; 1833. Agrost. p. 317: g. Avenacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 872. p. 97; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Diplocea, Windsoria. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 446. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 347. — Rchb.

*) οὐρά, cauda; λεπίς, palea.

Uralepis Nutt. cont.
1841. Nom. p. 36. n. 1223. Sect.: Uralepis, Windsoria. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 247: g. inter Avenaceas et Festucaceas intermedium.
Synon. Diplocea Rafin.; Diplocoea Rchb.; Dasyochloa Willd. (Steud.)

Uralepis DC. 1837. Prodr. VI. p. 563: sect. Microlonchi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2867 *b*. p. 472; 1841. Ench. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 2651. 2. (in Ind. p. 230 emendat. *Uralepia.*)

Uralepsis Nutt., Elliott vid. *Uralepis Nutt.*

Urananthe *) Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 270: sect. Gentianae. (G. ciliata L.)
= Crossopetalum DC.

Urananthus Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 118; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 51: sect. Chlorae. (Gentiana exaltata Juss.) — Par. (?) Endl. 1841. Spl. I. n. 3547 *b*. p. 1399; 1841. Ench. p. 302.
Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 46: g. Gentianacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5096: g. Erythraeariar.
= Eustoma Don.

Urandra Thwaites 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 211: nov. g. Icacinear., Stemonuro aff. (U. apicalis.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 353: g. Olacacinear.

Uraneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 164: trib. Musacear. Gen.: Musa, Strelitzia, Ravenala.

Urania Schreb. 1789. Gen. I. p. 212. n. 539: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 7. n. 601. — Pers. 1805. Ench. I. p. 343. n. 762. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 114.
Batsch 1802. Tab. p. 106: g. Palmariar.
Link 1821. En. I. p. 344: g. Musacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 180.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 115. n. 1286; 1830. Gen. I. p. 280. n. 1453: g. Musear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXV. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1200.
A. Rich. 1831. Musac. p. 12. t. 4. 5: g. Uraniar.
= Ravenala Adans.

Uraniae A. Rich. 1831. Musac. p. 11: trib. Musacear. Gen.: Musa, Strelitzia, Urania.

Uranieae Endl. 1837. Gen. p. 228; 1841. Ench. p. 123: trib. Musacear. Gen.: Musa, Strelitzia, Ravenala, Phenakospermum. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292). Gen. ead. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 136. Gen. ead. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 434. Gen. ead. (omisso quarto).

Uranthera Naudin 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 189: nov. g. Melastomacear. (Microlicia alsinaefolia et variabilis DC.)

*) οὐρανός, coelum.

Uranthera Naudin cont.
Walp. 1846. Rep. V. p. 697: g. Rhexiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 74.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 282: g. Lasiandralium.

Uraria Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 122: nov. g. Leguminosar. (Hedysarum pictum, etc.) — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 305.
DC. 1825. Pr. II. p. 324: g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 287. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 221. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (65). — Endl. 1841. Gen. n. 6610. p. 1284; 1841. Ench. p. 670. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 213.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 3998; 1841. Nom. p. 153. n. 5966: g. Onobrychear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 292.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 130: g. Hedysarear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 266.
Synon. Doodia Roxb.

Uraspermum *) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 192: nov. g. Umbellatar. (Scandix Claytoni Michx.)
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 307: g. Umbelliferar.
= Osmorrhiza Rafin.

Uratea Gmel., St. Hil., Hedw. vid. *Ouratea Aubl.*

Urceola Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 78. t. 6. f. 4: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 343. — Hedw. 1806. Gen. p. 368. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 4. 99. n. 423.
= seq.? (Hedw.)

Urceola Roxb. 1799. Asiat. Research. V. p. 167 (Bibl. brit. genev. 1800. v. 13. p. 399 c. ic. *Cf.* Spreng. 1800 in Schrad. Journ. II. p. 236.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 269. n. 618: g. Apocynear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 492. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 317.
Hedw. 1806. Gen. p. 112. n. 496: g. Pentandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3574: g. Cerberear.
Bartl. 1830. Ord. p. 204: g. Echitear.
Endl. 1838. Gen. n. 3395. p. 581; 1841. Ench. p. 294: g. Plumeriear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 518. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172).
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5178: g. Vincear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 358: g. Tabernaemontanear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 416.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

*) Nomen rejiciendum ob Urospermum Scop.

Urceolaria Feuillé 1725. Observ. III. p. 69. t. 43. *Cf.* Molina Chile p. 277.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 52. 77. n. 58: g. Diandr. Monogyn.
= Sarmienta Ruiz & Pav.

Urceolaria Willd. 1790 in Cothen. Disp. p. 10.
Gmel. 1791. Syst. p. 390: g. Pentandr. Monogyn.
= Schradera Vahl.

Urceolaria Achar. 1798. Lich. suec. p. 30: g. Lichenum. (crustaceor.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 314. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 370; 1815. V. p. 184. — Mart. 1817. Erlang. p. 238. (scutellator.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIII. 141: g. Coenothalamor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 298.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 41: g. Idiothalamor.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 74. 331; 1814. Syn. Lich. p. 137: g. Discoideor. Sect. (1810): Aspisteria, Amphiloma.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 457: g. Lecidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: p. Scutellatar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 17: g. Verrucariar.
Fée 1824. Crypt. cort. t. 25. f. 3.
Fries 1825. Pl. homon. p. 269: g. Limborinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 369.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 186: g. Hymenocarpor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Lecanorear. — Par. Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 373.
Fries 1831. Lich. eur. p. 4. 176: sect. Parmeliae. (Urceolariae Ach. sp.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 205. — Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 293.
„Achar." Endl. 1836. Gen. n. 140. p. 13; 1841. Ench. p. 10: g. Limboriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 548.
„Fries" Endl. 1836. Gen. n. 172 *A a* p. 15; 1841. Ench. p. 11: subsect. Squamariae.
Genth 1836. Nass. I. p. 366: g. Parmeliacear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 72.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 24: g. Urceolariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Limboridar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349; 1849. ibid. XII. p. 767: g. Parmeliear.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 85: g. Lecanorinor.
Flot. 1850. Bot. Zeit. p. 382: g. Lecanorinar.
Math. 1853. Belg. II. p. 151: g. Lichenear. sect. 5.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 168: g. Urceolarinar.
Arnold 1858. Flora p. 330: g. Volvariear.
Conf. Polistroma Clem.; Phlyctis Wallr.; Lepropinacia Vent. pt.

Urceolaria Herbert 1821. Append. p. 28; 1825. Bot. Mag. App. p. IV: nov. g. Amaryllidear. (Cyrtanthiformium)?
= Collania Schult. f.

Urceolaria Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 130: sect. Lasiandrae. (L. urceolaris.)

Urceolaria Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 203: g. Pezizeor., a Peziza Fr. separatum. (Ceracellae, Tapesia etc. Fr.)

Urceolarieae Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 24: sect. Limboriear. Gen.: Urceolaria, Gyalecta.
Arnold 1858. Flora I. p. 329: ordo Gnesiolichenum. Trib.: Volvarieae, Hymenelieae, Gyalecteae, Aspicilieae.

Urceolarinae Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 154: subfam. Lecanorear. Gen.: Acarospora, Harpidium, Aspicilia, Urceolaria, Phialopsis, Gyalecta.

Urceolina Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1234: g. Cyrtanthear.
Herb. 1837. Amaryll. p. 74. 193: g. Amaryllidear. (Pancratiformium.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Narcissear.
Synon. Urceolaria Herb.; Collania Schult. f.

Uredei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 514: subdiv. Uredineor. Gen.: Pileolaria, Uromyces, Uredo.

Uredinaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 41: ordo Fungalium.
= Coniomycetes Fries.

Uredinaria Chevall. 1826. Fl. Paris. p. 411.
Lév. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 788: g. Uredinear. dubium.
= Schizoderma Kunze. (Endl. Gen. p. 18.)

Uredineae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 519: fam. 1 Fungor. Trib.: *verae* (gen.: Uredo, Aecidium, Puccinia, Phragmidium, Podisoma, Gymnosporangium), Fusidieae, Bactridieae, Stilbosporeae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 75: fam. Tuberculariear. Gen.: Gymnosporangium, Podisoma, Sporidesmium, Puccinia, Bullaria, Aecidium, Uredo, Dicaeoma.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1824. p. 522): fam. Gasterosporar. Sect.: Uredinea, Stilbosporea, Naemasporea, Podisomea.
Castagne 1842. Urédinées I; 1843. II.
L. & Ch. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 43. *Cf.* L. R. Tulasne 1854. ibid. 4e sér. II. p. 77.
Léveillé 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 370; 1849. Flora I. p. 275. Gen.: Uromyces, Pileolaria, Cystopus, Uredo, Polycystis, Tilletia, Microbotryum, Ustilago, Thecaphora, Coleosporium; Lecythea, Physonema, Podosporium; Protomyces, Spilocaea, Melampsora.
Math. 1853. Belg. II. p. 415: fam. 7 Acotyledonear. Trib.: Tubercularieae, Melanconieae.

Uredineae DC. & Duby 1830. Bot. gall. II. p. 877.
= Gymnomycetes Endl.

Uredinei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: div. Epiphytor. Gen.: Caeoma, Cronartium, Spilocaea, Sporisorium, Septaria, Triphragmium, Puccinia, Phragmidium.
Rchb. 1828. Consp. p. 3; 1832. Fl. exc. p.

Uredinei Link cont.
L; 1837. Hdb. p. 129: fam. Blastomycetum. Divis.: Praeformativi, Entophyti.
Rchb. 1841. Nom. p. 1: fam. Coniomycetum. Sect.: *genuini* (gen.: Protomyces, Uredo, Physoderma, Coniosporium, Coniothecium, Coccularia, Aecidium, Cronartium, Röstelia, Achitonium, Cylindrosporium, Echinobotryum), Phragmidiacei, Torulacei. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 2. Sect. eaed.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 246: fam. Entophytor. Gen.: Uredo, . . .
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 68: fam. Stromatosporor. Gen.: Sporidesmium, Puccinia, Uredo.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 511: div. Hypodermior. Subdivis.: Epitei, Pucciniei, Uredei.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: sect. Coniopsideor. Gen.: Uredo, Cronartium, Spilocea?, Papularia?, Phylloedium? Physoderma?, Protomyces? — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 768. Gen. fere ut 1845 et Trichobasis.
Tulasne 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 166. (Flora 1855. p. 724.) Divis.: Alboginei, Aecidinei, Melampsorei, Phragmidiacei, Pucciniei, Cronartiei.

Uredo Pers. 1795 in Usteri n. Ann. IX. p. 16; 1796. Obs. myc. p. 16: g. Fungor. *Cf.* Unger 1833. Exanth. Pfl. (Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 211.) — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 23. 275.
Pers. 1797. Tent. disp. p. 13: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XV. 214: g. Gymnospermor. Sect.: Rubigo, Nigredo, Albugo, Ustilago. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 319. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 354. Sect. eaed. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 50.
DC. 1805. Franç. II. p. 226; 1815. V. p. 62: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 6: fam. Caeomatis.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 27: subg. Hypodermii.
Nees 1816. Syst. p. 15; 1817. Überbl. p. 2: sect. Caeomatis. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 316. Subsect.: Albugo, Rubigo, Nigredo. — Link 1825. Spec. II. p. 1.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 539: g. Coeomidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Intestinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 520: g. Uredinear. (verar.) Subgen.: Ustilago, Uredo, Caeomurus. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75. — Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 371; 1849. Flora p. 277.
Fries 1825. Pl. homon. p. 198: subg. Aecidii.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 570. n. 3592; 1831. Gen. II. p. 786. n. 4079: g. Coniomycetum. (liberor.) — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 89.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 8: g. Hypodermior. Sect.: Ustilago, Sphaerotheca. — Par. Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 514.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Endl. 1836. Gen. n. 181. p. 16; 1841. Ench. p. 13: g. Entophytor. Sect.: Ustilago, Uromyces.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 1; 1838. II. p. 2; 1839. III. p. 3; 1842. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 9: g. Caeomacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Flora III. H. 25. 26. p. 1. t. 1; 1851. Linnaea XXIV. p. 102.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 5: g. Uredineor. (genuinor.) Sect. ut Pers. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 246. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 3. Sect. ut Pers. — Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 70; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492; 1849. ibid. XII. p. 785.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 515: g. Uredeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 39. 288: g. Protomycetum.
Math. 1853. Belg. II. p. 434: g. Aecidinear.
Synon. Erysibe Wallr.

Uredo Strauss 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 81: g. Fungor. dilatat. Sect.: Stilbospora, Ustilago, Albugo, Rubigo, Nigredo, Puccinia.

Urena *) Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 430. t. 319. f. 412.
Linn. 1737. Gen. p. 204. n. 555; 1737. Cliff. p. 348; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 200; 1753. Sp. II. p. 692; 1759. Syst. ed. X. p. 1148. n. 754; 1763. Sp. ed. II. p. 974; 1764. Gen. ed. VI. p. 355. n. 844; 1767. Syst. ed. XII. p. 462: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 521; 1784. Syst. p. 627. — Reich. 1778. Gen. p. 354. n. 909. — Lour. 1790. Coch. II. p. 416. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 467. n. 1137. — Gmel. 1791. Syst. p. 1058. — Pers. 1797. Syst. p. 665. — Willd. 1800. Sp. III. p. 800. n. 1295; 1809. En. p. 734. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 182.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 232. n. 958: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 614.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 281. — Gis. 1792. Prael. p. 452.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Malvar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 400. — Medic. 1787. Malv. p. 42. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. p. 192; 1789. Phil. Bot. I. p. 37.
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 334. t. 183—185: g. Malvacear. Char. emend. *Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 148. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 272. — Vent. 1799.

*) *Uren* planta hujus generis in Ht. Malabar.

Urena Dillen. cont.
Tabl. III. p. 184. — Batsch 1802. Tab. p. 19. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 61. — Pers. 1807. Ench. II. p. 253. n. 1638. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 799 (verar.); 1826. Syst. III. p. 96. n. 2438; 1831. Gen. II. p. 555. n. 2718. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 277. — Link 1822. En. II. p. 212. — Kunth 1824. Syn. III. p. 249. — DC. 1824. Pr. I. p. 441. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 470. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 121.
Neck. 1790. El. II. p. 411. n. 1232: g. Omoplephytor. Disjungitur Typhalea.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 252. t. 135.
A. Juss. 1824 in St. Hil. Pl. us. Brés. t. 26; 1825. Fl. Bras. I. p. 219: g. Malvear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 361. — Meisn. 1837. Gen. p. 26 (25). — Endl. 1840. Gen. n. 5274. p. 981; 1841. Ench. p. 511. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 302.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Sidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5253: g. Lavaterear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 287: g. Pavoniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 200. n. 7624: g. Urenear.

Ureneae Rchb. 1841. Nomencl. p. 200: sect. Pavoniear. Gen.: Urena, Pavonia, Lopimia, Lebretonia, Göthea.

Urera Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 496: nov. g. Urerear. (Urtica baccifera L. etc.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 176 (Flora 1855. p. 515); 1857. ibid. VII. p. 356.
Endl. 1837. Gen. n. 1879 *b*. p. 283; 1841. Ench. p. 170: sect. Urticae.
Hensl. 1838 in Jard. Ann. nat. hist. I. p. 341. t. 11: g. Urticacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262. — Wedd. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 199.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2483: g. Urticear. (genuinar.) — Par. Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 188.

Urereae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 496: div. Urticear. Gen.: Urtica, Urera, Fleurya, Laportea, Girardinia. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24. (verar.) Gen. ead.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 174; 1857. ibid. VII. p. 349: trib. Urticacear. Gen. ead. et Obetia.

Urgenia Wight vid. *seq.*

Urginea*) Steinheil 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 321: nov. g. Liliacear. (Scilla anthericoides Poir., maritima L., etc.)
Steinh. 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 276. Char. emend. Distinguitur Squilla.
Nees jun. . . . Gen. pl. Fasc. X. t. 4.

*) Nomen a *Ben Urgin*, tribu Arabum.

Urginea Steinheil cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1786: g. Scillear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Endl. 1842. Spl. II. p. 13. n. 1131 *b*: sect. Squillae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 331 (*Urginia*): g. Hyacinthear. (Scilla maritima, indica, undulata et U. fugax St.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 313 (*Urginia*).
D. G. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 790: g. Asphodelear. — Par. Webb 1850. Canar. III. p. 339. — Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 27. t. 2063. 2064 (*Urgenia*).
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 184: g. Discospermear.

Urginea Endl. 1837. Gen. n. 1131. p. 146; 1841. Ench. p. 84: g. Hyacinthear.
Meisn. 1842. Gen. p. 400 (304): g. Scillear. = Squilla Endl.

Urginia Kunth, Spach vid. *Urginea Steinh.*

Urinaria „Herm." Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 230.
Medic. 1787. Malv. p. 80: g. Monadelph. Triandr. (Phyllanthus Niruri Forsk.)

Urirandra Briss.-Mirbel 1803. Hist. nat. d. pl. IV. p. 117. (*Cf.* Koch 1858. Wochenschr. Nr. 23. p. 178.)
= Uvirandra St. Hil.

Urmenetea*) Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Synantherear. (Nomen. — *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 26. t. 3. f. A: U. Atacamensis.)

Urnula Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 364: nov. g. Patellariaceor. (P. Craterium Schwein. Carol. t. 1. f. 7—11.)

Urnulinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: sect. Viresciniae. Fam.: Musceae, Schistheceae, Sphagneae, Jungermannideae, Cephalotheceae, Carpocereae, Fissulineae.

Urocarpus „Drumm." Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 54: nov. g. Diosmear. (U. phebalioides.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 407.

Urochlaena Nees 1841. Fl. Afr. austr. I. p. 437.
Endl. 1842. Spl. II. p. 8. n. 893/1: g. Bromear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Steud. 1854. Glum. I. p. 299: g. Festucacear.

Urochloa Palis. 1812. Agrost. p. 52: nov. g. Graminear., a Panico L. sejunctum. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 26. 476. n. 269. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 358. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 120.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1830. Gram. p. 31; 1833. Agrost. p. 73: g. Paniccar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 155. — Endl. 1837. Gen. n. 768. p. 83; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn.

*) Dicat. Hieron. Urmeneta.

Urochloa Palis. cont.
I. p. 132. 253. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1269. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Agdh. 1823. Aphor. p. 149: g. Avenacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 891 *a*: sect. Echinochloae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Setariear.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. (1835) p. 208: sect. Panici. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 43.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 440: g. Eupanicear.
Synon. Axonopus Palis.; Caridochloa Nees; Panici sp. Lam., etc.

Urocladium „Preuss" Griseb. in Arch. f. Naturg. 1852. II. p. 429: sphalm. pro *Ulocladium.*

Urocnide Blume 1856. Mns. bot. Lugd. II. p. 225: sect. Böhmeriae.

Urococcus Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 322.
Kütz 1849. Sp. Alg. p. 206. n. 154: g. Palmellear.

Urodesmium Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 338: nov. g. Clidemiear. (U. huberioides.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 888.

Urodon Turczan. 1849. Bull. soc. Mosc. XXII. 2. p. 16; 1853. ibid. XXVI. Nr. 1. p. 268: nov. g. Podalyriear., Phyllotae aff. *Cf.* Flora 1850. p. 477. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 311.

Urolepis DC. 1836. Prodr. V. p. 136: sect. Hebeclinii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2276 *b*. p. 369; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3833. 2.

Uromyces Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 28: subg. Hypodermii (antea Caeomurus). *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 359 et Unger 1833. Exanth. Pfl. (Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 212.)
Endl. 1836. Gen. n. 181 *b*. p. 17; 1841. Ench. p. 13: sect. Uredinis.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 4: subsect. Nigredinis.
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 370; 1849. Flora p. 276; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 785: g. Uredinear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 514: g. Uredeor.
Tulasne 1854. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 185: g. Phragmidiaceor. *Cf.* Flora 1855. p. 746.
Conf. Caeomurus Link; Coeomurus Gray.

Uropappus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 424: nov. g. Hyoserideear. Sect.: Calocalais, Brachycarpa.
= Calocalais DC.

Uropedium Lindl. 1846. Orchid. Linden. p. ...: nov. g. Cypripediear. (U. Lindenii.) — Par. Rchb. f. 1854. Xen. Orchid. p. 32. t. 15.
Brongn. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 113. Char. ampliat.

Uropetalum Ker 1816. Bot. Regist. II. t. 156; 1826. XII. t. 974.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 78. n. 1230; 1830. Gen. I. p. 259. n. 1349: g. Liliacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXVIII. 617. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1111.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1370; 1830. Fl. exc. p. 105; 1841. Nom. p. 48. n. 1777: g. Scillear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Link 1829. Hdb. I. p. 167: g. Hyacinthinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Hyacinthear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1122. p. 144; 1841. Ench. p. 83. — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (303). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 377. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 326.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 18: g. Hyacinthinear.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 183: g. Discospermear.
Synon. Polemannia Berg.; Zuccangnia Thunb.; Zuccagnia Willd.; Dipcadi Mönch; Hyacinthi sp. Auct.

Urophorus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 305: subg. Townsendiae. An genus? (T. spathulata.)
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 186: sect. Townsendiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 957.

Urophyllum Jack & Wall. 1824 in Roxb. Fl. ind. II. p. 184: nov. g. Pentandr. Monogyn., Patimae et Sabiceae aff. (U. villosum.)
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 292: g. Hameliacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 441: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 540. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Endl. 1838. Gen. n. 3227. p. 546; 1841. Ench. p. 273. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2924.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 222: g. Randiear. Sect.: genuina, Axanthopsis.
Synon. Wallichia Roxb.; Cymelonema Presl.

Urophyllum Schott 1853...
= Massowia Koch.

Uropyrum Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 397: subg. Aegilopis. (A. macrura Jaub. & Sp.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 791.

Uroskinnera*) Lindl..... Gard. Chron.: nov. g. Pentstemoni aff. *Cf.* Berl. Allg. Gartenz. 1857. p. 70.

Urospatha Schott.... Aroid. p....: nov. g. Aroidear.

Urospermeae Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: subdiv. Lactucear. Archetypar. Gen.: Urospermum.

*) Dicat. G. Ure-Skinner.

Urospermeae Cassini cont.
Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 475: subtrib. Cichoracear. (1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 87 Picrideis injuncta.)
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 466: div. Cichoracear. Gen.: Urospermum.

Urospermum Scopoli 1777. Introd. p. 122. n. 366: nov. g. Semiflosculosar. (Tragopogon picrioides L.)
Juss 1789. Gen. p. 170: g. Cichoracear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 490. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 377. — DC. 1805. Franç. IV. p. 62. — Link 1829. Hdb. I. p. 782.
Neck. 1790. El. I. p. 55. n. 100: g. Glossariphytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 581; 1826. Syst. III. p. 661. n. 2890; 1831. Gen. II. p. 640. n. 3248: g. Cichorear.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 60: g. Lactucear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1828. v. 56. p. 369; 1830. v. 60. p. 568: g. Urospermear. — Par. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 466.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2178; 1831. Fl. exc. p. 277; 1841. Nom. p. 94. n. 3693: g. Scorzonerear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 133. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 116. — Endl. 1838. Gen. n. 2994. p. 497; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 790. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 304.
Koch 1837. Syn. p. 422. Ed. II. p. 485: g. Leontodontear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 265: g. Liguliflorar.
Synon. Tragopogonoides Vaill.; Arnopogon Willd.

Urosporium Fingerhuth 1835. Linnaea X. p. 231: nov. g. Fungor. (U. curvatum.)

Urostachya Lindl. . . . . Journ. Proc. Linn. soc. III. p. 60: sect. Eriae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 661.

Urostelma Bunge 1832. Enum. pl. Chin. bor. p. 44; 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 218: nov. g. Apocynear., Oxystelmati proximum? (U. chinense.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 145: g. Asclepiear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.
= Metaplexis R. Brown.

Urostigma Gasparr. 1844. Gen. Fic. p. 7; 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 343; 1845. Ricerche p. 81: nov. g. ex typo Ficus religiosae L.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 35. n. 1859 *g*: sect. Ficus.
Liebm. 1851. Mexico's neldeagt. Pl. p. . . . .: g. Artocarpear.

Urostigma Miquel 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 525: g. Ficuum ampliat. (*Visiania, Cystogyne* et *Galoglychia Gasp.*) Species 167.

Urostigma Miquel cont.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 670: g. Morear.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 46; 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 89: g. Ficear.

Urostylis Meisn. 1839. Gen. pl. vasc. p. 207 (133): g. Eugalinsogear., pro *Layia Hook. & Arn.* propositum.
= Madaroglossa DC.

Ursenia DC. in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 325: sphalm. pro *Ursinia.*

Ursinella Turpin 1828. Mém. Mus. XVI. p. 316. f. 19. (U. margarifera = Echinella radiosa Lyngb. t. 69, E. fig. 2?)
= Cosmarium Corda.

Ursinia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 462. t. 72: nov. g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 572; 1826. Syst. III. p. 609. n. 2838; 1831. Gen. II. p. 638. n. 3195. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 376.
Mönch 1794. Meth. p. 608: g. Petalostemonis. (Arctotis paleacea L.)
Vent. 1799. Tabl. II. p. 535: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VIII. p. 180.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 180; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 579: g. Anthemidear. (Archetypar. verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140. — Griess. 1830. Linnaea V. p. 414. (*Synon. Sphenogyne R. Brown* et *Thelythamnos Spreng.*) — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25.
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2404: g. Anthemear.
Less. 1832. Syn. p. 244: g. Calear.
DC. 1836. Pr. V. p. 688: g. Sphenogynear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2627. p. 427; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 208 (133). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3636. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Ursinieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 92: div. Amphicenianthar. Subdivis.: Sphenogyneae, Cryptostemmeae, Gortericae.

Urtica*) Tourn. 1700. Inst. p. 534. t. 308: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 309: g. pl. class. XIX. (Ed. Hall. 1745. p. 327 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 283. n. 710; 1737. Cliff. p. 440; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 282; 1753. Sp. II. p. 983; 1759. Syst. ed. X. p. 1265. n. 935; 1763. Sp. ed. II. p. 1395; 1764. Gen. ed. VI. p. 486. n. 1054; 1767. Syst. ed. XII. p. 621: g. Monoec. Tetrandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 234. — Murr. 1774. Syst. p. 709; 1784. Syst. p. 849. — Reich. 1778. Gen. p. 483. n. 1149. — Lour. 1790. Coch. II. p. 557. Swartz 1791. Obs. bot. p. 355. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 633. n. 1422. — Pers. 1797. Syst. p. 893. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 347. n. 1662; 1809. En. p. 966. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 207. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 3. 143. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 581.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 177: g. ordinis 3 class. III.

*) Nomen ab urendo.

Urtica Tourn. cont.
Linn. 1747. Class. pl. p. 358: g. Apetalor.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 30. n. 118: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 351.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Scabridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593. — Batsch 1802. Tab. p. 178. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 616.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Amentaceis aff.
Adans. 1763. Fam. II. p. 376: g. Castanear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 491.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 30: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 378: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 337: g. Defloratar.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 69; 1794. Prodr. I. p. 31; 1818. Fl. cap. I. p. 565: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 268. — Swartz 1797. Ind. occ. I. p. 286. — Rebent. 1804. Neom. p. 51.
Juss. 1789. Gen. p. 403: g. Urticar.
Neck. 1790. El. II. p. 202. n. 925: g. Sysellophytor. Sejungitur Rutica.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 531: g. Urticear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 308. — — DC. 1805. Franç. III. p. 322; 1815. V. p. 355. — Pers. 1807. Ench. II. p. 552. n. 2057. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 905. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 36. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 354; 1826. Syst. III. p. 836. n. 3099; 1831. Gen. II. p. 691. n. 3485. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 252. — Kunth 1822. Syn. I. p. 372; 1838. Berol. II. p. 185. (legitimar.) — Lois. 1825. Dict. v. 36. p. 496 (*Ortie*). — Agdh. 1825. Aphor. p. 204. — D. Don 1825. Nepal. p. 59. — Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1800; 1831. Fl. exc. p. 181. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17. — Bartl. 1830. Ord. p. 106. — Link 1831. Hdb. II. p. 425. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 240. — Koch 1837. Syn. p. 635. Ed. II. p. 732. — Webb .... Canar. III. p. 259. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 221 (*Ortie*). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 224. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 194. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 107.
Cram. 1803. Disp. p. 190 in Dioec. Tetrandr. et p. 194 in Dioec. Pentandr. (U. baccifera L.)
Link 1822. En. II. p. 384: g. Urticinar.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 490: g. Coenosanthear.
Endl. 1833. Norf. p. 37; 1837. Gen. n. 1879. p. 283; 1841. Ench. p. 170: g. Urticacear. Sect. (1837): Urtica, Urera, Laportea, Fleurya, Girardinia. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 327. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 636.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272: g. Cecropiear.

Urtica Burm. 1737. Thes. Zeyl. p. 231. t. 110.
= Böhmeria Jacq.

Urtica Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 496: g. restrict. Urerear. (Urtica pilulifera, urens, etc.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 26. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 178 (Flora 1855. p. 516); 1857. ibid. VII. p. 351.
Endl. 1837. Gen. n. 1879 *a*. p. 283; 1841. Ench. p. 170: sect. Urticae.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2482: g. Urticear. (genuinar.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 98. — Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 27.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear. — Par. Wedd. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 197. — Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 137.
Synon. Urticae spec. oppositifoliae Auct.

Urticaceae Rchb. 1828. Consp. p. 83: fam. Incompletar. Divis.: Urticeae, Dorstenieae, Cecropieae, Monimieae, Lacistemeae, Ulmeae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 178. Divis.: Artocarpeae, Lupulinae, Cannabinae, Celtideae, Ulmeae, Urticeae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 172; 1841. Nom. p. 66. Divis.: Artocarpeae, Urticeae, Ulmeae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. Urticariear. Trib.: Morideae, Urticeae, Cannabineae, Humulineae, Celtideae.

Urticaceae Endl. (1833. Prodr. fl. Norf. p. 37) 1837. Gen. p. 282: ordo (94) Juliflorar. Gen.: Urtica, Elatostemma, Schychowskya, Pilea, Pellionia, Böhmeria, Parietaria, Soleirolia, Forskolea; Droguetia?, Australina? Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1376 et Ench. p. 169) Malaisia, 1842 (Spl. II. p. 30) Splitgerbera et 1847 (Spl. IV. p. 36) Girardinia, Hemistylus. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). Gen. ut Endl. 1842.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 260: ordo Urticalium. Gen. fere ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 798: fam. Urticinear. Gen. ead.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 174. Trib.: Urereae, Lecantheae, Böhmerieae, Parietarieae, Forskahleae.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 349: ordo Urticinear. Trib. ut 1854. (Procrideae loco Lecanthear.)

Urticae Juss. 1789. Gen. p. 400: ordo 3 class. XV. Gen. §. 1: Ficus, Ambora, Dorstenia, Hedycaria, Perebea. §. 2: Cecropia, Artocarpus, Morus, Elatostema, Böhmeria, Procris, Urtica, Forskalea, Parietaria, Pteranthus, Humulus, Cannabis, Theligonum. §. 3. *Affinia*: Gunnera, Misandra, Piper, Gnetum, Thoa, Bagassa, Coussapoa, Pourouma.

Urticales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 25: nixus Rectembryar. Ord.: Urticeae, Stilagineae, Empetreae, Myriceae, Juglandeae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 258: nixus Exogenar. diclinar. Ord.: Stilaginaceae, Urticaceae, Ceratophyllaceae, Cannabinaceae, Moraceae, Artocarpaceae, Platanaceae.

Urticarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15: ordo Torosepalar. Fam.: Artocarpideae, Urticaceae, Stilagineae, Ulmideae, Theligoneae.

Urticeae Vent. 1799. Tabl. III. p. 524: ordo 3 class. XV. Gen. §. 1: Ficus, Ambora, Dorstenia. §. 2: Böhmeria, Urtica, Forskalea, Parietaria, Pteranthus, Humulus, Cannabis, Ambrosia, Xanthium, Theligonum. §. 3 (genera inter Urticeas et Amentaceas media): Piper, Cecropia, Artocarpus, Morus, Broussonetia. *Cf.* Cassel 1810. Nat. Fam. p. 108 et Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 379.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 302. t. 110. Gen. Urticar. Juss. Accedunt in §. 1 Mollinedia, in §. 2 Brosimum, Broussonetia, Vaniera.

DC. 1805. Franç. III. p. 317: fam. (26) Dicotyledonum apetalar. Ord.: Artocarpeae, *Urticeae* (gen.: Humulus, Urtica, Parietaria, Cannabis, Ambrosia, Xanthium). — Par. Mirb. 1815. Élem. II. p. 904. Typi sectionum: Morus, Ficus, Urtica.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 353: fam. 34 plant. Gen.: Urtica, Böhmeria, Procris, Parietaria, Antiaris, Forskolea; Brosimum, Artocarpus, Cecropia, Dorstenia, Ficus, Mithridatea; *Calycanthus, Atherosperma, Citrosma, Peumus, Hedycarya; Humulus, Cannabis; Gunnera, Gnetum, Thoa; Ambrosia, Franseria, Nephelium, Xanthium.

DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 635. Ed. II. p. 732. Trib.: *genuinae* (gen.: Urtica, Parietaria), Cannabineae, Artocarpeae, Celtideae, Ulmaceae.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 251: fam. Monochlamydear. Gen.: Lupulus, Urtica, Parietaria, Cannabis, Xanthium.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: fam. Thalamitegmiae.

Blume 1825. Bijdr. Nr. 9. p. 435. Sect.: Pholeosantheae, Artocarpeae, Coenosantheae, Cannabinae.

Agdh. 1825. Aphor. p. 203; 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: ordo Micranthar. Trib.: Cynomorieae, Artocarpeae, *genuinae* (gen.: Morus, Broussonnetia, Böhmeria, Urtica, Gunnera, Panke, Forskahlea, Pilea, Parietaria, Humulus, Cannabis, Sorocea), Thoaceae, Monimieae.

Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 491. Divis.: Elatostemeae, Urereae, Böhmerieae, Parietarieae, Forskalieae, Cecropieae; Celtideae, Cannabineae, Broussoneticae, Moreae, Ficeae, Dorstenieae; Pouroumeae, Artocarpeae; Misandreae, Piperaceae.

Rchb. 1828. Consp. p. 83 (1831. Fl. exc. p. 181): div. Urticacear. Gen.: Pilea, Urtica, Böhmeria, Procris, Neraudia? Brosimum, Galactodendron, Trophis? Parietaria, Forskolea, Clibadium, Humulus. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 172. Subdivis.: Lupulinae, Gunnereae, Cecropieae. — Rchb. 1841. Nom. p. 66. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Urtica, Urera, Laportea, Fleurya, Girardinia), Elatostemmeae, Böhmerieae, Parietarieae, Forskoleeae, Cannabineae, Forestiereae, Seepeae, Garryeae, Cecropieae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Urticacear. Gen.: Urtica, Parietaria, Bohmeria, Forskahlea.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (78) Apetalar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 425. Gen.: Urtica, Parietaria, Thelygonum, Cannabis.

Urticeae Vent. cont.

Bartl. 1830. Ord. p. 105: ordo (74) Urticinar. Divis.: *verae* (gen.: Böhmeria, Urtica, Pilea, Forskahlea, Clibadium, Parietaria, Pteranthus, Brosimum; Neraudia, Trophis), Cannabinae.

Lindl. 1833. Nix. pl. p. 25: ordo Urticalium.

Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 22: fam. Urticinear. Trib.: *verae* (sect. Elatostemeae, Urereae, Böhmerieae, Parietarieae, Forskahleae), Cannabineae. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 98. Gen.: Urtica, Pilea, Böhmeria, Gesnouinia, Parietaria, Forskoelea.

Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 254. Tribus prima: Ulmaceae.

Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 183: subordo Urticinear. Gen.: Böhmeria, Urera, Gesnouinia, Urtica, Fleurya, Pilea.

Urticella Miquel 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 198: sect. Pileae.

Urticinae Link 1822. Enum. II. p. 384. 438. = Urticeae DC.

Urticinae Bartl. 1830. Ord. p. 102: class. (24) Gymnoblastor. Ord.: Monimieae, Artocarpeae, Urticeae.

Urticineae Spach 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 20: class. (40) Dicotyledoneor. Fam.: Urticeae, Artocarpeae, Monimieae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. XXVI. 98: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam. eaed. et Moreae, Celtideae, Cannabineae.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 795: ordo pl. Fam.: Ulmaceae, Moraceae, Artocarpeae, Urticaceae, Cannabineae.

Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 77. Subord.: Artocarpeae, Ulmaceae, Urticeae.

Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 308: class. plant. Ord.: Ulmaceae, Cannabineae, Artocarpeae, Moreae, Urticaceae.

Urucu „Pison. 1648. Brasil. p. 65" Adans. 1763. Fam. II. p. 381: g. Tiliar. = Bixa Linn.

Urvillaea DC., Rchb., Bartl., Lindl. vid. *seq.*

Urvillea *) HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 105: nov. g. Paulliniacear. (Kölreuteria triphylla Juss.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 153.

DC. 1824. Pr. I. p. 602 (*Urvillaea*): g. Paulliniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 363 (*Urvillaea*).

Spreng. 1825. Syst. II. p. 247. n. 1501; 1830. Gen. I. p. 322. n. 1641: g. Sapindear. (Octandr. Trigyn.) — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 388. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 19. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 657. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 43. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). — Endl. 1840. Gen. n. 5599. p. 1067; 1841. Ench. p. 561. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 376.

Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 352:

*) Dicat. Jul. Dumont-D'Urville.

Urvillea HBK. cont.
g. Sapindacear. — Par. Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1077 (*Urvillaea*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1317. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 87.
Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5236 (*Urvillaea*); 1841. Nom. p. 198. n. 7565: g. Cardiospermear.

Usnea *) Dillen. 1741. Hist. Musc. p. 56. t. 11—13: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 389.
Adans. 1763. Fam. II. p. 7: g. Fungor. (Injungitur Coralloides Dill.)
Wigg. 1780. Holsat. p. 90: g. Aspidoferar.
Hoffm. 1789. Pl. lichenos. t. 30. f. 2; 1795. Crypt. p. 132: g. Scutellator.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 768: sect. Lichenis. Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1378.
Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 21: g. familiae secundae plantar. lichenosar.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 223: g. Lichenum (caulescentium). Sejungitur Setaria. — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 16. 173. — DC. 1805. Franç. II. p. 332. — Mart. 1817. Erlang. p. 237. (scutellator.)
Schrad. 1799. Journ. Bot. I. p. 54.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 36: g. Algar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 21.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 332: g. Lichenacear.
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXV: g. Coenothalamor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 314.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 42: g. Coenothalamior.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 127. 618; 1814. Syn. Lich. p. 303: g. Peltator.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: g. Cephaloidum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 403: g. Usneadear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 24: g. Usneacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 234 (sect.: Thamnium, Physcia, Cornicularia, Alectoria); 1831. Lich. eur. p. 1. 17; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 144. — Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 410 (sect. ut Fries); 1841. Nom. p. 16. n. 559. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71. — Endl. 1836. Gen. n. 179. p. 16; 1841. Ench. p. 11. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 120. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 3; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 2.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 188: g. Hymenocarpor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 844: g. Hymenothalamar.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 541: sect. Parmeliae.
Genth 1836. Nass. I. p. 323: g. Parmeliacear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 93. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 102.

*) Nomen officinale, assumptum ex Serapionis *Axneeh* et *Usnee.*

Usnea Dill. cont.
Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 209: g. Parmeliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Usneidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349; 1849. ibid. XII. p. 800: g. Usneear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 60: g. Peltopsorar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 3: g. Usneaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 109: g. Lichenear. sect. 2.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12 (Flora 1854. p. 234): g. Usnear. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 351. — Arnold 1858. Flora I. p. 101.
Synon. Reichenbachia Spreng.; Lichenis sp. Linn.

Usneaceae Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 23: cohors 7 Lichenum. Gen.: Evernia, Cetraria, Usnea.
Fries 1825. Pl. homon. p. 233: trib. Hymenothalamor. Gen.: Usnea, Evernia, Ramallina, Roccella, Siphula, Cetraria. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 15; 1841. Ench. p. 11. Gen. ut Fries 1831.
Rchb. 1828. Consp. p. 22: div. Parmeliacear. Gen. ut Fries 1825.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Usnea.
Fries 1831. Lich. eur. p. 1: subtrib. Parmeliacear. Gen. ut antea exclusa Siphula.
Rchb. 1837. Hdb. p. 133; 1841. Nom. p. 16: fam. Apotheciopsorar. Gen.: Usnea, Alectoria, Coenogonium, Roccella, Ramalina, Evernia, Cetraria.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 118: fam. Peltopsorar. Gen.: Cornicularia, Bryopogon, Alectoria, Usnea.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 3: fam. Lichenum heteromericor. acroblastor. Gen.: Usnea, Cornicularia, Bryopogon, Roccella.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 2: fam. Thamnoblastor. Gen. ut 1846 exclusa Roccella.
Arnold 1858. Flora I. p. 101: ordo Gnesiolichenum. Trib.: Usnea, Evernieae.

Usneacei Schärer 1850. En. Lich. eur. p. 3: fam. Lichenum discoideor. Gen.: Usnea.

Usneadeae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 395. 403: div. Homothalamear. Gen.: Usnea.

Usneae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 11 (Flora 1854. p. 234): trib. Intricatar. Gen.: Usnea, Chlorea.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 351: fam. Parmeliacear. Gen.: Usnea, Bryopogon, Cornicularia, Evernia, Ramalina, Borrera.
Arnold 1858. Flora I. p. 101: trib. Usneacear. Gen.: Usnea, Cornicularia, Alectoria.

Usneeae Montagne 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349: subtrib. Parmeliacear. Gen.: Usnea, Evernia, Cornicularia, Bryopogon, Neuropogon, Ramalina, Thysanothecium, Alectoria, Roccella, Cetraria.

Usneidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: sect. Hymenothalamear. Gen.: Cetraria, Roccella, Ramalina, Evernia, Usnea.

Ustalia Fries 1817. Dianom.; 1825. Pl. homon. p. 274: nov. g. Graphidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 383; 1841. Nom. p. 15. n. 540. — Endl. 1836. Gen. n. 132. p. 12; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 173; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XII. p. 801.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Graphidar.
Synon. Pyrochroa Eschw.; Platygramma Meyer; Platygramme Spreng.

Usteria*) Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 480; 1791. Phil. Bot. II. p. 95: nov. g. ex typo Hyacinthi cernui L.
= Scillae sp.

Usteria Willd. 1790 in Röm. & Ust. Mag. p. 151; 1792 in Beob. Ges. nat. Fr. Berl. IV. p. 51; 1797. Sp. I. p. 18. n. 19: nov. g. Monandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 782. n. 1704. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 20. — Vahl 1805. Enum. I. p. 5. n. 4. — Hedw. 1806. Gen. p. 5. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 5. 37. n. 26. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 9. n. 24. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 24.
Afzel. 1804. Gen. pl. Guin. p.... Char. emend. *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 2. p. 230 et Konig Ann. of bot. I. p. 263. t. 7. f. 3.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 564 (Verm. bot. Schr. I. p. 75): g. Loganear.
Spreng. 1817. Anal. II. 1. p. 495: g. Carissear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 16. n. 20: g. Contortar.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 133: g. Loganiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3504; 1837. Hdb. p. 211. — Bartl. 1830. Ord. p. 206. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 483. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Loganiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 166.
Endl. 1838. Gen. n. 3366. p. 576; 1841. Ench. p. 289: g. Usteriear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). — Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5138. — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 22.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Strychnear.
Synon. Monodynamis Gmel.

Usteria Cavan. 1793. Icon. II. p. 15. t. 116: nov. g. Didynam. Angiosperm., Chelonae aff. (U. scandens.) *Cf.* Usteri n. Ann. V. p. 78.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 277: g. Personatar.
= Maurandia Ort.

Usteria Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Patsjotti Rheede* V. t. 5.)
= Acalypha Linn.

Usterieae Endl. 1838. Gen. p. 576; 1841. Ench. p. 289: trib. Loganiear. Gen.: Usteria. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167).

Usterieae Endl. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 133: sect. Loganiear. Gen. id.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 21: trib. Strychnear. Gen. id.

Ustilagineae L. R. & Ch. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 14. 73. (Flora 1849. I. p. 257.) Divis.: *verae* (gen. Ustilago, Thecaphora, Protomyces), Tilletieae.

Ustilaginei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 515: div. Hypodermior. Gen.: Polycystis, Testicularia, Thecaphora, Ustilago, Tilletia; Protomyces.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: sect. Coniopsideor. Gen.: Polycystis, Ustilago, Sporisorium, Testicularia.

Ustilago Pers. 1801. Syn. Fung. p. 224: sect. Uredinis. — Par. Strauss 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 81. — Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 8 *a*; 1841. Nom. p. 1. n. 5. 4. — Endl. 1836. Gen. n. 181 *a*. p. 16; 1841. Ench. p. 13. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 3.
Willd. 1805 in Web. & Mohr. Beitr. I. p. 139: g. Gasteromycor., ex Aecidio et Uredine compositum.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 6: fam. Caeomatis.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 27: subg. Hypodermii.
Nees 1816. Syst. p. 13; 1817. Überbl. p. 2: subg. Caeomatis. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 315.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 538: g. Coccomidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 520: subg. Uredinis.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 517: g. Hypodermior.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 8; 1842. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 9: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
L. R. & Ch. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 75: g. Ustilaginear. verar. (Flora 1849. p. 267.)
Lév. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 373 (Flora 1849. p. 277); 1849 in Orb. Dict. XII. p. 787: g. Uredinear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 516: g. Ustilagineor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Bonord. 1851. Hdb. p. 39. 288: g. Protomycetum.
Synon. Reticularia Bull.; Endophyllum Lév.; Aecidii sp. Auct.

Usubis Burm. 1768. Fl. Ind. t. 32. f. 1.
Scop. 1777. Intr. p. 250: g. Polycarpiar.
= Schmideliae Linn. sp.

Utania*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 663: g. Cyrtandrear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425: g. Loganiear. §. 2.
= Fagraea Thunb.

*) Dicat. Paulo Usteri, botanico Turicensi.

*) Nomen vernaculum *Tjankudu Utan*.

Utanica „Don“ Meisn. Comm. p. 211 in adnot. et Steud. Nomencl. II. p. 736: vid. *praeced.*

Utea St. Hil. vid. *Outea Aubl.*

Uterini Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LV: ordo Hymenomycetum. Gen.: Cyphella, Solenia, Peziza; *Mitrati.*

Uterini veri Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLIX: ordo Gasteromycetum. Subord.: Trichospermi, Pyrenomycetes.

Uterveria Bertol. 1839. Pl. nov. hort. Bonon. II. 8.

Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7127: g. Capparear. genuinar.

= Capparidastrum DC. (Endl. Spl. III. p. 89.)

Utricularia*) Linn. 1737. Gen. p. 5. n. 15; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 18; 1759. Syst. ed. X. p. 851. n. 29; 1762. Sp. ed. II. p. 25; 1764. Gen. ed. VI. p. 14. n. 31; 1767. Syst. ed. XII. p. 61: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 61; 1784. Syst. p. 65. — Reich. 1778. Gen. p. 15. n. 34. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 19. n. 41. — Lour. 1790. Coch. I. p. 26. — Gmel. 1791. Syst. p. 39. — Pers. 1797. Syst. p. 66; 1805. Ench. I. p. 18. n. 56. — Willd. 1797. Sp. I. p. 111. n. 54; 1809. En. p. 29. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 42. t. 180; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 143; ed. 1832. p. 142. — Vahl 1805. Enum. I. p. 194. n. 47. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 154. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 12. — Elliott 1821. Sketch I. p. 20. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 342. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 7. 48.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 154. n. 635: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Corydalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 371.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Orobanchear.

Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 290: g. Angiospermar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 75: g. Monopetalar. irregular.

Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 477: g. Pinguiculatar.

Scop. 1777. Intr. p. 167: g. Personatar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 353. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — DC. 1805. Franç. III. 574; 1815. V. p. 404. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 49.

Juss. 1789. Gen. p. 98: g. Lysimachiis aff.

Neck. 1790. El. I. p. 328. n. 510: g. Chasmatophytor.

Hayne 1800 in Schrad. Journ. I. p. 17.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 225: g. Primulaceis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 13. 349.

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 108. t. 198.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 430. Ed. Nees p. 286: g. Lentibulariar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 225. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 316. — Kunth 1823. Syn. II. p. 24; 1838. Berol. II. p. 410. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 49. n. 86; 1830. Gen. I. p. 25. n. 108. — D. Don 1825. Nepal. p. 84. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 739. — Link 1829. Hdb. I. p. 512. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 17. — Bartl. 1830. Ord. p. 168. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 386; 1837. Hdb. p. 198. — Wight 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 91. t. spl. 27; 1850. Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 9. t. 1567—1584. — A. DC. 1844. Pr. VIII. 3. Sect.: Megacista, Lentibularia, Stylotheca, Oligocista, Orchidioides. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 206.

A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 19: g. Lentibulariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3317. Sect.: Lentibularia, Ambulligera. — Koch 1837. Syn. p. 579. Ed. II. p. 665. — A. St. Hil. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 149. Char. emend. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 335. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 801. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 1. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 444. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 996.

Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 57. 192. n. 88: g. Primulacear.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 389: g. Primulear.

Link 1821. En. I. p. 27: g. Utricularinar. — Par. E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 281.

Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 14: g. Personatis aff.

Le Conte 1824. Ann. Lyc. N. York I. p. 72. *Cf.* Flora 1827. I. p. 12.

Lois. 1828. Dict. v. 56. p. 405 et Juss. ibid. p. 408: g. Utricularinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 61.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Utriculariacear.

Nees jun. . . . . Gen. pl. Fasc. XII.

St. Hil. 1833. Voy. distr. diam. II. p. 427; 1840. Mon. Prim. et Lentib. ed. Aurel. p. 21.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 286; 1847. Veg. kd. p. 686: g. Lentibulariacear.

Endl. 1839. Gen. n. 4193. p. 728; 1841. Ench. p. 354: g. Utriculariear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 314 (225). — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4576. — Lehm. 1845. Pl. Preiss. I. p. 338. — Benj. 1847. Linnaea XX. p. 299. 486; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. IX. p. 235.

Synon. Lentibularia Vaill.; Millefolii sp. C. Bauh.; Linariae sp. Plum.

Utriculariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. 23: fam. Pinguiculariear. Gen.: Utricularia.

Utricularieae Endl. 1839. Gen. p. 728; 1841. Ench. p. 354: ordo (155) Personatar. Gen.: Utricularia, Genlisea, Pinguicula.

Meisn. 1840. Gen. p. 314 (225): ordo Labiatiflorar. Gen. ead. et Ceramanthe?

Rchb. 1841. Nom. p. 117: sect. Calceolariear. Gen.: Utricularia, Dorrienia.

*) Nomen a „singularibus admodum vesiculis pellucidis, unico foramine perviis,“ etc. (Linn. Fl. lapp.)

Utricularieae Endl. cont.
Lehm. 1844. Bot. Zeit. p. 109. Novum genus: Polypompholyx.
Benjam. 1847. Linnaea XX. p. 299. 485. Gen. ut Endl. et Polypompholyx, Quinquelobus, Akentra. — Benj. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. IX. p. 233. Gen. bras.: Utricularia, Polypompholyx, Genlisea, Benjaminia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 802: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.

Utricularinae Link & Hoffmsg. 1809. Fl. Portug. I. p. 339; 1821. En. I. p. 27. = Lentibularieae Rich.

Utricularineae Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 408: ordo pl. Gen.: Utricularia, Pinguicula, Micranthemum, Hemianthus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 61: fam. Personear. Gen.: Utricularia, Pinguicula.

Utriculosae C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 365: trib. Umbelliferar. Gen.: Eleutherospermum.

Utrini Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 460: sect. Fungor. Series: *pistillares* (Phallus), *calycini* (Peziza, Ascobolus).
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 377: div. Fungor. Gen.: Batarrea, Hymenophallus, Phallus, Clathrus, Peziza, Ascobolus. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 766. Gen.: Hymenophallus, Phallus, Clathrus; Ditiola.

Utsugia A. DC. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 240: sect. Weigelae. (*Utsugi Kämpf.* Amoen. exot. p. 854.)

Uva Ursi Tourn. 1700. Inst. p. 599. t. 370: g. pl. class. XX.
Mönch 1794. Meth. p. 470: g. Petalostemonis.
DC. 1805. Franç. III. p. 638: sect. Arbuti.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 400: g. Ericinar. = Arctostaphylos Adans.

Uvaria Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 131: nov. g. plant.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 100. n. 224 (Nov. gen. zeyl. p. 11. n. 1060); 1753. Sp. I. p. 536; 1759. Syst. ed. X. p. 1082. n. 612; 1762. Sp. ed. II. p. 756; 1764. Gen. ed. VI. p. 279. n. 692; 1767. Syst. ed. XII. p. 374: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 423; 1784. Syst. p. 508. — Reich. 1778. Gen. p. 283. n. 750. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 374. n. 944. — Lour. 1790. Coch. I. p. 348. — Gmel. 1791. Syst. p. 868. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 30. t. 33—36; 1832. Ind. II. p. 658. — Pers. 1797. Syst. p. 544. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1261. n. 1077.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Coadunatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 592.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Anonar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 284. — Batsch 1802. Tab. p. 118.
Gled. 1764. Syst. p. 116. n. 480: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 256: g. Polycarpiar.
Neck. 1790. El. II. p. 317. n. 1096: g. Acascophytor.

Uvaria Linn. cont.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 155. t. 114.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 77: g. Glyptospermar.
Desport. 1804. Dict. v. 6. p. 342 (*Canang*): g. Anonear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 80. — Juss. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 340. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 639. n. 2025; 1839. Gen. I. p. 457. n. 2252. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 301.
Pers. 1807. Ench. II. p. 94. n. 1349: g. Annonar.
Dunal 1817. Mon. Anon. p. 39. 86: g. Anonacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 481; 1824. Pr. I. p. 88. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 11. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Blume 1829. Fl. jav. Anon. p. 9. Sect.: verae, Canangae, Mitrephorae, Melodorae, ambiguae, Asiminae, Stelechocarpae. — Bartl. 1830. Ord. p. 247. — A. DC. 1832. Mém. Genèv. V. p. 201. 203. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 7. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 44. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 519. — Mart. 1841. Fl. Bras. fasc. II. p. 39. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 42.
Link 1822. En. II. p. 87: g. Annonacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. p. LXI; 1828. Consp. p. 194. n. 5007: g. Unonear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 92.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7322: g. Uvariear. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 95. (Char. ampliat.) Sect.: Macranthi, Narum. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 45. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 303.
Endl. 1839. Gen. n. 4717 *a*. p. 832; 1841. Ench. p. 422: sect. Uvariae.
Synon. Melodorum Lour.; Mitrephora Blume; Trigynaea Schltd.? *Cf. Asimina* et *Narum Adans.*

Uvaria Endl. 1839. Gen. n. 4717. p. 832; 1841. Ench. p. 422: g. Xylopiear., injuncta Unona a genere Linnaeano discrepans. Sect.: Uvaria, Unona.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422: g. Xylopear.

Uvarieae Rchb. 1837. Handb. p. 278: subsect. Annonariar. Gen.: Xylopia, Coelocline, Habzelia, Unona, Uvaria, Porcelia, Asimina, Trigynaea.
Rchb. 1841. Nom. p. 193: subsect. Anonariar. Gen. ead.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 91: trib. Anonacear. Gen.: Sageraea, Stelechocarpus, Uvaria, Ellipeia. — Par. Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 302. Gen. ead. excepta Sageraea.

Uvedalia*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 440. Ed. Nees p. 296: nov. g. Scrophularinar. (U. linearis.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 802. n. 2175.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321: g. Rhinanthear.

*) „Dicat. in memoriam dom. Uvedale, a Plukenetio et Petiverio laudati."

Uvedalia R. Brown cont.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 413: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3185: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Mimulear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3: g. Gratiolear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 555. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4618. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3933. p. 680; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 514. — Walp. 1845. Rep. III. p. 274. 963.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 368 Mimulo injungit, praeced. Spreng. 1831. Gen. II. p. 489.

Uvedalia DC. 1836. Prodr. V. p. 516: sect. Polymniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2475 *a*. p. 402; 1841. Ench. p. 237.
Synon. Polymnia Neck.; Polymnactis Torr. & Gray.

Uvifera Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 487: g. indefinitum ex Plukenet Alm. desumtum.

Uvinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: ordo Cocculiniae. Fam.: Fucaceae, Dictyoteae.

Uvirandra Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 52: g. Fluvialium.
Synon. Urirandra Briss.-Mirb.; Ouvirandra Pet.-Th.; Hydrogeton Pers.

Uvularéae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 329: ordo Monocotyledonum. Gen.: Cymbanthes, Wurmbea, Baeometra, Ornithoglossum, Dipidax, Erythronium, Methonica, Disporum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: trib. Melanthacear. Gen.: Schelhammera, Kreysigia, Uvularia, Tricyrtis, Disporum, Prosartes, Hekorima, Streptopus.

Uvularia *) Linn. 1737. Gen. p. 93. n. 263; 1737. Cliff. p. 121; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 304; 1759. Syst. ed. X. p. 980. n. 373; 1762. Sp. ed. II. p. 436; 1764. Gen. ed. VI. p. 164. n. 412; 1767. Syst. ed. XII. p. 241. n. 408: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 269; 1784. Syst. p. 325. — Reich. 1778. Gen. p. 167. n. 445. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 219. n. 560. — Gmel. 1791. Syst. p. 546. — Pers. 1797. Syst. p. 345; 1805. Ench. I. p. 360. n. 794. — Willd. 1799. Sp. II. p. 93. n. 630; 1809. En. p. 364. — Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 198. — Elliott 1817. Sketch I. p. 390. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 224. — Gmel. 1826. Bad. IV. p. 224. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 468. 500.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 72. n. 303: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 98. n. 1264; 1830. Gen. I. p. 262. n. 1367. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXX. 367. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1121.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 48. — Juss. 1789. Gen. p. 48.
Hill 1769. Ht. kew. p. 222. 355: g. Hexapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 82: g. Liliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 119. — Hedw. 1806. Gen. p. 244. n. 992. — Link 1821. En. I. p. 320. — Juss. 1823. Dict. v. 26. p. 414. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 415.
Neck. 1790. El. III. p. 190. n. 1553: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 169: g. Gloriosar.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 224: g. Ruscinar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 161: g. Smilacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1349: g. Methonicear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Smilacinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Colchicaceis aff.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1080. p. 136; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 248.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1357: g. Uvulariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1712. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 200.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.

Uvulariaceae Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 650: ordo Coronariar.

Uvularieae Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1357: subtrib. Veratrear. Gen.: Anguillaria, Schelhammera, Kreysigia, Uvularia, Tricyrtis, Disporum, Drapiezia. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 47. Gen. ead. et Melanthium, Androcymbium, Wurmbea, Ledebouria, Baeometra.
Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306): trib. Smilacear. Gen. ut Endl. et Herreria?
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 5; 1843. Enum. IV. p. 199: fam. Monocotyledonum. Gen.: Uvularia, Prosartes, Hekorima, Streptopus, Disporum, Kreysigia, Schelhammera; Drymophila?, Iphigenia?

Uwarovia Lindl. vid. *seq.*

Uwarowia *) Bunge 1840. Bull. sc. Ac. Pet. VII. p. 278.
Fisch. & Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 153. t. 4.
Endl. 1842. Spl. II. p. 58. n. $3685/_1$: g. Lippiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664 (*Uwarovia*): g. Verbenacear.
= Glandularia Gmel.

*) Nomen e Trago mutuatum.

*) Dicat. Sergio de Uwarow, ministro rossico.

V.

Vaccaria Dodon. 1583. Pempt. 104.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 96.
Mönch 1794. Meth. p. 63: g. Thalamostemonis.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 67. 88: g. Decandr. Monogyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 365: sect. Saponariae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 396. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 800. — Koch 1836. Syn. p. 99. Ed. II. p. 108.
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5361: g. Caryophyllear.
Link 1831. Hdb. II. p. 240: g. Silenear. — Par. Fries 1842 in Lindl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora I. p. 124. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 180. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 804.
Webb 1836. Canar. I. p. 144: g. Caryophyllacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5247. p. 972; 1841. Ench. p. 506: g. Lychnidear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 302.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7819: g. Saponariear.
A. Braun 1843. Flora p. 381: g. Dianthear. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 170.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 227: sect. Gypsophilae.

Vaccinarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: ordo Gynocoronar. Fam.: Vaccinideae, Styracineae.

Vaccineae Rchb. 1828. Consp. p. 93: subdiv. Caprifoliacear. genuinar. Gen.: Oxycoccus, Vaccinium, Ceratostemma, Thibaudia, Symphysia?, Gaylussacia.

Vaccinia Adans. 1763. Fam. II. p. 160: fam. 22 plant. Gen. §. 1: Oxycoccus, Vaccinium, Chupalon. §. 2: Kolbia, Tsutsusi, Erica, Rhododendros, Epigaea, Gaulteria, Dulia, Pyrola, Diconangia. §. 3: Arbutus, Arctostaphylos, Royena, Diospyros, Mokof, Ageria, Aquifolium, Cainito, Gillena, Camunium, Ximenia, Vedela, Styrax, Benteca, Manilkara, Sapota, Erythroxylum, Elengi, Jaquinia, Olax.

Vacciniaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 221) 1847. Veg. kingd. p. 757: ordo Cinchonalium. Gen. Vacciniear. Endl 1841 et Decachaeta, Oreanthes.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 804: fam. Dicotyledonear. monopetalar. perigynar. Gen. §. 1: Ceratostemma, Oreanthes, Agapetes, Gaylussacia, Andreusia, Thibaudia, Cavendishia, Vaccinium, Oxycoccus, Sphyrospermum. §. 2: Phalerocarpus, Macleania, Anthopterus.
Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 6: ordo Ericalium.

Vacciniatae Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 488: ordo plant. Gen.: Andromeda, Erica, Pirola, Vaccinium.

Vaccinideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: fam. Vaccinariear. Gen.: Vaccinium, Vitidaea, Oxycoccus, Lussacia.

Vaccinidiae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Calicitubiae. Gen.: Vaccinium, etc.

Vaccinieae DC. 1813. Théor. élém. p. 216; 1819. ed. II. p. 246: ordo Calyciflorar. — Par. Dunal 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 552. Gen. §. 1: Ceratostema, Agapetes, Gaylussacia, Andreusia, Thibaudia, Cavendishia, Vaccinium, Oxycoccus. §. 2: Phalerocarpus, Macleania, Anthopterus, Argophyllum, Amechania. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 408. Trib.: Chymocarpicae, Xerocarpicae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 404: fam. Calyciflorar. Gen.: Vaccinium, Vitis-idaea, Oxycoccus.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: div. Ericear.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (172) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 153: ordo (94) Ericinear. Gen.: Ceratostemma, Oxycoccus, Vaccinium, Cavinium, Thibaudia, Gaylussacia; Symphysia. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 243 (151). Gen.: Argophyllum?, Sphyrospermum, Anthopterus, Macleania, Cavendishia, Thibaudia, Ceratostema, Gaylussacia, Andreusia, Symphysia.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 203: div. Caprifoliacear. *Cf. Vaccineae Rchb.*
Lindl. 1833. Nix. pl. p. 27: ordo Ericalium.
D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152: trib. Ericacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 789. 851. Gen.: Vaccinium, Oxycoccus, Gaylussacia; Thibaudia, Agapetes, Ceratostemma. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 71. Gen. ex Don et Macleania.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: div. Ericacear. Subdivis.: Myrtilleae, Symphysieae, Gaylussacieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 127. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Oxycoccus, Vaccinium, Sphyrospermum, Cavendishia, Thibaudia, Andreusia, Agapetes, Ceratostemma, Gaylussacia), Argophylleae (serius Phalerocarpeae), Cyrilleae.
Endl. 1839. Gen. p. 757: subordo Ericacear. Gen.: Gaylussacia, Sphyrospermum, Oxycoccos, Vaccinium, Thibaudia, Ceratostemma, Cavendishia, Macleania, Brossaea? Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1412 et Ench. p. 370) Anthopterus, Amechania?
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 522: fam. (156) Ericinear. Gen. ut G. Don et Cavendishia, Macleania, Symphisia, Sphyrospermium, Brossaea?
Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 14: trib. Siphonandracear. Gen.: Macleania, Tyria, Satyria, Socratesia, Orthaea, Siphonandra, Oreanthes, Cavendishia, Semiramisia, Eurygania, Ceratostemma, Anthopterus; Cali-

Vaccinieae DC. cont.
gula, Sophoclesia, Polyboea, Proclesia, Sphyrospermum, Symphysia, Agapetes, Thibaudia, Themistoclesia, Psammisia, Pentapterygium, Gaylussacia, Epigynium, Vaccinium, Oxycoccus, Phalerocarpus. *Cf.* Walp. Ann. bot. II. p. 1079.

Vaccinium Rupp. 1718. Fl. jen. p. 46. Ed. Hall. 1745. p. 52: g. pl. class. I.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 413: g. Dicotyledonum Diplostemonum.

Adans. 1763. Fam. II. p. 164: g. Vaccinior.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 142. t. 28. f. 7 (Myrtillus).

Roth 1788. Germ. I. p. 169: g. Octandr. Monogyn. Distinguitur Schollera.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 279; 1789. Phil. Bot. I. p. 125.

Neck. 1790. El. I. p. 217. n. 358: g. Dicroophytor.

Pers. 1805. Ench. I. p. 478. n. 1086: g. Decandr. Monogyn. (Ericoidear.) — Par. Elliott 1817. Sketch I. p. 494. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 263.

Hedw. 1806. Gen. p. 319. n. 1260: g. Ericar.

Link 1821. En. I. p. 374: g. Ericinar.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 405: g. Vacciniear. (Distinguitur Vitis-idaea.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 154. — Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 35. t. 123—125. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 203; 1841. Nom. p. 127. n. 4921. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 851. — Dunal 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 565. — Endl. 1839. Gen. n. 4332. p. 757; 1841. Ench. p. 370. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 522. Sect.: Myrtillus, Myrtillidium, Vitis-idaea. — Nutt. 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 263. (restrict.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 901. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 487. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 476. (Char. emend. ex Wight Ic. pl. IV. p. 3.) — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 805. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 423. Sect.: Myrtillus, Vitis idaea. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 53. Subgen.: Batodendron, Cyanococcus, Disterigma, Euvaccinium, Macropelma, Cinetosandra, Scytanthemum, Neurodesia, Vitis-Idaea. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1096. Subgen. ead. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1060. Sect.: Epigynium, Euvaccinium.

Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1972: g. Vaccinear.

Link 1829. Hdb. I. p. 616: g. Myrtilloidear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: g. Vaccinidear.

Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 31: sect. Vaccinii.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 221; 1847. Veg. kd. p. 758: g. Vacciniacear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Myrtillear.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 392: g. Ericear.
Synon. Vitis idaea Tourn.; Adenaria Rafin.?

Vaccinium Linn. 1737. Gen. p. 110. n. 313; 1737. Cliff. p. 148; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 349; 1759. Syst. ed. X. p. 1001. n. 434; 1764. Gen. ed. VI. p. 191. n. 483; 1764. Syst. ed. XII. p. 267. n. 478: g. Octandr. Monogyn. ampliat. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 272. — Murr. 1774. Syst. p. 300; 1784. Syst. p. 362. — Reich. 1778. Gen. p. 195. n. 523. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 258. n. 758. — Gmel. 1791. Syst. p. 620. — Pers. 1797. Syst. p. 387. — Willd. 1799. Sp. II. p. 348. n. 768; 1809. En. p. 413. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 227.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonis.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 464. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 235.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.

Gled. 1764. Syst. p. 87. n. 360: g. Thalamostemonum.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 136: g. Fructiflorar.

Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 488: g. Vacciniatar.

Scop. 1777. Intr. p. 141: g. Opulinar.

Walt. 1788. Carol. p. 13. 139. n. 180: g. Decandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 104.

Juss. 1789. Gen. p. 162: g. Ericar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 362.

Batsch 1802. Tab. p. 219: g. Myrtillear.

Duchesne 1804. Dict. v. 1. p. 406 (*Airelle*): g. Ericinear.

DC. 1805. Franç. III. p. 686: g. Ericacear. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 4. 19.

Mirbel 1815. Élém. II. p. 883: g. Rhodoracear.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 521: g. Epacridum.

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 263: g. Ericear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 319. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 209. n. 1421; 1830. Gen. I. p. 302. n. 1544. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 851. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 66. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1263.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: g. Vaccinidiar.

Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 31: g. Vacciniear. Sect.: Vaccinium, Oxycoccos. — Par. Koch 1837. Syn. p. 474. Ed. II. p. 545. Sect.: Myrtillus, Vitis Idaea, Oxycoccos. — Kunth 1838. Berol. I. p. 404. — Meisn. 1839. Gen. p. 243 (151). — Math. 1853. Belg. I. p. 332. Sect. ut Koch.

A. Gray 1844. Lond. journ. bot. III. p. 234 in adnot. Nova sect.: Decachaena.

A. Gray 1846. Mem. Amer. Ac. n. ser. III. p. . . . Subgen.: Oxycoccus, Vitis-Idaea, Batodendron, Myrtillus s. Euvaccinium, Cyanococcus. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 512.
= Vaccinium Rupp. et Oxycoccus Tourn.

Vachelia Endl. vid. *seq.*

Vachellia *) Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 272: nov. g. Acaciear. (Acacia Farnesiana W.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6835. p. 1326; 1841. Ench. p. 683 (*Vachelia*). — Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6132 (*Wachelia*).
Meisn. 1837. Gen. p. 96 (69): g. Mimosear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 404. — Webb 1846. Canar. II. p. 121. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 806.
Synon. Aldina E. Meyer; Farnesia Gasp.

Vachendorfia Adans. vid. *Wachendorfia Burm.*

Vada-Kodi „Rheede IX. t. 42" Adans. 1763. Fam. II. p. 201: g. Verbenar.
= Gendarussa Rumph.

Vagaria Herbert 1837. Amaryll. p. 76. 226. 416: nov. g. Amaryllidear. Pancratiformium. (Pancratium parviflorum Red.)
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 505: g. Narcissear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 14. 155: g. Narcissinear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 693 (*Vaginaria*): g. Pancratiear.
= Lapiedra Lag.? *Cf.* Meisn. Gen. p. 394 (297).

Vaginales Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: ordo 27 plant. Gen.: Laurus, Helxine, Polygonum, Bistorta, Persicaria, Atraphaxis, Rheum, Rumex.
Batsch 1802. Tab. p. 176: fam. Seminiferar. Gen.: Piper, Saururus; Coccoloba, Atraphaxis, Polygonum, Rumex, Rheum, Triplaris, Calligonum, Königia; Begonia, Proserpinaca.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXXV: div. Holoracear. Gen.: Rheum, Rumex, Polygonum, Königia.
Link 1829. Hdb. I. p. 290: subclass. I. Exogenear. Ord.: Piperitae, Sycoideae, Polygoneae, Begoniaceae.

Vaginantes Link 1829. Handb. I. p. 310: subclass. II. Exogenear. Ord.: Umbellatae, Araliaceae.

Vaginaria Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 70. n. 126: g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 36. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 37.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: g. Scirpear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 237: sect. Fuirenae.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 423: g. Cyperacear.
= Fuirena Rottb.

Vaginaria Bory 1821. Dict. class. I. p. 594: nov. g. Arthrodiear. (Oscillariar.) *Cf.* Agdh. Spec. Alg. II. 1. p. XXIX.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 280: g. Oscillatoridear. (Oscillatoria vaginata Vauch.)
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 175: g. Hydrophytar. loculatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 455 *b*: sect. Oscillatoriae.
= Microcoleus Desmaz.

Vaginaria Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 350: sect. Disae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1537. *b* γ. p. 1365; 1841. Ench. p. 112: subsect. Calodisae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1882. 2 c.

Vaginaria Kütz. .... Alg. decad. nr. 132.
= Hydrocoleum Kütz.

Vaginaria Kunth vid. *Vagaria Herb.*

Vaginata Nees 1816. Syst. p. 191; 1817. Überbl. p. 46: sect. Agarici. (A. ocreatus Holmsk.)
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 601: g. Agaricidear. (Agaricus vaginatus Bull.)

Vaginella C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 492: sect. Bartramiae.

Vaginularia Fée 1852. Gen. Fil. p. 97: nov. g. Pleurogrammear. (Monogramme trichoidea Sm.)
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 25: g. Polypodiear.
Synon. Diclidopteris Brackenr.

Vaginulati Brid. 1822. Meth. musc. p. XII. 4: sect. Muscor. frondosor. Class.: Astomi, Gymnostomi, Peristomi, Epistomi, Hypostomi.
Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 26: fam. Muscor. Series: Acrocarpi, Pleurocarpi.
Conf. Acrocarpi Brid. 1826.

Vagnera Adans. 1763. Fam. II. p. 496: g. Hyacinthor.
= Polygonatum Tourn.?

Vahea Lam. Illustr. t. 69.
Poir. 1817. Suppl. V. p. 409.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXVII. 435. n. 759: g. Apocynear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 430.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3535: g. Vincear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26.
Bartl. 1830. Ord. p. 204: g. Echitear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 264 (172)?
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 92: g. Tabernaemontanear.
Endl. 1838. Gen. p. 586 et p. 1397: g. dubium Apocynacear. An (praeced. Poir.) = Urceola Roxb.?
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5222: g. Strychnear.?
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 327: g. Eucarissear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 394.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Carissear.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 150: g. Willughbeiar.
Synon. Faterna Nor.; Tabernaemontanae sp. Spr.

Vahlia *) Thunb. 1782. Nov. gen. II. p. 36; 1794. Prodr. I. p. 48; 1818. Fl. cap. II. p. 181: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 270. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 176. n. 452. — Gmel. 1791. Syst. p. 463. — Pers. 1797. Syst. p. 285; 1805. Ench. I. p. 290. n. 646. —

*) Dicat. Rever. G. H. Vachell, bot. Chin.

*) Dicat. Mart. Vahl, prof. Hafniensi.

Vahlia Thunb. cont.
Willd. 1797. Sp. I. p. 1354. n. 514. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 89.
Juss. 1789. Gen. p. 318: g. inter Ficoideas et Onagras medium.
Neck. 1790. El. I. p. 161. n. 271: g. Gitonophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 315: g. Succulentar.
Batsch 1802. Tab. p. 29: g. Saxifragear. — Par. R. Brown 1823. Frankl. narr. p. 766. (Verm. bot. Schr. I. p. 545.) — A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 89. — DC. 1830. Pr. IV. p. 53. — Wight. & Arn. 1834. Prodr. I. p. 364. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 231. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 39. — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100). — Endl. 1839. Gen. n. 4631. p. 814; 1841. Ench. p. 408.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 148: g. Onagrariar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 188. n. 776.
Poir. 1807. Dict. VIII. p. 284.
Juss. 1817. Dict. v. 7. p. 441: g. Cercodianar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 705; 1825. Syst. I. p. 868. n. 1020; 1830. Gen. I. p. 217. n. 1120: g. Onagrar. (descisc.) — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XXVII. 313. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 430. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 925.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4212: g. Cunoniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 319: g. Jussiear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 337: g. Jussievear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 157. n. 6148: g. Vahliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.
Synon. Russelia Linn. f.; Bistella Delile; Oldenlandiae sp. Auct.

Vahlia Dahl 1787. Observ. bot. p. 40; 1788 in Röm. & Ust. Mag. Bot. IV. p. 32: nov. g. Columniferar. (V. fastuosa.)
= Assonia Cavan.

Vahlieae Rchb. 1837. Handb. p. 230; 1841. Nomencl. p. 157: subsect. Heucherear. Gen.: Vahlia.

Vahlodea Fries 1842. Botan. Notis. p. 176: nov. g. ex typo Airae atropurpureae. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 364.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 78: g. Melicear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 423: sect. Deschampsiae.

Vaillantia Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berl. V. 1751. p. 127: g. Petalostemonis.
Neck. 1790. El. I. p. 200. n. 334: g. Phyllastrophytor.
Hoffm. 1804. Bot. Taschenb. p. 274: g. Polygam. Monoec.
DC. 1805. Franç. IV. p. 266: g. Rubiacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 264. n. 482. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 46.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae.

Vaillantia Gleditsch cont.
Schult. 1827. Mant. III. p. 13: g. Tetrandr. Monogyn.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 134: g. Asperulear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 613: g. Stellatar. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 206; 1841. Nom. p. 74. n. 2745. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 662. — Koch 1836. Syn. p. 336. Ed. II. p. 368. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). — Endl. 1838. Gen. n. 3098. p. 522; 1841. Ench. p. 270. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 422.
Tausch 1835. Flora I. p. 358.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 771: g. Galiacear.
Synon. Valantia Tourn.; Valantiae sp. Linn.

Vaillantioides Koch 1836. Synops. p. 329. Ed. II. p. 362: sect. Galii. (G. saccharatum All.)
= Euaparines sp. DC.

Valantia *) Tourn. 1706. Act. Ac. Paris. p. 85. t. 3: nov. g. plant.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 147. t. 8.
Mich. 1729. Nov. gen. p. 13. t. 7: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 316. n. 770; 1737. Cliff. p. 468; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 302; 1753. Sp. II. p. 1051; 1759. Syst. ed. X. p. 1307. n. 1019; 1763. Sp. ed. II. p. 1490; 1764. Gen. ed. VI. p. 543. n. 1151; 1767. Syst. XII. p. 672: g. Polygam. Monoec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 762; 1784. Syst. p. 908. — Reich. 1778. Gen. p. 538. n. 1258. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 723. n. 1575. — Pers. 1797. Syst. p. 948. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 947. n. 1874; 1809. En. p. 1039. — MBieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 435.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520. — Batsch 1802. Tab. p. 231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 597. — Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1989. — Bartl. 1830. Ord. p. 209. — Webb ..... Canar. II. p. 178.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 197; 1820. Mém. Mus. VI. p. 370. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 567. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 93. n. 460. — Lois. 1828. Dict. v. 56. p. 431. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420 (*Vallantia*). 473. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 169.
Gled. 1764. Syst. p. 163. n. 664: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 639. Sejungitur Aparine.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 170: g. Fructiflorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 119: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 470: g. Rubiatar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 176; 1789. Phil. Bot. I. p. 25.
Gmel. 1791. Syst. p. 240: g. Tetrandr. Mo-

*) Dicat. Sebast. Vaillant.

Valantia Tourn. cont.
nogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 129. n. 242.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Galiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 48: g. Asperulear.
= Vaillantia Gled. et Auct.

Valantia Gaudin 1828. Fl. Helv. I. p. 443: sect. Galii. (G. tricorne, sacharatum, Cruciata, Pedemontanum, verum.)
C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 472: g. Stellatar. Sect.: Cruciata, Euvalantia.
= Cruciatae, Euaparines, etc. DC. spec.

Valcarcelia „Lag.“ Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. inter Vouapam et Hymenaeam.
Meisn. 1837. Comm. p. 69: g. Cassiear.? — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 741 (*Valcarcella*).

Valcarcella Steud. vid. *praeced.*

Valdesia *) Ruiz et Pav. 1794. Prodr. p. 67. t. 11; 1798. Syst. I. p. 121: nov. g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 3. n. 1160.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 171 (*Valdezia*): g. Melastomear. — Par. Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 508. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 435 (*Valdezia*).
= Blakea Linn.

Valdezia St. Hil., Poir. vid. *praeced.*

Valdia **) Plumier 1703. Gen. p. 11. t. 24. (Ic. t. 256.)
Adans. p. 1763. Fam. II. p. 157: g. Caprifolior.
= Clerodendrum R. Brown.

Valdivia Gay 1847. Fl. Chil. III. p. 43: nov. g. Saxifragear. (V. Gayana Remy.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 976.

Valentiana Rafin. 1814. Specch. I. p. 87.
DC. 1830. Pr. IV. p. 340: g. Lonicereis aff., vix notum. *Cf.* Meisn. Gen. p. 155 (111). — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 453. — Endl. 1838. Gen. p. 570. n. 1; 1841. Ench. p. 282.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 327: g. Caprifoliacear. dubium.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2739: g. Linnaeacear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767: g. Sambucear.?

Valentina Hedwig vid. *seq.*

Valentinia ***) Swartz 1788. Prodr. p. 4. 62; 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 687. t. 14: nov. g. Octandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 437. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 801. n. 1748. — Gmel. 1791. Syst. p. 618. — Willd. 1799. Sp. II. p. 344. n. 762. — Pers. 1805. Ench. I. p. 415. n. 940. — Hedw. 1806. Gen. p. 281. n. 1129 (*Valentina*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 661: g. Rhamnear.
DC. 1824. Pr. I. p. 618: g. Sapindacear.

*) Dicat. Antonio Valdez, horti Cartagenensis fundatori.
**) Dicat. Gonsales Ferdin. d'Oviedo, alias De Valde.
***) In memoriam Mich. Bernh. et Christ. Bernh. Valentini.

Valentinia Swartz cont.
minus notum. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 675. — Endl. 1840. Gen. n. 5631. p. 1074; 1841. Ench. p. 562. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1305. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 296. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 243. n. 1485; 1830. Gen. I. p. 317. n. 1618: g. Sapindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5205; 1841. Nom. p. 199. n. 7603: g. Cupaniear.
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Dodonaeacear.?
Synon. Malpighia Plum.; Ilex Pluk. (Endl.)

Valentinia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 450. n. 1283: g. Chorisophytor.
= Tachigali Aubl.

Valentinia Räusch. . . .
= Eystathes Lour.? (Rchb. Consp. p. 201.)

Valentynia „Neck.“ DC. et Endl. in synon. Tachigaliae: vid. *Valentinia Neck.*

Valenzuela Steud. vid. *Valenzuelia Bert.*

Valenzuelia *) S. Mutis 1810. Sem. Nov. Gran.: g. Dioeciae non descriptum. (Endl. Gen. p. 1334. n. 56.)
= . . . ?

Valenzuelia „Bertero mss.“ Cambess. 1834. Nouv. Mém. Mus. III. p. 236: nov. g. Sapindacear. (V. trinervis Bert.) — Par. Steud. 1841. Nom. p. 741 (*Valenzuela*)?
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Dodonaeacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5606. p. 1069; 1841. Ench. p. 561: g. Sapindear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7573: g. Cardiospermear.

Valerandia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 33. n. 663: nov. g. Darinyphytor., a Chironia L. sejunctum. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 438.
= Orphium E. Meyer? (Griseb. in DC. Pr. IX. p. 43.)

Valeriana **) Tourn. 1700. Inst. p. 131. t. 52: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 209. Ed. Hall. 1745. p. 213: g. pl. class. IX. Sejungitur Phu.
Vaill. 1722. Act. Ac. Paris. p. 184: g. Dipsacear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 662. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 561.
Adans. 1763. Fam. II. p. 152: g. Scabiosar.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 120: g. Fructiflorar.
Mönch 1794. Meth. p. 638: g. Petalostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 2 in Monandr. Monogyn., p. 35 in Tetrandr. Monogyn., et p. 188 in Dioec. Tetrandr.
Vahl 1806. Enum. II. p. 1: g. Triandr. Monogyn.
= Valeriana Linn. exclusa Valerianella.

*) Dicat. Dr. Mich. Valenzuela.
**) Nomen barbarum.

Valeriana Linn. 1737. Gen. p. 8. n. 21; 1737. Cliff. p. 15; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 13; 1753. Sp. I. p. 31; 1759. Syst. ed. X. p. 860. n. 43; 1762. Sp. ed. II. p. 44; 1764. Gen. ed. VI. p. 22. n. 44; 1767. Syst. ed. XII. p. 72: g. Triandr. Monogyn., injuncta Valerianella ampliat. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 32. — Murr. 1774. Syst. p. 72; 1784. Syst. p. 79. — Reich. 1778. Gen. p. 23. n. 48. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 29. n. 60. — Gmel. 1791. Syst. p. 91. — Pers. 1797. Syst. p. 81; 1805. Ench. I. p. 37. n. 77. — Willd. 1797. Sp. I. p. 175. n. 75; 1809. En. p. 50. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 84. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 145. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 20. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 166; ed. 1832. I. p. 163. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 386. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 63. 73.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 158. n. 647: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 528.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 470. — Juss. 1789. Gen. p. 195. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 426. — Hedw. 1806. Gen. p. 22. 352.
Hill 1769. Ht. kew. p. 130: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 137: g. Polypremor.
Batsch 1802. Tab. p. 227: g. Valerianacear. = Valerianeae DC.

Valeriana Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 204: vid. *Locusta Riv.*, *Med.*

Valeriana Necker 1790. Elem. bot. I. p. 122. n. 206: g. Sphanidophytor., exclusis Kentrantho, Mitrophora, Odontocarpa et Mouffeta restrict.
DC. 1805. Franç. IV. p. 233; 1815. V. p. 491; 1830. Pr. IV. p. 632: g. Valerianear. Sect. (1830): Phyllactis, Aretiastrum, Phu. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 339. 349. n. 119. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 323. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 590; 1825. Syst. I. p. 139. n. 139; 1830. Gen. I. p. 35. n. 150. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 477. — Kunth 1824. Syn. III. p. 2; 1838. Berol. I. p. 311. — D. Don 1825. Nepal. p. 159. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 919. — Lois. 1828. Dict. v. 56. p. 438. — Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1946; 1831. Fl. exc. p. 199; 1841. Nom. p. 72. n. 2698. Sect.: Phyllactis, Aretiastrum, Valeriana. — Link 1829. Hdb. I. p. 669. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 51. — Bartl. 1830. Ord. p. 132. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 672. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 443. — Koch 1836. Syn. p. 336. Ed. II. p. 369. — Endl. 1838. Gen. n. 2186. p. 352; 1841. Ench. p. 227. Sect. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (121). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 163. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 307. (restrict.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 172. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 434. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 809. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 54. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 117. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 138.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: g. Valerianeae.
Link 1821. En. I. p. 62: g. Dipsacear.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 18: g. Aggregatar.
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 265; 1847. Veg. kd. p. 698: g. Valerianacear. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 47.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 15. t. 214—219.
Synon. Phu Rupp.; Valeriana, Phyllactis et Astrephia Dufr.; Valerianae sp. et Oligacocc Willd.; Valerianoides Vaill.?

Valerianaceae Batsch 1802. Tab. affin. p. 227: fam. Marcidar. Gen.: Allionia, Morina, Valeriana.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. 32: fam. Dipsariear. Trib.: Fedieae, Valerianeae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 265) 1847. Veg. kd. p. 697: ordo Campanalium. Gen. Valerianear. Endl.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 46: ordo Dicotyledonum. Gen.: Valeriana, Plectritis, Fedia.

Valerianea Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: subfam. Gitonanthiae. Gen.: Valeriana, Centranthus, Hemesotria.

Valerianeae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 232: fam. (59) Dicotyledonum. Gen.: Valeriana, Centranthus, Fedia, Valerianella. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 442.
Juss. 1807. Ann. Mus. X. p. 308.
Dufresne 1811. Hist. d. Valérianées. (Montpell. 4.) *Cf.* Röm. & Schult. Syst. I. p. 339.
Kunth 1814 in Desv. journ. bot. p. 171; 1818 in HBK. Nov. gen. III. p. 322.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 589: fam. 57 plant. Gen.: Valeriana, Centranthus, Fedia, Patrinia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246; 1830. Pr. IV. p. 237: ordo (99) Calyciflorar. Gen. (1830): Patrinia, Nardostachys, Dufresnia, Valerianella, Astrephia, Fedia, Plectritis, Centranthus, Valeriana, Betckea, Triplostegia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 665. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 336. Ed. II. p. 369. Gen.: Valeriana, Centranthus, Valerianella.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 477: fam. Calyciflorar. Gen.: Valeriana, Centranthus, Valerianella.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Fructitubiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Subaggregatar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXX: fam. Dipsacear. Gen.: Centranthus, Valeriana, Fedia, Patrinia.
Rchb. 1828. Consp. p. 92 (1831. Fl. exc. p. 197): div. Caprifoliacear. Subdivis.: *genuinae* (gen. ut 1827), Sambuceae, Viburneae.

Valerianeae DC. cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 668: ordo Epanthar. Gen. ut Gray et Fedia, Patrinia.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (185) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 130: ordo (87) Aggregatar. Gen.: Centranthus, Valeriana, Astrephia, Phyllactis, Patrinia, Fedia, Valerianella. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 350; 1841. Ench. p. 226. Gen. ut DC. et Axia?
Lindl. 1833. Nix. pl. p. 31: ordo Dipsalium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 178: div. Dipsacear. Subdivis.: *genuinae* (vid. Rchb. 1828), Valerianelleae, Sambuceae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 72. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Centranthus, Betkea, Valeriana, Triplostegia, Axia?), Valerianelleae, Sambuceae.
Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120): ordo 110 plant. (p. 441 Aggregatar.) Gen. ut Endl.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 302: fam. (63) Aggregatar. Gen. ut DC. et Phyllactis, Aretiastrum, Axia?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 47: fam. Loniceroidear. Gen. ex DC.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 810: fam. Dicotyledonear. monopetalar. perigynar. Gen. ut Endl.
Conf. Dipsaceae §. 2 Juss.; Valerianaceae Lindl.

Valerianeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Valerianacear. Gen.: Valeriana, Centranthus.

Valerianella Tourn. 1700. Inst. p. 132. t. 52: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 210. Ed. Hall. 1745. p. 215: g. pl. class. IX.
Vaill. 1722. Act. Ac. Paris. p. 188: g. Dipsacear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 666. — Link 1821. En. I. p. 163.
Mönch 1794. Meth. p. 493: g. Petalostemonis. (Valeriana locusta L.)
Cram. 1803. Disp. p. 35: g. Tetrandr. Monogyn.
DC. 1805. Franç. IV. p. 240; 1815. V. p. 492; 1830. Pr. IV. p. 625: g. Valerianear. — Par. Dufr. 1811. Valér. p. 56. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 479. — Lois. 1823. Dict. v. 27. p. 490 (*Mache*); 1828. v. 56. p. 444. — Link 1829. Hdb. I. p. 671. — Bartl. 1830. Ord. p. 132. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 198. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 667. — Koch 1836. Syn. p. 339. Ed. II. p. 371. — Endl. 1838. Gen. n. 2181. p. 351; 1841. Ench. p. 227. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (121). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 305. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 170. Sect.: Locusta, Psilocoele, Platycoele. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 428. — Webb .... Canar. II. p. 193. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 811. — Soyer-Will. 1850 in Gren. & Godr. France II. p. 58. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 138.
Betcke 1826. Animadv. bot. in Valerianellas. (Rostock.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Fediear.

Valerianella Tourn. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 178; 1841. Nom. p. 72. n. 2701: g. Valerianellear. Sect.: Valerianella, Psilocoela, Platycoela, Solenocoela.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 51: sect. Fediae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 698: g. Valerianacear.
Synon. Polypremum Adans.; Odontocarpa Neck.; Valeriana Med.; Locusta Med.; Fediae sp. Auct.

Valerianelleae Rchb. 1837. Handb. p. 178; 1841. Nomencl. p. 72: subdiv. Valerianear. Gen.: Valerianella, Plectritis, Fedia, Astrephia, Dufresnia, Nardostachys, Patrinia.

Valerianoides „Boerh.“ Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 177: g. pl. ex typo Verbenae jamaicensis L.

Valerianoides Vaillant 1722. Act. Ac. Paris. p. 187: g. Dipsacear.
= Valeriana Neck.?

Valerianoides Pluken. 271. f. 5.
= Arctopus Linn.

Valicana*) Endl. 1840. Gen. n. 6663 *a α*. p. 1294; 1841. Ench. p. 671: subsect. Cochlitropidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5819. 1 *a*.

Valikaha Adans. 1763. Fam. II. p. 84: g. Onagrar.
= Memecylon Linn.

Valisneria Scopoli 1777. Introd. p. 68: g. Spadicear.
Neck. 1790. El. III. p. 277. n. 1669: g. Catabophytor.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 230: g. Dioec. Diandr.
Link 1822. En. II. p. 412: g. Najadum.
Agdh. 1822. Aphor. p. 127: g. Hydrocharidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 112: g. Anacharidear.
= Vallisneria Mich.

Vallantia Dietr. vid. *Valantia Tourn.*

Vallaris Burm. 1768. Ind. p. 51. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 447.
Scop. 1777. Intr. p. 190: g. Speciosar.
Gmel. 1791. Syst. p. 391: g. Pentandr. Monogyn.
R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 63 (Verm. bot. Schr. II. p. 400): g. Apocynear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1042. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 145. n. 724.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 635. n. 682: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 650.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3519; 1841. Nom. p. 133. n. 5156: g. Echitear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3416. p. 584; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (173).
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 78: g. Echitear.

*) Nomen anagr. ex Canavalia.

Vallaris Burm. cont.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 399: g. Parsonsiear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 426.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Parsonsear. *Synon.* Peltanthera Roth; Emericia Röm.; Pergulariae sp. Linn.

Vallea*) „Mutis" Linn. f. 1781. Suppl. p. 42. 266. n. 1401: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 492. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 363. n. 914. — Gmel. 1791. Syst. p. 814. — Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 75. t. 14. — Pers. 1797. Syst. p. 528. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1212. n. 1049. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 374.
Juss. 1789. Gen. p. 434: g. incertae sedis.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 92: g. Tiliacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 67. n. 1274.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 783: g. Ranunculear. descisc.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 349: g. Elaeocarpear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 283. — DC. 1824. Pr. I. p. 520. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 599. n. 1929; 1830. Gen. I. p. 430. n. 2136. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5427; 1837. Hdb. p. 304. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 447. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 561. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 258. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372.
Endl. 1840. Gen. n. 5389. p. 1012; 1841. Ench. p. 523: g. Tricuspidariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7940.

Vallenia J. vid. *Wallenia Swartz.*

Valleriana Linn. 1751 vid. *Valeriana Linn.*

Vallesia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 28. t. 5; 1799. Fl. peruv. II. p. 26. t. 151: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 642. n. 701.
Pers. 1805. Ench. I. p. 265. n. 606: g. Apocynear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 233. t. 241. (verar.) — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIX. 525. n. 808. — Link 1821. En. I. p. 207. — Kunth 1823. Syn. II. p. 299. (verar.) — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 449.
Hedw. 1806. Gen. p. 121. n. 533: g. Apocinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3556; 1841. Nom. p. 134. n. 5202: g. Rauwolfiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 205.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 127. n. 636 et p. 131. n. 630 a: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 611.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 100: g. Alyxiear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 348.
Endl. 1838. Gen. n. 3384. p. 580; 1841. Ench. p. 294: g. Ophioxylear. — Par.

*) Dicat. Rob. Valle, Rouen.
**) Dicat. Franc. Valles.

Vallesia Ruiz & Pav. cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 511. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 51.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Valli-filix Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 1 in Römer Collect. bot. p. 195: nov. g. Filicum. (Ophioglossum scandens L.) = Lygodium Swartz.

Vallisnereae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 142: trib. Hydrocharidacear. Gen. Vallisneriear. et Anacharidear. Endl. 1843.

Vallisneria*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 12. t. 10: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 300. n. 741; 1737. Fl. lapp. p. 295. Ed. Smith p. 304; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1015; 1759. Syst. ed. X. p. 1286. n. 975; 1763. Sp. ed. II. p. 1441; 1764. Gen. ed. VI. p. 513. n. 1097; 1767. Syst. ed. XII. p. 647: g. Dioec. Diandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 735; 1784. Syst. p. 878. — Reich. 1778. Gen. p. 509. n. 1199. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 673. n. 1491. — Pers. 1797. Syst. p. 920; 1807. Ench. II. p. 598. n. 2177. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 34. t. 165; 1832. Ind. III. p. 750. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 220. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 650. n. 1754; 1809. En. p. 1001. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 196. 202. — Blanco 1837. Filipin. p. 780.
Linn. 1737. Cliff. p. 454: g. Dioec. Monandr.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Musar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Palmis aff. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 32.
Gled. 1764. Syst. p. 321: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 67: g. Hydrocharidum. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 123. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 169. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 263; 1831. Gen. II. p. 704. n. 3551. (in Dioec. Triandr.)
Gmel. 1791. Syst. p. 80: g. Diandr. Trigyn.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 217: g. Hydrocharideis aff.
DC. 1805. Franç. III. p. 267: g. Hydrocharidear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 344. Ed. Nees p. 200. — Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 62. — Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 121. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 900. n. 3166. — Lois. 1828. Dict. v. 56. p. 452. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 13. — Bartl. 1830. Ord. p. 76. — Wight 1831 in Hook. Bot. Misc. II. p. 344. suppl. t. 11. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 776. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 4.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 632: g. Tripetaloidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 805: g. Stratiotear.

*) Dicat. Ant. Vallisneri, prof. Patavino,

Vallisneria Micheli cont.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Vallisneriacear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 281.

Endl. 1837. Gen. n. 1209. p. 161; 1841. Ench. p. 195: g. Vallisneriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1154. — Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). — Duch. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 812. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 46. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 308. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 235.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142: g. Vallisnerear.

Synon. Vallisneroides Michx.; Valisneria Scop. etc.; Physkium Lour.

Vallisneriaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. 55: fam. Hydrochariar. Gen.: Vallisneria, Blyxa.

Link 1829. Handb. I. p. 281: ordo 22 Endogenear. Gen.: Vallisneria.

Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.

Vallisnerieae Endl. 1837. Gen. p. 161; 1841. Ench. p. 95: trib. Hydrocharidear. Gen.: Vallisneria, Blyxa. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). Gen. ead. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 746. Gen. ead. — Caspari 1858. Ann. wiss. Bot. I. 3; 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 385. Gen. ead. et Nechamandra, Diplosiphon.

Rchb. 1841. Nom. p. 34: subdiv. Hydrocharear. Gen. ut Endl.

Vallisneroides Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 13. t. 10: g. pl. class. I, ad Vallisneriam accedens.

= Vallisneriae planta mas.

Vallota Herbert 1821. App. p. 29; 1825. Bot. Mag. App. p. IV; 1837. Amaryll. p. 70. 133: nov. g. Amaryllidear. (Cyrtanthiformium.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58 (*Valota*). — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 338.

Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1236: g. Cyrtanthear. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 531.

Schult. 1830. Syst. VII. p. 827: sect. Amaryllidis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1273 *f.* p. 176; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1179. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1601. 6.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 418: subg. Amaryllidis.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 12. 109.

Valonia*) Ginnani 1757. Op. postum. I. p. 38. t. 45.

Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 428; 1824. Syst. p. XXXI. 180: g. Ulvacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 336. — Leman 1828. Dict. v. 56. p. 455. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 182.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 366. n. 3432; 1831. Gen. II. p. 754. n. 3831: g. Solenotar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 87.

Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 476: g. Ulvear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 88. p. 7; 1841. Ench. p. 5.

Mart. 1830. Flora II. p. 681.

Grev. 1830. Synops. p. LXVI.

Menegh. 1838. Cenni p. 35: g. Siphonear. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 23. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328. (Flora 1843. p. 93.)

Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 673: g. Vaucheriear. — Par. Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 20. n. 63. (verar.) — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 307; 1845. Phyc. germ. p. 252. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130. — Rabenh. 1847. Krypt. II. p. 2. p. 127. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XII. p. 813.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Hydrogastridar.

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Valoniacear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Bryopsidear.

Kütz. 1849. Sp. Algh. p. 507. n. 322: g. Valoniear.

Synon. Gastridium Lyngb. pt.; Physidrum Rafin.?

Valoniaceae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. . . .: ordo 7 Algar. Gen.: Valonia, Hydrogastrum, Caulerpa, Anadyomene.

Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 41: ordo Chlorospermear. Gen. am.: Chamaedoris, Penicillus; Blodgettia; Anadyomene, Dictyosphaeria.

Valonieae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 507: fam. Coeloblastear. Gen.: Valonia, Ascothamnion, Dasycladus, Neomeris, Chamaedoris, Acrocladus, Polyphysa, Acetabularia, Cymopolia.

Valoradia*) Hochstett. 1842. Flora I. p. 239: nov. g. Plumbaginear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 65. n. 2176/1. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 641.

Meisn. 1843. Comm. p. 368: g. Plumbagear. — Par. Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 694.

Valota Adans. 1763. Fam. II. p. 495: g. Phalaridum. (Gramen arvense Sloane t. 14. f. 2.)

= . . . ?

Valota Dumort. vid. *Vallota Herb.*

Valsa Adans. 1763. Fam. II. p. 9: g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 458.

Scop. 1772. Carn. II. p. 397: g. Algar. (*Lichen-Agaricus Mich.*, *Hypoxylon Mentz.*) „An Fungis adnumeranda?"

Scop. 1777. Intr. p. 361: g. Fungoidear.

Fries 1825. Pl. homon. p. 107: subg. Valsae.

Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 277 *b*; 1841. Nom. p. 7. n. 299. 2: sect. Valsae.

---

*) Vox Itala.

*) Dicat. Valorado.

Valsa Fries 1825. Pl. homon. p. 107: g. Sphaerinor. ampliat. Subg.: Perigrapha, Valsa, Heterostomum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 458. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 277; 1841. Nom. p. 7. n. 299. Sect. eaed. — Endl. 1836. Gen. n. 395. p. 34; 1841. Ench. p. 19.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 135: g. Sphaeriaceor.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 410: g. Cytisporeor.
Synon. Variolaria Rouss.; Engizostoma Gray; Circinaria Pers.; Sphaeriae sp. Nees; Crytosphaeriae sp. Grev.

Valvatae Agardh 1822. Aphor. p. 107: div. Muscor. Vid. *Musci Agdh.*

Valvisporae Agardh 1825. Class. plant. p 14; 1826. Isis p. 588: class. Phanerocotyledonear. completar. hypogynar. polypetalar. Ord.: Samydeae, Flacourtianae, Resedaceae, Droseraceae, Frankeniaceae, Violarieae, Cistinae, Bixinae.

Vanalphena „Leschen.“ Rchb. Handb. p. 302 in synon. Reinwardtae: vid. *seq.*

Vanalphimia Leschen. mss. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 516 (et 744 sph. *Vanalpighmia*). = Saurauja Willd.

Vananthes Rchb. Consp. p. 158 et Endl. Ench. p. 405 in synon. Grammanthis: vid. *Vauanthes Haw.*

Vancouveria*) Morren & Decaisne 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 351; 1835. Bull. Ac. Brux. II. p. 205: nov. g. Berberidear. (Epimedium hexandrum Hook.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8). (verar.) — Endl. 1839. Gen. n. 4012. p. 853; 1841. Ench. p. 440.
Rchb. 1837. Hdb. p. 265; 1841. Nom. p. 185. n. 7089: g. Epimediear.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 52: g. Nandinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 438.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 33: g. Epimedinear.

Vanda R. Brown 1820. Bot. Regist. VI. n. 506 (Verm. bot. Schr. II. p. 415): nov. g. Orchidear. (Aërides paniculatum Lindl.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 719. n. 2985; 1831. Gen. II. p. 665. n. 3353. — Leman 1828. Dict. v. 56. p. 466.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 215: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1504; 1841. Nom. p. 54. n. 2078. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1472. p. 204; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (280). — — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 61. Sect.: verae, Fieldia. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 678. Sect.: Euvanda, Lamellaria, Fieldia.

Vanda R. Brown cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 57: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Lindl. 1853. Fol. Orchid. 20 Apr. Sect.: Fieldia, Euvanda, Lamellaria, Anota, cristatae.
Synon. Fieldia Gaudich.; Epidendri sp. Linn.; Angraeci sp. Pet.-Th.

Vandeae Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 529): trib. Epidendrear. Gen.: Calanthe, Octomeria, Arpophyllum, Pinalia, Maxillaria, Polystachya, Camaridium, Ornithidium, Pholidota, Sunipia, Telipogon, Ornithocephalus, Cryptarrhena, Psittacoglossum, Alamannia, Tipularia, Aërides, Vanda, Sarcanthus, Aëranthes, Angraecum, Cryptopus, Oeonia, Jonopsis, Cymbidium, Lissochilus, Geodorum, Sobralia, Gastrochilus, Dipodium, Oncidium, Macradenia, Brassia, Odontoglossum, Cyrtopodium, Cyrtochilum, Cuitlanzina, Anguloa, Catasetum, Eulophia, Xylobium, Trizeuxis, Fernandezia, Rodriguezia, Gomeza, Cirrhaea, Notylia, Megaclinium, Trichoceros, Masdevallia, Gongora. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 53. Gen. ut Endl. 1841 (Eckartia loco Peristerae, Eucnemia loco Eucnemidis, Corydandra loco Galeandrae).
Rchb. 1828. Consp. p. 68: div. Orchidear. Gen. ut Lindl. 1826 et Sophronia, Zygopetalon, Robiquetia, Lockhartia, Renanthera.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: trib. Orchidear. Gen. ex Lindl. — Par. Lindl. 1833. Orchid. Pt. III. p. 135. Gen.: Podochilus, Cryptopus, Aëranthes, Bifrenaria, Oeonia, Dipodium, Tetrapeltis, Chelonanthera, Sunipia; Lissochilus, Microsaccus, Trichoglottis, Acanthoglossum, Rodriguezia, Vanda, Diplocentrum, Geodorum, Jonopsis, Renanthera, Saccolabium, Taeniophyllum, Cleisostoma, Ceratochilus, Echioglossum, Sarcanthus, Schoenorchis, Angraecum, Oeceoclades, Tipularia, Aërides, Galeandra, Eulophia, Nanodes, Aspasia, Trizeuxis, Acriopsis, Ornithidium, Masdevallia, Peristeria, Alamania, Notylia, Oncidium, Camarotis, Micropera, Trichoceros, Macradenia, Fernandezia, Calypso, Pachyphyllum, Cyrtochilum, Stanhopea, Ornithocephalus, Cremastra, Catasetum, Myanthus, Geodorum, Dicrypta, Adenoncos, Telipogon, Grammatophyllum, Phymatidium, Brassia, Sobralia, Cymbidium, Acropera, Monachanthus; Cryptoglottis, Cyrtopera, Maxillaria, Eucnemis, Sarcochilus, Psittacoglossum, Cycnoches, Ephippium, Dorites, Chilochista, Govenia, Gongora, Cirrhaea, Phalaenopsis, Cryptarrhena, Anguloa, Coryanthes, Dichaea, Odontoglossum, Zygopetalum, Cyrtopodium, Cuitlauzina; Agrostophyllum, Calanthe, Limatodes, Cryptochilus, Ceratostylis, Thelasis, Acanthophippium, Appendicula, Arpophyllum, Glomera. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. 1834. p. 108. — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280). Gen. fere ut Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. Gen. ex Endl. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p.

*) Nomen ab habitatione circa Fort Vancouver Caforniae.

Vandeae Lindl. cont.
177. Gen. fere ut Endl. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 170. Sect. ut Lindl. 1847.

Dumort. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6: subtrib. Epidendrinear.

Endl. 1837. Gen. p. 196: subordo Orchidear. Gen.: Nanodes, Aspasia, Ornithidium, Acriopsis, Trizeuxis, Ornithocephalus, Cirrhaea, Sarcochilus, Trigonidium, Maxillaria, Epiphora, Siagonanthus, Trichocentrum, Bifrenaria, Batemania, Scaphyglottis, Dicrypta, Govenia, Alamania, Psittacoglossum, Cycnoches, Zygostates, Catasetum, Stanhopea, Gongora, Coryanthes, Anguloa, Peristera, Eucnemis, Cymbidium, Grobya, Acropera, Cremastra, Grammatophyllum, Trichoceros, Geodorum, Acanthephippium, Doritis, Chelonanthera, Acanthoglossum, Sunipia, Calypso, Eulophia, Dipodium, Galeandra, Zygopetalum, Cyrtopodium, Chysis, Cyrtopera, Lissochilus, Notylia, Masdevallia, Cryptochilus, Trichopilia, Jonopsis, Diadenium, Comparettia, Rodriguezia, Bourlingtonia, Macradenia, Cryptarrhena, Cuitlauzinia, Oncidium, Fernandezia, Pachyphyllum, Dichaea, Phymatidium, Cyrtochilum, Odontoglossum, Brassia, Tetrapeltis, Phalaenopsis, Trichoglottis, Telipogon, Vanda, Renanthera, Diplocentrum, Microsaccus, Camarotis, Chiloschista, Gunnia, Micropera, Saccolabium, Taeniophyllum, Cleisostoma, Appendicula, Cryptoglottis, Ceratostylis, Ephippium, Ceratochilus, Echioglossum, Sarcanthus, Podochilus, Adenoncos, Oeceoclades, Aërides, Schoenorchis, Aëranthes, Cryptopus, Oeonia, Angraecum, Mystacidium, Agrostophyllum, Calanthe, Anthericlis, Limatodes, Glomera, Oxyanthera, Thelasis. — Par. Endl. 1841. Gen. Spl. I. p. 1363; 1841. Ench. p. 110. Excluduntur Acanthephippium, Cryptochilus, Appendicula, Cryptoglottis. Accedunt Dactylostylis, Aganisia, Stenia, Huntleya, Cyclosia, Scleropteris, Chaenanthe, Quekettia, Miltonia, Malachadenia, Centropetalum; praeterea 1842 (Spl. II. p. 17 & 104) Houlletia, Birchea, Bromheadia et 1843 (Spl. III. p. 61) Seraphyta, Sutrina, Pteroceras, Leochilus, Stauroglottis, Ptychochilus. — Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 231. Nova genera: Ptychochilus, Stauroglottis.

Rchb. 1837. Hdb. p. 155: subdiv. Orchidear. genuinar.

Lindl. 1840. Gen. Orchid. p. XVII; 1847. Veg. kd. p. 181: trib. Orchidacear. Sect. (1847): Sarcanthidae, Cryptochilidae, Brassidae, Pachyphyllidae, Maxillaridae, Notylidae, Ionopsidae, Calanthidae.

Klotzsch ..... in Hayne Arzneigew. XXIV. subdiv. Ceracear. Gen.: Oncidium, etc.

Rchb. f. 1852. Poll. gen. p. 13: div. Operculatar. Gen.: Acineta, Maxillaria, etc.

Vandelia St. Hil., Wight vid. *seq.*

Vandellia *) Linn. 1767. Mant. p. 12. n. 1265; 1767. Syst. ed. XII. p. 422: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 479; 1784. Syst. p. 573. — Reich. 1778. Gen. p. 322. n. 838. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 419. n. 1040. — Gmel. 1791. Syst. p. 953. — Pers. 1797. Syst. p. 610; 1807. Ench. II. p. 167. n. 1494. — Willd. 1800. Sp. III. p. 343. n. 1180.

Scop. 1777. Intr. p. 172: g. Personatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 487. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 355. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 281 (*Vandelia*). — Link 1822. En. II. p. 144. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 466.

Juss. 1789. Gen. p. 122: g. Scrophulariis aff.

Neck. 1790. El. I. p. 345. n. 538: g. Chasmatophytor.

Vahl 1798. Eclog. II. p. 47.

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 35.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 396; 1825. Syst. II. p. 800. n. 2170; 1831. Gen. II. p. 489. n. 2412: g. Scrofularinar.

D. Don 1825. Nepal. p. 86: g. Scrophularinar.

Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.

Chamisso 1828. Linnaea III. p. 20. (Observ.)

Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3150: g. Antirrhinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24. — Bartl. 1830. Ord. p. 171.

Benth. 1835. Scroph. ind. p. 35; 1835. Scroph. rev. p. 4: g. Gratiolear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 548. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4599. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3952. p. 683; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 519. — Brongn. 1843. En. genr. p. 60. — Wight 1844. Ic. pl. Ind. III. 2. p. 5 (*Vandelia*). t. 863. — Walp. 1845. Rep. III. p. 291. 965. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 1.

Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 412; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Lindernicar. Sect.: Toreniodes, Tittmannia, Ilyogeton, Numularia, Ellobum. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 690. Sect. eaed.

Synon. Lindernia D. Don; Tittmannia Rchb.; Hornemannia Link & Otto; Diceros Blume?

Vandesia *) Salisbury 1812. Trans. hort. soc. I. p. 332: nov. g. Alströmerear. (Alströmeria edulis Tuss.)

Vangueria **) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 206; 1820. Mém. Mus. VI. p. 396: nov. g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 586. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 447. — Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 459 (*Vanguiera*). — Hedw. 1806. Gen. p. 136. n. 589 (*Vanguiera*). — Link 1821. En. I. p. 224. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 760. n. 817; 1830. Gen. I. p. 174. n. 878.

*) Dicat. Dom. Vandelli, prof. Colimbr.

*) Dicat. „Comtesse de Vandes."

**) *Voa Vanguier* Madagasc.

Vangueria Comm. cont.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 470 (*Vanguieria*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 789.
Gmel. 1791. Syst. p. 367: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 976. n. 355. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 172; ed. 1832. I. p. 536.
Batsch 1802. Tab. p. 235: g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 614. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2103; 1841. Nom. p. 76. n. 2841. (genuinar.) — DC. 1830. Pr. IV. p. 454. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 549. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 421. — Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 75. t. 193.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XIV, 222. n. 906: g. Coffeacear.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84 (*Vanqueria*): g. Lygistidiae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Vangueriear.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 217: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 430.
Endl. 1838. Gen. n. 3191. p. 540; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 248: g. Euvangueriear.
Synon. Vavanga Rohr; Meyna Link; Meynia Schult.

Vanguerieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Rubiacear. Gen.: Hamelia, Evosmia, Mitchella, Vangueria, Nonatelia.
Benth. 1849. Niger Fl. p. 411: subtrib. Rubiacear. Novum gen.: Craterispermum.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 248: trib. Coffeacear. Subtrib.: Euvanguerieae, Paederieae, Bobeae.

Vanguiera Pers., Hedw. vid. *Vangueria Comm.*

Vanguieria Poir. vid. *praeced.*

Vanhallia*) Marchand 1828. Bydr. tot nat. Wet. III. p. 261: nov. g. Fungor. (Conoplea cylindrica et atra.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 183.
= Chaetomium Kunze.

Vanhallia Schult. 1829. Syst. VII. p. XVIII. 66. n. 1322: g. Onagrear. (*Ceramium Blume*, nec Roth et Ag.)
Meisn. 1838. Gen. p. 121 (86): g. Gaurear.?
= Bragantia Lour.

Vanhouttea Ch. Lemaire 1845. Bull. soc. hort. Orléans I. p. 346; 1845. Hortic. univ. VI. p. 191. 289.
= Houttea Decne.

Vaniera St. Hil., Pers. vid. *seq.*

Vanieria**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 564. Ed. Willd. p. 690: nov. g. Monoec. Pentandr. (V. cochinchinensis et chinensis.)

*) Dicat. H. C. van Hall, prof. Groningensi.
**) Dicat. Jacobo Vanierio, scriptori botanico.

Vanieria Lour. cont.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 307 (*Vaniera*): g. Urticear.
Pers. 1807. Ench. II. p. 557 (*Vaniera*): sect. Böhmeriae.
= Elatostemma Forst.

Vanilla *) Plumier 1703. Nov. gen. pl. p. 25. t. 28.
Adans. 1763. Fam. II. p. 70: g. Orchidum.
= Epidendrum Linn.

Vanilla Juss. 1789. Gen. p. 66: g. Orchidear., ab Epidendro L. sejunctum. — Par. Swartz 1799. Nov. Act. Ups. VI. p. 66; 1799 in Schrad. Journ. II. p. 208; 1806. Ind. occ. III. p. 1997; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 82. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 210. — Batsch 1802. Tab. p. 101. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 165. — Pers. 1807. Ench. II. p. 520. n. 1999. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 220. (Verm. bot. Schr. II. p. 48.) — Link 1822. En. II. p. 372; 1829. Hdb. I. p. 255. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 421. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 715. n. 2978; 1831. Gen. II. p. 663. n. 3345. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 472. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1553. 1579.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 121. n. 1607; 1809. En. p. 946: g. Gynandr. Monandr. — Par. Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1513.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 355: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 339. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 293: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 529): g. Gastrodiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1460. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56.
Blume 1835. Rumphia I. p. 196. t. 67. 68: g. Vanillear. — Par. Lindl. 1840. Orchid. p. 434. — Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Endl. 1837. Gen. n. 1614. p. 220; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 189. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 3. — Klotzsch .... in Hayne Arzneigew. XXIV. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 718.
Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2189: g. Vanillacear.
Klotzsch 1846. Bot. Zeit. p. 561.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.
Synon. Vanillophorum Neck.; Myrobroma Salisb.; Myrobrama Ritg.

Vanillaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 341.
Rchb. 1841. Nom. p. 56: subdiv. Arethusear. Gen. Vanillear. Blume.

Vanilleae Blume 1835. Rumphia I. p. 196: nova trib. Orchidear. Gen.: Vanilla, Cyrtosia, Erythrorchis, Epistephium?
Rchb. 1837. Hdb. p. 155: subdiv. Orchidear. genuinar.

*) Nomen hispanicum.

Vanilleae Blume cont.
Lindl. 1840. Orchid. p. 429: div. Arethusear. Gen. ut Blume et. Cyathoglottis, Sobralia, Hysteria?
Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287): subtrib. Arethusear. Gen. ut Lindl.
Vanillidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Arethusear. Gen.: Cyathoglottis, Sobralia, Epistephium, Erythrorchis, Cyrtosia, Vanilla, Pogochilus. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Vanillophorum Necker 1790. Elem. bot. III. p. 134. n. 1476: g. Synarmophytor.
= Vanilla Juss.

Vanillosma Lessing 1831. Linnaea VI. p. 630 (*Vanilosma*): subsect. Vernoniae.
DC. 1836. Pr. V. p. 18: sect. Vernoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2204 *d.* p. 358; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3868. 4. — Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 211.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39 (*Vannillosma*): g. Vernoniear. verar.
Synon. Carphobolus Schott.

Vanilosma Less. vid. *praeced.*

Vannillosma Spach vid. *praeced.*

Vanqueria Rafin. vid *Vangueria Comm.*

Vanrheedia*) Plumier 1703. Gen. p. 45. t. 18 (*Vanrhedia* in tab.) Ed. Burm. 1755. t. 257.
= Rheedia Linn.

Vantana Necker vid. *seq.*

Vantanea**) Aublet 1775. Guian. II. p. 572. t. 229: nov. g. Polyandr. Monogyn. (V. guianensis.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 374. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 487. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 434. n. 2150.
Juss. 1789. Gen. p. 434: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 257. n. 1009 (*Vantana*): g. Dapsilophytor.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3616 b: g. Oleacinar. genuinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5383. p. 1011; 1841. Ench. p. 523: g. (dubium) Tiliacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 260.
Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7964: g. Tiliear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 344.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 447: g. Humiriacear. — Par. Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 98. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 382. 383.
Synon. Lemniscia Schreb.; Lemnescia Willd.; Helleria Mart.

Vanvoorstia***) Harvey 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 144. t. 5: nov. g. Floridear., Claudeae aff. (V. spectabilis.)

Varasia†) Philippi 1860. Fl. Atacam. p. 35. t. 5. f. B: nov. g. Gentianear. (V. podocarpa), nomine (err. *Varcasia*) indicatum in Bot. Zeit. 1857. p. 681.

Varcasia „Phil. Fl. Atacam. ined." Bot. Zeit. 1857. p. 681: vid. *praeced.*

*) Dicat. Henrico Adriano Van Rheede tot Draakestein.
**) Nomen caribaeum simile.
***) Dicat. Joh. Van Voorst.
†) Dicat. dom. Ant. Varas.

Vareca Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 290. t. 60. f. 6: nov. g. pl. flore incognito. (*Walwareka* Zeylanens.) *Cf.* Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 490.
DC. 1828. Pr. III. p. 337: g. Passiflorear. (verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 271. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 59. — Meisn. 1838. Gen. p. 124 (89). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 257. (?) — Endl. 1839. Gen. n. 5102. p. 927; 1841. Ench. p. 483 (dubium). — Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5082.
Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3464: g. Granadillear.
Blume 1833. Nov. fam. expos. (Tijdschr. v. nat. Geschied. I. p. 132); 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 90: g. Pangiear.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 133. 205: g. Modeccear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.?

Vareca Roxb. 1824. Fl. Ind. ed. Wall. II. p. 445; ed. 1832. I. p. 647: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Bennett in Horsf. Pl. jav. rar. p. 209.
= Pentaloba Lour.? (Endl. Gen. p. 911.)

Varennea DC. 1825. Prodr. II. p. 522 (Lég. mém. XIV): g. Leguminosar. non satis notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 466.
Meisn. 1837. Gen. p. 85 (60): g. Genistear.? et p. 95 (68) Dalbergiear.?
Synon. Viborquia Ort.

Vargasia „Bertero" Spreng. 1825. Syst. II. p. 283. 388. n. 1707; 1830. Gen. I. p. 354. n. 1789: g. Malpighiear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1429.
Bartl. 1830. Ord. p. 359: g. Malpighiacear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 124.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 643: g. Banisteriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39). — Rchb. 1837. Hdb. p. 299.
= Thouinia Poit.? (Endl. Gen. p. 1071.)

Vargasia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 676: nov. g. Eugalinsogear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2618. p. 426; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133).
Deless. . . . . Icon. select. IV. t. 47.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Heleniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3111: g. Galinsogear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Conf. Vasargia Steud.
Variflorae Rchb. 1828. Consp. p. 141; 1831. Fl. exc. p. 437. 439; 1837. Handb. p. 217; 1841. Nomencl. p. 138: ordo Calycanthar. Formationes: Parviflorae, Leguminosae.

Varilla A. Gray 1849. Pl. Fendl. p. 106 adnot. (Mem. Amer. Ac. I; Flora 1850. II. p. 713): nov. g. Athanasiear. (V. mexicana.) *Cf.* A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 123. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 895.

*) Dicat. Dr. Vargas, Caracasano.

Varinga Miquel 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 33: subsect. Caricae. (Ficus scabrella, radicans, comosa, conglomerata, etc.)

Variolaria Bulliard 1780 (?) Herb. Fr. t. 492: g. Hypoxyleor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 492.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 17: g. Fungor. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 7.
= Sphaeria Hall.

Variolaria Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 23: gen. fam. tertiae plantar. lichenosar. *Cf.* Fries 1825. Pl. homon. p. 278, Leman 1828. Dict. v. 56. p. 493 et Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 42.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 27: g. Lichenum. (crustaceor.) — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 324; 1815. V. p. 176. — Mart. 1817. Erlang. p. 258. (verrucosor.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXIX. 12: g. Stereothalamor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 289.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 67. 319; 1814. Syn. Lich. p. 119: g. Phymatoideor.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Variolariarum.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Leprosar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 490: g. Variolaridar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 15: g. Verrucariarum.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 883: g. Coniothalamar.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 358: g. Coniocarpicar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Variolariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 13. n. 504: g. Variolariacear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 4.
Bayrh. 1849. Taun. p. 100: g. Anamorphosium.
Math. 1853. Belg. II. p. 154: g. Lichenear. sect. 5.

Variolaria Rouss. ex Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 143.
= Valsa Adans. (Endl. Gen. p. 34.)

Variolaria Sternb. 1820. Vers. I. 1. p. 24: trib. Lepidodendri.
Mart. 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . . . : g. foss. pl. *Cf.* Flora 1823. I. p. 326, ubi proponitur nomen *Sedeites*.
= Stigmaria Brongn.

Variolariaceae Rchb. 1841. Nomencl. p. 13: fam. Coniopsorar. Gen.: Variolaria.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 4: div. Lichenum imperfector. Gen. id.

Variolariae Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: series Coniothalamor. Gen.: Spiloma, Conioloma, Coniangium, Variolaria.

Variolaridae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 486. 490: div. Idiothalamear. Gen.: Variolaria.

Variolarieae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Variolaria.

Varonthe Juss. herb.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5592 inter genera vix cognita.
= Physena Nor.

Varronia*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 172: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 916. 1363. n. 1118; 1762. Sp. ed. II. p. 275; 1764. Gen. ed. VI. p. 102. n. 258; 1767. Syst. ed. XII. p. 176. n. 257. — Jacq. 1763. Amer. p. 40. t. 33. — Murr. 1774. Syst. p. 192; 1784. Syst. p. 231. — Reich. 1778. Gen. p. 105. n. 279. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 140. n. 353. — Lour. 1790. Coch. I. p. 138. — Gmel. 1791. Syst. p. 394. — Pers. 1797. Syst. p. 241; 1805. Ench. I. p. 167. n. 371. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1079. n. 398. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 23. t. 146. 147. (reform.)
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 129. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 297. — Hedw. 1806. Gen. p. 117. n. 515. — Desv. 1808. Journ. bot. I. p. 257. (Monogr.) — Poir. 1824. Dict. v. 32. p. 454 (*Monjoli*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 177: g. Borraginum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Asperifoliar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 157. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. I. p. 78.
Gled. 1764. Syst. p. 211. n. 882: g. Petalostemonum.
Neck. 1790. El. I. p. 277. n. 437: g. Trachytophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 383: g. Sebestenar.
Ledeb. 1810 in Schrad. n. Journ. IV. 1. p. 79.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 71: sect. Cordiae. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 458. — Kunth 1823. Syn. II. p. 194. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 382. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 613.
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2988: g. Hydrophyllear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Cordiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 193.
Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 115: subg. Cordiae.
Endl. 1839. Gen. p. 644. n. 3738 *b β*: subsect. Sebestenae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4371. 2 *b*.

Varronia DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 278 (185): g. emendat. Cordiacear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3738/$_1$. p. 1401; 1841. Ench. p. 319. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629.
DC. 1845. Pr. IX. p. 468: g. Cordiear.

Varthemia**) DC. 1836. Prodr. V. p. 473: nov. g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2428. p. 394; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28: g. Inulear. (genuinar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3394. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip 1843 in Walp. Rep. II. p. 953 (err. *Karthemia*): g. Conyzear. legitimar.

*) Nomen ab antiquo autore, qui de re rustica scripsit.
**) Dicat. peregrinatori Lud. de Varthem.

Varthemia DC. cont.
Boiss. 1845. Diagn. pl. or. I. Nr. 6. p. 74 (*Warthemia*); 1856. ibid. III. Sér. 2. Nr. 3. p. 9: g. Corymbiferar.
Synon. Blanchea Boiss.

Vasargia*) Steud. 1841. Nomencl. II. p. 745: nomen pro *Vargasia DC.* (non Bert.) propositum.

Vascoa DC. olim.
= Mundia Kunth.

Vascoa DC. 1825. Prodr. II. p. 119 (Lég. Mém. VI): g. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4049. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 130. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59).
Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 462: sect. Rafniae. (praeeunte Benth.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6459 *a*. p. 1261; 1841. Ench. p. 667. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5899. 2. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 464.
Synon. Crotalariae sp. Linn.; Rafniae et Borboniae sp. Thunb., Willd.

Vasconcella St Hilaire 1837. Mém. Réséd. II. p. 12 in not. *Cf.* Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 259 (*Vasconcellea*).
Endl. 1839. Gen. n. 5120. p. 933; 1841. Ench. p. 487: g. Papayacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 109. — Walp. 1843. Rep. II. p. 205 (*Vasconella*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 316. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 121. 124. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 322. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 455.
Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3975: g. Papayear.

Vasconcellea Planch. vid. *praeced.*

Vasconcellia Martius Herbar. et mss.
= Arrabidaea DC.

Vasconella Walp. vid. *Vasconcella St. Hil.*

Vasculares Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I: class. I. plant. Subclass.: Exogenae, Endogenae.

Vasquezia Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Synantherear. (Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 31. t. 5. f. A: V. biternata.)

Vatairea Aublet 1775. Guian. II. p. 755. t. 302: nov. g. Diadelph. Hexandr.?, Octandr.?, Decandr.? (V. guianensis.)
Gmel. 1791. Syst. p. 1085 in Diadelph. Decandr.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 501 (*Dartrier*): g. Leguminosar.
DC. 1825. Pr. II. p. 521: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 465. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4120: g. Caesalpiniear.?
Endl. 1841. Gen. n. 6734. p. 1307; 1841. Ench. p. 673: g. Dalbergiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6027. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Vateria*) Linn. 1737. Gen. p. 153. n. 431; 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 235. n. 514; 1753. Sp. I. p. 515; 1759. Syst. ed. X. p. 1076. n. 592; 1762. Sp. ed. II. p. 734; 1764. Gen. ed. VI. p. 269. n. 666; 1767. Syst. ed. XII. p. 364: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 411; 1784. Syst. p. 494. — Reich. 1778. Gen. p. 273. n. 722. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 359. n. 906. — Lour. 1790. Coch. I. p. 333. — Gmel. 1791. Syst. p. 819. — Pers. 1797. Syst. p. 530. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 86. t. 288; 1832. Ind. II. p. 601.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 112. n. 459: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 262: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 258: g. Guttiferis et Aurantiis aff. — Simil. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 31 (err. *Walteria*).
Neck. 1790. El. II. p. 272. n. 1030: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear., et p. 90 iterum in Guttaeferis.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 53.
Pers. 1807. Ench. II. p. 70. n. 1290: g. Guttiferar. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104. — Spreng. 1825. Syst II. p. 599. n. 1926; 1830. Gen. I. p. 432. n. 2142.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 785: g. Mesuëar.
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 498: g. Elaeocarpo injungendum censet.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5432: g. Elaeocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 340. — Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29)?
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 814: g. Dipterocarpear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 83. — Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27). — Rchb. 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 210. n. 7978. — Arnott 1839. Ann. nat. hist. III. p. 155. Sect.: Euvateria, Isauxis. — Endl. 1840. Gen. n. 5394. p. 1013; 1841. Ench. p. 525. Sect. eaed. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 258. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 309. — Walp. 1846. Rep. V. p. 126. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 336.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4: g. Tiliaceis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 394: g. Dipteracear.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 29: g. Vateriear.
Synon. Panoë Adans.; Isauxis Arn.; Seidlia Kost.; Retinodendron Korth.

Vaterieae Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 28: subordo Dipterocarpear. Gen.: Vateria, Vatica.

Vatica Linn. 1771. Mant. II. p. 152. n. 3011: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 368; 1784. Syst. p. 443. — Reich. 1778. Gen. p. 243. n. 649. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 318. n. 812. — Gmel. 1791. Syst. p. 748. — Pers. 1797.

*) Anagramma nominis Vargasia.

*) Dicat. Abrah. Vater, prof. Wittenberg.

Vatica Linn. cont.
474; 1807. Ench. II. p. 3. n. 1163. — Willd. 1799. Sp. II. p. 847. n. 936.
Scop. 1777. Intr. p. 236: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 259: g. Guttiferis et Aurantiis aff. — Simil. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 31.
Batsch 1802. Tab. p. 83: g. Hesperidear., et p. 90 denuo in Guttaeferis.
DC. 1824. Pr. I. p. 517: g. Tiliaceis aff. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 449. n. 1754; 1830. Gen. I. p. 389. n. 1951: g. Tiliacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 557. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 5.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5458: g. Tiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28)?
Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 499: g. Guttiferar.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 84: g. Dipterocarpear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27). — Rchb. 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 210. n. 7890. — Endl. 1840. Gen. n. 5395. p. 1014; 1841. Ench. p. 525. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 310. — Walp. 1846. Rep. V. p. 127. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 337.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 394: g. Dipteracear.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 30: g. Vateriear. Sejungitur Shorea.
Synon. Shorea Roxb.?; Saul Roxb. (Steud.)

Vauanthes *) Haworth 1821. Rev. pl. succ. p. 18: nov. g. Pentandr. Pentagyn. (Crassula dichotoma L.)
= Grammanthes DC.

Vaucheria **) DC. 1803 in Vauch. Mém. Conf. p. 25; 1805. Fl. franç. II. p. 61: nov. g. Algar. (Conferva fontinalis L.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 500. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 303. (infusoriar.)
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXIII. 47; 1821. Aphor. p. 99: g. Ulvoidear.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 75: g. Soleniator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 289: g. Vaucheridear.
Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 458; 1824. Syst. p. XXXI. 171: g. Ulvacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 337.
Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 520: g. Hydronematear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 364. n. 3429; 1831. Gen. II. p. 755. n. 3839: g. Solenotar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 87.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 472 *b*: sect. Ectospermae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: g. Vaucheriacear.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 189.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 57: g. Trichonematum.

*) Nomen a corollae lacinis basi litera *vau* reversa parva rubra eleganter notatis.
**) Dicat. J. P. Et. Vaucher, prof. Genevensi.

Vaucheria DC. cont.
Nardo 1835. Consid. Alghe (Isis 1837. p. 90): g. Tubulosar.
Endl. 1836. Gen. n. 79. p. 7; 1841. Ench. p. 5: g. Siphonear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 35. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 404; 1841. Brit. Alg. p. 146; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 261. — Hass. 1845. Brit. freshw. Algh.
Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 669: g. Vaucheriear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 20. n. 61. (verar.) — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 305; 1845. Phyc. germ. p. 249; 1849. Sp. Alg. p. 486. n. 306. — Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 4. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 124. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XIII. p. 44. — Math. 1853. Belg. II. p. 500.
Trevis. 1843. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): g. Vaucheriar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Hydrogastridar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p....: g. Bryopsidear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. oligocytidear. bicellularium.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 30: g. Codiear.
Synon. Ectosperma Vauch.

Vaucheriaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Granuliniae. Gen.: Ectosperma.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: fam. Confervariear. Gen.: Vaucheria, Ectosperma.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p....: ordo 11 Algar. Trib.: Bryopsideae, Codieae.

Vaucheriae Trevisan 1843. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): trib. Siphonoidear. Gen.: Valonia, Dasycladus, Caulerpa, Bryopsis, Vaucheria, Hydrogastrum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: subordo Fucacear. Trib.: Hydrogastridae, Dasycladidae, Ectocarpidae, Batrachospermidae, Chordaridae.

Vaucherideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 288: div. Hydrophytar. Gen.: Bryopsis, Vaucheria, Codium.

Vaucherieae Fries 1825. Pl. homon. p. 340: trib. Ulvacear. Gen.: Alysium, Bryopsis, Codium. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 27. Gen. ead. et Ectosperma, Coccoderma. — Rchb. 1837. Hdb. p. 136. Subdivis.: Protonemeae, Ectospermeae, Bryopsideae. — Rchb. 1841. Nom. p. 19. Gen.: Botrydium, Vaucheria, Bryopsis, Alysium, Coccoderma, Valonia, Codium, Flabellia, Anadyomene. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. (Syngonimicar.) Gen.: Bryopsis, Vaucheria, Valonia, Hydrogastrum.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328 (Flora 1843. p. 93): trib. Aplosporear. Gen.: Vaucheria.
Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.

Vaucherieae Fries cont.
Endl. 1843. Spl. III. p. 19: subordo Phycear. Trib.: Hydrogastreae, Dasycladeae, Ectocarpeae, Batrachospermeae, Chordarieae.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 302; 1845. Phyc. germ. p. 249: fam. Coeloblastear. Gen.: Botrydium, Vaucheria, Bryopsis, Valonia. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 486. Gen.: Botrydium, Vaucheria, Sciadium, Bryopsis, Rhipidosiphon.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 123: subsect. Siphonear. Gen.: Mycocoelium, Botrydium, Vaucheria, Bryopsis, Valonia, Dasycladus.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: trib. Phycoidear. Gen.: Bryopsis, Derbesia?, Hydrogastrum, Vaucheria, Achlya, Valonia.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 228: fam. Chlorosporear.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 445: fam. Siphonear. Gen. scand.: Bryopsis, Halicystis.
Math. 1853. Belg. II. p. 500: trib. 12 Algar. Gen.: Vaucheria, Botrydium, Hydrogastrum.

Vaucherieae verae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 19: subtrib. Hydrogastrear. Gen.: Hydrogastrum, Vaucheria, Bryopsis, Valonia.

Vauquelina Spreng., Dietr. vid. *seq.*

Vauquelinia *) Correa 1808 in Humb. & Bonpl. Pl. aequin. I. p. 140. t. 40: nov. g. Salicariis et Rosaceis aff.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 868 (*Vauquelina*): g. Rosaceis aff.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 238: g. Spiraeacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 479. — DC. 1825. Pr. II. p. 547. — Bartl. 1830. Ord. p. 404. (descisc.) — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 429 (anomalum).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 466. n. 1801; 1830. Gen. I. p. 399. n. 2003: g. Rosacear. (Dodecandr. Pentagyn.) — Par. Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 507. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3 (*Vauquelina*). 32.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4457: g. Spiraeear.
D. Don 1831. Edinb. n. phil. journ. X. p. 229: g. Quillajear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 523. — Meisn. 1837. Gen. p. 103 (72). — Endl. 1840. Gen. n. 6398. p. 1249; 1841. Ench. p. 660. — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6518. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565.

Vautheria Wittst. vid *seq.*

Vauthiera A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 106: nov. g. Cyperacear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 919 (*Vautheria*). — Par. A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 372.
Endl. 1837. Gen. n. 996. p. 117; 1841. Ench. p. 64: g. Ficiniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1490: g. Fuirenear. genuinar.

Vauthiera A. Rich. cont.
Meisn. 1843. Gen. p. 411 (314): g. Scirpear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Ficinidar.
Steud. 1855. Glum. II. p. 165: g. Rhynchosporear. anomalum.

Vavaea *) Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 212: nov. g. Ixonanthi aff., Cedrelacear.? *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 896.
Endl. 1843. Spl. III. p. 95. n. 5557/1: g. Cedrelear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 376. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 462.
Walp. 1843. Rep. II. p. 801: g. Elaeocarpear.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 132. 141: g. Cedrelaceis aff.
A. Gray 1854. Bot. Un. St. exped. Phan. I. p. 244. t. 6; 1855. Mem. Amer. Ac. n. ser. V. p. 329: g. Meliacear.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 388: g. Trichiliear.

Vavanga Rohr 1792 in Danske Nat. selsk. Skrivt. II. 1. p. 208: nov. g. pl. (V. edulis.)
= Vangueria Comm.

Vedela Adans. 1763. Fam. II. p. 502: g. Vaccinior. (*Synon. Viscoides Plum.*)
= . . . ?

Vegelia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 355. n. 1784: g. Darinyphytor.
= Weigela Thunb.?

Vegetabilia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53. Classes: Staminacia, Pollinacia, Fluidacia.
Bartl. 1830. Ord. nat. p. 3. Divis.: *cellularia* (class.: Fungi, Lichenes, Algae, Musci), *vascularia* (sect.: *cryptogama* [class.: Rhizocarpae, Filices, Lycopodineae, Gonyopterides], *phanerogama* [divis.: Monocotyledonea, Dicotyledonea]).
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 1. Classes: Dicotyleae, Monocotyleae, Filices, Musci, Cryptophyta.

Vegetabilia agama Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. XIII. 2. Classes: Filices, Lichenastra, Musci, Lichenes, Algae s. Phykea, Fungi s. Mycetes.

Vegetabilia fossilia Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 203—240. p. 297—348. Class. I. Gen.: Exogenites, Endogenites. Class. II. Gen.: Culmites, Calamites, Syringodendron, Sigillaria, Clathraria, Sagenaria, Stigmaria. Class. III. Gen.: Lycopodites, Filicites, Sphenophyllites, Asterophyllites, Fucoides, Phyllites, Poacites, Palmacites. Class. IV. Ord.: Carpolithes, Antholithes.

Vegetabilia fungosa Nees 1817. Syst. Überbl. p. 38: class. Vegetabilium. Regna: Fungi aërei et hypogaei; clavati et pileati; Utrini, Myelomyci.

Vegetabilia mycetoidea Nees 1817. Syst. Überbl. p. 1: class. Vegetabilium. Regna: Protomyci, Nematomyci, Gastromyci.

Veisia Hedwig vid *Weisia Hedw.*

*) Dicat. Nic. Lud. Vauquelin, chemico.

*) Nomen ab insula Vavao.

Velaea *) DC. 1829. Coll. mém. V. p. 61; 1830. Prodr. IV. p. 230: nov. g. Scandicinear. (Ligusticum toluccense Kunth.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 369. — Rchb. 1837. Hdb. p. 219. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107).

Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.

Endl. 1839. Gen. n. 4511. p. 787; 1841. Ench. p. 380: g. Scandicinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5328.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Velaga Adans. 1763. Fam. II. p. 398: g. Malvar.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 245. t. 133. (*Velago* xylocarpa.)

Vent. 1799. Tabl. III. p. 193: g. Malvacear.

DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 111; 1824. Pr. I. p. 500: sect. Pterospermi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5316 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 537. — Endl. 1840. Gen. n. 5352 *a*. p. 1003; 1841. Ench. p. 520.

Velaga Gärtn. 1791. Fruct. II. t. 133 (globosa).

Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 622: sect. Lagerströmiae.

Velago (xylocarpa) Gärtn. vid. *Velaga Adans.*

Velarum **) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 459; 1824. Prodr. I. p. 191: sect. Sisymbrii. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 204. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 689; 1841. Nom. p. 183. n. 7033. 1. — Koch 1836. Syn. p. 47. Éd. II. p. 51. — Endl. 1839. Gen. n. 4906 *a*. p. 875; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 176. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 257.

Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1103. 1165; 1828. Consp. p. 185. n. 4808: g. Sisymbrear. Sect.: Velarum (in Consp. Klukia), Kibera.

Synon. Erysimum Link; Klukia Andrz.; Chamaeplium Wallr.

Velezia ***) Linn. 1753. Spec. I. p. 332; 1759. Syst. ed. X. p. 989. n. 403; 1762. Sp. ed. II. p. 474; 1764. Gen. ed. VI. p. 176. n. 774: g. Hexandr. Digyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 79.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 330. — Juss. 1789. Gen. p. 302. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 248. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 119. — — DC. 1805. Franç. IV. p. 765. — Hedw. 1806. Gen. p. 183. n. 756. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 837. (anomal.); 1825. Syst. I. p. 866. n. 1015; 1830. Gen. I. p. 216. n. 1117. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XXI. 215. — Link 1821. En. I. p. 287. — Lois. 1828. Dict. v. 57. p. 220. — Rchb.

*) Nomen ex claro Seb. Eug. Vela.
**) *Etym.*: „Erysimum, quod. Galli *Velarum* appellant: Plin."
***) Dicat. Franc. Velez de Arciniega, Hispano.

Velezia Linn. cont.

1828. Consp. p. 206. n. 5357. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 923.

Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.

Gled. 1764. Syst. p. 62. n. 248: g. Thalamostemonum.

Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 198: g. Pentandr. Digyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 130. n. 350. — Murr. 1784. Syst. p. 266. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 174. n. 448. — Gmel. 1791. Syst. p. 459. — Pers. 1797. Syst. p. 279; 1805. Ench. I. p. 290. n. 645. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1329. n. 510.

Neck. 1790. El. III. p. 394. n. 1840 (*Welezia*): g. Catotaphytor. (Sarothrae proximum.)

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 216. t. 129.

DC. 1824. Pr. I. p. 387: g. Silenear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1832. Fl. exc. p. 803. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 306. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 417. — Link 1831. Hdb. II. p. 249. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 147. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 324. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 195. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.

Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Dianthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5243. p. 971; 1841. Ench. p. 505. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 274. — A. Braun 1843. Flora p. 386. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 242.

Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7820: g. Tunicear.

Velheimia Scopoli vid. *Veltheimia Gled.*

Vella *) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 329; 1737. Coroll. p. 12. n. 970.; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 317. n. 654; 1748. Ups. p. 186; 1753. Sp. II. p. 641; 1759. Syst. ed. X. p. 1126. n. 714; 1763. Sp. ed. II. p. 895; 1764. Gen. ed. VI. p. 331. n. 797; 1767. Syst. ed. XII. p. 431: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 488; 1784. Syst. p. 584. — Reich. 1778. Gen. p. 333. n. 861. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 435. n. 1073. — Gmel. 1791. Syst. p. 969. — Pers. 1797. Syst. p. 621. — Willd. 1800. Sp. III. p. 422. n. 1222; 1809. En. p. 663. — Link 1822. En. II. p. 149.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 62. n. 260: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 275.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 241. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 509. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 79. (Verm. bot. Schr. V. p. 13.) — Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 221.

*) Nomen e Galeno desumptum. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 220.

Vella Linn. cont.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[11]: g. Siliculosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 320. — Smel. 1805. Nov. Act. Petr. XIV. p. 478. — Pers. 1807. Ench. II. p. 185. n. 1548. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 721; 1825. Syst. II. p. 870. n. 2293; 1831. Gen. II. p. 517. n. 2537. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 674.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 340; 1789. Phil. Bot. I. p. 193.
Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 49; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 40: g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen.*)
Vent. 1799. Tabl. III. p. 112: g. Alyssoidear.
Conf. seq.

Vella DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 639; 1824. Prodr. I. p. 223: g. Vellear. restrict. (Vella Pseudocytisus L.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182. n. 4740; 1841. Nom. p. 181. n. 6979. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 254. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4957. p. 884; 1841. Ench. p. 451. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 92.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 529.
Link 1831. Hdb. II. p. 300: g. Alyssinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Vellidar.
Synon. Carrichterae sp. Adans.

Vella Gray 1821. Ann. brit. pl. II. p. 690: g. Cruciferar. (V. annua L.)
= Carrichtera DC.

Vellaquezia Wittst. vid. *seq.*

Vellasquezia Bertol. 1840. Fl. Guatim. p. 40. t. 11: nov. g. Amentacear. (V. Melaenodendron.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 253 et Wittst. Etym. Handw. p. 920 (*Vellaquezia*).
= Triplaris Linn.

Velleae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 243; 1821. Syst. II. p. 152. 639; 1824. Prodr. I. p. 651: trib. Orthoplocear. Gen.: Vella, Boleum, Carrichtera, Succowia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 254. Gen. ead. et Savignya. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). Gen. ut Don. — Endl. 1839. Gen. p. 884; 1841. Ench. p. 451. Gen. ead. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 74) Stroganowia et 1850 (Spl. V. p. 40) Stubendorffia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182: subdiv. Siliculosar. Gen. ut DC.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181: subdiv. Amphischistar. Gen. ut Don et 1841 Schimpera?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 92: trib. Cruciferar.

Velleia *) Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 217.
Labill. 1804. Nov. Holl. t. 77. Char. emend.

Velleia Smith cont.
Cf. Schrad. n. Journ. III. 1. p. 118 (*Velleja*).
Hedw. 1806. Gen. p. 141. n. 611: g. Campanulear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 580. Ed. Nees p. 436: g. Goodenoviar. Sect.: Menoceras, Velleiae verae. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. V. 33. n. 870.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 5; 1823. Dict. v. 27. p. 98: g. Lobeliacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 526; 1825. Syst. I. p. 722. n. 784: g. Lobeliear.
Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 223: g. Goodenoviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2278. Sect. ut R. Brown. — Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Goodeniear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 152. n. 762. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 726. Sect. ut R. Br. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186. — Endl. 1838. Gen. n. 3047. p. 508; 1841. Ench. p. 261 (*Velleja*). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 517 (*Velleya*). — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (147). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 683. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. — Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4014 (*Velleya*). Sect.: Menoceras, Velleya. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32 (*Velleya*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695 (*Velleja*). — Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 171. Sect. ut R. Brown. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 386.
F. Müll. 1854. Trans. phil. soc. Vict. I. Nr. 1 (Flora 1855. p. 624): g. Goodeniacear. Nova sect.: Aceratia.

Velleja Schrad., Endl., Lindl. vid. *praeced.*

Velleya DC., Rchb., Brongn. vid. *praeced.*

Vellidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Orthoplocear. Gen. Vellear. Endl. 1842 et Stubendorfia, Savignya.

Vellosia *) Vandelli 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. t. 6. f. 12 (*Vellozia* in textu, *q. cf.*): nov. g. Isocandr. Monogyn.
A. St. Hil. 1822. Mém. Mus. IX. p. 313 (*Velosia*): g. Amaryllidear.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 155: g. Bromeliacear. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 224.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 338. n. 2625; 1831. Gen. II. p. 603. n. 2972: g. Haemodorear. (in Polyadelph.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1230.
Endl. 1837. Gen. n. 1262 *b*. p. 173; 1841. Ench. p. 101: sect. Vellosiae.
Herb. 1837. Amaryll. p. 64. 81: g. Xerophytear.
Synon. Vellozia Vand.; Campderia A. Rich.; Radia A. Rich.

Vellosia Mart. & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 13. t. 6—9: g. Haemodorear, injuncta Xerophyta ampliat. — Par. Pohl 1827. Pl. brasil. I. p. 116. t. 93—100.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Haemodoracear.

---

*) Dicat. Thom. Velley, botanico anglico.

*) Dicat. Vellozo, botanico Brasiliano.

Vellosia Mart. cont.
D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. VIII. p. 164: g. Hypoxidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1262. p. 173; 1841. Ench. p. 101: g. Velloziear. Sect.: Xerophyta, Vellosia.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 73: g. Vellosiear. Sect.: Xerophyta, Euvellosia.

Vellosieae Rchb. 1837. Handb. p. 151: subdiv. Haemodorear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 23: fam. Bromelioidear. Gen.: Barbacenia.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 65. Gen.: Barbacenia, Vellosia.

Vellozia Vandelli 1796 in Röm. Script. p. 112: g. Isocandr. Monogyn.
Spreng. 1821. Neue Entd. II. p. 108: g. Liliacear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 172: g. Iridear. spuriar.
Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1671: g. Velloziear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 399: g. Bromeliaceis aff.
Conf. Vellosia Vand.

Vellozieae Endl. 1837. Gen. p. 172: sect. Haemodoracear. Gen.: Barbacenia, Vellosia. *Cf.* Beer 1857. Fam. Bromel. p. 191.
Endl. 1841. Ench. p. 101: fam. Haemodoraceis aff. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 46: sect. Haemodorear. genuinar. Gen. ead. et Xerophyta.
A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740: trib. Bromeliacear. Gen. ut Endl.
Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299): trib. Haemodoracear. Gen. ut Endl. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153. Gen. ead.

Velosia A. St. Hil. vid. *Vellosia Vand.*

Velthaemia Thunb. vid. *seq.*

Veltheimia *) Gleditsch 1771. Act. Ac. Berol. pro 1769. p. 67: nov. g. ab Alethride sejunctum. (A. capensis L.) *Cf.* Schrank 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 89 (*Velthemia*).
Scop. 1777. Intr. p. 85 (sph. *Velheimia*): g. Liliacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 236; 1825. Syst. II. p. 75. n. 1222; 1830. Gen. I. p. 258. n. 1345. — Link 1821. En. I. p. 332. — Eckl. 1827. Verz. p. 2. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1110.
Medic. 1786. Theod. spec. p. 98; 1789. Vorles. IV. 1. p. 223; 1789. Phil. Bot. I. p. 68.
Mönch 1794. Meth. p. 631: g. Thalamostemonis.
Willd. 1799. Sp. II. p. 181. n. 656; 1809. En. p. 380: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 377. n. 382. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 278 (*Velthaemia*).
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 127: g. Asphodelear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 226. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XL. 628.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1401: g. Aletrinear.
Link 1829. Hdb. I. p. 170: g. Hyacinthinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Hyacinthear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1121. p. 144; 1841. Ench. p. 83. — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 281. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 290.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Hemerocallidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1776: g. Scillear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 18 (*Weltheimia*): g. Hyacinthinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Hemerocallear.

Velthemia Schrank vid. *praeced.*

Veltis Adans. 1763. Fam. II. p. 116: g. Carduor. (Carduus eryngoides Pr. Alp.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 57. p. 228.
Scop. 1777. Intr. p. 124: g. Flosculosar.
= Centaureae sect. Acrocentri spec.

Velutella Fries Syst. myc. III. 2. p. 458: sphalm. pro *Volutella.*

Venana Lamarck Illustr. t. 131; Poir. 1807. Encycl. méth. VIII. p. 450.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXIV. 433. n. 991: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 229.
Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 104: g. Guttiferar.?
Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 312: g. inter Terebinthaceas et Rhamneas intermedium?
= Brexia Petit-Thouars.

Venegasia *) DC. 1837. Prodr. VI. p. 43: nov. g. Chrysanthemear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2660. p. 433; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 210 (134). — Nutt. 1841. Am. phil. trans. n. ser. VII. p. 395. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 410. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3077. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 276 (*Venesaglia*): g. Pyrethrear.

Venelia Commers. mss.
= Erythroxylon Kunth.

Venesaglia Schultz Bip. vid. *Venegasia DC.*

Venidium Lessing 1831. Linnaea VI. p. 91; 1832. Syn. Compos. p. 29: nov. g. Arctotidear. (Arctotis scabra Thunb.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3236. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37.
DC. 1837. Pr. VI. p. 491: g. Arctotear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2832. p. 464;

*) Dicat. Aug. Ferd., comiti de Veltheim, fundatori horti Harbkeani.

*) Dicat. Mich. Venegas, jesuitae hispanico.

Venidium Lessing cont.
1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Synon. Cleitria Schrad.; Cleithria Wittst.; Arctotidis et Osteospermi sp. Linn., Thunb.

Venilia *) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 507: sect. Scrophulariae. *Cf.* Wydl. in Mém. soc. Genèv. IV. p. 45. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 164. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 302. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 215. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 706.
Synon. Ceramanthe Rchb.

Venosae Rchb. 1828. Consp. p. 82; 1831. Fl. exc. p. 145. 165; 1837. Handb. p. 161; 1841. Nomencl. p. 65: ordo Synchlamydear. Formationes: Incompletae, Foliosae.

Ventenata **) Köler 1802. Gram. p. 273.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1043 *b*; 1830. Fl. exc. p. 50: sect. Avenae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 796. Ed. II. p. 920. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 412.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 509: g. Avenacear.
= Acrospelion Besser.

Ventenatia Cavan. 1797. Icon. IV. p. 79 (antea p. 28. t. 348. 349 *Vintenatia*): nov. g. Pentandr. Monogyn. (V. humifusa et procumbens.) — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 109. n. 485.
= Astroloma et Melichrus R. Brown.

Ventenatia Palis.-Beauv. 1805. Fl. Owar. I. p. 29. t. 17: nov. g. Polyandr. Monogyn. (V. glauca.) *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 1. p. 96. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 604. n. 1949; 1830. Gen. I. p. 438. n. 2169. — Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 258.
Pers. 1807. Ench. II. p. 66. n. 1272: g. Tiliacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 818.
DC. 1824. Pr. I. p. 527: g. Laplacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 570.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208. n. 5406: g. Ternströmiear.
Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 409: g. Ternströmiacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 41 (30). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 263. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
Bartl. 1830. Ord. p. 337: g. Chlenacear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 75: g. Bonnetiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 302: g. Camelliear.
Endl. 1840. Gen. n. 5402. p. 1016; 1841. Ench. p. 528: g. Chlaenacear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8019.
= Heptaca Lour.

Ventenatia Smith 1806. Exot. bot. II. p. 13. t. 66: nov. g. Gynandr. Tetrandr. (V. major.)
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 719: sect. Stylidii. (St. graminifolium Sw.)
= Stylidium Swartz.

Ventenatum Leschen. mss.
= Diplolaena R. Brown. (Rchb. Consp. p. 199.)

Ventilago Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 223. t. 49. f. 2: nov. g. plant. (Funis viminalis Rumph. Amboin. (V. p. 3. t. 2.)
Roxb. 1795. Pl. Corom. I. p. 55. t. 76; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 413; ed. 1832. I. p. 629: g. Pentandr. Monogyn. (V. Maderaspatana.) — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1106. n. 407. — Pers. 1805. Ench. I. p. 250. n. 573. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 358. — Hedw. 1806. Gen. p. 167. n. 701.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 692; 1825. Syst. I. p. 781. n. 859; 1830. Gen. I. p. 180. n. 907: g. Malpighiear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIX. 346. n. 970: g. Rhamnear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 38. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1144. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 357. — Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 259. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 28. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 164. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51). — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 120.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3820: g. Frangulacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Rhamnidear.
Endl. 1840. Gen. n. 5715. p. 1095; 1841. Ench. p. 580: g. Paliurear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5601. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 639. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 433.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 583: g. Rhamnacear.

Venturia *) De Notaris 1844. Cenno Pirenom. (Bot. Zeit. 1845. p. 484): nov. g. Haplosphaeriar.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 405: g. Perisporieor.

Venustum „Wall." Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1577 *c*: sect. Cypripedii.

Vepreeella Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 312: nov. g. Dissochaetear. (V. lutea, etc.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 882.

Vepreculae Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: ordo 54 plant. Gen.: Rhamnus, Sideroxylum, Chrysophyllum, Lycium, Ceanothus, Philyca, Cestrum, Catesbaea, Daphne, Gnidia, Passerina, Stellera, Lachnea.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 31 plant. Gen.: Dais, Quisqualis, Dirca, Daphne, Gnidia, Lachnaea, Passerina, Stellera, Thesium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414. Gen. ead. et Struthiola.

Vepris „Comm. mss." A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 509: nov. g. Zanthoxylear. (Toddalia paniculata Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5126. — Bartl.

*) Nomen mythologicum: uxor Neptuni.
**) Dicat. Etienne Pierre Ventenat, prof. Paris.

*) Dicat. Ant. Venturi, Bresciano.

Vepris Comm. cont.
1830. Ord. p. 386. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 806. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 361. — Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46). — Endl. 1840. Gen. n. 5976. p. 1147; 1841. Ench p. 609. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 84.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 325. n. 1655: g. Rutacear. (in Octandr. Tetragyn.) — Par. Endl. 1833. Norf. p. 89. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1329.
Arnott . . . . . in Hook. journ. bot. III. p. 154.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7472: g. Xanthoxylear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.
Synon. Boscia Thunb.; Asaphes DC.; Duncania Rchb.

Veratrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Torochlamydar. Fam.: Cephaloteae, Veratrineae, Triglochineae.

Veratreae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 328: ordo Monocotyledonum. Gen.: Aletris, Lloydia, Zigadenus.
Agdh. 1823. Aphor. p. 166; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar. Gen.: Colchicum, Merendera, Veratrum; Melanthium, Androcymbium, Anguillaria, Wurmbea, Nolina, Zigadenus; Helonias, Xerophyllum, Pleea, Tofieldia; Burmannia, Schelhammera; Campynema.
Rchb. 1828. Consp. p. 63; 1830. Fl. exc. p. 96; 1837. Hdb. p. 152: subdiv. Melanthear. Gen.: Scheuchzeria, Veratrum.
Nees & Eberm. 1830. Hdb. I. p. 150.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 130: trib. Sarmentacear. Gen. ut Agdh. (exclusis Merendera, Androcymbio et Pleea) et Ornithoglossum, Leimanthemum.
Endl. 1837. Gen. p. 134: trib. Melanthacear. Gen.: Tofieldia, Pleea, Nolina, Xerophyllum, Helonias, Veratrum, Zygadenus, Burchardia, Erythrostictus, Ornithoglossum, Anguillaria, Melanthium, Androcymbium, Wurmbea, Ledebouria, Baeometra, Schelhammera, Kreysigia, Uvularia, Tricyrtis, Disporum, Drapiezia. — Par. Bernh. 1840. Flora II. p. 425. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1356. Subtrib.: Melantheae, Uvularieae. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 3; 1843. Enum. IV. p. 179. (restrict.) Gen.: Amiantanthus, Asagraea, Schoenocaulon, Veratrum, Stenanthium, Anticlea, Zygadenus. — Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308). Gen. ut Endl. emissis Uvularieis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. Gen.: Uvularia, Schelhammera, Melanthium, Wurmbea, Helonias, Tofielda, Veratrum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199. Gen. ut Meisn. et Asagraea, Schoenocaulon, Amianthium, Anticlea.
Endl. 1841. Ench. p. 78: subordo Melanthacear. Gen. ut 1837 et Schoenocaulon, Amianthemum, Leimanthium.
Rchb. 1841. Nom. p. 46: div. Juncacear. Subdivis.: Melantheae, Uvularieae.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 234: trib. Colchicacear. Gen. fere ut Endl.

Veratrineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Veratrariear. Gen.: Veratrum, Melanthium, Tofieldia, Zigadenus, Helonias, Wurmbea, Xerophyllum, Leimanthium, Chamaelirium, Nolina, Androcymbium, Ornithoglossum, Anguillaria, Schelhammera, Burchardia.

Veratronia Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 553: nov. g. Uvulariear.? dubium. (Veratrum? malayanum Jack.)

Veratrum *) Tourn. 1700. Inst. p. 272. t. 145: g. pl. class. VI. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 141. Ed. Hall. 1745. p. 155.
Linn. 1737. Gen. p. 316. n. 769; 1737. Cliff. p. 468; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1044; 1759. Syst. ed. X. p. 1304. n. 1013; 1763. Sp. ed. II. p. 1479; 1764. Gen. ed. VI. p. 540. n. 1144; 1767. Syst. ed. XII. p. 668: g. Polygam. Monoec. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 271. — Murr. 1774. Syst. p. 757; 1784. Syst. p. 902. — Reich. 1778. Gen. p. 532. n. 1249. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 715. n. 1564. — Pers. 1797. Syst. p. 943. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 249. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 895. n. 1859; 1809. En. p. 1026. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 308. 310.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 298: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Linn. 1747. Cl. pl. p. 244: g. Rosaceor.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 75: g. Lilior.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 47. — Juss. 1789. Gen. p. 47.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 238. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 663.
Gled. 1764. Syst. p. 74. n. 311: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 359: g. Hexapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 82: g. Liliacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 71. t. 18. f. 4 (album).
Neck. 1790. El. III. p. 196. n. 1563: g. Gonoophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 589: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 397. n. 882. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 233.
Mönch 1794. Meth. p. 644: g. Petalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 154: g. Juncacear.
Batsch 1802. Tab. p. 133: g. Melanthior.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 116: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 252. n. 1021.
DC. 1805. Franç. III. p. 194: g. Colchicacear. — Par. Lois. 1828. Dict. v. 57. p. 301. — Bartl. 1830. Ord. p. 52. — Koch 1837. Syn. p. 724. Ed. II. p. 836.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 223: g. Ruscinar.
Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 16: g. Colchicear.
Link 1822. En. II. p. 437; 1829. Hdb. I. p. 147: g. Melanthacear. — Par. Schult.

*) Nomen antiquum.

Veratrum Tourn. cont.
1830. Syst. VII. p. CI. 1552. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 380.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: g. Melanthidear.

Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1291; 1830. Fl. exc. p. 97. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. — Endl. 1837. Gen. n. 1067. p. 135; 1841. Ench. p. 79. Sect. (1841): Stenanthium, Euveratrum. — Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 182. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 207. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 172.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 151. n. 1379; 1830. Gen. I. p. 290. n. 1502: g. Sarmentacear. — Par. Ledeb. 1830. Alt. II. p. 62. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1213.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.

A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York. IV. p. 117: g. Melanthear. Subgen.: Stenanthium, Veratrum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1698. Sect. eaed.

Synon. Helonias sp. Don.

Veratrum A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 117: subg. Veratri. — Simil. Endl. 1841. Spl. I. p. 1357. n. 1067 *b*. — Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1698. 2.

Kunth 1843. Enum. IV. p. 185: g. Veratrear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 246.

= Euveratrum Endl.

Verbaceae Link Enum. I. p. 174: sphalm. pro *Verbenaceae.*

Verbascariae Rchb. 1837. Handb. p. 198: sect. Caprariear. Subsect.: Lentibulariae, Scrofulareae, Verbasceae.

Verbasceae Bartl. 1830. Ord. p. 170: div. Scrophularinar. Gen.: Verbascum, Celsia, Hemimeris, Scrophularia.

Benth. 1835. Scroph. rev. p. 1; 1835. Scroph. ind. p. 16: trib. Scrophularinear. Gen.: Verbascum, Celsia, Alonsoa; Jovellana, Calceolaria; Scrophularia. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 266. 272. Gen. ead. et Nefflea, Ceramanthe.

Koch 1837. Syn. p. 510. Ed. II. p. 586: ordo Corolliflorar. Gen.: Verbascum, Scrophularia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 199: subsect. Verbascariar. Gen.: Isanthera, Alonsoa, Celsia, Verbascum.

Endl. 1839. Gen. p. 670; 1841. Ench. p. 338: trib. Scrophularinar. Gen. ut Benth. 1835. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 106) Schistanthe et 1843 (Spl. III. p. 78) Staurophragma. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). Gen. ead. exclusis Jovellana et Calceolaria.

Rchb. 1841. Nom. p. 117: sect. Caprariear. Subsect.: Calceolarieae, Scrofularieae, *genuinae* (gen.: Celsia, Verbascum).

Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 224; 1847. in Lindl. Veg. kd. p. 684: trib. Antirrhinidear. Gen.: Verbascum, Janthe, Celsia, Staurophragma. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 458. Gen. ead.

Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 181: subordo Scrophulariacear.

Verbascinae Nees 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 78. Gen.: Verbascum, Celsia, Isanthera.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 488: ordo Corollaeflorar. Gen. ead. et Ramondia.

Verbascineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae. Gen.: Verbascum, Celsia.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Rhinanthidear. Gen. ead. et Ramonda.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 59: trib. Scrophularinear. Gen. ead. et Alonzoa, Calceolaria, Scrophularia, Angelonia, Nemesia.

Verbasculum Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 92: sect. Primulae. (P. minima, integrifolia et calycina.)

= Arthritica Duby.

Verbascum *) Tourn. 1700. Inst. p. 146. t. 61: g. pl. class. II.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 235. Ed. Hall. 1745. p. 246: g. pl. class. IX.

= Verbasci Linn. pars.

Verbascum Linn. 1737. Gen. p. 54. n. 153; 1737. Cliff. p. 54; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 45; 1753. Sp. I. p. 177; 1759. Syst. ed. X. p. 931. n. 217; 1762. Sp. ed. II. p. 252; 1764. Gen. ed. VI. p. 97. n. 245; 1767. Syst. ed. XII. p. 169. n. 244: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 154. — Murr. 1774. Syst. p. 183; 1784. Syst. p. 219. — Reich. 1778. Gen. p. 100. n. 262. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 132. n. 331. — Gmel. 1791. Syst. p. 377. — Pers. 1797. Syst. p. 228. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1001. n. 376; 1809. En. p. 223. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 133. — Roxb. 1824. Ind. II. p. 237; ed. 1832. I. p. 560.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 509: g. Solanacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 214. n. 490.

Linn. 1747. Cl. pl. p. 336: g. Infundibuliformium.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 209. n. 869: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 446.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 181. — Gis. 1792. Prael. p. 384. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 139. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 8. 115. Sect.: Thapsus, Lychnitis, Blattaria.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 212: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 192. — Link 1821. En. I. p. 175. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 150. n. 747. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 658.

---

*) Nomen ex Plinio.

Verbascum Linn. cont.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 91: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 133: g. Monopetalar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 262. t. 55. f. 8 (phoeniceum).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 230.
Juss. 1789. Gen. p. 124; 1827. Dict. v. 49. p. 408: g. Solanear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 368. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 285. — DC. 1805. Franç. III. p. 600; 1815. V. p. 412. — Hedw. 1806. Gen. p. 104. n. 466. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 460. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXIV. 324. n. 703. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 326. — Lois. 1824. Dict. v. 31. p. 565 (*Molène*).
Neck. 1790. El. II. p. 32. n. 661: g. Darinyphytor.
Schrad. 1813. Monogr. I; 1823. II. Comm. Gotting. III. etc.)
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60; 1829. Anal. fam. p. 24: g. Verbascinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 57.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 618. n. 654: g. Scrofularinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 549. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 230.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3191: g. Antirrhinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 170: g. Verbascear. — Par. Benth. 1835. Scroph. ind. p. 16; 1835. Scroph. rev. p. 1; 1846 in DC. Pr. X. p. 225; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684. Sect. (1846): Thapsus, Lychnitis. — Koch 1837. Syn. p. 510. Ed. II. p. 586. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4588. Sect.: Blattaria, Verbascum. — Kunth 1838. Berol. II. p. 57. — Endl. 1839. Gen. n. 3878. p. 670; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 93. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). — Webb .... Canar. III. p. 128. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 263 (*Molène*). — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 193. Sect. ut Benth. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 719. Sect.: Thapsus, Anisocalyx, Microcalyx, Blattaria, Chamaeverbascum. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 547. Sect. ut Benth. et Blattaria.
Nees 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 79: g. Verbascinar. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 488.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 41: g. Euscrophularinear. Sect.: Blattaria, Phoenicophlomus, Melanophlomus, Lychnitis, Entomophlomus, Thapsus.
Synon. Verbascum et Blattaria Tourn.

Verbena Tourn. 1700. Inst. p. 200. t. 94: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 231. Ed. Hall. 1745. p. 236: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 334. n. 834; 1737. Cliff. p. 10; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 8; 1753. Sp. I. p. 18; 1759. Syst. ed. X. p. 851. n. 30; 1762. Sp. ed. II. p. 27; 1764. Gen. ed. VI. p. 14. n. 32; 1767. Syst. ed. XII. p. 62: g. Diandr. Monogyn.

Verbena Tourn. cont.
— Par. Murr. 1774. Syst. p. 61; 1784. Syst. p. 66. — Reich. 1778. Gen. p. 15. n. 35. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 20. n. 43. — Lour. 1790. Coch. I. p. 26. — Gmel. 1791. Syst. p. 41. — Pers. 1797. Syst. p. 66. — Willd. 1797. Sp. I. p. 115. n. 56.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 661: g. Gymnotetraspermar.
Linn. 1747. Cl. pl. p. 340: g. Labiator.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 186. n. 769: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 368.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 166. — Gis. 1792. Prael. p. 486.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 198.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 328: g. Ringentium. (descisc.)
Hill 1769. Ht. kew. p. 266: g. Monopetalar. irregular.
Scop. 1772. Carn. I. p. 433: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Walt. 1788. Carol. p. 31. 162. n. 236.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 36: g. Ringentes et Verticillatas conjungens.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 315. t. 66. f. 1 (bonariensis).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 186. 321. 325. *Cf. Blattaria*, *Valerianoides* et *Lippia Med.*
Juss. 1789. Gen. p. 109: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 295. n. 460: g. Corythophytor. Sejunguntur Abena et Patya.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 322: g. Pyrenacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 502. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 390. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60.
Batsch 1802. Tab. p. 190: g. Verticillatar.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 13: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 143. — Willd. 1809. En. p. 632. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 40. — E. M. 1819. Flora II. p. 603. — Elliott 1821. Sketch II. p. 96.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 254; 1806. ibid. VII. p. 65: g. Verbenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 251. — Hedw. 1806. Gen. p. 14. 349. — Pers. 1807. Ench. II. p. 138. n. 1424. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 272. — Link 1822. En. II. p. 122; 1829. Hdb. I. p. 450. Sect.: Verbena, Aloysia, Priva, Zapania. — Kunth 1823. Syn. II. p. 57; 1838. Berol. II. p. 123. — G. Don 1825. Nepal. p. 104. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 13 (*Verveine*). — Koch 1837. Syn. p. 578. Ed. II. p. 664. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 152. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. (restrict.) — Webb .... Canar. III. p. 112. — Clos 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 380 (inclusa Shuttleworthia). — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 207. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 718.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 421; 1825. Syst. II. p. 747. n. 2109; 1831. Gen. II.

Verbena Tourn. cont.
p. 476. n. 2352: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2894; 1831. Fl. exc. p. 334; 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 108. n. 4178. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Cham. 1832. Linnaea VII. p. 254. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 236. (restrict.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 65. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 535. Sect.: Verbenaca, Glandularia. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 908.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 4. 30: g. Bilabiatar.
Endl. 1838. Gen. n. 3685. p. 633; 1841. Ench. p. 312: g. Lippiear. Sect.: Stachytarpheta, Bouchea, Melasanthus, Verbenae verae (1841 Euverbena). — Simil. Meisn. 1840. Gen. p. 290 (198). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 600. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 13. Sect.: Aloysioides, Verbenaca.
Ledeb. 1849. Ross. III. p. 329: g. Euverbenear. — Par. Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 180. Sect. ut 1847.
Synon. Glandularia Gmel.; Billardiera Mönch; Vermicularia Mönch; Aubletia Jacq.; Patya Neck.?

Verbenaca Caesalp. 1583. De plant. lib. 11. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 24.)
= Lycopus Tourn.

Verbenaca Walp. 1845. Rep. IV. p. 14: sect. Verbenae. — Par. Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 536; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 181.

Verbenaceae Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 254. Gen.: Lantana, Volkameria, Ovieda, Vitex, Premna, Gmelina, Theka, Petraea, Citharexylum, Duranta, Lippia, Verbena, Hebenstretia, Callicarpa. *Cf.* Pers. 1807. Ench. II. p. 138 et Juss. 1828. Dict. v. 57. p. 309.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 245. t. 43. Gen. §. 1: Clerodendrum, Volkameria, Ovieda, Aegiphila, Vitex, Callicarpa, Manabea, Premna, Petitia, Cornutia, Gmelina, Theka, Avicennia. §. 2: Petraea, Citharexylum, Duranta, Lippia, Lantana, Spielmannia, Zapania, Verbena, Taligalea, Tamonea, Perama. §. 3: Eranthemum, Selago, Hebenstretia.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 63. Gen. §. 1: Clerodendrum, Volkameria, Platunium, Ovieda, Aegiphila, Vitex, Callicarpa, Premna, Petitia, Cornutia, Hosta, Gmelina, Theka, Avicennia. §. 2: Petraea, Citharexylum, Priva, Duranta, Tamonea, Taligalea, Spielmannia, Lantana, Lippia, Zapania, Stachyarpheta, Aloysia, Verbena, Perama.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 510. Ed. Nees p. 366: ordo Dicotyledonum monopetalar. Nova gen.: Pityrodia, Chloanthes.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15: ordo Tetraspermar.
Link 1829. Hdb. I. p. 449: ordo (27) Hypanthar. Gen.: Verbena, Aloysia, Stachytarpheta, Selago, Hebenstreitia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. 22: fam. Labiarிear. Trib.: Verbeneae, Viticeae.

Verbenaceae Juss. cont.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (220) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 178: ordo (109) Labiatiflorar. Divis. ut Dumort. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 290 (197). Trib.: Lippieae, Lantaneae, Symphoremeae, Aegiphileae, Avicennieae.
Lindl. 1833. Nix. p. 30: ordo Labialium.
Mart. 1835. Consp. p. 23: ordo 130.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 277; 1847. Veg. kd. p. 663: ordo Echialium. Gen. Endlicheriana et Aloysia, Stachytarpheta, Bouchea, Melasanthes, Uwarovia, Casarettoa, Gumira, Holochiloma, Hemigymnia, Cyclonema, Scleroon, Sphenodesme, Dissolena, Patagonula.
Koch 1837. Syn. p. 577. Ed. II. p. 663: ordo Corolliflorar. Gen.: Vitex, Verbena. — Par. Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 522. Trib.: Verbeneae, Viticeae, Avicennieae.
Endl. 1838. Gen. p. 632; 1841. Ench. p. 311: ordo (137) Nuculiferar. Trib.: Lippieae, Lantaneae, Aegiphileae. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 231. Gen. foss.: Petraea.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 225: fam. (141) Labiatiflorar. Sect. ut Bartl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: fam. Verbeninear. Trib.: Aegiphileae, Lantaneae, Verbeneae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 183: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Trib. ut Bartl.
Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 169. Trib.: Verbeneae, Viticeae, Avicennieae.
Synon. Vitices Juss.; Verbeneae Spreng.

Verbenae B. Juss. 1759 in Hort. Trian.: ordo 27 plant. Gen.: Verbena, Phryma, Houstonia, Lantana, Petitia, Cornutia, Callicarpa, Vitex, Clerodendrum, Volkameria, Citharexylum, Duranta, Petraea, Gmelina.
Adans. 1763. Fam. II. p. 195: fam. 26 plant. Gen. §. 1: Alguelaguen, Verbena, Kempfera, Blairia, Sherardia, Lippia. § 2: Camara, Ostia, Gmelina, Vitex, Mailelou, Douglassia, Citharaexylon, Duranta, Gerardia, Schwalbea, Petrea, Hebenstreitia, Tozzia, Vada-Kodi, Upata, Leptostachia, Michelia, Priva.

Verbeneae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 420: ordo Viticear. Gen.: Verbena, Zapania, Ghinia, Hebenstreitia, Phaulopsis, Priva, Holmskioldia, Petrea, Chloanthes, Amasonia, Spielmannia, Cornutia, Hoslundia, Lantana, Premna, Citharexylon, Clerodendron, Duranta, Gmelina, Vitex, Callicarpa, Lippia, Wallenia.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 747; 1831. Gen. II. p. 476: div. Angiospermar. Gen.: Verbena, Lippia, Priva, Hebenstreitia, Casselia, Tamonea, Congea, Streptium, Holmskioldia, Premna, Chloanthes, Vitex, Clerodendron, Wallrothia, Pyrostoma, Petraea, Lantana, Spielmannia, Citharexylon, Duranta, Amasonia, Gmelinia, Mendocia, Myoporum, Pholidia, Stenochilus, Bontia,

Verbeneae Spreng. cont.
Eremophila. *Descisc.*: Xenopoma, Tozzia, Hemiphragma, Josephinia, Pedalium, Avicennia.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVI; 1828. Consp. p. 117 (1831. Fl. exc. p. 334): div. Labiatar. Gen.: Verbena, Priva, Stachytarpheta, Platonia, Tamonea, Citharexylon, Taligalea, Melasanthus, Aloysia, Vitex, Chloanthes; Spielmannia, Casselia, Petrea, Asaphes, Duranta, Premna, Congea, Streptium; Holmskioldia, Oxera; Raputia, Cornutia, Petitia, Buchia, Pityrodia, Callicarpa, Porphyra, Wallenia, Nuxia, Aegiphila, Manabea, Chilianthus, Tectona, Ovieda, Clerodendron, Wallrothia, Pyrostoma, Hilsenbergia, Volkamera, Amasonia, Gmelina, Mendozia; Zapania, Perama, Lippia, Lantana; Chrysomallum; Avicennia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 190: subdiv. Angiocarpicar. Gen. ut antea (exceptis 2 ultimis). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 108. Sect.: *genuinae* (gen.: Verbena, Aloysia, Lippia, Cryptocalyx, Buchia, Melasanthus, Bouchea, Stachytarpheta, Monochilus, Chascanum, Casselia, Dipyrena, Priva, Chloanthes; Caryopteris; Peronema), Viticeae, Aegiphileae.

= Verbenaceae Juss.

Verbeneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Verbenacear. Gen.: Verbena, Zapania, Aloysia, Stachytarpheta, Chloanthes, Petraea, Citharexylum, Duranta, Priva, Lippia, Lantana, Spielmania. — Par. Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 445. Nov. gen.: Cryptocalyx. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 65. Gen. ex Bartl. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 525. Subtrib.: Spielmannieae, Monochileae, Casselieae, *Verbeneae* (gen.: Mallophora, Chloanthes, Priva, Dipyrena, Verbena, Bouchea, Stachytarpha, Lippia), Lantaneae, Duranteae, Petreae. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 184. Subtrib. eaed. — Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 171. Subtrib.: Monochileae, Casselieae, Euverbeneae, Lantaneae, Duranteae, Petreae.

Bartl. 1830. Ord. p. 180: div. Verbenacear. Gen.: Duranta, Petrea, Citharexylon, Amasonia, Taligalea, Melasanthus, Priva, Streptium, Mendozia, Tamonea, Colebrookia, Spielmannia, Platonia, Aeollanthus, Aloysia, Verbena, Stachytarpheta; Buchia, Perama, Lippia, Lantana. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227. Gen. ead. et Pöppigia, Mallophora, Verbenella, Glandularia, Bouchea, Ridelia, Dipterocalyx, Monochilus, Chascanum, Casselia, Dipyrena.

Verbenella Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 237: nov. g. Verbenear. (Verbena chamaedryfolia Juss. et Tweediana Hook.)

Verbenineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XX. 64: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Verbenaceae, Labiatae, Stilbineae, Plantagineae.

Verbesina *) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 155. Ed. Hall. 1745. p. 168: g. pl. class. VIII.
= Bidens Linn.

Verbesina Linn. 1737. Gen. p. 259. n. 662; 1737. Cliff. p. 411; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 267; 1753. Sp. II. p. 901; 1759. Syst. ed. X. p. 1226. n. 874; 1763. Sp. ed. II. p. 1270; 1764. Gen. ed. VI. p. 437. n. 975; 1767. Syst. ed. XII. p. 567: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 648; 1784. Syst. p. 779. — Reich. 1778. Gen. p. 434. n. 1058. — Lour. 1790. Coch. II. p. 506. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 570. n. 1317. — Gmel. 1791. Syst. p. 1255. — Pers. 1797. Syst. p. 820; 1807. Ench. II. p. 471. n. 1900. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2221. n. 1529; 1809. En. p. 917. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 170. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 440.

Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 257. n. 1065: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 593.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 183. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 527. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 414.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540. — Link 1822. En. II. p. 349.

Hill 1769. Ht. kew. p. 9: g. Radiatar. (et 31 Tubulatar.) — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 565; 1826. Syst. III. p. 576. n. 2797; 1831. Gen. II. p. 633. n. 3159. — Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 312.

Scop. 1777. Intr. p. 132: g. Flosculosar.

Neck. 1790. El. I. p. 33. n. 61: g. Actinophytor. Sejungitur Abesina.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 201: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 464. — Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17. (Archetypar.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 910. — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2642. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.

Less. 1830. Linnaea V. p. 155: g. Coreopsidear.

Synon. Forbicina Ponted.; Abesina Neck.?

Verbesina Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 139; 1830. v. 60. p. 576: g. Verbesinear. restrict.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20: g. Helianthear. verar.

Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3153. 1: sect. Verbesinae.

= Verbesinaria DC.

Verbesina Lessing 1832. Syn. Compos. p. 231: g. emendat. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 612. Sect.: Verbesinaria, Hamulium, Platypteris. — Endl. 1838. Gen. n. 2550. p. 455; 1841. Ench. p. 239. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p.

*) Nomen ex Verbena supina?

Verbesina Lessing cont.
199 (130). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 358. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3153. Sect. fere ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Brongn. 1843. En. genr. p. 41: g. Helianthear.
Synon. Ceratocephaloides Vaill.; Tepion Adans.; Locheria Neck.; Anomantia et Hingstonia Rafin.; Verbesinae et Siegesbeckiae sp. Linn.

Verbesinaria DC. 1836. Prodr. V. p. 612: sect. Verbesinae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2550 *a*. p. 415; 1841. Ench. p. 239.
Synon. Siegesbeckia Gron.; Phaethusa Gärtn.; Phaetusa Schreb.; Phaethusia Raf.; Verbesina Cass. 1829; Pallasiae sp. Humb. & Bonpl.; Wedeliae sp. Hook.; Clerodendron Hort. ital.

Verbesineae Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 138; 1830. v. 60. p. 576: subdiv. Helianthear. Archetypar. Gen.: Lipotriche, Blainvillea, Acmella, Sanvitalia, Zinnia, Tragoceros, Hamulium, Verbesina, Ximenesia.
Less. 1832. Syn. p. 320: div. Helianthear. Gen.: Lipotriche, Selloa, Verbesina, Ximenesia, Sanvitalia, Spilanthus, Neuractis, Glossocardia, Synedrella, Heterospermum, Chrysanthellum, Narvalina, Thelesperma, Isostigma. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 607. Gen.: Lasianthaea, Perymenium, Psathurochaeta, Lipochaeta, Diplothrix, Selloa, Verbesina, Dithrichum, Micractis, Spilanthes, Dunantia, Ximenesia, Sanvitalia, Anaitis, Oligogyne, Synedrella, Calyptocarpus, Electra, Chrysanthellum, Neuractis, Glossocardia, Heterospermum, Glossogyne, Delucia, Narvalina, Thelesperma, Isostigma. — Endl. 1838. Gen. p. 414; 1841. Spl. I. p. 1382; 1841. Ench. p. 239. Gen. ead. et 1841 Harpephora, Chromolepis. Accedunt (1842. Spl. II. p. 43) Microchaeta, Aphanopappus. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). Gen. ead. et Galophthalmum?
Rchb. 1841. Nom. p. 82: div. Anthemidear. Gen. ut Endl. et Calophthalmum, Anisopappus?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Helianthear. Gen. ut Endl. 1842 et Acoma, Coreocarpus, Mendezia.

Verea *) Willd. 1799. Spec. II. p. 471. n. 792; 1809. Enum. p. 433: g. Octandr. Tetragyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 286. n. 1148.
Link 1821. En. I. p. 388: g. Sempervivar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 260. n. 1511; 1830. Gen. I. p. 324. n. 1650: g. Sedear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1327.
= Kalanchoë Adans.

Vercia Andr. 1797. Bot. Repos. t. 21.
= Kalanchoë Adans.

Verhuellia **) Miquel 1843. Syst. Piperac. p. 47: nov. g. Peperomiear. (Piper serpens Sw.) — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 15. n. 1820.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Peperomidar.

Verlangia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 125. n. 805: nov. g. Plyrontophytor., a Rhamno L. disjunctum. *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 57. p. 322.

Vermicularia Tode 1790. Meckl. II. p. 15: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 57. p. 326. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1480.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. 110: g. Sclerocarpor.
Fries 1825. Pl. homon. p. 111; 1828. Elench. II. p. 107: g. Dothidinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 267. — Endl. 1836. Gen. n. 385. p. 33; 1841. Ench. p. 19.
A. Lib. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123: g. Ascochytaceor.
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 289: g. Dothideor.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 66: g. Cryptoclyneor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 419: g. Sphaeropsideor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493.
Math. 1853. Belg. II. p. 422: g. Sporidesmiear.
Conf. Mydonotrichum, Colletotrichum, Trichostoma et Ospriosporium Corda; Ospreosporium Fries; Exosporii sp. Link.

Vermicularia Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 150: nov. g. Petalostemonis. (Verbena indica L.) *Cf.* Juss. 1828. Dict. v. 57. p. 327.
= Stachytarpheta Vahl.

Vermifuga Ruiz & Pav. 1794. Prodr. fl. peruv. p. 113. t. 24; 1798. Syst. p. 210: nov. g. Syngenes. Polygam. Segregat.
= Flaveria Juss.

Vermontea Comm. ex Steud. Nomencl. 111. Ed. sec. II. p. 572. (V. decandra = Blakwellia paniculata.)
= Blackwellia Comm.

Verniceae Link 1831. Handb. II. p. 123: ordo 37 Perigynar. Subord.: Anacardiaceae, Sumachinae, Spondiaceae, Burseraceae; Amyrideae.)

Vernicia *) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 586. Ed. Willd. p. 720: nov. g. Monoec. Monadelph. (V. montana.)
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 589. n. 2149: g. Euphorbiacear.
= Dryandra Thunb.

Vernisckia Steud. vid. *Wernisckia Scop.*

Vernix Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.
= Toxicodendron Tourn.

---

*) Dicat. John. Vere, botanico anglico.
**) Dicat. Q. M. R. Ver Huell, itineratori docto.

*) Nomen ab oleo ex nucleis expresso.

Vernonella Sonder 1850. Linnaea XXIII. p. 62: nov. g. Vernoniacear., Vernoniae aff. (V. africana.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 809: g. Heterocomear.

Vernonia *) Schreb. 1791. Gen. II. p. 541. n. 1262: nov. g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1632. n. 1430; 1809. En. p. 835. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 94. — Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1317. — Pers. 1807. Ench. II. p. 404. n. 1827. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 133.
Gis. 1792. Prael. p. 538: g. Capitatar.
Rich. (1801?) An IX. Catal. pl. jard. méd. p. 89: g. Liatridear.
Cass. 1817. Bull. soc. philom. p. 66: g. Vernoniear. Subgen.: Vernonia, Ascaricida, Lepidaploa. — Par. Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 341; 1830. v. 60. p. 586. (Archetypar. verar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1829. Linnaea IV. p. 244; 1831. ibid. VI. p. 626 (sect.: Hololepis, Pycnocephalum, Vernonia [subsect.: Vanilosma, Vernonia], Ascaricida, Pacourina, Albertinia); 1832. Syn. p. 146. — Bartl. 1830. Ord. p. 135. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 304. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 57. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 296. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 47. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 9. Sect. ex DC. et Cyanopis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 543; 1826. Syst. III. n. 434. n. 2679; 1831. Gen. II. p. 610. n. 3010: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2185.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 33: g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 369. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 893. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 189.
Link 1822. En. II. p. 296: g. Acarnacear.
Poir. 1828. Dict. v. 57. p. 334: g. Flosculosar.
DC. 1836. Pr. V. p. 15: g. Heterocomear. Sect.: Acilepis, Hololepis, Leptospermoides, Vanillosma, Strobocalyx, Trianthaea, Tephrodes, Lepidaploa, Ascaricida. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2204. p. 358; 1841. Ench. p. 232. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 144.
Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3868: g. Pacourinear. Sect.: Acilepis, Hololepis, Leptospermidia, Vanillosma, Strobocalyx, Trianthaea, Tephrodes, Vernonia, Ascaridia.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 41. t. 247.
Synon. Cacalia et Scabiosa Burm.

Vernoniaceae HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 39: sect. Carduacear. Gen.: Pacourina, Ampherephis, Vernonia, Turpinia, Odontoloma, Dialesta, Pollalesta, Baccharis, Conyza, Gnaphalium, Elychrysum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: trib. Trichostylar. Subtrib.: Rolandreae, Vernonieae, Tarchonantheae, Plucheae, Liabeae.

*) Dicat. Will. Vernon, peregrinatori botanico.

Vernoniaceae Lessing 1830. Linnaea V. p. 134: trib. Synantherear. Subtrib.: Pectideae, Elephantopeae, Vernonieae. — Par. Less. 1831. ibid. VI. p. 397 (subtrib.: Vernonieae, Andromachieae); 1832. Syn. p. 145 (subtrib.: Vernonieae, Elephantopodeae, Trichospireae, Rolandreae, Liabeae, Pectideae).
DC. 1836. Pr. V. p. 9: trib. 1 Tubuliflorar. Subtrib.: Vernonieae, Pectideae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 356; 1841. Ench. p. 232. Subtrib. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). Subtrib. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. Subtrib.: Ethulieae, Heterocomeae, Elephantopeae, Rolandreae, Bojerieae, Liabeae, Pectideae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 46: trib. Compositar. Subtrib. ut DC.
Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33: trib. Cassiniacear. Subtrib.: Vernonieae, Liabeae.

Vernonieae Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 173: trib. 17 Synantherear.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 384; 1828. v. 57. p. 338; 1830. v. 60. p. 586: trib. 20 Synantherear. Divis. 1828: Liabeae, Plucheineae, Tarchonantheae, *Archetypae* (subdivis.: Ethulieae, *Archetypae verae* [gen.: Lychnophora, Distephanus, Heterocoma, Lepidaploa, Vernonia, Centrapalus, Ascaricida, Achyrocoma, Gymnanthemum, Critonia?, Hololepis, Ampherephis, Centratherum, Pacourinopsis, Pacourina], Elephantopeae), Rolandreae. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. 296. Sect. eaed.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Elephantopus, Vernonia, Heterocoma, Sparganophorus, Stokesia.
Less. 1829. Linnaea IV. p. 240: trib. Synantherear. Gen.: Vernonia, Dialesta, Piptocoma, Lychnophora, Eremanthus, Pacourinopsis, Andromachia, Liabum, Centratherum, Stokesia, Spiracantha, Elephantosis, Elephantopus, Distreptus, Corymbium, Rolandra, Lagascea, Gundelia, Sparganophorus, Ethulia, Odontoloma, Adenocyclus, Cacosmia, Oiospermum; Pacourina, Heterocoma, Albertinia, Trichospira.
Bartl. 1830. Ord. p. 135: div. Synantherear. Gen.: Corymbium, Achyrocoma, Vernonia, Ascaricida, Ethulia, Sparganophorus, Voigtia, Odontoloma, Cacosmia, Centrapalus, Centratherum, Distreptus, Distephanus, Dialesta, Pollalesta, Ampherephis, Pacourina, Pacourinopsis, Stokesia, Oligocarpha, Arrhenachne, Tarchonanthus, Tessaria, Monarrhenus, Phalacromesus, Monenteles, Chlaenobolus, Pluchea, Gymnanthemum, Heterocoma, Hololepis, Isonema, Lepidaploa, Liabum, Lychnophora, Munnozia?, Adenotrichia, Oligactis, Oliganthes, Piptocoma, Shawia?, Xanthocephalum?
Rchb. 1841. Nom. p. 97: div. Homoianthar. Subdivis.: Ethulieae, Albertinieae, Pacourineae.
Conf. Vernoniaceae Less.

Vernonieae Lessing 1830. Linnaea V. p. 136; 1831. ibid. VI. p. 397. 625; 1832. Syn. Comp. p. 146: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Heterocoma, Vernonia, Dialesta,

Vernonieae Lessing cont.
Eremanthus, Lychnophora, Piptocoma, Odontoloma, Adenocyclus, Sparganophorus, Ethulia, Oiospermum, Ampherephis, Platycarpha, Stokesia. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 10. Divis.: Euvernonieae, Elephantopeae, Rolandreae, Bojerieae. — Endl. 1838. Gen. p. 356; 1841. Ench. p. 232. Divis. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). Divis. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 46. Gen. ex DC. — Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33. Divis. ut DC.

Vernonioides DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 24: sect. Gochnatiae.
= Eugochnatia Endl.

Veronica Tourn. 1700. Inst. p. 143. t. 60: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 238. Ed. Hall. 1745. p. 244: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 4. n. 10; 1737. Cliff. p. 7; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 7; 1753. Sp. I. p. 9; 1759. Syst. ed. X. p. 848. n. 25; 1762. Sp. ed. II. p. 12; 1764. Gen. ed. VI. p. 12. n. 25; 1767. Syst. ed. XII. p. 57: g. Diandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 10. — Murr. 1774. Syst. p. 56; 1784. Syst. p. 58. — Reich. 1778. Gen. p. 12. n. 26. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 15. n. 32. — Gmel. 1791. Syst. p. 28. — Pers. 1797. Syst. p. 58; 1805. Ench. I. p. 10. n. 46. — Willd. 1797. Sp. I. p. 54. n. 44; 1809. En. p. 15. — Vahl 1805. Enum. I. p. 55. n. 29. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 15. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 6. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 147. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 303. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 6. 12.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 527: g. Dicotyledonum Meiostemonum.
Linn. 1847. Class. pl. p. 336: g. Infundibuliformium.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 154. n. 631: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 433. Excluditur Veronicastrum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 209. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 192. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 70. n. 100; 1830. Gen. I. p. 20. n. 77. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 26. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 55.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 217: g. Ringentium. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 333. (desciscc.)
Hill 1769. Ht. kew. p. 262: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 477: g. Jasminear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 257. t. 54. f. 7 (officinalis).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 203; 1789. Phil. Bot. I. p. 55.
Juss. 1789. Gen. p. 99: g. Pedicularium.
Neck. 1790. El. I. p. 389. n. 606: g. Plasyrgophytor.

Veronica Tourn. cont.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 297: g. Rhinanthoidear.
Schrad. 1803. Comm. sup. Veronicis spicatis. (Gotting.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 228: g. Rhinanthacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 458; 1815. V. p. 387. — Hedw. 1806. Gen. p. 11. 346. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 53. 86. n. 63. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 304. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 5. — Link 1829. Hdb. I. p. 521.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 434. Ed. Nees p. 290: g. Scrophularinar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 389. — D. Don 1825. Nepal. p. 92.
Schrank 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 58.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 879: g. Scrophularinear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 190.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 479: g. Gentianear.
Link 1821. En. I. p. 19: g. Rhinanthear. Sect.: Callistachya, Veronica, Diplophyllum. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 108. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 742. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321. — Lois. 1828. Dict. v. 57. p. 349.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: g. Rhinanthidear.
Duvau 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 163. t. 26: g. Veronicear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5; 1835. Scroph. ind. p. 44; 1846 in DC. Pr. X. p. 458; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685. Sect. (1846): Hebe, Leptandra, Pseudolysimachia, Beccabunga, Chamaedrys, Paederotoides, Veronicastrum, Omphalospora. — D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 563. Sect.: Veronica, Gentianoides, Serpyllifolia, Piritia, Hebe, Chamaedrys, Scutellata, Beccabunga, Cochlidiosperma. — Kunth 1838. Berol. II. p. 69. — Endl. 1839. Gen. n. 3979. p. 688; 1841. Ench. p. 340. Sect. Cochlidiospermum, Veronica, Diplophyllum. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 101. — Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4473. Sect. ut Endl. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (218). — Brongn. 1843. En. genr. p. 61. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 342. — Walp. 1845. Rep. III. p. 335. Sect. ut Endl. — Webb . . . . Canar. III. p. 147. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 229. Sect. ex Benth. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 688. Sect.: Pseudolysimachia, Beccabunga, Chamaedrys, Veronicastrum, Alsinoides. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 190. Sect. ut Benth. — Math. 1853. Belg. I. p. 390. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 700.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 365: g. Antirrhinear. Sect.: Cochlidiosperma, Veronica. — Par. Koch 1837. Syn. p. 524. Ed. II. p. 608. Sect.: Chamaedrys, Pseudo-Lysimachium, Veronicastrum, Alsinoides.

Veronica Tourn. cont.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 23: g. Euscrophularinear. Sect.: Alsinebe, Euveronica, Chamaedrys, Beccabunga.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 585: g. Scrophulariacear. Sect.: Pseudolysimachium, Chamaedrys, Veronicastrum, Omphalospora.
Synon. Beccabunga Riv., Rupp.

Veronica Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3063; 1837. Hdb. p. 196: g. Veronicear., sejuncta Cochlidiosperma restrict. Sect.: Aidelus, Veronicastrum, Hebe. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23. — Bartl. 1830. Ord. p. 171. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 323. (ulterius restrict.)
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 365: sect. Veronicae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3979 *c*. p. 688; 1841. Ench. p. 340. — Walp. 1845. Rep. III. p. 338.
= Veronicae sp. plur. (Synon. Hebe Juss., Aidelus Spreng.)

Veronicae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo pl. Gen.: Hebenstretia, Bartsia, Melampyrum, Rhinanthus, Pedicularis, Schwalbea, Polygala, Securidaca, Veronica, Paederota, Browallia, Euphrasia, Buchnera, Erinus, Gerardia, Stemodia, Limosella, Monniera, Sibthorpia.
Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: div. Ringentium.

Veronicastrum „Heist." Fabric. 1759. Helmst. p. 111.
Mönch 1794. Meth. p. 437: g. Petalostemonis. (Veronica sibirica et virginica L.)
= Leptandra Benth.

Veronicastrum Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3063 *b*: sect. Veronicae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 529. Ed. II. p. 608. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 699. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 592.
= Veronicastri Benth. pars.

Veronicastrum Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 479: sect. Veronicae. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 246.
Synon. Veronicastri sp. Koch; Alsinebes sp. et Euveronica Griseb.

Veroniceae Duvau 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 177: fam. plant. Gen.: Veronica, Sibthorpia, Disandra.
Rchb. 1828. Consp. p. 121: sect. Pedicularinar. Gen.: Cochlidiosperma, Veronica, Leptandra, Curanga, Paederota, Wulfenia; Sibthorpia, Disandra; Hemiphragma?; Romanzoffia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Rhinanthidear. Gen.: Veronica, Diplophyllum, Hedystachys, Leptandra, Paederota, Wulfenia, Browallia.
Bartl. 1830. Ord. p. 171: div. Scrophularinar. Gen.: Paederota, Leptandra, Veronica, Cochlidiosperma, Omphalospora, Sibthorpia?, Disandra, Romanzoffia; Geochorda, Manulea, Erinus, Büchnera, Heteranthia, Palmstruckia, Franciscea, Capraria, Schizanthus.
Benth. 1835. Scroph. ind. p. 43; 1835. Scroph. rev. p. 5: trib. Scrophularinear. Gen.: Ourisia, Disandra?, Sibthorpia; Scoparia, Geochorda, Picrorhiza; Veronica,

Veroniceae Duvau cont.
Calorhabdos, Wulfenia, Gymnandra. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. Gen.: Veronica, Leptandra, Paederota, Wulfenia, Picrorhiza, Gymnandra, Antonia? — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 563. Gen.: Veronica, Diplophyllum, Leptandra, Paederota, Calorhabdos, Wulfenia, Gymnandra; Picrorhiza, Geochorda. — Endl. 1839. Gen. p. 687; 1841. Ench. p. 340. Gen.: Scoparia, Geochorda, Sibthorpia; Glossostigma, Limosella, Amphianthus; Veronica, Paederota, Calorhabdos, Wulfenia, Campylanthus, Gymnandra, Picrorhiza, Ourisia; Hemiphragma; Leucophyllum, Aragoa. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. 323. Gen. ead. et Disandra, Cochlidiospermum, Diplophyllum, Callistachya. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). Gen. ut Endl. — Brongn. 1843. En. genr. p. 60. Gen. ex Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: sect. Antirrhinariar. Gen.: Cochlidiosperma, Veronica, Paederota, Wulfenia, Calorhabdos, Gymnandra; Picrorhiza, Geochorda; Sibthorpia, Disandra.
Rchb. 1841. Nom. p. 115: sect. Antirrhinear. Gen.: Veronica, Leptandra, Wulfenia, Paederota, Calorhabdos, Campylanthus, Gymnandra, Picrorhiza, Ourisia; Hemiphragma, Leucophyllum, Aragoa; Sibthorpieae.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 456; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: trib. Rhinanthidear. (restrict.) Gen.: Paederota, Veronica, Aragoa, Ourisia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459. Gen. ead.

Veronicella DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 233: sect. Drabae. (D. nemoralis Ehr., etc.)
= Drabella DC.

Verpa Swartz 1815. Act. Holm. p. 129: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 57. p. 357.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 202: g. Helvelloideor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 82: g. Mitracear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 23; 1825. Pl. homon. p. 85; 1828. Elench. II. p. 2: g. Mitrator. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 491. n. 3479; 1831. Gen. II. p. 764. n. 3909. — Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 319. — Endl. 1836. Gen. n. 433. p. 38; 1841. Ench. p. 21. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 377.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 574: g. Helvellear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 301.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Helvellaceor. — Par. Corda 1829 in Sturm Fl. Fung. II. p. 3. t. 1—6. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 347. — Bonord. 1851. Hdb. p. 208. — Bail 1858. Syst. p. 67. t. 21.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Helvellacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. 158.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 549: g. Hymenomycetum gymnosporor.

Verpa Swartz cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 451: g. Morchellinor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Morchelleor.
Synon. Phalli sp. Fl. dan.

Verpa Schweinitz . . .
= Cidaris Fries.

Verrucaria Scopoli 1777. Introd. p. 61: nov. g. Crustacear. (Lichen Mich. O. XXXV. t. 59. — Fungilli petiolati Hall. Helv. 2042. 2043. Lichenes Fl. Carn. 1363—66.)

Verrucaria Wiggers 1780. Prim. fl. Holsat. p. 85: nov. g. Aspidoferar. (Lichen scriptus L., etc.)
Mönch 1794. Meth. p. 766: g. Algar. terrestrium.
Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 23: g. fam. tertiae plantar. lichenosar. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 57. p. 361.
Schrad. 1794. Spic. fl. Germ.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 169: g. Scutellator. (Spec. 71.)
Achar. 1798. Lich. suec. p. 13: g. Lichenum. (crustaceor.) — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 17. 215. — Mart. 1817. Erlang. p. 255. (verrucosor.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXI. 113: g. Idiothalamor. *Cf.* Flörke 1809. Ann. Wett. Ges. I. p. 102. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 297.
DC. 1805. Franç. II. p. 313; 1815. V. p. 172: g. Hypoxylor. — Par. Chev. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 56. (lichenoideor.)
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 43: g. Angiocarpor.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 51. 274; 1814. Syn. Lich. p. 87: g. Heterogeneor. Sect.: Lejophloea, Blennorina, Lithoicea, Conizaea, Inoderma.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 864: g. Hypoxylear. — Par. Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384 (Pseudolichenum). — Math. 1853. Belg. II. p. 159.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: g. Verrucariar. — Par. Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 16.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Pyrenulatar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 78: g. Globigerear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 264: g. Verrucarinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 373. Sect.: Pyrenula, Verrucaria.
Meyer 1825. Flecht. p. 329: g. Myelocarpor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 243. n. 3367; 1831. Gen. II. p. 743. n. 3762.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 869: g. Gasterothalamar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Verrucariear. — Par. Fries 1831. Lich. eur. p. 8. 430; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 120. — Endl. 1836. Gen. n. 150. p. 13; 1841. Ench. p. 10. — Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 527. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 145; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350; 1849. ibid. XIII. p. 193. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 7. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 339. Sect.: Lithoicea, Euverrucaria. — Bayrh. 1849. Taun. p. 95. — Arnold 1858. Flora II. p. 536. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 381. Sect.: Verrucaria, Thelidium.

Verrucaria Wiggers cont.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 297: g. Pyrenocymatior.
Genth 1836. Nass. I. p. 393: g. Endocarpear. — Par. Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 15. (Flora 1854. p. 236.)
Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 231: g. Graphidear.
Fée . . . . Sect.: Euverrucaria, Spermatodium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Verrucaridar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 213: g. Verrucarior.
Conf. Tubercularia Schreb.; Polycoccum Flot.; Thrombium Auct.; Amphoridium Mass.; Verrucaridae Gray.

Verrucaria Hoffm. 1784. Enum. t. 5. f. 1. t. 8. f. 1.
= Patellaria Pers. (Endl. Gen. p. 15.)

Verrucaria Medic. 1787. Malv. p. 103: nov. g. Monadelph. Pentandr. (Tournefortia volubilis L.) *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 300; 1789. Phil. Bot. I. p. 152.
= Pittonia Kunth.

Verrucaria Stackhouse 1816. Nereis brit. (Spreng. n. Entd. I. p. 95): g. Algar.

Verrucariaceae Theob. 1858. Nat. Abh. Geb. Wett. p. 379: ordo Lichenum. Fam.: Verrucarieae, Pyrenuleae.
Arnold 1858. Flora II. p. 536: ordo Gnesiolichenum. Trib.: Verrucarieae, Pyrenuleae, Thelochroëae, Limborieae, Pertusarieae.

Verrucariae Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: series Gasterothalamor. Gen.: Verrucaria, Thelotrema, Trypethelium, Endocarpon.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 15: cohors 2 Lichenum. Gen.: Variolaria, Porina, Thelotrema, Verrucaria, Pyrenula, Pyrenastrum, Limboria, Urceolaria, Lecidea, Biatora.

Verrucaridae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 486. 495: div. Idiothalamear. Gen.: Lejophlea, Lithocia, Inoderma, Endocarpon.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: sect. Gasterothalamear. Gen.: Diorygma, Pyrenothea, Pyrenastrum, Verrucaria.

Verrucarieae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Endocarpear. Gen.: Thelotrema, Verrucaria, Porina, Pyrenula, Tripethelium, Chiodecton.
Fries 1831. Lich. eur. p. 6. 428: trib. 3 Lichenum angiocarpor. Gen.: Segestrella, Verrucaria. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350. Gen.: Verrucaria, Pyrenastrum.
Endl. 1836. Gen. p. 13; 1841. Ench. p. 10: Gasterothalamor. Gen.: Diorygma, Pyrenothea, Pyrenastrum, Verrucaria.
Rchb. 1841. Nom. p. 15: div. Gasterothalamar. Gen. ut Endl. et Ascidium.

Verrucarieae Fée cont.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 7: fam. Cryopsorar. Gen.: Verrucaria, Sphaeromphale, Thelotrema, Pertusaria, Sagedia, Stigmatidium, Pyrenula.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 120: div. Lichenum nucleiferor. Gen.: Sagedia, Verrucaria, Cliostomum, Pyrenothea; Coniangium.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: fam. Lichenum heteromericor. acramphiblastor. Gen.: Sphaeromphale, Verrucaria.
Bayrh. 1849. Taun. p. 95: fam. Lichenum. Gen.: Verrucaria.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 331: fam. Kryoblastor. Gen.: Segestrella, Sychnogonia, Thelochroa, Sphaeromphale, Stigmatomma, Verrucaria, Gongylia, Thelidium, Acrocordia, Lembidium, Pyrenula, Sagedia, Arthopyrenia, Leptorhaphis, Microthelia, Bagliettoa, Limboria.
Arnold 1858. Flora p. 536: trib. Verrucariacear. Gen.: Verrucaria, Amphoridium, Thrombium, Polyblastia, Arthopyrenia, Leptorhaphis, Acrocordia, Sagedia, Thelidium.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 379: fam. Verrucariacear. Gen.: Endocarpon, Pertusaria, Verrucaria, Sagedia, Thelotrema.

Verrucarii Schärer 1850. En. Lich. eur. p. 207: fam. Lichenum verrucarioideor. Gen.: Segestria, Pyrenula, Verrucaria, Thrombium, Limboria.

Verrucarinae Fries 1825. Pl. homon. p. 263: trib. Gasterothalamor. Gen.: Verrucaria, Pyrenastrum, Pyrenothea.
Rchb. 1828. Consp. p. 20: div. Trypetheliacear. Gen. ead.

Verrucarites Göppert 1844. Übers. p. 195.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 17; 1846. Chlor. prot. p. XXIX: g. Lichenum foss.

Verrucularia A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 327; 1843. Arch. Mus. III. p. 319. t. 7: nov. g. Malpighiear. (Banisteria glaucophylla Mart. herb.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7869. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 346. — Walp. 1846. Rep. V. p. 181. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 27.
Endl. 1842. Spl. II. p. 85. n. $5589/_1$: g. Apterygiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Malpighear.

Vertebraria Roussel 1806. Fl. du Calvad. teste Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 144. = Lemanea Bory.

Vertebraria Royle 1834. Ill. bot. Himal. V. 1. p. 29.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 114; 1846. Chlor. prot. p. LIII: g. Marsilaeacear.
M'Coy 1847. Ann. and Mag. XX. p. 145: g. foss. Marsileacear.?

Vertebrata Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 338: nov. g. Hutchinsidear. (Conferva polymorpha L.)
= Polysiphoniae sect. Stenosiphonia.

Verticicladium Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 127: nov. g. Polyactidear. (V. trifidum.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 159.

Verticillaria Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 81. t. 15; 1798. Syst. p. 140: nov. g. Polyandr. Monogyn.
Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 420: g. Guttiferar. (sect. 1.) — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5487: g. Clusiear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 615. — Meisn. 1837. Gen. p. 42 (31). — Endl. 1840. Gen. n. 5434. p. 1025; 1841. Ench. p. 534. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.
Bartl. 1830. Ord. p. 294: g. Garciniear. (genuinar.) — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 308.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Tovomitear.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8027: g. Clusiariar.
Synon. Chloromyron Pers.

Verticillaria Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 370: subsect. Clidemiopsidis. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 764.

Verticillatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: ordo 58 plant. Gen.: Ajuga, Teucrium, Trichostema, Thymus, Satureja, Clinopodium, Origanum, Lavandula, Hyssopus, Melissa, Horminum, Salvia, Rosmarinus, Ziziphora, Monarda, Lycopus, Amethystea, Glechoma, Mentha, Ocymum, Dracocephalum, Nepeta, Betonica, Sideritis, Cunila, Lamium, Galeopsis, Stachys, Ballota, Marrubium, Moluccella, Leonurus, Orvala, Phlomis, Brunella, Scutellaria, Prasium.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 42 plant. Gen. ead. (Prunella loco Brunellae) et Melittis, Cleonia. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 495. Gen. ead.
Schreb. 1774. Pl. verticill. unilab. gen. p. XIII. Char. classis. (Gen. unilabiatar.: Aiuga, Teucrium.)
Rüling 1774. Ord. nat. Tab. Divis.: Salviae, Melissae, Hyssopi.
Scop. 1777. Intr. p. 161: trib. 14 plant. Gentes: 1. *Staminibus 4 fertilibus.* Gen. §. 1: Thymus, Origanum, Clinopodium, Dracocephalum, Horminum, Ocymum, Melittis, Melissa, Trichostema, Scutellaria, Prunella, Cleonia, Thymbra, Prasium, Phryma. §. 2: Galeopsis, Lamium, Stachys, Sideritis, Betonica, Leonurus, Phlomis, Nepeta, Perilla, Molucella, Marrubium, Ballota, Glechoma, Hyssopus, Satureia, Lavandula, Aiuga, Teucrium, Mentha. 2. *Staminibus 2 fertilibus.* Gen.: Lycopus, Amethystea, Monarda, Salvia, Rosmarinus, Ziziphora, Collinsonia, Cunila.
Batsch 1802. Tab. p. 190: fam. Tetraspermar. Gen. ead. ac Linn. 1764 (omissis Hormino, Orvala et Cleonia) et Verbena, Phryma, Collinsonia, Hyptis, Plectranthus, Thymbra.
= Labiatae Juss.

Verticillium Nees 1816. Syst. p. 56; 1817. Überbl. p. 15: nov. g. Mucedinum. (capitatar.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 6. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Ascophorar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 535: g. Botrytidear.

Verticillium Nees cont.
Link 1824. Spec. I. p. 75: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 301. (synsporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 178: g. Acremonior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 135.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Gonocladear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 89 (*Verticillum*): g. Spondylomycetum.
Endl. 1836. Gen. n. 227 *e*. p. 19; 1841. Ench. p. 14: sect. Botrytidis.
Corda 1837 in Sturm Flora. Fung. III. p. 15. t. 8. (Botrytis allochroa Nees.)
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 20: g. Aspergillinor.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 15; 1842. V. p. 14; 1842. Mycol. p. 54: g. Polyactidear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 124.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 165: g. Polyactideor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 99: g. Mucedineor. genuinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Botrytideor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 97: g. Dendrinor.
Synon. Oncocladium Wallr.?

Verticillum Ritg. vid. *Verticillium Nees*.

Verticordella Meisn. 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 19: sect. Verticordiae.

Verticordia *) DC. 1826. Dict. class. XI. p. 400; 1827. XVI. p. 565.
DC. 1828. Pr. III. p. 208: g. Chamaelaucicar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4665; 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 176. n. 6826. (genuinar.) Sect. (1841): Chrysorrhoë, Catocalypta, Verticordia. — Bartl. 1830. Ord. p. 331. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 812. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 110. — Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Endl. (1837. En. pl. Hügel. p. 46) 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 193; 1840. Gen. n. 6279. p. 1225; 1841. Ench. p. 650. Sect.: Euverticordia, Calymmatanthus. — Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. VI. t. 2. A. — Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 98. — Meisn. 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 19. Sect.: Euverticordia, Verticordella, Catocalypta, Pennuligera.
Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 197: g. Euchamaelaucicar. Subgen.: Euverticordia, Catocalypta, Chrysoma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.
Synon. Diplachne R. Brown mss.; Chrysorrhoë Lindl.; Chamaelaucii sp. Dsf.

Verucarieae Endl. Gen. p. 13: sphalm. pro *Verrucarieae*.

*) Cognomen Veneris.

Verulamia *) „DC. mss." Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 7: g. Rubiacear.
Smith .... in Rees Cyclop. XXXVII.
= Baconia DC.

Verutina Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1829. v. 58. p. 8; 1830. v. 60. p. 571: g. Calcitrapear. verar. (Centaurea Verutum L.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 592: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *x*. p. 474; 1841. Ench. p. 247.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 4 *a*: subsect. Calcitrapae.

Verutum Pers. 1807. Ench. II. p. 488: sect. Centaureae.
Conf. Verutina Cass.

Vesalea **) Martens & Galeotti 1844. Bull. Ac. Brux. XI. 1. p. 241: nov. g. Lonicerear. (V. floribunda et hirsuta.)
= Abelia R. Brown.

Vesicaria ***) Tourn. 1703. Coroll. p. 49. t. 483: g. pl. class. V.
Adans. 1763. Fam. II. p. 420: g. Lunariar.
Gled. 1764. Syst. p. 64. n. 263: g. Thalamostemonum.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 108: g. Alyssoidear.
DC. 1821. Syst. II. p. 296: sect. Vesicariae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4768 *b*; 1841. Nom. p. 181. n. 6961. 1.
= Vesicariana DC.

Vesicaria Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 412: sect. Trifolii. (T. fragiferum L.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 531.
= Fragifera Koch.

Vesicaria Lamarck Illustr. t. 559.
DC. 1805. Franç. IV. p. 696: g. Cruciferar. — Par. R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 97. (Verm. bot. Schr. V. p. 36.) — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 171. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 24.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 718; 1825. Syst. II. p. 871. n. 2297; 1831. Gen. II. p. 518. n. 2543: g. Siliculosar. — Par. Gaud. 1829. Helv. IV. p. 187. 265. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 473. (Sejungitur Cistocarpium.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 638.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 232; 1821. Syst. II. p. 295; 1824. Pr. I. p. 159: g. Alyssinear. Sect.: Vesicariana (1821 Vesicaria), Alyssoides. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4768; 1832. Fl. exc. p. 672. Sect. ut DC. 1821. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 176. Sect. ut DC. 1824. — Link 1831. Hdb. II. p. 296. — Koch 1836. Syn. p. 58. Ed. II. p. 62. — Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 100. Sect. ut G. Don et Physaria. — Endl. 1839. Gen. n. 4869. p. 867; 1841. Ench. p. 448. Sect. eaed. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 135. —

*) Dicat. Baconi de Verulam.
**) Nomen in honorem anatomici belgici Vesalei.
***) Nomen a fructus forma. (Tourn.)

Vesicaria Lam. cont.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 113. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 195.
Link 1822. En. II. p. 158: g. Tetradynam. Siliculos.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 181. n. 6961: g. Alyssear. genuinar. Sect.: Vesicaria, Alyssopsis.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 270: g. Latiseptar. (restrict.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 90: g. Allyssinear.
C. Koch 1846. Linnaea XIX. 3. p. 318: subg. Berteroae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.
Synon. Alyssoides et Vesicaria Tourn.

Vesicaria G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 180: sect. Anodonteae.
= Anodontea DC.

Vesicariana DC. 1824. Prodr. I. p. 159: sect. Vesicariae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 176. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 100. — Endl. 1839. Gen. n. 4869 *a*. p. 867; 1841. Ench. p. 448.
Synon. Vesicaria Tourn.; Alyssi sp. Linn.

Vesicastrum Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 202: sect. Trifolii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3869 *e*; 1832. Fl. exc. p. 490; 1841. Nom. p. 147. n. 5694. 2. Subsect. (1841): Fragifera, Mistyllus. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 190. — — Endl. 1840. Gen. n. 6511 *d*. p. 1268; 1841. Ench. p. 668 (sejuncta Fragifera). — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 550. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 35. — Webb 1846. Canar. II. p. 78.
Synon. Mistyllus Presl.

Vesicastrum Gren. (& Godr.) 1848. Fl. France I. p. 26: sect. Ranunculi. (R. Thora, alpestris, glacialis, etc.)

Vesicularia C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 233: subsect. Omaliae.
Synon. Acosta C. Müll.

Vesiculifera Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p....: nov. g. Cystospermear.
= Oedogonium Link.

Veslingia „Heist." Fabric. 1759. Hort. Helmst. p. 363.
Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 299: g. Calycostemonis. (Aizoon canariense L.)
= Aizoon Linn.

Veslingia *) Visiani ..... Nuov. saggi Ac. Padov. V. p. 269; 1820. Ind. sem. h. Patav. (Linnaea Litt. XV. p. 102): nov. g. Senecionidear., Heliopsidi, Guizotiae et Tetragonothecae aff. (V. scabra). *Cf.* Walp. 1843. Rep. II. p. 610. 611.
Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3139: g. Heliopsidear.
= Guizotia Cass. (Endl. Suppl. II. p. 42.)

*) Dicat. Joh. Veslingio, Mindano.

Vespuccia Parlat. 1854. Nuovi gen. monocot. p. 55: nov. g. Butomear. (Stratiotes nymphaeoides Willd.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 6.
= Hydrocleys Rich.

Vestia *) Willd. 1809. Enum. p. 208: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Periphragmos foetidus Rz. & Pav.) *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 64.
D. Don 1822. Edinb. n. phil. journ. Nr. 7. p. 291.
Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 307: g. Polemoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3287: g. Solanear.
Schltd. 1832. Linnaea VII. p. 53: g. Cestrinar.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 486: g. Cestrinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 57.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Mandragorear.
Endl. 1839. Gen. n. 3868. p. 668; 1841. Ench. p. 332: g. Vestiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4770. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 630.
Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. 177: g. Nicotianear. (Char. emend.) — Par. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 579.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Fabianear.
Synon. Periphragmos Ruiz & Pav.; Cantua Juss.

Vestieae Endl. 1839. Gen. p. 668: trib. Solanacear. Gen.: Vestia, Sessaea. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1404 et Ench. p. 332) Metternichia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). Gen. ut Endl. 1839. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 58. Gen. ut Endl. 1841. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 661. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 122: sect. Cestrinear. Gen. ut Endl. 1841 et Retzia, Lonchostoma, Sanchezia?

Vetiveria Virey ex Steud. Nom. I. p. 92; II. p. 661.
= Andropogon muricatus Retz.

Vetiveria Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 25. 26: nov. g. Graminear. (Nomen.)
An = praeced.?

Vetrix Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. tot nat. Wet. I. p.....: subsect. Capri-Salicis. (Salix incubacea, repens, versifolia, phylicifolia, Caprea, etc.)
Fries 1832. Nov. fl. Suec. Mant. I. p. 37. 48: tribus Salicis.
Synon. Caprea Fries.

Vetrix Fries 1840. Bot. Notis. p. 145; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 56: sect. Salicis. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 348.
= Vimen Dumort. pt.

*) Dicat. Lor. de Vest, prof. Grätz.

Vexillaria Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 117: nov. g. Clitoriear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6637. p. 1289; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5793. — Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Synon. Pilanthus Poit.; Neurocarpi sp. Desv.?

Vialia *) Visiani 1840. Ind. sem. h. Patav. n. 5: nov. g. Byttneriacear. (Hermannia macrophylla Hort.) *Cf.* Linnaea XV. Litt. p. 103; XVI. Litt. p. 114.
Meisn. 1843. Comm. p. 344: g. Hermanniear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 113: g. Dombeyacear.?
= Brotera Cavan.? (Endl. Suppl. II. p. 80.)

Vibo Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 178: nov. g. ex typo Rumicis spinosi L.
Mönch 1794. Meth. p. 318: g. Thalamostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 182: g. Monoec. Hexandr.
Presl 1826. Sicul. I. p. XXXIX: g. Polygonear.
Synon. Emex Neck.; Centropodium Burch.; Podocentrum Burch.; Centopodium Steud.

Viborgia Mönch 1794. Meth. p. 132: nov. g. Thalamostemonis. (Cytisus supinus L.)
= Tubocytisus DC.

Viborgia Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 748: g. Spartiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 135: g. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4039; 1841. Nom. p. 151. n. 5878. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 142. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 28. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 476. — Endl. 1840. Gen. n. 6479. p. 1263; 1841. Ench. p. 668. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 459; 1844. ibid. III. p. 363.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 229. n. 2536; 1831. Gen. II. p. 572. n. 2785: g. Leguminosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Lotononidear.
= Wiborgia Thunb.

Viborgia „Humb. Bonpl." Steud. Nom. I. p. 192; II. p. 761 in synon. Baziasae: vid. *Wiborgia HBK.*

Viborgianthe Rchb. vid. *Viborgioides Endl.*

Viborgioides Endl. 1838. Gen. n. 2452 *b*. p. 398; 1841. Ench. p. 237: sect. Sabaziae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3102. 2 (*Viborgianthe*).

Viborgioides „Benth." Walp. 1846. Rep. V. p. 453: sect. Lebeckiae.

*) Dicat. Fel. Viali, quondam botan. professori Patavino.

Viborquia Ortega 1798. Decad. V. p. 66. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 67.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4013: g. Dalbergiear.?
= Varennea DC. (Nomen mutatum ob Viborgiam s. Wiborgiam Alior.

Vibrio Müll. Anim. infus. p. 54.
Gmel. 1791. Syst. nat. I. 6. p. 3898: g. Vermium infusorior.
= Bacillaria Gmel.

Vibrissea Fries 1823. Syst. myc. II. p. 31; 1828. Elench. II. p. 3: nov. g. Mitrator. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 77.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 573: g. Helvellear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 86: g. Clavicularium. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 427. p. 37; 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 445. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 339.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Helvellaceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 208. — Bail 1858. Syst. p. 67. t. 21.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 313: g. Claviculator.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Helvellacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 548: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 156: g. Leotiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 360: g. Dermateor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Geoglosseor.
Synon. Leotiae sp. Alb. & Schw.

Viburnaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Fructitubiae. Gen.: Viburnum.

Viburnarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: ordo Gynocoronar. Fam.: Caprifoliaceae, Viburnideae.

Viburneae Agardh 1825. Class. plant. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Rchb. 1828. Consp. p. 92: subdiv. Valerianear. Gen.: Viburnum, Opulus, Lentago, Trapaulos.
Bartl. 1830. Ord. p. 214: ordo (127) Rubiacinar. Gen.: Viburnum, Opulus, Sambucus.
Kunth 1838. Berol. I. p. 306: div. Caprifoliacear. Gen.: Viburnum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. Gen. id.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 303: fam. (123) Rubiacinear. Sect.: Viburnineae, Sambucineae et genus anomalum: Adoxa.

Viburnideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. 33: fam. Viburnariear. Gen.: Viburnum, Lentago, Opulus, Sambucus.

Viburnidia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: fam. Osaritiae. Subfam.: Lentaginia, Opulidia, Chenocaspia.

Viburnineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 306: sect. Viburnear. Gen.: Viburnum, Tinus, Solenotinus.

Viburnum*) Tourn. 1700. Inst. p. 607. t. 377: g. pl. class. XX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 39. Ed. Hall. 1745. p. 41: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 86. n. 245; 1737. Cliff. p. 109; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 127. n. 292; 1748. Ups. p. 68: g. Pentandr. Trigyn.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 467: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 203. n. 845: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Dumosar.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 148.
Borckh. 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 20. Char. emend.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Opulidiae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 488: g. Caprifoliacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1950: g. Viburnear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Viburnidear.
= Viburni Linn. pars.

Viburnum Linn. 1753. Sp. I. p. 267; 1759. Syst. ed. X. p. 964. n. 332; 1762. Sp. ed. II. p. 383; 1764. Gen. ed. VI. p. 147. n. 370; 1767. Syst. ed. XII. p. 218. n. 367: g. ampliat. Pentandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 220. — Murr. 1774. Syst. p. 243; 1784. Syst. p. 294. — Reich. 1778. Gen. p. 150. n. 400. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 197. n. 503. — Gmel. 1791. Syst. p. 496. — Pers. 1797. Syst. p. 311; 1805. Ench. I. p. 326. n. 727. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1486. n. 567; 1809. En. p. 325. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 202. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 25. 443.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear. — Par. Neck 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 469.
Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior. (Distinguitur Tinus.) — Par. Juss. 1789. Gen. p. 213. — Hedw. 1806. Gen. p. 204. n. 841. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 620; 1825. Syst. I. p. 935. n. 1103; 1830. Gen. I. p. 233. n. 1228. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXI. 629. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 419. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1010.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 187.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 145: g. Fructiflorar.
Scop. 1777. Intr. p. 144: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 133. t. 27. f. 3 (Opulus).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 287. 288. 297. *Cf. Tinus, Opulus* et *Viburnum Tourn.*
Neck. 1790. El. I. p. 142. n. 247: g. Sphanidophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 603: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 458. — DC. 1805. Franç. IV. p. 274. —

*) Nomen ex Virgilio.

Viburnum Linn. cont.
Link 1821. En. I. p. 288; 1829. Hdb. I. p. 666. — D. Don 1825. Nepal. p. 141. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 239 (*Viorne*). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 154.
Batsch 1802. Tab. p. 238: g. Sambucinar.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 427: g. Sambucear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 73. — DC. 1830. Pr. IV. p. 323. Sect.: Lentago, Opulus, Solenotinus. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 279. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 438. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 388. — Koch 1836. Syn. p. 324. Ed. II. p. 356. — Rchb. 1837. Hdb. p. 178. — Meisn. 1838. Gen. p. 155 (111). — Endl. 1838. Gen. n. 3340. p. 569; 1841. Ench. p. 282. Sect. ut DC. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 13. — Brongn. 1843. En. genr. p. 48. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 384. Sect. ut DC. — Webb . . . . Canar. II. p. 174. Sect.: Lentago. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 246 (*Viorne*). — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 119. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 96.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: g. Viburnacear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 655: g. Caprifoliear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 201: g. Valerianear.
Kunth 1838. Berol. I. p. 306: g. Viburnear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2744. Sect.: Solenotinus, Viburnum, Opulus.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 306: g. Viburninear. Sect.: Opulus, Lantana, Lentago.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 7: g. Sambucinear.
Synon. Opulus, Viburnum et Tinus Tourn.; Viburnum et Opulus Mönch; Trapaulos Rafin.

Viburnum Mönch 1794. Meth. p. 505: g. Petalostemonis, includens Viburnum et Tinum Tourn.
Bartl. 1830. Ord. p. 215: g. Viburnear.
Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2744. 2: sect. Viburni.
= Lentago DC.

Vicatia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 243: nov. g. Smyrnear. (Sison? coniifolium Wall.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 377. — Endl. 1839. Gen. n. 4533. p. 790; 1841. Ench. p. 380.
Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5352: g. Smyrniear.
Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108): g. Cachrydear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.

Vicentia Dietr. vid. *Vincentia Gaudich.*

*) Dicat. R. Vicat, scriptori de plantis venenosis.

Vicentia Allem. 1844. Diss. (Bot. Zeit. 1854. p. 435): nov. g. Combretacear. (An *Vincentia?*)

Vicia Tourn. 1700. Inst. p. 396. t. 221: g. pl. class. X.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 252. Ed. Hall. 1745. p. 261: g. pl. class. XI.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 597: g. Leguminosar. — Par. B. Juss 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 360. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 418. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 234. — DC. 1805. Franç. IV. p. 589; 1815. V. p. 576. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 17 (*Vesce*). — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 430. 501.
Adans. 1763. Fam. II. p. 331: g. Viciar.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Viciear. — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 354. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3919 (sect.: Wiggersia, Vicia); 1841. Nom. p. 148. n. 5771 (sect.: Vicia, Isthmovicia, Cracca). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 315. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 156.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1270: sect. Viciae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6581 *b*. p. 1279; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. II. p. 665. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 282.
Link 1831. Hdb. II. p. 190: g. Lathyroidear.
= Viciae Linn. pars.

Vicia Linn. 1737. Gen. p. 221. n. 587; 1737. Cliff. p. 368; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 218; 1753. Sp. II. p. 734; 1759. Syst. ed. X. p. 1165. n. 782; 1763. Sp. ed. II. p. 1034; 1764. Gen. ed. VI. p. 376. n. 873; 1767. Syst. ed. XII. p. 487: g. injuncta Faba ampliat. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 64. — Murr. 1774. Syst. p. 552; 1784. Syst. p. 663. — Reich. 1778. Gen. p. 375. n. 974. — Lour. 1790. Coch. II. p. 443. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 497. n. 1187. — Gmel. 1791. Syst. p. 1110. — Pers. 1797. Syst. p. 701; 1807. Ench. II. p. 306. n. 1717. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1093. n. 1356; 1809. En. p. 762. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 97. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 323.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 133. n. 554: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 384. — Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 497. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 124. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 454.
Hill 1769. Ht. kew. p. 299: g. Tetrapetalar. irregular.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 8: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 310. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 753; 1826. Syst. III. p. 264. n. 2573; 1831. Gen. II. p. 589. n. 2896. — Link 1822. En. II. p. 238. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 343.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 489: g. Papilionatar.

Vicia Linn. cont.
Neck. 1790. El. III. p. 37. n. 1350: g. Cyteophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 325. t. 151.
Rebent. 1804. Neom. p. 187: g. Decandr. Monogyn.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 613: g. Lathyroidear. Sect.: Cracca, Ervum, Vicia, Aphaca, Faba.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1232. 1270: g. Viciear. Sect.: Vicia, Faba. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 527. Sect. eaed. et Cracca. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 300. — Koch 1836. Syn. p. 191. Ed. II. p. 212. — Meisn. 1837. Gen. p. 92 (65.) — Kunth 1838. Berol. I. p. 241. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 269. — Endl. 1840. Gen. n. 6581. p. 1279; 1841. Ench. p. 670. Sect. ut Rchb. 1832. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 664. Sect. ut Rchb. 1828. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 77. Sect.: Vicia, Cracca. — Webb 1846. Canar. II. p. 98. Sect.: Ervum, Cracca, Etymovicia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 458. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 209 (*Vesce*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 282. Sect. ut Rchb. 1828. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 528.
Presl. 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 588. Char. reform. Sect.: Vicioides, Cracca.
Synon.. Vicia et Faba Tourn.; Vicia, Faba et Vicioides Mönch; Vicia et Wiggersia GMS.; Arachus Med.

Vicia Mönch 1794. Meth. p. 147: g. Thalamostemonis, sejuncta Vicioide restrict.
= Viciae Linn. pars.

Vicia GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 36: g. Diadelph. Decandr., disjuncta Wiggersia a Linnaeano discrepans.
Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 9319 *b*: sect. Viciae.

Vicia Rchb. 1832. Fl. exc. p. 527: sect. Viciae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6581 *b*. p. 1279; 1841. Ench. p. 670. Subsect.: Euvicia, Vicioides.

Viciae Adans. 1763. Fam. II. p. 329: sect. 6 Leguminosar. Gen.: Aphaca, Nissolia, Ochrus, Lathyrus, Clymenum, Orobus, Pisum, Faba, Vicia, Ervum, Lens, Cicer.

Vicieae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 133: subtrib. Curvembryar. diadelphar. Gen.: Orobus, Lathyrus, Ochrus, Pisum, Vicia, Lens, Ervum, Faba, Cicer, Arachis.
DC. 1825. Pr. II. p. 353 (Leg. Mém. VII.): trib. 4 Papilionacear. Gen.: Cicer, Faba, Vicia, Ervum, Pisum, Lathyrus, Orobus. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 101. 311. Gen. ead. et Ochrus, Platystylis. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. 298. Gen. ut DC. — Koch 1836. Syn. p. 191. Ed. II. p. 211. Gen. ut DC. excepta Faba. — Meisn. 1837. Gen. p. 92 (65). Gen. ead. — Endl. 1840. Gen. p. 1278; 1841. Ench. p. 669. Gen. ead. — Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 133. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — Lindl. 1847. Veg. kd.

Vicieae Bronn cont.
p. 554. Gen. ead. et Astrophia? — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 270. Gen. ut Koch.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVII: subdiv. Lotear. Gen. ut DC.
Rchb. 1828. Consp. p. 149; 1832. Fl. exc. p. 525; 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 148: subdiv. Fabacear. Gen. ut DC. et 1841 Ervilia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: trib. Leguminosar. Gen. ut DC. et Ervilia.
Bartl. 1830. Ord. p. 411: div. Papilionacear. Gen. ut DC.
Synon. Viciae Adans.

Vicioides Mönch 1794. Meth. p. 135: nov. g. Thalamostemonis.
Endl. 1840. Gen. n. 6581 *b β.* p. 1279; 1841. Ench. p. 670: subsect. Viciae.
Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 488: sect. Viciae.
Synon. Isthmovicia Rchb.

Vicioides Jaub. & Spach 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 230: sect. Ciceris. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 884.

Vicoa *) Cassini 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 33; 1830. Dict. v. 60. p. 580. 594: nov. g. Inulear. (Archetypar. verar.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 199. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3393. (genuinar.) — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954. (legitimar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 63.
DC. 1836. Pr. V. p. 474: g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2429. p. 394; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128).
Synon. Inulae sp. Linn., Wall.; Jacobaea Burm.

Victoria **) Lindl. 1837. Monogr. c. ic.; 1838. Bot. Regist. App. p. 13: nov. g. Nymphaeacear. (V. regia.) *Cf.* Schomb. in Johnst. Mag. II. p. 440. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 265.
Endl. 1839. Gen. n. 5019. p. 899; 1841. Ench. p. 461; 1850. Spl. V. p. 43: g. Euryalear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 106. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 219. — Planch. 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 19. 22. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 151. 152.
D'Orb. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 53. (Species 2.)
Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1167: g. Anesleaear. genuinar.
Meisn. 1843. Comm. p. 340: g. Nymphaeear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 411: g. Euryalidar.
Curt. 1847. Bot. Mag. t. 4275—4278.
Hook. 1851. Victoria regia. (fol.)
Synon. Euryales sp. Pöpp.; Maruru Brasil.

Victoriperrea Hombr. & Jacq. Voy. au pol Sud. t. 1. f. 1—9: nov. g. Pandaneum indescriptum. *Cf.* Decaisne 1853. Bot. voy. Pol Sud. II. p. 83 et Müll. Ann. bot. V. p. 861.

*) Dicat. Giov. Batt. Vico, Neapolitano.
**) Dicat. reginae Victoriae.

Vidua Coulter 1823. Mém. Dipsac. p. 37: sect. Scabiosae. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 657. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 691. — Endl. 1838. Gen. n. 2195 *b.* p. 355; 1841. Ench. p. 229. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 182. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 17.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 449: subsect. Scabiosae verae.
= Cyrtostemma Koch.

Vieraea Schultz Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 225: vid. *Vieria Webb.*

Viereya Steud. vid. *Vireya Blume.*

Vieria *) Webb Phyt. Canar. Icon. t. 84.
Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3387: g. Inulear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. p. 710 (*Viraea*).
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 225 (corr. *Vieraea*): g. Euinulear. (Jasonia laevigata DC.)
Schultz Bip. 1841 in Walp. Rep. II. p. 954 (sph. *Pieraea*): g. Eujasoniear.
Synon. Donioides DC.

Vieusseuxia **) La Roche 1766. Diss. (Lugd. Bat. 4.): nov. g. ab Iride sejunctum. (Iris tricuspis Thunb., etc.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 765.
DC. 1803. Ann. Mus. II. p. 136: g. Iridear. *Cf.* Schrad. n. Journ. I. 3. p. 79. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 344. 489. n. 142. — Link 1821. En. I. p. 56; 1829. Hdb. I. p. 214. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 165. n. 168; 1831. Gen. II. p. 528. n. 2594. (in Monadelph. Triandr.) — Eckl. 1827. Verz. p. 11. — Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 114. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1223. p. 165; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 148. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1552. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. En. genr. p. 22.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1186: g. Ferrariear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 10.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Freuchenia Eckl.?; Iridis sp. Linn.; Moraeae sp. Jacq.

Vigia Vell. Fl. Flum. IX. t. 128: g. Gynandr. Polyandr. (serrata) ex Steud. Nom. II. p. 766.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 57: inter genera nondum descripta.

Vigiera Vell. Fl. Flum. II. t. 73. 74.
= Escallonia Mutis et Jussiaea Linn.

Vigna ***) Savi 1824. Diss. p. 6; 1825. Nuovo giorn. lett.: nov. g. a Dolicho sejunctum. *Cf.* Linnaea I. p. 331.
DC. 1825. Pr. II. p. 401: g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3941; 1841. Nom. p. 149. n. 5776. Sect. (1841): Vigna, Callicysthus, Catjang, Unguicularia.

*) Nomen in honorem egregii viri Josephi Vierae.
**) Dicat. Vieusseux, medico Genevensi.
***) Dicat. Domin. Vigna, prof. Pisano.

Vigna Savi cont.
— Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 360. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 439.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Euphaseolear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 281. — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 533. — Endl. 1841. Gen. n. 6675. p. 1297; 1841. Ench. p. 672. Sect.: Euvigna, Callicystus, Catjang, Otoptera. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 186. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 562.
Synon. Callicysthus Endl.; Scytalis E. Meyer; Dolichi sect. Unguicularia et Catiang DC.

Vignaldia Rich. 1847. Fl. Abyssin. I. p. 357: nov. g. Hedyotidear. (Mussaendae sp. Hochst.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 773.

Vignea *) Palis. 1819 in Lestib. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 17): nov. g. Caricear. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 203. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1070; 1829 ap. Mössl. III. p. 1584. 1604; 1830. Fl. exc. p. 55; 1841. Nom. p. 40. n. 1434.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 305; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 94: sect. Caricis. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 368; 1838. Berol. II. p. 330. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 409. — Webb 1850. Canar. III. p. 370.
Heuff. 1844. Flora II. p. 529: g. Caricinear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 40: g. Cyperoidear. Sect.: Psyllophora, Heleonastes, Leimonastes.
= Caricis spec. stigmatibus 2.

Vigneae Koch 1844. Syn. ed. II. p. 864: sect. Caricis.
= Caricis spec. spiculis androgynis in spicam dispositis.

Vigolina Poir. ex Steud. Nomencl. I. p. 656; II. p. 766. (V. Acmella.)
= Galinsoga Ruiz & P.

Viguiera **) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 224: nov. g. Helianthear. (V. helianthoides.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 475. — Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 150. (Archetypar. verar.) — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2643. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach. 1841. Vég. phan. X. p. 20. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 615. n. 2850; 1831. Gen. II. p. 640. n. 3208: g. Radiatar. — Par. Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 203.
Less. 1832. Syn. p. 229 (*Viguieria*): g. Coreopsidear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 578. — Endl. 1838. Gen. n. 2534. p. 412; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen.

*) Dicat. D. F. de la Vigne, prof. Charkow.
**) Dicat. Alex. Viguier, botanico Monspeliensi.

Viguiera HBK. cont.
p. 203 (132). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3606. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 317: g. Euhelianthear.
Synon. Euviguiera Gardn.; Helianthi sp. Cav.

Viguiera Gardn. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 396: g. Senecionidear. ampliat. Sect.: Euviguiera, Leighia, Harpalizia, Harpalium. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 860. Sect. eaed.

Viguieria Lessing vid. *Viguiera HBK.*

Vilfa Adans. 1763. Fam. II. p. 495: g. Phalaridum.
Palis. 1812. Agrost. p. 16: g. Graminear. — — Par. Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 205.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 137; 1822. Syn. I. p. 204: g. Agrostidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 144. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 434. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 29.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 343: sect. Agrostidis. — Par. Link 1821. En. I. p. 70. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 257; 1830. Gen. I. p. 58. Subsect.: Colpodium, Phippsia. — Koch 1837. Syn. p. 781. Ed. II. p. 901. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 460. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 378. — Math. 1853. Belg. I. p. 594.
Trin. 1820. Fund. p. 118: g. Triandr. Digyn.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 672): g. Vilfaceor.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 5: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 912: g. Miliacear. Sect.: Colpodium, Sporobolus.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 392: g. Agrostear.
Trin. 1835. Linnaea X. p. 302: g. Vilfacear.
Trin. 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 50: g. Vilfeor.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 192: subg. Agrostidis.
Steud. 1854. Glum. I. p. 153: g. Vilfear.
Synon. Agrostidis sp. Kunth et Sporoboli sp. R. Brown; Decandolia Bast., Math.; Bennetia Rafin.

Vilfacea Trinius 1824. Gram. uniflor. (Isis 1825. p. 670. 671): div. Graminum. Gen.: Cornucopiae, Alopecurus, Phleum, Lappago, Knappia, Crypsis, Vilfa, Potamophila, Leersia, Limnas.

Vilfaceae Trinius 1835. Linnaea X. p. 302: div. Graminear. Gen.: Vilfa, Phleum.

Vilfea Trinius 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 23: div. Agrostideor. Gen.: Nardus, Aegopogon, Lycurus, Holböllia, Phippsia, Coleanthus, Alopecurus, Vilfa, Spartina, Crypsis, Reynaudia, Limnas, Phleum.

Vilfeae Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 146: subtrib. Agrostidear. Gen.: Nardus, Schedonnardus, Aegopogon, Lycurus, Phippsia, Coleanthus, Alopecurus, Ktenosachne, Phleum, Pentarrhaphedon, Crypsis, Maillea, Rhizocephalus, Reynaudia, Limnas, Vilfa.

Villamilla „Ruiz & Pav. mss." Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 10: sect. Rivinae.
Synon. Piercea Rafin.

Villanova Ortega 1789. Decad. p. 48. t. 6.
= Parthenium Linn.

Villanova Lagasca 1816. Nov. gen. et sp. p. 31: nov. g. Corymbiferar., Unxiae aff. (V. oppositifolia, alternifolia et pinnatifida.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 902: g. Radiatar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18: g. Milleriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2726. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 236; 1830. v. 60. p. 577: g. Siegesbeckiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.
Less. 1832. Syn. p. 256: g. Chrysanthemear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 75. — Endl. 1838. Gen. n. 2678. p. 436; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3091. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. .... in Webb Canar. II. p. 276: g. Pyrethrear.
Synon. Unxiae sp. HBK.

Villaresia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 35; 1802. Fl. peruv. III. p. 8. t. 231: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 206.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 107: g. Rutaceis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 159. n. 680 (et p. 177. n. 741).
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 14. Char. emend.
Endl. 1840. Gen. n. 5709. p. 1093; 1841. Ench. p. 578: g. Ilicinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 431.
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5253: g. Aquifoliacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598.
Synon. Villarezia Röm. & Schult.; Citronella Don; Citri sp. Mol.

Villarezia Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVII. 331. n. 960: g. Rutacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 779. n. 850; 1830. Gen. I. p. 178. n. 900. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.
Meisn. 1839. Gen. p. 252 (160): g. Aquifoliacear.?
= Villaresia Ruiz & Pav.

Villaria Guett. .... Mém. min. I. p. 170 ex DC. Prodr. VI. p. 542. An *Villarsia?*
= Arctium Lam.

Villaria Schreb. 1791. Gen. II. p. 685. n. 1514: g. Dioec. Pentandr., inter Melicytum et Astronium collocatum.
= . . . ?

Villarsia**) Guett. .... Mém. min. I. p. 170. t. 19 ex Endl. Gen. p. 469.
= Arctium Lam.

Villarsia Neck. 1790. Elem. bot. II. p. 110. n. 777: g. Plyrontophytor.
= Cabomba Aubl.

Villarsia Gmel. 1791. Syst. p. 477: g. Pentandr. Digyn. (V. aquatica Walt. Fl. carol. p. 108.)
Vent. 1803. Choix p. 2. n. 9.

*) Dicat. Mathiae Villarés.
**) Dicat. Domin. Villars, prof. tandem Argentorat.

Villarsia Gmel. cont.
DC. 1805. Franç. III. p. 648: g. Gentianear. Par. Hedw. 1806. Gen. p. 180. n. 743. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 477; 1825. Syst. I. p. 582. n. 625; 1830. Gen. I. p. 144. n. 721. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 186. — Link 1821. En. I. p. 209; 1829. Hdb. I. p. 427. — Kunth 1823. Syn. II. p. 274. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 850. (indica Vent.) — Mert. & Koch 1827. Deutschl. Fl. II. p. 8. 125. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 207. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 221. — Bartl. 1830. Ord. p. 201 (desciscens). — Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1533. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 37. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 649.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 456. Ed. Nees p. 312: g. Gentianeis aff. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVI. 178. n. 666. — Wight 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 96. t. spl. 30.
Elliott 1817. Sketch I. p. 230: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 120. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 7. 79.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 132. n. 3475; 1831. Fl. exc. p. 420: g. Menyanthear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 485. — Endl. 1838. Gen. n. 3565. p. 605; 1841. Ench. p. 303. Sect.: Nymphaeanthe, Limnanthemum. — Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 54. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 364. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 76.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Menyanthidear.
A. St. Hil. 1833. Voy. distr. diam. II. p. 413. *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 190.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 168: g. Menyanthacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 208: g. Limnanthemear.
Synon. Swertia Labill.

Villarsia Griseb. 1839. Gent. gen. p. 336; 1839 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 70: g. Menyanthidear. (V. ovata, pumila, crista galli, parnassifolia.)
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5085: g. Villarsiear.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 136: g. Menyanthear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
= Nymphaeanthe Rchb.

Villarsieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 132: sect. Menyanthear. Gen.: Villarsia, Nymphaeanthe.

Villarsites Münst. .... Beitr. V. p. 109. t. 4.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 231; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII: g. foss. Gentianear.

Villebrunea Gaudich. Voy. Bonite. Bot. t. 91. 92.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 195 (Flora 1855. p. 521): g. Maoutiear.
Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 166: g. Urticacear.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 381: g. Villebrunear.
Synon. Oreocnide Miq.; Morocarpi sp. Sieb. & Zucc.

Villebruneae Weddell 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 372: subtrib. Böhmeriear. Gen.: Pipturus, Villebrunea, Debregeasia.

Villemetia Moq.-Tand. vid. *Willemetia Märkl.*

Villiflorae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 235: sect. 6 Graminear. Gen.: Lagurus, Imperata, Saccharum, Heteropogon, Andropogon, Pollinia, Sorghum, Ischaemum, Apluda.

Villocuspis A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 162: sect. Chrysophylli.

Vilmorina Rchb. vid. *seq.*

Vilmorinia*) DC. 1825. Prodr. II. p. 239: nov. g. Clitoriar. (Clitoria multiflora Sw.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 219.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 2968 (*Vilmorina*); 1841. Nom. p. 149. n. 5811: g. Glycinear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6655. p. 1292; 1841. Ench. p. 671. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. (?)
Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Clitoriear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62).

Vilshenica „Petit-Thouars" Rchb. 1828. Consp. p. 212d. n. 5593: inter genera vix cognita.

Vimen P. Browne 1757. Jamaic. p. 369 (t. 22. f. 5): in Append.
= Alina Adans.

Vimen Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. I. p. ...: subsect. Capri-Salicis. (Salix viminalis, rubra, mollissima, etc.)
Synon. Vetrix Fries pt.

Viminaria Smith 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 507; 1808. Linn. Trans. IX. p. 261: nov. g. Leguminosar. (Daviesia denudata Vent.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 210. — Par. R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 13. (Verm. bot. Schr. II. p. 464.) — Link 1821. En. I. p. 403. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 353. n. 1660; 1830. Gen. I. p. 366. n. 1847. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1506.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 744: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 107. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4070. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 119. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 175. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 32; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 76: g. Pultenaear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6436. p. 1257; 1841. Ench. p. 667. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 57.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5930: g. Pultenaeear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 126: g. Podalyriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Pultenear.
Synon. Sophorae sp. Schrad.; Spartii sp. Willd. Herb.

Viminella „Ser. mss." Mathieu 1853. Fl. Belg. I. p. 485: sect. Salicis. (S. lanceolata, viminalis, etc.)

Vinca**) „Rivin." Rupp. 1788. Fl. jen. p. 27. Ed. Hall. 1745. p. 27: g. pl. class. I.

Vinca Rivin. cont.
Linn. 1737. Gen. p. 63. n. 180: g. Pentandr. Digyn. (ob germina gemina.)
Linn. 1737. Cliff. p. 77; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 53; 1753. Sp. I. p. 209; 1759. Syst. ed. X. p. 944. n. 261; 1762. Sp. ed. II. p. 304; 1764. Gen. ed. VI. p. 115. n. 295; 1767. Syst. ed. XII. p. 189. n. 293: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 209; 1784. Syst. p. 252. — Reich. 1778. Gen. p. 120. n. 322. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 163. n. 419. — Lour. 1790. Coch. I. p. 118. — Gmel. 1791. Syst. p. 435. — Pers. 1797. Syst. p. 265. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1232. n. 380; 1809. En. p. 274. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 9. 237. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 1 (*Vinka*).
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 197. n. 813: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Contortor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Apocinor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 201. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 638. n. 695. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 655.
Hill 1769. Ht. kew. p. 149: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 378: g. Apocinatar.
Scop. 1777. Intr. p. 155: g. Dicarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 144: g. Apocinear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 421. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 328. — Hedw. 1806. Gen. p. 113. n. 509. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 882.
Neck. 1790. El. I. p. 261. n. 416: g. Campylophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 172. t. 117.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 262: g. Apocynear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 267. n. 612. — DC. 1805. Franç. III. p. 665. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 493; 1830. Gen. I. p. 147. n. 736. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXVII. 433. n. 757. — Link 1821. En. I. p. 206; 1829. Hdb. I. p. 431. — Lois. 1826. Dict. v. 39. p. 166 (*Pervenche*). — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1035. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Koch 1837. Syn. p. 484. Ed. II. p. 556. — Kunth 1838. Berol. II. p. 27. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 66. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 653 (*Pervenche*).
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 342: g. Vinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3533; 1831. Fl. exc. p. 432; 1841. Nom. p. 134. n. 5166: g. Vincear. Distinguitur Lochnera.
Bartl. 1830. Ord. p. 204: g. Echitear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 95: g. Tabernaemontanear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 381. Sect.: Lochnera, Cupa-Veela, Pervinca. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 424.
Endl. 1838. Gen. n. 3405. p. 582; 1841. Ench. p. 294: g. Plumeriear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 522. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 41.

*) Dicat. Vilmorin, agronomo gallico.
**) Nomen a vinciendo.

Vinca Rivin. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 477: g. Apocynacear.
Synon. Provinca Caesalp.; Pervinca Tourn., Dumort.

Vinca Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 258; 1789. Phil. Bot. I. p. 103: g. a Pervinca Tourn. separatum. (Vinca rosea L.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Vincear.
= Lochnera Rchb.

Vincae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 291. 342: fam. Corolliflorar. Gen.: Vinca.

Vinceae DC. & Duby 1828. Bot. gall. p. 324: sect. Apocynear.
Rchb. 1828. Consp. p. 134; 1831. Fl. exc. p. 430; 1837. Hdb. p. 211: subdiv. Apocynear. Gen.: Vinca, Lochnera, Tabernaemontana, Vahea, Cameraria, Amsonia, Plumeria, Plectaneia, Adenium? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 134. Gen. Plumeriear. Endl. 1840.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Apocynear. Gen.: Pervinca, Vinca, Tabernaemontana, Cameraria, Plumeria, Amsonia, Vahea, Allamanda.

Vincentia*) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 417: nov. g. Cyperacear. (Machaerina restioides Gaudich.) — Par. Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. III. p. 98. Char. emend. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129 (*Vicentia*). 207. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 276.
Kunth 1837. Cyper. p. 314: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Steud. 1855. Glum. II. p. 156.
= Elynanthus Nees?

Vincentia**) Bojer 1830 in Hook. Bot. Miscell. I. p. 293. t. 62: nov. g. Tiliacear. (V. triflora.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 551. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 238.
Meisn. 1837. Gen. p. 38 (28): g. Tiliear.
= Damine Endl.

Vincetoxicum „Dodon." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 25. Ed. Hall. 1745. p. 25: g. pl. class. I.
Walt. 1788. Carol. p. 13. 104. n. 105: g. Pentandr. Digyn.
Medic. 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 404: g. Gynandriae Monadelpho-decandrodigynae. (Asclepias Vincetoxicum L.)
Mönch 1794. Meth. p. 717: g. Stigmatostemonis.
Pers. 1805. Ench. I. p. 274: sect. Cynanchi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3440 *a*; 1831. Fl. exc. p. 419. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 555. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 68.
Hedw. 1806. Gen. p. 133: g. Pentandr. Monogyn.
Endl. 1838. Gen. n. 3465. p. 591; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 545: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4954. (genuinar.)
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212; 1844 in DC. Pr. VIII. p. 523: g. Asclepiadear.

*) Dicat. Bory de St. Vincent.
**) Dicat. John Vincent, jurisconsulto Mauritiano.

Vincetoxicum Dodon. cont.
verar. (haplostemmar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 44. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 479.
Synon. Cynanchi sect. 5 R. Brown; Blyttia Arn.; Pentagonium Schauer. (Lindl.)

Viniferae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 48. t. 79: fam. plant. Gen.: Cissus, Vitis.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 892: fam. Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Vitis.
Juss. 1817. Mém. Mus. III. p. 444: ordo plant. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 220. Gen. ut St. Hil. et Botrya, Ampelopsis, Lasianthera?
DC. 1824. Pr. I. p. 627: trib. Ampelidear. (*Vid. Sarmentaceae DC.*) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 689. Gen. ut St. Hil. et Pterisanthes, Ampelopsis. — Meisn. 1837. Gen. p. 51 (36). Gen. ut Don.
Brongn. 1843. En. genr. p. 57: fam. Celastroidear. Gen.: Cissus, Ampelopsis, Vitis, Laea.

Vinka Roxb. vid. *Vinca Linn.*

Vinsonia „Gaudich." Brongn. 1843. Énum. genr. p. 15: g. Pandanear. (Nomen.)

Vintenatia Cavan. vid. *Ventenatia Cavan.*

Viticena Steud. 1841. Nomencl. II. p. 769: nomen pro *Vincentia Boj.* (nec *Gaudich.*) propositum.
= Damine Endl.

Viola Tourn. 1700. Inst. p. 419. t. 236: g. pl. class. XI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 273. Ed. Hall. 1745. p. 288: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 267. n. 679; 1737. Cliff. p. 427; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 276; 1753. Sp. II. p. 933; 1759. Syst. ed. X. p. 1238. n. 898; 1763. Sp. ed. II. p. 1323; 1764. Gen. ed. VI. p. 457. n. 1007; 1767. Syst. ed. XII. p. 584: g. Syngenes. Monogam. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 181. — Murr. 1774. Syst. p. 668; 1784. Syst. p. 802. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 808. t. 318. 319. — Reich. 1778. Gen. p. 452. n. 1092. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 326. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 597. n. 1364. — Pers. 1797. Syst. p. 844.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 500: g. Dicotyledonum Isostemônum.
Linn. 1747. Cl. plant. p. 352: g. Polypetalor. anomalor.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 146. n. 608: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 229.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Capparidum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 389: g. Geranior.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 393.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 97: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 315: g. Pentapetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 482: g. Capparear.
Scop. 1777. Intr. p. 292: g. Columniferar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 232; 1789. Phil. Bot. I. p. 78. *Cf. Ion.*
Juss. 1789. Gen. p. 294: g. Cistis aff.

Viola Tourn. cont.
Neck. 1790. El. III. p. 63. n. 1385: g. Amorphophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 139. t. 112.
Gmel. 1791. Syst. p. 412: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 40; 1818. Fl. cap. II. p. 52. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1159. n. 446; 1809. En. p. 263. — Cram. 1803. Disp. p. 56. — Rebent. 1804. Neom. p. 121. — Pers. 1805. Ench. I. p. 253. n. 582. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 147. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 11. 194. Sect.: Nomimium, Dischidium, Melanium. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 447; ed. 1832. I. p. 649.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 22: g. Cistoideis aff.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 267.
Cram. 1803. Disp. p. 12 in Diandr. Monogyn. (V. diandra.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 99: g. Cisteis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 164. n. 693.
DC. 1805. Franç. IV. p. 802; 1815. V. p. 617: g. Violacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 667. Sect.: Viola, Jacea. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 231. — A. St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 135. — Kunth 1838. Berol. I. p. 93. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 136. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 236. Sect.: Nominium, Melanium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88.
R. Brown 1818. Tuck. Cong. p. 440 (Verm. bot. Schr. I. p. 220): g. Violear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 368. — Kunth 1824. Syn. III. p. 297. — Ging. 1824 in DC. Pr. I. p. 291 (restrictum). Sect.: Nomimium, Dischidium, Chamaemelanium, Melanium, Leptidium. — D. Don 1825. Nepal. p. 205. — Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4885 (sect.: Leptidium, Nomimium, Dischidium, Jonium, Grammeionium); 1832. Fl. exc. p. 704 (sect.: Dischidium, Viola, Grammeionium); 1837. Hdb. p. 269 (genuinar.); 1841. Nom. p. 186. n. 7138; 1844. Fl. sax. p. 394 (sect.: Dischidium, Violetta, Viola, Grammeionium [1844 Grameionium]). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 284. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 191. n. 968. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 320. Sect. ut Ging. — Meisn. 1837. Gen. p. 20(18). — Endl. 1839. Gen. n. 5040. p. 909; 1841. Ench. p. 470. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 840. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 243. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 232.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 827; 1825. Syst. I. p. 796. n. 894: g. Jonidior. — Par. Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 254.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXX. 350. n. 973: g. Violar.
Link 1821. En. I. p. 239: g. Violinar.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 542: g. Campanaceis proximum.
Presl 1826. Sicul. I. p. 131: g. Violariear. Sect.: Nomimium, Melanium. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 73. Sect. eaed. et Chamaemelanium. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 31. — Koch 1836. Syn. p. 82. Ed. II. p. 88. Sect. ut Presl et Dischidium. — Webb 1836. Canar. I. p. 109. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 244. Sect. eaed. et Chamaemelanium. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 175. Sect. ex Ging. — Burgersd. 1852. Pl. Jungh. II. p. 118. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 15.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Jonidiear.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 49. t. 165. 166.
Synon. Erpetion DC.; Cittaronium Rchb.

Viola Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 501: g. Violear., emissis Chrysione, Mnemione, Lophione, Erpetione restrictum.
= Nomimium Ging.

Violaceae DC. 1805. Fl. Franç. IV. p. 801: fam. (81) Dicotyledonum. Gen.: Viola.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476 (*cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 227): fam. sine nomine indicata.
DC. 1819. Théor. élém. p. 244: ordo (15) Thalamiflorar. Gen.: Viola. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. Clav. (syncarpar.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 667: fam. Thalamiflorar. Gen.: Viola.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamunguliae. Gen. id.
Ging. 1823. Mém. soc. Genèv. II. 1. p. 1.
Lindl. 1833. Nix. p. 18: ordo Violalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 146.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 135: ordo Dicotyledonum. Gen.: Noisettia, Viola, Solea, Jonidium.

Violaceae Rchb. 1828. Consp. p. 188; 1832. Fl. exc. p. 704; 1837. Handb. p. 268; 1841. Nomencl. p. 186: fam. Cistiflorar. Divis.: Violeae, Alsodineae, Sauvageae (eorum loco 1837 et 1841 Pittosporeae).

Violaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Cistariar. Trib.: Violeae, Alsodineae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 88: fam. Violinear. Gen.: Viola, Jonidium, Schweiggeria, Alsodeia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 338: ordo Violalium. Trib.: Violeae, Alsodeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 242: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Trib. ut Dumort.

Violaeoides Michx. mss.
= Noisettia HBK.

Violales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 18: nixus Parietalium. Ord.: Violaceae, Samydeae, Moringeae, Droseraceae, Frankeniaceae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 326: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Flacourtiaceae, Lacistemaceae, Samydaceae, Passifloraceae, Malesherbiaceae, Moringaceae, Violaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae, Sauvagesiaceae, Crassulaceae, Turneraceae.

Violariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 57: fam. Adonariar. Gen.: Turnera, Tamarix,

Violariae Batsch cont.
Reseda, Salmasia, Viola, Impatiens, Qualea, Cucullaria.
Link 1831. Hdb. II. p. 267: ordo 1 Allostemonum. Gen.: Viola.

Violarieae Gingins 1824 in DC. Prodr. I. p. 287: ordo (16) Thalamiflorar. Trib.: Violeae, Alsodineae, Sauvageae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 316. Trib. ut Bartl.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valvisporar.
Bartl. 1830. Ord. p. 283: ordo (162) Cistiflorar. Trib.: Violeae, Alsodineae.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 494: fam. (85) Cistiflorar. Trib. ut Bartl.
Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18): ordo 18 plant. (p. 438 Parietalium.) Trib. ut Ging.
Endl. 1839. Gen. p. 908; 1841. Ench. p. 469: ordo (190) Parietalium. Trib. ut Bartl.
Conf. Ionidia Vent.: Violeae R. Brown; Violaceae DC.; Violinae Link.

Violeae R. Brown 1818 in Tuck. Cong. App. V. p. 440 (Verm. bot. Schr. I. p. 220): ordo plant. Gen.: Viola, Pombalia, Hybanthus, Passalia, Alsodeia, etc.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: fam. Cistiflorar. Divis.: Jonidieae, Parnassieae, Alsodineae, Sauvageseae, Drosereae.
= Violarieae Ging. etc.

Violeae „DC. mss." Gingins 1824 in DC. Prodr. I. p. 288: trib. Violariear. Gen.: Calyptrion, Noisettia, Glossarrhen, Viola, Solea, Pombalia, Pigea, Jonidium, Hybanthus. — Par. G. Don 1831. Gen. I. p. 317. Gen. ead. et Erpetion, Anchietea. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 496. Gen.: Corynostylis, Anchietea, Noisettia, Glossarrhen, Viola, Chrysion, Mnemion, Lophion, Erpetion, Jonidium, Pigea, Solea, Hybanthus. — Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18). Gen. ut Don et Spathularia. — Endl. 1839. Gen. p. 909; 1841. Ench. p. 470. Gen.: Viola, Jonidium, Noisettia, Anchietea, Schweiggeria, Corynostylis; Amphirrhox. Accedit 1850 (Spl. V. p. 44) Paypayrola.
Rchb. 1828. Consp. p. 188; 1832. Fl. exc. p. 704: div. Violacear. Gen. ut Ging. (Corynostylis et Anchietea loco Calyptryonis et Pigeae.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 268; 1841. Nom. p. 186. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Viola, Grammeionium, Dischidium, Schweiggeria, Erpetion, 1841: Viola, Cittaronium, Schweiggeria), Corynostyleae, Jonidieae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: trib. Violacear. Gen. ex DC. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 242. Gen. ead.
Bartl. 1830. Ord. p. 284: div. Violariear. Gen. ut Rchb. 1828.

Violetta Rchb. 1841. Nomencl. p. 186. n. 7138. 2; 1844. Fl. sax. p. 394: sect. Violae. (V. palustris et uliginosa.)

Violinae Link 1821. Enum. I. p. 239: ordo pl. Gen.: Viola.
= Violeae DC.

Violineae Brongn. 1843. Enum. genr. p. XXIV. 88: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Sauvagesieae, Violaceae, Droseraceae, Frankeniaceae.

Vionaea Necker 1790. Elem. bot. I. p. 107. n. 187: nov. g. Psydomorphytor., a Protea L. sejunctum.

Viorna *) Pers. 1807. Ench. II. p. 98: sect. Atragenes. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4947 *a*.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277: g. Clematidear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 268. Sect.: Euviorna, Viornium.
Rchb. 1841. Nom. p. 191. n. 7235. 2: sect. Clematidis.
Synon. Muralta Adans.: Cheiropsis DC.

Viornium Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 270: sect. Viornae. (Clematis integrifolia L.)

Viraya **) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 466. t. 89: nov. g. Inulear. (V. podolepis.)
= Leptorhynchus Less.

Virdika Adans. 1763. Fam. II. p. (19): g. Cepar.
= Albuca Linn.

Virea Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
Scop. 1777. Intr. p. 122: g. Semiflosculosar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 250.
Gmel. 1791. Syst. p. 1174: g. Syngenes. Aequal.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 365. t. 159: g. Ligulatar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 429: g. Cichoracear. Sect.: Apargiae, Vireae.
Endl. 1838. Gen. n. 2990 *a*. p. 496; 1841. Ench. p. 250: sect. Leontodontis.
Synon. Taraxaconoides Vaill.; Leontodon Juss.; Antodon Neck.; Leontodontis sp. Linn.; Apargiae sp. Willd.

Virea Vahl 1815 in Hornem. H. Hafn. p. 759: nov. g. plant. (Picris asplenioides.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 132: sect. Helminthiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3699. 2.
Synon. Vireae sp. Adans.; Deckera Schultz.

Virecta ***) Linn. f. 1781. Suppl. p. 17. n. 1366: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 197. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 125. n. 312. — Gmel. 1791. Syst. p. 334. — Pers. 1797. Syst. p. 204. — Willd. 1797. Sp. I. p. 972. n. 352.
Juss. 1789. Gen. p. 200; 1820. Mém. Mus. VI. p. 385: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 437. — Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 463. — Hedw. 1806. Gen. p. 136. n. 585. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. II. 4. n. 853. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 702. n. 763. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 270.

---

*) Nomen e gallico.
**) Dicat. Jul. Jos. Viray (ex DC. Virey), scriptori pharmac.
***) Virectum s. viretum locus herbis virentibus amoenus.

Virecta Linn. f. cont.
Vahl 1798. Eclog. II. p. 11 (biflora et pratensis).
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 610. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2057. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 31. t. 184.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: g. Disodiniae.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Hedyotidear.
= Sipanea Aubl.

Virecta DC. 1830. Prodr. IV. p. 414: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 521. — Endl. 1838. Gen. n. 3247. p. 551; 1841. Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2882.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Phyteumoides Smeathm.; Virectae sp. Smith.

Virescinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: stirps Pollinaciae. Ordines: Arcania, Urnulinia, Scutellinia.

Vireya Rafin. 1814. Specch.
= Alloplectus Mart.

Vireya *) Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 854; 1828. Fl. jav. Praef. p. VIII: nov. g. Ericear. (Azaleae et Rhododendri sp. L.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 774 (*Viereya*). — Par. Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 274.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 848: g. Rhodorear.
= Eurhododendron Endl.

Virga Hill 1769. Hort. kew. p. 75: nov. g. Aggregatar. (Dipsacus pilosus L.) *Cf. Acaenopsis Schrad., Galedragon Gray.*

Virga-Aurea Tourn. 1700. Inst. p. 483. t. 275: g. pl. class. XIV.
Vaill. 1720. Act. Ac. Paris. p. 306: g. Corymbiferar.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 181: g. pl. class. VIII.
= Solidago Linn.

Virga regia Caesalp. 1583. De plant. lib. 8. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 18.)
= Digitalis Tourn.

Virga sanguinea Dillen. 1719. Nov. gen. p. 145: nov. g. a Corno disjunctum.
= Cornus Tourn.

Virgaria Nees 1816. Syst. p. 54; 1817. Überbl. p. 14: nov. g. Mucedinum capitatar. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 276. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 342.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Botrytidum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 552: g. Aspergillidear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 36: sect. Botrytidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 115 *c.* — Endl. 1836. Gen. n. 227 *f.* p. 19; 1841. Ench. p. 14. (Praeterea ab Endl.

*) Dicat. Virey, pharmacologo Parisiensi.

Virgaria Nees. cont.
p. 19. n. 223 in synon. Sporotrichi laudatur.)
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 535: g. Botrytidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 89: g. Spondylomycetum.

Virgaria Rafin. 1831 in litt. ex DC. Prodr. V. p. 243.
= Asteris Nees spec.

Virgaria Trinius 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 247: sect. Panici. (P. obseptum Trin.) — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 64. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 263.

Virgaurea Rupp. 1718. Fl. jen. p. 169. Ed. Hall. 1745. p. 178: g. pl. class. VIII.
= Erigeron Linn.

Virgaurea DC. 1836. Prodr. V. p. 330: sect. Solidaginis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2376 *a.* p. 385; 1841. Ench. p. 235. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 197.
Synon. Solidago Nutt., Cass.

Virgilia L' Herit. . . . Diss. c. ic.
= Gaillardia Foug.

Virgilia Lamarck 1792. Illustr. t. 326.
Hedw. 1806. Gen. p. 293. n. 1167: g. Leguminosar. — Par. R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 4. (Verm. bot. Schr. II. p. 453.) — Link 1821. Enum. I. p. 401. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 348. n. 1642; 1830. Gen. I. p. 364. n. 1833. — Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 276. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1501.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 283: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 743: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 98. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4087; 1841. Nom. p. 154. n. 6038. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 111. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 162. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 179. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 1. Sejungitur Calpurnia. — Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57). Sect.: Virgilia, Calpurnia, Cladrastis. — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 87. — Endl. 1841. Gen. n. 6741. p. 1308; 1841. Ench. p. 673. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Synon. Aphora Neck.

Virgilia Burger g. Vitium, teste Bronner.

Virginia Areschoug 1853. Öfvers. Vet. Ak. Förh. X. p. 147: nov. g. Algar., Nereocysti aff. *Cf.* Flora 1855. p. 652.

Virgularia Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 92. t. 19; 1798. Syst. p. 161: nov. g. Didynam. Angiosperm.
Pers. 1807. Ench. II. p. 183. n. 1476: g. Antirrhinear.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3208: g. Caprariacear.

Virgularia Ruiz & Pav. cont.
Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 279: g. Personatar.
Mart. 1829. Nov. gen. t. 205.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5: g. Gerardiear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111.
Rchb. 1837. Gen. p. 198: g. Digitalear.
= Eugerardia Benth.

Virgularia Martius 1829. Nov. gen. III. p. 5. t. 203. 204. (nec. t. 205: *cf.* praeced.) g. Scrophularinar. emendat. *Cf.* Flora Lit. I. p. 2.
= Esterhazya Mikan.

Virola *) Aublet 1775. Guian. II. p. 904. t. 345: nov. g. Dioec. Hexandr. (V. sebifera.)
Scop. 1777. Intr. p. 340: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 81: g. Lauris aff.
Gmel. 1791. Syst. p. 570: g. Hexandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 190: g. Laurineis aff.
Vell. Fl. Flum. X. t. 30.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: g. Myristicear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 245.
Endl. 1841. Ench. p. 419. n. 4706 *a*: sect. Myristicae. — Par. A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 194.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 302: g. Myristicacear.

Virson Adans. 1763. Fam. II. p. 13: g. Fucor. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 281.
= Fucus Linn., Agdh.

Virsoon „Adans." Endl. Gen. p. 10; Ench. p. 8 et Spl. III. p. 29 in synon. Fuci: vid. *praeced.*

Viscaceae Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 803: ordo Dicotyledonum polypetalar. perigynar. Gen.: Viscum, Ginalloa.

Viscago Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 417. t. 309—317.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 373: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Mönch 1794. Meth. p. 704: g. Allagostemonis, ex Cucubali L. speciebus constitutum. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 58. p. 290.
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5363 *b*; 1832. Fl. exc. p. 823; 1841. Nom. p. 206. n. 7828. 7: sect. Silenes. — Par. Koch 1836. Syn. p. 100. Ed. II. p. 109. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 35.

Viscago Koch 1836. Syn. p. 106. Ed. II. p. 115: sect. Lychnidis.
= Viscaria Röhl.

Viscaria „Rivin." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 113. Ed. Hall. 1745. p. 126: g. pl. class. V.
Röhl. 1796. Deutschl. Fl. II. p. 37.
DC. 1805. Franç. IV. p. 761; 1824. Pr. I. p. 385: sect. Lychnidis. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 648. — Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5362 *e*; 1832. Fl. exc. p. 825. — Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 324. — Kunth 1838. Berol. I. p. 115. — A. Braun 1839. Flora p. 318.

*) Nomen Sinemariense *Virola*.

Viscaria Rivin. cont.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 414: g. Silenear. — Par. Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 122. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 166. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 206. n. 7832: g. Lychnidear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5249. p. 973; 1841. Ench. p. 506. Sect.: Hymenanthe et Eudianthe (serius in Suppl. II. exclusa). — Ledeb. 1841. Ross. I. p. 328. — A. Braun 1843. Flora p. 376. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 36. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 224.
Synon. Steris Adans; Viscago Koch; Hymenanthe Fenzl.

Viscaria Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 101: sect. Chironiae. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. 9.
= Ixochiron Griseb.

Visceae Rchb. 1841. Nomencl. p. 73: subdiv. Loranthear. Gen.: Viscum, Arceuthobium, Ginalloa, Tupeia, Antidaphne.

Viscinae Batsch 1802. Tab. affin. p. 240: fam. Polymorphar. Gen.: Loranthus, Viscum, Rhizophora.
Rchb. 1828. Consp. p. 93: sect. Loranthear. Gen.: Viscum, Arceuthobinm, Aucuba, Loranthus, Tupeia. — Par. Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 10.

Viscoideae Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 33. Ed. Voigt. 1811. p. 29: div. Caprifoliacear., an fam. propria? Gen.: Aloranthus (?), Viscum, Loranthus, Codonium, Aucuba.

Viscoides Plum. . . . .
= Vedela Adans.

Viscoides Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 73. t. 51: nov. g. Pentandr. Monogyn. (V. pendulum.)
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2031 *e*: sect. Psychotriae.
= Ronabea Aubl.

Viscum Tourn. 1700. Inst. p. 609. t. 380: g. pl. class. XX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 40. Ed. Hall. 1745. p. 42: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 284. n. 713; 1737. Cliff. p. 441: g. Monoec. Tetrandr.
Linn. 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 473. n. 859; 1753. Sp. II. p. 1023; 1759. Syst. ed. X. p. 1289. n. 979; 1763. Sp. ed. II. p. 1451; 1764. Gen. ed. VI. p. 117. n. 1105; 1767. Syst. ed. XII. p. 650: g. Dioec. Tetrandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 261. — Murr. 1774. Syst. p. 739; 1784. Syst. p. 883. — Reich. 1778. Gen. p. 514. n. 1209. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 680. n. 1504. — Pers. 1797. Syst. p. 926; 1807. Ench. II. p. 613. n. 2204. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 737. n. 1774. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 235. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 197. 277. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 763.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 162: g. ord. 3 class. III.

Viscum Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 262. n. 1085: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 694.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Algar.?
Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 528.
Hill 1769. Ht. kew. p. 420: g. Dioicear.
Scop. 1777. Intr. p. 102: g. Disparium.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 63; 1794. Prodr. I. p. 31; 1818. Fl. cap. I. p. 559: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 273. — Rebent. 1804. Neom. p. 52.
Walt. 1788. Carol. p. 51. 240. n. 388: g. Dioec. Triandr.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 131. t. 27. f. 1 (album).
Juss. 1789. Gen. p. 212: g. Caprifolior. — Par. Link 1822. En. II. p. 422.
Neck. 1790. El. III. p. 117. n. 1455: g. Daphonophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 600: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 457. — DC. 1805. Franç. IV. p. 273.
Batsch 1802. Tab. p. 240: g. Viscinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1959.
Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 33. Ed. Voigt p. 29: g. Viscoidear.
Rich. 1808. Ann. Mus. XII. p. 296: g. Loranthear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 621; 1825. Syst. I. p. 487. n. 534; 1830. Gen. I. p. 111. n. 562. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 445. — Lois. 1821. Dict. v. 20. p. 67 (*Gui*). — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 201. — Kunth 1824. Syn. III. p. 85; 1838. Berol. I. p. 293. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 666. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 203. — Link 1831. Hdb. II. p. 2. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 543.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 492: g. Loranthidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34.
D. Don 1825. Nepal. p. 142: g. Loranthacear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 277. — Endl. 1833. Norf. p. 61; 1839. Gen. n. 4584. p. 801; 1841. Ench. p. 399. Sect. (1841): Euixos, Ploinixia, Aspidixia, Baratostachys. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 402. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 378. — Koch 1836. Syn. p. 322. Ed. II. p. 354. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 357. — Meisn. 1838. Gen. p. 154 (111). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 654. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 115. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 324. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 645. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 380. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791. — J. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 426 (*Gui*). — A. Gray 1849. Mem. Amer. Ac. IV. p. . . . (Flora 1850. p. 706.) — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 4. — Molkenb. 1852. Pl. Jungh. II. p. 107. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 101. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 91.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 649: g. Dumosis proximum.
Griff. 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 71.

Viscum Tourn. cont.
Schleid. 1839 in Wiegm. Arch. Nat. V. p. 211. (De inflorescentia.)
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2710: g. Viscear.
Korth. . . . . Loranth. jav. p. 57. (Diss. sine anno.)
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 803: g. Viscacear. Sect.: Ploionuxia, Aspiduxia.

Visena Schult. vid. *seq.*

Visenia Houtt. Syst. p. 287. t. 46. f. 3.
Gmel. 1791. Syst. p. 515 (*Wisenia*): g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXVII. 736 (*Visena* *)).
Blume 1825. Bijdr. Nr. 2. p. 88: g. Byttneriacear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 29. n. 2350: g. Hermannicar. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 617.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 538: g. Dombeyacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5356. p. 1004; 1841. Ench. p. 520: g. dubium Eriolaenear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7692. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 316: g. Büttneriacear.
Synon. Aleurodendron Reinw.; Glossospermum Wall.

Visiania DC. 1844. Prodr. VIII. p. 289: nov. g. Oleinear. (a Blume 1850 [Mus. bot. Lugd. p. 312] Ligustro injunctum.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 547.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617: g. Olear.
Synon. Oleae sp. Wall.; Phillyreae sp. Roxb.

Visiania Gasparr. 1844. Nov. gen. Fic. p. 9; 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 345: nov. g. ex typo Ficus elasticae Auct.
= Urostigma Gasparr.

Vismea Schreb. vid. *Visnea Linn.*

Vismea HBK., Cham., Poir. vid. *Vismia Vell.*

Vismia **) Velloz. 1788 in Vandell. Dicc. (Flor. Lusit. p. 51. t. 3); 1796 in Röm. Script. p. 138. t. 7. f. 24: nov. g. Polyadelph. Polyandr. — Par. Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 101. t. 22; 1798. Syst. p. 183.
Pers. 1807. Ench. II. p. 86. n. 1337: g. Hypericinar.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 181 (*Vismea*): g. Hypericear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345. — Kunth 1824. Syn. III. p. 193. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 350. n. 2632; 1831. Gen. II. p. 599. n. 2957. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII. — Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 291 (*Vismea*). — Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33).
Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 34: g. Vismiear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 542. — Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5474; 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8013. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 599.
St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 325: g. Hypericinear. — Par. Cham. & Schltd. 1828.

*) „Nomen parum mutavimus, quo facilius distinguatur a Witsenia."
**) Dicat. De Vismc, mercatori Lisbonensi.

Vismia Velloz. cont.
Linnaea III. p. 115 (*Vismea*). — Bartl. 1830. Ord. p. 292.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 348; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 349: g. Visminear.
Endl. 1840. Gen. n. 5466. p. 1034; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.
Synon. Caopia Pis.; Caspia Scop.; Acrossanthes Presl.

Vismieae Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 33; 1824 in DC. Prodr. I. p. 541: trib. Hypericinear. Gen.: Haronga, Vismia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 599. Gen. unicum: Vismia.
Rchb. 1828. Consp. p. 210: subdiv. Hypericear. Gen. ut Choisy.

Vismieae Rchb. 1837. Handb. p. 308; 1841. Nomencl. p. 211: subdiv. Hypericear. ampliata. Sect.: Elodeinae (1841 Helodeae), Tridesmeae, *genuinae* (gen.: Haronga, Vismia, Psorospermum).

Vismineae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 340. 347; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 349: sect. Desmostemonear. Gen.: Vismia, Psorospermum, Haronga.

Visnaga*) „Rivin." Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 92. t. 21. f. 12: nov. g. plant. (Gingidium alterum Dod.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 307: sect. Ammios.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3670 *b*: sect. Dauci.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Seselinear.
= Ammios Tourn. pars.

Visnea**) Linn. f. 1781. Suppl. p. 36. 251: nov. g. Dodecandr. Trigyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 454. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 327. n. 833 (*Vismea*). — Gmel. 1791. Syst. p. 767. — Pers. 1797. Syst. p. 487. n. 1393; 1807. Ench. II. p. 19. n. 1191. — Willd. 1799. Sp. II. p. 926. n. 960. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 398. n. 1997. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 30.
Batsch 1802. Tab. p. 29: g. Saxifragear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 705; 1825. Syst. II. p. 465. n. 1794: g. Onagrar. (descisc.)
Link 1822. En. II. p. 7: g. Diospyrinar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3656: g. Mimusopear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 215: g. Diospyrear.
Meisn. 1839. Comm. p. 157: g. Styracinar.?
Endl. 1840. Gen. n. 5408. p. 1018; 1841. Ench. p. 530; 1850. Spl. V. p. 66: g. Ternströmiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7911: g. Mocanerear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 81 (Hook. Ic. t. 253): g. Ebenacear.?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 75: g. Ternströmiacear. — Par. Webb .... Canar. II. p. 144. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397. (?)
Synon. Mocanera Juss.

Visnea Steud. . . .
= Barbacenia Vand. (Endl. Gen. p. 173.)

*) Nomen hispanicum.
**) Dicat. dom. Visne, Lusitan.

Vissadali Adans. 1763. Fam. II. p. 145: g. Aparinium.
= Knoxia Linn. (Ad.)

Vistnu Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar. (Rheede Ht. Malab. XI. t. 64.)
= Evolvuli Linn. sp.

Vitaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 30.) 1847. Veg. kingd. p. 439: ordo Berberalium. Trib.: Viteae, Leeae.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 242: ordo Dicotyledonum. Gen.: Vitis, Ampelopsis.
= Ampelideae Kunth.

Vitalba*) Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 276: sect. Clematidis. (C. Vitalba, virginiana.)

Vitaliana**) Sesl. 1750. Epit. t. 10. f. 1: nov. g. ex typo Primulae Vitalianae L.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 400: sect. Androsaces.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343: g. Primulacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4825: g. Androsacear.
= Gregoria Duby.

Viteae Rchb. 1828. Consp. p. 145: div. Umbelliferar. Subdivis.: Hageniaceae?, Cisseae, Hederaceae.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 458: div. Araliacear. Subdivis.: Hederaceae, Cisseae.

Viteae Rchb. 1837. Handb. p. 221: subdiv. Cissear. Gen.: Cissus, Ampelopsis, Vitis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. Gen. ut Endl.
Endl. 1839. Gen. p. 796; 1841. Ench. p. 395: subordo Ampelidear. Gen.: Cissus, Vitis, Pterisanthes.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 440: trib. Vitacear. Gen. ut Endl.
Synon. Vitigineae D. Don.

Viteae Schauer in DC. Prodr. XI. p. 525: vid. *Viticeae Schauer.*

Vitellaria Gärtn. f. 1805. Fruct. III. t. 205.
= Lucuma Mol.

Vitenia Noronh. A. B. V. 67. *Cf.* Steud. Nom. II. p. 776.
Hasskarl 1844. Cat. Bogor. alt. p. 224: g. Sapindacear.
= Erioglossum Blume.

Vites Juss. 1789. Gen. p. 267: ordo 12 class. XIII. Gen.: Cissus, Vitis.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (104) Thalamiflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo Pittosporalium.
= Ampelideae Kunth.

Vitex***) Tourn. 1700. Inst. p. 603. t. 373: g. pl. class. XX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 243. Ed. Hall. 1745. p. 249: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 186. n. 516; 1737. Cliff. p. 327; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 638; 1759. Syst. ed. X. p. 1122. n. 708; 1763. Sp. ed. II. p. 890; 1764. Gen. ed. VI. p. 326. n. 790; 1767. Syst. ed. XII. p. 426: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 448. — Murr.

*) Nomen contractum ex Vitis alba.
**) Dicat. Ant. Vitaliano, scriptori saeculi XVII.
***) Nomen ex Plinio.

Vitex Tourn. cont.
1774. Syst. p. 483; 1784. Syst. p. 578. — Reich. 1778. Gen. p. 327. n. 853. — Lour. 1790. Coch. II. p. 389. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 427. n. 1060. — Gmel. 1791. Syst. p. 962. — Pers. 1797. Syst. p. 615; 1807. Ench. II. p. 143. n. 1441. — Willd. 1800. Sp. III. p. 390. n. 1206; 1809. En. p. 660. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 69.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 229. t. 109.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 182. n. 749: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 424.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 171. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 200.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 269. t. 56. f. 7 (Agnus castus).
Juss. 1789. Gen. p. 107: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 353. n. 551: g. Chasmatophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 319: g. Pyrenacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 502. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 246: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 74. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 511. Ed. Nees p. 367. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 245. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 181 (*Gatilier*). — Link 1822. En. II. p. 128. — Kunth 1823. Syn. II. p. 40. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 812. — Cham. 1832. Linnaea VII. p. 107. — Koch 1837. Syn. p. 577. Ed. II. p. 663. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 152. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 718. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 203.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 425; 1825. Syst. II. p. 756. n. 2120; 1831. Gen. II. p. 479. n. 2363: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2903; 1831. Fl. exc. p. 334.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Viticear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 447. — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 449. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 229. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4201. Sect.: Vitex, Limia. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 682; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 294. Sect.: Euagnus, Pyrostoma, Chrysomallum. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 331.
Endl. 1838. Gen. n. 3700. p. 635; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. Sect.: Agnus castus, Limia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 610. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 82. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 34 (*Gattilier*).
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 858: g. Euviticear. *Synon.* Ephialis Sol.; Mailelou Adans.?; Wilckea Scop.?; Limia Vand.; Allasia Lour.?; Wallrothia Roth; Nephrandra Cothen; Psilogyne DC.; Ephialum Wittst.

Viticastrum Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 577 (Bot. Bemerk. p. 147): nov. g. Verbenacear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 691: g. Lantanear. = Sphenodesme Jack.

Viticeae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 418: fam. 42 plant. Ord.: Myoporeae, Verbeneae.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 69. Gen. bras.: Stachytarpheta, Zapania, Petraea, Casselia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Verbenacear. Gen.: Clerodendron, Volkameria, Siphonanthus, Vitex, Holmskidia, Aegiphila, Callicarpa, Premna, Hosta, Cornutia, Tectona. — Par. Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 449: Gen. guian.: Pyrostoma, Vitex, Aegiphila, Clerodendron. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 620. Subtrib.: Symphoremeae, Caryopterideae, *Viticeae* (gen.: Pityrodia, Tectona, Premna, Petitia, Callicarpa, Aegiphila, Volkameria, Clerodendrum, Cyclonema, Oxera, Amasonia, Gmelina, Cornutia, Vitex, Holmskioldia?, Quoya?, Hemigynia?, Scleroon?). — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 185. Subtrib. eaed. — Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 277. Gen. bras.: Aegiphila, Volkameria, Amasonia, Vitex.
Link 1829. Hdb. I. p. 446: ordo (26) Hypanthar. Gen.: Clerodendron, Vitex, Callicarpa, Tectonia, Lantana, Spielmannia.
Bartl. 1830. Ord. p. 180: div. Verbenacear. Gen.: Clerodendron, Volkameria, Pyrostoma, Hilsenbergia, Wallrothia, Aegiphila, Chilianthus, Cornutia, Petitia, Callicarpa, Pityrodia, Premna, Hosta, Vitex, Congea, Holmskioldia, Chloanthes, Gmelina, Tectona; Avicennia. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 226. Gen. ead. (exclusa Holmskioldia) et Symphorema, Peronema, Caryopteris.
Rchb. 1841. Nom. p. 108: sect. Verbenear. Gen. Lantanear. Endl. 1841.

Viticella Dillen. 1719. Nov. gen. p. 165. t. 14: nov. g. herbae Gymnopolyspermae.
Mönch 1794. Meth. p. 296: g. Thalamostemonis.
DC. 1818. Syst. I. p. 160; 1824. Pr. I. p. 8: sect. Clematidis. — Par. Link 1822. En. II. p. 91. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4946*b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 9. — Koch 1836. Syn. p. 2. Ed. II. p. 2. — Endl. 1839. Gen. n. 4768*a*. p. 844; 1841. Ench. p. 434. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 4. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 297.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7236: g. Clematidear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 263.

Viticella Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 220. n. 24: nov. g. plant. = Galax Linn.

Vitices Juss. 1789. Gen. p. 106: ordo 5 class. VIII. Gen. §. 1: Clerodendrum, Volkameria, Aegiphila, Vitex, Callicarpa, Manabea, Premna, Petitia, Cornutia, Gmelina, Theka, Avicennia. §. 2: Petraea, Citharexylum, Duranta, Lippia, Lantana, Spielmannia, Taligalea, Tamonea, Verbena, Perama. §. 3. *Affinia:* Eranthemum, Selago, Hebenstretia. = Verbenaceae Juss.

Vitidaea Dumort. vid. *Vitis-Idaea Gray.*

Vitideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 48: fam. Citrariear. Gen.: Cissus, Ampelopsis, Vitis.

Vitigineae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 188: ordo pl. Gen.: Vitis.

Viti-Salix Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. tot n. Wet. I. p. ...: sect. Salicis. Subsect.: Amerina, Chamaetia.

Vitis Tourn. 1700. Inst. p. 613. t. 384: g. pl. class. XXI.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 123. Ed. Hall. 1745. p. 137: g. pl. class. V.

Linn. 1737. Gen. p. 56. n. 161; 1737. Cliff. p. 74; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 50; 1753. Sp. I. p. 202; 1759. Syst. ed. X. p. 941. n. 250; 1762. Sp. ed. II. p. 293; 1764. Gen. ed. VI. p. 112. n. 284; 1767. Syst. ed. XII. p. 184. n. 281: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 169. — Murr. 1774. Syst. p. 203; 1784. Syst. p. 244. — Reich. 1778. Gen. p. 115. n. 305. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 156. n. 396. — Lour. 1790. Coch. I. p. 155. — Gmel. 1791. Syst. p. 421. — Pers. 1797. Syst. p. 255; 1805. Ench. I. p. 252. n. 577. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1180. n. 453; 1809. En. p. 267. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 105. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 142. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 473; ed. 1832. I. p. 659. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 11. 233.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 166: g. ord. 3 class. III.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 36. n. 139: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 75.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Sarmentacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 168. — DC. 1805. Franç. IV. p. 857. — Bartl. 1830. Ord. p. 354. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 217.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Geranior.

Adans. 1763. Fam. II. p. 408: g. Capparidum.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Hederacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 519. — Batsch 1802. Tab. p. 44.

Scop. 1777. Intr. p. 325: g. Disciferar.

Walt. 1788. Carol. p. 52. 242. n. 393: g. Dioec. Pentandr. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 230.

Juss. 1789. Gen. p. 267: g. Vitium.

Neck. 1790. El. II. p. 225. n. 962: g. Eredophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 108. t. 106.

Cram. 1803. Disp. p. 39: in Tetrandr. Monogyn. (hederacea L. = Ampelopsis.)

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 49: g. Viniferar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 155. n. 663. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 892. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIII. 300. n. 945. — Link 1821. En. I. p. 235. — DC. 1824. Pr. I. p. 633. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 777. n. 848; 1830. Gen. I. p. 187. n. 947. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 118 (*Vigne*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 695. — Meisn. 1837. Gen. p. 51 (36). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 832. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88.

Vitis Tourn. cont.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 622: g. Caprifoliar.

HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 226: g. Ampelidear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 222. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 194. — Presl 1826. Sicul. I. p. 199. — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 347. — Link 1831. Hdb. II. p. 216. — Koch 1836. Syn. p. 137. Ed. II. p. 150. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 458. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 312. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 153. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 323. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 221. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 391.

Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3792; 1832. Fl. exc. p. 485: g. Cissear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: g. Vitidear.

Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 130: sect. Vitis. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 244.

Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 143. n. 5570: g. Vitear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4567. p. 797; 1841. Ench. p. 395. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 440.

Vitis D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 188: g. Vitiginear., injuncto Cisso ampliat.

Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 124: g. Ampelidear. Sect.: Cissus, Vitis.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 242: g. Vitacear. Sect. ead.

Vitis-Idaea Tourn. 1700. Inst. p. 607. t. 377: g. pl. class. XX.

Mönch 1794. Meth. p. 47: g. Thalamostemonis.

= Vaccinium Adans.

Vitis-Idaea Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 405: g. Vacciniear. restrictum.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29 (*Vitidaea*): g. Vaccinidear.

Koch 1837. Syn. p. 474. Ed. II. p. 545: sect. Vaccinii. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 528. — Simil. A. Gray 1846. Mem. Am. Ac. n. ser. III. p. .... — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 423. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 62. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1100. — Math. 1853. Belg. I. p. 333.

Vitmannia *) Vahl 1794. Symb. III. p. 51. t. 60: nov. g. pro *Samandura L.* propositum.

Willd. 1799. Sp. II. p. 320. n. 735: g. Octandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 412. n. 925. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 464.

Hedw. 1806. Gen. p. 266. n. 1071: g. Onagrear.?

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 786: g. Mesuëar.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 214. n. 1430: g. Malpighiear.? — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1270 (*Vittmannia*).

Spreng. 1830. Gen. I. p. 305. n. 1559: g. Simarubear.

= Samadera Gärtn. (*Cf.* DC. Pr. I. p. 592: *Niota.*)

*) Dicat. F. Vitmann, professori Mediolanensi.

Vitmannia Turra. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 296. An *Vittmannia?*
= Oxybaphus L'Her.

Vitmannia Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 166: g. Rhamnear., pro *Willemetia Brongn.* propositum. — Par. Wight 1841. Ic. pl. Ind. II. 2. p. 6 (*Vittmania*). t. 490.
= Noltea Rchb.

Vittaclinia A. Cunn. vid. *seq.*

Vittadenia Steud. vid. *seq.*

Vittadina Schultz Bip. vid. *seq.*

Vittadinia *) A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 250: nov. g. Asterear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)
DC. 1836. Pr. V. p. 280: g. Erigerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2327. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (127). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep II. p. 951 (*Vittadina*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 127 (sph. *Vittaclinia*): g. Asteroidear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 779 (*Vittadenia*).
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3270: g. Erigeronear.
Synon. Brachycomes sp. Gaudich.

Vittadinia F. Müll. mss.
= Eurybiae sect. Argophyllaea DC.

Vittadinion Zobel 1854 in Corda Icon. Fung. VI. p. 54: g. Tuberaceor., p. 75 subg. Tuberis. (T. excavatum Vitt.)

Vittaria Smith 1791. Mem. Ac. Torin. V. p. 413; 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 54; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 101: nov. g. Filicum. — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 301. — Swartz 1799 in Neue Schr. nat. Fr. Berl. II. p. 129; 1800 in Schrad. Journ. II. p. 5. 71 (annulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 109. (gyratar.) — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 261. — Willd. 1810. Sp. V. p. 404. n. 1971. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 252. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 67. n. 3252; 1831. Gen. II. p. 722. n. 3645. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 292. — Leman 1829. Dict. v. 58. p. 297.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 38: g. Cathetogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 30: g. Gyrator.
R. Brown 1810. Prodr. I. 153. Ed. Nees p. 9: g. Polypodiacear. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 192. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 58. — D. Don 1825. Nepal. p. 15. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 198. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Endl. 1833. Norf. p. 12. — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 76.
Gaudich 1826. Freyc. voy. Bot. p. 381: g. Schizolomear.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 694: g. Pteroidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Asplenicar.

Vittaria Smith cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Endl. 1836. Gen. n. 626. p. 61; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 400; 1842. ibid. IV. p. 67. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1014. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 259. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 23.
Presl 1836. Pterid. p. 165: g. Vittariacear. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 116. — Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 431.
Meisn. 1843. Gen. p. 431 (332): g. Pterídear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: g. Taenitidear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 85: g. Vittariear. (includens Taeniopsidem Sm. et Taeniopteridem Hook.) Sect.: Taeniopsis, Euvittaria.
C. Müll. 1854. Bot. Zeit. p. 545. Sect.: Runcinaria, Aristaria, Parenchymaria.
Synon. Taeniopsis J. Smith?; Haplopteris Presl.

Vittaria Dochnahl 1855. Obstk. I. p. 215: g. Malorum. (*Streifling.*)

Vittariaceae Presl 1836. Pterid. p. 164: trib. Gymnosorear. Gen.: Vittaria, Prosaptia.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 116: subordo Polypodiacear. Gen.: Vittaria.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 431: trib. Polypodiacear. Gen. id.

Vittarieae Fée 1852. Gen. Fil. p. 84: trib. Cathetogyratar. Gen.: Vittaria, Diblemma?, Pteropsis, Cuspidaria, Schizolepton, Taenitis, Lomagramma, Jenkinsia, Nevrodium, Drymoglossum.

Vittellaria „Gärtn." Endl. Gen. p. 741 in synon. Lucumae: vid. *Vitellaria Gärtn.*

Vitteria „Swartz" Reuss 1802. Rep. comm. II. p. 203: vid. *Vittaria Smith.*

Vittmania Wight vid. *seq.*

Vittmannia „W. & A." Endl. Gen. p. 1098 in synon. Nolteae: vid. *Vitmannia Wight & Arn.*

Vittmannia „Vahl" Endl. (in synon. Samaderae), Dietr. vid. *Vitmannia Vahl.*

Vittmannia Turra (ex Endl. Gen. p. 311): vid. *Vitmannia Turra.*

Vivianeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 203: subdiv. Oxalear. Gen.: Caesarea, Viviania.

Viviania *) Cavan. 1804. Anal. cienc. nat. VII. p. 212.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 686: g. Meliear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 331. n. 1616; 1830. Gen. I. p. 356. n. 1799: g. Decandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1471.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5594: inter genera vix cognita.
D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. VIII. p. 170: g. Caryophyllear., Mollugini aff.

*) Dicat. C. Vittadini, mycologo Mediolanensi.

*) Dicat. Domin. Viviani, prof. Genuensi.

Viviania Cavan. cont.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 418: g. Silenear.
Hook. & Arn. 1833. Bot. Misc. III. p. 148: nomen admittunt pro *Macraea Lindl.*
Klotzsch 1835. Linnaea X. p. 434: g. Vivianiacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 365.
Endl. 1840. Gen. n. 6053. p. 1170; 1841. Ench. p. 662: g. Vivianiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7725: g. Vivianear.
Synon. Macraea Lindl.; Xeropetalon Hook.; Clethra Bert. (Steud.)

Viviania Rafin. 1814. Specch. I. p. 117.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Pyrenidiae.
= Guettardae sect. Laugeria. (Endl. Gen. p. 541.)

Viviania Raddi 1822. Crypt. bras. in Mem. di Modena XIX. p. 42.
= Symphyogynes sp. (Nees Syn. Hepat. p. 482).

Viviania Colla 1825. Ann. soc. Linn. Par. IV. p. 25: nov. g. Rubiacear. *Cf.* Linnaea I. p. 316; IV. Litt. p. 54.
= Melanopsidium Cels.

Viviania Willd. herb.
= Andromachiae sect. Pleionactis DC.

Vivianiaceae Klotzsch 1835. Linnaea X. p. 433: fam. Geraniaceis aff. Gen.: Viviania, Caesarea, Cissarobryon, Linostigma.
Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42): ordo Geranioidear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 365: ordo Malvalium. Gen. ead.

Vivianieae Endl. 1840. Gen. p. 1169; 1841. Ench. p. 522: fam. Gruinalium, Geraniaceis aff. Gen. Vivianacear. Klotzsch.

Vlamingia *) De Vriese 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 398: nov. g. Lobeliear. (V. australasica.) — Par. Walp. 1847. Rep. II. p. 380.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.
= Pigea DC.

Vleckia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170 (N. York med. repos. II. Hexad. V. p. 350): nov. g. pro Hyssopo nepetoide L. propositum.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2866; 1841. Nom. p. 105. n. 4086: g. Nepetear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165.
= Lophanthi sect. Chiastandra Benth.

Voacanga **) Petit-Thouars 1809. Nov. gen. madag. n. 32 in Römer Collect. bot. p. 203: nov. g. Apocinear.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXVIII. 439. n. 762: g. Apocynear. — Par. Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 303.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3558: g. Rauwolfiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 205.
E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 189: g. Plumeriear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3397. p. 581; 1841. Ench. p. 294. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 691. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172).
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 92: g. Tabernaemontanear. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 357 (sejuncta Piptolaena).
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5176: g. Vincear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.?

Voandzeia *) Petit-Thouars 1809. Nov. gen. madag. n. 77 in Römer Collect. bot. p. 213: nov. g. Leguminosar. (Glycine subterranea L.)
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. II. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66). — Benth. 1839. Linn. Trans. XVIII. 2. p. 158. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5785.
DC. 1825. Pr. II. p. 474: g. Geoffrear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 424.
Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4097: g. Geoffroyear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 415. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 134.
Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 531: g. Hedysarear.
Endl. 1841. Gen. n. 6684. p. 1298; 1841. Ench. p. 672: g. Euphaseolear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 175.
Synon.. Cryptolobus Spreng.; Foandseia Hassk.; Arachis sp. Burm.

Voandzou Flacourt 1661. Madag. p. 118.
= Voandzeia Pet.-Thouars.

Vocasan „Ad." Endl. in synon. Helianthi: vid. *Vosacan Adans.*

Vochisia Juss. 1789. Gen. p. 424: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 4. 343.
St. Hil. 1820. Mém. Mus. VI. p. 266: g. Vochisiear. — Par. Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 308.
Synon. Vochy Aubl.; Vochya Vand.; Salmonia Neck.; Cucullaria Schreb.; Struckeria Fl. Flum.; Vochysia Mart.

Vochisieae A. St. Hilaire 1820. Mém. Mus. VI. p. 253. 265 (1822. ibid. IX. p. 340 adnot.): novus ordo plant. Gen.: Qualea, Vochisia, Salvertia. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 309.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: ordo Centrisporar.

Vochy *) Aublet 1775. Guian. I. p. 18. t. 6: nov. g. Diandr. Monogyn. (V. guianensis.)
= Vochisia Juss.

Vochya Vandell. 1796 in Römer Script. t. 6. f. 1 (in textu p. 96 Thalia geniculata).
= Vochisia Juss.

Vochyaceae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (127) Calyciflorar. syncarpar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 87; 1847. Veg. kd. p. 379: ordo Sapindalium. Gen. Vochysiacear. Endl.
Conf. Vochisieae St. Hil.; Vochysiaceae Mart.

---

*) Dicat. navarcho Will. de Vlaming.
**) Nomen vernaculum.

*) *Voandzou* Madagascariensium.
**) Nomen caribaeum.

Vochysarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: ordo Calypetalar. Fam.: Vochysiaceae, Tropaeolineae.

Vochysia Mart. & Zuccar. 1824. Nov. gen. I. p. 139. t. 83—92: g. Vochysiacear. — Par. Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 18. t. 111—120. — Link 1831. Hdb. II. p. 61. — Endl. 1840. Gen. n. 6071. p. 1178; 1841. Ench. p. 630. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 262.

DC. 1828. Pr. III. p. 26: g. Vochysiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4508; 1841. Nom. p. 171. n. 6591. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 321. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 669. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 321. — Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 22.

Lindl. 1836. Nat. syst. p. 87; 1847. Veg. kd. p. 380: g. Vochyacear.

Bongard 1836. Mém. Ac. Pet. Bot. 6e sér. III. p. 5. t. 3. 4.

= Vochisia Juss.

Vochysiaceae Martius & Zuccar. 1824. Nov. gen. I. p. 123. Gen.: Callisthene, Amphilochia, Qualea, Erisma, Vochysia, Salvertia.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: fam. Vochysariear. Trib.: Vochysieae, Erismaceae.

Link 1831. Hdb. II. p. 60: ordo 20 Perigynar. Gen.: Vochysia.

Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Aceralium.

Mart. 1835. Consp. p. . . .: fam. Malpighinar.

Endl. 1840. Gen. p. 1177; 1841. Ench. p. 629: ordo (260) Calyciflorar. Gen.: Callisthene, Amphilochia, Qualea, Schuechia, Vochysia, Salvertia; Erisma, Lozania. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 68. Gen. ead.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 261: fam. Dicotyledonear. polypetalar. Trib.: Vochysieae, Erismeae.

Conf. Vochysianae Juss.; Vochisieae St. Hil.; Vochysieae Meyer; Vochyaceae Lindl.

Vochysianae Juss. herbar.

= Vochysiaceae Mart.

Vochysieae E. Meyer . . . . Nov. Act. Leop. XI. p. 812.

DC. 1828. Pr. III. p. 25: ordo (69) Calyciflorar. Gen. §. 1: Callisthene, Amphilochia, Vochysia, Salvertia, Qualea. §. 2: Erisma, Lozania?, Agardhia?, Schweiggeria? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 320. Gen. ead. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 668. Gen. ead.

Rchb. 1828. Consp. p. 170: subdiv. Myrobalanear. Gen. ut DC. et Lopezia, Circaea, Rumphia?

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: trib. Vochysiacear. Gen.: Vochysia, Qualea, Callisthene. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 262. Gen. ut DC. et Schuechia.

Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 318: fam. Calyciflorar. Gen. ut DC.

Rchb. 1837. Hdb. p. 248: div. Lythrariear. Gen. ut 1828 emissis Lozania et Circaea.

Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85): ordo 78 plant. (p. 440 Calycanthemar.) Gen. ut DC. exclusa Schweiggeria.

Vochysieae E. Meyer cont.

Rchb. 1841. Nom. p. 171: sect. Lopeziear. Gen. Vochysiacear. Endl.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 87: fam. Aesculinear.

Conf. Vochysiaceae Mart.

Völckeria Klotzsch & Karsten 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 66. n. 5411/₁: nov. g. Ternströmiear.

Vogelia Gmel. 1791. Syst. p. 107: g. Triandr. Monogyn.

= Burmannia Linn.

Vogelia Lamarck 1792. Illustr. t. 149.

Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 474: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 120. n. 524.

Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 482: g. Plumbaginear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 382; 1825. Syst. I. p. 537. n. 574; 1830. Gen. I. p. 121. n. 603. — Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 312. — Bartl. 1830. Ord. p. 127. — Endl. 1838. Gen. n. 2176. p. 349. 1841. Ench. p. 224. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 591. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 343. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 641.

Röm. &. Schult. 1819. Syst. IV. p. II. 3. n. 615: g. Nyctaginear., aut Plumbaginear.?

Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1927; 1841. Nom. p. 123. n. 4787: g. Dentellariear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Plumbagear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 315 (227). — Boiss. 1848 in DC. Pr. XII. p. 695.

Vogelia Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 32; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 38. nov. g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen*: Myagrum paniculatum L.)

GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 419. 471: g. Tetradynamiae. (Pericarpiferar.)

= Neslia Desv.

Voglera *) Gärtn., Meyer & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 480. 500: nov. g. Monadelph. Decandr. (Genista germanica L.)

Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4030 *b*: sect. Genistae.

Spach 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 257: sect. Spartocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 470.

Vohiria Juss. 1789. Gen. p. 141: g. Gentianar.

Pers. 1805. Ench. I. p. 283. n. 634: g. Gentianear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 96. n. 436. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVI. 175. n. 663. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346. — Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 313. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 199. (verar.)

Hook. Bot. Misc. I. p. 46.

Endl. 1838. Gen. n 3540 *a*. p. 602; 1841. Ench. p. 302: sect. Voyrae.

= Voyria Aubl.

Voigtia Roth 1790 in Usteri Mag. X. p. 17.

DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 245: sect. Andryalae.

Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3741: g. Rodigiear.

= Rothia Schreb. (Endl. Gen. p. 501.)

*) Dicat. J. W. Vogler.

Voigtia *) Spreng. 1826. Syst. III. p. 367. n. 2914; 1831. Gen. II. p. 648. n. 3270: g. Compositar. desciscent. (*Turpinia Bonpl.*)
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2189: g. Eupatorinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 135: g. Vernoniear.
= Fulcaldea Poir.

Voigtia Klotzsch 1846 in Hayne Arzneigew. XIV. adnot. ad tab. 15.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 69: g. Eucinchonear.

Voitia **) Hornschuch 1818. De Voitia et Systylio p. 5; 1819. Flora I. p. 83: nov. g. Muscor. (V. nivalis.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 317. — Par. Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 87. t. 101. 126. — R. Brown 1824. Parry's voy. App. XI. p. CCCIII. (Verm. bot. Schr. I. p. 451). — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 142. n. 3285; 1831. Gen. II. p. 726. n. 3680. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 90. (astomor.)
Agdh. 1821. Aphor. p. 107: g. Astomar.
Grev. & Arn. 1822. Mem. Wern. Soc. IV. 1. p. 145: g. Phascoidear. — Par. Arn. 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 219. — Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58.
Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 79: g. Acrocarpor. astomor. — Par. Brid. 1826. Bryol. I. p. 54. (1827. ibid. II. p. XLII Phascoideis aff.)
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 583: g. Phasceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Phascear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 97. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XIII. p. 263.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 19: g. Astomor.
Bruch & Schimp. 1834. Bryol. eur. Fasc. I: g. Phascacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 85.
Endl. 1836. Gen. n. 482. p. 47; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 857: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 102: g. Voitiacear.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 34: g. Ephemerear.

Voitia Moug. & Nestl. . . . . Crypt. voges. f. 8.
= Bruchia Schwägr.

Voitiaceae C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 102: trib. Cleistocarpor. Gen.: Voitia.

Volckameria Linn. Syst. ed. II. p. 26: sphalm. pro *Volkameria*.

Volema Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 3: g. Pyror. (*Faustbirne.*)

Volkamera Rchb. vid. *seq.*

Volkameria ***) Linn. 1737. Gen. p. 347. n. 872; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 181; 1753. Sp. II. p. 637; 1759. Syst. ed. X. p. 1122. n. 706; 1763. Sp. ed. II. p. 889; 1764. Gen. ed. VI. p. 325. n. 788; 1767. Syst. ed. XII. p. 425: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 483; 1784. Syst. p. 577. — Reich. 1778. Gen. p. 327. n. 851. — Lour. 1790. Coch. II. p. 388. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 425. n. 1056. — Gmel. 1791. Syst. p. 961. — Pers. 1797. Syst. p. 614; 1807. Ench. II. p. 144. n. 1445. — Willd. 1800. Sp. III. p. 383. n. 1201; 1809. En. p. 658. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 58.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 169. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar.
Gled. 1764. Syst. p. 182. n. 748: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 180.
Hill 1769. Ht. kew. p. 276: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 267. t. 56. f. 3 (aculeata).
Juss. 1789. Gen. p. 107: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 384. n. 597: g. Plasyrgophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 317: g. Pyrenacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 246: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 74. — Link 1822. En. II. p. 127. — Poir. 1829. Dict. v. 58. p. 446. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 275.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 760. n. 2124: g. Verbenear. (serius [Gen. II.] Clerodendro insertum.) — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 994. 1097; 1828. Consp. p. 117. n. 2933 (*Volkamera*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Viticear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 226. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4208. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 656; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 290.
Endl. 1836. Gen. n. 3707. p. 636; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (200). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 99.
Synon. Douglassia Adans.; Duglassia Houst.

Volkameria P. Browne 1756. Jamaic. p. 214. t. 21. f. 1: nov. g. Enneandr. Monogyn.
= Clethra Gärtn.

Volkameria Burm. 1768. Prodr. p. 17.
= Eucapparis DC.

Volkmannia Jacq. 1798. Hort. Schönbr. III. t. 338.
= Clerodendrum R. Brown. (Schauer.)

Volkmannia *) Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXIX: nov. g. Najadear. foss. (V. distachya et polystachya.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 343.

*) Dicat. Fried. Sig. Voigt, prof. Jenensi.
**) Nomen in memoriam Dr. Voit, Suevofurtensis,
***) Dicat. Joh. Christ. Volkamer, botanico Norimberg.

*) In honorem auctoris Silesiae subterraneae.

Volkmannia Sternb. cont.
Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 157: g. pl. foss. incertae classis.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 111: g. Najadum foss.
Presl 1838. Verh. Ges. vat. Mus. Böhm. p. 26.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 52: g. Equisetoiditum.
Unger 1844. Bot. Zeit. p. 181; 1845. Syn. pl. foss. p. 30; 1846. Chlor. prot. p. XXXII: g. Asterophyllitar.

Voltzia Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 112; 1828. Ann. sc. nat. XV. p. . . (Isis 1834. p. 1039); 1828. Prodr. p. 108: g. foss. Coniferar. — Par. Lindl. . . . . Foss. Fl. t. 195. — Endl. 1837. Gen. n. 1811. p. 263; 1841. Ench. p. 147.
Endl. 1842. Spl. II. p. 27. n. $1806/_1$: g. Abietinar. foss.
Schimp. & Moug. 1844. Pl. foss. Vosg. p. 21. t. 6—15.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 202; 1846. Chlor. prot. p. LXXV: g. Abietinear.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 279; 1847. Gen. Spl. IV. p. 12. n. $1816/_{17}$: g. Cupressinear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 123.

Volubilaria Lamx. 1824. Dict. class. V. p. 387.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 490 *c*: sect. Rhodomelae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Sphaerococcear.
Mont. 1846. Fl. Alg. I. p. 77; 1849 in Orb. Dict. X. p. 55; 1849. ibid. XIII. p. 275: g. Rhodomelear..
Math. 1853. Belg. II. p. 481: g. Floridear.
= Dictyomenia Grev. (Endl. Spl. III. p. 47.)

Volutarella Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 36. 39; 1827. v. 50. p. 247; 1829. v. 58. p. 452; 1830. v. 60. p. 571: g. Chryseidear. (Centaurea Lippii L.), antea Auctori *Volutaria.* — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11.
= Cyanopsis DC. pars.

Volutaria Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 200; 1817. Dict. v. 7. p. 377: nov. g. Centauriear. (Centaurea Lippii L.) *Cf. Volutarella Cass.*
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2696: g. Centaurear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 559: subsect. Cyanopsidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2865 *A β* 3. p. 471; 1841. Ench. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3649. 1. *b. c.*

Volutella Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 84: nov. g. Enneandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 652.
Scop. 1777. Intr. p. 230: g. Nomadear.
= Cassyta Linn.

Volutella Tode 1790. Meckl. I. p. 28. t. 5. f. 43: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 482. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1459.

Volutella Tode cont.
Pers. 1797. Tent. p. 61: g. Lytothecii.
Fries 1825. Pl. homon. p. 86: g. Clavicularium. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 425. p. 37 („Fries Syst. II. p. 173", ubi *Volutella Tode,* genus inquirendum, inter Dermeas); 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 443. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 339.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 311: g. Claviculator.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 466: g. Tubercularinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 206. p. 18; 1841. Ench. p. 13.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 519: g. Hymenomycetum angiosporor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 36; 1842. Mycol. p. 152: g. Pezizear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 363: g. Dermateor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Myrothecieor.?
Bail 1858. Syst. p. 64. t. 20: g. Pezizeor.
Synon. Atractii et Fusarii sp. Link; Tuberculariae sp. Alb. & Schw.

Volutellaria Endl. 1836. Gen. n. 130 *A d α.* p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Hymenoscyphi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 1. *d. a.*

Volva Adans. 1763. Fam. II. p. 12: g. Fungor. (Fungus Mich. t. 76. f. 1. 2. Elvela Ciceronis.)
= . . .?

Volvales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 28: nixus Polycarpar. Ord.: Cuscuteae, Convolvulaceae, Polemoniaceae, Hydroleaceae.

Volvaria DC. 1805. Fl. Franç. II. p. 373: nov. g. Lichenum. (Lichen clausus Hoffm.) *Cf.* Léon Dufour 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 189.
= Gyalecta Achar.? et Thelotrema Achar.

Volvaria Fries 1821. Syst. myc. I. p. 277: trib. Pratellae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 74: subsect. Pratelli. — Par. Rchb. 1818. Consp. p. 14. n. 349. *B f.* — Math. 1853. Belg. II. p. 355.
Endl. 1836. Gen. n. 453 III *f.* p. 40; 1841. Ench. p. 22: subsect. Pratellae.
Fries 1836. Epicr. p. 138; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 285: subg. Hyporhodii. — Simil. Bail 1858. Syst. p. 39. t. 37.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 5. *a*: subsect. Plutei. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 512.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Volvarieae Arnold 1858. Flora I. p. 329: trib. Urceolariacear. Gen.: Phlyctis, Urceolaria.

Volvocineae Cohn 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 323: fam. Algar. Gen.: Chlamydomonas, Gonium, Eudorina; Chlamydococcus, Stephanosphaera.

Volvox O. F. Müll. 1773. Hist. verm. I. 1. p. 28: g. Infusorior. (V. globator.) *Cf.* Blainv. 1829. Dict. v. 58. p. 486.
? = Volvocineae Cohn.

Volvulus Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 42: nov. g. ex typo Convolvuli sepium. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 211; 1789. Phil. Bot. I. p. 60.
= Calystegia R. Brown.

Volvycium Rafin. (1808. N. York med. repos. II. Hex. V. p. 356) 1808 in Desv. Journ. bot. I. p. 222: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 489 et Endl. Gen. p. 31.

Vonckhout Sterbeeck 1675. Theatr. fung. p. 262. n. 128: g. Fungor.
= Daedalea Pers. (Endl. Gen. p. 39.)

Vonkhout Wittstein Etym. Handw. p. 927: vid. *praeced.*

Vormia Adans. 1763. Fam. II. p. 284: g. Thymelaear.
= Selago Linn.

Vorstia Adans. 1763. Fam. II. p. (23): g. Cistor.
= Thryallis Linn.

Vorticella (pyraria) Müll. 1773. Verm. hist. I. p. 126: species generis Vermium.
= Gomphonematis Agdh. sp.

Vosacan Adans. 1763. Fam. II. p. 130: g. Bidentum.
= Helianthus Linn.

Vossia Adans. 1763. Fam. II. p. 243: g. Portulacar. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 58. p. 498.
= Mesembryanthemi Linn. pars.

Vossia Wall. & Griff. 1836. Journ. As. soc. Bengal. V. p. 572: nov. g. Graminear. (Ischaemum cuspidatum Roxb.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 373.
Endl. 1841. Spl. I. n. 925/1. p. 1354; 1841. Ench. p. 60: g. Rottbölliacear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Steud. 1854. Glum. I. p. 359.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1363: g. Rottbölliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Rottböllear.

Votomita *) Aublet 1775. Guian. I. p. 90. t. 35: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (V. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 278.
Scop. 1777. Intr. p. 107. n. 278: g. Strictar.
Juss. 1789. Gen. p. 382: g. Rhamnis aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 274: g. Rhamneis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 69. 376: g. Rhamnear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 64 (*Glossoma*).
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4318: g. Talinear.?
DC. 1830. Pr. IV. p. 275: g. Cornear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 401. — Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 143. n. 5568 (dubium). — Meisn. 1838.

*) Nomen caribaeum *Votomit.*

Votomita Aublet cont.
Gen. p. 153 (110)? — Endl. 1839. Gen. n. 4580. p. 799; 1841. Ench. p. 397.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 88: g. Cornacear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 783.
Synon. Glossoma Schreb.; Guilleminia Neck.

Vouacapoua *) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 9. t. 373: nov. g. flore incognito. (V. americana.)
= Andira Lam. (DC. Pr. II. p. 475.)

Vouapa **) Aublet 1775. Guian. I. p. 25. t. 7. 8: nov. g. Triandr. Monogyn. (V. bifolia, Simira.)
Juss. 1789. Gen. p. 350: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 209 (*Vuapa*).
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 511: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 457. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4112: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 120. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Amherstiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Endl. 1841. Gen. n. 6803 *b.* p. 1320; 1841. Ench. p. 674: sect. Macrolobii.
Synon. Krügeria Scop.; Macrolobium Vahl.

Vouarana ***) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 12. t. 374: nov. g. pl. flore incognito. (V. guianensis.)
= Crudya DC. (DC. Pr. II. p. 519 et Endl.) et = Cupania Plum. (Endl. gen. p. 1070.)

Vouay Aublet 1775. Guian. II. App. p. 99: g. Palmar.
= Geonoma Mart. (Endl. Spl. II. p. 24.)

Voucapoua „Aubl." Endl. in synon. Lumbricidiae: vid. *Vouacapoua Aubl.*

Voyara †) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 26. t. 383: nov. g. flore incognito. (V. montana.)

Voyra Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3495: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3540. p. 602; 1841. Ench. p. 302. Sect.: Vohiria, Leiphaimos.
Bartl. 1830. Ord. p. 200: g. Gentianear. — Par. Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 33. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1837. Hdb. p.211; 1841. Nom. p. 132. n. 5111: g. Erythraeariar. Sect.: Voyra, Leiphaimos.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 206: g. Lisyanthear. Sect.: Leiphaimos, Lita. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
= Voyria Aubl.

*) Nomen caribaeum *Voicapou.*
**) Nomen caribaeum.
***) Nomen caribaeum *Vouarana.*
†) Nomeu caribaeum *Vouayara.*

Voyria *) Aublet 1775. Guian. I. p. 208. t. 83: nov. g. Pentandr. Monogyn. (V. rosea et coerulea.) *Cf.* Benth. in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 195. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 334.
Scop. 1777. Intr. p. 188: g. Speciosar.
Splitg. 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 129. Revisio specierum.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 83: g. Lisianthear. Sect.: Lita, Leiphaimos, Leianthostemon, Pneumonanthopsis.
Synon. Vohiria Juss.; Lita Schreb.; Humboldtia Neck.; Voyra Rchb.; Leiphaimos Schltd. & Cham.; Gentianae sp. Jacq.; Exaci sp. Willd.

Voyria Miquel. 1850. Stirp. sel. Surinam. p. 146: g. restrict. Gentianear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 84.
= Lita Schreb.

Voyriella Miquel 1850. Stirp. sel. Surinam. p. 146: nov. g. Gentianear. (V. parviflora.) *Cf.* Benth. in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 195.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 82: g. Lisianthear.

Vriesea **) Hasskarl 1842. Flora Beibl. II. p. 27: g. pro *Lindernia R. Brown* constitutum.
= Ilyogeton Endl.

Vriesea Beer Fam. Bromel. p. 21. 91: vid. *Vriesia Lindl.*

Vrieseae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 9. 19. 21: div. Lepidanthear. Gen.: Vriesea.

Vriesia Lindl. 1843. Bot. Regist. t. 10; 1847. Veg. kingd. p. 148: nov. g. Bromeliacear. (Tillandsia psittacina.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 332. — Par. Gaudich..... Voy. Bonite t. 65—70. — Walp. 1850. Ann. bot. III. p. 622. (Bot. Mag. t. 4382.)
Beer 1857. Fam. Bromel. p. 21. 91 (*Vriesea*): g. Vriesear.

Vriesia Benth. in DC. Prodr. X. p. 412 in synon. Vandelliae: vid. *Vriesea Hassk.*

Vrisia Endl. Gen. Suppl. III. p. 79 in synon. Ilyogetonis: vid. *praeced.*

Vrolichia Benth. in DC. Prodr. X. p. 201 in synon. Heteranthiae: vid. *seq.*

Vrolickia Endl. Gen. p. 684 (sub Heteranthia) vid. *seq.*

Vrolikia ***) Spreng. 1826. Syst. III. p. 149. 157. n. 2476: g. Primulear.? An Polygalear.? *Cf.* Steud. Nom. II. p. 780 (*Vrolickia*).
= Heteranthia Nees.

Vrydagzynea Blume .... Fl. jav. p. 60: nov. g. ...
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 726: sect. Hetaeriae.

*) *Voyria* nomen vernaculum inter Gariponenses.
**) Dicat. De Vriese, prof. Amstelodam.
***) Dicat. Gerh. Vrolick, prof. Amstelodam.

Vuapa St. Hil. vid. *Vouapa Aubl.*

Vulfenia Leman vid. *Wulfenia Jacq.*

Vulneraria Tourn. 1700. Inst. p. 391. t. 211: g. pl. class. X.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 569: g. Leguminosar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar. (Anthyllis tetraphylla et Vulneraria L.)
Scop. 1772. Carn. II. p. 55: g. Diadelph. Decandr.
Mönch 1794. Meth. p. 146: g. Thalamostemonis.
DC. 1825. Pr. II. p. 169 (Lég. mém. VI): sect. Anthyllidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4025 *b*; 1832. Fl. exc. p. 515. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 165. — Kunth 1838. Berol. I. p. 221. — Endl. 1840. Gen. n. 6506 *a*. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 13. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 379.
Link 1831. Hdb. II. p. 194: g. Galegoidear.

Vulnerarieae (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 378: subtrib. Lotear. Gen.: Anthyllis, Hymenocarpus.
Conf. Anthyllideae Koch.

Vulpia *) Gmel. 1805. Fl. Badens. I. p. 1. 8: nov. g. (Graminear.) Monandr. Digyn. (Festuca Myurus L.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 123: g. Bromear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1411. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 166; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 107.
Link 1827. Hort. I. p. 146; 1829. Hdb. I. p. 58: g. Festucacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1000; 1830. Fl. exc. p. 37. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 185; 1850 in Webb Canar. III. p. 415. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 564.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 144: sect. Festucae. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 273. — Endl. 1837. Gen. n. 899 *c*. p. 101; 1841. Ench. p. 59. — Koch 1837. Syn. p. 810. Ed. II. p. 936. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 431; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 349. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 409. — Steud. 1854. Glum. I. p. 303.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 35: g. Festucear.
Synon. Mygalurus Link.

Vyenomus **) Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 462: nov. g. inter Evonymum et Lophopetalum intermedium. (Evonymus pendula Wall.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 188: g. Celastrinear.

*) Dicat. Vulpio, pharmacopoeo Pforzhemiensi.
**) Anagramma nominis Evonymus.

W.

Wachelia Endl., Rchb. vid. *Vachellia Wight. & Arn.*

Wachendorfeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 205: trib. Liliacear. Gen.: Hagenbachia, Xiphidium, Wachendorfia, Schiekia, Lophiola.

Wachendorffia Necker vid. *seq.*

Wachendorfia *) Burmann 1757. Wachendorfia, Amstel. fol.

Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 864. 1359. n. 1108; 1762. Sp. II. p. 89; 1764. Gen. ed. VI. p. 27. n. 61; 1767. Syst. ed. XII. p. 79: g. Triandr. Monogyn. — Par. Burm. 1761. Act. Nat. Cur. II. p. 192. — Murr. 1774. Syst. p. 80; 1784. Syst. p. 94. — Reich. 1778. Gen. p. 29. n. 67. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 38. n. 85. — Gmel. 1791. Syst. p. 120. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 12; 1818. Fl. cap. I. p. 306. — Pers. 1797. Syst. p. 95; 1805. Ench. I. p. 54. n. 110. — Willd. 1797. Sp. I. p. 248. n. 103; 1809. En. p. 67. — Vahl 1806. Enum. II. p. 163. n. 105.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 47 (*Vachendorfia*).

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. — Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Konig Ann. bot. I. p. 234.

Gled. 1764. Syst. p. 9. n. 28: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 82: g. Liliacear.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 52. t. 15. f. 4 (thyrsiflora).

Juss. 1789. Gen. p. 59: g. Iridibus aff.

Neck. 1790. El. III. p. 170. n. 1523 (*Wachendorffia*): g. Ymnodiphytor.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 149: g. Irideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 28. 356.

HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 319: g. Haemodoracear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 312. — Bartl. 1830. Ord. p. 43. — Endl. 1837. Gen. n. 1251. p. 171; 1841. Ench. p. 100. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 287.

Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 344. 458. n. 138: g. Iridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 158. — Link 1821. En. I. p. 55. — Eckl. 1827. Verz. p. 17. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 1. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 127.

Agdh. 1823. Aphor. p. 171: g. Haemodorear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 41. n. 184. (II. p. 816.)

Spreng. 1825. Syst. I. p. 169. n. 178: g. Sarmentacear.?

Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1160: g. Xiphidiear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 170. — Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300).

*) Dicat. Eberh. Jac. a Wachendorf, prof. Ultraject.

Wachendorfia Burmann cont.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Wachendorfiacear.

Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 336: g. Wachendorfiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1667.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Wachendorfear.

Synon. Erythrobulbus Pluk.; Pedilonia Presl.

Wachendorfiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: trib. Xiphidear. Gen.: Wachendorfia.

Wachendorfieae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 336: trib. Haemodoracear. Gen.: Wachendorfia.

Rchb. 1841. Nom. p. 46: sect. Haemodorear. genuinar. Gen.: Hagenbachia, Xiphidium, Wachendorfia, Lophiola.

Wadapus Rafin. 1836. Fl. Tell. n. 723.

Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 391: sect. Gomphrenae.

= Eugomphrena Endl.

Waddingtonia Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: novum g. Solanacear. (Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 41. t. 5. f. E: floribunda.)

Wagatea *) Dalzell 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 90: nov. g. Caesalpiniear.? — Par. Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 13. t. 1995. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 588.

Wageneria **) Klotzsch 1855. Begon. p. 232: nov. g. Pritzeliear. (Begonia vitifolia Schott, etc.)

Wahabia Fenzl 1844. Flora p. 312: nov. g. Acanthacear. (Nomen.)

Wahlbergella ***) Fries . . . .

Rupr. 1845. Beitr. Pfl. russ. R. 2te Lief. (*Synon. Gasterolychnis.*) *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 549.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 36: g. Lychnidear.

Wahlbomia †) Thunb. 1790. Vet. Ac. Handl. p. 215. t. 9.

Willd. 1799. Sp. II. p. 1244. n. 1066: g. Polyandr. Tetragyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 85. n. 1332.

Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 6: g. Rosacear.

= Tetracera Linn.

Wahlenbergia ††) Schrad. 1814. Catal. h. Gotting.; . . . . Comm. Gotting. VI. p. 123.

Roth 1821. Nov. spec. p. 399.

D. Don 1825. Nepal. p. 156: g. Campanulacear. — Par. Link 1829. Hdb. p. 631.—

*) *Wagatee* Bombayensium.
**) Dicat. H. Wagener, Halensi.
***) Dicat. P. F. Wahlberg, prof. Holm.
†) Dicat. Joh. Gust. Wahlbom, botanico suecico.
††) Dicat. G. Wahlenberg, botanico Upsal.

Wahlenbergia Schrad. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 152. — Koch 1837. Syn. p. 473. Ed. II. p. 544. — A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 49. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 536. — De Vriese 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 241. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 159.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 359: sect. Campanulae. — Simil. Dietr. 1839. Syn. I. p. 751.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2798; 1831. Fl. exc. p. 305: g. Campanulear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 129. Sect.: Edraiantha, Aikinia, Cervicina, Lobelioides, Linarioides, Nesophila. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 288.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 225: g. Campanular.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 737: g. Jasionear. Sect. ut. A. DC.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4038: g. Canarinear. (genuinar.) Sect. (1841): Stachyocodonia, Linocodonia, Wahlenbergia, Cervicina, Aikinia, Megasanthes.
Endl. 1838. Gen. p. 516. n. 3079: g. Lightfootiear. Sect. ut DC. 1830. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 242 (149). — Endl. 1841. Ench. p. 266. Sect. ut DC. 1839 excluso Megasanthe.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 424: g. Wahlenbergiear. Sect.: Megasanthes, Aikinia, Cervicina, Lobelioides, Linarioides, Phyteumoides. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 671. — Webb . . . Canar. III. p. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: g. Lightfootear.
Synon. Codonia Spreng.; Schultesia Roth; Campanopsis sp. R. Brown; Roucelae sp. Dumort.

Wahlenbergia Blume 1823. Catal. h. Buitenz. p. 14 ex Flora 1825. I. p. 113: nov. g. Cinchonear.
= Stylocoryne DC.

Wahlenbergia Schumach. 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 161: nov. g. pl. (W. globularis.)
= Cryphiospermum Palis.

Wahlenbergia R. Brown 1831 in Wallich Catal. n. 4342.
= Moacurra Roxb.

Wahlenbergia Rchb. 1841. Nomencl. p. 103. n. 4038. 3: sect. Wahlenbergiae.
= Lobelioides DC.

Wahlenbergieae Endl. 1838. Gen. p. 514: 1841. Ench. p. 266: trib. Campanulacear. Subtrib.: Jasioneae, Lightfootieae, Prismatocarpeae. — Par. A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 414. Gen.: Jasione, Lightfootia, Cephalostigma, Microcodon, Platycodon, Canarina, Campanumoea, Codonopsis, Wahlenbergia, Heterochaenia, Prismatocarpus, Roella, Edraianthus. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148). Subtrib. ut Endl. exclusis Jasioneis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. Gen. ex A. DC. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 103. Gen. ut A. DC.

Wailesia „Lindl. in Journ. hort. soc. IV. p. 261" Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 562: g. Vandear.

Waitzia Wendl. 1808. Collect. pl. II. 1. p. 13. t. 42: nov. g. Syngenes. Aequal. (W. corymbosa.)
Leman 1829. Dict. v. 59. p. 7: g. Cynarocephalar.
Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 449; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 233: g. Helichrysear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 498.
Synon. Viraya Gaudich.; Leptorhynchos Benth.; Morna Lindl.

Waitzia Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1196; 1841. Nom. p. 44. n. 1581: g. Gladiolear. (*Tritonia Ker.*)
= Montbretia DC.

Walafrida *) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. austr. II. p. 272: nov g. Selaginear.
Synon. Walafridia Endl.

Walafridia Endl. 1839. Gen. n. 3732. p. 642; 1841. Ench. p. 317: g. Selaginear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4445. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 478. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 144.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 667: g. Selaginacear. — Par. Choisy 1848 in DC. Pr. XII. p. 21.
= Walafrida E. Meyer.

Walchia Sternb. 1825. Vers. I. p. XXII: nov. g. Filicum anomalar. (Lycopodiolitis sp. Schloth., Brongn.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 342.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 119: g. Abietinear. foss.
? = Lycopodites Brongn.

Walcuffa „Bruce Trav. in Eg. p. 67 ic." Gmel. 1791. Syst. p. 1029: g. Monadelph. Dodecandr.
Steud. 1841. Nom. II. p. 783 (*Walkuffa*): g. Malvacear.
= . . . ?

Waldheimia **) Karelin & Kirilow 1842. Bull. Mosc. I. p. 126: nov. g. Senecionear., Doronico proximum. (W. tridactylites.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 312 et Linnaea XVI. Litt. p. 310.
Ledeb. 1846. Ross. II. p. 627: g. Eusenecionear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 254.
= Allardia Decne? (Endl. Spl. III. p. 70.)

Waldschmidia ***) Wiggers 1780. Prim. fl. holsat. p. 19: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Menyanthes nymphoides L.)
Hayne 1800 in Schrad. Journ. I. p. 24.
Bluff & Fing. 1825. Consp. I. p. 264 (emend.

*) Dicat. in memoriam Walafridi Strabi.
**) Dicat. dom. Gotthelf Fischer v. Waldheim.
***) Dicat. Wilh. Ulr. Waldschmidt, prof. quondam Kiloniensi.

Waldschmidia Wiggers cont. *Waldschmidtia*): g. Gentianear. — Par. Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 8.

Griseb. 1839. Gent. gen. p. 341; 1845 in DC. Pr. IX. p. 138: sect. Limnanthemi. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168). — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 77.

Waldschmidtia Scopoli 1777. Introd. p. 100. n. 232: g. Disparium. (*Apalatoa Aubl.*) Neck. 1790. El. III. p. 112. n. 1445: g. Daphonophytor.

= Crudya DC.

Waldschmidtia Bluff & Fing., Meisn., Griseb., Ledeb. vid. *Waldschmidia Wigg.*

Waldsteinia *) Willd. 1799 in N. Schr. nat. Fr. Berl. II. p. 106; 1799. Sp. II. p. 1007. n. 988; 1809. En. p. 520: nov. g. Icosandr. Digyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 36. n. 1225.

Batsch 1802. Tab. p. 10: g. Senticosar.

Nestl. 1816. Potent. p. 17. t. 1: g. Fragariacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 864: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4442; 1832. Fl. exc. p. 597.

Link 1822. En. II. p. 34: g. Rosacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 502. n. 1849; 1830. Gen. I. p. 412. n. 2056. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 8. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 124.

DC. 1825. Pr. II. p. 555: g. Dryadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 403. — Link 1831. Hdb. II. p. 100. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 529. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 481. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6500. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 426: g. Eudryadear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6382. p. 1245; 1841. Ench. p. 659. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 25.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.

Walidda A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 407: sect. Wrightiae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 434.

Walkera **) Schreb. 1789. Gen. I. p. 150. n. 378: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1145. n. 430. — Pers. 1805. Ench. I. p. 250. n. 568.

Hedw. 1806. Gen. p. 157. n. 669: g. Menispermear.

DC. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 421; 1824. Pr. I. p. 737: g. Ochnacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVIII. 345. n. 967. — Juss. 1825. Dict. v. 35. p. 331. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 817. — Meisn. 1837. Gen. p. 66 (47).

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 669 (*Walkeria*): g. Diosmear.

*) Dicat. Franc. Ad. comiti de Waldstein-Wartenburg.
**) Dicat. Rich. Walker, fundatori horti Cantabridg.

Walkera Schreb. cont. Spreng. 1825. Syst. I. p. 780. n. 855 (*Walkeria*); 1830. Gen. I. p. 186. n. 938: g. Ochnear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII; 1828. Consp. p. 199. n. 5185; 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. n. 7543. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 384. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 389. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 830. — Endl. 1840. Gen. n. 5960. p. 1142; 1841. Ench. p. 606. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 475. (?)

Synon. Tsjocatti Rheede; Meesia Gärtn.

Walkeria Ehret 1764. Phil. Trans. LIII. p. 130. t. 10: nov. g. monopetalum.

= Nolana Linn.

Walkeria Hornsch. . . . *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 10. et Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 289.

= Leucoloma Brid.

Walkeria Spreng., Dietr. vid. *Walkera Schreb.*

Walkuffa Steud. vid. *Walcuffa Gmel.*

Wallenia *) Swartz 1788. Prodr. p. 2. 31; 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 247. t. 6: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 789. n. 1722. — Gmel. 1791. Syst. p. 246. — Willd. 1797. Sp. I. p. 618. n. 208. — Pers. 1805. Ench. I. p. 133. n. 267. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 342. — Hedw. 1806. Gen. p. 56. 368.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 426; 1830. Gen. I. p. 81. n. 395: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2922. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 430.

Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 4. 98. n. 421: g. Ardisiacear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 87. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 13 (*Wallène*).

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Lentaginiae?

Spreng. 1825. Syst. I. p. 421. n. 434: g. Viticear.

Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 89. t. 237: g. Myrsinear.

Bartl. 1830. Ord. p. 164: g. Ardisiear. — Par. A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 101; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 191; 1841. ibid. XVI. p. 78; 1844. Pr. VIII. p. 118. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 8. — Endl. 1839. Gen. n. 4217. p. 735; 1841. Ench. p. 359. — Meisn. 1839. Gen. p. 253 (162). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4852 (*Walleria*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — J. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 552 (*Vallenia*).

Synon. Petesioides Jacq.

Walleria Rchb. vid. *Wallenia Swartz.*

Wallichia **) Roxb. 1819. Corom. III. p. 91. t. 295: nov. g. Monoec. Hexandr. (W. caryotoides.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 488.

Mart. 1824. Palm. fam. p. 17: g. Arecinar.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 140. n. 1348; 1830. Gen. I. p. 285. n. 1476: g. Palmar. (in

*) Dicat. Math. Wallen, Hiberno.
**) Dicat. Nath. Wallich, botanico Calcutt.

Wallichia Roxb. cont.
Hexandr. Trigyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1204. — Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 157.
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1647: g. Arecacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Arecinear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 32.
Synon. Wrightea Roxb.; Harina Hamilt.; Saguaster minor Rumph.?

Wallichia Roxb. mss.
= Urophyllum Jack & Wall.

Wallichia Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 107: nov. g. Pentandr.
Blume 1823. ibid. ex Flora 1825. I. p. 107: g. Guettardear.
= Axanthes Blume.

Wallichia DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 104; 1824. Prodr. I. p. 501: nov. g. Wallichiear. (W. spectabilis.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 539. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 458.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 15: g. Büttneriacear.
= Schillera Rchb.

Wallichieae DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: subtrib. Dombeyacear. Gen.: Eriolaena, Wallichia.
DC. 1824. Pr. I. p. 501: trib. Byttneriacear. Gen. ead. et Göthea. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 539. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: div. Geraniacear. Gen.: Wallichia, Göthea.
Bartl. 1830. Ord. p. 344: div. Dombeyacear. Gen. ut DC.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 444. 457: trib. Dombeyacear. Gen. ead.

Wallinia *) Moquin-Tand 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 143: g. Corispermear.
Synon. Lophiocarpus Turcz.

Wallrothia **) Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 640; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLV. 556. n. 1213: nov. g. Amminar. (Bunium alpinum Kit.)
Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3708 *b*: sect. Ligustici.
DC. 1829. Coll. diss. V. p. 49; 1830. Pr. IV. p. 162: g. Seselinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 320. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105).
Gay 1832. Ann. sc. nat. XXVI. p. 221 in not.
Synon. Dethawia Endl.

Wallrothia Roth 1821. Nov. pl. sp. p. 317: nov. g. Didynam. Angiosperm. (Vitex Leucoxylon L.)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 760. n. 2122; 1831. Gen. II. p. 479. n. 2365: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2930.
Bartl. 1830. Ord. p. 180: g. Viticear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 226. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4200.
Endl. 1838. Gen. n. 3699. p. 635; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 610. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 82.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
= Vitex Linn. (Schauer.)

Wallrothia Presl 1822. Delic. Prag. I. p....: g. Ammiacear. (W. divaricata.)
= Bunii sp. DC.

Walpersia *) Reissek 1840 in Endl. Gen. n. 5736. p. 1100; 1841. Ench. p. 581: nov. g. Phylicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5576.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
= Trichocephalus Brongn.

Walpersia Krauss mss. in herbar.
= Sigmodostyles Meisn.

Walsura **) Roxb. 1832. Fl. Ind. II. p. 386: nov. g. Octandr. Monogyn. (W. robusta, piscidia et ternata.)
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 120: g. Trichiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 49 (36). — Endl. 1840. Gen. n. 5539. p. 1051; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8075. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 85. 108. (restrict.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 389.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Heyneear.
Synon. Surwala Römer.

Walteria Scop., Dumort. vid. *Waltheria Linn.*

Walteria St. Hil. vid. *Vateria.*

Walteriana Fras. mss.
= Cliftonia Banks. (Endl. Spl. I. p. 1413.)

Waltheria ***) Linn. 1737. Gen. p. 203. n. 552; 1737. Cliff. p. 342; 1740. Syst. p. 27; 1753. Sp. II. p. 673; 1759. Syst. ed. X. p. 1140. n. 741; 1763. Sp. ed. II. p. 941; 1764. Gen. ed. VI. p. 348. n. 827; 1767. Syst. ed. XII. p. 451: g. Monadelph. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 509; 1784. Syst. p. 610. — Reich. 1778. Gen. p. 348. n. 892. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 453. n. 1108. — Gmel. 1791. Syst. p. 1008. — Pers. 1797. Syst. p. 648. — Willd. 1800. Sp. III. p. 586. n. 1258; 1809. En. p. 692.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 235. n. 971: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 398: g. Malvar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 283 (*Walteria*). — Gis. 1792. Prael. p. 452.
Hill 1769. Ht. kew. p. 197: g. Pentapetalar.
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 315. t. 170. 171:

*) Dicat. G. Wallin.
**) Dicat. C. Fr. W. Wallroth, Nordhusano.

*) Dicat. G. W. Walpers, botanico Berolin.
**) Nomen vernaculum *Walsura* s. *Wallursi.*
***) Dicat. Aug. Fr. Walther, prof. Lipsiensi.

Waltheria Linn. cont.
g. Malvacear. Char. emend. *Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. VI. p. 141. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 18.
Juss. 1789. Gen. p. 289: g. Tiliacear. (dubium). — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 205. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 90. — Pers. 1807. Ench. II. p. 216. n. 1592. — Link 1822. En. II. p. 179. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 459 (*Walthère*).
Neck. 1790. El. II. p. 440. n. 1172: g. Comizophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 804: g. Pentapetear.
Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 65: g. Hermanniear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 492. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 149. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 31. n. 2351; 1831. Gen. II. p. 535. n. 2626. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46 (*Walteria*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 530. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 66. — Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — Endl. 1840. Gen. n. 5336. p. 999; 1841. Ench. p. 519. — Brongn. 1843. En. genr. p. 78. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 323.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 332: g. Hermanniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 343. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 461.
Kunth 1824. Syn. III. p. 273: g. Büttneriacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5308: g. Dombeyacear.
Webb 1836. Canar. I. p. 41: g. Byttneriacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 201. n. 7677: g. Waltheriear.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 195: g. Hermanniar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Hermannear.
Synon. Monospermalthaea Isn.; Malvinda Burm.; Lophanthus Forst.; Aubentonia Domb.; Astropus Spreng.; Riedleiae sp. DC.

Waltherieae Rchb. 1837. Handb. p. 291; 1841. Nomencl. p. 201: sect. Hermanniear. Gen.: Waltheria, Altheria.

Wangenheimia *) Mönch 1794. Meth. p. 200: nov. g. Thalamostemonis. (Cynosurus Lima L.)
Trin. 1820. Fund. p. 132: g. Triandr. Digyn.
Link 1827. Hort. I. p. 45: g. Triticear.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 847: g. Secalinar.
Link 1829. Hdb. I. p. 19: g. Graminear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Kunth 1830. Gram. p. 125; 1833. Agrost. p. 385: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 370. — Steud. 1854. Glum. I. p. 297.
Endl. 1837. Gen. n. 891. p. 100; 1841. Ench. p. 59: g. Bromear. — Par. Meisn. 1843.

*) Dicat. Fr. Ad. Jul. de Wangenheim.

Wangenheimia Mönch cont.
Gen. p. 424 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1401: g. Seslériear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.

Wangenheimia (umbellata) Dietr. (Steud.) = Gilibertia Ruiz & Pav. (Endl. Gen. p. 794.)

Wannschia A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 606: sect. Schwanniae. (An genus proprium?) — Par. Walp. 1845. Rep. V. p. 353.

Wardia Harv. & Hook. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 183. t. 25: nov. g. Muscor. (W. hygrometrica.) *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 55 et Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 291. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 386. (pleurocarpor.) — Schwägr. 1842. Suppl. IV. t. 314.
Endl. 1841. Spl. I. n. $505/_1$. p. 1245; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 881: g. Calyptrobryor.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 81: g. Ripariacear.
= Neckerae Müll. pars.

Warea *) Nuttall 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 83: nov. g. Stanleyear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7030.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 98: g. Sisymbrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4917. p. 877; 1841. Ench. p. 450. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 297: g. Cleomear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 717: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
Synon. Stanleyae sp. DC. et Nutt.

Waria Aublet 1775. Guian. II. p. 604. t. 243: nov. g. Polyandr. Polygyn. (W. zeylanica.)
Scop. 1777. Intr. p. 256: g. Polycarpiar.
= Habzelia A. DC.

Warnera Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 19: vid. *seq.*

Warneria Mill. ... Ic. II. p. 190. t. 285.
= Hydrastis Linn.

Warrea Lindl. 1844. Bot. Regist. misc. 3; 1845. Bot. Regist. t. 28; 1847. Veg. kingd. p. 182: nov. g. Maxillaridar. (Maxillaria Warreana.) *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 616 et Flora 1846. I. p. 220.

Warrenia Harvey . . . .
= Wrangeliae sp. (Kütz. Sp. Alg. p. 665.)

Warscewiczella Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 613. 765; 1855. Pescatorea t. 29. 37; 1858. Xen. Orchid. p. 60. t. 23: nov. g. Orchidear., inter Warream et Zygopetalum intermedium. *Cf.* Regel Gartenflora 1857. p. 37.

Warsewitschia (Cujusnam?) Gard. Chron. n. 13 (*cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 663): nov. g. Orchidear.

*) Dicat. N. A. Ware, de flora Floridana merito.

Warszewiczia Klotzsch 1853. Monatsber. Berl. Ak. p. 496 (Flora 1853. p. 716): nov. g. Rondeletiear. (Calycophyllum coccineum DC.) — Par. Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 72.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 122: g. Eucinchonear.

Warthemia Boiss., Walp. vid. *Varthemia DC.*

Washingtonia Winslow et Auct. americ. nonnull. *Cf.* Seemann 1858. Bonplandia VI. p. 343.
= Sequoia Endl.

Watsonia *) Miller . . . . Ic. p. 276. t. 294. f. 2. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 20.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Iridum. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 58.
Batsch 1802. Tab. p. 143: g. Ensatar. — Par. Gawl. 1805 in Konig Ann. bot. I. p. 229.
Pers. 1805. Ench. I. p. 42. n. 100: g. Triandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 147: g. Iridear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 24. 353. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 260. — Link 1821. En. I. p. 53; 1829. Hdb. I. p. 219. — Ker 1827. Irid. p. 122. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 128. — Endl. 1837. Gen. n. 1240. p. 168; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 158. — Meisn. 1843. Gen. p. 392 (294). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 292.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 323: g. Gladiolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1192 (sect.: Micranthus, Callanthus); 1841. Nom. p. 43. n. 1577. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58 (*Watzonia*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 84.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 150. n. 154; 1830. Gen. I. p. 39. n. 172: g. Spathacear.
Eckl. 1827. Verz. p. 34: g. Gladiolor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Phalangium Houtt.; Meriana Trew; Micranthes Pers.; Neuberia Eckl.?; Gladioli et Ixiae sp. Jacq.

Wattahaka Endl. 1838. Gen. n. 3501 *b*. p. 596; 1841. Ench. p. 299: sect. Hoyae. — Par. Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 639. (Jacquem. voy. t. 114.)
= seq.

Wattakaka Hasskarl 1857. Flora I. p. 99: nov. g. Pergulariear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 496.
Synon. Watta-kaka-codi Rheede; Wattahaka Endl.; Schollia Rchb.

Watta-kaka-codi Rheede 1689. Hort. Malab. IX. p. 25. t. 15.
= praeced.

Watzonia Dumort. vid. *Watsonia Mill.*

Webbia **) DC. 1836. Prodr. V. p. 72: nov. g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2212. p. 359; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

*) Dicat. Will. Watson, prof. bot. Chelsea.
**) Dicat. Ph. Barker-Webb, florae Canar. auctori.

Webbia DC. 1838. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3876: g. Pacourinear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 970 in adnot.: sect. Vernoniae.
Synon. Conyzae sp. Thunb.; Erigerontis sp. Houtt.; Vernoniae sp. Less.

Webbia Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 408; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 356: nov. g. Hyperinear. (Hypericum canariense L.)
Webb 1836. Canar. I. p. 46. t. 4. 5: g. Hypericinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 307; 1841. Nom. p. 210. n. 7995: g. Androsaemear.
Endl. 1840. Gen. p. 1032. n. 5464 *A a*; 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *B c*: sect. Hyperici.
= Hübneria Rchb.

Webbia Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 952. 970 (non DC.): nov. g. Diplostephiear. (W. Kraussii.)

Webera *) Hedwig 1782. Fund. musc. II. p. 95; 1801. Spec. Musc. p. 168: nov. g. Muscor. frondosor. (Bryum pyriforme, Hallerianum, trichodes), ab auctoribus varie circumscriptum.
Roth 1788. Germ. I. p. 477: g. Muscor. — Par. Mönch 1794. Meth. p. 746. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 302. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 34. — Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 66.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 173; II. 3. p. 122; 1817. Spl. III. p. 34: g. Diploperistomator.
Roth 1800. Germ. III. p. 251: sect. Bryi. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 500. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 74. — Brid. 1822. Meth. musc. p. 120; 1826. Bryol. I. p. 624. — Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 642 *a*; 1841. Nom. p. 26. n. 920. 1. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 268. — Endl. 1836. Gen. n. 542 *a*. p. 52; 1841. Ench. p. 31. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 88. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 243. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 207. — Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47.
Rebent. 1804. Neom. p. 264: sect. Hypni.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 236.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Bryoidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea VI. p. 85.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 424: g. Diploperistomor.
Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 42: g. Bryacear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 20.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Brycar.
Synon. Orthopyxidis sp. Palis.; Macrauchenium Brid.

*) Dicat. G. H. Weber, prof. Kiloniensi.

Webera Ehrhart 1787. Beitr. I. p. 17. 177: nov. g. Muscor. (W. Diphyscium.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 25.
= Diphyscium Mohr.

Webera Schreb. 1791. Gen. II. p. 794. n. 1733: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1224. n. 476.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 71. t. 192.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 604: g. Coffeacear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 759. n. 814; 1830. Gen. I. p. 175. n. 881: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 792.
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2090: g. Cinchonear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Gardeniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 211: g. Gardeniear.
= Cupia DC.

Webera Gmel. 1791. Syst. p. 820: g. Polyandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 27.
= Blakea P. Browne, Aubl.

Webera Cramer 1803. Disp. syst. p. 38: g. Tetrandr. Monogyn. (W. tetrandra W.)
= Canthium Lam.

Weddellina *) Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 113: nov. g. Tristichear. (W. squamulosa.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 444.
Tul. 1852. Arch. Mus. VI. p. 195: g. Weddellinear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 792.

Weddellineae Tulasne 1852. Arch. Mus. VI. p. 195: sect. Tristichear. Gen.: Weddellina. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 792.

Wedelia Löfl. 1758. It. p. 180.
Endl. 1837. Gen. n. 2065 *b*. p. 311; 1841. Ench. p. 193: sect. Allioniae.

Wedelia **) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 217. t. 130: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (W. frutescens.) — Par. Cram. 1803. Disp. p. 170.
Scop. 1777. Intr. p. 133: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 189: g. Corymbiferar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 418.
Neck. 1790. El. I. p. 30. n. 56: g. Actinophytor.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2334. n. 1553; 1809. En. p. 933: g. Syngenes. Necessar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 490. n. 1937.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 575; 1826. Syst. III. p. 580. n. 2804; 1831. Gen. II. p. 632. n. 3149: g. Radiatar. — Par. Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 29.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 214: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 471. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Less. 1831. Linnaea VI. p. 160. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 68.
Link 1822. En. II. p. 361: g. Oppositifoliar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear.

*) Dicat. Hug. Alg. Weddell, Castelnavii socio.
**) Dicat. Joanni Wolfgang Wedel, Jenensi.

Wedelia Jacq. cont.
— Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2667.
— Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 399. 409; 1830. v. 60. p. 577: g. Heliopsidear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 538. Sect.: Cyathophora, Callophora, Actinoptera, Aglossa? — Endl. 1838. Gen. n. 2496. p. 406; 1841. Ench. p. 238. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3126. Sect.: Wedelia, Callophora, Actinoptera, Aglossanthe? — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Less. 1832. Syn. p. 222: g. Wedeliear. ampliat.
Endl. 1832. Norf. p. 51: g. Synantherar.
Synon. Niebuhria Neck.; Stemmodontia et Trichostemma Cass.

Wedelieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 221: div. Helianthear. Gen.: Zinnia, Calyptocarpus, Helicta, Wedelia, Melananthera.

Wedeliopsis „Planch. mss." Benth. 1849. Niger fl. p. 351: sect. Heterotidis. (Melastoma theaefolia Don, etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 603.

Weigela *) Thunb. 1780. Vet. Ac. Handl. p. 137. t. 5; 1781. Nov. gen. I. p. 5; 1784. Fl. jap. p. 6; 1794. Linn. Trans. II. p. 331: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 198. — Gmel. 1791. Syst. p. 337. — Pers. 1797. Syst. p. 205. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 350.
Juss. 1789. Gen. p. 421: g. pl. incertae classis, an Apocineis aff.? — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 88. n. 400.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 327: g. Caprifoliacear.
A. DC. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 240: g. Lonicerear. Sect.: Utsugia, Calysphyrum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767 in synon. Diervillae.
C. A. Meyer 1855. Bull. Ac. Pet. XIII. p. 216: g. Diervillear.
Synon. Weigelia Schreb.; Calysphyrum Bunge?; Vegelia Neck.?

Weigelia Schreb. 1789. Gen. I. p. 113. n. 280: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 836. n. 317. — Pers. 1805. Ench. I. p. 176. n. 407. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. II. 5. n. 617. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 121. n. 604. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 591.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 537. n. 575: g. Viticear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3195: g. Antirrhinear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 128: g. Lonicerear.
= Weigela Thunb.

Weigeltia Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4107 b: nov. g. Ceratoniear., haud definitum.
Meisn. 1837. Comm. p. 69: g. Cassiear.? ignotum.

*) Dicat. Chr. Ehr. de Weigel, prof. Gryphiswald.

Weigeltia *) A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 102; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 291; 1844. Prodr. VIII. p. 114: nov. g. Ardisicar. (Wallenia Myrianthos Rchb.) *Cf.* DC. in Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 79. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 8. — Endl. 1839. Gen. n. 4219. p. 736; 1841. Ench. p. 359. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — Meisn. 1839. Gen. p. 253 (162). — Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4854. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648.
Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 299: sect. Cybianthi.

Weihea **) Spreng. 1825. Syst. II. p. 594. n. 1911: g. Polyandr. Monogyn.
= Cassipourea Aubl.

Weihea Ecklon 1827. Verzeichn. p. 22: nov. g. Ixiacear., inter Geissorhizam et Hesperantham medium. (Ixia excisa L.)
= Geissorrhiza Gawl.?

Weihea Rchb. 1828. Consp. p. 212 b. n. 4072: g. Sophorear.
= Burtonia R. Brown.

Weilbachia ***) Klotzsch 1855. Begon. p. 239: nov. g. Platycentrear.

Weingärtneria Bernhardi 1799. Erfurt. p. 51.
= Corynephorus Palis.

Weinmania Neck. vid. *Weinmannia Linn.*

Weinmanneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 572: trib. Cunoniacear. Gen. Cunoniear. Endl. (exclusis Belangera et Bauera) et Ochranthe.

Weinmannia †) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1005. 1367. n. 1131; 1762. Sp. ed. II. p. 515; 1764. Gen. ed. VI. p. 195. n. 493; 1767. Syst. ed. XII. p. 274. n. 488: g. Octandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 310; 1784. Syst. p. 375. — Reich. 1778. Gen. p. 199. n. 535. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 263. n. 674. — Gmel. 1791. Syst. p. 636. — Pers. 1797. Syst. p. 401; 1805. Ench. I. p. 438. n. 974. — Willd. 1799. Sp. II. p. 436. n. 782.
Gled. 1764. Syst. p. 84. n. 348: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 225: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 309: g. Saxifragis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 383. n. 1197 (*Weinmania*): g. Ypsoophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 383: g. Saxifragear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 29. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 34.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 133: g. Saxifragis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 282. n. 1132.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 549 (Verm. bot. Schr. I. p. 41): g. Cunoniacear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 49. — Kunth 1824. Syn. III. p. 359. — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4910. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 201. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. — Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 50. Sect.: Dieterica, Weinmannia. —

*) Dicat. botanophilo Weigelt.
**) Dicat. K. E. Aug. Weihe, Paderborn.
***) Dicat. Weilbach, hortulano Hafniensi.
†) Nomen Browneanum a Linnaeo parum mutatum, cum nullus in botanica clarus sit Windmannus.

Weinmannia Linn. cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 79. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 717.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 511: g. Rhododendrear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 245. n. 1495: g. Ericear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1311.
Don . . . in Edinb. n. phil. journ. IX. p. 85.
DC. 1830. Pr. IV. p. 8: g. Cuniear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 320. n. 1635. — Bartl. 1830. Ord. p. 313. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 197. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 7. — Endl. 1839. Gen. n. 4655. p. 818; 1841. Ench. p. 409. — Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6221. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 294. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 151. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 29.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: g. Weinmanniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 572: g. Weinmannear.
Synon. Windmannia P. Browne.

Weinmannieae Rchb. 1837. Handb. p. 230: subdiv. Cunoniariar. Gen.: Codia, Belangera, Callicoma, Dieterica, Weinmannia, Cunonia, Arnoldia, Ceratopetalum.

Weinmannodora *) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 409: nov. g. Leveillineor. (W. ruthenica.)

Weinreichia Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4017; 1841. Nom. p. 153. n. 5998: g. Dalbergiear.
= Echinodiscus Benth.

Weisia **) Hedwig 1782. Fund. hist. musc. II. p. 83. 90 (*Veisia*): nov. g. Muscor. (frondosor.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 155. n. 3306; 1831. Gen. II. p. 730. n. 3703. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 138. (odontostomor.)
Röhl. 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 96: g. Aploperistomator.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Genth 1836. Nass. I. p. 165: g. Bryoideor.
Bruch & Schimp. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: g. Weisiacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 168. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 125. — Bayrh. 1849. Taun. p. 7. — Bruch, Schimp. & Gümb. 1850. Bryol. eur. Fasc. 46. 47. Subgen.: Microweisia, Weisia (compacta, etc.), Oreoweisia, Weisiopsis.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 648: g. Pottiacear. Sect.: Rhabdoweisia, Euweisia, Hymenostomum.
Synon. Weissia Hedw.; Weissa Schrank.

Weisiaceae Bruch & Schimp. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: fam. Muscor. Gen.: Hymenostomum, Weisia, Rhabdoweisia, Gymnostomum, Eucladium. Accedunt 1850 (Fasc. 46—47): Astomum, Anoectangium.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 120: subsect. Dicranoidear. Gen. ut Bruch & Schimp. et Cynodontium.

*) Donum cel. Weinmanni.
**) Dicat. botanico Weis, Gotting.

Weisiopsis Bruch, Schimp. & Gümb. 1850. Bryol. eur. Fasc. 46—47: subg. Weisiae. (W. reflexa.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402 (*Weissiopsis*): g. Weissiear.

Weissa Schrank in Schr. Regensb. Ges. I. p. 292 ex Reuss Rep. comm. II. p. 25. 204: vid. *Weissia Hedw.*

Weissia *) Ehrhart 1779. Hann. Mag. p. 1003; 1787. Beitr. I. p. 33: nov. g. Muscor. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 760. n. 1648. — Willd. 1799 in Schrad. Journ. II. p. 15. — Roth 1800. Germ. III. p. 214.
= Orthotrichum Hedw.

Weissia Hedw. 1787. Musc. frond. I. p. 7. 8. 38; 1801. Spec. Musc. p. 64: g. Muscor. (frondosor.) — Par. Mönch 1794. Meth. p. 734. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 11. 93. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 288. — Rebent. 1804. Neom. p. 259. — DC. 1805. Franç. II. p. 454; 1815. V. p. 209. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 31. — Mart. 1817. Erlang. p. 110. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 729. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 222. — Leman 1829. Dict. v. 59. p. 37. — Math. 1853. Belg. II. p. 56.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 157. II. 1. p. 69; 1806. Suppl. I. p. 103: g. Aploperistomator.
Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72: sect. Grimmiae.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 38: g. Peristomor. acrocarpor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 755: g. Bryoideor.
Brid. 1826. Bryol. I. n. 332: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV g. Weissioideor.) — Par. Nees & Hornsch. 1831. Bryol. germ. II. 2. p. 7.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 248: g. Dicranoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 605: g. Weissiaceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Dicranear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 96.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Weissioidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 81.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 122: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 516. p. 50; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 41: g. Weissiear. — Par. Mont. 1841 in Webb Canar. IV. p. 38; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402; 1849. ibid. XIII. p. 294.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 894: g. Calyptrobryor.
Bayrh. 1849. Taun. p. 6: g. Weissiacear.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 59: g. Weissiar.
= Weisia Hedw.

*) Dicat Dr. F. G. Weis, Gotting.

Weissiacea Rchb. 1828. Consp. p. 34: sect. Dicranoideor. Gen. vide *Weissioidei Brid.*

Weissiaceae Bayrh. 1849. Taunus p. 6: fam. Muscor. frondosor. Gen. vid. *Weissiaceae Br., Sch.*

Weissiae Wilson 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 58: trib. Bryacear. Gen.: Gymnostomum, Weissia, Symblepharis.

Weissieae Hampe 1839. Linnaea VIII. p. 41: ordo Muscor. Gen.: Astomum, Weissia, Trematodon, Dicranum, Ceratodon.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen.: Hymenostomum, Weissia, Weissiopsis, Gymnostomum, Eucladium, Rhabdoweissia, Pyramidium, Didymodon, Ceratodon, Eucamptodon, Hyophila, Pilopogon, Plaubelia, Hymenostylium, Eucladon, Lophiodon, Garckea, Microbryum, Seligeria, Brachyodus, Blindia, Stylostegium, Angströmia?

Weissioideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: fam. 3 Muscor. Gen.: Hymenostomum, Gymnostomum, Weissia, Dicranum (casu omissum), Ceratodon, Cynodontium.

Weissioidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Weissia, Discelium, Catoscopium, Coscinodon, Oreas. *Affinia*: Syrrhopodon, Trachymitrium, Calymperes, Octoblepharum, Leucophanes.

Weissiopsis Mont. vid. *Weisiopsis Br. & Schimp.*

Weissites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 14: g. Filicum foss. (Filicites vesicularis Schloth.)
Sternb. 1838. Vers. II. p. 175: g. Filicitum dubium.
Unger 1846. Syn. pl. foss. p. 106; 1846. Chlor. prot. p. LI: g. Filicum foss. dubium.

Weldenia Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXI: g. Dillenear. (Nomen!)

Weldenia *) Schult. f. 1829. Flora I. p. 1: nov. g. Hexandr. Monogyn. (W. candida.)
Schult. 1830. Syst. VII. p. LXI. 1136: g. Narcissor.?
Herb. 1837. Amaryll. p. 64. 83: g. Hypoxidear.
Endl. 1837. Gen. p. 185. n. 1315: g. dubium Bromeliacear.
Endl. 1841. Spl. I. n. $1085/_1$. p. 1358; 1841. Ench. p. 79. n. 1087: g. Colchicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1718. — Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 151. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 234. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.(?)
A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740: g. Tillandsiear.
Synon. Leucocrinum Nutt.?; Geanthia Rafin.?; Rugendasia Schiede.

Welezia Necker vid. *Velezia Linn.*

Wellingtonia **) Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. Comm. p. 207 in adnot.: g. Wellingtoniacear.
= Meliosma Blume.

*) Dicat. De Welden.
**) Nomen ob Millingtoniam Linn. f. nuperius restitutam pro Millingtonia Roxb. propositum.

Wellingtonia Lindl. 1853. Gard. Chron. Dec. p. 819. 823: nov. g. Coniferar. (W. gigantea.) *Cf.* Hook. 1854. Bot. Mag. t. 4777. 4778; Lemr. 1854. Ill. p. 14 c. ic.; Rev. hortic. 1854. p. 166.
= Sequoia Endl.

Wellingtoniaceae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. Comm. p. 207 in adnot.: novus ordo plant., Sapindaceis et Meliaceis proxime affinis. Gen.: Wellingtonia.
= Meliosmeae Endl. *Cf.* Meisn. Comm. p. 346.

Weltheimia Brongn. vid. *Veltheimia Gled.*

Weltrichia Braun 1847. Flora I. p. 86 (nomen); 1849. ibid. II. p. 705. t. 2 (descr.): nov. g. Rafflesiacear. foss.

Welwitschia *) Rchb. 1837. Handb. p. 194; 1841. Nomencl. p. 113. n. 4387: g. Giliear., pro *Hügelia Benth.* propositum. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108.
Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179): sect. Giliae.
= Collomioides Endl.

Wenderothia **) Schlechtend. 1838. Linnaea XII. p. 330; nov. g. Phaseolear. (W. discolor.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 351.
Endl. 1841. Gen. n. 6666. p. 1295; 1841. Ench. p. 671: g. Erythrinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5822.
= Canavalia DC.? (Lindl. 1847.)

Wendia ***) Hoffm. 1814. Umbell. p. 136: nov. g. Umbelliferar. (Heracleum longifolium MB.)
MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 227: g. Pentandr. Digyn.
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 368: sect. Heraclei. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3682 *a*; 1832. Fl. exc. p. 456. — Koch 1836. Syn. p. 308. Ed. II. p. 339.
= Wendtia DC.

Wendlandia †) Willd. 1799. Sp. II. p. 275. n. 709: g. Hexandr. Hexagyn. (antea *Androphylax Wendl.*) *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 46. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 400. n. 896. — Hedw. 1806. Gen. p. 255. n. 1033. — Elliott 1817. Sketch I. p. 433. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 241.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 677: g. Menispermear. — Par. Link 1821. En. I. p. 352. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50 (*Wenlandia*).
= Cocculus DC.

Wendlandia Bartl. 1830. Ord. p. 211: nov. g. Cinchonear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 411: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 517. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 402. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Endl. 1838. Gen. n. 3252. p. 552; 1841. Ench. p. 274. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2887. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 58. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 157.

Wendlandia Bartl. cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 167. n. 842: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 739.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Rondeletiae sp. Roxb., Wall.; Sestiniae sp. Boiss.

Wendtia DC. 1830. Prodr. IV. p. 194: sect. Heraclei. (*Cf. Wendia Hoffm.*) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 344. — Endl. 1839. Gen. n. 4477 *e*. p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5476. 3. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 328. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 697.

Wendtia *) Meyen 1834. Reise I. p. 307: nov. g. Ledocarpear. — Par. Klotzsch 1835. Linnaea X. p. 432. — Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42). — Endl. 1840. Gen. n. 6051. p. 1169; 1841. Ench. p. 622. — Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7730.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 489: g. Oxalidacear.
Synon. Martiniera Guillem.; Hyperum Presl.

Wenlandia Dumort. vid. *Wendlandia Willd.*

Wensea **) Wendl. 1819. Collect. plant. III. 2. p. 24. t. 84: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (W. pyramidata.)
= Pogostemon Desfont. (Bartl. Ord. p. 182.)

Wepferia Heister . . .
= Aethusa Linn.

Werinnua ***) Heyn. tract. on Ind. p. 49 ex Ainsl. (DC. Prodr. V. p. 551.)
= Guizotia Cass.

Werneria †) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 189: nov. g. Jacobear. (W. humilis, etc.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 458.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 566. n. 2769; 1831. Gen. II. p. 629. n. 3126: g. Radiatar.
Less. 1832. Syn. p. 393: g. Senecionear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3357. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
DC. 1837. Pr. VI. p. 323: g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2803. p. 457; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136). — Rémy 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 189. Char. emend.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33: g. Othonnear.
Synon. Oresigonia Willd.; Oribasia Fl. mex.; Euryopis sp. amer. Cass.

Werniseckia Wittst. Etym. Handw. p. 933: vid. *seq.*

Werniseckia Scopoli 1777. Introd. p. 273. n. 1246: g. Polyandrar. (*Houmiri Aubl.*) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 175. 752 (*Verniseckia*).
= Humirium Mart.

*) Dicat. Fried. Welwitsch, peregrinatori.
**) Dicat. prof. Wenderoth, Marburgensi.
***) Dicat. Dr. Wendt, quare bene nomen emendavit DC.
†) Dicat. Joh. Chr. Wendland, Herrnhusano.

*) Dicat. navarcho Wendt.
**) Dicat. A. A. F. v. de Wense.
***) Nomen in India usitatum.
†) Dicat. Ab. Gottlieb Werner, olim professori Fribergensi.

Westeringia Pers., Dumort., Poir. vid. *Westringia Smith.*

Westia Vahl 1810 in Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 117: nov. g. Lomentacear. (W. grandiflora, parviflora.)
= Anthonota Palis.? (Endl. Gen. p. 1427.)

Westonia Spreng. 1826. Syst. III. p. 152. 230. n. 2540; 1831. Gen. II. p. 580. n. 284: nov. g. Leguminosar. (Glycine humifusa W.)
Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4054; 1841. Nom. p. 151. n. 5882: g. Genistear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 409. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. — Endl. 1841. Spl. I. n. 6475. p. 1427; 1841. Ench. p. 668. — Meisn. 1843. Comm. p. 350.
Synon. Rothia Pers.; Dillwynia Roth; Harpelema Jacq.; Hosakia Grah. (Steud.); Harpeloma Wittst.; Götzea Rchb.

Westringia *) Smith 1797. Vet. Ac. n. Handl. p. 171; 1798. Tracts rel. to nat. hist. p. 277. t. 3.
Pers. 1807. Ench. II. p. 129. n. 1404 (*Westeringia*): g. Labiatar. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 501. Ed. Nees p. 357. — Link 1822. En. II. p. 115. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 712. n. 2074; 1831. Gen. II. p. 469. n. 2310. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 52 (*Westeringia*).
Willd. 1809. En. p. 622: g. Didynam. Gymnosperm.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 432: g. Sâlviear.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2840: g. Nepetear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22 (*Westeringia*): g. Catariear.
Bartl. 1830. Ord. p. 182: g. Westringiear.
Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1481: g. Satureinar.
Benth. 1834. Labiat. p. 457; 1848 in DC. Pr. XII. p. 570: g. Prostantherear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 801. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 108. n. 4176. — Endl. 1838. Gen. n. 3633. p. 622; 1841. Ench. p. 307. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 428. — Brongn. 1843. En. genr. p. 67. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 361. — Walp. 1845. Rep. III. p. 770. 985. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661.

Westringieae Bartl. 1830. Ord. p. 182: div. Labiatar. Gen.: Westringia, Microcorys, Hemigenia, Hemiandra, Synandra.

Wetherellia Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 89.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 253; 1846. Chlor. prot. p. LXXXVIII: g. incertae sedis.

Wetria **) Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 409: nov. g. Crotonidear. (Trewia? macrophylla Bl.)

*) Dicat. Joh. Pet. Westring, botanico succico.
**) Anagramma nominis Trewiae.

Wettinia *) Pöppig mss." Endl. 1837. Gen. n. 1715. p. 243; 1841. Ench. p. 133: g. Cyclanthear. — Par. Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 39. t. 153. 154. — Kunth 1841. Enum. III. p. 108. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1546. — Meisn. 1842. Gen. p. 359 (268). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 24. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 132.

Weydleria G. Don Gen. syst. III. p. 238: sphalm. pro *Wydleria.*

Wheelera Schreb. 1791. Gen. II. p. 725. n. 1579: nov. g. Polygam. Monoec., inter Ophioxylum et Brabejum collocatum.
= . . . ?

Whitea Dietr. vid. *Whitia Blume.*

Whitefieldia Nees vid. *seq.*

Whitfieldia Hook. 1845. Bot. Mag. t. 4155: nov. g. Acanthacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 407.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Barleridar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 220 (*Whitefieldia*): g. Ruëlliear.

Whitia Blume 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 118: nov. g. Bignoniacear. (W. oblongifolia.)
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 774: g. Cyrtandrear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 662. — R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 122. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (212). — Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4716. (genuinar.) — DC. 1845. Pr. IX. p. 285.
Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 216. 236: g. Diandr. Monogyn.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 55: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 64 (*Whitea*).
Endl. 1839. Gen. p. 718. n. 4147; 1841. Ench. p. 349. n. 4153: g. Eucyrtandrear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 749.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Cyrtandridar.

Whitlasia „Harv." Bot. Zeit. 1846. p. 843: vid. *seq.*

Whitlavia **) Harvey 1846. Lond. journ. bot. V. p. 311. t. 11. 12: nov. g. Hydrophyllacear. (W. grandiflora et minor.) *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 843 (*Whitlasia*). — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 524.

Whitleya Sweet . . . . Fl. gard. t. 125.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24 (*Withleya*): g. Solanear.
= Anisodus Link.

Wiasemskya Klotzsch . . .: nov g. Gardeniear. (Bot. Zeit. 1847. p. 594.)

Wibelia ***) Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 122: nov. g. Filicum gyratar. (Trichomanes multifidum Forst.)
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 27: g. Cathetogyratar.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 331: g. Davalliear.
Synon. Colposoria Presl.

*) Dicat. Friderico Augusto, Saxoniae regi, stirpis antiquissimae Wettiniae soboli.
**) Dicat. Franc. Whitla, Belfast.
***) Dicat. A. G. E. C. Wibel, Wertheim.

Wibelia Gärtn., Meyer & Scherb. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 97. 144: g. Semiflosculosar. (Crepis foetida L.)
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 456: subg. Crepidis. Sect.: Euwibelia, Delileocrepis.
= Barkhausiae Mönch sp.

Wibelia Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 477: g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 57. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 150. n. 644. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 794. n. 888; 1830. Gen. I. p. 194. n. 982. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 850.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5595: inter genera incognita.
= Paypayrola Aubl.

Wibelia Röhling 1813. Deutschl. Fl. II. p. 426.
Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 81.
= Willemetia Neck.

Wiborgia *) Thunb. 1800. Nov. gen. X. p. 137; 1800. Prodr. II. p. 121. 192; 1818. Fl. cap. p. 560 (Endl.): nov. g. Diadelph. Decandr. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 57. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 919. n. 1325. — Pers. 1807. Ench. II. p. 279. n. 1679.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 409. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 194.
Synon. Viborgia Spreng.; Acanthobotrya Eckl. & Zeyh.?; Acropodium Desv.?

Wiborgia Roth 1800. Catalect. II. p. 112. (W. Acmella.)
Less. 1830. Linnaea V. p. 148: g. Helianthear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 355.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 247: g. Tagetear.
Less. 1832. Syn. p. 245: g. Galinsogear.
Kunth 1838. Berol. I. p. 340: g. Galinsogiear.
Sond. 1851. Hamb. p. 456: g. Compositar.
= Galinsoga Ruiz & Pav.

Wiborgia HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 256: g. Helianthear. (V. urticaefolia.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 192; II. p. 761 (*Viborgia*). — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 492.
= Sabazia Cass.

Wichuraea Nees 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 290: nov. g. Rhamnear. (Cryptandra arbutiflora Fenzl.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 269.
Endl. 1850. Spl. V. p. 85. n. 5742/1: g. Phylicear.

Wichuraea **) Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 19. 277: g. Alströmeriear. (*Collania Herb.*, nec *Schult.*) — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 781.

Wickströmia Rchb. vid. *Wikströmia Spreng.*

Wickströmia Rchb., Bartl., Spach vid. *Wikströmia Schrad.*

Wickströmia Endl. 1833. Prodr. fl. Norfolk. p. 47: nov. g. Thymelear. (W. australis.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436.

Wickströmia Endl. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 2105. p. 332; 1841. Ench. p. 209 (*Wikströmia*): g. Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2445.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (243): g. Lagettear.
C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 356: g. Daphnear. Sect.: Euwickströmia, Capura. — Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 543 (*Wikströmia*). Sect.: Euwikströmia, Diplomorpha? — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 878.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531 (*Wikströmia*): g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 68. n. 2106/11 (*Wikströmia*): g. Eudaphnear. Sect. ut Meyer.
Synon. Capura Linn.?

Widdringtonia Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 25. n. 1795: g. Cupressinear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 135.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 31; 1847. Gen. Spl. IV. p. 2. n. 1790: g. Actinostrobear.
Synon. Pachylepis Brongn.; Parolinia Endl.

Widdringtonites Endl. 1847. Syn. Conif. p. 271; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 11. n. 1816/5: g. Cupressinear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 121.

Wiedemannia *) Fisch. & Meyer 1837. Ind. quart. sem. h. Petr. n. 2348 (Linnaea 1838. Litt. p. 174): nov. g. Labiatar.
Endl. 1838. Gen. n. 3644. p. 624; 1841. Ench. p. 308: g. Lamiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 287 (195). — Walp. 1845. Rep. III. p. 801. 987. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 503. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 326.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166: g. Stachydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4071. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 437.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Lamidar.

Wiegmannia **) Meyen 1835. Reise II. p. 139: nov. g. Rubiacear., Ernodeae proximum. (W. glauca.) — Par. Walp. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 354.
Meisn. 1838. Gen. p. 172 (119): g. Putoriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3116. p. 526; 1841. Ench. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2764. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 27 (*Wigmannia*).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Wielandia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 586: nov. g. Wielandiidear. (W. oblongifolia et elegans.)

Wielandiideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 568: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Wielandia, Savia, Poranthera, Andrachne, Stenonia, Amanoa, Briedelia, Discocarpus, Meineckia, Moacurra, Securinega, Lithoxylon, Fluggea, Bischofia, Uapaca, Richeria, Guarania, Hymenocardia, Adenocrepis, Antidesma, Stilaginella, Thecacoris, Drypetes.

*) Dicat. Er. Nilsen Wiborg, prof. Hafniensi.
**) Dicat. Dr. Wichura Vratislaviensi, botanico excellentissimo.

*) Dicat. Chr. Rud. Guil. Wiedemann, prof. Kilon.
**) Dicat. Wiegmann, prof. Berolin.

Wierzbickia Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 205. n. 7772 (Icon. Cent. XV. p. 30. t. 211. 212): nov. g. Minuartiear.
= Alsines sect. 7 Fenzl. (Endl. Spl. III. p. 92.)

Wiestia Schultz Bip. 1841. Scel. syst. Cichor. p. 4: novum g. a Lactuca separatum. *Cf.* Koch Syn. ed. II. p. 495.

Wigandia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 95. n. 172: nov. g. Siphonophytor., a Stoebe L. disjunctum.
Less. 1832. Syn. p. 362: g. Antennariear.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729: g. Leysseriear.
= Disparago Gärtn.

Wigandia *) Humb. & Bonpl. .... Pl. aequin. II. p. 234.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 126: g. Hydroleacear. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 58. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XVIII. 189. — Kunth 1823. Syn. II. p. 234. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3019. — Bartl. 1830. Ord. p. 190. — Choisy 1833. Mém. Genèv. VI. p. 115; 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 245. *Cf.* Flora Lit. V. p. 116 et Isis 1836. p. 475. — Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1966. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 251. — Endl. 1839. Gen. n. 3834. p. 661; 1841. Ench. p. 330. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (180). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 105. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 865. n. 1012; 1830. Gen. I. p. 215. n. 1111: g. Hydrolear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 922.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Hydrolaeacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 194; 1841. Nom. p. 113. n. 4400: g. Hydroleear.
Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 184: g. Namear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639: g. Hydrophyllacear.
Synon. Hydroleae sp. Ruiz & Pav.

Wigersia Leman vid. *seq.*

Wiggersia Gärtn., Meyer & Scherb. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 6. 33: nov. g. Diadelph. Decandr. (Vicia sylvatica L.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 60 (*Wigersia*).
Rchb. 1838. Consp. p. 150. n. 3919 *a*: sect. Viciae.
= Viciae Linn. pars.

Wigghia Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 366: novum nomen pro *Chaetospora Agdh.* propositum.
= Naccaria Endl.

Wightia **) Wallich 1830. Pl. As. rar. I. p. 71. t. 81: nov. g. Bignoniacear. (W. gigantea.) *Cf.* Isis 1831. p. 587. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 713. n. 4126; 1841. Ench. p. 347. n. $4128/_1$. (anomalar.)

*) Nomen in memoriam Joannis Wigand, olim episcopi Pomeraniensis.
**) Dicat. F. H. Wiggers, florae Holsatiae auctori.
***) Dicat. Rich. Wight, Madras.

Wightia Wallich cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 230: g. Bignoniear. — Par. DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123. (anomal.) — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131. — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4567. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 567.
Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207): g. Eubignoniear.
Fenzl 1841. Regensb. Denkschr. III p. 227 (Darst. 4 Pfl. Gatt. p. 75): g. Scrofularinear. anomalar. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 64.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 300; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.

Wightia Spreng. mss.
= Phyllocephalum Blume.

Wigmannia Walp. vid. *Wiegmannia Meyen.*

Wikströmia *) Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. p. 710: nov. g. Tiliaceis aff. (W. fructicosa.) — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 517.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5459 (*Wickströmia*): g. Tiliear.
Bartl. 1830. Ord. p. 335 (*Wickströmia*): g. Camelliaceis aff.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 60 (*Wickströmia*): g. Gordoniear.
= Laplacea Kunth. (Endl. Gen. p. 1020.)

Wikströmia Spreng. 1826. Syst. III. p. 355. 434. n. 2677: nov. g. Eupatorinar. (Eupatorium Dalea L.) *Cf.* Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 60. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2099 (*Wickströmia*).
= Critonia P. Browne.

Wikströmia Endl., Meisn. vid. *Wickströmia Endl.*

Wilberforcia Hook. f. mss. (nov. gen.)
= Codonanthus Don. (Walp. Ann. I. p. 522.)

Wilbrandia **) Silva Manso 1836. Cataract. Bras. p. 30.
Endl. 1843. Spl. III. p. 91. n. $5152/_1$: g. dubium Cucurbitacear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 764.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 14. 67: g. Momordicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Cucurbitear.

Wilckea Scopoli 1777. Introd. p. 170. n. 693: nov. g. Personatar. (*Mail-Elou* Hort. Malab. V. t. 1.)
= Viticis sp. Vahl?

Wilckia Scopoli 1777. Introd. p. 317. n. 1446: g. Siliquosar. (Cheiranthus maritimus L.) *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 60.
= Malcolmia R. Brown.

Wildenowa St. Hil. vid. *Willdenowa Cavan.*

Wildenowia Thunb. 1790. Act. Holm. p. 26. t. 2; 1792. Nov. gen. VI. p. 103: nov. g. Dioec. Triandr.
Thunb. 1794. Prodr. I. p. 14: g. Triandr. Monogyn.
= Willdenowia Willd.

Wilhelmsia Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5354: g. Alsinear.
= Merckia Fisch.

*) Dicat. Joh. Eman. Wikström, botanico Holmiensi.
**) Dicat. Joh. Bernh. Wilbrand, prof. Giessensi.

Wilhelmsia C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 400: nov. g. Sesleriacear. (W. caucasica.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 761: g. Pappophorear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 201.

Wilia Juss. vid. *Wylia Hoffm.*

Wilibalda *) Sternb. 1819. Flora I. p. 6: nomen pro Schmidtia utriculosa propositum.
= Coleanthus Seid.

Willdenovia Thunb. 1790. Vetensk. Ac. n. Handl. p. 26 (Reuss Rep. II. p. 204); 1818. Fl. cap. I. p. 312: g. Triandr. Monogyn.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 7 (teres).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: g. Restionear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 47. n. 220: g. Restiear.
= Willdenowia Willd.

Willdenovia **) Gmel. 1791. Syst. p. 362: g. Pentandr. Monogyn.
= Rondeletia Plum.

Willdenowa Cavan. 1791. Icon. I. p. 61. t. 89: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (W. glandulosa.) *Cf.* Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 61.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 414 (*Wildenowa*): g. Corymbiferar.
= Adenophyllum Pers.

Willdenowia „Thunb. em." Willd. 1805. Spec. IV. p. 717. n. 1765: g. Dioec. Triandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 606. n. 2189.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 187; 1825. Syst. I. p. 188. n. 211: g. Restiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 156. — Poir. 1827. Dict. v. 45. p. 278 (*Restiole*). — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Endl. 1837. Gen. n. 1012. p. 121; 1841. Ench. p. 67. Sect: Willdenowia, Hypodiscus, Leucoplocus, Mesanthus. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1501. Sect. caed. excluso Mesantho. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12.
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Restionear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1140. — Bartl. 1830. Ord. p. 36. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139.
Synon. Wildenowia Thunb.; Willdenovia Thunb.

Willdenowia Nees 1830. Linnaea V. p. 664: g. Restiacear. restrict. (W. teres.) — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 452. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 262.
Endl. 1837. Gen. n. 1012 *a.* p. 121; 1841. Ench. p. 67: sect. Willdenowiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1501. I.
Synon. Nematanthus Nees.

Willemeta Gmel. vid. *Willemetia Märkl.*

Willemetia *) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 50. n. 90: nov. g. Glossariphytor.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422. 427; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear. verar.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2161; 1831. Fl. exc. p. 269: g. Scorzonerear.
Monnier 1829. Hierac. p. 80. *Cf.* Flora Litt. I. p. 76.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 136. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 150. — Endl. 1838. Gen. n. 3011. p. 499; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 236 (144). — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 817. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Koch 1837. Syn. p. 427. Ed. II. p. 491: g. Chondrillear.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3722: g. Picridiear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 269: g. Liguliflorar.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 315: g. Crepoidear.
Synon. Wibelia Röhl.; Calycocorsus Schmidt; Aspideium et Peltidium Zollik.; Zollikoferia Nees; Hieracii sp. Jacq.

Willemetia **) Märklin 1800 in Schrad. Journ. I. p. 329: nov. g. ex typo Chenopodii arenarii Hoffm.
Gmel. 1805. Fl. Bad. I. p. 401. 576 (*Willemeta*): g. Pentandr. Digyn.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 415: sect. Kochiae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 604. Ed. II. p. 695.
Moq.-Tand. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 206 (*Villemetia*): g. Chenopodear.
= Echinopsilon Moq-Tand.

Willemetia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 409 in adnot. Ed. Nees p. 265: g. a Kochia Roth separandum proponit.
= Kochia Roth.

Willemetia ***) Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 370: nov. g. Rhamnear. (Ceanothus africanus L.) *Cf.* Soyer-Willemet 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 128. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 38. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 462.
= Noltea Rchb.

Williamia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 559: nov. g. Stachystemonear. (Phyllanthus pruinosus Pöpp.)

Willibalda „Sternb." Endl. in synon. Coleanthi: vid. *Wilibalda Sternb.*

Willichia „Mutis" Linn. 1771. Mant. II. p. 553. n. 1337: g. Triandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 74. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 74; 1784. Syst. p. 82. — Reich. 1778. Gen. p. 25. n. 54. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 32. n. 67. — Pers. 1797. Syst. p. 83; 1805. Ench. I. p. 40. n. 87. — Willd. 1797. Sp. I. p. 189. n. 83. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 340. — Vahl 1806. Enum. II. p. 39. n. 90. —

*) Dicat. Willibaldo Schmidt.
**) Dicat. C. L. Willdenow, prof. Berolin.

*) Dicat. Remi Willemet.
**) Dicat. Pierre-Remi-François de Paule Willemet.
***) Dicat. Soyer-Willemet, Nancy.

Willichia Mutis cont.
Hedw. 1806. Gen. p. 30. 358. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 346. 527. n. 154.
Murr. 1774. Syst. p. 138: denuo in Tetrandr. Monogyn.
Scop. 1777. Intr. p. 182: g. Luridar.
Juss. 1789. Gen. p. 418: g. pl. incertae class.
Neck. 1790. El. II. p. 5. n. 609: g. Darinyphytor.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 281. n. 204; 1830. Gen. I. p. 42. n. 194: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 177.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum. (*Synon. Hydranthelium HBK.*)
= Sibthorpia Linn.? (Benth. in DC. Pr. X. p. 427.)

Willisellus Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 736: nomen perperam pro *Elatine Linn.* substitutum. (ob Elatinem Dill.)

Willoughbeja Batsch vid. *Willughbeia Scop.*

Willugbaeya Necker 1790. Elem. bot. I. p. 82. n. 147: nov. g. Siphoniphytor., ab Eupatorio L. disjunctum.
= . . . ?

Willugbeia Dumort., Steud. vid. *Willughbeia Roxb.*

Willughbeia *) Scopoli 1778 (ex Spreng.)
Schreb. 1789. Gen. I. p. 162. n. 417: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 434. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1231. n. 478.
Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 201 (*Willoughbeja*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 672. n. 740; 1830. Gen. I. p. 160. n. 803.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 495: g. Carissear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 714: g. Solanear.
= Ambelania Aubl.

Willughbeia Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 77. t. 280: nov. g. Apocinear. (W. edulis.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 472.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1023: g. Apocynear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 787 (*Willugbeia*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26 (*Willugbeia*): g. Carissear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3381. p. 579; 1841. Ench. p. 293. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 509. — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5199. (genuinar.)
Roxb. 1832. Ind. II. p. 57: g. Pentandr. Digyn.
Wall. 1832. Pl. As. rar. III. p. 45. t. 272.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 101: g. Melodiniear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 321: g. Willughbeiar. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 153.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 389: g. Willughbeiear.
Synon. Ancylocladus Wall.

*) Dicat. Franc. Willoughby.

Willughbeiae A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 318: trib. Apocynacear. Subtrib.: Allamandeae, *Willughbeiae* (gen.: Chilocarpus, Landolphia?, Willughbeia, Couma, Collophora?, Pacouria?). — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601. Gen. ut A. DC.

Willughbeieae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 388: trib. Apocynear. Subtrib.: Allamandeae, Willughbeieae.

Wilsonia *) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 490. Ed. Nees p. 346: nov. g. Convolvulacear. (W. humilis.) — Par. Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 75. — Bartl. 1830. Ord. p. 192.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXII. 304. n. 693: g. Convolvulor.
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2997; 1841. Nom. p. 114. n. 4425: g. Convolvulear. (genuinar.) — Par. Choisy 1833. Mém. Genèv. VI. p. 496 (*cf.* Flora Lit. V. p. 137); 1845 in DC. Pr. IX. p. 450. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 302. — Endl. 1839. Gen. n. 3790. p. 652; 1841. Ench. p. 323. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.

Wilsonia **) Gill. & Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 172. t. 49: nov. g. Verbenacear. (W. glaberrima.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 795. n. 4124: g. Verbenear.
= Dipyrena Hook.

Wimmeria ***) Schlechtend. & Cham. 1831. Linnaea VI. p. 427: nov. g. Celastrinar. (W. concolor et discolor.)
Meisn. 1837. Gen. p. 68 (49): g. Evonymear.
Endl. 1840. Gen. n. 5684. p. 1087; 1841. Ench. p. 575: g. Elaeodendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7892. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588.

Winchia †) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 326 (Deless. Ic. sel. V): nov. g. Eucarissear. (Alyxia glaucescens G. Don.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Carissear.

Windmannia P. Browne 1756. Jamaic. p. 212: nov. g. Octandr. Digyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
= Weinmannia Linn.

Windsora Juss., Leman 1829. Dict. v. 59. p. 76: vid. *seq.*

Windsoria ††) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 70: nov. g. Triandr. Digyn. (Poa sesleroides Michx.)
Endl. 1837. Gen n. 872 *b.* p. 98; 1841. Ench. p. 59: sect. Uralepidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1223. 2.
= Tricuspis Palis.

Winkleria †††) Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 236: novum nomen pro *Platynema Schrad.* propositum.

*) Dicat. „in memoriam Joannis Wilson, auctoris operis a synopsis of british plants in Ray's method."
**) Dicat. Wm. Wilson, Harrington.
***) Dicat. Fr. Wimmer, florae silesiacae auctori.
†) Dicat. N. J. Winch.
††) Dicat. John Windsor.
†††) Dicat. cl. Winkler, Lipsiensi.

Wintera *) Murray 1784. Syst. p. 417. n. 1403: g. Polyandr. Polygyn. (pro *Drimyde Forst.* propositum.) — Par. Pers. 1797. Syst. p. 543.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 368. n. 929: g. Polyandr. Tetragyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 1239. n. 1063. — Cram. 1803. Disp. p. 140. — Pers. 1807. Ench. II. p. 84. n. 1329.
Gmel. 1791. Syst. p. 852: g. Polyandr. Octogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 116: g. Magnoliar. — Par. Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 205. t. 58. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 682.
DC. 1818. Syst. I. p. 443; 1824. Pr. I. p. 78: sect. Drimydis. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 79.
R. Brown 1818 mss. in DC. Syst. I. p. 548: g. Winterear.
Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4968 b: sect. Drymidis.
= Drimys Forst.

Winteraceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 17.
= Illicieae DC.

Winterana Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1045. 1370. n. 1140; 1764. Gen. ed. VI. p. 238. n. 598: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 244. n. 653.
Adans. 1763. Fam. II. p. 345: g. Pistaciar.
Gis. 1792. Prael. p. 306: g. Holoracear.
= Winterania Linn.

Winterana Sol.... Med. obs. V. p. 46. t. 1.
= Drimys Forst. (Endl. Gen. p. 839.)

Winteraneae Sieb. & Zuccar. 1836. Fl. japon. I. p. 83. Novum gen.: Trochodendron.
= Wintereae R. Brown.

Winterania Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 488: g. indefinitum. (Winteranus cortex Clus.) *Cf. Winterana Linn.*
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 636; 1767. Syst. ed. XII. p. 326: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 369. — Lour. 1790. Coch. I. p. 293. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 76.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear.
Gled. 1764. Syst. p. 139. n. 586: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 286: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 263: g. Meliar.
Neck. 1790. El. II. p. 430. n. 1256: g. Comizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 40: g. Meliacear.
= Canella P. Browne.

Wintereae R. Brown mss. 1818 in DC. Syst. I. p. 548: novus ordo plant. Gen.: Tasmannia, Illicium, Wintera.
Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (17) Thalamiflorar. apocarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo Anonalium.
Meisn. 1837. Gen. p. 3 (5): trib. Magnoliacear. Gen.: Illicium, Temus, Drimys, Tasmannia. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 73. Gen.: Illicium.

Wintereae R. Brown cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419: subordo Magnoliacear. Gen. ut Meisn. et Trochodendron.
= Illicieae DC.

Wintereae Rchb. 1837. Handb. p. 278; 1841. Nomencl. p. 92: sect. Illiciear. Gen.: Drymis, Temus.

Winterineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 433. 435: sect. Illiciear. Gen.: Temus, Drymis, Tasmannia.

Winterlia *) Mönch 1794. Meth. p. 74: g. Thalamostemonis. (Prinos glaber L.)
Cram. 1803. Disp. p. 39: g. Tetrandr. Monogyn.
DC. 1825. Pr. II. p. 17: sect. Prinos. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3626 c. — Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. 60.

Winterlia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 27: nov. g. pl. (*Panel Rheede* II. t. 9.)
= Limonia Linn.

Winterlia Spreng. 1825. Syst. I. p. 519. 788. n. 864; 1830. Gen. I. p. 183. n. 927: nov. g. Caryophyllear. (Sellowia uliginosa Roth.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 821.
Meisn. 1837. Gen. p. 25 (22): g. Alsinear.? et p. 132 (97) Illecebrear.?
Endl. 1839. Gen. n. 5204. p. 958; 1841. Ench. p. 504: g. Illecebrear. dubium.
Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6284: g. Herniariear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.?
= Sellowia Roth. (DC. — Nonne suspicantibus Wight & Arn. [conf. Endl. Gen. p. 1200. n. 6146 *a*] ad Ammanniam referenda?)

Wirtgenia **) Schultz Bip. 1842. Flora II. p. 433: nov. g. Podopterotheceear.
Meisn. 1843. Comm. p. 361: g. Ecliptear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 146.

Wirtgenia Junghuhn mss. teste Hassk. 1842. Flora II. Beibl. p. 45.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467: g. Anacardiacear.?
= Spondias Linn.?

Wisenia Gmel. vid. *Visenia Houtt.*

Wislizenia Engelm. 1848. Sketch bot. Wisliz. p. 99: nov. g. Capparidear. (W. refracta.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 823: gen. Notorhizeum Lepidineum? Oxystyli aff.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 224: g. Cleomear.

Wissadula Medic. 1787. Malv. p. 24: nov. g. Malvar. (Sida periplocifolia L.) *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 254.
Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 117. t. 49: g. Sidear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5295. p. 986; 1841. Ench. p. 512. — Meisn. 1843. Comm. p. 343. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370.
Rchb. 1841. Nom. p. 200. n. 7639: g. Lagunaecear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 201 (*Wissadulla*): g. Malvaceear. — Par. Hook. f. 1849. Niger Fl. p. 229.

*) Dicat. W. Winter, peregrinatori.

*) Dicat. J. J. Winterl, prof. Pestin.
**) Dicat. Ph. Wirtgen, botanico rhenano.

Wissadulla Hassk. vid. *praeced.*

Wistaria „Nutt. em." Spreng. 1826. Syst. III. p. 255. n. 2566: g. Leguminosar.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 348: g. Phaseolear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 283: g. Euphaseolear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Galegear.
Synon. Wisteria Nutt.; Thyrsanthus Ell.; Kraunhia Rafin.; Phaseoloides Ht. Angl.

Wisteria *) Nuttall 1818. Gen. am. II. p. 115: nov. g. Diadelph. Decandr. (Glycine frutescens W.)
DC. 1825. Pr. II. p. 389 (Lég. mém. IX): g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3936. — Bartl. 1830. Ord. p. 112. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 320. — Meisn. 1837. Gen. p. 92 (66). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 302.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 583. n. 2861: g. Leguminosar.
Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. I. p. 88. t. 43—45.
Endl. 1841. Gen. n. 6671. p. 1296; 1841. Ench. p. 672: g. Wisteriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5829.
= Wistaria Spreng.

Wisterieae Endl. 1841. Gen. p. 1296; 1841. Ench. p. 692: subtrib. Phaseolear. Gen.: Wisteria, Cyrtotropis, Apios. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 150: sect. Glycinear. Gen. ead.

Withamia Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 102. n. 13; 1845. Syn. pl. foss. p. 261; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIX: g. lignorum fossilium dubiae affinitatis.

Withania Pauquy 1824. Diss. de Bellad. (Fér. Bull. sc. nat. V. p. 254.)
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3306 (*Witharia*): g. Solanear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3858. p. 666; 1841. Ench. p. 332. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57. — Walp. 1845. Rep. III. p. 104; 1852. Ann. bot. III. p. 170.
Bartl. 1830. Ord. p. 194 (*Witharia*): g. Solanacear. — Par. Rchb. f. .... in Webb Canar. III. p. 283.
Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4747: g. Atropear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179; 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 225: g. Physalear. Char. emend.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 453: g. Solaninear. Sect.: Hypnoticum, Puneeria, Pseudowithania, Withania, Athenaea.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 665: subg. Physalidis.
Synon. Hypnoticum Rod.; Puneeria Stocks; Atropae sp. Linn.; Physalidis sp. Cav.

*) Dicat. Casp. Wistar.

Witharia Rchb., Bartl. vid. *praeced.*

Witheringia *) L'Herit. 1788. Sert. Angl. I. p. 33. t. 1.
Juss. 1789. Gen. p. 450; 1827. Dict. v. 49. p. 409: g. Solanear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 289. — Hedw. 1806. Gen. p. 56. 368. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 454; 1825. Syst. I. p. 675. n. 744; 1830. Gen. I. p. 159. n. 797. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 13. — Kunth 1823. Syn. II. p. 154. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3295; 1841. Nom. p. 122. n. 4759. (genuinar.) — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 79. — Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 73. t. 227—229. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 452. — Endl. 1839. Gen. n. 3853. p. 665; 1841. Ench. p. 332. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 711. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57. — Walp. 1845. Rep. III. p. 29. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 303.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 791. n. 1725: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 247. — Willd. 1797. Sp. I. p. 622. n. 211. — Pers. 1805. Ench. I. p. 133. n. 270.
Gis. 1792. Prael. p. 284: g. Luridar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 195.
Dunal 1813. Solan. p. 107; 1816. Synops. p. 1: g. Solanor.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 4. 100. 522. n. 425: g. Solanacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 194. — Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 123.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
(Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 144 speciem typicam ad Saracham refert.)
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 402: g. Solaninear.
Synon. Solani sp. Linn.

Witheringia Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 145: g. emend. Solanacear. (ibid. p. 179 Witheringiear.)
= Athenaea Sonder.

Witheringieae Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 179: trib. Solanacear. Gen.: Witheringia, Capsicum, Brachistus, Saracha, Discopodium, Puneera, Aureliana, Sichlera.

Withleya Dumort. vid. *Whitleya Sweet.*

Witsena Thunb., Pers. vid. *Witsenia Thunb.*

Witseneae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 309: ordo Monocotyledonum. Gen.: Tigridia, Sisyrinchium, Hydastylis, Galatea, Patersonia, Nivenia, Witsenia, Cleanthe, Aristea, Pardanthus, Bobartia, Hexaglottis, Galaxia.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 323: sect. Iridear. Gen.: Sisyrinchium, Tigridia. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 315.

Witsenia **) Thunb. 1782. Nov. gen. II. p. 33 (*Witsena*); 1794. Prodr. I. p. 7; 1818. Fl. cap. I. p. 255: nov. g. Triandr. Mono-

*) Dicat. Will. Withering, botanico Birmingham.
**) Dicat. Nic. Witsen, botanophilo batavo.

Witsenia Thunb. cont.
gyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 83. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 37. n. 83. — Gmel. 1791. Syst. p. 107. — Pers. 1797. Syst. p. 84; 1805. Ench. I. p. 42. n. 98 (*Witsena*). — Willd. 1797. Sp. I. p. 247. n. 101. — Vahl 1806. Enum. II. p. 47. n. 95. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. nr. 5.
Juss. 1789. Gen. p. 59: g. Iridum.
Neck. 1790. El. III. p. 200. n. 1570: g. Gonoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 170: g. Ensatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Kon. Ann. bot. I. p. 236.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 148: g. Iridear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 27. 355. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 341. 370. n. 124. — Link 1821. En. I. p. 445. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 83. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1233. p. 167; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 161. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1573. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 22.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 312: g. Witsenear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 251; 1825. Syst. I. p. 147. n. 147; 1830. Gen. I. p. 36. n. 159: g. Spathacear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 170: g. Haemodorear.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1183: g. Ferrariear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Ixiear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 97.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Tapeinia Comm.?; Nivenia Vent.; Genlisia Rchb.; Sophronia Licht.?

Wittea Kunth 1850 in Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 32: novum nomen pro *Clintonia Lindl.* propositum.

Wittelsbachia *) Martius & Zuccar. 1824. Flora I. Beil. p. 142; 1824. Nov. gen. I. p. 80. t. 55: nov. g. inter Bombaceas et Gordonieas medium. (Maximilianea regia Mart. & Schrank.)
= Cochlospermum Kunth.

Wodur Anders. (mss.?)
= Odina Roxb. (Endl. Gen. p. 1129.)

Wolffia „Horkel mss." Schleiden 1839. Linnaea XIII. p. 389: g. Lemnacear. (Lemna hyalina Delile.) — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 4 (*Wolfia*). — Endl. 1841. Spl. I. n. 1668. p. 1369; 1841. Ench. p. 126. — Meisn. 1842. Gen. p. 363 (271). — Wedd. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 155. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 221.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1129 (*Wolfia*): g. Lemnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 125: g. Pistiacear.
Synon. Horkelia Rchb.

Wolfia Schreb. 1791. Gen. II. p. 801. n. 1749: g. Octandr. Monogyn.
= Anavinga Lam. (Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 85.)

Wolfia Spreng. 1825. Syst. I. p. 808. n. 904: nov. g. Pentandr. Monogyn. familiae incertae. (W. brasiliensis.)
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5596: inter genera vix cognita.
= . . . ?

Wolfia Endl. 1837. Gen. p. 232. n. 1668 *a*: sect. Lemnae. (L. minor L.)
= Lemna Schleid.

Wolfia Kunth, Rchb. vid. *Wolffia Hork.*

Wollastonia *) „DC." Decaisne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 414: nov. g. Compositar. (Buphthalmum helianthoides Forst.)
DC. 1836. Pr. V. p. 546: g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2502. p. 407; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3133. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 70: g. Helianthear.
Synon. Wedeliae sp. Less.; Verbesinae sp. Gaudich., Blume; Ecliptae sp. Wall.

Woodfordia Salisb. . . . Parad. t. 42.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 709: g. Salicariar.
= Grislea Löfl.

Woodsia **) R. Brown 1812. Linn. Trans. XI. p. 170 (Verm. bot. Schr. II. p. 675): nov. g. Filicum. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 250. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 318. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 125. n. 3277; 1831. Gen. II. p. 725. n. 3671. (verar.) — Leman 1829. Dict. v. 59. p. 89. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 330. (verar.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 17: g. Cyathear. — Par. Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67.
Kaulf. 1824. En. Fil. p. 251: g. Polypodiacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 975. (nudar.) — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 320. (nudar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 717: g. Woodsiear. — Par. Hook. 1844. Sp. Filic. I. p. 59. Subgen.: Physematium, Perrinia, Woodsia. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 798. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 13: sect. Polypodii.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rhizospermar.
Endl. 1836. Gen. n. 646. p. 63; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1036. — Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 304. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 629. (nudar.)
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 134: g. Dryopteridear.
J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 191: g. Aspidiear.

*) „Domum veneraturi Wittelsbachiorum Heroum etc., hoc genus appellavimus".

*) Dicat. Will. Hyde Wollaston, chemico.
**) Dicat. Jos. Woods, botanico.

Woodsia R. Brown cont.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (345): g. Dicksoniear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 337. Sect.: Woodsia, Physematium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 97: g. Aspidiacear.
Synon. Physematium Kaulf.; Polypodii sp. Sw.

Woodsieae Rchb. 1828. Consp. p. 38: subdiv. Polypodiacear. indusiatar. Gen.: Woodsia, Niphobolus, Pleopeltis, Nothochlaena.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 58: subtrib. Dicksoniear. Gen.: Sphaeropteris, Diacalpe, Arachniodes, Woodsia.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: div. Polypodiacear. Gen.: Hypoderris, Onoclea, Cystopteris, Woodsia, Physematium, Diacalpe, Sphaeropteris.
Conf. Peranemaceae Presl.

Woodvillea *) DC. 1836. Prodr. V. p. 318: nov. g. Psiadiear. (W. calendulacea.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2367. p. 383; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3322. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.?
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (*Woodwillea*): g. Euasterear.

Woodwardia **) Smith 1791. Act. Ac. Turin. V. p. 411; 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 52; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 100: nov. g. Filicum. (dorsiferar.) — Par. Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 5. 76 (annulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 116. (gyratar.) — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 263. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 45. — Willd. 1809. En. p. 1075; 1810. Sp. V. p. 416. n. 1973. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 252. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 94. n. 3263; 1831. Gen. II. p. 723. n. 3656. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 285. — Leman 1829. Dict. v. 59. p. 90.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 33: g. Cathetogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 30: g. Gyrator.
Link 1822. En. II. p. 463: g. Polypodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80.
Agdh. 1822. Aphor. p. 117: g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 163. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 53. — D. Don 1825. Nepal. p. 12. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 196. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (indusiatar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 4.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Doodiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 713: g. Blechnoidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Asplenicear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 79. — Webb 1850. Canar. III. p. 444. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 206. Sect.: Euwoodwardia, Doodya.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Presl 1836. Pterid. p. 99: g. Blechnacear.
Endl. 1836. Gen. n. 633. p. 62; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1020.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 80: g. Aspleniacear. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 65.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 169: g. Pteridear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 432 (333).

Woodwardites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 175. 288. t. 21: nov. g. Pecopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. p. 77; 1846. Chlor. prot. p. XLIV. 123. t. 37. f. 4.
Endl. 1841. Ench. p. 43. n. $687/_{16}$: g. Filicum foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 79.

Woodwillea Schultz Bip. vid. *Woodvillea DC.*

Wormbia Dietr. vid. *seq.*

Wormia *) Rottböll 1783. Nye Saml. Vid. selsk. Skrivt. II. p. 532: nov. g. plant. (W. triquetra.)
Gmel. 1791. Syst. p. 851: g. Polyandr. Pentagyn.
DC. 1818. Syst. I. p. 433; 1824. Pr. I. p. 75: g. Dillenear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 76. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 631. n. 2010; 1830. Gen. I. p. 454. n. 2238: g. Dilleniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (5). — Endl. 1839. Gen. n. 4750. p. 841; 1841. Ench. p. 431. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 293 (*Wormbia*). — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 66. Sect.: Capellia, Euwormia. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 34.
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4986; 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7281: g. Hibbertiear. (genuinar.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: g. Dilleniacear. — Par. Jack 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 221.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413: g. Hibbertinear.
Synon. Clugnia Comm.; Lenidia Pet.-Th.; Capellia Blume; Dilleniae sp. Thunb.

Wormia Vahl 1810. Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 104: nov. g. plant. (W. hamata.) = Bigamea Kön.

Wormskioldia **) Schumacher 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1828. Danske Vid. Selsk. Afh. III. p. 165: nov. g. plant. (W. heterophylla = Raphanus pilosus W.)
A. Rich. 1832. Fl. Seneg. I. p. 36: g. Droseracear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 22 (19).

*) In memoriam Guil. Woodville, auctoris operis „Medical botany 1790—1793."
**) Dicat. Thom. Jenkinson Woodward.

*) Dicat. Cl. Worm, medico Lund.
**) Dicat. M. de Wormskiold, peregrinatori.

Wormskioldia Schumacher cont.
Endl. 1839. Gen. n. 5058. p. 915; 1841. Ench. p. 476: g. Turneracear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 230.
Rchb. 1841. Nom. p. 160. n. 6235: g. Turnerear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 340: g. Frankeniacear.
Synon. Tricliceras DC.; Schumacheria Spreng.; Streptopetalum Hochst.?; Cleomes sp. DC.

Wormskioldia Spreng. 1827. Syst. IV. p. 331. n. 3399; 1831. Gen. II. p. 749. n. 3797: nov. g. Floridar. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 92.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 501: g. Halymeniacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 94: g. Chondrothamnior.
= Hypoglossum Kütz.

Wormskioldia Postels & Rupr. 1840. Illustr. Alg. p. 15.
= Cryptopleura Kütz.

Wormskioldieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear. (*Delesserieae Kütz. 1843.*)

Wrangelia *) Agardh 1828. Spec. Alg. II. 1. p. 136; 1841. Linnaea XV. p. 37: nov. g. Ceramiear. (Griffitsia penicillata Ag.) — Par. Duby 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 17. — Endl. 1836. Gen. n. 64. p. 5; 1841. Ench. p. 3; 1843. Spl. III. p. 35. n. $122/_{18}$. — Menegh. 1838. Cenni p. 31. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 701. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 78. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358. (Flora 1843. p. 98.) — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 141. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XIII. p. 305.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 100; 1843. Phyc. gener. p. 376; 1845. Phyc. germ. p. 288; 1849. Sp. Alg. p. 664. n. 437: g. Callithamniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Ceramear.
Derb. & Sol. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 273: g. Antherozoidear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 142; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 236: g. Wrangeliaccar.
Synon. Warrenia Harv.

Wrangeliaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 141: ordo Desmiospermear. Gen.: Wrangelia.

Wrangelieae J. Agardh . . . . Spec. II. p. 701.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 104: trib. Centrothalamar.

Wredowia Ecklon 1827. Verz. p. 16: nov. g. Iridear., inter Sisyrinchium et Aristeam medium. (Moraea pulchra Aut.)
= Aristea Sol. (Endl. Gen. p. 167.)

Wrightea **) Roxb. 1832. Fl. Ind. III. p. 621: nov. g. Monoec. Hexandr. (W. caryotoides.)
= Wallichia Roxb.

*) Dicat. F. A. Wrangel, phycologo danico.
**) Dicat. Dr. Will. Wright, Edinb.

Wrightea Juss. vid. *Wrightia R. Brown.*

Wrighteae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 601: trib. Apocynacear. Gen.: Wrightia, Kixia, Alstonia, Blaberopus, Adenium et Echiteae A. DC. (accedente Mandervilla.)

Wrightia *) R. Brown 1809. Mem Wern. Soc. I. p. 73 (Verm. bot. Schr. II. p. 409); 1810. Prodr. I. p. 467. Ed. Nees p. 323: nov. g. Apocynear. (Nerium zeylanicum L.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 491; 1830. Gen. I. p. 147. n. 735. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXV. 413. n. 749. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1045. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 96. — Link 1829. Hdb. I. p. 429.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 638. n. 694: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 654.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3532: g. Echitear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Brongn. 1843. En. genr. p. 52.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 85: g. Wrightiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3429. p. 586; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 532. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5187. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 404. Sect.: Bammatophyton, Walidda. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 305. Sect. eaed. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 431. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.
Synon. Nerium Gärtn.

Wrightia Sol. vid. *Wrigtia Soland.*

Wrightieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 70. 85: trib. Apocynear. Gen.: Wrightia, Kibatalia. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. 532. Gen. ut Endl. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). Gen. ead.
Endl. 1838. Gen. p. 586; 1841. Ench. p. 295: trib. Euapocynear. Gen.: Wrightia, Kixia.
Rchb. 1841. Nom. p. 134: sect.Neriear. Gen. ead.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 404: trib. Apocynacear. Gen. ead.

Wrigtia (an *Wrightia*?) Soland. mss.
= Meriania Swartz.

Würschmittia *) Schultz Bip. mss. in Schimp. fl. abyss. nr. 334; 1841. Flora Erg. Bl. p. 27: nov. g. Coreopsidear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 161.
Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3127: g. Heliopsidear.

Würthia Regel 1851. Bot. Zeit. p. 595: nov. g. Iridear., Sparaxidi aff. (W. elegans.)

Wulfenia ***) Jacq. 1781. Miscell. austr. II. p. 60. t. 8. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 58. p. 512 (*Vulfenia*).
Murr. 1784. Syst. p. 65: g. Diandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 16. n. 34. — Gmel. 1791. Syst. p. 40. — Willd. 1797. Sp. I. p. 78. n. 46; 1809. En.

*) Dicat. Dr. Will. Wright, medico et botanico Jamaic.
**) Dicat. Ad. Br. Würschmitt.
***) Dicat. Fr. Xav. de Wulfen, Klagenfurt.

Wulfenia Jacq. cont.
p. 24. — Pers. 1797. Syst. p. 66; 1805. Ench. I. p. 14. n. 50. — Vahl 1805. Enum. I. p. 86. n. 30. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 47. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 339.
Neck. 1790. El. I. p. 322. n. 516: g. Chasmatophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 192: g. Personatar. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 56. 177. n. 83. — Link 1821. En. I. p. 27. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 42. n. 83; 1830. Gen. I. p. 20. n. 79 (*Wulffenia*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 63.
Smith 1802. Linn. Trans. VI. p. 96.
Schrank 1814. Denkschr. Ak. Münch. f. 1813. p. 61.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 388: (*Wulffenia*): g. Primulear.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 97: g. Pederotiae.
D. Don 1825. Nepal. p. 92: g. Scrophularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3067; 1837. Hdb. p. 198; 1841. Nom. p. 115. n. 4475: g. Veronicear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23. — Benth. 1835. Scroph. ind. p. 46; 1835. Scroph. rev. p. 5. — D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 580. — Endl. 1839. Gen. n. 3982. p. 688; 1841. Ench. p. 340. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 102. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 61.
Link 1829. Hdb. I. p. 544: g. Scrofularinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 171: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 373. — Koch 1837. Syn. p. 532. Ed. II. p. 612.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 455; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Digitalear.

Wulffenia Spreng. vid. *Wulfenia Jacq.*

Wulffia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 35. n. 66: nov. g. Actinophytor., a Coreopside L. sejunctum.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 398. 403; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2668; 1841. Nom. p. 92. n. 3622. — DC. 1836. Pr. V. p. 563. — Endl. 1838. Gen. n. 2521. p. 410; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
Synon. Chylodia Rich.; Gymnoloma Ker; Crodisperma (an Cordisperma?) Poit.; Chakiatella et Chatiakella Cass.

Wurdemannia Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 245 (Flora 1853. p. 677): nov. g. Rhodospermear. An Gelidiacear.?

Wurfbainia *) Giseke 1792 in Linn. Prael. p. 199. 206. 226. 245: nov. g. Scitaminear. (Amomum uliginosum Kön.)
= Amomi Linn. pars.

*) Dicat. J. S. Wurfbain,

Wurmbaea Steud. vid. *seq.*

Wurmbea *) Thunb. 1781. Nov. gen. I. p. 18: nov. g. Hexandr. Trigyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 348. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 239. n. 617. — Gmel. 1791. Syst. p. 587. — Pers. 1797. Syst. p. 370; 1805. Ench. I. p. 396. n. 880. — Willd. 1799. Sp. II. p. 265. n. 703.
Neck. 1790. El. III. p. 191. n. 1555: g. Gonoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 283: g. Coronariar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 115: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 249. n. 1013.
Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 25: g. Liliacear.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 330: g. Uvularear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 193; 1825. Syst. II. p. 147. n. 1373: g. Juncear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 789 (*Wurmbaea*).
Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. — Endl. 1837. Gen. n. 1075. p. 136; 1841. Ench. p. 79. — Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.
Schlechtend. 1826. Linnaea I. p. 82: g. Melanthiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1296: g. Heloniear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 97: g. Colchicear.
Bartl. 1830. Ord. p. 52: g. Colchicacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 287. n. 1487: g. Melanthacear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. C. 1540. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1207.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1707: g. Uvulariear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 159: g. Melanthiear.

Wyattia **) Trevisan 1842. Syn. gen. Alg.; 1849. Linnaea XXII. p. 437: g. Scytosiphonear. (Asperococcus pusillus Carm.)
Synon. Chlorosiphon Kütz.

Wydleria ***) DC. 1829. Mém. V. p. 36. t. 7; 1830. Prodr. IV. p. 103: nov. g. Amminear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 280. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220 (genuinar.); 1841. Nom. p. 139. n. 5379. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4395. p. 769; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 941. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Wyethia †) Nuttall 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 38; 1841. Am. phil. trans. n. ser.

*) Dicat. Fr. v. Wurmbs, Batav.
**) Dicat. Mariae Wyatt.
***) Dicat. Henr. Wydler, prof. Genevensi, tum Bernensi.
†) Dicat. N. B. Wyeth, detectori.

Wyethia Nuttall cont.
VII. p. 351: nov. g. Heliopsidear. Subgen.: Alarçonia. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 299. — Endl. 1842. Spl. II. p. 42. n. 2495. — Walp. 1843. Rep. II. p. 608.
Synon. Alarçonia DC.

Wylia *) Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 3; 1816. I. p. 3: nov. g. Umbelliferar. (Scandix australis L.)
Duby 1828. Bot. gall. I. p. 240: sect. Scandicis. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 221. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 363. — Koch 1836. Syn. p. 315. Ed. II. p. 346. — Endl. 1839. Gen. n. 4504 *b*. p. 786; 1841. Ench. p. 380. — Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5319. 2. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 369. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 345. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 740.
Synon. Anisomarathrum Col.

X.

Xanthacarpia Massal. (?), vid. *Xanthocarpia*.

Xanthaea *) Rchb. 1831. Fl. exc. p. 442: sect. Erythraeae. (E. maritima et lutea.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3543 *b*. p. 603 (*Xanthea*); 1841. Ench. p. 302. — Griseb. 1839. Gent. gen. p. 148; 1844. Rumel. II. p. 62; 1845 in DC. Pr. IX. p. 60.
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5090: g. Erythraeariar.

Xanthanthus Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 116: sect. Chlorae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3547 *a*. p. 1399; 1841. Ench. p. 302.
= Chlora Griseb. in DC. Pr. IX. p. 60.

Xanthaparine DC. 1830. Prodr. IV. p. 606: sect. Galii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3100 *d*. p. 523; 1841. Ench. p. 271.

Xanthe Schreb. 1791. Gen. II. p. 710. n. 1561: g. Dioec. Syngenes.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 877. n. 1855: g. Dioec. Monadelph. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 636. n. 2302.
= Quapoya Aubl.

Xanthea Endl. vid. *Xanthaea Rchb.*

Xantheum Wight vid. *Xanthium Tourn.*

Xanthidium Ehrenb. 1833. Abh. Berl. Ak. p. 317: nov. g. Volvocinor.
Ehrenb. 1838. Infus. p. 146; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 217: g. Bacillarior.
Menegh. 1840. Linnaea XIV. p. 223: g. Desmidiear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phyc. gener. p. 162; 1849. Sp. Alg. p. 177. n. 130. — Ralfs 1845. Trans. bot. soc. II. p. 119. (Bot. Zeit. 1846. p. 497.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 55. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 307.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Eumicrasteriear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.

Xanthieae Rchb. 1828. Consp. p. 113: subdiv. Ambrosiacear. Gen.: Xanthium.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 293: div. Cucurbitacear. Gen. id. et Ambrosia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 182: subdiv. Syncarpicar.

Xanthioides DC. 1836. Prodr. V. p. 521: sect. Acanthospermi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2479 *a*. p. 403; 1841. Ench. p. 237.

Xanthiophaea „Martius mss." Benth. 1833. Labiat. p. 97; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 96: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 693. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *k*. p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 10. — Walp. 1845. Rep. III. p. 538.
Synon. Rhaphiodon Schauer.

Xanthiophoea Steud. Nom. II. p. 790: vid. *praeced.*

Xanthiopsis DC. 1836. Prodr. V. p. 524: sect. Franseriae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2481 *a*. p. 403; 1841. Ench. p. 237.
Synon. Gärtneria Medic.

Xanthiopyxis Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 262. 264: subg. Pyxidiculae.
= Pyxidicula Ehrenb.

Xanthisma *) DC. 1836. Prodr. V. p. 94: nov. g. Liabear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2242. p. 364; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3220. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 61: g. Pectidear.
Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33: g. Hectorear.

Xanthium **) Tourn. 1700. Inst. p. 438. t. 252: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 286. n. 717; 1737. Cliff. p. 443; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 283; 1753. Sp. II. p. 987; 1759. Syst. ed. X. p. 1267. n. 937; 1763. Sp. ed. II. p. 1400; 1764. Gen. ed. VI. p. 487. n. 1056; 1767. Syst. ed. XII. p. 623: g. Monoec. Pentandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 236. — Murr. 1774. Syst. p. 711; 1784. Syst. p. 852. — Reich. 1778. Gen. p. 484. n. 1152. — Lour. 1790. Coch. II. p. 563.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 635. n. 1426.

---

*) Dicat. J. Wyllo, med. doctori.
**) ξανθός, fulvus.

*) ξάνθισμα, fulvo tinctum.
**) Nomen ex Plinio et Dioscoride: herba, qua rufantur capilli.

Xanthium Tourn. cont.
— Pers. 1797. Syst. p. 896; 1807. Ench. II. p. 558. n. 2065. — Michx. 1803. Fl. amer. II. p. 182. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 373. n. 1667; 1809. En. p. 968. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 852. n. 3115. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 4. 145. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 600.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 161: g. Juliferar.

Linn. 1747. Cl. plant. p. 353: g. Flosculosor.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 192. n. 797: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 191; 1806. Ann. Mus. VIII. p. 184. (anomalar.) — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 422. (anomalar.)

Adans. 1763. Fam. II. p. 119: g. Ambrosiar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 76: g. Aggregatar.

Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 469: g. Solidaginear.

Scop. 1777. Intr. p. 126: g. Flosculosar.

Thunb. 1784. Fl. jap. p. 267: g. Monadelph. Pentandr.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 198; 1789. Phil. Bot. I. p. 44.

Neck. 1790. El. I. p. 90. n. 163: g. Siphoniphytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 418. t. 164: g. Tubulosar.

Gmel. 1791. Syst. p. 464: g. Pentandr. Digyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 129.

Mönch 1794. Meth. p. 697; 1802. Suppl. p. 300: g. Calycostemonis.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 538: g. Urticear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 326; 1815. V. p. 356. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 362. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 254.

Cram. 1803. Disp. p. 185 in Monoec. Monadelph.

Nutt. 1818. Gen. II. p. 188: g. Syngenes. Polygam. Necessar.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 274: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 501. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 915.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 89: g. Ambrosidiae. Sejungitur Strumarium.

Link 1822. En. II. p. 390: g. Compositis aff. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 617.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 195 (*Lampourde*); 1823. v. 29. p. 176; 1829. v. 59. p. 101: g. Ambrosiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Less. 1832. Syn. p. 219. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 308. — DC. 1836. Pr. V. p. 522. Sect.: Euxanthium, Acanthoxanthium. — Endl. 1838. Gen. n. 2480. p. 403; 1841. Ench. p. 237. Sect. eaed. — Kunth 1838. Berol. I. p. 337. (legitimar.) — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 294. Sect. ut DC. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22. — Rchb. 1841.

Xanthium Tourn. cont.
Nom. p. 100. n. 3912. Sect. similes. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 227. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 541. Sect. ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 150. Sect. ut Wallr. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 240. Sect.: Euxanthium.

Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2744; 1831. Fl. exc. p. 293: g. Xanthiear.

Link 1829. Hdb. I. p. 817: g. Ambrosiacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16. — Koch 1837. Syn. p. 462. Ed. II. p. 531. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 393. — Math. 1853. Belg. I. p. 324.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 693. n. 3496: g. Urticeis aff. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 242.

C. Koch 1843. Linnaea XVII. p. 44: g. Melampodiear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 43.

Wallr. 1844. Beitr. z. Bot. I. 2. p. 219. (Monogr.) Sect.: Anoplia, Akanthoplium. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 26.

Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 8 (*Xantheum*). t. 1104: g. Senecionidear. — Par. J. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 225 (*Lampourde*).

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 67: g. Melampodinear.

Xanthizoon Griseb. 1843. Spicil. fl. Rumel. I. p. 333: sect. Saxifragae. (S. sancta n. sp.)

Xantho *) Remy 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 191: g. Anthemidear. (*Lasthenia Lindl., Endl.*)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 889: g. Chrysanthemear.
= Hologymne Bartl.

Xanthocarpia Massalongo 1853. Mem. Lich. p. 119. (An *Xanthacarpia*?)
Massal. 1855. Lich. It. exsicc. Fasc. IV. n. 114.
= Callopisma Not. (Körb.)
= Blastenia Massal. (Trevis.)

Xanthocephalon Spreng. vid. *seq.*

Xanthocephalum Willd. 1807. Mag. nat. Fr. Berl. I. p. 140: nov. g. Syngenes. Frustran., Zoëgeae aff.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 899 (*Xanthocephalon*): g. Centaurear.

Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 340; 1829. v. 59. p. 101; 1830. v. 60. p. 586: g. Ethuliear.?

Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2225: g. Eupatorinar.?

Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Vernoniear.?

Less. 1832. Syn. p. 352: g. Chrysanthemear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 43. — Endl. 1838. Gen. n. 2662. p. 433; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 210 (134). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3075. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 276: g. Pyrethrear.

---

*) Xantho nympha, filia Oceani et Tethydis.

Xanthoceras Bunge 1832. En. pl. chin. bor. p. 11; 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 85: nov. g. Sapindacear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385 (anomalum).
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Dodonaeacear.? — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5629. p. 1373; 1841. Ench. p. 561. (anomalar.)
Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7601: g. Cupaniear.

Xanthochilum Lindl. 1847. Bot. Regist. n. 20: sect. Odontoglossi. (Bot. Zeit. 1847. p. 461.)

Xanthochrysum Turczan. 1851. Bull. Mosc. XXIV. p. 199: nov. g. Helichrysear. (X. filifolium.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 273.

Xanthochymus Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 51. t. 196; 1819. III. p. 66. t. 270: nov. g. Polyadelph. Polyandr. (X. pictorius et dulcis.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 790: g. Aurantior. — Par. Link 1822. En. II. p. 274.
DC. 1824. Pr. I. p. 562: g. Calophyllear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47 (*Xanthochysmus*). — Bartl. 1830. Ord. p. 294.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 334. n. 2616; 1831. Gen. II. p. 598. n. 2953: g. Guttiferar. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 101.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 620: sect. Stalagmitidis. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 42.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 630: g. Polyandr. Monogyn.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 74: g. Clusiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402: g. Garciniear.
= Stalagmitis Murr.

Xanthochysmus Dumort. vid. *praeced.*

Xanthocoma HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 310: nov. g. Asterear. (X. humilis.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 408. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 192.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1830. v. 60. p. 581: g. Grindeliear.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2519: g. Grindeliacear.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 103: g. Radiatar.
DC. 1836. Pr. V. p. 310: g. Gymnospermear. Par. Endl. 1838. Gen. n. 2357. p. 382; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3312. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.

Xanthocromyon Karsten . . . nov. g. Iridear. (Bot. Zeit. 1847. p. 694.)

Xanthodraba Rchb. 1841. Nomencl. p. 180. n. 6950. 4: sect. Drabae.
= Chrysodraba DC.

Xanthogalium DC. 1830. Prodr. IV. p. 603: sect. Galii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3100 *h*. p. 523; 1841. Ench. p. 271. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 414.

Xanthogalum Lallem. 1841 in Fisch. & Mey. Ind. sem. h. Petr. VIII. p. 57: nov. g. Peucedanear. (X. purpurascens.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 176. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 358. — Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. 4462/1. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 316.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Xanthoglossa DC. 1837. Prodr. VI. p. 60: sect. Pyrethri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2760 *c*. p. 434; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3069. 3. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 556.
Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 221: sect. Tanaceti.
Synon. Coleostephus Cass.; Chrysanthemi sp. Auct.

Xanthoglossum Lindl. 1852. Fol. Orchid. 14 Oct.: sect. Odontoglossi.

Xanthogymnocline Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 221: sect. Tanaceti.

Xantholepis Willd. mss. & herb.
= Cacosmia HBK.

Xantholinum Rchb. 1837. Handb. p. 306; 1841. Nomencl. p. 210. n. 7988: nov. g. Macrolinear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 6056 *e*. p. 1426; 1841. Ench. p. 623: sect. Lini.

Xanthomeria Presl 1836. Mon. Lobel. p. 11; 1837 in Eckl. & Zeyh. En. pl. Afr. III. p. 394: sect. Rapuntii.
Endl. 1838. Gen. p. 511. n. 3058 *a*: sect. Lobeliae.
= Parastranthus Don.

Xanthophthalmum Schultz Bip. 1844. Üb. Tanac. p. 17 . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 245; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 207: nov. g. Euchrysanthemear. (Chrysanthemum segetum.) *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 307.

Xanthophyllum Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 81. t. 284: nov. g. Capparidear. (X. virens et flavescens.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 476 et Nees 1825. Flora I. p. 120. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 219. n. 1447; 1830. Gen. I. p. 310. n. 1587. — Leman 1829. Dict. v. 59. p. 104. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1277.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 221: g. Octandr. Monogyn.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 39: g. Polygalear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 111. (verar.) — Endl. 1840. Gen. n. 5657. p. 1080; 1841. Ench. p. 568 (anomalum).
Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6790: g. Krameriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378: g. Polygalacear. — Par. Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 296; 1852. Pl. Jungh. II. p. 126.
Synon. Jackia Blume; Kaulfussia Dennst. (Steud.)

Xanthophytum Reinwardt 1823. Catal. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Pentandr.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 989: g. Rubiacear. — Par. Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 104.

Xanthophytum Reinwardt cont.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 275: g. Cinchonear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 413: g. Rondeletiear. Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 520. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Endl. 1838. Gen. p. 551. n. 3250. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2885. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 175.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
= Lerchea Linn.? (Endl. Spl. I. p. 1339.)

Xanthopsis DC. 1837. Prodr. VI. p. 561: sect. Amberboae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2865 *Bγ*. p. 471; 1841. Ench. p. 246. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 684.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3649. 2. *g*: subsect. Amblyopsideae.
C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 422: g. Centauriear.

Xanthoreseda „G. Don" Steud. 1841. Nom. II. p. 441. 790: sect. Resedae.

Xanthorhaea Dumort. vid. *Xanthorrhoea Smith.*

Xanthorhaeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. 62: fam. Juncariear. Gen.: Xanthorhaea, Johnsonia, Baumgartenia.

Xanthorhiza Gmel., Endl., etc.: vid. *Xanthorrhiza Marsh.*

Xanthorhoea Spach vid. *Xanthorrhoea Smith.*

Xanthoria Fries 1825. Pl. homon. p. 243: sect. Parmeliae. (P. parietina, etc.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 402 *e*.

Xanthorrhaea Pers., Hedw., Poir., Brongn. vid. *Xanthorrhoea Smith.*

Xanthorrhiza Marsh. 1785. Arb. p. 167.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 727. n. 1581: g. Polygam. Monoec.
Gmel. 1791. Syst. p. 646: g. Octandr. Tetragyn.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Cram. 1803. Disp. p. 114 in Decandr. Polygyn. (X. apiifolia.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 783; 1825. Syst. I. p. 972. n. 1154; 1830. Gen. I. p. 238. n. 1258: g. Ranunculear.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXX. 801: g. Ranunculacear. (in Pentandr. Polygyn.) — Par. Link 1821. En. I. p. 303 (*Xantorhiza*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1037 (*Xantorrhiza*).
Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4960: g. Helleborear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50 (sph. *Xanthorthiza*): g. Paeoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 252.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 451: g. Anemonear.
Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4): g. Paeoniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4803. p. 850; 1841. Ench. p. 435.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7260: g. Actaeariar.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 407: g. Helleboracear. anomalum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428: g. Actaeear.
Vid. Zanthorhiza L'Herit.

Xanthorrhoea Smith 1798 in Ait. h. kew. I. p. 271; 1798. Linn. Trans. IV. p. 219.
Pers. 1805. Ench. I. p. 370. n. 810 (*Xanthorrhaea*): g. Hexandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 240. n. 972 (*Xanthorrhaea*): g. Asphodelear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 287. Ed. Nees p. 143. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 228; 1825. Syst. II. p. 91. n. 1250; 1830. Gen. I. p. 260. n. 1355. — Agdh. 1823. Aphor. p. 164 (abnormium). — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 105. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXII. 426. — Bartl. 1830. Ord. p. 51. (descisc.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1112.
Link 1821. En. I. p. 333 (*Xantorrhoea*): g. Liliacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1155 (*Xantorrhoea*): g. Xyridear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62 (*Xanthorhaea*): g. Xanthorhaeacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1173. p. 152; 1841. Ench. p. 87: g. Aphyllanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1690. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205 (*Xantorrhaea*). — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 310.
Meisn. 1842. Gen. p. 398 (302): g. Aloinear.?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 17 (*Xanthorrhaea*): g. Xerotear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 648: g. Asphodeleis aff. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256 (*Xanthorhoea*).
Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 39: g. Liliaceis aff.

Xanthorthiza Dumort. vid. *Xanthorrhiza Marsh.*

Xanthosia Rudge 1811. Linn. Trans. X. p. 361: nov. g. Pentandr. Digyn. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 106. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XXVIII. 314.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 478; 1825. Syst. I. p. 868. n. 1022; 1827. Cur. post. p. 114: g. Gentianear.
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4421: g. Cliffortiear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 217. n. 1122: g. Umbelliferar.
DC. 1830. Pr. IV. I. p. 74: g. Hydrocotylear. Sect.: Euxanthosia, Leucolaena. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 258. Sect. ead. — Rchb. 1837. Hd. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5512. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). Sect.: Xanthosia, Leucolaena. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 482; II. p. 932. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 290. Sect. ut DC. et Chlorosia. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 311.
Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Xanthosiear.
= Leucolaena R. Brown.

Xanthosia Meisn. 1838. Gen. pl. vasc. p. 140 (102): sect. Xanthosiae.
Endl. 1839. Gen. n. 4364 *a*. p. 764; 1841. Ench. p. 377; 1850. Spl. V. p. 1: sect. Leucolaenae.
Synon. Euxanthosia DC.

Xanthosieae Tausch 1834. Flora I. p. 354: subtrib. Disaspidospermar. Gen.: Micropleura, Xanthosia, Astrotricha.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 137: sect. Disaspidospermear. Gen.: Micropleura, Leucolaena, Astrotricha.

Xanthosmia Steud. vid. *seq.*

Xanthosoma Schott 1832. Melet. bot. p. 19: nov. g. Colocasiear. (Arum xanthorhizum Jacq.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 791 (*Xanthosmia*). — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1686. p. 237; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 44. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1098. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (270). — Brongn. 1843. En. genr. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 48.

Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 89. t. 299.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Caladiear.

Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 56: g. Syngoninar.

Xanthotheca Schuchard 1853. Syn. Tremandr. (Flora 1854. p. 475): sect. Tetrathecae.

Xanthoxylaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 135) 1847. Veg. kingd. p. 472: ordo Rutalium. Gen. (1847) Zanthoxylear. Endl. et Cyminosma, Aspidostigma, Teclea, Pseudiosma?, Tetradium?, Philagonia?, Bischofia?, Phelline?, Guindilia?

Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 248: ordo Terebinthinear. Gen.: Xanthoxylon, Picrasmus, Toddalia, Ptelea. *Affinia*: Acronychia, Philagonia, Bischoffia.

Conf. Zanthoxyleae A. Juss.

Xanthoxyleae Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 183: fam. plantar., a Diosmeis (R. Br.) sejuncta. Gen.: Xanthoxylum, Ochroxylum, Pohlana, Brunellia, Fagara, Evodia.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (114) Thalamiflorar. syncarpar.

Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo Rutalium.

Rchb. 1841. Nom. p. 196: subdiv. Rutariar. Gen. Zanthoxylear. Endl.

Xanthoxylon R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 33): g. Diosmear.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 655: g. Terebinthacear.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 944. n. 1125: g. Rutacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 999.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: g. Zanthoxylear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 230. n. 1208: g. Rutaceis aff.

Lindl. 1836. Nat. syst. p. 135; 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 248.

Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7476: g. Xanthoxylear. Sect.: Xanthoxylon, Pterota, Fagara, Ochrochylum, Pohlana, Typalia, Aubertia.

= Zanthoxylum Linn.

Xanthoxylum Gmel. 1791. Syst. p. 509: g. Pentandr. Pentagyn.

Xanthoxylum Gmel. cont.

Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.

Link 1822. En. II. p. 425: g. Terebinthacear.

Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 184: g. Xanthoxylear.

Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 231: g. Rutacear.

= Zanthoxylum Linn.

Xantion Adans. vid. *Xanthium Tourn.*

Xantorhiza Link vid. *Xanthorrhiza Marsh.*

Xantorrhiza Dietr. vid. *praeced.*

Xantorrhoea Link, Rchb. vid. *Xanthorrhoea*.

Xatardia Meisn. 1838. Gen. pl. vasc. p. 145 (105): g. Seselinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4433. p. 775; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5425. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 706.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Synon. Petitia Gay; Angelicae sp. Petit; Selini sp. Lapeyr.

Xaveria Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 30. n. $4794/_1$: g. Helleborear.

= Anemonopsis Sieb. & Zucc.

Xeilaria A. Libert .... Crypt. Ardenn. exsicc. 1.

= Cheilaria A. Lib.

Xenismia **) DC. 1836. Prodr. V. p. 509: nov. g. Millerïear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2468. p. 400; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3009. — Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 711.

Schultz Bip. 1855. Flora I. p. 121: g. Osteospermear.

Xenocarpus ***) Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 108; 1830. v. 60. p. 583: g. Senecionear. Prototypar. (Cineraria geifolia L.)

= Cineraria Less.

Xenochloa „Lichtenst. mss." Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 29. 501. n. 282: nov. g. Triandr. Digyn. (X. arundinacea.)

Leman 1829. Dict. v. 59. p. 110: g. Graminear., Arundini aff.

Kunth 1833. Agrost. p. 522: g. Graminear. dubium. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 109; 1841. Ench. p. 69. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1433. — Meisn. 1843. Comm. p. 317.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: inter gen. Graminacear. dubia.

Xenodochus Schlechtend. 1826. Linnaea I. p. 237: nov. g. Gymnomycetum, ab Endl. (Gen. p. 17) ad Torulam Pers. relatum.

Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 13: g. Hypodermior.

Leman 1829. Dict. v. 59. p. 110: g. Fungor.?

Spreng. 1831. Gen. II. p. 773. n. 3976: g. Atrichor.

Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 498: g. Sporodesmicor.

---

*) Dicat. cl. Xatard, florae pyrenaicae exploratori.

**) *ξενισμός*, peregrinitas.

***) *ξένος*, peregrinus.

Xenodochus Schlechtend. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Pucciniacor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 505: g. Toruleor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 49: g. Phragmidiaceor.

Xenophontia Arrab. ex Steud. Nomencl. II. p. 791: g. Compositar. (X. caryophylla.) Quid?

Xenopoma Willd. 1811. Berl. Mag. V. p. 399: nov. g. Didynam. (X. obovatum = Frutex innominatus Jacq. Schönbr. IV. p. 50. t. 498.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 111.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 392: g. Rhinanthear.
Colla 1824. Hort. Ripul. p. 147. t. 25.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 767. n. 2138; 1831. Gen. II. p. 482. n. 2380: g. Didynam. Angiosperm.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3213: g. Caprariacear.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 222: sect. Micromeriae.

Xeractis Martius 1830. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 13: sect. Paepalanthi (etiam in Nasmythia et Eriocaulone admissa).
Steud. 1855. Glum. II. p. 281: subsect. Paepalanthi.
Synon. Eulepis Bong.

Xerandra Rafin. . . . . Fl. Tell. p. 43 ex Moq.-Tand. in DC. Pr. XIII. 2. p. 339.
= Iresine P. Browne.

Xeranthae Link 1829. Handb. I. p. 392: subclass. IV. Exogenear. Ordo: Plantagineae.

Xeranthema Adans. 1763. Fam. II. p. 117: sect. 4 Compositar. Gen.: Acosta, Cyanus, Rhacoma, Rhaponticum, Amberboi, Serratula, Pterophorus, Tarchonanthes, Xeranthemum, Lonas, Santolina, Polymnia, Gnaphalium, Gnaphalodes, Denira.

Xeranthemae Endl. Ench. p. 246: vid. *Xeranthemeae Endl.*

Xeranthemeae Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 173: trib. 5 Synantherear.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 497: sect. Carlinear. Gen.: Xeranthemum, Chardinia, Nitelium, Dicoma?, Lachnospermum, Cousinia, Stobaea, Cardopatium. — Par. Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 112; 1830. v. 60. p. 569. Gen. ead. et Xeroloma, Siebera. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8. Gen. ut Cass. 1827 et Rhigiothamnus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: subtrib. Cynaracear. Gen.: Xeranthemum, Chardinia, Cardopatum.
Less. 1832. Syn. p. 14: subtrib. Cynarear. Gen.: Xeranthemum, Chardinia. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 528. Gen. ead. et Siebera. — Endl. 1838. Gen. p. 467; 1841. Ench. p. 246. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). Gen. ead. — Brongn. 1843. En. genr. p. 37. Gen. ead. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 476. Gen.: Xeranthemum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. Gen. ut DC.

Xeranthemeae Cassini cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 90: subdiv. Gnaphaliear. Gen. ut DC. (Fleurotia loco Sieberae.)
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 322: div. Acharacopappear. Gen.: Xeranthemum, Chardinia, Siebera? — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 428.

Xeranthemoides Dillen. 1732. Hort. Eltham. p. 434. t. 322. f. 415.
= Xeranthemum Tourn.

Xeranthemum *) Tourn. 1700. Inst. p. 499. t. 284: g. pl. class. XIV.
Vaill. 1718. Act. Ac. Par. p. 174: g. Cynarocephalar. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 230.
Dillen. 1719. Nov. gen. p. 140. t. 8.
Linn. 1737. Gen. p. 249. n. 643; 1737. Cliff. p. 400; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 255; 1753. Sp. II. p. 857; 1759. Syst. ed. X. p. 1211. n. 851; 1763. Sp. ed. II. p. 1201; 1764. Gen. ed. VI. p. 420. n. 947; 1767. Syst. ed. XII. p. 546: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 624; 1784. Syst. p. 749. — Reich. 1778. Gen. p. 417. n. 1027. — Lour. 1790. Coch. II. p. 498. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 551. n. 1283. — Gmel. 1791. Syst. p. 1218. — Pers. 1797. Syst. p. 790; 1807. Ench. II. p. 413. n. 1838. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1901. n. 1475; 1809. En. p. 869.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 709: g. Corymbiferar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 180. — Juss. 1789. Gen. p. 179. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 517. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 394. — DC. 1805. Franç. IV. p. 129. — Link 1822. En. II. p. 320.
Linn. 1747. Class. pl. p. 356: g. Radiator.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 108: g. Compositar. (ord. tertii.) — Par. D. Don 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 538 (valde restrictum).
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 250. n. 1034: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 582.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cinarocephalar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.
Hill 1769. Ht. kew. p. 18: g. Radiatar.
Scop. 1777. Intr. p. 127: g. Flosculosar.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 399. t. 165: g. Tubulosar.
Batsch 1802. Tab. p. 251: g. Capitatar. — Par. Gaud. 1829. Helv. V. p. 13. 385.
Cram. 1803. Disp. p. 127 in Syngenes. Polygam. Frustran.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 155: g. Carduacear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 291.
Desfont. 1817. Mém. Mus. III. p. 455. Char. reform. Sejungitur Chardinia.

*) ξηρός, siccus.

Xeranthemum Tourn. cont.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 110: g. Carlinear. — Par. Gay 1827. Mém. soc. h. n. Par. III. p. 357. Sejungitur Siebera. — Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2300. — Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 550; 1826. Syst. III. p. 485. n. 2727; 1831. Gen. II. p. 619. n. 3073: g. Eupatorinar.
Presl 1822. Delic. Prag. I. p....: g. Carlinacear.
Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 146: g. Gnaphaloidear. verar.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 497. 502; 1829. v. 59. p. 112; 1830. v. 60. p. 570: g. Xeranthemear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Less. 1832. Syn. p. 14. — DC. 1837. Pr. VI. p. 528. Sect.: Euxeranthemum, Xeroloma. — Koch 1837. Syn. p. 414. Ed. II. p. 476. — Endl. 1838. Gen. n. 2850. p. 467; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3514. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 657. — Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 323. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 313. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 281.
Link 1829. Hdb. I. p. 722: g. Elichrysear.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 242: g. Inulear.
Fisch. & Meyer .... Nouv. mém. soc. Mosc. IV. p. 333.
Synon. Xeranthemoides Dill.; Harrisonia Neck.; Xeroloma Cass.

Xeranthemum Necker 1790. Elem. bot. I. p. 83. n. 150: g. Siphoniphytor., exclusis Harrisonia et Trichandro a Linnaeano discrepans.
= Helipteri sect. Edmondia.

Xeranthus Miers 1826. Trav. in Chili II. p. 329.
= Grahamia Gill.?

Xerobius Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 153.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 127; 1830. v. 60. p. 581: g. Grangeinear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28: g. Buphthalmear.
= Egletes Less.

Xerobotrys Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 267 (Bot. Zeit. 1843. p. 762): nov. g. Arbutear. (Arbutus tomentosa Pursh.) — Par. Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 87. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1108.

Xerocalyx Vogel 1837. Linnaea XI. p. 701: subsect. Chamaecristae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6781 *g γ a-a.* p. 1316 (err. *Xerocarpus*); 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6083. 1. *c a* (*Xerolobium*).

Xerocarpa G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 728: sect. Scaevolae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3038 *b.* p. 506; 1841. Spl. I. p. 1391 (subsect.: Gymnostegia, Euxerocarpaea); Ench. p. 261 (*Xerocarpaea*). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 508 (*Xerocarpaea*). — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4008. 3 (*Xerocarpaea*).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 583: g. Scaevolear.

Xerocarpaea DC., Endl., Rchb. vid. *praeced.*

Xerocarpicae Schauer 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 5: subordo Myrtacear. Trib.: Chamaelaucieae, Leptospermeae.

Xerocarpicae Walpers 1847. Rep. VI. p. 415: trib. Vaccinicar. Gen.: Macleania, Anthopterus.

Xerocarpus Guillem. & Perrot. 1832. Fl. Senegal. I. p. 169. t. 44: nov. g. Lotear.
Meisn. 1837. Gen. p. 85 (60): g. Trifolicar.
Endl. 1840. Gen. n. 6474. p. 1262; 1841. Ench. p. 668: g. Genistear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5883. (genuinar.) — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 459.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Lotononidear.

Xerocarpus „Vogel" Endl. vid. *Xerocalyx Vogel.*

Xerochlaena DC. 1837. Prodr. VI. p. 187: sect. Chrysolepideae. (Walp. 1843. Rep. II. p. 992.)

Xerochloa R. Brown 1810. Prodr. I. p. 196. Ed. Nees p. 52: nov. g. Graminear., Apludae aff. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 109. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 46. 788. n. 355. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 131. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 66. n. 319.
Trin. 1820. Fund. p. 191: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 977: g. Saccharinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Kunth 1830. Gram. p. 168: g. Andropoginear.
Kunth 1833. Agrost. p. 518: g. Andropogonear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 414.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 186: g. Paniceear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 113.
Endl. 1837. Gen. n. 929. p. 105; 1841. Ench. p. 60: g. Rottbölliacear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 427 (326)? — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1367: g. Rottböllicar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Rottböllear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 522: g. Eusaccharear.

Xerococcus Örsted 1862. Centralam. Rubiac. p. 30: nov. g. Eugardeniear., Coccocypselo aff. (X. congestus.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 133.

Xeroderma A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 509: sect. Ehretiae,

Xerolepis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 244: subg. Sphenogynes.
DC. 1836. Pr. V. p. 687: sect. Sphenogynes. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2626 *b.* p. 427; 1841. Ench. p. 240. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3635. 2.

Xerolobium Rchb. vid. *Xerocalyx Vogel.*

Xeroloma Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 120; 1830. v. 60. p. 570: nov. g. Xeranthemear.

DC. 1837. Pr. II. p. 529: sect. Xeranthemi.

Xeromeria Endl. 1838. Gen. n. 2075 *a.* p. 326; 1841. Ench. p. 207: sect. Leptomeriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2350. 1. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 610. — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 679.

Xeropappus Wallich mss. = Eudicoma DC.

Xeropetalon Hook. mss. = Viviania Cavan.

Xeropetalum R. Brown 1821. Bot. Mag. n. 2247 (Verm. bot. Schr. V. p. 385): sect. Dillwyniae. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 109. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 121. — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 79. — Endl. 1840. Gen. n. 6441 *b.* p. 1258; 1841. Ench. p. 667.

Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4067: g. Sophorear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 409. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152.

Synon. Xerotropis Rchb.

Xeropetalum Delile 1826 in Cent. pl. Caill. voy. Meroë p. 84.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 388. n. 1949: g. Tiliacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 558. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 5.

Meisn. 1837. Gen. p. 37 (28): g. Tiliear.

Endl. . . . . . Dec. nov. stirp. p. 35; 1840. Gen. n. 5347. p. 1002; 1841. Ench. p. 520: g. Dombeyacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 344. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 617 (err. *Acropetalum*).

Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7684: g. Dombeyear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.

Planch. 1851. Fl. d. serr. VI. p. 225: sect. Dombeyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 325.

Synon. Leeuwenhoeckia E. Meyer.

Xerophyllum Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 210: nov. g. Hexandr. Trigyn. (Helonias asphodeloides L.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 399. n. 889. — Hedw. 1806. Gen. p. 253. n. 1025. — Willd. 1809. En. p. 402. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 234.

Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 29: g. Liliacear.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 192; 1825. Syst. II. p. 144. n. 1363: g. Juncear., serius (Gen. II. p. 288) Heloniadi iterum insertum.

Link 1821. En. I. p. 348: g. Melanthacear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. CII. 1567.

Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. — Endl. 1837. Gen. n. 1065. p. 135; 1841. Ench. p. 79. — Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 242. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.

Bartl. 1830. Ord. p. 52: g. Colchicacear.

Xerophyllum Rich. cont.

A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 128: g. Melanthear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1356. — Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1694.

Kunth 1843. Enum. IV. p. 177: g. Helonieur.

Xerophyta „Comm.“ Juss. 1789. Gen. p. 50: nov. g. Bromeliar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 139.

Gmel. 1791. Syst. p. 530: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 15. n. 605. — Pers. 1805. Ench. I. p. 346. n. 768. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 278. n. 1440. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1190.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 123: g. Bromeliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 233. n. 946. — Agdh. 1823. Aphor. p. 175. — Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. n. 1068. (?) — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 132. — Bartl. 1830. Ord. p. 40.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 99. n. 1269: g. Sarmentacear.

Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1229: g. Haemodorear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIII. 289.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 130: g. Bromeliear.

Herb. 1837. Amaryll. p. 63: g. Xerophytear.

Endl. 1837. Gen. n. 1262 *a.* p. 173; 1841. Ench. p. 101: sect. Vellosiae. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 73.

Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1670: g. Velloziear.

Xerophyteae Herbert 1837. Amaryll. p. 63. 81: subordo Amaryllidacear. Gen.: Xerophyta, Vellosia, Barbacenia.

Xerosiphon Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. p. 55 (Bot. Zeit. 1844. p. 266 et Flora 1844. p. 120): nov. g. Amarantacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Gomphrenear. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 43. (?)

Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 416: sect. Gomphrenae.

Xerospermum Blume 1850. Rumphia III. p. 99: nov. g. Sapindear. (Nephelium Noronhianum Camb.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. I. p. 221.

Xerostola Rchb. vid. *seq.*

Xerostole Endl. 1838. Gen. n. 2121 *d.* p. 337; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 76: sect. Petrophilae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2378. 4 (*Xerostola*). — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 272.

Xeroteae Rchb. 1828. Consp. p. 64: div. Sarmentacear. Gen.: Xerotes, Dasypogon, Calectasia, Kingia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 152: subdiv. Melanthacear.

Brongn. 1843. En. genr. p. 17: trib. Liliacear. Gen.: Xanthorrhaea, Xerotes, Aphyllanthes, Sowerbea, Dasylirion, Narthecium.

Xerotella Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1312 *b*: sect. Xerotis.

Xerotes *) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 259. Ed. Nees p. 115: nov. g. Juncear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 194; 1825. Syst. II. p. 147. n. 1374. — Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 238; 1829. v. 59. p. 133. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 183. t. 35. — Bartl. 1830. Ord. p. 38. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134.

Link 1822. En. II. p. 426 (*Xerotis*): g. Juncoidear.

Agdh. 1823. Aphor. p. 159: g. Xyridear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 121.

Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1312: g. Xerotear. Sect.: Dracaenella, Xerotella, Lomandra, Spathandra, Stachyandra. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 17.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 289. n. 1497: g. Asphodeleis et Junceis aff. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1210.

Endl. 1837. Gen. n. 1056. p. 132; 1841. Ench. p. 76; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 48: g. Xerotidear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 371. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1681. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310). — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 315. — Steud. 1855. Glum. II. p. 309. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 247.

Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 3; 1847. Veg. kd. p. 192: g. Juncacear.

Synon. Lomandra Labill.

Xerotes Fries 1825. Pl. homon. p. 78: g. Agaricinor. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 133.

= Xerotus Fries.

Xerothamnus DC. 1836. Prodr. V. p. 311: nov. g. Gymnospermear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2358. p. 382; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3313. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.

Xerotideae Endl. 1837. Gen. p. 132; 1841. Ench. p. 76: fam. Juncaceis aff. Gen.: Susum, Xerotes. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 370. Gen. ead.

Rchb. 1841. Nom. p. 46: subdiv. Juncear. Gen. ead.

Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310): subordo Juncacear. Gen. ead.

Steud. 1855. Glum. II. p. 309: fam. Juncear. Gen. ead. et Reilia, Baxteria.

Xerotinus Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 343: g. Agaricinor. (*Xerotes Fries.*)

= Xerotus Fries.

Xerotis Link vid. *Xerotes R. Brown.*

Xerotium Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 343: g. Eupatorinear., pro *Logfia Cass.* propositum.

Xerotropis Rchb. 1841. Nomencl. p. 152. n. 5935. 2: sect. Dillwyniae.

= Xeropetalum R. Brown.

Xerotus Fries 1828. Elench. I. p. 48: g. Pileator.

Fries 1838. Epicr. p. 400 (1849. Summ. veg. Scand. II. p. 315): g. Agaricinor. Sect.: Hypoxerus, Holoxerus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 487. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 196.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: g. Agaricinear.

Synon. Xerotes Fries; Xerotinus Rchb.

Xestaea *) Griseb. 1849. Linnaea XXII. p. 35: nov. g. Chlorear. (X. lisianthoides.)

Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 81: g. Lisianthear.

Xilaria Math. vid. *Xylaria Hill.*

Xilocarpus Blanco vid. *Xylocarpus Schreb.*

Xilopia Juss., St. Hil. vid. *Xylopia Linn.*

Ximenesia **) Cavan. 1793. Icon. II. p. 60. t. 178: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (X. encelioides.) *Cf.* Usteri n. Ann. XVII. p. 69. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2116. n. 1494; 1809. En. p. 898. — Pers. 1807. Ench. II. p. 473. n. 1909.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 569; 1826. Syst. III. p. 605. n. 2830; 1831. Gen. II. p. 637. n. 3187: g. Radiatar.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 226: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 476. — Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17. (Archetypar.) — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2644. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 141. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41.

Link 1822. En. II. p. 338: g. Corymbiferar.

Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 134; 1830. v. 60. p. 576: g. Verbesinear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 232 (sph. *Ximinesia*). — DC. 1836. Pr. V. p. 627. — Endl. 1838. Gen. n. 2555. p. 416; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 359. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Ximenia ***) Plumier 1703. Gen. p. 6. t. 21. *Cf.* Linn. 1737. Gen. p. 361. n. 902.

Linn. 1737. Clift. p. 483; 1742. Gen. ed. II. p. 521. n. 1007; 1753. Sp. II. p. 1193; 1759. Syst. ed. X. p. 1356. n. 1105: g. pl. incertae classis.

Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 497; 1764. Gen. ed. VI. p. 190. n. 470; 1767. Syst. ed. XII. p. 265: g. Octandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 106. t. 77. — Murr. 1774. Syst. p. 299; 1784. Syst. p. 361. — Reich. 1778. Gen. p. 193. n. 517. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 255. n. 651. — Gmel. 1791. Syst. p. 615. — Pers. 1797. Syst. p. 386; 1805. Ench. I. p. 414. n. 938. — Willd. 1799. Sp. II. p. 338. n. 757. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 252. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1270.

*) ξηρότης, siccitas.

*) ξεστός, laevigatus.
**) Dicat. Jos. Ximenes.
***) Dicat. Rev. patri Franc. Ximenes, Hispano.

Ximenia Plumier cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 166: g. Vaccinior.
Gled. 1764. Syst. p. 83. n. 144: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 234: g. Nomadear. Distinguitur Rottbölia.
Juss. 1789. Gen. p. 259: g. Aurantior. spurior.
Neck. 1790. El. II. p. 368. n. 1174 (*Xymenia*): g. Osariphytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 153: g. Hesperidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 53. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 33. — Hedw. 1806. Gen. p. 270. n. 1089.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. Déc. p. 377: g. Olacinear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 533. — Cambess. 1825 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 341. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 147. — Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 581. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 89. — Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33)? — Endl. 1840. Gen. n. 5490. p. 1042; 1841. Ench. p. 546. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5261. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 228. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 254. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 16. p. 247.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 116. n. 1444; 1830. Gen. I. p. 304. n. 1556: g. Santaleis aff.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 136. n. 3614: g. Olacinar. (genuinar.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Heisteriear.
Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 302.
Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159): g. Ebenacear.?
Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 677; 1841. Ann. and Mag. VII. p. 215: g. Olacear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 12. 22. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 86: g. Ximeniear.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 786: g. Olacacear.
Synon. Heymassoli Aubl.; Rottbölia Scop.; Tetanosia Rich.

Ximenieae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 86: fam. Hesperidear. Gen.: Ximenia, Balanites.

Ximinesia Less. vid. *Ximenesia Cavan.*

Xiphanthus „Raf." Endl. 1841. Gen. p. 1295. n. 6667 *a*: sect. Erythrinae. *Cf. Xyphanthus.*

Xiphideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: trib. Xiphidiear. Gen.: Xiphidium.

Xiphidieae Rchb. 1828. Consp. p. 58: subdiv. Commelinear. Gen.: Mayaca, Xiphidium, Wachendorfia, Hagenbachia, Pollia; Flagellaria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59 (*Xiphideae*). 61: fam. Liliariear. Trib.: Xiphideae, Wachendorfiaceae.
Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300): trib. Haemodoracear. Gen.: Lophiola, Wachendorfia, Schiekia, Xiphidium, Hagenbachia.

Xiphidium *) Löfling 1758. Ic. p. 179. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 18 (*Glaivane*).

Xiphidium Löfling cont.
Aubl. 1775. Guian. I. p. 33. t. 11: g. Triandr. Monogyn. (X. caeruleum.) — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 1. 17; 1797. Ind. occ. I. p. 79. t. 2. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 37. n. 84. — Gmel. 1791. Syst. p. 119. — Willd. 1797. Sp. I. p. 248. n. 102. — Pers. 1805. Ench. I. p. 54. n. 111. — Vahl 1806. Enum. II. p. 162. n. 104.
Scop. 1777. Intr. p. 88: g. Liliacear.
Juss. 1789. Gen. p. 59: g. Iridibus aff.
Neck. 1790. El. III. p. 168. n. 1519 (*Xyphidium*): g. Ymnodiphytor.
Gis. 1792. Prael. p. 170: g. Ensatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 143 (*Xyphidium*).
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 149: g. Irideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 28. 356.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 326: g. Haemodorear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 171.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 344. 487. n. 140: g. Iridear. — Par. Link 1821. En. I. p. 55.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 170. n. 180: g. Spathacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1159: g. Xiphidiear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 171. — Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Xiphidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 41. n. 87 (II. p. 816): g. Commelinear.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 235: g. Haemodoracear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1250. p. 170; 1841. Ench. p. 100. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 63.
Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1666: g. Wachendorfiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Wachendorfear.

Xiphioides D. Don 1840. Linn. Trans. XVIII. 3. p. 313: sect. Iridis. (Species praecipue Asiaticae et Americanae, nec non I. foetidissima et Pseudacorus.)

Xiphion Tourn. 1700. Inst. p. 362. t. 189: g. pl. class. IX.
Hall. 1745 in Rupp. fl. jen. p. 33 (*Xyphium*).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 173; 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 418 (*Xyphion*): g. ab Iride distinctum. (Iris Xiphium L.)
„Parlat. Nuovi gen. p. 43" (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 242: sect. Iridis. (I. Pseudacorus, graminea, etc.)

Xiphium Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 303: g. Iridear. (Iris lusitanica Ker.) — Par. Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . . (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1557. (genuinar.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 197 (*Xyphium*): sect. Iridis. (I. Xiphium.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1187 *f*.

*) ξιφίδιον, parvus gladius, Gladiolus.

Xiphium Salisb. cont.
Schrank 1824. Flora II. Beil. p. 15: g. Triandr. Monogyn.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p 18; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 92: subg. Iridis. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 817.
= Iridis Linn. pars.

Xiphizusa Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 919: nov. g. Orchidear. (Bolbophyllum chloropterum G. Rchb.) *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 242.

Xiphocarpus *) Presl 1830. Symb. I. p. 13. t. 7: nov. g. Galegear. (Robinia sericea Sieb.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 6 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 359. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 89 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6543. p. 1273; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5732.

Xiphochaeta Pöppig & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 44. t. 250: nov. g. Vernoniacear., prope Sparganophorum collocandum. (X. aquatica.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 66. n. $2199/_1$: g. Ethuliear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 88.

Xiphocoma Steven 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 270: nov. g. ex typo Ranunculi orientalis DC. *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 605 et Griseb. in Arch. f. Naturg. 1849. II. p. 424.

Xiphophora Montagne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 200; 1842. Prodr. Phycear. antarct. p. 12: nov. g. Fucacear. (Fucus gladiatus Labill.) — Par. Harv. 1855. in Hook. f. N. Zeal. II. p. 215.
Endl. 1843. Spl. III. p. 29. n. 120: g. Fucoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Fucidar.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 202: sect. Fucodii.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56; 1849. ibid. XIII. p. 318: g. Fucear.
= Himanthalia Lyngb. (Kütz. Spec. p. 587.)

Xiphophyllum Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 67; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Serapias Xiphophyllum.)

Xiphopterideae Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 432: trib. Polypodiacear. Gen.: Xiphopteris.

Xiphopteris Kaulf. 1824. Enum. Fil. p 85: nov. g. Polypodiacear. (Grammitis serrulata Sw.) — Par. Leman 1829. Dict. v. 59. p. 150. — Bartl. 1830. Ord. p. 13. (nudar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 36.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 261 (*Xyphopteris*): g. Hemionitidear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 53. n. 3241: g. Filicum verar.
Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 726: g. Gymnopteridum.
Blume 1829. Fl. jav. fasc. III. IV. p. 118: sect. Grammitidis. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 59. n. 607 *b*. — Presl 1836. Pterid. p. 208. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 991. 2.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 136: g. Grammariar.
Endl. 1841. Spl. I. n. 607 *a β*. p. 1347; 1841. Ench. p. 36: subsect. Eugrammitidis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 432: g. Xiphopteridear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 100: g. Pleurogrammear.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 280: g. Blechnoidear.
Synon. Micropteris Desv. pt.

Xiphostylis Gasparr. 1853. Rendic. Ac. Borb. I. p. 183: nov. g. Trifoliear. (Trigonella foenum graecum et galeata.)

Xiphotheca Ecklon & Zeyher 1836. En. pl. Afr. austr. II. p. 166: nov. g. Genistear.
= Priestleyae sect. Anisothea.

Xiris Vandell., St. Hil. vid. *Xyris Linn.*

Xolantha Rafin. (?) . . . . g. ab Helianthemo sejunctum, non adoptatum, teste Leman 1829. Dict. v. 59. p. 152.

Xolisma Rafin. 1819. Amer. monthl. mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 259: novum nomen propositum ob similitudinem cum Allionia, Lyonsia et Lyonella.
= Lyonia Nutt.

Xuaresia Pers. 1805. Ench. I. p. 176. n. 412: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 87. n. 397. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXV. 354. n. 708.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 622. n. 656: g. Scrofularinar.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3207: g. Caprariacear.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 153: g. Personatar.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268: g. Gratiolear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 264. 962.
= Xuarezia Ruiz & Pav.

Xuarezia *) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 24. t. 4; 1799. Fl. peruv. II. p. 13. t. 123: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf. praeced.*
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 355: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 117.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 642: g. Sibthorpiacear.
Endl. 1839. Gen. n. 3922. p. 679; 1841. Ench. p. 339: g. Gratiolear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4626. (genuinar.)
= Capraria Linn. (Benth. 1846.)

*) ξίφος, gladium.

*) Dicat. Casp. Xuarez.

Xulinosprionites *) Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 43.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 247; 1846. Chlor. prot. p. LXXXVI: g. Papilionacear. foss.

Xuris Adans. vid. *Xyris Linn.*

Xyladenius Desvaux 1825 in Hamilt. Pr. fl. Ind. occ. p. 41 (p. XV *Xylandenius*): nov. g. Dodecandr. Monogyn. *Cf.* Endl. Gen. p. 920.
Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4925 (*Xylandenius*): g. Bixinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17) obscurum.
Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7210 (*Xyladenus*): g. Laetiear.
= Banara Aubl.

Xyladenus Rchb. vid. *praeced.*

Xylandenius Hamilt., Rchb. vid. *praeced.*

Xylanthema Necker 1790. Elem. bot. I. p. 67. n. 116: nov. g. Siphoniphytor., a Carduo L. disjunctum. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 155.
= Lamyra Cass.

Xylaria „Hill" Pers. 1801. Syn. Fung. p. 1: sect. Sphaeriae.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 510: g. Spheridear.
Grev. . . . . Crypt. scot. t. 86. 237.
Fries 1825. Pl. homon. p. 106: sect. Hypoxyli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 278 *a*; 1841. Nom. p. 7. n. 300. 1.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 33. 74. t. 8. f. 52; 1842. Mycol. p. 136: g. Sphaeriaceor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 381; 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 124 (*cf.* Flora 1852. p. 683). Tribus (1851): Xyloglossa, Xylocoryne, Xylodactyla, Xylostyla. — Bonord. 1851. Hdb. p. 273.
Math. 1853. Belg. II. p. 164 (*Xilaria*): g. Sphaeriacear.

Xylastra Massalongo 1856. Framm. lich. p. . . .: nov. g. Lichenum.

Xylia Benth. 1842 in Hook. journ. bot. p. 417: nov. g. Gymnantherar. (X. dolabriformis.) — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 42.
Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Mimosear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 587: g. Gymnantherear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.

Xylissus Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 177 (N. York med. repos. II. Hexad. V. p. 356): nov. g. Fungor. vix indicatum.
= Dacrymyces Nees? (Endl. Gen. p. 34.)

Xyloaloë Rumph. 1685. Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 3. p. 74.
= Agallochum Rumph.

Xylobium **) Lindl. 1825. (Bot. Regist. 732): nov. g. Orchidear. (Dendrobium squalens.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 733. n. 3014; 1831. Gen. II. p. 670. n. 3383.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530): g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1529. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57.

*) ξύλινος, ligneus.
**) ξύλον, lignum.

Xylobium Lindl. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1549; 1833. Orchid. p. 150: sect. Maxillariae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1407 *b*. p. 197; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2010. 2.

Xylobium Endl., Walp. vid. *Xylolobium Vogel.*

Xylocarpeae Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 178: trib. Meliacear. Gen.: Calpandria, Carapa. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 87. 117. Gen.: Guarea, Elutheria, Carapa, Racapa, Touloucouna, Xylocarpus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: sect. Trichiliear. Gen.: Xylocarpus, Carapa, Goniochiton, Synoum, Lansium, Nemedra, Aphanamixis, Aglaia, Milnea.

Xylocarpus Schreb. 1789. Gen. I. p. 253. n. 646: g. Octandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 611. — Willd. 1799. Sp. II. p. 328. n. 746. — Pers. 1805. Ench. I. p. 416. n. 946. — Hedw. 1806. Gen. p. 275. n. 1105. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 239. — Blanco 1837. Filipin. p. 298 (*Xilocarpus*).
Cram. 1803. Disp. p. 157 in Monadelph. Octandr.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 213. n. 1429; 1830. Gen. I. p. 305. n. 1560: g. Meliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1270.
= Carapa Aubl.

Xylocarpus A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 243: g. Trichiliear. emendat. (X. granatum Kön.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 110. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 121. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 204. — Meisn. 1837. Gen. p. 48 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5545. p. 1052; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8081. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Rchb. 1837. Hdb. 313: g. Xylocarpear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 88. 124.
Synon. Carapae sp. Lam., Blume.

Xylochoeras *) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 477: nov. g. Sclerotiaceor. (Sclerotium epixylon P.)

Xylociste Adans. vid. *Xylocyste P. Browne.*

Xylococcus **) Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 258 (Bot. Zeit. 1843. p. 761): nov. g. Campanulacear. (X. bicolor.)
= Comarostaphylis Zucc.

Xylocoryne Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 124: tribus Xylariae.

Xylocyste P. Browne 1756. Jamaic. p. 372: in App.
Adans. 1763. Fam. II. p. 510 *Xylociste*) inter genera incerta.

Xylodactyla Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 124. 127: tribus Xylariae.

Xyloderma Erhard 1849. Flora I. p. 244: subsect. Correiae.

*) χοιράς, scrophulae.
**) ξύλον, lignum; κόκκος, bacca.

Xylodon Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVII. 552; 1825. Mycol. eur. II. p. 191: sect. Sistotrematis. (Sist. quercinum, fagineum, Cerasi, fimbriatum, spathulatum, cellare.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 30.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 649: g. Sistotremidear.
= Irpex Fries. (Endl. Gen. p. 39.)

Xyloglossa Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 124: tribus Xylariae.

Xyloglossum Pers. (ubi?) g. Fungor. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 158.
= Acrospermum Tode.

Xylogramma Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 509: g. Hymenomycetum angiosporor.
= Propolis Fries.

Xylographa Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 197: subg. Stictidis. — Par. Leman 1827. Dict. v. 51. p. 8.
Endl. 1836. Gen. n. 423 *b*. p. 36; 1841. Ench. p. 20: sect. Stictidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 439. 1. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 333.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 372: g. Sticteor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Agyrieor.?
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 236): g. Graphidear. — Par. Massal. 1856. Misc. Lich. (Flora 1857. p. 488.) Char. emend.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 314: g. Xylographidear. — Par. Coemans 1858. Bull. Ac. Belg. 2e sér. V. p. 497.

Xylographideae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 314: trib. Lichenacear. Gen.: Xylographa, Agyrium.
Coemans 1858. Bull. Ac. Belge 2e sér. V. p. 496: trib. Lichenum. Gen. ead. (Bot. Zeit. 1860. p. 119.)

Xylohypha Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 447: sect. Hypheliae.

Xyloidion Czerniaiew 1845. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 154: nov. g. Myxogastrum. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 131 et Flora 1847. I. p. 195.
= Xyloon Fries.

Xylolobium Vogel 1837. Linnaea XI. p. 655: subsect. Chamaefistulae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6781 *b a*. p. 1316 (***Xylobium***); 1841. Ench. p. 674. — Walp. 1842. Rep. I. p. 813.
Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6083. 6 *d*: subsect. Chamaecassiae.

Xyloma Pers. 1797. Tent. disp. p. 4. 52: genus Sclerocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 103: g. Sclerocarpor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 341. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46.
GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 19. 249: g. Fungor.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. XI: g. Xylomycor.
DC. 1805. Franç. II. p. 302; 1815. V. p. 152: g. Hypoxylor. Sect. (1815): Spiloma, Microma.

Xyloma Pers. cont.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 197; 1818. II. p. 357: g. Sphaerioideor.
Nees 1816. Syst. p. 25; 1817. Überbl. p. 5: g. Goniomycor. entophytor.
DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 312: g. Xylomor. Sect. ut 1815 et Denoroma.
Mart. 1817. Erlang. p. 308: g. Coniomycetum elementarium.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Sclerotior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 82: g. Xylomacear.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 545: g. Xylomidear.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 38; 1829. v. 59. p. 159: g. Xylomear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Sclerotacear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 601: g. Xylomaceor. (asporor.) — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 123. (spurior.) — Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 232; 1841. Nom. p. 6. n. 253. — Endl. 1836. Gen. p. 31; 1841. Ench. p. 19. (asporor.)
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 538. n. 3536: g. Gastromycor. obscuror. desciscentium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Xylomatear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 93: g. Leptomycetum. (Nees f. 20. 21.)
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 409: g. Hymenomycetum angiosporor.

Xyloma Link 1809. Berl. Mag. III. p. 35: g. Gastromycor.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 261: trib. Sclerotii.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 556: g. Sclerotiear.
= Pompholyx Endl.

Xyloma DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 316: trib. Hypoxylor. Gen.: Polystigma, Xyloma, Asteroma, Hypoderma, Histerium.

Xyloma Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 553: trib. Dothideae. Sect.: Polystigma, Stigmea, Asteroma, Uniformes.

Xylomaceae Agardh 1821. Aphor. p. 82; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: div. Pyrenomycetum. Gen.: Xyloma, Depazea, Actinothyrium, Leptostroma.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Sclerosporangiar. Sect.: Xylomacea, Cystisporea, Phacidiacea.

Xylomacei Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LII: sect. Pyrenomycetum. Gen.: Depazea, Actinothyrium, Xyloma, Leptostroma. — Simil. Fries 1823. Syst. myc. II. p. 319. Gen.: Actinothyrium, Leptostroma; (*aspori*:) Xyloma, Ectostroma, Asteroma, Depazea.
Fries 1825. Pl. homon. p. 120: ordo Pyrenomycetum. Gen.: Sphinctrina, Schizoxylon, Prosthemium, Labrella, Pilidium, Actinothyrium, Leptostroma, Sacidium. (*Spurii*:) Xyloma, Ectostroma, Asteroma, Depazea.
Rchb. 1828. Consp. p. 10: subdiv. Cytisporeor. Gen. ut Fries 1825 et Sphinctosporium?
Endl. 1836. Gen. p. 31; 1841. Ench. p. 19: trib. Pyrenomycetum. Gen.: Leptostroma,

Xylomacei Fries cont.
Actinothyrium, Labrella, Prosthemium, Sphinctrina. *Aspori*: gen. spurior. Fries.
Rchb. 1841. Nom. p. 6: div. Sphaeriaceor. Subdivis.: *genuini* (gen.: Depazea, Asteroma, Ectostroma, Xyloma), Leptostromatei, Cytisporei.

Xylomateae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 75: fam. Sphaeriariear. Gen.: Xyloma, Dothidea, Rhytisma, Leptostroma, Phoma.

Xylomatites Göppert 1844. Übers. Arb. Ver. p. 123: g. Fungor. foss.
= Xylomites Unger.

Xylomeae Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: trib. Hypoxylear. Pseudofungor. Gen.: Polystigma, Xyloma, Asteroma, Hypoderma, Hysterium.
Conf. Xyloma DC. 1817.

Xylomelum Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 214: nov. g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Nöhden in Schrad. Journ. 1800. I. p. 261.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Protear.
Hedw. 1806. Gen. p. 74. n. 350: g. Proteacear. — Par. R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811) p. 189 (Verm. bot. Schr. II. p. 293); 1810. Prodr. I. p. 387. Ed. Nees p. 243. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 26. 427. n. 551. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 481. n. 523; 1830. Gen. I. p. 107. n. 533. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 164. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 535. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 580.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 336: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 237.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1759: g. Lambertiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Banksiear.
Endl. 1838. Gen. n. 2146. p. 341; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 87: g. Hakeear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2396.
Meisn. 1841. Gen. p. 333 (245): g. Rhopalear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 425: g. Grevillear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 422.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.

Xylomideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 533. 545: div. Protomycear. Gen.: Xyloma.

Xylomites Unger 1841. Chlor. protog. I. p. 3. t. 1. f. 2 (1846. p. XXIX); 1845. Syn. pl. foss. p. 18: g. Fungor. foss.
Synon. Xylomatites Göpp.

Xylomyci Willd. 1804 in Rebent. Fl. Neom. p. XI: ordo 10 Cryptogamiae. Gen.: Sphaeria, Stilbospora, Naemaspora, Hysterium, Xyloma.
Link 1831 in Willd. Grundr. p. 236: ordo 12 Cryptogamiae.
A. Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 122: fam. Fungor. Sect.: Phacidiacei, Sphaeriacei, Ascochytacei, Cytisporei.

Xylomyzon Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 26: nov. g. Merulinor. (Boletus lacrymans Wulf.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 164.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Phlebophoreor.
= Merulius Hall.

Xylon Tourn. 1700. Inst. p. 101. t. 27: g. pl. class. I.
Medic. 1787. Fam. Malv. p. 43: g. Malvar. *Cf.* Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 92.
Mönch 1794. Meth. p. 615: g. Petalostemonis.
= Gossypium Linn.

Xylon *) Linn. 1737. Gen. p. 53. n. 152; 1737. Cliff. p. 75; 1742. Gen. ed. II. p. 87. n. 204: g. Pentandr. Monogyn. *(Ceiba Plum.)*
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 98; 1748. Ups. p. 148: g. Polyandr. Monogyn.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
= Bombax Linn.

Xyloon Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 448: g. Aethalinor. (*Xyloidion Czern.*)

Xylopeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 422: subordo Anonacear. Gen. Xylopiear. Endl. (excepta Habzelia).

Xylophagus Link 1809. Berl. Mag. III. p. 38: nov. g. Fungor. primae seriei.
= Merulius Hall.

Xylophylla Linn. 1771. Mant. II. p. 147. n. 1299: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 244; 1784. Syst. p. 296. — Reich. 1778. Gen. p. 152. n. 406. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 200. n. 511. — Gmel. 1791. Syst. p. 499. — Pers. 1797. Syst. p. 314. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1500. n. 573; 1809. En. p. 329.
Scop. 1777. Intr. p. 333: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 387: g. Euphorbiar.
Neck. 1790. El. II. p. 187. n. 904: g. Aclithrophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 123. t. 108.
Swartz 1791. Obs. bot. p. 114: g. Triandr. Trigyn. Char. emend.
Gis. 1792. Prael. p. 474: g. Tricoccar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 168. — Link 1821. En. I. p. 289.
Cram. 1803. Disp. p. 180 in Monoec. Triandr. et p. 182 in Monoec. Hexandr.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 280: g. Euphorbiacear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXV. 692. — Agdh. 1823. Aphor. p. 193. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 24. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 171. — Link 1831. Hdb. II. p. 433.
Hedw. 1806. Gen. p. 210. n. 865: g. Euphorbiear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 369.
Pers. 1807. Ench. II. p. 591: sect. Phyllanthi. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5847 *a.* p. 1120; 1841. Ench. p. 588. — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7410. 1. — Baill. 1858. Euphorb. p. 623.

---

*) Potest merito sibi adtribuere nomen *Xylon*, quod arborem sonat *κατ' ἐξοχήν*.

Xylophylla Linn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5079: g. Phyllanthear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 497. — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Brongn. 1843. En. genr. p. 81. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Synon. Phyllanthus Plum.; Genesiphylla L'Herit.

Xylophyllos (Ceramica) Rumph. 1755. Amboin. VII. p. 19. t. 12. (Meisn.)
= Exocarpos Labill.

Xylopia *) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1250. 1378. n. 1165; 1763. Sp. ed. II. p. 1367; 1764. Gen. ed. VI. p. 469. n. 1027; 1767. Syst. ed. XII. p. 602: g. Gynandr. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 688; 1784. Syst. p. 826. — Reich. 1778. Gen. p. 464. n. 1116. — Pers. 1797. Syst. p. 871.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Anonar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 284 (*Xilopia*). — Batsch 1802. Tab. p. 118.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coadunatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 592.
Gled. 1764. Syst. p. 286. n. 1169: g. Stylostemonum.
Aubl. 1775. Guian. II. p. 601. t. 242: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 375. n. 946. — Gmel. 1791. Syst. p. 866. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1270. n. 1079. — Cram. 1803. Disp. p. 141. — Pers. 1807. Ench. II. p. 98. n. 1354.
Scop. 1777. Intr. p. 255: g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 339. t. 59. f. 7 (frutescens).
Neck. 1790. El. II. p. 288. n. 1052: g. Synathrophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 78: g. Glyptospermar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 80 (*Xilopia*): g. Anonear. — Par. Juss. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 340 (*Xilopia*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 680; 1825. Syst. II. p. 632. n. 2022; 1830. Gen. I. p. 456. n. 2249. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 175. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 298.
Dunal 1817. Mon. Anon. p. 48. 118. t. 17—20: g. Anonacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 499; 1824. Pr. I. p. 92. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 63. — Kunth 1824. Syn. III. p. 128. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 39. t. 8. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 246. — A. DC. 1832. Mém. Genèv. V. p. 209. *Cf.* Flora Litt. III. p. 111. — Schltd. 1834. Linnaea IX. p. 326. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 506. — Mart. 1841. Fl. Bras. fasc. II. p. 41. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 35.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI; 1828. Consp. p. 193. n. 5004: g. Unonear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 96.

*) Nomen ex Browneano decurtatum.

Xylopia Linn. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7316: g. Uvariear.
Endl. 1839. Gen. n. 4714. p. 832; 1841. Ench. p. 422: g. Xylopiear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 330. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 124 (injunctis Coelocline et Patonia). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 61. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 318.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422: g. Xylopear.
Synon. Embira s. Pindaiba Pis.; Ibira Marcgr.; Xylopicrum P. Browne; Waria Aubl.?; Krockeria Neck.?; Bulliarda Neck.; Bulliardia Wittst.; Habzelia A. DC.? *Cf.* Endl. Spl. III. p. 85.

Xylopicron Adans. vid. *seq.*

Xylopicrum P. Browne 1756. Jamaic. p. 250: g. Polyandr. Monogyn. (?)
Adans. 1763. Fam. II. p. 365 (*Xylopicron*): g. Anonar.
= Xylopia Linn.

Xylopieae Endl. 1839. Gen. p. 831; 1841. Ench. p. 422: trib. Anonacear. Gen.: Polyalthia, Xylopia, Habzelia, Coelocline, Uvaria, Hexalobus. Accedit 1842 (Spl. II. p. 107) Patonia. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 92. 115. Gen.: Melodorum, Habzelia, Xylopia. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 302. 317. Gen. ead.

Xylopleurum Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 378: nov. g. Oenotherear. (Oenothera speciosa Nutt.)
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 168. 270 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 369): g. Oenotherinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 395: subsect. Oenotherii.
Endl. 1840. Gen. n. 6115. 10. p. 1191; 1841. Ench. p. 637: sect. Oenotherae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6562. 10.

Xylopodium Montagne 1843. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 364: nov. g. Fungor. (X. Delestrei.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 443: g. Lycoperdineor.

Xylorhiza Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 297: nov. g. Asterinear., Calimeridi aff.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 158: subsect. Orthomeridis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 572.
Endl. 1842. Spl. II. p. 38. n. 2305/1 (*Xylorrhiza*): g. Euasterear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (*Xylorrhiza*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709 (*Xylorrhiza*): g. Asterear.

Xylorrhiza Endl., Walp., Lindl. vid. *praeced.*

Xylosma Forst. 1786. Prodr. p. 380.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 703. n. 1548: g. Dioec. Polyandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 834. n. 1832. — Pers. 1807. Ench. II. p. 629. n. 2274.
Gmel. 1791. Syst. p. 797: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p.

Xylosma Forst. cont.
443. n. 2193. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 270.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 608. n. 1962: g. Guttiferar.

Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 191: g. Flacourtianear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1421. n. $5081/_1$; 1841. Ench. p. 479. n. $5080/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 342.

Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7132: g. Flacourtiear. — Par. Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 393; 1857. ibid. VIII. p. 227.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Flacourtear.

Synon. Myroxylon J. R. Forst.; Miroxylon Scop.; Miroxylum Blanco.

Xylosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 91: g. Sphaeriear. (Sphaeria bulbosa?, Hypoxylon, etc.)

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Stigmaspherar.

Xylosteon *) Tourn. 1700. Inst. p. 609. t. 379: g. pl. class. XX.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 244 (*Xylosteum*); ed. Hall. 1745. p. 250: g. pl. class. IX.

Adans. 1763. Fam. II. p. 157. 501: g. Caprifolior. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 212. — Hedw. 1806. Gen. p. 147. n. 632.

Mönch 1794. Meth. p. 502: g. Petalostemonis.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 597: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 456. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 426. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 487. — Kunth 1824. Syn. III. p. 72. (verar.) — D. Don 1825. Nepal. p. 140. — Bartl. 1830. Ord. p. 214.

Michx. 1803. Fl. am. I. p. 106: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 138.

Juss. 1804. Dict. v. 6. p. 295 (*Camérisier*): g. includens Chamaecerasum Tourn.

Pers. 1805. Ench. I. p. 213: sect. Lonicerae. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 271. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 758. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 365; 1831. Fl. exc. p. 202. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 190. — DC. 1830. Pr. IV. p. 333. Subsect.: Nintooae, Chamaecerasi, Cuphanthae, Isicae. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 446. Subsect. eaed. — Koch 1836. Syn. p. 325. Ed. II. p. 357. — Endl. 1838. Gen. n. 3337 *B.* p. 568; 1841. Ench. p. 282. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 8. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 153. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 387. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 10.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: g. Xylostiae.

Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1984: g. Lonicerear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2735. (genuinar.) Sect.: Nintoa, Xylosteum, Cuphantha, Isika.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Caprifoliar.

Synon. Chamaecerasus Tourn.; Isica Adans.; Cobaea Neck.

Xylosteum Rupp., Michx., Nutt., Kunth, D. Don, Spreng., Gaud., Rchb., Bartl., G. Don, Koch, Ledeb., Gren. etc. vid. *praeced.*

Xylosteum Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 355: g. restrict. Caprifoliacear. (Lonicera coerulea, pyrenaica.)

Xylostia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: subfam. Caprifoliae. Gen.: Xylosteon, Chamerasia.

Xylostroma Tode 1790. Fung. meckl. I. p. 36: nov. g. Fungor., a Pers. (Syn.) ad Racodium relatum. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 178. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1442.

Link 1809. Berl. Mag. III. p. 22: g. Mucedinum? dubium.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLVII: g. Hymenotrichor. (Nomen, serius ad Thelephoram relatum.)

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 559: g. Byssidear.

Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.

Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 93: g. Byssoideor. veror.

Rchb. 1828. Consp. p. 15: g. Fungor. spurior.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 60: g. Byssaceor.

Xylostyla Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 124: trib. Xylariae.

Xylotheca Hochstett. 1843. Flora I. p. 69: nov. g. Bixacear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 90. n. $5072/_4$.

Walp. 1846. Rep. V. p. 56: g. Prockiear.?

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Bixear. et (ibid.) iterum inter Prockeas.

= Heptaca Lour.

Xymalobium Steud. vid. *Xysmalobium R. Browne.*

Xymenia Neck. vid *Ximenia Plum.*

Xyphanthus (an *Xiphanthus*?) Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 103.

= Xiphanthus Endl.

Xypherus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260: novum nomen pro *Amphicarpa Ell.* propositum.

= Amphicarpaea DC.

Xyphidium Neck., Batsch vid. *Xiphidium Löfl.*

Xyphion Medic. vid. *Xiphion Tourn.*

Xyphium Hall., Gray vid. *praeced.*

Xyphopteris Gaudich. vid. *Xiphopteris Kaulf.*

Xyridaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 288) 1847. Veg. kingd. p. 187: ordo Xyridalium. Gen.: Xyris, Abolboda, Acoridium?, Rapatea, Dasypogon.

= Xyrideae Kunth.

Xyridales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 185: nixus Endogenar. Ordines: Philydraceae, Xyridaceae, Commelynaceae, Mayaceae.

*) Quasi lignum osseum,

Xyridanthe *) Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. XXIII: nov. g. Helichrysear. (X. stricta.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2730/2. p. 1384: 1841. Ench. p. 242. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3501. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Xyrideae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 326: ordo Monocotyledonum. Gen.: Xyris. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 1. Gen.: Xyris, Abolboda. *Affine*: Mayaca.

HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 255: sect. Restiacear. Gen.: Xyris, Abolboda. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 264.

Agdh. 1823. Aphor. p. 158; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 854: ordo Glumiflorar. Gen.: Xyris, Abolboda, Aphyllanthes, Rapatea, Xerotes, Dasypogon, Calectasia.

Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 49: fam. plant. monocotyledonear. Gen. §. 1: Xyris, Abolboda, Johnsonia? §. 2: Gaimardia. §. 3: Aphyllanthes. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 332. Gen. ut Endl.

Rchb. 1828. Consp. p. 58; 1830. Fl. exc. p. 140 (11); 1837. Hdb. p. 148: div. Commelinacear. Gen.: Tonina, Eriocaulon, Abolboda, Xyris, Aphyllanthes; Laxmannia, Sowerbaea; Johnsonia; Baumgartenia, Xanthorrhoea.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. 55: fam. Commelinariar. Gen.: Xyris, Abolboda, Johnsonia.

Lindl. 1830. Nat. syst. Clav.: ordo (233) Tripetaloidear.

Bartl. 1830. Ord. p. 38: ordo (27) Juncinar. Gen.: Xyris, Abolboda; Astelia.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 121: trib. Juncacear. Gen. ut Agdh.

Lindl. 1833. Nix. p. 36: ordo Glumacear. — Par. Steud. 1855. II. p. 283. Gen. ut Endl.

Mart. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 71: fam. Enantioblastar.

Endl. 1837. Gen. p. 123; 1841. Ench. p. 68: ordo (47) Enantioblastar. Gen.: Xyris, Abolboda; Mayaca. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 408 (311). Gen. ut Kunth 1815.

Rchb. 1841. Nom. p. 42: div. Commelynacear. Subdivis.: Centrolepideae, Eriocauloneae, *Xyrideae* (gen. ut Endl.)

Brongn. 1843. En. genr. p. 13: fam. Juncinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 130. Gen. ut Kunth 1815.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Enantioblastear.

Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 209. Gen.: Xyris, Abolboda.

Xyridion „Tausch" Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1187 *d*; 1830. Fl. exc. p. 82: sect. Iridis. (Iris spuria L.) — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 793 (*Xyridium*).

Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1556, 2: sect. Limniridis.

Xyridion Tausch cont.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 23; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 94: subg. Iridis. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 818.

Xyridium Steud. vid. *praeced.*

Xyris *) Linn. 1737. Gen. p. 11. n. 31; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 42; 1759. Syst. ed. X. p. 865. n. 59; 1762. Sp. ed. II. p. 62; 1764. Gen. ed. VI. p. 29. n. 64; 1767. Syst. ed. XII. p. 79: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 81; 1784. Syst. p. 95. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 40. t. 14. — Reich. 1778. Gen. p. 30. n. 70. — Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 72 (*Xiris*). — Schreb. 1789. Gen. I. p. 39. n. 89. — Gmel. 1791. Syst. p. 122. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 12; 1818. Fl. cap. I. p. 310. — Pers. 1797. Syst. p. 96; 1805. Ench. I. p. 50. n. 116. — Willd. 1797. Sp. I. p. 254. n. 107. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 46. t. 71. (reform.) — Vahl 1806. Enum. II. p. 204. n. 111. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 30. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 183; ed. 1832. I. p. 178. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 181.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 23. n. 91: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 44. (An Cyperoideis affinior?, an Iridibus?)

Adans. 1763. Fam. II. p. (20: *Xuris*): g. Iridum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 159: g. Tripetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 78: g. Liliacear.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 52. t. 15. f. 3 (indica).

Batsch 1802. Tab. p. 152: g. Juncear. — Par. Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 239.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 109 (*Xiris*): g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 31. 359. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 348. 550. n. 167.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 255. Ed. Nees p. 111: g. Restiacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 189; 1825. Syst. I. p. 181. n. 206. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 180.

Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 326: g. Xyridear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 255. — Kunth 1822. Syn. I. p. 264; 1843. Enum. IV. p. 2. — Agdh. 1823. Aphor. p. 158. — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. — Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1149 (sect. Xyris, Xyroides); 1841. Nom. p. 42. n. 1519 (sect.: Xyris, Pomatoxyris). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55. — Bartl. 1830. Ord. p. 38. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 121. — Endl. 1837. Gen. n. 1025. p. 124; 1841. Ench. p. 69; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 55. Sect.: Euxyris, Pomatoxyris. — Meisn. 1842. Gen. p. 407 (312). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 131. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 332. — Steud. 1855. Glum. II. p. 284. — Seubert 1855 in Mart.

*) ξυρίς s. ξειρίς, planta quaedam aromatica.

*) Nomen ex Plinio: ξυρίς, gladiolus.

Xyris Linn. cont.
Fl. Bras. fasc. XV. p. 211. Sect.: Nematopus, Euxyris, Potamoxyris. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 527.
Link 1821. En. II. p. 444: g. Juncinar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 46. n. 215: g. Restiear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 288; 1847. Veg. kd. p. 187: g. Xyridacear.
Synon. Kotsjiletti Adans.

Xyroides Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 12 in Römer Collect. bot. p. 197: nov. g. Juncor. (Xyridis sp.) *Cf.* Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 348.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1149 *b*: sect. Xyridis.
Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 183: g. a Xyride vix diversum.

Xysmalobium *) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 39 (Verm. bot. Schr. II. p. 376): nov. g. Asclepiadear. (Asclepias undulata et grandiflora). — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 482; 1825. Syst. I. p. 850. n. 983; 1839. Gen. I. p. 211. n. 1079. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XI. 89. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. I. p. 215. (verar.) Sejungitur Pachycarpus. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 902. — Steud. 1841. Nom. II. p. 794 (*Xymalobium*). — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3430: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 146: g. Asclepiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4978. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3487. p. 594; 1841. Ench. p. 299: g. Euasclepiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176).
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 519: g. Haplostemmar.

Xystidium Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 102. t. 2: nov. g. Triandr. Digyn. (X. maritimum.) *Cf.* Spreng. n. Entd. II. p. 265. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 9. 183.
Bartl. 1830. Ord. p. 31: g. Saccharinar.
= Perotis Ait.

Xystris *) Schreb. 1789. Gen. I. p. 138. n. 347: g. Pentandr. Monogyn., inter Jacquiniam et Chironiam collocatum. *Cf.* Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 184. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 390. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIV. 489. n. 787.

*) ξύσμα, strigmentum, ramentum.
*) ξυστρίς, strigil.

Y.

Yermolofia **) Bélanger Voy. Ind. Bot. ic. (An *Yermoloffia*? ex Wittst. Etym. Handw. p. 944.
= Lagochilus Bunge. (Endl. Gen. p. 625.)

Ymnitrichum Necker 1790. Elem. bot. III. p. 329. n. 1741: nov. g. Phryganophytor., a Polytricho L. sejunctum.
= . . . ?

Ymnodiphytum ***) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 151: gen. 43 plantar. Spec. nat.: Leucoium, Galanthus, Narcissus, Pancratium, Crinum, Amaryllis, Alströmeria, Hypoxis, Agave, Bauxia, Haemanthus, Dilatris, Moraea, Galaxia, Pontederia, Cepa, Allium, Tonningia, Tradescantia, Iris, Sisyrinchium, Ixia, Xyphidium, Gethyllis, Crocus, Ferraria, Wachendorffia, Commelina, Stickmannia, Gladiolus, Antholiza.

Ymnostema Necker 1790. Elem. bot. I. p. 133. n. 228: nov. g. Sphanidophytor., a Lobelia L. sejunctum.
= . . . ?

Youngia †) Cassini 1831. Ann. sc. nat. XXIII. p. 88; 1834. Opusc. phys. III. p. 86: nov. g. Lactucear. (Prototypar. verar.) — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 192. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Endl. 1841. Spl. I. n. 3004/2. p. 1388; 1841. Ench. p. 250. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3706. (genuinar.) — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 836. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 114: g. Cichoracear.
Synon. Prenanthis sp. Thunb., etc.; Chondrillae sp. Poir.

Ypoballus Necker 1790. Elem. bot. III. p. 326. n. 1734: nov. g. Phryganophytor., a Bryo L. disjunctum. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 215.
= . . . ?

Ypsilonia **) Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 284: nov. g. Sphaeropsideor. (Y. cuspidata.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492; 1849. ibid. XIII. p. 337: g. Asteromeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 424: g. Ascosporeor.

Ypsoophytum ***) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 372: gen. 31 plantar. Spec. nat.: Fraxinus, Ornus, Haematoxylum, Mayaca, Parnassia, Burghartia, Leontice, Sauvagea, Aldrovanda, Trianthema, Cyrilla, Linconia,

**) Dicat. Alexei Pet. Yermoloff.
***) ὑμενώδης, in modum membranae speciem respiciens; φυτόν, planta.
†) Dicat. Anglis Young, poëtae et physico.
**) Nomen a forma sporarum.
***) ὑψόω, in altum tollo; φυτόν, planta.

Ypsoophytum Necker cont.
Spathelia, Portulaca, Merida, Elaphrium, Weinmania, Monotropa, Antichorus, Tamarix, Cunonia, Hydrangea, Chrysosplenium, Saxifraga, Hydatica, Heuchera, Dionaea, Befaria, Kiggellaria.

Yrmeloffia „Bel." Walp. Rep. III. p. 808 in synon. Lagochili: vid. *Yermolofia Bél.*

Yuca Dill., Adans. vid. *seq.*

Yucca „Lobel. 1570" Rupp. 1718. Fl. jen. p. 141. Ed. Hall. 1745. p. 156: g. pl. class. VI.
Dillen. 1719. Nov. gen. p. 111. t. 5 (*Yuca*): g. herbae Bulbosae.
Linn. 1737. Gen. p. 99. n. 281; 1737. Cliff. p. 130; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 88; 1753. Sp. I. p. 319; 1759. Syst. ed. X. p. 985. n. 388; 1762. Sp. ed. II. p. 456; 1764. Gen. ed. VI. p. 170. n. 429; 1767. Syst. ed. XII. p. 248. n. 425: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 277; 1784. Syst. p. 337. — Reich. 1778. Gen. p. 173. n. 463. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 226. n. 580. — Gmel. 1791. Syst. p. 562. — Pers. 1797. Syst. p. 359; 1805. Ench. I. p. 378. n. 834. — Willd. 1799. Sp. II. p. 183. n. 685; 1809. En. p. 381. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 69 (ed. Schrank 1819. p. 74); 1819. Suppl. p. 31; 1821. Revis. p. 34. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 218.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 73. n. 307: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 292.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 49.
Adans. 1763. Fam. II. p. 49 (*Yuca*): g. Scillar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283. — Agdh. 1823. Aphor. p. 166.
Hill. 1769. Ht. kew. p. 332: g. Monopetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 83: g. Liliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 121. — Hedw. 1806. Gen. p. 245. n. 997. — Link 1821. En. I. p. 333. — Juss. 1823. Dict. v. 26. p. 414. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 222. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 257. n. 1336. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1093.
Medic. 1786. Theod. spec. p. 77: g. Aloarum.
Neck. 1790. El. III. p. 187. n. 1547: g. Gonoophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 34. t. 85.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 171: g. Gloriosar.
Batsch 1802. Tab. p. 140: g. Draconear.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 334: g. Hemerocallidear.

Yucca Lobel. cont.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 289: g. Tulipacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 292. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Brongn. 1843. En. genr. p. 20.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 246; 1825. Syst. II. p. 41. n. 1191: g. Spathacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XLI. 715.
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1413: g. Yuccear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50.
Link 1829. Hdb. I. p. 187: g. Dracaenacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Ornithogalear.
Endl. 1837. Gen. n. 1117. p. 144; 1841. Ench. p. 83: g. Aloinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1844. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (302). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 338.
Miq. 1839. Bull. Neerl. p. 42.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 268: g. Liliaceis aff.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 282: g. Liliear.
Synon. Codonocrinum Willd.

Yuccaeopsis Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 11. 71: sect. Crini. (Cr. sumatranum Roxb.) — Simil. Kunth 1850. Enum. V. p. 553.

Yucceae Rchb. 1828. Consp. p. 66: sect. Dracaenear. Gen.: Apicra, Haworthia, Bowiea, Gasteria, Aloë, Lomatophyllum, Dracaena, Yucca.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: div. Asphodelear. Gen.: Yucca, Lomatophyllum, Aloë, Gasteria, Bowiea, Haworthia, Apicra; Phormium, Tritomanthe.

Yuccites Martius 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . .: nov. g. plant. foss. *Cf.* Flora 1823. I. p. 323, Isis 1823. p. 859 et Sternb. Vers. III. p. 23.
Schimp. & Moug. 1844. Pl. foss. Vosg. p. 42.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 170; 1846. Chlor. prot. p. LXVII: g. Liliacear.

Yulania Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 462: nov. g. Magnolinear. (Magnolia Yulan, Cobus.)
Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7289. 2: sect. Magnoliae.
= Magnoliae Linn. pars.

Yungia Walp. vid. *Youngia Cass.*

Ywlania Endl. Gen. Suppl. V. p. 27 in synon. Magnoliae: vid. *Yulania Spach.*

Yxemia Hampe? mss. olim. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 817.
= Clathropteris Brongn.

Z.

Zacintha *) Tourn. 1700. Inst. p. 476. t. 269: g. pl. class. XIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Par. p. 201: g. Cichoracear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 375. — DC. 1805. Franç. IV. p. 48.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 534. n. 1249: g. Syngenes. (Polygam.) Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1624. n. 1423;

*) Nomen ab insula Zacintho s. Zacyntho, in qua abundare dicitur, quare melius *Zacynthia*. (Beckm. Lex. bot. p. 224.)

Zacintha Tourn. cont.
1809. En. p. 833. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 541. — Link 1822. En. II. p. 294.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 358. t. 157: g. Ligulatar.
Mönch 1794. Meth. p. 533: g. Petalostemonis.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1830. v. 60. p. 228: g. Crepidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3714.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 228: g. Semiflosculosar.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Link 1829. Hdb. I. p. 811: g. Cichoriacear.
Less. 1832. Syn. p. 138: g. Lactucear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 178. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 328: g. Crepoidear.
Synon. Zazintha Hall.; Zacyntha Adans., etc.; Lapsanae sp. Linn.

Zacintha „Arrab." Steud. 1841. Nomencl. II. p. 795: g. Monadelph. Octandr. (Z. nutans.) *Cf. Zacyntha Fl. Flum.*

Zacyntha Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 578; 1826. Syst. III. p. 671. n. 2903; 1831. Gen. II. p. 647. n. 3261: g. Cichorear.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2139; 1831. Fl. exc. p. 254: g. Crepidear. — Par. Koch 1844. Syn. ed. II. p. 499.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3013. p. 499; 1841. Ench. p. 250. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 830. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
= Zacintha Tourn.

Zacyntha Vell. Fl. Flum. VII. t. 9. (Mart. herb. Bras. p. 267.) *Cf. Zacintha Arrab., Steud.*
= Theophrasta Linn. (Endl. Spl. II. p. 67.)
= Clavija Ruiz & Pav. (A. DC.)

Zacynthia Beckm. vid. *Zacintha Tourn.*

Zähringia Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. II.

Zahlbrucknera *) Rchb. 1832. Fl. exc. p. 551: nov. g. Saxifragear. (Saxifraga paradoxa Sternb.) — Par. Koch 1836. Syn. p. 278. Ed. II. p. 306. — Rchb. 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 157. n. 6154. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 4633. p. 814; 1841. Ench. p. 408. — Meisn. 1843. Comm. p. 357.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.
Synon. Oreosplenium Zahlbr.

*) Dicat. Joh. Bapt. Zahlbruckner, botanico styriaco.

Zala *) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 405. Ed. Willd. p. 491: nov. g. Monadelph. Pentandr. (Pistia stratiotes L.)
= Pistia Linn.

Zalacca Rumph. 1747. Amboin. V. p. 57. t. 2. (Roxb. Fl. Ind. III. p. 773.)
„Reinw." Blume 1830 in Schult. Syst. VII. p. 1333: g. (Dioec.) Palmar. (Calamus Zalacca Gärtn.)
Mart. . . . . in Wall. Pl. As. rar. t. 222—224; . . . . Palm. p. 200. t. 118. 119. 123. 150.
Endl. 1837. Gen. n. 1737. p. 249; 1841. Ench. p. 135: g. Lepidocaryinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2239.
Kunth 1841. Enum. III. p. 202: g. Calamear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 354 (265). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 16. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139.
Blume 1843. Rumphia II. p. 161: g. Palmijuncear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 85: g. Lepidocarynear.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 80: g. Lepidocaryinear.
Cf. Salacca Reinw.

Zaleya Burm. 1768. Fl. ind. p. 110. t. 31. f. 3.
DC. 1828. Pr. III. p. 352: sect. Trianthemae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 72. — Endl. 1839. Gen. n. 5168 *b*. p. 948; 1841. Ench. p. 501. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1059.
Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6338: g. Sesuviear.

Zallia „Birm. Ind. 110. t. 3. f. 3" Roxb. Fl. Ind. II. (1832) p. 444 in synon. Trianthemae: vid. *praeced.*

Zalucania Steud. vid. *Zaluzania Pers.*

Zaluzania „Comm. mss." Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 74. t. 192. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 232.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2087: g. Cinchonear.?
DC. 1830. Pr. IV. p. 392: sect. Bertierae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 505. — Endl. 1838. Gen. n. 3295 *b*. p. 560; 1841. Ench. p. 275.
= Adenosacme Wall.? (Miq.)

Zaluzania Pers. 1807. Ench. II. p. 473. n. 1904: nov. g. Syngenes. Superfl. (Anthemis triloba Ort.)
Link 1822. En. II. p. 350 (*Zaluziana*): g. Oppositifoliar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 18; 1828. v. 56. p. 232; 1829. v. 59. p. 232: g. Milleriear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear. — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 795 (*Zalucania*). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.
Less. 1832. Syn. p. 224: g. Heliopsidear. —

*) ζάλη, fluctuatio: planta in aqua fluctuans.

Zaluzania Pers. cont.
Par. DC. 1836. Pr. V. p. 553. — Endl. 1838. Gen. n. 2511. p. 408; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3143. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Zaluzanskia Neck. vid. *Zaluzianskia Neck.*

Zaluziana Link vid. *Zaluzania Pers.*

Zaluzianskia *) Necker 1775. Act. Theod. Palat. Phys. III. p. 303: nov. g. Filicum. (Marsilea quadrifolia L.)
Neck. 1790. El. III. p. 311. n. 1708 (*Zaluzanskia*): g. Sphaeroophytor. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 248.
= Marsilea Linn.

Zaluzianskia Benth. vid. *seq.*

Zaluzianskya J. W. Schmidt 1793 in Usteri Ann. X. p. 115.
Tausch 1834. Flora II. p. 553.
Endl. 1839. Gen. n. 3964. p. 685; 1841. Ench. p. 339: g. Manulear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4641. — Walp. 1845. Rep. III. p. 306. 967.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 318: g. Buchnerear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 340.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 348 (*Zaluzianskia*): sect. Nycteriniae.
Synon. Nycterinia Don.

Zamaria Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: nov. g. Chimarhidiae. (Rondeletiae sp. L.)
= Cupia DC.

Zamia **) Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1659; 1764. Gen. ed. VI. p. 564. n. 1227; 1767. Syst. ed. XII. p. 731: g. Palmar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 70. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 778. n. 1700. — Batsch 1802. Tab. p. 127. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 208. (anomal.)
Murr. 1774. Syst. p. 778; 1784. Syst. p. 926: g. Filicum. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 554. n. 1286. — Linn. f. 1781. Suppl. p. 68. — Juss. 1789. Gen. p. 16. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Pers. 1797. Syst. p. 967. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 67. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 47.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 15. t. 3.
Neck. 1790. El. III. p. 306. n. 1706: g. Pocilmophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 863: g. Polyandr. Polygyn.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 242: g. Dioec. Polyandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 845. n. 1839; 1809. En. p. 1022. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 244.
Rich. 1807 in Pers. Ench. II. p. 631. n. 2282; 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 122; 1810. Ann. Mus. XVI. p. 299: g. Cycadear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 348. Ed. Nees p. 204. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 1. — Kunth 1822. Syn. I. p. 349. — Agdh. 1822. Aphor. p. 134. —

*) Dicat. Adamo Zaluziansky de Zaluzian, Polono.
**) Zamiae Plinio sunt strobili in pinu, nucesque [illegible]

Zamia Linn. cont.
Link 1822. En. II. p. 432; 1829. Hdb. I. p. 265. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 907. n. 3199; 1831. Gen. II. p. 711. n. 3587. — A. Rich. 1826. Conif. p. 198. t. 27. 28. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 249. — Bartl. 1830. Ord. p. 94. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 135.
Rchb. 1828. Consp. p. 40. n. 750: g. Zamiear., sejuncta Arthrozamia restrict.
= Zamia et Encephalartos Lehm.

Zamia Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 99; 1828. Prodr. p. 94: g. foss. Cycadear.
= Palaeozamia Endl.

Zamia Lindl. 1831. Foss. fl. t. 165.
= Zamites Brongn.

Zamia Lehm. 1834. Pugill. VI. p. 3: g. Cycadear., disjuncto Encephalarto restrictum. *Cf.* Flora Lit. V. p. 66. — Par. Vriese 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 152. — Miq. 1841. Mon. Cycad. p. 63; 1843. Linnaea XVII. p. 730. — Morris 1841. Ann. and Mag. VII. p. 113. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 136. — Karst. 1857 in Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 193.
Endl. 1836. Gen. n. 706. p. 71; 1841. Ench. p. 50: g. Cycadeacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1066. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 225.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 442: g. Zamiacear.

Zamiaceae Rchb. 1837. Handb. p. 139: fam. Anoegopteridum. Divis.: Palaeophyta ?, Arthrozamieae, Zamieae.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 442: sect. Cycadear. Gen.: Encephalartos, Zamia.

Zamiae Endl. 1836. Gen. p. 70; 1841. Ench. p. 48: class. (19) Acrobryor. Protophytor. Ordo unicus: Cycadeaceae.

Zamieae Rchb. 1828. Consp. p. 40: div. Cycadeacear. Gen.: Zamia, Arthrozamia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 140: div. Zamiacear. restricta. Gen.: Zamia.

Zamieae Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 148; 1845. Chlor. protog. p. LXI.
= Zamiae Endl.

Zamioculcas Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 71: nov. g. Caladiear. problematicar. (Caladium zamiaefolium Lodd.)

Zamiostrobus Endl. 1836. Gen. n. 707. p. 72; 1841. Ench. p. 50: g. foss. Cycadeacear. (Zamia macrocephala Hensl.) — Par. Unger 1845. Syn. p. 161; 1846. Chlor. prot. p. LXV.
Göpp. 1844. Übers. Arb. schles. Ges. p. . . . : g. Cycadear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 112.

Zamites Brongn. 1828. Prodr. p. 94: g. foss. Cycadear. — Par. Morris 1841. Ann. and Mag. VII. p. 115. — Göpp. 1844. Übers. Arb. schles. Ges. p. . . . — Corda 1845. Fl. Vorw. p. 38. (Z. Bucklandi.) — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 110. Sect.: Podozamites, Pterozamites.
Endl. 1836. Gen. n. 709. p. 72; 1841. Ench. p. 50: g. foss. Cycadeacear. (*Filicites Brongn.*, *Zamites Lindl.*)

Zamites Sternb. 1838. Vers. II. p. 195. 198. 199: g. Cycadeacitum.
= Nilssonia Brongn.

Zamites Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 150; 1846. Chlor. protog. p. LXII: g. Cycadeacear. emend. (*Synon. Zamia Brongn., Palaeozamia Endl., Podozamites C. F. Braun, Ptilophyllum Morr., Otozamites C. F. Braun, Odontopteris Sternb.*)

Zanardinia *) Nardo .... in Atti della II. Riun. Nat. Torino p. 189.
Zanard. 1842. Mem. Ac. Torin. Ser. 2. IV. p. ...: g. Squamariear.
= Padina Adans.

Zanichellia Linn., Hall., Gärtn., Juss., Vent., DC., Lois., Koch, Lehm, Gren. etc.: vid. *Zannichellia Mich.*

Zannichelia Scop. vid. *praeced.*

Zannichelleae Rchb. 1837. Handb. p. 144: div. Potamogetonear.

Zannichellia **) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 70. t. 34: g. pl. class. XV.
Linn. 1737. Gen. p. 278. n. 700; 1737. Fl. lapp. p. 252. Ed. Smith p. 260; 1737. Cliff. p. 437; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 969; 1759. Syst. ed. X. p. 1259. n. 920; 1763. Sp. ed. II. p. 1375; 1764. Gen. ed. VI. p. 476. n. 1034; 1767. Syst. ed. XII. p. 613: g. Monoec. Monandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 212. — Murr. 1774. Syst. p. 700; 1784. Syst. p. 838. — Reich. 1778. Gen. p. 471. n. 1124. — Lour. 1790. Coch. II. p. 543? (Excludenda. *Cf.* Steinheil in Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 88.) — Schreb. 1791. Gen. II. p. 616. n. 1391. — Pers. 1797. Syst. p. 882; 1807. Ench. II. p. 529. n. 2016. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 292. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 181. n. 1623. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 201. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 1. 9.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 198: g. ordinis 8 Apetalar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 2. n. 8: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Inundatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 66 (*Zannichelia*). — Gis. 1792. Prael. p. 326. — Batsch 1802. Tab. p. 161.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Aroidear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 468: g. Arorum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 411: g. Staminear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 77. t. 19. f. 6 (palustris).
Juss. 1789. Gen. p. 19: g. Naiadum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 118; 1826. Syst. III. p. 803. n. 3079; 1831. Gen. II. p. 685. n. 3454. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 111. — C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 196.
Neck. 1790. El. III. p. 278. n. 1671: g. Catabophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 18: g. Monandr. Tetragyn.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 83: g. Fluvialium. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 53. — Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365. — Kunth 1838. Berol. II. p. 308.
DC. 1805. Franç. III. p. 182: g. Alismacear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 455. — Lois. 1829. Dict. v. 59. p. 253.
Rich. 1808. Anal. fr. Ed. Voigt p. 46: g. Potamophilar. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 577.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 32: g. Fluviatilium.
Agdh. 1822. Aphor. p. 124: g. Najadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 72. — Endl. 1837. Gen. n. 1662. p. 231; 1841. Ench. p. 125. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 66. — Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 3. — Webb 1850. Canar. III. p. 300. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 21.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XX; 1828. Consp. p. 43. n. 760: g. Potamogear.
Link 1829. Hdb. I. p. 286: g. Hydrogetonum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Zannichelliacear.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 6: g. Potamogetonear.
Koch 1837. Syn. p. 678. Ed. II. p. 782: g. Potamear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1132. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 477. — Math. 1853. Belg. I. p. 510. — Gay 1854. Compt. rend. Ac. Par. XXXVIII. p. 703. (sect. 2.) — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 320.
Rchb. 1837. Hdb. p. 144: g. Zannichellear.
Steinh. 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 87. Revisio generis.
Kunth 1841. Enum. III. p. 123: g. Zannichelliear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 363 (272). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 15.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 144: g. Naiadacear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 237.
Synon. Algoides Vaill.; Zanichellia Auct.

Zannichelliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Potamogetariear. Gen.: Zannichellia.

Zannichellieae Kunth 1841. Enum. plant. III. p. 123: trib. Fluvialium. Gen.: Zannichellia, Althenia.
Meisn. 1842. Gen. p. 363 (271): trib. Najadear. Gen.: Cymodocea, Halodule, Zannichellia, Althenia, Caulinia, Najas. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 15. Gen. ut Kunth. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 566. Gen. ead.

Zannonia A. St. Hil. vid. *Zanonia Linn.*

Zanonia Plumier 1703. Gen. p. 38. t. 38. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 255.
Cram. 1803. Disp. p. 75. n. 180: g. Hexandr. Monogyn. (Commelina Zanonia L.) — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 220. n. 894.
Sternb. 1822. Flora p. 161.
= Campelia Rich.

---

*) Dicat. G. Zanardini, phycologo.
**) Dicat. Joh. Hieron. Zannichellio.

*) Dicat. Jacobo Zanoni, Bononiensi.

Zanonia Linn. 1737. Coroll. p. 19. n. 987; 1740. Syst. p. 31; 1742. Gen. ed. II. p. 477. n. 903; 1753. Sp. II. p. 1028; 1759. Syst. ed. X. p. 1292. n. 990; 1763. Sp. ed. II. p. 1457; 1764. Gen. ed. VI. p. 523. n. 1117; 1767. Syst. ed. XII. p. 654: g. Dioec. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 742; 1784. Syst. p. 886. — Reich. 1778. Gen. p. 519. n. 1222. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 690. n. 1524. — Pers. 1797. Syst. p. 929; 1807. Ench. II. p. 618. n. 2231. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 769. n. 1796. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 254.

Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 204. n. 847: g. Petalostemonum.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cucurbitacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 152. — Juss. 1789. Gen. p. 397. (dubiar.) — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 298. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 594; 1825. Syst. I. p. 932. n. 1102; 1830. Gen. I. p. 233. n. 1229. — Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1013.

Neck. 1790. El. I. p. 244. n. 397: g. Sygolliphytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 500: g. Pentandr. Trigyn.

A. St. Hil. 1822. Mém. Mus. IX. p. 218 (*Zannonia*): g. Nandhirobear.

Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Cucurbitaceis aff.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 937: g. Zanoniacear. Sect.: Zanonia, Alsomitra. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29.

DC. 1828. Pr. III. p. 298: g. Nhandirobear. Sect. ut Blume. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2772. Sect. eaed. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 3. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 340. (?) — Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). — Endl. 1839. Gen. n. 5122. p. 934; 1841. Ench. p. 489. Sect. eaed. — Arnott 1841. Hook. journ. bot. III. p. 272. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 682. Sect. eaed.

Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3973: g. Zanoniear. Sect. eaed.

Zanonia Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 937: sect. Zanoniae. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 298. — Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2772 *a*; 1841. Nom. p. 101. n. 3973. 1. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 4. — Endl. 1839. Gen. n. 5122 *a*. p. 934; 1841. Ench. p. 489. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 682.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 190: g. Nhandirobear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 113. 117. Sect.: Zanonia, Actinanthera. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.

Synon. Penarvalli Rheede.

Zanoniaceae Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 936: sect. Cucurbitacear. Gen.: Zanonia.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. 29: fam. Cucurbariear. Gen.: Zanonia, Fevillea, Couratarìa, Myrianthus.

Zanonieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 101: div. Cucurbitacear. Gen.: Feuillea, Zanonia.

Zantedeschia Spreng. 1826. Syst. III. p. 756. n. 3056; 1831. Gen. II. p. 680. n. 3431: nov. g. Aroidear. (Calla aethiopica L.) *Cf.* Koch 1854. Ind. sem. Berol. et Müll. Ann. bot. V. p. 892.

Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 116: g. Anaporinar. restrict. (Z. occulta.) — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 210.

Synon. Homalonema Schott.

Zanthorhiza L'Herit. 1784. Stirp. p. 79. t. 38.

Juss. 1789. Gen. p. 243: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 65. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 255 (*Zanthoriza*).

Willd. 1797. Sp. I. p. 1568. n. 600; 1809. En. p. 345: g. Pentandr. Polygyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 341. n. 760. — Elliott 1817. Sketch I. p. 376. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 207.

Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 111 (*Zanthorriza*): g. Thalamostemonis.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 492: g. Ranunculear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 216. n. 885.

DC. 1818. Syst. I. p. 386; 1824. Pr. I. p. 65: g. Paeoniacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV (*Zanthorrhiza*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 65.

Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 40: g. Cimicifugear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 98 (*Zanthorrhiza*): g. Paeoniear.

= Xanthorrhiza Marsh.

Zanthoriza Poir. vid. *praeced.*

Zanthorrhiza Rchb., Brongn. vid. *praeced.*

Zanthorriza Mönch vid. *praeced.*

Zanthoxylaceae Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 64 (46): ordo Rutacear. Trib.: Zanthoxyleae, Ailantheae.

Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 213: ordo Dicotyledonum. Gen.: * Zanthoxylum, Ptelea, Pitavia.

Zanthoxyleae DC. 1813. Théor. élém. p. 215. Ed. II. 1819. p. 245: ordo Calyciflorar.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae. Gen.: Zanthoxylon.

DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141: trib. Rutacear. Gen.: Zanthoxylum, Aubertia. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 422. 497. (*Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 46. p. 467 et 1829. v. 59. p. 257: quarta sect. Rutacear.) Gen.: Dictyoloma, Galvezia, Brucea, Brunellia, Zanthoxylum, Boymia, Toddalia, Vepris, Ptelea. *Affine*: Ailanthus. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. Gen.: Zanthoxylum. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 800. Gen. ut A. Juss. et Blackburnia. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 291.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 589: div. Rutacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII. Gen.: Dictyoloma, Brucea, Brunellia, Xanthoxylon, Toddalia, Ptelea.

Rchb. 1828. Consp. p. 197; 1832. Fl. exc. p. 767: subdiv. Rutariar. Gen. ut A. Juss. et Duncania, Blakburnia, Philagonia?, Labordia, Thysanus?, Triceros?, Trattinickia?

Zanthoxyleae DC. cont.
— Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 282. Gen. ead. et Ailanthus.
Bartl. 1830. Ord. p. 385: ordo (228) Terebinthinar. Gen. ut A. Juss. et Labordia.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 360: fam. (19) Terebinthinear. Gen. ut Bartl.
Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46): trib. Zanthoxylacear. Gen.: Dictyoloma, Galvezia, Brunellia, Vepris, Toddalia, Picrasma?, Zanthoxylum, Boymia, Philagonia?, Ptaeroxylon?, Bischofia?, Ptelea, Blackburnia.
Endl. 1840. Gen. p. 1145; 1841. Ench. p. 608: ordo (250) Terebinthinear. Gen.: Dictyoloma, Pitavia, Brucea, Brunellia, Zanthoxylon, Blackburnia, Boymia, Toddalia, Vepris, Ptelea. *Affinia*: Acronychia, Spathelia, Ailanthus. Accedunt 1850 (Spl. V. p. 101) Thamnosma, Podostaurus, Helietta. (Excluduntur affinia.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 84: fam. Therebinthinear. Gen. ex Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 276: fam. Rutacear. Gen. ut Endl. et Picrasma, Picraena, Nima, Perijea, Helietta, Spathelia, Ailanthus.

Zanthoxylon Walt., Neck., Gis., Dumort. vid. *Zanthoxylum Linn.*

Zanthoxylon Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 147: g. Zanthoxylear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5972. p. 1146; 1841. Ench. p. 609. Sect.: Euzanthoxylon, Pterota, Fagara, Ochroxylum, Pohlana, Rhetsa, Aubertia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 84. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 342. = Zanthoxylum Kunth.

Zanthoxylum *) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 487: g. indefinitum. (ex Catesby desumtum.)
Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 16; 1753. Sp. I. p. 270: g. Pentandr. Trigyn.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 189: g. Pentandr. Pentagyn.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1290. n. 335; 1763. Sp. ed. II. p. 1455; 1764. Gen. ed. VI. p. 519. n. 1109; 1767. Syst. ed. XII. p. 652: g. Dioec. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 741; 1784. Syst. p. 884. — Reich. 1778. Gen. p. 515. n. 1213. — Walt. 1788. Carol. p. 52. 243 (*Zanthoxylon*). — Schreb. 1791. Gen. II. p. 684. n. 1512. — Pers. 1797. Syst. p. 927; 1807. Ench. II. p. 615. n. 2213. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 235. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 753. n. 1783; 1809. En. p. 1013. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 236. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 768.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Gled. 1764. Syst. p. 48. n. 189: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 340.
Scop. 1777. Intr. p. 248 (*Zantoxyllon*): g. Pericarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 333. t. 68. f. 8 (carolinianum et caribaeum).

*) Absque dubio pro Xanthoxylum.

Zanthoxylum Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 374: g. Terebintaceis aff. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 453. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 259.
Lour. 1790. Coch. II. p. 659: g. Polygam. Dioec.
Neck. 1790. El. II. p. 302. n. 1078 (*Zanthoxylon*): g. Synathrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 519 (*Zanthoxylon*): g. Hederacear.
Cram. 1803. Disp. p. 26 in Triandr. Trigyn. et p. 59 in Pentandr. Monogyn.
Tussac 1817. Dict. v. 9. p. 371 (*Clavalier*): g. Terebinthacear.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141: g. Zanthoxylear. Sect.: Fagaroides. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59 (*Zanthoxylon*).
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 801: sect. Zanthoxyli. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 364. — Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46).
Synon. Xanthoxylum Gmel.; Xanthoxylon R. Brown.

Zanthoxylum Colden Novebor. 68. (Endl.) = Euzanthoxylum Endl.

Zanthoxylum HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 1: g. Diosmear., injuncta Fagara ampliat. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 324. — DC. 1824. Pr. I. p. 725.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 74: g. Rutacear.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 503: g. Zanthoxylear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5132. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 386. — Cham. 1830. Linnaea V. p. 58. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 801. Sect.: Zanthoxylum, Fagara, Ochroxylum, Langsdorfia, Aubertia, Ampacus. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 291; 1842. Pl. vasc. Cub. p. 325. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 363. Sect.: Zanthoxylum, Ochroxylum, Ampacus, Langsdorfia. — Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46). Sect.: Zanthoxylum, Tobinia, Pterota, Aubertia, Ochroxylum, Langsdorfia. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 89. t. 23 (1846. p. LXXXV); 1845. Syn. p. 242. — Endl. 1850. Spl. V. p. 101. Sect. ut antea (vid. *Zanthoxylon*) et Perijea. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 414.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 214: g. Zanthoxylacear. Sect.: Zanthoxylum, Ochroxylum.
Synon. Zanthoxylum et Fagara Linn.; Fagaras Burm.; Tenorea Rafin.; Langsdorffia Leand.; Pohlana Nees & Mart.; Zanthoxylon Wight & Arn., Endl.; Lacaris Wall.

Zantoxyllon Scop. vid. *Zanthoxylum Linn.*

Zapania Lamarck Illustr. t. 17.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 322: g. Pyrenacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 250: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — Hedw. 1806. Gen. p. 15. 350. — Pers. 1807. Ench. II. p. 140. n. 1429. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 514. Ed. Nees p. 370. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 257.

Zapania Lamarck cont.
— Griseb. 1844. Rumel. II. p. 152. — Webb .... Canar. III. p. 113 (*Zappania*). Zuccagni 1809 in Römer Collect. bot. p. 117 (*Zappania*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 421: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2937; 1831. Fl. exc. p. 334. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 41: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Elliott 1821. Sketch II. p. 100.
Link 1822. En. II. p. 123: sect. Verbenae.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 71. t. 5: g. Viticear.
Endl. 1838. Gen. n. 3684 *a.* p. 633; 1841. Ench. p. 312; 1842. Spl. II. p. 58 (*Zappania*): sect. Lippiae. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 42. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 580; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 231.
Synon. Bertolonia Raf.; Riedelia Cham.; Cryptocalyx Benth.?; Verbenae sp. Linn.

Zappania Zucc., Endl., Webb vid. *praeced.*

Zarabellia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 10. n. 14: nov. g. Actinophytor., a Gorteria L. sejunctum.
= Berkheya Ehrh.

Zarabellia Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 234. 240; 1830. v. 60. p. 577: g. Milleriear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
DC. 1836. Pr. V. p. 519: sect. Melampodii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2478 *b.* p. 402; 1841. Ench. p. 237. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3016. 2.
Synon. Dysodium Rich.; Alcinae sp. Lag.; Melampodii sp. Kunth.

Zarcoa *) Llanos 1857. Bot. Zeit. p. 423: nov. g. Sterculiar.

Zasmidium Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 407: g. Myxotheciеor. (Antennaria sect. 1 Fries syst.) — Par. Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 132. Sect.: Dendropogon. (Z. Robinsonii.)

Zataria **) Boissier 1844. Diagn. pl. or. nov. I. Nr. 5. p. 18: nov. g. Satureinear., Bystropogoni aff. (Z. multiflora.)
Walp. 1845. Rep. III. p. 981: g. Origanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Origanidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 183: g. Thymear.

Zauscheria Steud. vid. *seq.*

Zauschneria Presl 1831. Reliq. Hänk. II. p. 28: nov. g. Onagrariar. — Par. Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. Pt. III. p. 140. — Steud. 1841. Nom. II. p. 797 (*Zauscheria*).
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 400: g. Epilobiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6122. p. 1192; 1841. Ench. p. 637.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 174 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 405): g. inter Epilobineas et Fuchsineas ambiguum.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6573: g. Zauschneriear.

*) Dicat. duci Zarco del Vallo.
**) Nomen ab Arabico triviali plantarum affinium desumptum.

Zauschneria Presl cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 126 (86): g. Onagrear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 486: g. Epilobinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.

Zauschnerieae Rchb. 1837. Handb. p. 246; 1841. Nomencl. p. 170: sect. Epilobiear. Gen.: Zauschneria.

Zazintha Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 209: g. pl. class. VIII.
Koch 1837. Syn. p. 434: g. Crepidear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 278: g. Liguliflorar.
= Zacintha Tourn.

Zea *) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: g. pl. class. XIV a. (non descriptum.)
Linn. 1737. Gen. p. 279. n. 703; 1737. Cliff. p. 437; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 281; 1753. Sp. II. p. 971; 1759. Syst. ed. X. p. 1260. n. 926; 1763. Sp. ed. II. p. 1378; 1764. Gen. ed. VI. p. 480. n. 1042; 1767. Syst. ed. XII. p. 615: g. Monoec. Triandr. (*Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 263.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 702; 1784. Syst. p. 841. — Reich. 1778. Gen. p. 475. n. 1133. — Lour. 1790. Coch. II. p. 550. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 621. n. 1403. — Pers. 1797. Syst. p. 885. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 200. n. 1636; 1809. En. p. 952. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 203. — Trin. 1820. Fund. p. 200. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 2. 15. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 567.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 19. n. 74: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 78. (spurior.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Link 1822. En. II. p. 377.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 406. — Juss. 1789. Gen. p. 33. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 111. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 88. — Pers. 1807. Ench. II. p. 533. n. 2029. — Palis. 1812. Agrost. p. 136. — Lois. 1823. Dict. v. 28. p. 103 (*Maïs*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 238. n. 242; 1831. Gen. II. p. 687. n. 3468. — Link 1829. Hdb. I. p. 96. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 595 (*Maïs*).
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 37: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 148.
Neck. 1790. El. III. p. 229. n. 1613: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 75: g. Olyrear. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 311. — Koch 1837. Syn. p. 769. Ed. II. p. 889.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 183: g. Oryzear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 153.
Link 1827. Hort. I. p. 253: g. Diclinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1059; 1830. Fl. exc. p. 54: g. Zeacear. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 376.

*) Nomen peculiaris frumenti speciei apud veteres. (Ht. Cliff.)

Zea Micheli cont.
Kunth 1830. Gram. p. 12; 1833. Agrost. p. 19: g. Phalaridear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 742. p. 80; 1841. Ench. p. 56. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 26. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1246. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 172. — Steud. 1854. Glum. I. p. 9.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. (1838.) p. 78: g. Andropogineor.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 234: g. Phalaroidear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 11: g. Panicear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 21: g. Panicacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 477: g. Maydear.
Synon. Mays Tourn.; Mayz Mich.; Thalysia Linn.; Mais Adans.

Zeaceae Rchb. 1828. Consp. p. 55; 1830. Fl. exc. p. 54: div. Graminear. Gen. unicum: Zea.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 376: div. Loxanthar. Gen. id.

Zebrina Schnizlein 1849. Bot. Zeit. p. 868: nov. g. ex typo Tradescantiae zebrinae Hort.

Zedoaria Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 233.
= . . ?

Zeduba Hamilt. mss.
= Calanthe R. Brown. (Meisn. Comm. p. 280.)

Zehneria *) Endl. 1833. Prodr. Fl. Norfolk. p. 69: nov. g. Cucurbitacear., Luffae aff. (Z. Baueriana.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 116.
Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91): g. Cucurbitear. — Par. Arnott 1841. Hook. journ. bot. III. p. 275. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 268. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. n. 5127. p. 936; 1841. Ench. p. 491: g. Melothriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3955. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 654. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 10. 31.
Synon. Pilogyne Schrad.; Bryoniae sp. Auct.

Zelkova **) Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 356: nov. g. a Planera Auct. disjunctum. (Pl. Richardi Michx.)
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 47; 1842. Vég. phan. XI. p. 117: g. Planerear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 29. n. 1849: g. Ulmacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 370. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 645 (*Zelkowa*).
Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 238: subg. Planerae.
Conf. Abelicea Hon. Belli.

Zelkowa Ledeb. vid. *praeced.*

Zenkeria ***) Trin. 1837. Linnaea XI. p. 150. t. 3: nov. g. Festuceor. (Z. elegans.)
Steud. 1854. Glum. I. p. 328: g. Festucacear.

*) Dicat. Joh. Zehner, Vindobonensi.
**) *Zelkoua* nomen vernaculum.
***) Dicat. J. C. Zenker, prof. jenensi.

Zenkeria „Arnott Mag. Zool. and Bot. II. p. 548" Endl. 1842. Spl. II. p. 109. n. 6803/1: g. Caesalpiniear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 611.
Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Cassiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Cynometrear.

Zenkeria Rchb. 1841. Nomencl. p. 236: novum nomen pro *Parmentiera DC.* propositum.

Zenobia D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 158: nov. g. Andromedear. (Andromeda speciosa Mich.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 830. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 597. — Meisn. 1839. Gen. p. 246 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 479. — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4911. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 17. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1113.
Endl. 1839. Gen. n. 3418 *d.* p. 755; 1841. Ench. p. 370: sect. Andromedae.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1389: g. Ericear.
Synon. Eubotrys Nutt.; Cassandra Spach.

Zenopogon *) Link 1831. Handb. II. p. 481 (p. 146 sphalm. *Anthyllis*): nov. g. Genistoidear.
= Barba Jovis Tourn.

Zeobromus Griseb. 1844. Spic. Fl. Rumel. II. p. 449; 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 361: sect. Bromi. (B. mollis, racemosus, etc.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 416.
= Serrafalcus Parlat.

Zeocrithum Beckmann vid. *seq.*

Zeocriton **) Palis. 1812. Agrost. p. 114. t. 21. f. 11: nov. g. Graminear., ab Hordeo L. sejunctum. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 116 [*Zeocritum*]. (spicatar.)
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 792: sect. Hordei. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 845 *a*; 1841. Nom. p. 39. n. 1379. 2. — Endl. 1837. Gen. n. 917 *a.* p. 104; 1841. Ench. p. 60.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 89: g. Hordeacear.
Synon. Zeopyrum Trin.

Zeocritum Ritgen vid. *praeced.*

Zeopyrum Trinius 1824. Gram. unifl. ex Isis 1825. p. 679: sect. Hordei.
= Zeocriton Palis.

Zeora Fries 1825. Pl. homon. p. 244: nov. g. Parmeliacear. Sect.: Imbricaria, Rinodinae. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 270. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 400. Sect.: Tapelia, Rinodina, Imbricaria.
Fries 1831. Lich. eur. p. 86: sect. Parmeliae. Subsect.: Amphiloma, Psoroma. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 172 *B.* p. 15; 1841. Ench. p. 11. — Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 570. 2. — Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 288.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349: g. Parmeliear.

*) *Ζεύς*; *πώγων*, barba.
**) *Ζέα*, spelta; *κριθή*, hordeum; quare rectius *Zeocrithum*. (Beckmann.)

Zeora Fries cont.
Flot. 1850. Bot. Zeit. p. 382: g. Lecanorear. (amplius circumscriptum.) — Par. Arnold 1858. Flora p. 324.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 132: g. Lecanorinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 366: sect. Lecanorae.
Synon. Amphiloma Fries?; Pannaria Delis.?

Zephyra D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 236: nov. g. Conantherear. (Z. elegans.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1154. p. 149; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1810. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 633: g. Anthericear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256.

Zephyranthes Herbert 1821. Append. p. 36; 1825. Bot. Mag. App. p. III; 1837. Amaryll. p. 72. 170: nov. g. Amaryllidear. (Hippeastriform.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Link 1829. Hdb. I. p. 195. — Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1254: g. Amaryllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 12. 119.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 274. n. 1426: g. Spathacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1175.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 796: sect. Amaryllidis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1273 *a*. p. 176; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1601. 1. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 415: subg. Amaryllidis. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 144.
Kunth 1850. Enum. V. p. 580: g. Hippeastrear.

Zephyrites „Herb." Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 11. 101: sect. Habranthi. (H. versicolor Herb.) — Par. Kunth 1850. Enum. pl. V. p. 498.

Zerdana *) Boissier 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 84: nov. g. Sisymbrear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Walp. 1842. Rep. I. p. 173: g. Sisymbriear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 37. n. $4912/_2$.

Zerna Panzer 1814. Denkschr. Ak. Münch. f. 1813. p. 296. t. 11. f. 3: novum g. Graminum. (Bromus asper, giganteus, tectorum etc., Festuca myuros, bromoides, etc.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 115: g. Bromear.
Ledeb. 1829. Alt. I. p. 111: sect. Bromi.

Zerumbet **) Rumph. 1747. Amboin. V. t. 68.
= Curcuma Linn.

Zerumbet Wendland 1798. Sert. Hann. I. fasc. IV. t. 19: nov. g. plant. (Z. speciosum.)
Jacq. . . . . Fragm. t. 68.
Schrank 1824. Syll. Ratisb. II. p. 174: g. Scitaminear. Char. emend.
= Alpinia Gärtn.?

*) Nomen a monte *Zerde* Graeciae.
**) Nomen arabicum.

Zerumbet Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 329: g. Scitaminear. (p. 341 Costoidear.)
= Zingiber Gärtn.? (Endl. Spl. II. p. 22.)

Zetocapnia „Link & Otto in icone" Steud. Nom. I. p. 224; II. p. 798.
= Coetocapnia Link & O.

Zeugites *) P. Browne 1756. Jamaic. p. 341. t. 4. f. 3.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 810. n. 1763: g. Monoec. Triandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 204. n. 1639.
Gis. 1792. Prael. p. 136: g. Graminum. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 192.
Batsch 1802. Tab. p. 156: g. Graminear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 533. n. 2033. — Palis. 1812. Agrost. p. 110. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 337. n. 339; 1830. Gen. I. p. 73. n. 356. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 272. — Kunth 1833. Agrost. p. 520 (dubium). — Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 247 (dubiae sedis).
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Oryzear.?
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 180: g. Saccharinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 979. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.
Endl. 1837. Gen. n. 955. p. 109; 1841. Ench. p. 60: g. Andropogonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1336. — Meisn. 1843. Gen. p. 429 (328). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Steud. 1854. Glum. I. p. 411.
Synon. Senites Adans.

Zeugnema Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: nomen emendat. pro ***Zygnemate Agdh.*** propositum.

Zeugophyllites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 123; 1828. Prodr. p. 121; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 138: g. Palmar. foss. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1782. p. 257; 1841. Ench. p. 136. — Unger 1845. Syn. p. 183; 1846. Chlor. prot. p. LXX.
M'Coy 1847. Ann. and Mag. XX. p. 152: g. Palmacear.

Zeuxina Steud. vid. *seq.*

Zeuxine Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528); 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1430; 1841. Nom. p. 55. n. 2144. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1577. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 485; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Physuridar. Sect.: Euzeuxine, Cionisaccus. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1565. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 723.
Steud. 1841. Nom. II. p. 798 (***Zeuxina***): g. Orchidear.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 20. Sect. ut Lindl.

*) Nomen ex Plinio.

Zeuxine Lindl. cont.
Falconer 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 73: g. Ophrydear.
Wight 1851. Ic. fl. Ind. V. 1. p. 16 (semper *Zuxine*) t. 1724 bis. 1725. 1726: g. Neottear.
Synon. Adenostyles Blume; Cionisaccus Kuhl & Hass.

Zexmenia *) La Llave & Lexarza 1824. Nov. veg. descr. I. p. 13: nov. g. Polygam. Superfl. (Verbesinar. — Z. serrata.)
Less. 1832. Syn. p. 420 (sph. *Zexmeria*): g. Synantherear. minus notum.
Benth. 1852 in Vidensk. Meddel. p. 95: g. Verbesinear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 225.

Zexmeria Less. vid. *praeced.*

Zeyhera DC., Lindl. vid. *seq.*

Zeyheria **) Martius 1826. Nov. gen. II. p. 65. t. 159; 1837. Herb. fl. Bras. p. 956: nov. g. Bignoniacear. (Z. montana.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 111. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677 (*Zeyhera*).
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3263: g. Bignoniear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 227. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 566.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123. 130 (*Zeyhera*); 1845. Pr. IX. p. 211: g. Catalpear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 300 (208).
Endl. 1839. Gen. n. 4116. p. 712; 1841. Ench. p. 346: g. Tecomear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4548. — Miquel 1842. Flora II. p. 428.
Synon. Chasmia Schott?

Zeyheria A. Spreng. 1828. Tent. suppl. p. 92: nov. g. Syngenes.
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2405: g. Anthemear.?
= Geigeria Griess.

Zeylanidium Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 104; 1852. Arch. Mus. VI. p. 138: sect. Hydrobryi. (Podostemon olivaceus et griseus Gardn.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 439. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 785.

Zichia Steud. vid. *seq.*

Zichya „Hügel in Bot. Arch. t. 1" Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 39: nov. g. Phaseolear. (Z. Molly.) — Par. Steud. 1841. Nom. II. p. 798 (*Zichia*). — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 130.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 123: g. Kennedyear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6642. p. 1290; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5798. — Walp. 1842. Rep. I. p. 757. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 92. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 52; 1842. ibid. t. 68: g. Papilionacear.
Synon. Kennedyae sp. Vent.

*) Anagramma nominis Ximenez.
**) Dicat. Equiti Zeyher, Magniducis Badensis hortorum praefecto.

Ziera Dumort. vid. *seq.*

Zieria *) Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 216.
Hedw. 1806. Gen. p. 68. n. 327: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 498.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 35): g. Diosmear. — Par. DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141; 1824. Pr. I. p. 722. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 180. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 483. — Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5166. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45 (*Ziera*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 794. — Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 32. 481. n. 586: g. Rutacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 674; 1825. Syst. I. p. 442. n. 467; 1830. Gen. I. p. 98. n. 489. — Link 1821. En. I. p. 142. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 274.
Bartl. 1830. Ord. p. 388: g. Boroniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 341. — Endl. 1840. Gen. n. 6003. p. 1154; 1841. Ench. p. 612. — Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7514. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.

Ziervoglia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 254. n. 404: nov. g. Campylophytor., a Cynancho L. disjunctum. *Cf.* Juss. 1829. Dict. v. 59. p. 275.

Zietenia **) Gleditsch 1764. Syst. p. 185. n. 766; 1766. Act. Ac. Berol. p. 3: novum g. Petalostemonum. (Verticillatar., Stachydi aff.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 125. n. 1393: g. Labiatar. — Par. Link 1822. En. II. p. 110.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2880: g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Betonicear.
Benth. 1834. Labiat. p. 563; 1848 in DC. Pr. XII. p. 486: sect. Stachydis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 834. — Endl. 1838. Gen. n. 3650 *i.* p. 626; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4078. 7. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 142. — Walp. 1845. Rep. III. p. 841. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 694. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 418. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 693.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166: g. Stachydear.

Zigadenus ***) Rich. 1803 in Michx. Fl. boram. I. p. 213. t. 22: nov. g. Hexandr. Trigyn. (Veratro aff.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 398. n. 883. — Elliott 1817. Sketch I. p. 420. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 233.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 115: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 252. n. 1022.

*) Dicat. J. Zier, soc. Linn. Londin. socio.
**) Dicat. Hans Joach. de Zieten.
***) ζυγός, jugum.

Zigadenus Rich. cont.
Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 30: g. Liliacear.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 329: g. Veratrear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 167. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 130.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 193; 1825. Syst. II. p. 147. n. 1369: g. Juncear.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1298: g. Helonicar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.
Schult. 1830. Syst. VII. p. CI. 1559: g. Melanthacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 288. n. 1491. — D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 233. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1209.
Bartl. 1830. Ord. p. 52: g. Colchicacear.
A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 111: g. Melanthear.
Synon. Helonias Sims; Zygadenus Endl.; Melanthii sp. Auct.

Zignoa **) Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. (Bot. Zeit. 1843. p. 233 et Flora 1843. p. 265): nov. g. Ulvear. (Ulva ramulosa Engl. Bot.) — Par. Nägeli 1847. Alg. Syst.
Endl. 1843. Spl. III. p. 19. n. 57: g. Ulvacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Ileinar.
= Enteromorpha Link. (Kütz.)

Zigophyllum Juss. Gen. p. LXVIII: vid. *Zygophyllum Linn.*

Zilla ***) Forsk 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 121: nov. g. Tetradynam. Siliculos. (Bunias spinosa L.)
Scop. 1777. Intr. p. 320: g. Siliculosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 678.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 646; 1824. Pr. I. p. 224: g. Zillear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV; 1828. Consp. p. 182. n. 4723; 1841. Nom. p. 179. n. 6902. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 255. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4964. p. 885; 1841. Ench. p. 451. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 854. n. 2268; 1831. Gen. II. p. 513. n. 2511: g. Synclistar.
Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 276: g. Crucifcrar.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 258: g. Calepinear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 326: g. Carcerulosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Zillidar.

Zilleae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 244; 1821. Syst. II. p. 153. 646; 1824. Prodr. I. p. 224: trib. Orthoplocear. Gen.: Zilla, Muricaria, Calepina. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 255. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 885; 1841. Ench. p. 451. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV: subdiv. Lomentacear. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 182; 1832. Fl. exc. p. 655: subdiv. Raphanear. Gen. ead.
Koch 1836. Syn. p. 76. Ed. II. p. 82: trib. Nucamentacear. Gen.: Calepina.
Rchb. 1841. Nom. p. 179: subsect. Calepinear. Gen.: Zilla, Muricaria.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 93: trib. Cruciferar. Gen. ex DC.

Zillidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Orthoplocear. Gen. Zillear. DC.

Zingiber „Boerh." Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 234.
„Diosc." Adans. 1763. Fam. II. p. 66: g. Zingiberum.
= seq.?

Zingiber Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 33. t. 12. f. 1: nov. g. pro Amomi Linn. speciebus constitutum.
Roxb. 1812. Asiat. research. XI. p. 518: g. Scitaminear. *Cf.* Link Jahrb. I. 1820. p. 94. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 329. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 3. 23 (emend. ibid. p. 564.) — Kunth 1822. Syn. I. p. 322. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 12. n. 12; 1830. Gen. I. p. 6. n. 12. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 14. — Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 312. (p. 341 Alpiniear.)
Salisb. 1812. Hortic. trans. I. p. 284: g. Zingiberear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2210. — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 276: g. Scitaminum veror.
Roxb. 1819. Corom. III. p. 49. t. 253; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 46; ed. 1832. I. p. 47: g. Monandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 4; 1829. Hdb. I. p. 231: g. Alpiniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1595: g. Amomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 41: g. Zingiberum. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1622. p. 222; 1841. Ench. p. 119.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 322; 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 25. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 592.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Kämpferiear.
G. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 217 (*Gingembre*): g. Globbear.
Synon. Zinziber Marcgr.; Lampujang Rumph.; Jägera et Dieterichia Gis.; Dietrichia Wittst.; Cassumunar Colla; Zerumbet Lestib.?

---

* [illegible]
**) [illegible]

Zingibera Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 41: div. Scitaminear. Gen.: Zingiber, Curcuma, Kämpferia.
Endl. 1837. Gen. p. 222; 1841. Ench. p. 119: sect. Zingiberacear. Gen. ead. et Roscoea.

Zingiberaceae L. C. Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 36.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 322) 1847. Veg. kd. p. 165: ordo Amomalium. Gen. Endlicheriana et Colebrookia, Ceratanthera, Mantisia, Trilophus, Gamochilus, Peperidium, Jacuanga.
Endl. 1837. Gen. p. 221; 1841. Ench. p. 118: ordo (88) Scitaminear. Sect.: Globbae, Zingibera, Amoma, Alpiniae, Costi. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 388 (290). Trib.: Globbeae, Zingibereae, Amomeae, Alpinieae, Costeae.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: trib. Amomear. Sect.: Kämpferieae, Amomeae, Alpinieae, Costeae, Globbeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 24: fam. Scitaminear. Gen. ex Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 355: fam. Monocotyledonum. Trib.: Kämpferieae, Hedychieae, Curcumeae, Alpinieae, Costoideae, Mantisieae.
Synon. Amomeae Juss; Scitamineae R. Brown; Alpiniaceae Link; Curcumaceae Dumort.

Zingibereae Salisb. 1812. Trans. hortic. soc. I. (1815.) p. 279: ordo Monocotyledonum. Gen.: Renealmia, Hellenia, Galanga, Ethanium, Gethyra, Cardamomum, Marogna, Torymenes, Alexis, Zingiber, Curcuma, Kämpferia.
Rchb. 1841. Nom. p. 56: subdiv. Amomear. Gen. Zingiberum Endl.
Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290): trib. Zingiberacear. Gen. ead. et Hitchenia.

Zingiberes Adans. 1763. Fam. II. p. 61: fam. 9 plantar. Gen.: Costus, Curcuma, Zingiber, Alpinia, Maranta, Katubala, Pacoseroca, Caraguata, Pinguin, Karatas, Hoiriri, Bromelia, Ananas, Musa, Bihai, Ravenala.

Zinnia*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1221. 1377. n. 1161; 1763. Sp. ed. II. p. 1269; 1764. Gen. ed. VI. p. 437. n. 974; 1767. Syst. ed. XII. p. 561: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 641; 1784. Syst. p. 771. — Reich. 1778. Gen. p. 427. n. 1046. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 563. n. 1305. — Gmel. 1791. Syst. p. 1246. — Pers. 1797. Syst. p. 812; 1807. Ench. II. p. 458. n. 1871. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2139. n. 1509; 1809. En. p. 901. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 166. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 435.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 188. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 529. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 415. — Link 1822. En. II. p. 340.

*) Dicat. Gottfr. Zinn, prof. Gotting.

Zinnia Linn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 130: g. Bidentium.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.
Gled. 1764. Syst. p. 257. n. 1066: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 608.
Scop. 1777. Intr. p. 132: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 19. n. 33: g. Actinophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 459. t. 172: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 564; 1826. Syst. III. p. 578. n. 2798; 1831. Gen. II. p. 633. n. 3158.
Schrank 1815. Denkschr. Regensb. Ges. I. p. 145. Char. emend.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 250: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 489. — Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17. (Archetypar.) — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2645. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 137. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 139. 315; 1830. v. 60. p. 576: g. Verbesinear.
Link 1829. Hdb. I. p. 775: g. Coreopsidear. — Par. Less. 1830. Linnaea V. p. 156.
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 155.
Less. 1832. Syn. p. 221: g. Wedeliear.
DC. 1836. Pr. V. p. 534: g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2493. p. 405; 1841. Ench. p. 238. Sect.: Euzinnia, Pseudozinnia, Calozinnia. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 348. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 298. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3123. Sect. ut Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 105 Diplothricem DC. injungit. Sect.: Zinnia, Diplothrix, Heterogyne. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 216.
Synon. Lepia Hill; Lejica Hill; Crassina Scep.

Zinziber Marcgr. 1648. Brasil. p. 17 c. ic.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 119: g. Diandr. Monogyn.
= Zingiber Gärtn.?

Zippea Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 76. t. 26: nov. g. Protopteridear. (Z. disticha.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 84: g. Caulopteridear.

Zippelia *) Blume 1830 in Schult. f. Syst. VII. p. 1614. 1651. n. 1320 a: nov. g. Saururear. (Z. begoniaefolia.)
Endl. 1837. Gen. p. 265. n. 1821; 1841. Ench. p. 149. n. 1823/1: g. Piperacear. — Par. Kunth 1839. Linnaea XIII. p. 562. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 11.
Benn. 1848 in Horsf. pl. jav. rar. p. 76. t. 16. (Z. lappacea.)
Miquel 1839. Bull. Néerl.; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 172; 1840. Comm. phyt. II. p. 41: g. Zippeliear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335 (247).

*) Dicat. Zippelio, botanico batavo.

Zippelia Blume cont.
Miq. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 288: g. Zippeliar.
Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2576: g. Piperear. genuinar.
Miq. 1844. Syst. Piper. II. p. 548: g. Zippelinar. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 604. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. n. 1823/14.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar.

Zippelia Rchb. 1837. Handb. p. 164: g. Rafflesiear.
= Brugmansia Blume.

Zippeliae Miquel 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 288: vid. *Zippelieae Miq.*

Zippelieae Miquel 1839. Bull. Néerl. Livr. 6; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 169; 1840. Comm. phyt. II. p. 33. 41: trib. Piperacear. Gen.: Zippelia, Serronia. *Cf.* Isis 1840. p. 498. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335 (247). Gen.: Zippelia, Ottonia.

Zippelinae Miquel 1843. Syst. Piperac. I. p. 46; 1844. II. p. 535: cohors Piperacear. Gen.: Ottonia, Zippelia. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 604. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. Gen. ead.

Zizania *) „Gronov." Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 455. n. 863; 1753. Sp. II. p. 991; 1759. Syst. ed. X. p. 1269. n. 942; 1763. Sp. ed. II. p. 1408; 1764. Gen. ed. VI. p. 491. n. 1062; 1767. Syst. ed. XII. p. 627: g. Monoëc. Hexandr. — Par. Gron. 1743. Fl. Virg. II. p. 189. — Murr. 1774. Syst. p. 714; 1784. Syst. p. 855. — Reich. 1778. Gen. p. 488. n. 1159. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 639. n. 1433. — Pers. 1797. Syst. p. 899; 1807. Ench. II. p. 561. n. 2077. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 394. n. 1675. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 210. — Trin. 1820. Fund. p. 206.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 77. n. 322: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 78. (spurior.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 74. — Link 1822. En. II. p. 391.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 33. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 87. — Palis. 1812. Agrost. p. 124. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 136. n. 1330; 1830. Gen. I. p. 282. n. 1459. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 343.
Neck. 1790. El. III. p. 231. n. 1617: g. Achyrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 579: g. Hexandr. Digyn.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 75: g. Olyrear. (An Oryzeis affinior?)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 182: g. Oryzear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 152. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 959; 1841. Nom. p. 36. n. 1253. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Kunth 1830. Gram. p. 7; 1833. Agrost. p. 9. — Endl. 1836. Gen. n. 732. p. 78; 1841. Ench. p. 56. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 231. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 11. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 4.
Link 1827. Hort. I. p. 251: g. Diclinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Oryzacear.
Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 182: g. Oryzeor.
Synon. Elymus Mitch.; Fartis Adans.

*) ζιζάνιον apud solos evangelistas in novo testamento. (Beckmann.)

Zizia *) Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 128: nov. g. Amminear. (Smyrnium aureum L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3727; 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5376. (genuinar.) — DC. 1830. Pr. IV. p. 99. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 276. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4392. p. 769; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 940. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 614. Sect.: Euzizia, Taenidia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 111.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.
Synon. Smyrnium Ell.; Smyrnium et Thaspium Nutt.

Zizia Roth . . .
= Petrocallis R. Brown.

Zizifora Adans. vid. *seq.*

Ziziphora Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 305: g. Didynam. Gymnosperm. (Ziziphorum Moris., Acinos sp. Moris.)
Linn. 1737. Cliff. p. 502; 1737. Coroll. p. 1. n. 936; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 13. n. 28; 1748. Ups. p. 9; 1753. Sp. I. p. 21; 1759. Syst. ed. X. p. 853. n. 33; 1762. Sp. ed. II. p. 31; 1764. Gen. ed. VI. p. 16. n. 36; 1767. Syst. ed. XII. p. 64: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 63; 1784. Syst. p. 67. — Reich. 1778. Gen. p. 17. n. 39. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 21. n. 47. — Lour. 1790. Coch. I. p. 27. — Gmel. 1791. Syst. p. 43. — Pers. 1797. Syst. p. 68. — Willd. 1797. Sp. I. p. 123. n. 60; 1809. En. p. 31. — Vahl 1805. Enum. I. p. 216. n. 53. — MBieb. 1808. Taur. cauc. I. p. 17; 1819. III. p. 20.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 164. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 189. 504 (*Zizifora*). — Juss. 1789. Gen. p. 111. Vent. 1799. Tabl. II. p. 328. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 255. — Hedw. 1806. Gen. p. 15. 350. — Pers. 1807. Ench. II. p. 129. n. 1403. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 57. 208. n. 93. — Link 1821. En. I. p. 17; 1829. Hdb. I. p. 498. —

*) Dicat. J. B. Ziz.

Ziziphora Linn. cont.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 55. n. 92; 1830. Gen. I. p. 18. n. 67. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 822. — Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 345. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 20. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 96.
Hill 1769. Ht. kew. p. 248: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 316. t. 66 f. 3 (capitata).
Neck. 1790. El. I. p. 300. n. 469: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 430: g. Salviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2838: g. Nepetear.
Benth. 1835. Labiat. p. 727: g. Monardear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 760. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 68. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 368.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Origanear.
Endl. 1838. Gen. n. 3602. p. 616; 1841. Ench. p. 307: g. Rosmarinear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 684.
Synon. Hedyosmos Mitch.?; Faldermannia (Fladermannia?) Bunge?; Zizyphora Dumort.

Ziziphus Tourn. 1700. Inst. p. 627. t. 403: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 122. Ed. Hall. 1745. p. 136: g. pl. class. V.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rhamnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 380.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 470: g. Rhamnoidear.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 100: g. Thalamostemonis.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 270: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 183. n. 755. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 257 (*Jujubier*). — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1141.
Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 333; ed. 1832. I. p. 606: g. Pentandr. Monogyn.
Synon. Zizyphus Auct.; Nabca Pr. Alp.; Jujuba Burm.; Mansana Gmel.; Rhamni sp. Linn.; Paliuri sp. Vahl.

Zizypheae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 122: trib. Rhamnear. Gen.: Karwinskia, Rhamnus, Berchemia, Condalia, Zizyphus, Paliurus. — Par. A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 354. Gen.: Zizyphus.

Zizyphi Adans. 1763. Fam. II. p. 297: fam. 42 plant. Gen. §. 1: Tsiem-tani, Chloroxylum, Maurocena, Staphylaea, Evonymus, Celastrus, Paliurus, Zizyphus, Alaternoides, Byttneria. §. 2. Frangula, Alaternus, Rhamnus, Guidonia, Icaco, Prunus, Cerasus, Amygdalus, Sasali. §. 3: Tribulus, Guaiacou, Fagonia, Fabago, Iripa, Agialid, Jambolana, Carambola.

Zizyphora Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.
Benth. 1835. Labiat. p. 320; 1848 in DC. Pr. XII. p. 364: g. Monardear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4067. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 114. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 970.

Zizyphora Dumort. cont.
Meisn. 1840. Gen. p. 284 (192): g. Rosmarinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p 661: g. Rosmarinidar.
= Ziziphora Linn.

Zizyphus *) Adans. 1763. Fam. II. p. 304: g. Zizyphor.
Scop. 1777. Intr. p. 208: g. Dumosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 202. t. 43. f. 4 (sativa).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 151. (Rhamnus Zizyphus L.)
Willd. 1797. Sp. I. p. 1102. n. 406; 1809. En. p. 250: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 153.
Cram. 1803. Disp. p. 62. 67 in Pentandr. Trigyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 241: sect. Rhamni.
DC. 1805. Franç. IV. p. 625: g. Frangulacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3817.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 902: g. Rhamnear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 659; 1825. Syst. I. p. 770. n. 838; 1830. Gen. I. p. 181. n. 916. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVII. 334. n. 963. — DC. 1825. Pr. II. p. 19. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 56. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 177. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 354. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — Link 1831. Hdb. II. p. 219. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 486. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 23. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 161. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 441. — Koch 1836. Syn. p. 147. Ed. II. p. 161. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 808. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 149. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 334. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 159 (*Jujubier*). — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 118.
Link 1821. En. I. p. 229: g. Rhamnoidear.
D. Don 1825. Nepal. p. 189: g. Rhamneacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Rhamnidear.
Endl. 1840. Gen. n. 5717. p. 1096; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5588. (genuinar.) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 501. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 741.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: g. Zizyphear. — Par. A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 354.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
= Ziziphus Tourn.

Zoëgaea Linn. 1770 vid. *seq.*

Zoëgea **) Linn. 1767. Mantissa p. 15. n. 1271; 1767. Syst. ed. XII. p. 571; 1770. Mant. p. 117 (*Zoëgaea*): g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 652; 1784. Syst. p. 784. — Reich. 1778. Gen. p. 437. n. 1065. — Schreb. 1791.

*) Arbor apud Palladium.
**) Dicat. Zoega, Linnaei discipulo.

Zoëgea Linn. cont.
Gen. II. p. 578. n. 1331. — Gmel. 1791. Syst. p. 1263. — Pers. 1797. Syst. p. 826; 1807. Ench. II. p. 481. n. 1928. — — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2276. n. 1547.
Scop. 1777. Intr. p. 135: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 174: g. Cinarocephalar. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 503. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 386.
Neck. 1790. El. I. p. 17. n. 29: g. Actinophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 538: g. Capitatar.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 158: sect. Cyani.
Link 1822. En. II. p. 355: g. Acarnacear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 408. n. 2662; 1831. Gen. II. p. 608. n. 3000: g. Cynarear.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 36; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 560 (*Zyégée*): g. Jaceinear. verar.
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2692: g. Centaureear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Centauriear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 7. — DC. 1837. Pr. VI. p. 562. — Endl. 1838. Gen. n. 2866. p. 471; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. 64. — Brongn. 1843. En. genr. p. 36. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3650: g. Zoëgeear.

Zoëgeeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 93: div. Amphicenianthar. Gen.: Amberboa, Zoëgea, Microlonchus, Tricholepis, Tomanthea.

Zollernia *) Nees 1827. Nov. Act. Leop. XIII. 2. Praef. p. XIII. t. C. D; 1829. Flora II. p. 414: nov. g. Swartziear. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 45. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4158; 1841. Nom. p. 156. n. 6109. — Bartl. 1830. Ord. p. 413. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 380. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 146. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68). — Vogel 1837. Linnaea XI. p. 166. — Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73. — Endl. 1841. Gen. n. 6813. p. 1322; 1841. Ench. p. 681. — Walp. 1842. Rep. I. p. 841. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Tul. 1854. Arch. Mus. IV. p. 190: g. Caesalpiniear.
Synon. Acidandra Mart.; Coquebertia Brongn.

Zollikofera „Nees" Endl. Gen. p. 499: vid. *Zollikoferia Nees.*

Zollikoferia **) Nees 1825 in Bluff & Fing. Comp. II. p. 305: g. Cichoracear., a Cl. Zollikofer (mss.) nomine *Peltidii* propositum. (Crepis apargioides W.) — Par. Gaud. 1829. Helv. V. p. 2. 142.
= Willemetia Neck.

Zollikoferia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 138: nov. g. Lactucear. (Sonchus chondrilloides Desf.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Endl. 1841. Spl. I. n. 3002/1. p. 1388; 1841. Ench. p. 250. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3720 (*Zollikofferia*): g. Crepidear.
= Rhabdotheca Cass.

Zollikofferia Rchb. vid. *Zollikoferia DC.*

Zollingeria Schultz Bip. 1854. Flora p. 273: nov. g. Artemisicar., Artemisiae aff. (Z. scandens). *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 246.

Zomicarpa *) Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 33: nov. g. Zomicarpear. (Arisarum Pythonium Blume.)

Zomicarpeae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 33: trib. Aroidear. efilamentatar. stenozeugmaticar. anatropooar. Gen.: Zomicarpa.

Zonaria Rouss. 1806. Fl. Calvad. teste Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 143.
= Thelephora Ehrh.

Zonaria Drap. (1801. Disc. s. l. moeurs des pl.?)
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XX. 40: g. Ulvoidear. *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 59. p. 352 et Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 361.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 19: g. Phycoidator.
Agdh. 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 124; 1821. Aphor. p. 101: g. Fucoidear.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 340: g. Dictyotidear.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXVII. 263: g. Laminariear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 328: sect. Dictyotae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 508 *a*.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 326. n. 3391; 1831. Gen. II. p. 749. n. 3791: g. Phycoidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Dictyotacear.
Endl. 1836. Gen. n. 105. p. 9; 1841. Ench. p. 7: g. Fucacear. Sect.: Padina, Dictyota, Halyseris.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 462: g. Eudictyotear. (*Synon. Padina Lamx., Trattinickia Web. & M.*)

Zonaria Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: nov. g. Ulvar. (Ulva Pavonia L.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 512.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 192: g. Ulvacear.
= Ulvae Lamx. pars.

Zonaria J. Agardh 1841. Linnaea XV. p. 444; 1842. Alg. medit. p. 38; 1848. Sp. Fuc. p. 106: g. emend. Dictyotear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 25. n. 91. — Kütz. 1843 Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 341; 1845. Phyc. germ. p. 273; 1849. Sp. Alg. p. 565. n. 371. — Sonder 1846 in

---

*) [illegible] III
**) [illegible]

*) [illegible]

Zonaria J. Agardh cont.
Lehm. Pl. Preiss. II. p. 155. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Menegh. 1841. Alg. ital. p. 232.
Zanard. 1843. Class. Fic. p. 10: g. Zonariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 105; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 218: g. Dictyotacear.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 362: g. Phaeosporear.
Synon. Pterigospermum Targ.; Cora Fries 1825.

Zonariaceae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. . . .: ordo 12 Algar. Trib.: Chantransieae, Padineae, Fuceae.

Zonarideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 318 (div. Thalassiophytar.): vid. *Dictyotideae Gray.*

Zonarieae Post. & Rupr. 1840. Illustr. Alg. p. . . .: trib. Algar. Gen.: Padina, Corallina.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Ectogymnosporear. Gen.: Zonaria, Aglaozonia.

Zonarites Sternb. 1838. Vers. II. p. 34: g. Fucoiditum.
Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 54. n. $122/_{96}$: g. Algar. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 60.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 6; 1846. Chlor. prot. p. XXVI: g. Phycear. foss. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57.

Zonarius Örsted 1843 in Cons. nat. cur. Scand. Jul. (*cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 623): nov. g. Algar., Elachistae aff.

Zonotrichia *) J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 9: nov. g. Rivulariear. (Z. hemisphaerica.) — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. (Flora 1843. p. 92.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 13. n. 18. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 91. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 362.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Rivularidar.
= Euactis Kütz. sp.

Zoocarpa **) Bory 1827. Dict. class. XVI. p. 724: g. Zoocarpear.
= Conferva Agdh.

Zoocarpea Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 517: sect. Hydronematear. Gen.: Anthophysa, Tiresias, Cadmus.

Zoocarpeae Bory 1827. Dict. class. XVI. p. 724: quarta tribus Arthrodiear. Gen.: Anthophysis, Tiresias, Cadmus. — Par. Leman 1829. Dict. v. 59. p. 355.

Zoogalactina Sette 1824. Mémoire in 8.
Pauls. 1827 in Schweigg. Jahrb. II. p. 396.
= Protococcus Agdh.? (Endl. Gen. p. 3.)

Zoogloea Cohn 1854. Nov. Act. Leop. XXIV. 1. p. 123. t. 15. f. 9: nov. g. Mycophycear. (Palmella infusionum Ehr.) *Cf.* A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 14.

Zoophthalmum P. Browne 1756. Jamaic. p. 295. t. 31: nov. g. Diadelph. Decandr.
DC. 1825. Pr. II. p. 405: sect. Mucunae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3949 *a.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 363. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 337. — Endl. 1841. Gen. n. 6665 *a.* p. 1295; 1841. Ench. p. 671.

Zoopsis Hook. f. & Tayl. 1845. Fl. antarct. p. 167. t. 66. f. 6: nov. g. Hepaticar. (Z. argentea.) — Par. Mitten 1858 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 164. (frondosar.)
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 473: g. Codoniear. — Par. Lehm. 1846. Pl. Preiss. II. p. 129.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549: g. Frondosor.

Zoospermeae J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 1: div. Algar. Trib.: Rivularieae, Oscillatorieae, Conferveae, Ulvaceae, Siphoneae, *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 466.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: fam. I. Phycear. Trib.: Palmelleae, Nostochineae, Leptothriceae, Rivularieae, Oscillarieae, Hydrodictyeae, Zygnemeae, Conferveae, Draparnaldieae, Caulerpeae, Acetabularieae, Halimedeae, Lemanieae, Ulvaceae.

Zoosporeae Decaisne 1841. Arch. Mus. II. p. 115; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 305. 306. 326 (Flora 1843. p. 87. 92): div. Algar. Trib.: Nostochineae, Rivularieae, Oscillatorieae, Palmelleae, Ulvaceae, Confervaceae, Hydrodictyeae, Chaetophoroideae, Lemaneeae, Halymedeae, Caulerpeae, Acetabularieae, Siphoneae. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 376. — Par. Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 216. Sect.: Chlorosporeae, Phaeosporeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XI. 1: ordo Algar. Fam.: Oscillatorieae, Nostochineae, Confervaceae, Ulvaceae, Caulerpeae.

Zopoa Walpers 1846. Repert. V. p. 843: sect. Pozoae.
Synon. Eupozoa Fenzl.

Zornia *) Gmel. 1791. Syst. p. 1096: nov. g. Diadelph. Decandr. (Walt. Fl. carol. p. 181.) — Par. Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 46. t. 41. — Pers. 1807. Ench. II. p. 318. n. 1739. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 110.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 238; 1813 in Desv. Journ. bot. III. p. 61: g. Leguminosar. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 124. — Spreng. 1825. Syst. III. p. 311. n. 2596; 1831. Gen. II. p. 549. n. 2934. — Poir. 1830. Dict. v. 60. p. 550.
St. Hil. 1812. Bull. soc. philom. p. 192. Char. emend.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 759: g. Coronillear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 134.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 513: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 131.
DC. 1825. Pr. II. p. 316: g. Euhedysarear. — Par. Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 582. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 279. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 217. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (64). — Endl. 1841. Gen. n. 6599. p. 1282;

*) ζώνη, cingulum.
**) ζῶον, animal.

*) Dicat. Joh. Zorn, pharmacopolae, Kemptensi.

Zornia Gmel. cont.
1841. Ench. p. 670. — Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 422. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 533.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 3990; 1841. Nom. p. 153. n. 5977: g. Onobrychear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.
Vogel 1838. Linnaea XII. p. 58: g. Hedysarear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 353. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 278.
Synon. Anonymos Walt. n. 279; Hedysari sp. Linn.

Zornia Mönch 1794. Meth. p. 410; 1802. Suppl. p. 139: nov. g. Petalostemonis. (Dracocephalus canescens L., etc.)
= Lallemantia Fisch. & Meyer.

Zosima *) Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 145: nov. g. Umbelliferar. (Heracleum absinthifolium Vent.) *Cf.* Leman 1830. Dict. v. 60. p. 555 (*Zozima*).
Smith .... in Rees Cyclop. v. 29.
Synon. Zosimia MB.; Zozimia DC.

Zosimia Marsch.-Bieb. 1819. Fl. taur. cauc. III. p. 229: g. Pentandr. Digyn.
Link 1821. Enum. I. p. 274: g. Umbelliferar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 88: g. Selinear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 355.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3683; 1837. Hdb. p. 220: g. Peucedanear. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 329.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 362: g. Tordyliacear.
= Zosima Hoffm.

Zostera **) Linn. 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 138: nov. g. plant.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Inundatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 161.
Linn. 1753. Sp. II. p. 968; 1759. Syst. ed. X. p. 1252. n. 919; 1763. Sp. ed. II. p. 1374; 1764. Gen. ed. VI. p. 472. n. 1032; 1767. Syst. ed. XII. p. 605: g. Gynandr. Polyandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 211. — Murr. 1774. Syst. p. 691; 1784. Syst. p. 829. — Reich. 1778. Gen. p. 467. n. 1123. — Pers. 1797. Syst. p. 874.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Piperitar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 123.
Gled. 1764. Syst. p. 128. n. 527: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 67: g. Spadicear.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 232: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 863.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 76. t. 19. f. 5 (maritima).
Juss. 1789. Gen. p. 24: g. Aroidear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 56. — DC. 1805. Franç. III. p. 154. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 6. 42. n. 33. — Orb. 1820.

Zostera Linn. cont.
Mém. Mus. VI. p. 188. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 574. — Lois. 1830. Dict. v. 60. p. 552.
Neck. 1790. El. III. p. 295. n. 1692: g. Emproophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 615. n. 1390: g. Monoec. Monandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 179. n. 1622. — Pers. 1807. Ench. II. p. 529. n. 2015. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 201.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 82: g. Fluvialium. — Par. Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365.
Cram. 1803. Disp. p. 3: g. Monandr. Monogyn. — Par. Vahl 1805. Enum. I. p. 14. n. 12. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 3. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 280.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 46: g. Potamophilar.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 338. Ed. Nees p. 194: g. Aroideis aff.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 116; 1825. Syst. I. p. 20. n. 38; 1830. Gen. I. p. 13. n. 48: g. Najadum. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 111.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 37: g. Fluviatilium.
Agdh. 1822. Aphor. p. 124: g. Najadear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 820. — Bartl. 1830. Ord. p. 72. — Koch 1837. Syn. p. 680. Ed. II. p. 783. — Endl. 1837. Gen. n. 1659. p. 230; 1841. Ench. p. 125. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 63. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 378. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 20. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 225.
Dumort. 1827. Belg. p. 163: g. Zosterear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 43. n. 754. — Kunth 1841. Enum. III. p. 115. — Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 478. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 14.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XX: g. Potamogear.
Link 1829. Hdb. I. p. 287: g. Hydrogetonum.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 6: g. Potamogetonear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: g. Zosteracear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 31. n. 1070. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 68. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 145. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 325.
Math. 1853. Belg. I. p. 511: g. Potamear.
Synon. Alga Tourn.; Ruppia Möhr.; Phucagrostis Cavol. pt.

Zostera Caulin. 1772. Zosterae oceanicae ανθησις. Neap. (*cf.* Konig Ann. of bot. II. p. 77 et Usteri n. Ann. III. p. 57): g. Hexandr. Monogyn. (Calamariar.)
= Posidonia König.

Zosteraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65. 66: fam. Araricar. Gen.: Zostera, Posidonia, Caulinia.
Rchb. 1841. Nom. p. 31: fam Limnobiar. Gen. ead. et Naias, Cymodocea, Thalassia, Phyllospadix, Halophila, Barkania.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 68: div. Potamogetonear. Gen.: Zostera.

*) Dicat. nomini fratrum Zosimadum, Anastasii, Nicolai et Zoae.
**) ζωστήρ, cingulum, balteus.

Zosteraceae Dumort. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 145: ordo Hydralium. Gen.: Cymodocea, Amphibolis, Thalassia, Zostera, Posidonia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: fam. Aperispermear.

Zostereae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 163: trib. Potamogetonear. Gen.: Zostera, Cavolinia.
Rchb. 1828. Consp. p. 43: div. Potamogetonear. Gen.: Zostera, Thalassia, Phucagrostis?, Posidonia, Halophila, Barkania.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Rchb. 1837. Hdb. p. 141: fam. Limnobiar. Gen.: Zostera, Thalassia, Phucagrostis?
Kunth 1841. Enum. p. 115: trib. Fluvialium. Gen.: Zostera, Cymodocea.
Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272): trib. Najadear. Gen.: Posidonia, Ruppia, Zostera, Phyllospadix, Thalassia. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 477. Gen.: Posidonia, Zostera. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 14. Gen. ut Kunth. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 565. Gen. ead.

Zosterites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 117; 1828. Prodr. p. 114 (1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 317): g. Nayadum foss. — Par. Unger 1842. Chlor. prot. p. 46. 63. t. 16 (1846. p. LXVIII); 1845. Syn. p. 175. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 135.
Synon. Amphibolis Agdh.; Potamophyllites Nilss.

Zosterospermum „Palis. mss." Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 20 et Schult. Mant. II. p. 4): nov. g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. 56. n. 1080.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 14: g. Cyperacear. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 536 (obscurum).
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 297: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Steud. 1855. Glum. II. p. 151.
Endl. 1837. Gen. n. 976 *a*. p. 114; 1841. Ench. p. 64: sect. Dichromenae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1458. 1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.
Synon. Echinoschoenus Nees?; Schoeni et Rhynchosporae sp. Auct.

Zosterostylis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 418: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1840. Orchid. p. 446; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1548/1. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 720.
Meisn. 1842. Gen. p. 384 (288): g. Cranichidear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181: g. Neottiear.

Zoydia Pers., Hedw. vid. *Zoysia Willd.*

Zoysia *) Willd. 1801. Neue Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 440: nov. g. Triandr. Digyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 73. n. 144 (*Zoydia*). — Hedw. 1806. Gen. p. 41. n. 193 (*Zoydia*). — Trin. 1820. Fund. p. 98.

*) Dicat. dom. de Zoys, Labacensi.

Zoysia Willd. cont.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 208. Ed. Nees p. 64: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 1. t. 4. f. 1. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 11. 265. n. 207. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 239. n. 245; 1830. Gen. I. p. 55. n. 265. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 312.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Hordeacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 176.
Link 1827. Hort. I. p. 8: g. Zoysinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 881: g. Paspalacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 30: g. Panicear.
Kunth 1830. Gram. p. 156: g. Andropoginear.
Kunth 1833. Agrost. p. 471: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 935. p. 106; 1841. Ench. p. 60. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 398. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1340. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Steud. 1854. Glum. I. p. 414.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 95: g. Andropogineor.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 478: g. Zoysiear.
Synon. Matrella Pers.; Osterdamia Neck.

Zoysieae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 365: cohors Saccharear. Gen.: Zoysia, Perotis, Didactylon, Asthenochloa.

Zoysinae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 8: fam. Graminear. Gen.: Zoysia.

Zozima Leman vid. *Zosima Hoffm.*

Zozimia DC. 1830. Prodr. IV. p. 195: g. Peucedanear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 344. — Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4478. p. 782; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 10. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 973. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5478. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
= Zosima Hoffm.

Zucca „Commers." Juss. 1789. Gen. p. 308. *Cf.* Juss. 1830. Dict. v. 60. p. 556 et Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 257.
Poir. 1817. Suppl. V. p. 526.
St. Hil. 1823. Mém. Mus. IX. p. 190: g. Cucurbitacear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 275.
Juss. 1825. Dict. v. 38. p. 50: g. Passiflorear.?
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Cucurbitaceis aff. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 319. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 43. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 21. 110.
Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2766; 1841. Nom. p. 101. n. 3969: g. Cucurbitear.? — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 188.
Endl. 1839. Gen. n. 5194. p. 940; 1841. Ench. p. 491: g. Sicyoidear. penitus dubium.

Zuccagnia *) Thunb. 1798. Nov. gen. IX. p. 27 (*Zuccangnia*); 1800. Prodr. fl. cap. II. p. 184; 1818. Fl. cap. II. p. 321: g. Hexandr. Monogyn. (Lachenalia viridis Thunb.) — Par. Willd. 1809. En. p. 378. n. 421.
Pers. 1805. Ench. I. p. 375 (*Zuccangnia*): sect. Hyacinthi.
Hedw. 1806. Gen. p. 238. n. 963 (*Zuccangnia*): g. Asphodelear.
Link 1821. En. I. p. 332: g. Liliacear.
= Uropetalum Ker.

Zuccagnia Cavan. 1799. Icon. V. p. 2. t. 403: nov. g. Decandr. Monogyn. (Z. punctata.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 461. n. 1021: g. Leguminosar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 306. n. 1211. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 328. n. 1603; 1830. Gen. I. p. 353. n. 1782. — Poir. 1830. Dict. v. 60. p. 556. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1426.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 486. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 435. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70).
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4139; 1841. Nom. p. 155. n. 6075: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6773. p. 1314; 1841. Ench. p. 674. — Vogel 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 38.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 72: g. Leptolobiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Zuccangnia Thunb., Pers., Hedw. vid. *Zuccagnia Thunb.*

Zuccarinia **) Märklin 1811. Ann. Wett. Ges. II. 2. p. 252: novum gen. Verbenae et Büchnerae aff. (Z. verbenacea.)

Zuccarinia ***) Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1006: nov. g. Rubiacear. — Par. Poir. 1830. Dict. v. 60. p. 557.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 262: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 368: g. Sarcocephalear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 487. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Endl. 1838. Gen. n. 3282. p. 558; 1841. Ench. p. 274. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2937.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372: g. Gardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 197: g. Randiear.

Zuccarinia Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 50; 1830. Gen. I. p. 169. n. 851: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Jackia ornata Wall.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 759.
= Jackia Wall.

Zucchellia Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 492: nov. g. Periplocear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.

Zuckertia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 495: nov. g. Dysopsidear. (Z. cordata.)

Zuelania A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. I. p. 88. t. 12: nov. g. Flacurtianear. (Z. laetioides.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 108. n. $5072/_2$: g. Prockiear. (An satis a Thiodia Benn. diversum?) — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 204.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Prockear.
Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 241: g. Laetiear.

Zulatia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 117. n. 791: nov. g. Plyrontophytor., e speciebus Melastomatis Aubl. formatum.

Zurloa „Tenore in Duchartre Rev. bot. II. p. 127" Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 135: nov. g. Meliacear. (Afzelia splendens H. Cels.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 75. n. $5545/_1$ (dubium). — Tenore 1854. Ind. sem. h. Neap. (Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 377.) — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 390.

Zuxine Wight vid. *Zeuxine Lindl.*

Zuzygium „P. Browne" Auct. in synon. Calyptranthis: vid. *Suzygium P. Browne.*

Zwaardekronia Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. IV. p. 252: nov. g. Rubiacear. (Psychotria lurida Blume.) *Cf.* Flora 1851. p. 538.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 747: g. Coffeear.

Zwackhia *) Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 285: nov. g. Opegraphear. (Opegrapha siderella Ach.)

Zwingera **) Hofer .... Act. Helvet. V. p. 267. t. 1.
Neck. 1790. El. III. p. 385. n. 1827: g. Arcythophytor.
= Nolana Linn.

Zwingera Schreb. 1791. Gen. II. p. 802. n. 1752: g. Decandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 569. n. 850.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 812; 1825. Syst. II. p. 319. n. 1579: g. Ochnear.
= Simaba Aubl.

Zycas Ritgen vid. *Cycas.*

Zygadenus Endl. 1837. Gen. n. 1068. p. 135; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 404 (309). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 194. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 247. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1700: g. Melanthear.
= Zigadenus Rich.

Zygantihereae Rchb. 1841. Nomencl. p. 101: sect. Cucurbitear. genuinar. Subsect.: Cyclanthereae, Bryonieae, Embothrieae.

Zygia ***) P. Browne 1756. Jamaic. p. 279. t. 22. f. 3: nov. g. Monadelph. sect. 4.

*) Dicat. A. Zuccagni, horti Florentini directori.
**) Dicat. prof. Zuccarini, horti Heidelb. directori.
***) Dicat. J. G. Zuccarini, prof. Monac.

*) Dicat. equiti de Zwackh, Heidelberg.
**) Dicat. Theod. Zwinger, prof. Basil.
***) ζυγός, jugum.

Zygia P. Browne cont.
Juss. 1789. Gen. p. 366: g. Leguminosis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 246.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
Juss. & Poir. 1830. Dict. v. 60. p. 624: g. Leguminosar. dubium.
E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 164: g. Acaciear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6836. p. 1326; 1841. Ench. p. 683. — Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6133. — Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 92. — Walp. 1846. Rep. V. p. 598. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68): g. Mimosear.

Zygis *) Pers. 1807. Ench. II. p. 131: sect. Thymi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2819 *a*.
Desv. 1825 in Hamilt. Ind. occ. p. 46: g. Didynam. Gymnosperm. (Z. aromatica.)
= Piperella Presl.

Zygnema Agardh 1817. Syn. Alg. p. XXXII. 98; 1821. Aphor. p. 98: nov. g. Confervoidear. *Cf.* Leman 1830. Dict. v. 60. p. 624. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 910.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 170: g. Siphonigonator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 296: g. Conjugatidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: g. Conjugatear.
Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 521: g. Hydronematear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 360. n. 3422; 1831. Gen. II. p. 753. n. 3824: g. Confervinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 466; 1841. Nom. p. 19. n. 664: g. Zygnemear. Sect. (1828): Globulina, Spirogyra, Conjugata.
Rudolphi 1829. Flora I. p. 367: g. Conjugatar.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 47: g. Gryphonematum.
Endl. 1836. Gen. n. 54. p. 5; 1841. Ench. p. 4: g. Confervear. Sect.: Serpentinaria, Stellulina, Spirogyra.
Synon. Conjugata Vauch.

Zygnema Bory 1822. Dict. class. I. p. 595: g. Conjugatar.
= Mougeotia Agdh.

Zygnema Agardh 1824. Syn. Alg. p. XXVI. 77: g. emendat. Confervear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 405; 1841. Brit. Alg. p. 142. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 187.
Fries 1825. Pl. homon. p. 339: g. Ulvacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: g. Conjugatar. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78.
Menegh. 1838. Cenni p. 33: g. Zygnemear. — Par. Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466). — Endl. 1843. Spl. III. p. 14. n. 31. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 133. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. — Math. 1853. Belg. II. p. 505. Sect.: Salmacis, Tentaridea, Mougeautia.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328 (Flora 1843. p. 93): g. Synsporear.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p.... (Bot. Zeit. 1847. p. 112): g. Conjugatear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Zygnemidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p...: g. Zygnemacear.
Synon. Globulina et Stellulina Link; Lucernaria Rouss.; Tendaridea et Ledae sp. Bory; Conjugatae sect. II. Vauch. *Cf. Zeugnema Link.*

Zygnema Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 280: g. restrict. Zygnemear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 13. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 121. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 381.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 224; 1849. Sp. Alg. p. 444. n. 277: g. Zygnemacear.
Synon. Tendaridea Bory pt.

Zygnemaceae Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 221; 1849. Sp. Alg. p. 433: fam. Confervinar. Gen.: Mougeotia, Sirogonium, Mesocarpus, Staurospermum, Spirogyra, Rhynchonema, Zygnema, Zygogonium, Thwaitesia.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ...: ordo 5 Algar. Gen.: *Zygnemeae Auct.*, Oedogonium, Bulbochaete et Rhizoclonium.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 92: ordo Chlorospermear.

Zygnemateae Rudolphi 1829. Flora I. p. 366: vid. *Conjugatae Rud.*

Zygnemeae Fries 1825. Pl. homon. p. 340: trib. Ulvacear. Gen.: Zygnema, Leda, Hydrodictyon, Tiresias. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 27. Gen. ead. et Mougeotia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 135: 1841. Nom. p. 19: div. Confervacear. Gen.: Spirogyra, Zygnema, Tyndaridea, Mougeotia.
Menegh. 1838. Cenni p. 33: fam. Algar. Gen.: Spirogyra, Zygnema, Mougeotia.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466): subtrib. Confervear. Gen.: Mougeotia, Spirogyra, Zygnema.
Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 14: trib. Confervoidear. Gen. ut Trevis.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gener. p. 274: fam. Dermatosiphear. Gen.: Mougeotia, Sirogonium, Staurospermum, Spirogyra, Zygnema, Zygogonium. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 13 (entospermear.). Gen. ead.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 132: div. Ulvacear. Seirogonimicar. Gen.: Hydrodictyon, Mougeotia, Tyndaridea, Zygnema.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 119: sect. Confervacear. Gen. ut Trevis. et Staurospermum, Zygogonium.

*) Nomen ex Apulejo et Dioscoride.

Zygnemeae Fries cont.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: trib. Confervinar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: trib. Zoospermear. Gen.: Mougeotia, Sirogonium, Staurospermum, Mesocarpus, Tyndaridea, Thwaitesia, Zygnema.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 382: fam. Phycear. Gen. ut Kütz. et Hydrodictyon.
Math. 1853. Belg. II. p. 505: trib. 17 Algar. Gen.: Zygnema, Rhynchonema, Mesocarpus.

Zygnemidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 18: trib. Confervear. Gen.: Mougeotia, Zygnema, Spirogyra.

Zygocapnos Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 184. n. 7057. 3: sect. Corydalidis.
= Leonticoides DC.

Zygoceros Ehrenb. 1840. Kreideth.; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 218: g. Bacillarior.
Kütz. 1844. Bacill. p. 138; 1845. Phyc. germ. p. 117; 1849. Sp. Alg. p. 139. n. 96: g. Biddulphiear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 50: g. Schizophycear.?
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eubiddulphiear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 383: g. Diatomear.

Zygodesmus Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 11. t. 2. f. 164. 165; 1840. IV. p. 26: nov. g. Sporotrichacear. (Z. hypochnoides et ochraceus.)
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 129: g. Sporotricheor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 84.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 8; 1842. Mycol. p. 30: g. Cephalocladior. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 109.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Sepedonieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494: g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Botrytideor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 93: g. Pleurosporiaceor.

Zygodon Hook. & Tayl. 1818. Musc. brit. p. 70: nov. g. Muscor. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 744. — Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 138. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 226. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 184. n. 3325; 1831. Gen. II. p. 733. n. 3719. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 205. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 45.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 590: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Orthotrichoideis aff.)
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 233: g. Orthotrichoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 626: g. Orthotrichcor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Orthotrichear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 80.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Zygodontoidear.

Zygodon Hook. cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 385: g. Diploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 514. p. 50; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Genth 1836. Nass. I. p. 229: g. Bryoideor.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 892: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 670: sect. Zygodontis.
Bruch, Schimp. & Gümb. . . . . Bryol. eur. Fasc. IV: g. Zygodontear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 91. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401; 1849. ibid. XIII. p. 382. — Bayrh. 1849. Taun. p. 46.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 174: g. Orthotrichacear.
Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. III. p. III: g. Zygodontacear.
Synon. Amphidium Nees; Gagea Raddi; Euzygodon C. Müll.

Zygodon C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 668; 1849. Syn. Musc. I. p. 666: g. emend. Orthotrichear. Sect. 1844: Ulozygodon, Amphidium, Codonoblepharon, Zygodon. Sect. 1849: Amphidium, Codonoblepharon, Euzygodon, Ulozygodon, Anoectangium.

Zygodontaceae Bruch & Schimp. . . . Bryol. eur. III. p. III: fam. Muscor. Gen.: Amphidium, Zygodon.

Zygodonteae Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. Fasc. IV: fam. Muscor. Gen.: Zygodon.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 91: div. Bryacear. Gen. id.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen. id. et Codonoblepharum.
Bayrh. 1849. Taun. p. 16: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Zygodon.

Zygodontoideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 8 Muscor. Gen.: Hymenostylium, Zygodon, Codonoblepharum.

Zygoglossum Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 102: nov. g. Gynandr.
Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 4: g. Orchidear. (descript.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1574.
= Cirrhopetalum Lindl.

Zygogonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 280: nov. g. Zygnemear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 13. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 122. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 383.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. (Bot. Zeit. 1847. p. 112): g. Conjugatear.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 224; 1849. Sp. Alg. p. 445. n. 278: g. Zygnemacear.
Synon. Leda Bory; Tendaridea Bory pt.

Zygolepis Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. I. p. 573: nov. g. Aphaniae et Ma-

Zygolepis Turczan. cont.
taybae aff. (Z. rufescens.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 708.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 211: g. Sapindear.

Zygomenes Salisb. 1812. Trans. hortic. soc. I. p. 271: nov. g. Commelinear. (Tradescantia axillaris L.)
= Cyanotis Don.

Zygomeris Fl. mexic.
= Amicia Kunth.

Zygopeltis „Fenzl mss." Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 107. n. 4888/1: nov. g. Thlaspidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 340.
= Heldreichia Boiss.

Zygopetalon Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1505: g. Vandear.
Bartl. 1830. Ord. p. 57: g. Epidendrear.
Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 668. Char. emend. Sect.: Euzygopetalon, Zygosepalon.
= Zygopetalum Hook.

Zygopetalum Hook. .... Bot. Mag. t. 2748; 1838. ibid. n. 3674: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 187; 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1857: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1443. p. 201; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2048. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.
Conf. Zygopetalon Rchb.

Zygophyllaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 133; 1847. Veg. kingd. p. 478: ordo Rutalium. Trib.: Tribuleae, Zygophylleae.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 212: ordo Dicotyledonum. (Trib.: Tribuleae.)
„Fisch." Ledeb. 1842. Ross. I. p. 483: ordo 30 Thalamiflorar. Trib.: Zygophylleae, Tribuleae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 274. Trib. eaed.
Conf. Zygophylleae R. Brown.

Zygophylleae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 34): novus ordo plantar., primam sectionem Rutacear. Juss. amplectens. *Cf.* Juss. 1830. Dict. v. 60. p. 629.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 139; 1824. Pr. I. p. 703: ordo (50) Thalamiflorar. Divis.: *verae* (gen.: Tribulus, Fagonia, Larrea, Zygophyllum, Guajacum, Porlieria), *spuriae* (gen.: Chitonia, Biebersteinia?, Melianthus, Balanites?). — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 768. Divis. ut DC. (Accedunt ad div. 1: Ehrenbergia, Röpera, ad div. 2: Trichanthera, Anatropa.)
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 394. 450: trib. Rutacear. Gen.: Tribulus, Fagonia, Röpera, Zygophyllum, Larrea, Porlieria, Guajacum. *Affinia*: Biebersteinia, Melianthus.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 589: ordo Gynobasear.

Zygophylleae R. Brown cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI: div. Rutacear. Gen. ut Juss. excepto Melianthο.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. 45: fam. Geranariear. Trib.: Melianthcae, Fagonieae, Balaniteae, Tribuleae.
Bartl. 1830. Ord. p. 390: ordo (231) Terebinthinar. Divis.: Tribuleae, *genuinae* (gen.: Fagonia, Seezenia, Röpera, Zygophyllum, Larrea, Porlieria, Guajacum). *Affinia*: Chitonia, Melianthus.
Link 1831. Hdb. II. p. 228: ordo 6 Anastemonum. Gen.: Tribulus, Fagonia, Zygophyllum, Guajacum.
Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo Rutalium.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 304: fam. (16) Terebinthinear. Trib. ut Bartl.
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (43): ordo Rutacear. Gen. ut A. Juss. et Kallströmia, Ehrenbergia, Seezenia, Plectrocarpa, Anatropa, Trichanthera, Chitonia?, Balanites?
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 46. Trib.: Euzygophylleae, Aitonieae, Meliantheae.
Endl. 1840. Gen. p. 1161; 1841. Ench. p. 615: ordo (253) Terebinthinear. Trib.: Tribuleae, *verae* (gen.: Chitonia, Juliana, Fagonia, Röpera, Zygophyllum, Trichanthera, Larrea, Porlieria, Plectrocarpa, Guajacum. Accedunt 1843 [Suppl. III. p. 100] Sarcozygium et 1850 [Spl. V. p. 104] Miltianthus, Bulnesia, Pintoa, Jürgensenia?)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 82: fam. Geranioidear. Gen. ex Endl.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 47. Gen. foss.: Lillia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479: trib. Zygophyllacear. Gen. Zygophyllear. verar. Endl. et Peganum, Malacocarpus, Eurynema, Seetzenia, Melianthus. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 275. Gen. fere ut Endl.

Zygophylleae Rchb. 1828. Consp. p. 199; 1832. Fl. exc. p. 768: div. Sapindacear. Subdivis.: Tribuleae, Guajaceae, Hippocastaneae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. Subdivis.: Tribuleae, Guajaceae, Staphylaeeae.

Zygophyllum *) Linn. 1737. Gen. p. 126. n. 352; 1737. Cliff. p. 160; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 103; 1753. Sp. I. p. 385; 1759. Syst. ed. X. p. 1020. n. 474; 1762. Sp. ed. II. p. 551; 1764. Gen. ed. VI. p. 212. n. 530; 1767. Syst. ed. XII. p. 295. n. 624: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 333; 1784. Syst. p. 400. — Reich. 1778. Gen. p. 218. n. 577. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 288. n. 730. — Gmel. 1791. Syst. p. 681. — Pers. 1797. Syst. p. 427. — Willd. 1799. Sp. II. p. 560. n. 846; 1809. En. p. 448. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 100 (Ed. Schrank 1819. p. 109); 1821. Revis. p. 59.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 97. n. 400: g. Thalamostemonum.

*) „Nomen Fabaginis permuto cum Zygophyllo, cum folia conjugata sint, ut boves sub jugo." (Ht. Cliff.)

Zygophyllum Linn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Succulentar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 176: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 200: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 277: g. Icosandrar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 316. *Cf. Fabago Medic.*
Juss. 1789. Gen. p. 296: g. Rutacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 226. — Batsch 1802. Tab. p. 155. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 103. — Pers. 1805. Ench. I. p. 463. n. 1036. — Hedw. 1806. Gen. p. 308. n. 1219. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 675; 1825. Syst. II. p. 322. n. 1586; 1830. Gen. I. p. 349. n. 1763. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 95 (*Fabagelle*). — Link 1821. En. I. p. 399. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1419.
Neck. 1790. El. II. p. 227. n. 966: g. Eredophytor. Sejungitur Agophyllum.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 144.
Cram. 1803. Disp. p. 92: in Octandr. Monogyn.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 10: g. Zygophyllear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 331. — DC. 1824. Pr. I. p. 705. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 455. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI. — Cham. 1830. Linnaea V. p. 44. — Bartl. 1830. Ord. p. 392. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 101; 1842. Ross. I. p. 484. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 771. — Link 1831. Hdb. II. p. 228. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 306. (verar.) — Webb 1836. Canar. I. p. 16. — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — Endl. 1840. Gen. n. 6036. p. 1163; 1841. Ench. p. 616. Sect.: Fabago, Agrophyllum. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 82. — Miq. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 164. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 405.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5197; 1841. Nom. p. 198. n. 7551: g. Guajacear. Sect. (1841): Zygophyllum, Agrophyllum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Fagoniear.
Leman 1849 in Orb. Dict. V. p. 548 (*Fabagelle*): g. Zygophyllacear. — Par. Bunge 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 235.
Synon. Fabago Tourn.; Agophyllum Neck.

Zygopteris Corda 1845. Beitr. Fl. Vorw. p. 81: g. Phthoropteridum. (Tubicaulis primarius Cotta.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 85: g. Rachiopteridear.

Zygosephalon Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 668: sect. Zygopetali. An genus?
= seq.

Zygosepalum Rchb. f. 1857 in Vriese Kruidk. Arch. (Müll. Ann. bot. VI. p. 665): g. Vandear.
Conf. praeced.

Zygospermum „Thwait. mss.“ Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 620: nov. g. Phyllanthidear. (Z. zeylanicum.)

Zygosporium Montagne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 120 (Pl. cell. Cub. p. 303): nov. g. Hyphomycetum.
Corda 1842. Mycol. p. 189: g. Psiloniacear. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 9.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 501: g. Dematiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 393: g. Crateromyceor.?
Bonord. 1851. Hdb. p. 114: g. Basidiophoror.

Zygostates Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1927 (1852. Fol. Orchid. 14 Oct.): nov. g. Vandear. (Z. cornuta et lunata.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1419. p. 198; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2024. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.
Synon. Dactylostylis Scheidw.

Zygostigma Griseb. 1839. Gen. et spec. Gentian. p. 150: nov. g. Erythraeacear. (Sabbatia australis Cham.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3543/1. p. 1399; 1841. Ench. p. 302: g. Chironiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5091: g. Erythraeariar.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 51: g. Sabbatiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.
Synon. Erythraeae sp. Hook.

Zygotrichia Brid. 1826. Bryol. un. I. p. 520: nov. g. Acrocarpor peristomor. (Barbula leucostoma R. Br.) *Cf.* Leman 1830. Dict. v. 60. p. 630. (*Conf. Leucoloma Brid.*)
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: g. Trichostomoideis aff.
Brid. 1827. Bryol. univ. II. p. 271: sect. Climacii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 557 *a*; 1841. Nom. p. 26. n. 963. 2. — Endl. 1836. Gen. n. 585 *b*. p. 56; 1841. Ench. p. 32.
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 634: g. Trichostomor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Desmatodontoidear.?
= Barbulae sp. (Müll.)

Zygoxanthium Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 218: nov. g. Bacillarior. (Xanthidium Echinus Ehrenb.)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 178. n. 131: g. Desmidiear.

Zymum *) „Noronh. mss.“ Petit-Thouars 1807. Vég. Il. Afr. Livr. IV. p. 69: nov. g. Malpighiar.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 482; 1823. Dict. v. 28. p. 456: g. Malpighiacear.

*) ζύμη, fermentum. (?)

Zymum Noronh. cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 692; 1825. Syst. II. p. 329. n. 1607; 1830. Gen. I. p. 354. n. 1790: g. Malpighiear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1429.
= Tristellateia Petit-Thouars.

Zyrphelis Cassini 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 420; 1830. v. 60. p. 582. 597: nov. g. Asterear. (Archetypar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)
Less. 1832. Syn. p. 183: subg. Elphegeae.
Nees 1833. Aster. p. 250: g. Asterum plumigeror.
DC. 1836. Pr. V. p. 217: sect. Mairiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2296 *b*. p. 372; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3289. 2.

Zythia *) Fries 1825. Pl. homon. p. 118: nov. g. Cytisporeor. (Sphaeronematis sp. Fr.)

*) ζύθος, cerevisia. (?)

Zythia Fries cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 249: g. Phomaceor.
Leman 1830. Dict. v. 60. p. 630: g. Pyrenomycetum.
Fries 1835. Fl. Scan.; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 407: g. Myxothecieor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 31; 1842. Mycol. p. 127: g. Sphaeronemear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Sphaeronaemeor.

Zythinia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 400: sect. Sphaeronematis. (S. subulatum, rufum, aciculare.)

Zyzygites Agardh 1821. Aphor. p. 80: g. Mucedinum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 533: g. Mucorear.
= Syzygites Ehrenb.

Zyzygium Brongn. vid. *Syzygium Gärtn.*

Addenda.

Labiarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: ordo Torocoronar. Fam.: Labiatae; Verbenaceae, Myoporineae, Selagineae, Pedalineae.

Labiatae B. Juss. 1759.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15: ordo Tetraspermar.
Dum. 1829. An. p. 19. 22: fam. Labiariear. Trib.: Teucrieae, Salvieae, Melittideae, Stachydeae, Leonureae, Nepeteae, Ocymeae, Mentheae.

Lablab Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.

Lachenalia Jacq. 1782.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear. — Par. Endl. 1837 . . .

Lachnaea Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 18: Thymelinear.

Lachnagrostis Trin. 1820.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 677): Calamagrostideor.

Lachnanthes Ell. 1817.
Synon. (add.) Heriteria Dumort.?; Camderia Ej.?

Lachryma Jobi Burm. vid. *Lacryma Job Tourn.*

Lacryma Job Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 137 *(Lachryma Jobi).*

Lactuca Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 30: Lactucear.

Lactuceae Cass. 1816.
Dum. 1829. An. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen.: Prenanthes, Chondrilla, Lactuca, Sonchus, Picridium, Urospermum.

Laetia Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 50: Bixacear. — Par. Juss. 1842. . . .

Lagerströmia Willd. 1799.
Dum. 1829. An. p. 39: Lagerströmiear.

Lagerströmieae DC. 1826.
Dum. 1829. An. p. 39: trib. Lythrariacear. Gen.: Lagerströmia.

Lagoecia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Lagoeciear.

Lagoecieae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 34: trib. Monospermar. Gen. id.

Lagunea Pers. 1807.
Dum. 1829. An. p. 46: Sidacear.

Lagurus Linn. 1737.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 677): Calamagrostideor.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear.

Lambertia Smith 1789.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.

Laminaria Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 77: Laminariacear.

Laminariaceae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 77: fam. Ulvariear. Gen.: Laminaria, Desmaretia, Agarum.

Laminarieae Bory 1822.
Agdh. (1824. Syst.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: div. . . .

Lamium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 22: Galeopsidear.

Lamourouxia HBK. 1817.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.

Lanaria Ait. 1789.
Dum. 1829. An. p. 58: Haemodoracear. — Par. Bartl. 1830 . . .

Langsdorfia Agdh. 1825.
Dum. 1829. An. p. 69: Balanophorear. — Par. Spreng. 1831 . .

Lantana Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear.

Lapeyrousia Pourr. 1788.
Dum. 1829. An. p. 58: Gladiolear.

Lappa Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 32: Carduinear.

Lappago Schreb. 1789.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 671): Vilfaceor.

Lappula Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 24: Cynoglossear.

Lapsana Scop. 1777.
Dum. 1829. An. p. 30: Lapsanear.

Lapsaneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen: Rhagadiolus, Kölpinia, Lapsana.

Larbraea Dumort. vid. *Larbrea Ser.*

Larbrea Seringe 1824.
Dum. 1829. An. p. 49 (*Larbraea*): Alsinear.

Lardizabala Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 50: Lardizabalear.

Lardizabaleae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Menispermidear. Gen.: Lardizabala.

Larix Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 11: Abietinear. — Par. Link . . .

Laserpitium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 35: Thapsiear.

Lasiandra DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.

Lasianthera Palis. 1805.
Dum. 1829. An. p. 27: Leeacear.
Lasiobotrys Kunze 1823.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Lasiopetalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Hermanniacear. Gen.: Seringia, Lasiopetalum, Thomasia.
Lasiopetaleae Gay 1821.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: div. Büttneriacear.
Lasiopetalum Smith 1798.
Dum. 1829. An. p. 46: Lasiopetalar.
Lasiorrhiza Lagasca 1811.
Dum. 1829. An. p. 31 (*Lasiorhiza*): Nassauviear.
Lasiospora Cass. 1822.
Dum. 1829. An. p. 30: Scorzonerear.
Latania Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 55: Borassear.
Lathraea Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 23: Orobanchear.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: Lathraeear.
Lathraeeae Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: subtrib. Orobanchacear. Gen.: Lathraea, Phillipaea, Epiphegus.
Lathyrus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Viciear.
Laugeria Linn. 1764.
Dum. 1829. An. p. 32: Psathurear.
Lauraceae Lindl. 1847.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 10. Trib. Laurinar. Nees.
Laurelia Juss. 1809.
Dum. 1829. An. p. 16: Atherospermear.
Laurinae Vent. 1799.
Agdh. (1825. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo . . .
Laurineae Juss. 1805.
Dum. 1829. An. p. 14. 16: fam. Laurrainiear. Trib.: *genuinae* (gen.: Laurus, Cinnamomum, Persea, Eudiandra, Litsea, Ocotea), Cassythaceae.
Laurrainieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: ordo Torosepalar. Fam.: Laurineae, Hernandiaceae, Myristiceae.
Laurus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 16: Laurinear. genuinar.
Lavandula Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 79: Sideritidear.
Lavatera Tourn. 1706.
Dum. 1829. An. p. 46: Malvear. — Par. Bartl. . . .
Lavoisiera DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: Lavoisierear.
Lavoisiereae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: trib. Melastomacear. Gen.: Meriania, Lavoisiera.
Lawia *) Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 5. t. 1070: nov. g. Hameliear. — Par. Walp. . . .
Lawsonia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Lythrear.
Laxmannia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 61: Alliacear.
Leandra Raddi 1820.
Dum. 1829. An. p. 39: Miconiear.

*) Dicat. J. S. Law, Bombay.

Leangium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Lebeckia Thunb. 1800.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Lebretonia Schrank 1819.
Dum. 1826. An. p. 46: Malvear. — Par. Bartl. 1830. . .
Lecanora Achar. 1810.
Dum. 1829. An. p. 71: Lecanorear. — Par. Körb. 1846 . . .
Lecanoreae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Urceolaria, Lecidea, Lecanora.
Lechea Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 50: Cistinear.
Lechenaultia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 30: Goodeniear. — Par. Spreng. 1830 . . .
Lecidea Achar. 1803.
Dum. 1829. An. p. 71: Lecanorear.
Lecythideae Rich., Kunth 1824.
Dum. 1829. An. p. 38: trib. Myrtinear. Gen.: Lecythis, Eschweilera, Couroupita.
Lecythis Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 38: Lecythidear.
Ledum Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 27: Rhodoracear.
Leea Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 27: Leeacear.
Leeaceae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 27: fam. Jasminariear. Gen. ead.
Leersia Soland., Swartz 1788.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 72): Vilfaceor.
Dum. 1829. An. p. 64: Oryzacear.
Leguminosae Hall. 1742.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ordines: Papilionaceae, Cassieae, Mimoseae.
Dum. 1829. An. p. 36. 40: fam. Rosariear. Trib.: Detarieae, Cassieae, Geoffreae, Acacieae, Swartzieae, Dalbergieae, Phaseoleae, Vicieae, Hedysareae, Loteae, Sophoreae.
Leimanthium Willd. 1808.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Leiorreuma Eschw. *Cf.* Isis 1825. p. 553.
Lejeunia Libert 1820.
Dum. 1829. An. p. 69; 1835. Obs. Jung. p. 11: Lejeuniacear.
Lejeuniaceae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69: trib. Jungermanniacear. Gen.: Codonia, Madotheca, Lejeunia.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 11: trib. Jungermanniotypar. Gen.: Fossombronia, Madotheca, Lejeunia, Colura.
Lemanea Bory 1808.
Dum. 1829. An. p. 78: Confervacear.
Lemna Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 61: Lemnacear.
Lemnaceae Dumort. 1827.
Dum. 1829. An. p. 59. 61: fam. Nayariear. Gen.: Lemna.
Lentago Rafin. 1820.
Dum. 1829. An. p. 33: Viburnidear.
Lentibulariae R. Brown 1810.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1825. Isis p. 587: ordo Tubiflorar.

Liabeae Cass. 1828.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Liabum, Cacosmia. — Par. Less. . . .
Liabum Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 31: Liabear.
Liatrideae Rich. 1801.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Eupatorinear. Gen.: Liatris, Suprago, Kuhnia.
Liatris Cass. 1823.
Dum. 1829. An. p. 31: Liatridear.
Libanotis Riv., Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear.
Libertia Dumort. (1822. Comm.) 1829. An. p. 60: Hemerocallidear.
Licea Schrad. 1797.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Lichenarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: ordo Peltosporar. Fam.: Endocarpeae, Lichenes, Graphideae, Baeomyceae.
Lichenes Hoffm. 1795.
Agdh. (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: class. II. Acotyledonear. Ordines: Crustaceae, . . .
Dum. 1829. An. p. 71: fam. Lichenariear. (restricta). Trib.: Cenomyceae, Sphaerophoreae, Usneaceae, Cornicularieae, Ramalineae, Peltigereae, Umbilicarieae, Collemateae, Parmeliaceae, Squamarieae, Lecanoreae, Variolarieae, Coniocarpeae.
Lichinora Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 18. t. 1738: nov. g. Malaxidear. (L. Jerdoniana.)
Licuala Rumph. 1741.
Dum. 1829. An. p. 55: Sabalinear. — Par. Duch. 1849 . . .
Lidmodorum Dumort. vid. *Limodorum Tourn.*
Ligfootia Dumort. vid. *Lightfootia L'Her.*
Lightfootia L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 30 (*Ligfootia*): Campanulear.
Ligularia Cass. 1816.
Dum. 1829. An. p. 31: Adenostylear.
Ligusticum Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear.
Ligustrum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 26: Oleinar.
Ligustrum Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 141. t. 64.
? = Ophioxylon Linn.
Lilac Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 26: Lilacinear.
Lilacineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Jasminidear. Gen.: Lilac, Chionanthus, Ornus, Fraxinus, Fontanesia.
Spach 1839 . . .
Lilaea Humb. & Bonpl. 1808.
Dum. 1829. An. p. 65: Lilaeariear.
Lilaearieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. 65: fam. Graminariear. Gen.: Lilaea.
Liliaceae Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 59. 60: fam. Liliariear. Trib.: Tulipaceae, Lilieae, Asphodeleae, Hemerocallideae, Hyacintheae; Agapantheae, Alliaceae.
Liliarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Torochlamydar. Fam: Asparagineae, Flagellariaceae, Liliaceae, Xiphidieae, Pontederiaceae.
Lilieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Liliacear. Gen.: Lilium, Fritillaria, Erythronium.
Ritg. 1831 . . .
Liliiflorae Agardh (1823. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: class. Cryptocotyledonear. Ordines: . . . .
Lilio-Narcissus Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 142.
Lilium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 60: Liliear. — Par. Ritg. 1831 . . .
Limbarda Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 31: Inulear.
Limnanthes Stokes, Gray 1821.
Dum. 1829. An. p. 25: Menyanthidear.
Limnas Trin. 1820.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 673): Vilfaceor.
Limnia Linn. 1746.
Dum. 1829. An. p. 23: Montiacear.
Limnobieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: trib. Hydrocharidear. Gen.: Hydrocharis, Limnobium, Ottelia.
Limnobium Rich. 1811.
Dum. 1829. An. p. 54: Limnobiear.
Limnocharis Humb. & Bonpl. 1808.
Dum. 1829. An. p. 55: Butomear.
Limodoreae Dumort. 1835. Nouv. Mém. Brux. IX. p. 6: trib. Chondrorchidear. Subtrib.: Neottieae, Arethuseae.
Limodorum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 56 (*Lidmodorum*): Arethusear.
Limonia Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 48: Aurantiacear.
Limosella Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 32; 1829. An. p. 23: Limosellear. — Par. Rchb. 1831 . . .
Limoselleae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 32; 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Rhinanthidear. Gen.: Limosella, Lindernia.
Rchb. 1831 . . .
Linanthe Dumort. vid. *Lissanthe R. Brown.*
Linaria Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Lindernia Allion. 1755.
Dum. 1829. An. p. 23: Limosellear.
Lindsaea Smith 1791.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Lindsaya Kaulf. 1824.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 59: Polypodiacear.
Lineae DC. 1813.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: ordo Centrisporar.
Linideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 46: fam. Geranariear. Gen.: Linum, Reinwardtia, Radiola.
Linnaea Gron., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33 (*Linnea*): Linnaeacear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Linnaeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: trib. Caprifoliacear. Gen.: Linnea, Abelia.
Rchb. 1841 . . .
Linociera Swartz 1791.
Dum. 1829. An. p. 26: Oleinear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Linum Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 46: Linidear.

Liparia Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Liparis Rich. 1818.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Liperanthus Dumort. vid. *Lyperanthus R. Br.*
Lippia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear.
Liquidambar Bauh., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 12: Liquidambrear.
Liriodendron Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 50: Magnoliear.
Lissanthe R. Brown.
Dum. 1829. An. p. 28 (*Linanthe*): Stenantherear.
Lissochilus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Listera R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Lithospermeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Boraginear. Subtrib.: Cynoglosseae, Anchuseae, Pulmonariae.
Don 1832 . . .
Lithospermum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 24: Pulmonariar.
Litsea Lam. 1789.
Dum. 1829. An. p. 16: Laurinear. genuinar.
Littaea Tagl.
Dum. 1829. An. p. 58 (*Littlea*): Agaveacear.
Littlea Dumort. vid. *Littaea Tagl.*
Littorella Berg., Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 25: Littorellear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Littorelleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Plantaginear. Gen.: Littorella.
Rchb. 1837 . . .
Livistona R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 55: Coryphinear. — Par. Spach 1846 . . .
Loasa Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 42: Loasacear.
Loasaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 42: fam. Cactariear. Gen.: Bartonia, Loasa, Blumenbachia.
= Loaseae Juss.
Loaseae Juss. 1804.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Peponiferar. — Par. . . .
Lobelia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 30: Lobeliacear.
Lobeliaceae Juss. 1811.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: div. Campanulacear.
Dum. 1829. An. p. 28. 30: fam. Campanariear. Gen.: Lobelia, Monopsis, Isotoma, Cyphia.
Lobiolatae Agardh (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 4; 1826. Isis p. 583: ordo Lichenum.
Loddigesia Sims 1808.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Lodoicea Comm., St. Hil. 1805.
Dum. 1829. An. p. 55: Borassear.
Löflingia Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 80: Spergulear.
Logania R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 26: Loganiacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Loganiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 26: fam. Asclepiariear. Gen.: Logania, Usteria, Gärtnera, Pegamaea, Geniostoma, Anaster.
Lindl. 1830 . . .
Loiseleuria Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 27: Rhodoracear.
Loliaceae Link 1827.
Dum. 1829. An. p. 65: subtrib. Triticear. Gen.: Agropyron, Brachypodium, Lolium, Desmazeria.
Lolium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 65: Loliacear.
Lomaria Willd. 1809.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 51: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67 (*Lomoria*): Aspleniear. — Par. Brongn. 1849 . . .
Lomathophyllum Dumort. vid. *Lomatophyllum W.*
Lomatia R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.
Lomatophyllum Willd. 1811.
Dum. 1829. An. p. 60 (*Lomathophyllum*): Asparagear.
Lomentaria Lyngb. 1819.
Dum. 1829. An. p. 76: Sphaerococcear.
Lomoria Dumort. vid. *Lomaria* Willd.
Lonas Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Lonchitis Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Lonchocarpus HBK. 1823.
Dum. 1829. An. p. 40: Galegear.
Lonicera Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 33: Caprifoliar.
Lopezia Cavan. 1791.
Dum. 1829. An. p. 39: Circaear.
Lophocolea Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 17: Aploziear.
Lophopetalum Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 9. t. 162: g. Celastrinear. (L. Wightianum Arn.) — Par. Arnott . . .
Lophospermum Don 1827.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Lophozia Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 17: Aploziear.
Lophozonia Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 396: nov. g. Tripterocarpo Meisn. aff.? (L. heterocarpa.)
Lorantharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: ordo Gynopetalar. Fam.: Loranthideae, Rhizophoreae.
Loranthcae Juss. 1808.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Loranthideae Gray 1821.
Dum. 1829. An. p. 33. 34: fam. Lorantharicar. Gen.: Loranthus, Schöpfia, Spirostyles, Viscum.
Loranthus Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 34: Loranthidear.
Loroglossum Rich. 1818.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear. — Par. Math. . . .
Loteae DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Leguminosar. Subtrib. ut DC.

Lotus Seringe 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Trifoliear.
Lourea Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 40: Onobrychear.
Lubinia Comm., Vent. 1800.
Dum. 1829. An. p. 27: Anagallidear.
Luculia Sweet.
Dum. 1829. An. p. 32: Gardeniacear.
Lucuma Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear. — Par. G. Don . . .
Ludia Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 50: Bixacear. — Par. A. Juss. 1842 . . .
Ludwigia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Jussieuear.
Luffa Tourn. 1706.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear.
Lunaria Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 51: Lunariear.
Lunarieae Dumort. (1827. Fl. belg.) 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Siliculosar. Gen.: Camelina, Cochlearia, Draba, Erophila, Subularia, Alyssum, Berteroa, Lunaria, Ricotia, Clypeola, Farsetia, Aubrietia, Vesicaria, Meniocus, Peltaria, Vella, Carichtera.
Lunularia Mich. 1729.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 69: Cephalothecear.
Lupinus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.
Lussacia Spreng. 1825.
Dum. 1829. An. p. 29: Vaccinidear.
Luxemburgia St. Hil. 1822.
Dum. 1829. An. p. 49: Frankeniacear.
Luzula DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 62: Juncear.
Lychnanthus Gmel. 1806. Fl. Bad. II. p. 195. 249: Decandr. Trigyn. (antea *Lychnanthos.*)
Lychnis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 49: Silenear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Lycium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Cestrinear.
Lycogala Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Lycoperdarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: ordo Sarcosporar. Fam.: Lycoperdineae, Trichiaceae, Spumariaceae.
Lycoperdeae Gray 1821.
Dum. 1829. An. p. 74: trib. Lycoperdinear. Gen.: Lycoperdon, Bovista, Actinodermium, Geastrum, Tulostoma.
Lycoperdineae Brongn. 1824. (non 1834.)
Dum. 1829. An. p. 72. 74: fam. Lycoperdariear. Trib.: Sclerodermeae, Lycoperdeae.
Lycoperdon Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 74: Lycoperdear.
Lycopersicum Hill 1769.
Dum. 1829. An. p. 74: Solanear.
Lycopodarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: ordo Dermogynar. Fam.: Isoëtineae, Lycopodineae.
Lycopodineae Swartz 1806.
Agdh. (1822. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 583: ordo Tetradidymar.
Dum. 1829. An. p. 67. 68: fam. Lycopodariear. Gen. ut R. Br.
Lycopodium Rupp. 1718.
Burm. 1737. Thes. Zeyl. p. 144. t. 66.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 77: Lycopodiacear.
Dum. 1829. An. p. 68: Lycopodinear.
Lycopsis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Pulmonariar.
Lycopus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 49; 1829. An. p. 22: Menthear. — Par. Rchb. 1831 . . .
Lygeum Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear.
Lyginia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 62 (*Lygnia*): Restionear.
Lygnia Dumort. vid. *Lyginia R. Brown.*
Lygodium Swartz 1800.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 72: Osmundacear. — Par. Dum. 1829. An. p. 67.
Lyngbya Agardh 1821.
Dum. 1829. An. p. 78: Oscillariear. — Par. Mont. . . .
Lyonia Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.
Lyonsia R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Echitear.
Lyperanthus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56 (*Liperanthus*): Arethusear.
Lysimachia Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 145. t. 67.
= Chironia Linn., etc.
Lysimachia Mönch 1794.
Dum. 1829. An. p. 27: Anagallidear.
Lysinema R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Epacrear. — Par. Endl. 1839 . . .
Lythrariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Myrtariear. Trib.: Lagerströmieae, Lythreae.
Lythreae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 39: trib. Lythrariacear. Gen.: Lythrum, Ammannia, Cuphea, Diplosudon, Grislea, Nesaea, Lawsonia, Acisanthera, Peplis, Suffrenia.
Lythrum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Lythrear.
Maba Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 27: Ebenacear.
Maburnia Petit-Thouars 1809.
Dum. 1829. An. p. 55: Tripterellear.
Macclellandia *) Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 14. t. 1996: nov. g. Salicariear. (M. Griffithiana.)
Machaonia Humb. & Bonpl. 1808.
Dum. 1829. An. p. 33: Machaoniear.
Machaonieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: trib. Rubiacear. Gen.: Nauclea, Disodia, Chimarrhis, Machaonia.
Macradenia R. Brown 1822.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Macraea Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 27. t. 1901. 1902: nov. g. Phyllanthear. (*Niruri Rheede* X. 27.)
Madacarpus Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 14. t. 1152: nov. g. Senecionidear. (M. Belgaumensis.)

---

*) Dicat. John McClelland.

Madia Molin. 1782.
Dum. 1829. An. p. 79: Calendulear.
Madotheca Dumort. (1822. Comm.) 1829. Anal. fam. p. 69; 1835. Obs. Jung. p. 11: Lejeuniacear.
Maelenia Dumort. 1834.
Dum. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 13; 1836. Flora I. p. 52: g. Epidendrinear. (M. paradoxa c. tab.)
Maesa Forsk. 1775.
Dum. 1829. An. p. 27: Ardisiacear.
Magallana Cavan. 1797.
Dum. 1829. An. p. 41: Tropaeolinear.
Magnolia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Magnoliear.
Magnoliaceae St. Hil. 1805.
Dum. 1829. An. p. 44. 50: fam. Ranunculariear. Trib. ut DC. 1824.
Magnolieae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Magnoliacear. Gen: Michelia, Magnolia, Liriodendron.
Mahernia Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 46: Hermanniear.
Mahonia Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 50: Mahoniear.
Mahonieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: trib. Berberidear. Gen.: Berberis, Mahonia, Nandina.
Maianthemeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Asparaginear. Gen.: Maianthemum, Smilacina, Drymophila, Dianella.
Maianthemum Wigg. 1780.
Dum. 1829. An. p. 60: Maianthemear.
Majorana Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 22: Origanear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Malachodendron Mitch. 1748.
Dum. 1829. An. p. 47: Ternstromiear.
Malachra Jacq. 1762.
Dum. 1829. An. p. 46: Malvear.
Malaxideae Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 57: trib. Orchidear. Gen.: Angraecum, Dendrobium, Coelogyne, Malaxis, Liparis, Calypso, Microstylis, Stelis, Pleurothallis, Eria, Anisopetalum, Tribachia.
Dum. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 7; 1836. Flora I. p. 52: trib. Cerorchidear.
Malaxis Soland., Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Malcomia R. Brown 1802.
Dum. 1829. An. p. 51: Cardaminear.
Malesherbia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 42: Malesherbiear.
Malesherbieae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 42: trib. Passifloracear. Gen. id.
Malope Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 46: Malvear. — Par. Bartl. . . .
Malpighia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 48: Malpighiear.
Malpighiaceae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 43. 48: fam. Sapindariear. Trib.: Banisteriae, Hyptageae, Malpighieae, Hyppocastaneae.
Malpighieae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 48 (*Malpigieae*): trib. Malpighiacear. Gen.: Bunchosia, Byrsonima, Malpighia

Malva Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 46: Malvear. — Par. Bartl. . . .
Malvaceae Adans. 1761.
Dum. 1829. An. p. 43. 46: fam. Malvariear. Trib.: Malveae, Sidaceae.
Malvarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43: ordo Toropetalar. Fam.: Malvaceae, Bombaceae, Hermanniaceae, Tiliaceae, Elaeocarpeae, Tremandraceae.
Malvaviscus Dill. 1732.
Dum. 1829. An. p. 46: Malvear. — Par. Spach . . .
Malveae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Malvacear. Gen.: Malope, Malva, Kitaibelia, Althea, Lavatera, Malachra, Urena, Pavonia, Malvaviscus, Achania (p. 79), Lebretonia, Hybiscus, Gossypium.
Malvinda Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 149. t. 68.
= Waltheria Linn.
Mamillaria Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 42: Opuntiacear.
Mammea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 47: Calophyllear.
Mandragora Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear.
Mangifera (Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 152?) Linn. 1747 . . .
Dum. 1829. An. p. 41: Anacardiear.
Manisuris Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 64: Tripsacear.
Mantisia Curt.
Dum. 1829. An. p. 56: Curcumacear.
Manulea Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 24: Erinear.
Maranta Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 56 (*Marantha*): Cannacear.
Marathrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: ordo Torochlamydar. Fam. unica: Marathrineae.
Marathreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: trib. Marathrinear. Gen.: Marathrum. Corda 1835 . . .
Marathrineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. 62: fam. Marathrariear. Trib.: Podostemoneae, Marathreae.
Marathrum Humb. & Bonpl. 1808.
Dum. 1829. An. p. 62: Marathrear. — Par. Corda 1835 . . .
Marattia Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 67: Marattiacear.
Marattiaceae Kaulf. 1824.
Dum. 1829. An. p. 67: trib. Filicum. Gen.: Marattia, Danaea.
Marcgravia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 47: Marcgraviear.
Marcgraviaceae Juss. 1809.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
Dum. 1829. An. p. 43. 47: fam. Hypericariear. Trib.: Marcgravieae, Noranthеae.
Marcgravieae Choisy 1824.
Dum. 1829. An. p. 47: trib. Marcgraviacear. Gen. ead. — Par. Spach . . .
Marchantia Wigg. 1780.
Dum. 1822. Comm.; 1829. An. p. 69; 1831. Syll. p. 7: Cephalothecear.

Marica Schreb. 1789.
Dum. 1829. An. p. 58: Moraeacear.
Marodenia Dumort. vid. *Marsdenia R. Brown.*
Marrubieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: subtrib. Leonurear. Gen.: Leonurus, Molucella, Chaiturus, Marrubium, Ballota, Phlomis, Leucas, Leonotis.
Rchb. 1837 . . .
Marrubium Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 153. t. 71. f. 1.
Dum. 1829. An. p. 22: Marrubiear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Marsdenia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 26 (*Marodenia*): Pergulariear. — Par. Spach 1839 . . .
Marsilea Linn. 1737.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 84: Marsileacear.
Dum. 1829. An. p. 67 (*Marsilaea*): Pilulariacear.
Marsupella Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69 (*Mursupella*): Jungermanniear.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 23: Mesophyllear.
Martinezia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 56: Cocoinear. — Par. Spach 1846 . . .
Martynia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Sesamear.
Massonia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear. — Par. Endl. 1837 . . .
Matayba Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 48: Sapindear.
Matelea Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 26: Gonolobear.
Mathiola Scop. 1777.
Dum. 1829. An. p. 32: Psathurear.
Mathiola R. Brown 1812.
Dum. 1829. An. p. 51: Cardaminear.
Matricaria Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Mattia Schult. 1809.
Dum. 1829. An. p. 24: Cynoglossear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Maurandia Ort. 1797.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Mauritia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 55: Lepidocaryear.
Maxillaria Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Maydeae Dumort. 1823. Agrost. Belg.; 1827. Belg. p. 148; 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Calliflorar. Gen.: Mays, Coix.
Mays Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 148; 1829. An. p. 64: Maydear. — Par. Math. 1853 . . .
Maytenus Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 41: Evonymear.
Mazus Lour. 1790.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Meconopsis DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 52: Papaverear.
Medicago Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Trifoliear.
Megacarpaea DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Biscutellear. — Par. Rchb. 1837 . . .

Megaclinium Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Melaleuca Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 38: Melaleucear.
Melaleuceae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: subtrib. Leptospermear. Gen. ut DC. exceptis primo et ultimo.
Melampodium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Milleriear.
Melampyraceae Dumort. (1827. Belg.) 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Rhinanthidear. Gen.: Orthocarpus, Melampyrum, Alectorolophus, Rhinanthus, Pedicularis, Tozzia, Euchroma, Castilleja, Odontites, Euphrasia, Bartsia, Lamourouxia, Camphyleia.
Melampyrum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Melanconium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Tuberculariacear.
Melanoselinum Hoffm. 1814.
Dum. 1829. An. p. 35 (*Melanoselium*): Thapsiear.
Melanoselium Dum. vid. *Melanoselinum Hoffm.*
Melanthium Gron., Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Melastoma Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 154. t. 72. 73. (Quoad characterem ad Linn. Gen. p. 127 refert.)
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.
Melastomaceae R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 36. 38: fam. Myrtariear. Trib.: Lavoisiereae, Rhexieae, Osbeckieae, Miconieae; Chariantheae.
Melhania Forsk. 1775.
Dum. 1829. An. p. 46: Dombeyacear.
Melia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 48: Meliear.
Meliaceae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 43. 48: fam. Citrariear. Trib. ut DC. 1824.
Melianthеae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 45: trib. Zygophyllear. Gen. id. — Par. Harv. 1838 . . .
Melianthus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 45: Melianthear.
Melica Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 63: Poëar. — Par. Griseb. 1853 . . .
Melichrus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Stenantherear.
Melicocca Juss. 1817.
Dum. 1829. An. p. 48: Sapindear.
Melicope Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Melicytus Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 49: Kiggelariear.
Melieae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 48: trib. Meliacear. Gen.: Turraea, Quivisia, Sandoricum, Melia.
Melilotus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Trifoliear.
Melinis Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64 (*Menilis*): Panicear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830 . . .
Melissa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: g. Melissear.

Melisseae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Nepetear. Gen.: Dracocephalum, Lepechina, Melissa, Thymus, Acinos, Calamintha, Thymbra, Prostanthera, Rosmarinus.
Melittideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Labiatar. Subtrib.: Scutellarieae, Prunelleae, Sideritideae.
Melittis Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 44; 1829. An. p. 22: Prunellear.
Melocactus Link 1822.
Dum. 1829. An. p. 42: Opuntiacear.
Melochia Dill. 1732.
Dum. 1829. An. p. 46: Hermanniear.
Meloseira Agdh. 1824.
Dum. 1829. An. p. 78: Diatomear.
Melothria Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear.
Memecyleae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 36. 38: fam. Myrtariear. Gen.: Memecylon, Mouriria.
Memecylon Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 38: Memecylear.
Menais Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 25: Cordiear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Menilis Dumort. vid. *Melinis Palis.*
Meniocus Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 51: Lunariear.
Meniscium Schreb. 1791.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear. — Par. Lindl. 1847 . . .
Menispermeae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Menispermidear. Gen.: Menispermum, Cocculus, Coscinium, Cissampelos, Wenlandia.
Menispermideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50 (p. 44 *Menispermaceae*): fam. Ranunculariear. Trib. Menispermacear. DC.
Menispermum Tourn. 1705.
Dum. 1829. An. p. 50: Menispermear.
Menonvillea R. Brown, DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Biscutellear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Mentha Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 157. t. 70. f. 2.
Dum. 1829. An. p. 22: Menthear. (restrict.)
Mentheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Labiatar. Gen.: Mentha, Pulegium, Lycopus, Perilla, Isanthus.
Rchb. 1831 . . .
Menyanthes Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 25: Menyanthidear. — Par. Griseb. 1836 . . .
Menyanthideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 25: fam. Asclepiariear. Gen.: Menyanthes, Limnanthes, Villarsia.
Griseb. 1836 . . .
Menziesia Smith 1791.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.
Meophylleae Dumort. vid. *Mesophylleae.*
Mephrodium Dumort. vid. *Nephrodium Rich.*
Mercurialis Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 45: Acalyphear.
Merendera Ramond 1798.
Dum. 1829. An. p. 61: Colchicinear.
Meriania Swartz 1800.
Dum. 1829. An. p. 38: Lavoisierear.
Merisma Pers. 1797.
Dum. 1829. A. p. 74: Tremellacear.
Mertensia Willd. 1804.
Dum. 1829. An. p. 67: Gleicheniear.
Merulieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: trib. Agaricinear. Gen.: Daedalea, Merulius, Steerbeckia.
Merulius Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 73: Meruliear.
Mesembryneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 41: fam. Portulariear. Gen.: Mesembryum, Tetragonia, Sesuvium, Aizoon, Orygia et (p. 79) trib.: Glineae.
Mesembryum Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 41: Mesembrynear.
Mesogloia Agdh. 1817.
Dum. 1829. An. p. 78: Nostocinear.
Mesogloieae Agardh 1841. Linnaea XV. p. 453. = Mesogloiaceae Agdh.
Mesophylla Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69 (*Mosophylla*): Jungermanniear.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 24: Mesophyllear.
Mesophylleae Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 23 (sph. *Meophylleae*): trib. Jungermanniotypar. Gen.: Marsupella, Mesophylla.
Mespileae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: subtrib. Pomacear. Gen.: Crataegus, Mespilus, Osteomeles, Cotoneaster.
Mespilus Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 92; 1829. An. p. 39: Mespilear.
Messerschmidia B. Juss. 1759.
Dum. 1829. An. p. 25: Ehretiear.
Metaplexis R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.
Metastelma R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Astephanear.
Methonica Herm. 1687.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 158.
Methoniceae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 60: trib. Flagellariacear. Gen. Gloriosa.
Metrosideros Banks, Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 38: Eucalyptear.
Metzgeria Raddi 1820.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 26: Pelliear. *Cf. Acrostolia Dumort.*
Meum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear.
Mibora Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear.
Michauxia L'Herit. 1788, Lam.
Dum. 1829. An. p. 30: Campanulear.
Michelaria Dumort. 1823.
Dumort. 1827. Belg. p. 155: Bromacear. (M. bromoidea.)
Dum. 1829. An. p. 63: Bromear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Michelia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Magnoliear.
Miconia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 39: Miconiear.
Miconieae DC. 1828.
Dum. 1829. p. 39: trib. Melastomacear. Gen. ex DC.
Micranthera Choisy 1823.
Dum. 1829. An. p. 47: Garciniear.
Micrococos Burm. vid. *Micrococos Burm.*

Microcoleus Desmaz. 1823.
Dum. 1829. An. p. 78: Oscillariear. — Par. Menegh. 1838 . . .
Micrococos Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 159 (in tab. 74 *Micrococos*).
? = Microcos Linn.
Microdon Choisy 1823.
Dum. 1829. An. p. 22: Selaginear.
Microlicia Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 38: Rhexiear.
Microloma R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Astephanear.
Micropus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Gnaphaliear.
Microrhynchus Less. 1832.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 13 (*Microrhyncus*). t. 1145: Cichoracear.
Microrhyncus Wight vid. *Microrhynchus Less.*
Microstylis Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Microtis R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.
Microtropis Wall. 1831.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 2. t. 1052: Euonymear.
Mikania Willd. 1803.
Dum. 1829. An. p. 31: Eupatoriear.
Miliaceae Dumort. 1823. Agrost. Belg.; 1827. Fl. Belg. p. 150; 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Panicear. Gen. 1827: Mibora, Digitaria, Panicum, Milium; 1829: Paspalum, Axopus, Ceresia, Milium.
Milium Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 150; 1829. An. p. 64: Miliacear.
Millea Willd. 1799.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear.
Milleria Cass. 1824.
Dum. 1829. An. p. 31: Milleriear.
Millerieae Cass. 1821.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Helianthidear. Gen.: Sigisbeckia, Unxia, Sclerocarpus, Polymnia, Milleria, Flaveria, Melampodium, Brotera.
Millingtonia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 23: Bignoniacear.
Mimetes Salisb., R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear.
Mimosa Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 40: Acaciear.
Mimuleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Rinanthidear. Gen.: Mimulus, Uvedalia.
Mimulus Linn. 1741.
Dum. 1829. An. p. 23: Mimulear.
Mimusops Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Mitchella Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 32: Vangueriear.
Mitella Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 30: Saxifragear.
Mitrasachme Wight vid. *Mitrasacme Labill.*
Mitrasacme Labill. 1804.
Wight 1850. Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 15 (*Mitrasachme*). t. 1601: Spigeliear.
Mitrasphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 74 (*Mitrosphera*): Stigmasphear.

Mitrogynae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 68: class. Cryptanthar. Ord.: Hypnarieae, Jungermannarieae, Ricciarieae.
Mitrosphera Dumort. vid. *Mitrasphaera Ej.*
Mitrula Fries 1821.
Dum. 1829. An. p. 73 (*Mitrularia*): Clavariacear.
Mitrularia Dumort. vid. *Mitrula Fries.*
Mniarum Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 19: Scleranthear.
Mniopis Dumort. vid. *Mniopsis Ej.*
Mniopsis Mart. 1822.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 34. t. 1918: Podostemacear.
Mniopsis Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69 (*Mniopis*, corr. in Ind.): Jungermanniear.
Dum. (1831. Syll. Jung. p. 75) 1835. Obs. Jung. p. 22: Acolear.
Modecca Lam. 1797.
Dum. 1829. An. p. 42: Passiflorear.
Möhringia Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.
Mönchia Ehrh. 1788.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.
Molgosphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 75: Astomospherar.
Molinaea Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 48: Sapindear.
Molkia Dumort. vid. *Moltkia Lehm.*
Mollia Willd. 1806.
Dum. 1829. An. p. 49: Spergulear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Mollugo Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 161. t. 71. f. 2.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear. — Par. G. Don 1831 . . .
Molospermum Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 34 (*Molopospermum*): Pimpinellear.
Moloppospermum Dumort. vid. *Molospermum Koch.*
Moltkia Lehm. 1817.
Dum. 1829. An. p. 24 (*Molkia*): Pulmonariar.
Molucella B. Juss. 1759.
Dum. 1829. An. p. 22: Marrubiear.
Momordica Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 160.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear.
Monachme Dumort. vid. *Monachne Palis.*
Monachne Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64 (*Monachme*): Panicear. genuinar.
Monarda Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Clinopodear.
Monerma Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64: Ophiurear.
Monilia Hill 1751.
Dum. 1829. An. p. 75: Moniliacear.
Moniliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 75: fam. Byssariear. Gen.: Monilia, Torula, Hormiscium, Alternaria.
Monimia Petit-Th. 1805.
Dum. 1829. An. p. 16: Monimiacear. — Par. Lindl. . . .
Monimiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16 (p. 14 *Monimieae*): fam. Monimiariear. Gen.: Monimia, Ambora, Ruizia.
Lindl. 1836 . . .

Monimiarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: ordo Torosepalar. Fam.: Atherospermeae, Monimiaceae.

Monniera Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.

Monnina Ruiz & Pav. 1798.
Dum. 1829. An. p. 23: Polygalacear. — Par. Presl 1831 . . .

Monoclea Hook. 1820.
Dum. 1829. An. p. 70: Targioniacear.

Monodora Dunal 1817.
Dum. 1829. An. p. 50: Anonacear.

Monogramma Comm., Schkuhr 1809.
Dum. 1829. An. p. 67: Asplenicar.

Monopsis Salisb.
Dum. 1829. An. p. 30: Lobeliacear. — Par. G. Don . . .

Monospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: series Umbellatar. Trib. unica: Lagoecieae.

Monotoca R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Stenantherear.

Monotropa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 47: Monotropear.

Monotropeae Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 47: trib. Pyrolacear. (p. 79 fam. Hypericariear.) Gen.: Monotropa.

Monoxora Wight 1842. Ic. pl. Ind. II. 3. p. 1. t. 524: g. Myrtear. (serius 1843 in Erratis ad Rhodamniam Jack reductum.)

Monsonia Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 46: Geraniear.

Montia Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 23: Montiacear.

Montiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. 23: fam. Pinguiculariear. Gen.: Montia, Limnia.

Montinia Thunb. 1781.
Dum. 1829. An. p. 39: Montiniear.

Montinieae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 39: trib. Onagracear. Gen.: Montinia.

Moraea Mill. 1731, Linn.
Dum. 1829. An. p. 58: Moraeacear. — Par. Spach . . .

Moraeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Iridear. Gen.: Iris, Moraea, Marica, Bobartia, Pardanthus, Tinantia, Homeria, Renealmia. — Par. Spach 1846 . . .

Morchella Dill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 74: Helvellacear. — Par. Corda 1842 . . .

Morenia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 55: Coryphinear.

Moricandia DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Brassicear.

Morideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: trib. Urticacear. Gen.: Morus, Broussonetia.

Morina Tourn. 1703.
Dum. 1829. An. p. 32: Morinacear.

Morinaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Dipsacear. Gen.: Morina.

Morinda Vaill. 1722.
Dum. 1829. An. p. 33: Psychotriear.

Moringa Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 162. t. 75.
Dum. 1829. An. p. 48: Moringacear. — Par. Lindl. 1836 . . .

Moringaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 48: fam. Sapindariear. Gen.: Moringa. Lindl. 1836 . . .

Morus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 17: Moridear.

Moschosma Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 22: Ocymear.

Mosophylla Dumort. vid. *Mesophylla Ej.*

Mouriria Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 38: Memecylear.

Mucedinarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: ordo Hyphosporar. Fam.: Cephalosporeae, Mucedineae.

Mucedineae Gray 1821.
Dum. 1829. An. p. 73. 75: fam. Mucedinariear. Trib.: Gonocladeae, Gonosporeae, Trichocladeae.

Mucedines Link 1809.
Agdh. (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis . . .

Mucor Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 75: Mucorinear.

Mucorarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: ordo Hyphosporar. Fam. unica: Mucorineae.

Mucorineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 75: fam. Mucorariear. Gen.: Eurotium, Ascophora, Thamnidium, Mucor, Hydrophora, Syzygites, Didymocrater, Stilbum. Schulz 1832 . . .

Mucuna Marcgr. 1648.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.

Mühlenbergia Schreb. 1779.
Dum. 1829. An. p. 63 (*Muhlembergia*): Agrostidear.

Muhlembergia Dumort. vid. *Mühlenbergia Schreb.*

Munnickia Blume, Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 14: Aristolochiear.

Munronia *) Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 5. t. 91: nov. g. Meliacear. (Melia pumila Moon catal.)

Muntingia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 46: Tiliacear.

Muraltia Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 23: Polygalacear. — Par. Lindl. 1847 . . .

Murraya Kön., Linn. 1774.
Dum. 1829. An. p. 48: Aurantiacear.

Mursupella Dumort. vid. *Marsupella Ej.*

Murucuia Pis. 1648, Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 42: Passiflorear.

Musa Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 56: Musacear.

Musaceae Mass. 1804.
Dum. 1829. An. p. 56: fam. Cannariear. Gen. ut St. Hil.

Muscari Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear. — Par. Endl. 1837 . . .

Musci Brid. 1797.
Dum. 1829. An. p. 68: fam. Hypnariear. Series: Endopogoni, Hymenopogoni, Dichopogoni, Aplopogoni, Apogoni, Astomati.

*) Dicat. Lieut. Munro.

Mussaenda Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 175. t. 76.
Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Musschia Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 30: Campanulear. — Par. A. DC. . . .
Mutisia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 31: Mutisiear.
Mutisieae Cass. 1817.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Chaenanthar. Gen.: Gerbera, Chaptalia, Perdicium, Leria, Onoseris, Mutisia, Chaenanthera, Flotovia, Proustia, Bardanesia.
Myagrum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 51: Isatidear.
Mycoderma Pers. 1822.
Dum. 1829. An. p. 78: Diatomear.
Mycosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: class. Dermosporar. Series: Hymenosporae, Sarcosporae, Hyphosporae.
Myginda Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 27: Ilicear.
Mylitta Fries 1825.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Mylocaryum Willd. 1809.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.
Myoporinae R. Brown 1810.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15: ordo Tetraspermar.
Myoporineae DC. 1819.
Dum. 1829. An. p. 19. 22: fam. Labiariear. Gen.: Myoporum, Stenochilus, Bontia, Avicenia.
Myoporum Banks & Sol., Forst. 1786.
Dum. 1829. An. p. 22: Myoporinear.
Myosanthus Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: g. Alsinear., inter Larbraeam et Alsinem collocatum. (Nomen.)
Myosotis Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 24: Anchusear. — Par. G. Don 1837 . . .
Myosurus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Ranunculear.
Myrcia DC. 1826.
Dum. 1829. An. p. 38: Myrtear.
Myrianthus Palis. 1805.
Dum. 1829. An. p. 29: Zanoniacear.
Myrica Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 12: Myricear. (restrict.)
Myricaria Desv. 1825.
Dum. 1829. An. p. 41: Tamariscinear.
Myriceae Rich. 1808.
Dum. 1829. An. p. 11. 12: fam. Populariear. Gen.: Myrica, Gale.
Myriodactylon Desv. 1809.
Dum. 1829. An. p. 78: Nostocinear.
Myriophyllum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Haloragidear.
Myriotheca Dumort. Anal. in Ind. p. 95: err. pro *Myrothecium*.
Myristica Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 16: Myristicear.
Myristiceae R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 14. 16: fam. Laurrainiear. Gen.: Myristica, Knema, Virola.
Myrobalanus Gärtn. 1791.
Dum. 1829. An. p. 13 (*Myrobolanus*): Myrobolanear.
Myrobolaneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: fam. Santalariear. Gen.: Bucida, Myrobolanus, Terminalia, Agathisanthes, Pentaptera.
Myrodia Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 46: Bombacear.
Myrospermum Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Myrothecium Tode 1790.
Dum. 1829. An. p. 74: Spumariacear.
Myrrhis Scop. 1772.
Dum. 1829. An. p. 35: Scandicinear.
Myrsine Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 27: Ardisiacear.
Myrsiphyllum Willd. 1808.
Dum. 1829. An. p. 60: Smilacinear.
Myrtarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36: ordo Calypetalar. Fam.: Granateae, Myrtineae, Memecyleae, Melastomaceae, Lythrariaceae.
Myrteae DC. 1826.
Dum. 1829. An. p. 38: trib. Myrtinear. Gen.: Psidium, Jossinia, Myrtus, Myrcia, Calyptranthes, Syzygium, Caryophyllus, Acmena, Eugenia, Jambosa.
Myrtineae DC. 1813.
Dum. 1829. An. p. 36. 38: fam. Myrtariear. Trib.: Chamaelancieae, Leptospermeae, Myrteae, Barringtonieae, Lecythideae.
Myrtus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 38: Myrtear.
Myscolus Cass. 1818.
Dum. 1829. An. p. 30: Scolymear.
Nacibea Dubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Nama Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 25: Hydrolaeacear.
Nandina Thunb. 1781.
Dum. 1829. An. p. 50: Mahoniear.
Napoleona Palis. 1805.
Dum. 1829. An. p. 29: Napoleonacear.
Napoleonaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. 29: fam. Cucurbariear. Gen.: Napoleona, Asteranthos.
Naravelia DC. 1818.
Dum. 1829. An. p. 50: Clematidear.
Narcissarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Gynochlamydar. Fam.: Narcissineae, Leucoideae, Agavineae.
Narcisseae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Narcissinear. Gen.: Narcissus.
Narcissineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. 58: fam. Narcissariear. Trib.: Amaryllideae, Pancratieae, Narcisseae.
Narcissus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 58: Narcissear.
Nardostachys DC. 1829.
Dum. 1829. An. p. 32: Fediear.
Nardus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 64: Ophiurear.
Nassauvia Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 31: Nassauviear.
Nassauvieae Cass. 1817.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Chaenanthar. Gen.: Nassauvia, Triptilium, Panphalea, Homoianthus, Clarionea, Trixis, Lasiorhiza, Jungia, Dumerilia.
Nasturium Dumort. vid. *Nasturtium R. Brown*.

Nasturtium R. Brown 1812.
Dum. 1829. An. p. 51 (*Nasturium*): Cardaminear.
Nastus Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 63: Bambusacear.
Nauclea Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 33: Machaoniear.
Naumburgia Mönch 1802.
Dum. 1829. An. p. 27: Anagallidear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Nayadeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59 (p. 61 *Naiadeae*): fam. Nayariear. Trib.: Ceratophylleae, Nayeae.
Nayarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Torochlamydar. Fam.: Nayadeae, Lemnaceae, Pistiaceae.
Nayas Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 61: Nayear.
Nayeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: trib. Nayadear. Gen.: Nayas, Hyas.
Neckera Roth 1788.
Dum. 1829. An. p. 68: Hypnear.
Negundo Mönch 1794.
Dum. 1829. An. p. 48: Acerinear.
Nelsonia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 53: Elytrariear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Nelumbo Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 53: Nelumbonear.
Nelumboneae DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 53: fam. Nymphaeariear. Gen.: Nelumbo.
Nemaspora Lühn. 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Tuberculariacear.
Nemesia Vent. 1803.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Nemopanthes Rafin. 1819.
Dum. 1829. An. p. 27: Ilicear.
Nemophila Bart. 1818.
Dum. 1829. An. p. 25: Hydrophyllear.
Neottia Ehrh. 1780.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Neottieae Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 56: trib. Orchidear. Gen. ex Lindl. 1826 et Gyrostachys.
Dum. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6: subtrib. Limodorear.
Nephentharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: ordo Torosepalar. Fam. unica: Nepenthideae.
Nepenthideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14. 16: fam. Nepenthariear. Gen.: Nepenthes.
Nepeta Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Catariear.
Nepeteae Spreng. 1817.
Dum. 1829. An. p. 22: trib. Labiatar. Subtrib.: Catarieae, Melisseae, Origaneae.
Nephrodium Rich. 1803.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 30. t. 5: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67 (sph. *Mephrodium*): Aspleniear.
Nerine Herb. 1821.
Dum. 1829. An. p. 58: Amaryllidear.
Nerium Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 166. t. 77. 78.
Nerium R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Echitear.

Nesaea Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 39: Lythrear.
Neslia Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 51: Buniadear. — Par. Link 1831 . . .
Neurada Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 39: Agrimoniacear.
Neurocalyx Hook. 1837.
Wight 1838. Ic. pl. Ind. I. t. 52: Rubiacear.
Neurocarpum Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 40: Clitoriear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Nicandra Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear.
Nicotiana Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 24: Nicotianear. — Par. G. Don 1837 . . .
Nicotianeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Solanidear. Gen.: Nicotiana, Petunia, Scopolia, Hyoscyamus.
G. Don 1837 . . .
Nidularia Fries 1818.
Dum. 1829. An. p. 74: Nidulariacear.
Nidulariaceae Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 72. 74: fam. Nidulariear. Gen.: Cyathus, Nidularia, Polyangium.
Nidularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: ordo Sarcosporar. Fam.: Nidulariaceae, Carpoboleae.
Niebuhria DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 51: Capparear.
Nigella Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 50: Helleborear.
Nigritella Rich. 1818.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Nipa Rumph., Thunb. 1782.
Dum. 1829. An. p. 55: Lepidocaryear.
Nissolia Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 40: Galegear.
Nitella Agdh. 1824.
Dum. 1829. An. p. 76: Characear.
Nivenia R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear.
Noccaea Willd. 1803.
Dum. 1829. An. p. 31 (*Noccea*): Rolandrear.
Noccea Dumort. vid. *Noccaea Willd.*
Noisettea Dumort. vid. *Noisettia Kunth.*
Noisettia HBK. 1821.
Dum. 1829. An. p. 49 (*Noisettea*): Violear.
Nolana Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 24: Nolanacear. — Par. Endl. 1839 . . .
Nolanaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 24: fam. Boraginariear. Gen.: Nolana.
Lindl. 1833 . . .
Nolina Rich. 1803.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Nomochloa Palis., Lestib. 1819.
Dum. 1829. An. p. 65: Schoenear.
Nonatelia Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 32: Vangueriear.
Nonea Medic. 1789.
Dum. 1829. An. p. 79: Pulmonariar. (loco *Batschiae*.)
Norantea Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 47 (*Noranthea*): Noranthear.
Noranthea Dumort. vid. *Norantea Aubl.*

Norantheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: trib. Marcgraviacear. Gen.: Noranthea, Ruyschia.
Norysca Spach 1836.
Wight 1838. Ic. pl. Ind. I. t. 56: Hypericinear.
Nostoc Vauch. 1803.
Dum. 1829. An. p. 78: Nostocinear.
Nostochariese Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: ordo Thallosporar. Fam.: Batrachospermeae, Nostocineae, Oscillarieae.
Nostocineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77. 78: fam. Nostochariear. Gen.: Chaetophora, Nostoc, Myriodactylon, Mesogloia, Rivularia, Palmella.
Notelaea Vent. 1803.
Dum. 1829. An. p. 26: Oleinear.
Notholaena R. Brown 1810.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 18. t. 1: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear.
Notoceras R. Brown 1812.
Dum. 1829. An. p. 51: Erysimear.
Nuphar Smith 1806.
Dum. 1829. An. p. 53: Nympheacear.
Nyctaginarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: ordo Torocoronar. Fam. unica: Nyctagineae.
Nyctagineae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 19. 21: fam. Nyctaginariear. Gen.: Oxybaphus, Nyctago, Abronia, Allionia, Boerhaavia, Pisonia, Boldoa.
Nyctago Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 21: Nyctaginear.
Nyctanthes Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 26: Jasminear.
Nycterisition Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Nycterium Vent. 1803.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear.
Nylandtia Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 23: Polygalacear.
Nymphaea Smith 1806.
Dum. 1829. An. p. 53: Nympheacear.
Nymphaearieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: ordo Torotepalar. Fam.: Sarracenieae, Nympheaceae, Nelumboneae, Hydropeltideae.
Nympheaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: fam. Nymphaeariear. Gen.: Nuphar, Nymphaea, Euryale.
Nyssa Gron., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 13: Nyssacear. — Par. Endl. 1838 . . .
Nyssaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: fam. Santalariear. Gen.: Nyssa.
Endl. 1838 . . .
Nyssanthes R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 18: Gomphrenear.
Obesia Haw. 1812.
Dum. 1829. An. p. 26: Stapeliear. — Par. G. Don 1837 . . .
Obione Gärtn. 1791.
Dum. 1829. An. p. 17: Atriplicear. — Par. Moq.-Tand. 1840 . . .
Ochna Schreb. 1789.
Dum. 1829. An. p. 45: Ochnacear.
Ochnaceae DC. 1811.
Dum. 1829. An. p. 42. 45: fam. Rutariear. Gen. ut DC. (exclusis affinibus).
Ochroma Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 46 (*Ochrosma*): Bombacear.
Ochrosia Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 26: Carissear.
Ochrosma Dumort. vid. *Ochroma Swartz.*
Ocotea Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 16: Laurinear. genuinar.
Octomeria R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Ocymeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Labiatar. Gen.: Ocymum, Plectranthus, Hyptis, Glechon, Moschosma, Pycnostachys.
Ocymum Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 174. t. 80.
Dum. 1829. An. p. 22: Ocymear.
Odontites Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Odontoschisma Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 19: g. Pleuroschismear.
Synon. Sphagnoecetis Nees.
Oedera Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 31: Gnaphaliear.
Oenanthe Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34 (*Aenanthe*): Seselinear.
Oenocarpus Mart. 1823.
Dum. 1829. An. p. 56: Arecinear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Oenothera Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Onagrear. (restrict.)
Olacineae Mirb. 1813.
Dum. 1829. An. p. 43. 47: fam. Citrariear. Trib.: Fissilieae, Heisterieae.
Olax Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 47: Fissiliear.
Oldenlandia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Olea Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 26: Oleinear.
Oleineae DC. 1819.
Dum. 1829. An. p. 26: trib. Jasminidear. Gen.: Olea, Ligustrum, Notelaea, Linociera.
Olfersia Raddi 1819.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 14: Polypodiacear.
Oligolepis Cass. 1827.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 13. t. 1149: Asteroidear.
Oligostemon Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 447: nov. g. Simarubaceis aff. (O. Schlimii.)
Olyra Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 64: Oryzacear.
Omphalea Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 45: Huracear.
Omphalobium Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 40: Connarinear.
Omphalodes Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 24: Cynoglossear. — Par. G. Don 1837 . . .
Onagra Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 39: Onagrear. — Par. Rchb. 1837 . . .

Onagraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Onagrariear. Trib.: Montinieae, Fuchsiaceae, Circaeeae, Onagreae, Gaureae, Jussieueae.
Lindl. 1836 . . .
Onagrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36: ordo Calypetalar. Fam.: Onagraceae, Haloragideae, Trapaceae, Combretideae.
Onagreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: trib. Onagracear. Gen.: Oenothera, Onagra, Epilobium, Clarkia.
Oncidium Swartz 1800.
Dum. 1829. An. p. 58: Vandear.
Onobrycheae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 40: subtrib. Hedysarear. Gen.: Ebenus, Lespedeza, Onobrychis, Hedysarum, Desmodium, Uraria, Lourea, Smithia, Aeschynomene, Adesmia, Stylosanthes, Zornia.
Onobrychis Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Onobrychear.
Onobrychis Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 176. t. 81.
= Desmodii DC. sp.
Onoclea Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Ononis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Onopordon Vaill. 1718.
Dum. 1829. An. p. 32: Carduinear. — Par. Less. 1832 . . .
Onoseris DC. 1812.
Dum. 1829. An. p. 31: Mutisiear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Onosma Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 24: Pulmonariar.
Onosmidium Dumort. vid. *Oonosmodium Rich.*
Onosmodium Rich. 1803.
Dum. 1829. An. p. 24 (*Onosmidium*): Pulmonariar.
Onygena Pers. 1798.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Opegrapha Pers. 1794.
Dum. 1829. An. p. 71: Graphidear.
Opercularia Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 32: Operculariacear.
Operculariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. 32: fam. Rubiariear. Gen.: Opercularia, Pomax.
Ophioglosseae R. Brown 1810.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 76: trib. Filicum. Gen.: Botrychium, Botryopteris.
Ophioglossineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: fam. Filicariear. Gen.: Ophioglossum, Helminthostachys, Botrychium.
Ophioglossum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 67: Ophioglossinear.
Ophioxylon Linn. 1751.
Synon. Ligustrum Burm.?
Ophispermum Lour. 1790.
Dum. 1829. An. p. 18 (*Ophiospermum*): Aquilariacear. — Par. Lindl. 1847 . . .
Ophiureae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 64: trib. Calliflorar. Gen.: Ophiurus, Rottbölia, Lepturus, Psilurus, Monerma, Nardus.
Ophiurus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 64: Ophiurear.

Ophrydeae Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 56: trib. Orchidear. Gen. fere ut Lindl. 1826.
Dum. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 5: trib. Elatorchidear.
Ophrys Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Oplismenus Palis. 1807.
Dum. 1829. An. p. 64: Panicear. genuinar.
Opopanax Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 35 (*Oppoponax*): Peucedanear.
Oppoponax Dumort. vid. *Opopanax Koch.*
Opulus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 33: Viburnidear.
Opuntia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 42: Opuntiacear.
Opuntiaceae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 42: trib. Cactidear. Gen. ead.
Orbea Haw. 1812.
Dum. 1829. An. fam. p. 26: Stapeliear. — Par. G. Don 1837 . . .
Orchideae Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 56: fam. Orchidiariear. Trib.: Ophrydeae, Gastrodieae, Arethuseae, Neottieae, Vandeae, Epidendreae, Malaxideae, Cypripedieae.
Dum. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 4; 1836. Flora p. 52. Divis.: . . . .
Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. Pt. 1. Trib. Orchidacear. Lindl.
Orchis R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Origaneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Nepetear. Gen.: Origanum, Amaracus, Majorana.
Rchb. 1837 . . .
Origanum Tourn.
Dum. 1829. An. p. 22: Origanear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Orites R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.
Orlaya Hoffm. 1814.
Dum. 1829. An. p. 35: Caucalidear. — Par. Tausch 1834 . . .
Orleana Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. cat. p. 464.
= Bixa Linn.
Ormacarpum Wight vid. *Ormocarpum Palis.*
Ormocarpum Palis. 1805.
Wight 1840. Ic. pl. Ind. I. 15. t. 297 (*Ormacarpum* in explicatione tabulae): Hedysarear.
Ornithidium Salisb. 1812.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Ornithocephalus Hook. 1825.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Ornithogalum Salisb. 1806.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear. — Par. Koch 1837 . . .
Ornithoglossum Salisb. 1806.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Ornithopus Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 40: Coronillear.
Ornus Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 26: Lilacinear.
Orobanchaceae Lindl. 1836.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 2. Subordines: Orobancheeae, Aeginetieae, Lathraeeae, Hyobancheae.

Orobanche Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 23: Orobanchear.
Orobanche C. A. Meyer 1830.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: Orobancheear.
Orobancheae Juss. 1804.
Dum. 1829. An. p. 23: trib. Orobanchidear. Gen.: Orobanche, Phelipaea, Hyobanche, Lathraea, Epiphegus.
Orobancheeae Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: subordo Orobanchacear. Gen.: Orobanche, Cystanche, Conopholis, Anoplanthus.
Orobanchideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 23: fam. Rhinanthariear. Trib.: Orobancheae, Aeginetieae.
Orobus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Viciear.
Orobus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 177.
= Abrus Prosp. Alp.
Orontieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: trib. Aridear. Gen.: Orontium, Dracontium, Pothos.
Orontium Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 66: Orontiear. — Par. Schott 1832 . . .
Ortegia Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear. (nec non in Sperguleis.)
Orthocarpus Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Orthoceras R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Orthopogon R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 64: Panicear. genuinar.
Orthotricheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Dichopogonor. Gen.: Orthotrichum, Zygodon, Calymperes, Aplotrichum.
Hampe 1839 . . .
Orthotrichum Hedw. 1789.
Dum. 1829. An. p. 69: Orthotrichear. — Par. Hampe 1839 . . .
Orygia Forsk. 1775.
Dum. 1829. An. p. 41: Mesembrynear.
Oryza Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 64 (*Oriza*): Oryzacear.
Oryzaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Callriflorar. Gen.: Oriza, Leersia, Trochera, Ehrharta, Potamophila, Zizania, Hydrochloa.
Osbeckia Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.
Wight 1845. Ic. pl. Ind. III. 3. p. 10 (*Osbeekia*). t. 996—998: Melastomear.
Osbeckieae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: trib. Melastomacear. Gen.: Lasiandra, Chaetogastra, Arthrostemma, Aciotis, Osbeckia, Melastoma, Pleroma.
Osbeekia Wight vid. *Osbeckia Linn.*
Oscillaria Bosc, Bory 1822.
Dum. 1829. An. p. 78: Oscillariear. — Par. Menegh. 1838 . . .
Oscillarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77. 78: fam. Nostochariear. Gen.: Oscillaria, Lyngbya, Anabaina, Microcoleus, Scytonema.
Menegh. 1838 . . .
Osiridyae Dumort. vid. *Osyrideae Ej.*
Osmunda Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 67: Osmundacear.
Osmundaceae R. Brown 1810.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 72: trib. Filicum. Gen.: Lygodium, Anemia. — Par. Dum. 1829. An. p. 67. Gen. ut. R. Brown et Todea, Anemia.
Osmundaria Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 76: Fucinear.
Osteomeles Lindl. 1821.
Dum. 1829. An. p. 39: Mespilear.
Osteospermum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 32: Calendulear. — Par. Brongn. . . .
Ostericum Hoffm. 1816.
Dum. 1829. An. p. 35: Angelicear.
Ostrya Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 12: Corylacear. — Par. Lindl. . . .
Osyrideae Dumort. (1822. Comm.) 1829. Anal. fam. p. 13 (sph. *Osiridyae*): trib. Santalinear. Gen.: Osyris.
Osyris Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 13: Osyridear.
Othonna Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 32: Calendulear.
Ottelia Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 54: Limnobiear.
Outarda Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: Cinchonear. (Nomen. An pro *Coutarea Aubl.?*)
Outea Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Ouviandra Dumort. vid. *Ouvirandra Pet.-Th.*
Ouviandreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: trib. Saururear. Gen.: Ouviandra.
Ouvirandra Pet.-Thouars 1809.
Dum. 1829. An. p. 66 (*Ouviandra*): Ouviandrear.
Oxalideae R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 43. 45: fam. Geranariear. Gen.: ut R. Brown et Biophytum.
Oxalis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Oxalidear.
Oxyanthus DC. 1807.
Dum. 1829. An. p. 32: Gardeniacear.
Oxybaphus L'Herit., Willd. 1797.
Dum. 1829. An. p. 21: Nyctaginear.
Oxycoccus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 29: Vaccinidear.
Oxylobium Andr. 1809.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Oxypetalum R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.
Oxyria Hill 1769.
Dum. 1829. An. p. 18: Rhear.
Oxys Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 178.
Oxysepala Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 17. t. 1736: nov. g. Malaxidear., Cochliae aff. (O. ovalifolia.)
Oxystelma R. Brown 1809.
Vid. Exitelma Dumort.
Oxytropis DC. 1802.
Dum. 1829. An. p. 40: Astragalear.
Ozonium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Byssinear.
Pachydendron Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: Hyacinthear.
Endl. 1841. . . . .
Pachysandra Michx. 1803.
Dum. 1829. An. p. 45: Buxinear.

Paederota Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 23: Veronicear.
Paenoë Rheede 1683.
Rheede l. c. (*Paenu* in tab.)
Paeonia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 50: Paeoniacear.
Paeoniaceae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Ranunculacear. Gen.: Actea, Cimicifuga, Xanthorthiza, Paeonia.
Pagamea Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 26 (*Pegamaea*): Loganiacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Palavia Schreb. 1791.
Dum. 1829. An. p. 46: Sidacear.
Paleolaria Cass. 1816.
Dum. 1829. An. p. 31: Adenostylear.
Paliurus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 41: Rhamnidear.
Palmae Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 54. 55: fam. Palmariear. Trib.: Sabalineae, Coryphineae, Lepidocaryeae, Borasseae, Arecineae, Cocoineae.
Palmarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: ordo Calytepalar. Fam. unica: Palmae.
Palmella Lyngb. 1819.
Dum. 1829. An. p. 78: Nostocinear.
Panax Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 35: Araliacear.
Pancratieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Narcissinear. Gen.: Pancratium, Calostema, Cearia, Ismene, Chrysiphiala.
Kunth 1850 . . .
Pancratium Dill. 1732.
Dum. 1829. An. p. 58: Pancratiear.
Pandaneae R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 65. 66: fam. Typhariear. Gen.: Pandanus, Phytelephas, Freycinetia.
Pandanus Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 66: Pandanear.
Paniceae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 64: trib. Calliflorar. Subtrib.: Miliaceae, *genuinae* (gen.: Panicum, Digitaria, Oplismenus, Echinochloa, Orthopogon, Isachne, Monachme, Menilis, Paractaemum, Athenantia, Hymenachne), Setarieae, Tripsaceae, Cenchreae.
Panicum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 64: Panicear. genuinar.
Panphalea Lag. 1811.
Dum. 1829. An. p. 31: Nassauviear.
Papaver Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 52: Papaverear.
Papaverarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam.: Fumariaceae, Papaverineae.
Papavereae Spreng. 1818.
Dum. 1829. An. p. 52: trib. Papaverinear. Gen.: Meconopsis, Argemone, Papaver.
Papaverineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44 (*Papaveraceae*). 51: fam. Papaverariear. Trib.: Hypecoëae, Chelidonieae, Papavereae.
Papaya Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 184.
Pappophoreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: trib. Bromacear. Gen.: Pappophorum, Enneapogon, Echinaria.
Kunth 1830 . . .
Pappophorum Schreb. 1791.
Dum. 1829. An. p. 63: Pappophorear. — Par. Kunth 1830 . . .
Papyrus Willd. 1812.
Dum. 1829. An. p. 65: Cyperinear.
Paractaemum Dumort. vid. *seq.*
Paractaenum Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64 (*Paractaemum*): Panicear. genuinar.
Pardanthus Bell.-Gawl. 1805.
Dum. 1829. An. p. 58: Moraeacear.
Pariana Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 64: Tripsacear.
Paridarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: ordo Torotepalar. Fam.: Parideae, Calocorthineae, Phylesiaceae.
Parideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: fam. Paridariear. Gen.: Paris, Trillium, Gyromia.
Parietaria Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 17: Urticear.
Paris Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 53: Paridear. — Par. Link 1829 . . .
Parkinsonia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Parmelia Achar. 1803.
Dum. 1829. An. p. 71: Parmeliacear.
Parmeliaceae Eschw. 1824.
Dum. 1829. An. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Parmelia, Sticta.
Parnassia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 49: Parnassiacear.
Parnassiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Resedariear. Gen.: Parnassia.
Paronychia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 18: Illecebrinear.
Paropsia Nor., Pet.-Th. 1807.
Dum. 1829. An. p. 42: Paropsiacear.
Paropsiaceae Dumort. 1829. An. p. 37. 42: fam. Turnerariear. Gen.: Paropsia, Smeathmannia.
Parsonsia R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Echitear.
Parthenium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Coreopsidear.
Paspalum Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 64: Miliacear.
Passerina Trag., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 18: Thymelinear.
Passiflora Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 42: Passiflorear.
Passifloraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 42: fam. Passiflorariear. Trib.: Passifloreae, Malesherbieae.
Passiflorarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: ordo Calypetalar. Fam.: Caricaceae, Passifloraceae.
Passifloreae Juss. 1805.
Dum. 1829. An. p. 42: trib. Passifloracear. Gen. ut Juss. 1805 et Disemma.
Pastinaca Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 79: Peucedanear.
Patagonula Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 25: Cordiear.
Patellaria Esenb., Gray 1821.
Dum. 1829. An. p. 73 (*Petellaria*): Pezizear. An huc?

Patersonia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 57: Ferrariear.
Patrinia Juss. 1807.
Dum. 1829. An. p. 32: Fediear.
Patrisia Rich. 1792.
Dum. 1829. An. p. 49: Patrisiear.
Patrisieae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 49: trib. Flacurtiacear. Gen. ead.
Pattonia *) Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 20. t. 1750: nov. g. Malaxidear. (P. macrantha.)
Paullinia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 48: Paulliniear.
Paullinieae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 48: trib. Sapindacear. Gen. ut DC. (excepta Urvillea.)
Pavetta Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 23: Pavettear. — Par. Miq. 1856 . . .
Pavetteae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: trib. Rubiacear. Gen.: Siderodendron, Tetramerium, Scolosanthus, Pavetta, Ixora, Baconia, Ernodea.
Miq. 1856 . . .
Pavia Boerh. 1720.
Dum. 1829. An. p. 48: Hyppocastanear.
Pavonia Cavan. 1786.
Dum. 1829. An. p. 46: Malvear.
Pectinaria Haw. 1819.
Dum. 1829. An. p. 26: Stapeliear. — Par. G. Don 1837 . . .
Pectis Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 31: Tagetinear.
Pedalieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: trib. Pedalinear. Gen.: Pedalium, Josephina.
Meisn. 1840 . . .
Pedalineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18. 22: fam. Labiariear. Trib.: Pedalieae, Sesameae.
Pedalium Roy., Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 22: Pedaliear. — Par. Meisn. 1840 . . .
Pedicularis Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Pedilanthus Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 45: Euphorbiear.
Pegamaea Dumort. vid. *Pagamea Aubl.*
Peganum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Rutear.
Pegia Colebr. 1827.
Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 12. t. 236: Anacardiear.
Pela Rheede 1682. Hort. Malab. III. p. 31. t. 34.
= Psidium Linn.
Pelargonieae Sweet 1820.
Dum. 1829. An. p. 46: trib. Geraniacear. Gen.: Pelargonium, Jenkinsonia, Ciconium.
Pelargonium L'Herit. 1787.
Dum. 1829. An. p. 46: Pelargoniear.
Pelexia Poit., Rich. 1818.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Pellia Raddi 1820.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 27: Pelliear.

*) Dicat. dominae Walker e gente Patton.

Pellieae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 26: trib. Blasiacear. Gen.: Metzgeria, Acrostolia, Aneura, Pellia.
Peltandra Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 24. t. 1891. 1892: nov. g. Phyllanthear. (P. longipes et parvifolia.)
Peltaria Jacq. 1762.
Dum. 1829. An. p. 51: Lunariear.
Peltidea Achar. 1798.
Dum. 1829. An. p. 71: Peltigerear.
Peltigereae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Solorina, Peltidea.
Mont. 1849. . . .
Peltophorus Desv., Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64: Tripsacear.
Peltosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: class. Dermosporar. Ordo unicus: Lichenarieae.
Pemphidia Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Ceramidear., inter Ectocarpum et Bulbochaetem locatum. (Nomen.) Quid?
Penaea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18: Penaeacear.
Penaeaceae R. Brown 1820.
Dum. 1829. An. p. 15. 18: fam. Proteariear. Gen.: Penaea.
Penicillaria Willd. 1809.
Dum. 1829. An. p. 64: Setariear.
Penicillium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75 (*Pennicillium*): Gonocladear.
Pennisetum Rich. 1805.
Dum. 1829. An. p. 64: Setariear.
Pentadesma Don 1831.
Dum. 1829. An. p. 47: Calophyllear.
Pentapetes Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 46: Dombeyacear.
Pentaptera Roxb. 1814.
Dum. 1829. An. p. 13: Myrobolanear.
Pentestemon Dumort. vid. *Pentstemon L'Her.*
Penthorum Gron., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 79: Sempervivear.
Pentstemon L'Herit., Schreb. 1791.
Dum. 1829. An. p. 79 (*Pentestemon*): Digitalidear.
Peperomia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 66 (*Pepronia*): Piperitear.
Peplis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Lythrear.
Pepronia Dumort. vid. *Peperomia R. & P.*
Perdicium Lag. 1811.
Dum. 1829. An. p. 31: Mutisiear.
Perebea Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 17 (*Peribea*): Artocarpear.
Pereskia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 42: Opuntiacear.
Pergularia Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 26: Pergulariear.
Pergularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: subtrib. Cynanchear. Gen.: Hoya, Pergularia, Tylophora, Dischidia, Marodenia, Gymnema, Sarcolobus.
Endl. 1838 . . .
Peribea Dumort. vid. *Perebea Aubl.*
Perichaena Fries 1825.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Periclymenum Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 186.

Perilla Linn. 1764.
Dum. 1829. An. p. 22: Menthear. — Par. Rchb. 1837 . . .

Periola Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.

Periploca Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 187. t. 83. f. 1.
Dum. 1829. An. p. 26: Periplocear.

Periploceae R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: trib. Asclepiadear. Gen.: Secamone, Periploca, Hemidemus, Gymnanthera, Cryptostegia.

Perisporium Fries 1821.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.

Peristylis Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 12 (quinquies) pro *Peristylus Blume.*

Peritoma DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 51: Cleomear.

Permna Dumort. vid. *Premna Linn.*

Perotis Ait. 1789.
Dum. 1829. An. p. 94: Saccharinear.

Persea Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 16: Laurinear. genuinar.

Persicarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Polygonear. Gen.: Polygonum, Fagopyrum, Königia, Calligonum.
Rchb. 1837 . . .

Persoonia Smith 1798.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.

Pervinca Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 26: Vincear. (Sejungitur Vinca = *Lochnera Rchb.*)

Petalanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: subdiv. Endoxylar. Class.: Gynopetalae, Calypetalae, Toropetalae.

Petalostemon Pers. 1807.
Dum. 1829. An. p. 40: Galegear. — Par. Torr. & Gray 1840 . . .

Petasites Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 31: Tussilaginear.

Petellaria Dumort. vid. *Patellaria Gray.*

Peterospermum Wight vid. *Pterospermum Schreb.*

Petiveria Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 17: Chenopodear.

Petraea B. Juss. 1759.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear. — Par. Spreng. 1831 . . .

Petrocalis Dumort. vid. *seq.*

Petrocallis R. Brown 1812.
Dum. 1829. An. p. 80 (*Petrocalis*): Lunariear.

Petrophila R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear.

Petroselinum Hoffm. 1814.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.

Petunia Juss. 1803.
Dum. 1829. An. p. 24: Nicotianear. — Par. G. Don 1837 . . .

Peucedaneae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 35: trib. Homalospermar. Gen.: Imperatoria, Peucedanum, Cervaria, Thysselinum, Anethum, Ferula, Opoponax, Heracleum, Galbanum.

Peucedanum Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 35: Peucedanear.

Peziza Dill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 73: Pezizear.

Pezizaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72, 73: fam. Fungariear. Trib.: Stictideae. Pezizeae.

Pezizeae Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 73: trib. Pezizacear. Gen.: Peziza, Ascobolus, Bulgaria, Ditiola, Tympanis, Cenangium, Petellaria, Helotium.

Phaca Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Astragalear.

Phacelia Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 25: Hydrophyllear.

Phacidium Fries 1815.
Dum. 1829. An. p. 75: Hysterinear.

Phaenix Dumort. vid. *Phoenix Linn.*

Phalacroloma Cass. 1826.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear. — Par. Less. 1832 . . .

Phalangium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear.

Phalarideae Link 1827.
Dum. 1829. An. p. 64: trib. Calliflorar. Subtrib.: Alopecureae, *genuinae* (gen.: Phalaris, Baldingera).

Phalaris Mönch 1794.
Dum. 1829. An. p. 64: Phalaridear. genuinar.

Phallus Dill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 74: Clathridear.

Phaloë Dumort. 1827.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.

Phalona Dumort. vid. *Falona Adans.*

Pharus P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 64: Andropoginear.

Phasceae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69: trib. unica Astomator. Gen.: Phascum, Bruchia, Voitia.

Phascum Linn. 1751.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 69: Phascear. — Par. Angstr. . . .

Phaseoleae Bronn 1822.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Leguminosar. Gen.: Rudolphia, Erythrina, Lupinus, Cajanus, Mucuna, Canavalia, Lablab, Dolichos, Soja, Phaseolus, Apios, Thyrsanthus, Fagelia, Rhynchosia, Kennedya, Abrus.

Phaseolus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.

Phaylopsis Willd. 1800.
Dum. 1829. An. p. 23: Ruellicar.

Phebalium Vent. 1804.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.

Phelipaea Desv. 1800.
Dum. 1829. An. p. 23: Orobanchear.

Phellandrium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear.

Phialisphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 75: Dryinospherar.

Philadelphineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38 (p. 36 *Phyladelphideae*): fam. Saxifragariear. Gen.: Philadelphus, Decumaria.

Philadelphus Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 38: Philadelphinear.

Philesia Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 54 (*Phylesia*): Phylesiacear.

Phillyrea Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 79: Oleinear.

Philoxerus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 18: Gomphrenear.

Phlebia Fries 1821.
Dum. 1829. An. p. 73: Thelephorear.
Phlebocarya R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 58: Hemodoracear.
Phleum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 61: Alopecurear. — Par. Fries 1846 . . .
Phlocideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Polemonidear. Gen.: Phlox.
Phlomis Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 22: Marrubiear.
Phlox Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 25: Phlocidear.
Phoenix Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 55 (*Phaenix*): Coryphinear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Pholidota Lindl. 1825.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Phoma Fries 1816.
Dum. 1829. An. p. 75: Xylomatear.
Phormium Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear.
Photinia Lindl. 1821.
Dum. 1829. An. p. 39: Pyrear.
Phragmicoma Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69: Jungermanniear.
Dum. (1831. Syll.) 1835. Obs. Jung. p. 13: Jubulear.
Phryma Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 22: Prunellear.
Phrynium Willd. 1797.
Dum. 1829. An. p. 56: Cannacear.
Phycella Lindl. 1825.
Dum. 1829. An. p. 58: Amaryllidear.
Phyladelphideae Dumort. vid. *Philadelphideneae*.
Phylantheae Dumort. vid. *Phyllantheae Blume*.
Phylesia Dumort. vid. *Philesia Comm.*
Phylesiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: fam. Paridariear. Gen.: Phylesia, Callixene.
Phylica Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 41: Rhamnidear.
Phylidrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: ordo Achnospathar. Fam.: Devauxiaceae, Phylidrineae.
Phylidrineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. 63: fam. Phylidrariear. Gen.: Phylidrum.
Phylidrum Vahl 1805.
Dum. 1829. An. p. 63: Phylidrinear.
Phyllantheae Blume 1825.
Dum. 1829. An. p. 45 (*Phylantheae*): trib. Euphorbiacear. Gen.: Xylophylla, Phyllanthus, Cluytia, Kirganellia, Cicca, Andrachne, Briedelia.
Phyllanthus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Phylanthear.
Phyllis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33: Galiear.
Phyllocladeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: trib. Taxinear. Gen.: Phyllocladus, Taxus, Ginkgo.
Phyllocladus Rich. 1826.
Dum. 1829. An p. 12: Phyllocladear.
Phyllosphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 75: Astomospherar.
Physalis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear.
Physarum Pers. 1795.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Physiotium Nees 1838 . . .
= Pleurozia Dumort.
Physospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: series Umbellatar. Trib. unica: Astrantieae.
Phytelephas Ruiz & Pav. 1798.
Dum. 1829. An. p. 66: Pandanear.
Phyteuma Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 30: Phyteumear.
Phyteumeae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 30: trib. Campanulacear. Gen.: Trachelium, Phyteuma.
Phytolacca Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 17: Phytolaccear.
Phytolacceae R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 15. 17: fam. Chenopodariear. restricta. Gen.: Phytolacca, Galenia.
Piaranthus R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26 (*Priaranthus*): Stapeliear.
Picea Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: Abietinear. — Par. Link . . . .
Picridium Desfont. 1799.
Dum. 1829. An. p. 30: Lactucear.
Picris Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 30: Crepidear.
Picrophleus Dumort. vid. *seq.*
Picrophloeus Blume 1826.
Dum. 1829. An. p. 26 (*Picrophleus*): Strychnear.
Pilobolus Tode 1782.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 74: Carpobolear.
Pilocarpus Vahl 1796.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Pilularia Vaill. 1727.
Dum. 1829. An. p. 67: Pilulariacear.
Pilulariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: fam. Pilulariear. Gen.: Pilularia, Marsilaea.
Pilularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: ordo Dermogynar. Fam.: Pilulariaceae, Salviniaceae.
Pimelea Banks & Sol., Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 18: Thymelinear.
Pimpinella Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Pimpinelleae Spreng. 1818.
Dum. 1829. An. p. 34: trib. Pleurospermar. Gen.: Smyrnium, Conium, Echinophora, Cicuta, Sium, Berula, Heloscia, Prionitis, Ammi, Sison, Carum, Trinia, Aegopodium, Bunium, Pimpinella, Apium, Petroselinum, Ptichotis, Molopospermum, Conopodium, Cuminum.
Pinarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: ordo Julosepalar. Fam.: Coniferae, Taxineae.
Pinckeneya Dumort. vid. *seq*.

Pinckneya Rich. 1803.
Dum. 1829. An. p. 32 (*Pinckeneya*): Cinchonear.

Pinguicula Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 23: Pinguiculacear.

Pinguiculaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: fam. Pinguicularicar. Gen.: Pinguicula, Brandonia.

Pinguicularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: ordo Torocoronar. Fam.: Pinguiculaceae, Utriculariaceae, Montiaceae.

Pinus Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: g. Abietinear. valde restrict. — Simil. Link 1830 . . . .

Piper Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 66: Piperitear.

Piperarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: ordo Spadicatar. Fam.: Piperiteae, Saurureae.

Piperiteae DC. 1819.
Dum. 1829. An. p. 65. 66: fam. Piperariear. Gen.: Piper, Peperonia, Chloranthus.

Piptatherum Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64: Stipacear. — Par. Kunth . . .

Piqueria Cavan. 1794.
Dum. 1829. An. p. 31: Eupatoriear.

Piriqueta Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 42: Turneracear.

Pisonia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 21: Nyctaginear.

Pistacia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 41: Anacardiear.

Pistia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 62: Pistiacear.

Pistiaceae HBK. 1815.
Dum. 1829. An. p. 59. 62: fam. Nayariear. Gen.: Pistia.

Pistillaria Fries 1821.
Dum. 1829. An. p. 73: Clavariacear. — Par. Corda 1838 . . .

Pistorina Dumort. vid. seq.

Pistorinia DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38 (*Pistorina*): Cotyledonear. — Par. Rchb. 1841 . . .

Pisum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Viciear.

Pitcairnia L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 55 (*Pitcarnia*): Tillandsiear. — Par. Rchb. 1841 . . .

Pittosporeae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 43. 48: fam. Citrariear. Gen.: Billardiera, Pittosporum, Bursaria, Senacia.

Pittosporum Banks, Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 48: Pittosporear.

Placodium Hill, Wigg. 1780.
Dum. 1829. An. p. 71: Squamariear.

Plagiochila Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 14: Radulear.

Planera Gmel. 1791.
Dum. 1829. An. p. 17: Ulmidear.

Plantagineae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 20. 25: fam. Convolvulariear. Trib.: *Plantagineae* (gen.: Plantago), Littorelleae.

Plantago Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 25: Plantaginear.

Plataneae Lestib. 1825.
Dum. 1829. An. p. 11. 12: fam. Populariear. Trib.: *genuinae* (gen.: Platanus), Liquidambreae, Comptonieae.

Platanthera Rich. 1818.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.

Platanus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 12: Platanear. genuinar.

Platisphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 75: Platispherar.

Platispherae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: trib. Trichiacear. Gen.: Platisphaera.

Platycerium Desv. 1827.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear. — Par. Lindl. 1847 . . .

Platylobium Smith 1794.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.

Platyzoma R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 67: Gleicheniear.

Plectranthus L'Herit. 1785.
Dum. 1829. An. p. 22: Ocymear.

Pleroma Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.

Pleurandra Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 50: Dilleniacear. — Par. Dietr. 1843 . . .

Pleuroschisma Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 19: g. Pleuroschismear. restrict. (*Pleuroschismatypus Dum.* 1831.)
Synon. Mastigobryum Nees.

Pleuroschismeae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 18: trib. Jungermanniotypar. Gen.: Chiloscyphus, Odontoschisma, Lepidozia, Pleuroschisma.

Pleurospermae Dumort. Anal. fam. p. 34: series Umbellatar. Trib.: Bolacineae, Buplevreae, Pimpinelleae, Seselineae.

Pleurothallis R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.

Pleurozia Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 15: nov. g. Aploziear. (Jung. cochleariformis, sphagnoides.)
Synon. Physiotium Nees.

Plocama Ait. 1789.
Dum. 1829. An. p. 33: Psychotriear.

Plocamium Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 76: Sphaerococcear. — Par. Fries 1846 . . .

Plocaria Ness 1820.
Dum. 1829. An. p. 76: Sphaerococcear.

Pluchea Cassini 1817.
Dum. 1829. An. p. 31: Pluchear.

Plucheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Pluchea, Tessaria.

Plukenetia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 45: Acalyphear. — Par. Meisn. 1841 . . .

Plumbageae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: trib. Plumbaginear. Gen.: Plumbago, Vogelia.

Plumbagineae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 21. 27: fam. Primulariear. Trib.: Armeriaceae, Plumbageae.

Plumbago Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 27: Plumbagear. — Par. Meisn. 1840 . . .

Plumeria Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 26: Vincear.
Poa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 63: Poëar. — Par. Fries 1846 . . .
Poaceae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 63: trib. Scobiflorar. Subtrib.: Poëae, Eleusineae.
Podalyria Willd. 1799.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Podanthes Haw. 1812.
Dum. 1829. An. p. 26: Stapeliear. — Par. G. Don 1837 . . .
Podisoma Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Uredinear.
Podisonia Dumort. vid. *Posidonia Kön.*
Podocarpeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: trib. Taxinear. Gen.: Podocarpus, Dacrydium.
Rchb. 1837 . . .
Podocarpus L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 12: Podocarpear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Podolobium R. Brown 1811.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Podophyllarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: ordo Toropetalar. Fam. unica: Podophylleae.
Podophylleae DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 45. 52: fam. Podophyllariear. Gen.: Podophyllum, Jeffersonia.
Podophyllum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 52: Podophyllear.
Podopterus Humb. & Bonpl. 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Rumicear.
Podospermum DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 30: Scorzonerear.
Podostemon Michx. 1803.
Dum. 1829. An. p. 62: Podostemonear.
Podostemoneae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 62: trib. Marathrinear. Gen.: Podostemon, Crenias.
Podostigma Elliott 1817.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.
Poëae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: subtrib. Poacear. Gen.: Glyceria, Enodium, Melica, Centotheca, Triodia, Uralepis, Briza, Eragrostis, Poa, Uniola, Airopsis.
Nees 1843 . . .
Pogonia Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.
Poinciana Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Polanisia Rafin. 1819.
Dum. 1829. An. p. 51: Cleomear.
Polemoneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Polemonidear. Gen.: Polemonium, Gilia, Ipomopsis, Caldasia, Collomia, et (p. 79) Cantua.
Polemonideae Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 20. 25: fam. Convolvulariear. Trib.: Polemoneae, Phlocideae.
Polemonium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 25: Polemonear.
Pollichia Soland. 1789.
Dum. 1829. An. p. 19: Pollichiear.
Pollichieae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 19: trib. Scleranthidear. Gen. id.
Polyactis Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonocladear.
Polyangium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 74: Nidulariacear.
Polyanthes Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear.
Polybotrya Humb., Willd. 1810.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear.
Polycarpon Löfl., Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 49: Spergulear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Polycenia Choisy 1823.
Dum. 1829. An. p. 22: Selaginear.
Polycnemum Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear.
Polygala Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 23: Polygalacear. — Par. Rchb. 1831 . . .
Polygalaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 23: fam. Polygalariear. Gen.: Polygala, Comesperma, Badiera, Soulamea, Muraltia, Nylandtia, Monnina, Securidaca.
Lindl. 1836 . . .
Polygalarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20: ordo Torocoronar. Fam.: Polygalaceae, Krameriaceae.
Polygaster Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 74: Tuberacear.
Polygonarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15: ordo Torosepalar. Fam.: Polygoneae, Rumiceae.
Polygonatum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 60: Convallariear. — Par. Endl. 1837 . . .
Polygoneae B. Juss. 1759.
Dum. 1829. An. p. 15. 18: fam. Polygonariear. Trib.: Coccolobeae, Persicarieae.
Polygonella Michx. 1803.
Dum. 1829. An. p. 18: Rumicear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Polygonum Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 18: Persicariear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Polymnia Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 31: Milleriear. — Par. Spach 1841 . . .
Polyotus Gottsche 1845 . . . .
= Lepidolaena Dumort.
Polypodeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: subtrib. Polypodiear. Gen.: Acrostichum, Platycerium, Polybotrya, Hemionitis, Gymnogramma, Taenitis, Notholaena, Grammitis, Ceterach, Meniscium, Cyclophorus, Polypodium.
Polypodieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: trib. Filicum. Subtrib.: Polypodeae, Asplenieae, Cyatheae.
Polypodium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear.
Polypogon Desfont. 1810.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear.
Polyporus Fries 1815.
Dum. 1829. An. p. 73: Boletear.

Polypremum Linn. 1741.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Polypteris Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 31: Heleniear.
Polysaccum DC. 1815.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerodermear.
Polysiphonia Grev. 1824.
Synon. (add.) Grammalia Dumort.; Syennema Spreng. pt.
Polyspora Sweet.
Dum. 1829. An. p. 47: Ternstromiear.
Polystachya Hook.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Polytricheae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 68: trib. unica Hymenopogonor. Gen.: Polytrichum, Catharinea.
Polytrichum Dill. 1719.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 68: Polytrichear.
Pomaceae Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 39: trib. Rosacear. Subtrib.: Mespileae, Pyreae.
Pomaderris Labill. 1804.
Dum. 1829. An. p. 41: Rhamnidear.
Pomax Soland., Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 32: Opercularidcear.
Pombalia Vand. 1771.
Dum. 1829. An. p. 49: Violear.
Pommereulla Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 63: Avenacear.
Ponceletia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Epacrear. — Par. DC. 1839 . . .
Pontederia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 61: Pontederiear.
Pontederiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Liliariear. Trib.: Pontederieae, Leptantheae.
Meisn. 1842 . . .
Pontederieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: trib. Pontederiacear. Gen.: Pontederia, Heteranthera.
Ponthieva R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Popularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: ordo Julosepalar. Fam.: Plataneae, Salicineae, Myriceae, Betulaceae.
Populus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 12: Salicinear.
Porana Burm. 1768.
Dum. 1829. An. p. 25: Convolvulinear.
Porcellites Cassini 1822.
Dum. 1829. An. p. 30: Scorzonerear.
Porina Achar. 1810.
Dum. 1829. An. p. 71: Verrucariear.
Porosphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 74: Stigmasphear.
Portlandia P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Portulaca Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 41: Portulacear.
Portulaceae Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 37. 41: fam. Portulariear. Gen.: Portulaca, Trianthema, Anacampseros.
Portularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: ordo Calypetalar. Fam.: Portulaceae, Mesembryneae.

Posidonia Kön. 1806.
Dum. 1829. An. p. 66 (*Podisonia*): Zosteracear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Potalia Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 26: Potaliacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Potaliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 26: fam. Jasminariear. Gen.: Potalia, Fagraea, Anthocleista.
Lindl. 1830 . . .
Potamogetarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Torochlamydar. Fam.: Potamogetoneae, Zannichelliaceae.
Potamogeton Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 61: Potamogetonear. — Par. Rchb. 1830 . . .
Potamogetoneae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 59. 61: fam. Potamogetariear. Gen.: Potamogeton, Ruppia.
Potamophila R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 64: Oryzacear.
Potentilla Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 39: Fragariacear.
Poteriae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19: trib. Sanguisorbear. Gen.: Poterium, Sanguisorba.
Poterium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 19: Poteriar.
Pothos Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 66: Orontiear. — Par. Spach 1846 . . .
Pourouma Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 17: Artocarpear.
Pourretia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 55: Tillandsiear.
Prasium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Prunellear.
Prasophyllum R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Premna Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 22 (sph. *Permna*): Viticear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Prenanthes Vaill. 1721.
Dum. 1829. An. p. 30: Lactucear.
Prescotia Lindl. 1825.
Dum. 1829. An. p. 56: Gastrodiear.
Prestonia R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Echitear.
Priaranthus Dumort. vid. *Piaranthus R. Brown.*
Primula Dodon., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 27: Primulear.
Primulaceae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 21. 27: fam. Primulariear. Trib.: Glaucideae, Anagallideae, Primuleae, Cyclamineae, Corideae.
Primularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21: ordo Torocoronar. Fam.: Ardisiaceae, Primulaceae, Plumbagineae.
Primuleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: trib. Primulacear. Gen.: Androsace, Aretia, Primula, Cortusa, Soldanella, Hottonia.
Prinos Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 27: Ilicear.
Prionitis Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Prismatocarpus L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 30: Campanulear.

Priva Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear.

Prockia P. Browne, Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 50: Bixacear.

Prostanthera Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 22: Melissear.

Proteae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Proteacear. Gen.: Protea, Leucadendron, Isopogon, Nivenia, Leucospermum, Petrophila, Mimetes, Serruria, Adenanthos, Sorocephalus, Spatalla, Conospermum, Synaphea, Simsia, Aulax, Brabeium.

Protonema Agardh 1824.
Dum. 1829. An. p. 75: Byssinear.

Proustia Lag. 1811.
Dum. 1829. An. p. 31: Mutisiear.

Prunella Moris. 1680.
Dum. 1829. An. p. 22: Prunellear. — Par. Rchb. 1837 . . .

Prunelleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Melittidear. Gen.: Cleonia, Prunella, Melittis, Prasium, Horminum, Phryma, Trixago.
Rchb. 1837 . . .

Prunus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Amygdalear.

Pterospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: series Umbellatar. Trib.: Thapsieae, Angeliceae.

Rhizoctonia DC. 1815.
Leman 1817. Dict. v. 8. p. 6 (*Rhizoctonum*): g. Sarcocarpor.

Rhizoctonum Leman vid. *Rhizoctonia DC.*

Rixea*) Ch. Morren 1845. Ann. soc. agric. et bot. de Gand. I. p. 225. t. 22: nov. g. Tropaeolear.

*) Dicat. Jos. Rixe, Gandaviensi, in Americam (Quito) tritici invectori.

Appendix

ex Dumortier Florula belgica 1827.

* *Labiateae* 42 fam. Thalamitubiae. Trib.: Teucrieae; Salvieae, Melittideae, Stachydeae; Leonureae, Nepeteae; Mentheae.

Laburnum 98 sect. Cytisi.

Lactuca 60 g. Lactucear. Archetypar. Sect.: Apate, Lactucaria.

* Lactucaria 60 sect. Lactucae. (sativa, virosa, etc.)

Lactuceae 59 tribus Trichostylear. Subtrib.: *Archetypae* (gen.: Sonchus, Lactuca, Mycelis), Crepideae, Hieracieae, Scorzonereae.

Ladanum 45 sect. Galeopsidis.

Lagopus 100 sect. Trifolii.

Lagurus 151 g. Phleacear.

Lamium 45 g. Galeopsidear. Sect.: Lamiopsis, Lamiotypus, Orvala.

Lampsana 60 g. Crepidear.

Lapathum 17 sect. Rumicis. Subsect.: Oreolapathum, Hydrolapathum, Nemolapathum, Blepharolapathum.

Lappa 73 g. Serratulear.

Lappula 40 g. Cynoglossear.

Larbraea 109 g. Arenariear. (aquatica, crassifolia.)

Larix 10 sect. Abietis.

Laserpitium 82 g. Thapsiear.

* Lasiocystis 148 sect. Dichostachydis. (Carex hirta, filiformis.)

Lathraea 33 g. Orobanchear. Sect.: Squamaria, Clandestina.

* Lathyris 87 sect. Euphorbiae.

* Lathyrotypus 102 sect. Lathyri. (sativus, etc.)

Lathyrus 103 g. Viciear. Sect.: Aphaca, Nissolia, Lathyrotypus.

Ledum 53 g. Rhodorear.

Leguminosae 98 fam. Calicunguliae. Trib.: Genisteae, Trifolieae, Galegeae, Astragaleae, Hedysareae, Vicieae, Phaseoleae.

* Leionema 29 sect. Lysimachiae. Subsect.: Lerouxia, Steironema, Eulysimachia, Naumburgia.

* Leiostipa 151 sect. Stipae. (capillata.)

Lemna 265 g. Lemnacear. Sect.: Hydrophylla, Hydrophace.

Lemnaceae 147 fam. Glumaciae. Gen.: Lemna.

Lentago 54 sect. Viburni.

Lentibularieae 31 fam. Thalamitubiae. Trib.: Utricularieae, Pinguiculeae.

Leontodon 63 g. Scorzonerear. Sect.: Thrincia, Apargia, Scorzoneroides.

* Leontorrhinum 34 sect. Linariae. (arvensis, vulgaris, etc.)

Leonurus 46 g. Marrubiear. Sect.: Cardiaca, Chaiturus.

Lepia 119 sect. Lepidii.

* Lepidiotypus 119 sect. Lepidii. (latifolium, graminifolium.)

Lepidium 118 g. Biscutellear. Sect.: Cardaria, Lepidiotypus, Deleptium, Cardamon, Lepia.

* *Lepiureae* (1823) 149 trib. Calliflorar. Gen.: Lepiurus, Nardus.

* Lepiurus 149 g. Lepiurear. (incurvatus et strigosus.)
= Lepturus R. Brown.

* Leprophyllum 21 sect. Chenopodii. (foetidum, viride, Botrys, etc.)

Lepteranthus 73 sect. Centaureae.

* Leptotrix (1823) 152 sect. Elymi. (europaeus.)

Lerouxia 29 subsect. Leionemae.

Leucoglochin 146 sect. Caricotypi. (Carex pauciflora.)

* *Leucoideae* 136 fam. Fructauliae. Gen.: Galanthus, Leucoium.

Leucosinapis 122 sect. Sinapios.

Levisticum 82 g. Angelicear.

* *Libanotideae* 79 subtrib. Seselinear. Gen.: Seseli, Bubon.

Ligusticum 79 g. Foeniculear.

Ligustrum 52 g. Oleinear.

Lilac 52 g. Lilacinear.

* *Lilacineae* 52 trib. Jasminear. Gen.: Lilac.

Liliaceae 139 fam. Liliiflorae. Gen.: Lilium, Fritillaria, Tulipa.

* *Lilifloria* 138 subordo Thalamauliae. Fam.: Asparagineae, Hemerocallideae, Liliaceae, Asphodeleae, Colchiceae, Melanthideae, Triglochineae, Juncineae.

Lilium 139 g. Liliacear.

Limbarda 68 g. Inulear. Archetypar.

Limnanthemum 52 g. Menianthear.

Limnochloa 143 sect. Clavulae. (Scirpus multiculmis.)

Limodorum 134 g. Aretusear. (abortivum.)

Limonium 27 g. Plumbaginear. (vulgare, bellidifolium.)

ERRATA.

pag. 1. 1 lin. 21 leg. Dietr. 1839.
15. 1 — 42 — Eusenecionear.
22. 1 — 50 — Agdh. 1823.
26. 1 ** — oppositum est.
29. 2 lin. 31 — g. Hymenioph.
35. 1 — 16 — Canar.
18 — Bory.
46. 1 — 58 — Coniocarpicar.
47. 2 — 3 — (Flora.
58. 1 — 3 — Ann. sc. nat.
70. 1 — 4 — Lepiscline, Lepidocl.
36 — 827. n. 2219.
71. 2 — 10 — Gmel. 1768
76. 2 — 21 — Symb. I. p. 9. t. 5.
84. 1 — 17 — Nematococcus.
85. 2 — 26 — Phyllanthi.
91. 1 — 1 — Brown cont.
95. 1 — ult. — Hdb. I. p. 480.
pag. 107. 2 lin. 15 ab ult. leg. 1841. Nom.
111. 1 — 47 Del. 1843.
147. 1 — 28 leg. Cyrtophyllum.
177. 2 — 13 — Brongn. 1824.
185. 2 — 17 ab ult. leg. 1827. v. 50.

pag. 187. 2 — 11 leg. Sejungitur.
190. 2 — 3 ab ult. leg. Lytogomphus.
217. 2 — 36 leg. St. Hil. 1827.
220. 2 — 8 — zeyl. p. 151. t. 70.
228. 2 — 4 — Wiggers 1780.
236. 2 — 7 ab ult. leg. Vég. phan.
253. 2 — 16 leg. Mejonectes.
313. 2 not. — ϑηλή.
406. 1 lin. 2 ab ult. leg. Bartl.
423. 2 not. leg. hortulano.
470. 1 not. — pallidus.
662. 1 lin. 2 leg. St. Hil. 1805.
814. 2 — 1 — Bocagear. (Bocagea pis.
967. 2 — 20 ab ult. leg. latum.
pag. 1046. 2 lin. 35 leg. Nees 1839.
1174. 1 — 47 — Willugbaeya.
1213. 1 — 7 ab ult. leg. Delia Dumort.
1368. 2 — 3 — — Brongn. 1843.
1431. 2 — 38 leg. p. 8; 1838. II..
1522. 2 — 25 — t. 3. f. 1.
1563. 2 not. leg. Vellozo.
1614. 2 lin. 21 leg. Rchb.

Druck von Stöhr & v. Gebhardi in Cassel.